




600049972.



.399

d. 1054

Bilder - Atlas.

Iconographische Encyclopädie der Wissenschaften und Künste.

Ein Ergänzungswerk zu jedem Conversations-Lexikon.

Zweite vollständig umgearbeitete Auflage.

Bearbeitet von

Karl Gustav von Crecelius, Ferdinand Bischoff, Karl Benhns, Moriz Carriere,
Bernhard von Cotta, August Essenwein, August von Eyr, Wilhelm Fränkel, Georg Gerland, Wilhelm Hamm,
Ernst Hartig, Rudolf Heyn, Henry Lange, Johann Müller, Bernhard Hermann Obß, Otto Prösch, Friedrich Schoedler,
Joseph Schott, Reinhard Schwamkrug, Alfred Steizner, Otto Ule, Karl Vogt, Heinrich Adolf Weiske,
Theodor Weiß, Reinhold Werner, Moriz Wilkomm.

Erläuternder Text.

In zwei Bänden.

Erster Band.

Mathematik — Physik — Astronomie — Erdkunde — Anatomie — Zoologie —
Botanik — Mineralogie — Mechanische Technik — Chemische Technik.



Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1875.



Das Recht der Uebersetzung ist vorbehalten.





Inhalt des ersten Bandes.

	Seite
Mathematik. Von Dr. Heinrich Adolph Weiske in Leipzig. (1½ Bogen.) . . .	1 — 24
Physik. Von Professor Dr. Johann Müller in Freiburg i. Br. (3 Bogen.) . .	1 — 48
Astronomie. Von Professor Dr. Karl Bruhns in Leipzig. (3¾ Bogen.) . . .	1 — 60
Erdfunde. Von Bergrath Dr. Bernhard von Cotta in Freiberg und Professor Dr. Johann Müller in Freiburg i. Br. (2⅛ Bogen.)	1 — 34
Anatomie. Von Dr. Bernhard Hermann Obst in Leipzig. (8¼ Bogen.) . . .	1 — 132
Zoologie. Von Professor Dr. Carl Vogt in Genf. (14½ Bogen.)	1 — 231
Botanik. Von Professor Dr. Moritz Willkomm in Prag. (5⅛ Bogen.)	1 — 82
Mineralogie. Von Hütteningenieur Dr. Otto Bröck in Bergisch-Gladbach. (2½ Bogen.)	1 — 40
Mechanische Technik. Von Professor Dr. Ernst Hartig in Dresden und Professor Dr. Theodor Weiß in Brünn. (6 Bogen.)	1 — 96
Chemische Technik. Von Director Dr. Friedrich Schoedler in Mainz. (3 Bogen.)	1 — 48

Mathematik.

Bearbeitet

VON

Dr. Heinrich Adolph Weiske,
Privatdocent an der Universität zu Leipzig.

I n h a l t.

	Seite		Seite
Einführung	3	Sphärische Trigonometrie	3
Allgemeine geometrische Grundbegriffe	3	Analytische Geometrie	3
Planimetrie	3	I. Linien zweiten Grades	3
I. Von den Winkeln und Parallellinien	3	II. Curven höherer Grade	3
II. Von den geradlinigen Figuren	4	III. Transcendente Linien	3
A. Von den Dreiecken	4	Darstellende Geometrie	3
B. Von den Vierecken und den Vielecken überhaupt	5	I. Parallelprojection	3
III. Von der Gleichheit der geradlinigen Figuren	5	Schattenconstructionen	3
IV. Vom Kreise	5	II. Centrale Projection	3
V. Von der Aehnlichkeit der Figuren	6	Construction der Perspektiven der Schattengrenzen	3
VI. Von den regulären Polygonen und der Kreismessung	7	Geodäsie	3
VII. Von der Flächenberechnung geradliniger Figuren und des Kreises	7	I. Instrumentenkunde	3
Ebene Trigonometrie	7	II. Messen und Aufnehmen	3
Stereometrie	7	1. Elementare Aufgaben	3
I. Von der Lage der Ebenen und Geraden im Raume	8	2. Horizontale Aufnahmen	3
II. Von den körperlichen Ecken und Polyedern	8	3. Verticale Messungen	3
III. Von den Prismen, Pyramiden und Körpern	8	4. Triangulation für größere Aufnahme und Gradmessungen	3
IV. Von Cylinder, Kegel und Kugel	9	III. Darstellung der geodätischen Aufnahme durch Zeichnung	3
		A. Topographie	3
		B. Chorographie	3

Einleitung.

Bei der Betrachtung aller Dinge lassen sich an ihnen einerseits die qualitativen, andererseits die quantitativen Beziehungen ins Auge fassen. Die Wissenschaft, welche sich mit der Erörterung dieser letztern befaßt, heißt die Mathematik, und zwar die reine, wenn sie die Quantitäten oder Größen betrachtet ohne Rücksicht auf irgendwelche vorliegenden concreten Fälle, die angewandte dagegen, wenn sie diese allgemeinen Betrachtungen anwendet auf die Ermittlung von Größenbeziehungen in der Natur oder den verschiedenen Zweigen der Praxis des Lebens.

Da aber die Größen ihrem Wesen nach in zwei Klassen getheilt werden müssen, nämlich in discrete oder Zahlengrößen und in stetige oder Raumgrößen, so zerfällt auch die Mathematik oder Größenlehre demgemäß in zwei Abtheilungen, die Arithmetik oder Zahlenlehre und die Geometrie oder Raumgrößenlehre.

Die rein arithmetischen Operationen als solche können nicht Gegenstand einer bildlichen Darstellung sein, wohl aber alles, was die Raumgrößen betrifft, also in das Gebiet der Geometrie gehört.

In der reinen Geometrie wird zunächst die Lehre von den Raumgebilden in der Ebene (Planimetrie) behandelt, und dann die von den körperlichen Raumgebilden (Stereometrie). Die Dreiecksausmessung (Trigonometrie) in der Ebene sowohl als auch der Kugelfläche (sphärische Trigonometrie) wird ihrer Wichtigkeit wegen immer als eine gesonderte Disciplin betrachtet.

Werden bei Erörterung der Raumgrößenbeziehungen nur die elementar-mathematischen Operationen angewendet, so nennt man diese Lehren die elementare Geometrie, während in der sogenannten höhern oder analytischen Geometrie complicirtere Operationen benutzt werden.

Wendet man die Lehren der Geometrie dazu an, richtige Bilder von sichtbaren Objecten auf gegebenen Flächen zu erzeugen, so bildet das den Inhalt der darstellenden (descriptiven) Geometrie, und wählt man als Object der geometrisch genauen Ausmessung und Darstellung Theile oder das Ganze der Erdoberfläche, so nennt man diesen Theil der angewandten Geometrie Geodäsie (mit Einschluß des Situationszeichnens und der Mappirungskunst oder Chorographie).

Allgemeine geometrische Grundbegriffe.

Jede Aufstellung einer mathematischen also auch einer geometrischen Wahrheit, welche sich unmittelbar von selbst versteht, heißt ein Grundsatz (Axiom), jede andere Behauptung aber, deren Wahrheit erst aus andern schon bekannten und zugestandenen gefolgert wird, heißt ein Lehrsatz (Theorem.) Die Schlussfolgerung, welche nöthig ist, um die Wahrheit eines Lehrsatzes darzutun, heißt ein Beweis. Der Beweis eines Satzes wird entweder direct geführt oder es wird die Unmöglichkeit aller übrigen Fälle gezeigt, sobald

nur die Möglichkeit des behaupteten Falles übrigbleibt. Dann heißt der Beweis indirect oder apagogisch.

Was nun zunächst die räumlichen Gebilde betrifft, deren Beziehungen zueinander die Geometrie erörtert, so heißt ein allseitig begrenzter Theil des an sich nach allen Richtungen unendlichen Raums ein Körper. Ein Körper hat drei Ausdehnungen (Dimensionen): Länge, Breite und Höhe. Seine Grenzen heißen Flächen. Eine Fläche hat nur zwei Dimensionen: Länge und Breite. Der Durchschnittsort zweier Flächen heißt Linie. Sie hat nur eine Dimension: die Länge. Der Durchschnittsort zweier Linien heißt ein Punkt, und ein solcher geometrischer Punkt hat natürlich gar keine Dimensionen.

Eine Linie, in welcher je drei beliebige aufeinanderfolgende Punkte immer in derselben Richtung liegen, heißt eine gerade Linie (kurz Gerade), jede andere eine krumme. Jede gerade Linie ist an sich unbegrenzt lang. Zwischen zwei Punkten ist die Gerade der kürzeste Weg (Grundsatz). Zwei Gerade können nur in einem Punkte sich schneiden (Grundsatz). Eine Fläche, mit welcher nach jeder Richtung eine Gerade vollständig zusammenfällt, heißt eine Ebene; jede andere Fläche ist krumm.

Planimetrie.

Die Elemente, aus denen die Gebilde der elementar-Planimetrie zusammengesetzt oder durch die sie begrenzt werden, sind die Gerade und der Kreis. Der Kreis (Taf. 1, Fig. 2) entsteht, wenn eine begrenzte Gerade AB sich um einen ihrer Endpunkte A dreht. Dann beschreibt B einen Kreis (Umfang, Peripherie), dessen Mittelpunkt (Centrum) A, dessen Halbmesser (Radius) AB ist.

I. Von den Winkeln und Parallellinien.

Zwei Linien AB und AC (Taf. 1, Fig. 1), welche sich in einem Punkte A durchschneiden, bilden einen Winkel ($\angle$). A ist der Scheitel, AB und AC sind die Schenkel des Winkels. Man schreibt ihn: $\angle BAC$ oder $\angle CAB$ (der Scheitelbuchstabe, hier A, steht in der Mitte). Ein Winkel kann auch entstanden gedacht werden durch Drehung einer Geraden AB (Fig. 2) in eine andere Lage AF. Für gleiche Winkel BAF und FAG müssen auch die Drehungsbogen BF und FG gleich sein, und es ist daher der Bogen ein Maß des Winkels. Man theilt zu diesem Zweck den ganzen Umlreis in 360 Theile, Grade ($^{\circ}$), jeden Grad in 60 Minuten ($'$), jede Minute in 60 Sekunden ($''$). Ein Winkel, dessen Bogen gleich einem Halbkreise ist und dessen Schenkel AB und AC in einer geraden Linie liegen, heißt ein flacher oder gestreckter und hat 180° . Die Hälfte eines flachen Winkels heißt ein Rechter ($= 90^{\circ} = R$). — Zwei Linien, wie BC und DE, welche sich unter rechten Winkeln schneiden, stehen aufeinander senkrecht oder die eine ist ein Loth (Perpendikel) auf der andern. Ein Winkel zwischen 0° und 90° wie BAG heißt ein spitzer, ein Winkel zwischen 90° und 180° wie CAG heißt ein stumpfer; beide Arten heißen concave Winkel.

Ein Winkel größer als 180° heißt ein *converger*. Von zwei Winkeln, die sich zu 180° ergänzen, wie $\angle BAF$ und $\angle FAC$, heißt der eine das *Supplement*, der andere von zweien, die sich zu 90° ergänzen, wie $\angle FAB$ und $\angle FAD$, heißt der eine das *Complement* des andern. Zwei Winkel wie $\angle BAC$ und $\angle DAC$ (Fig. 3), die einen Schenkel CA und den Scheitel A gemeinsam haben und deren andere Schenkel BA und DA entgegengesetzt in derselben Geraden liegen, heißen *Nebenwinkel*. Nebenwinkel betragen stets zwei Rechte (Lehrsatz). Zwei Winkel wie a und b oder c und d (Fig. 4), bei welchen die Schenkel des einen die Verlängerung der Schenkel des andern sind, nennt man *Scheitelwinkel*. Scheitelwinkel sind gleich, z. B. $a = c$ und $b = d$ (Lehrsatz). Werden zwei, wenn auch beliebig verlängert, doch nicht sich schneidende und dann *parallel* genannte Gerade durch eine dritte geschnitten (Fig. 5), so entstehen acht Winkel a, b, c, d und f, g, h, i , die sich paarweise in folgende drei Gruppen bringen lassen: 1) *Gegenwinkel*, ein innerer und ein äußerer an derselben Seite der schneidenden Linie (b und g, d und i, a und f, c und h); 2) *Wechselwinkel*, zwei innere oder zwei äußere an entgegengesetzten Seiten der schneidenden Linie (a und h, b und i, c und f, d und g); 3) *Ergänzungswinkel*, zwei innere oder zwei äußere an derselben Seite der schneidenden Linie (a und i, b und h, c und g, d und f). Ueber die Beziehungen dieser Winkel zueinander gelten folgende Lehrsätze: Werden Parallelen durch eine Gerade geschnitten, so sind die *Gegenwinkel* gleich ($a = f, b = g, c = h, d = i$), die *Wechselwinkel* gleich ($a = h, u. s. w.$) und die *Ergänzungswinkel* ergänzen sich zu zwei Rechten ($a + i = 180^\circ, u. s. w.$). Umgekehrt: Gelten beim Schnitte zweier Geraden durch eine dritte obige Winkelbeziehungen, so sind die geschnittenen Geraden *parallel*.

II. Von den geradlinigen Figuren.

Jeder ungrenzte Theil der Ebene heißt *Figur*. Sind die Grenzen derselben gerade Linien, heißt sie *Vieleck* oder *Polygon*. Man unterscheidet daran die *Seiten*, *Ecken* und *Winkel*. Die *Nebenwinkel* der letzten heißen *Außenwinkel*. Verbindungslinien nicht aufeinanderfolgender Ecken *Diagonalen*. Nach der Anzahl der Ecken hat man *Drei-, Vier-, Fünfeck* u. s. w. Zwei Figuren, die sich so aufeinanderlegen lassen, daß ihre Grenzen sich völlig decken, heißen *congruent* ($\cong$). Ihre gleichliegenden Seiten und Winkel sind dann gleich.

A. Von den Dreiecken.

Man unterscheidet nach den Seiten *ungleichseitige* Dreiecke (Zaf. 1, Fig. 6) mit drei ungleichen, *gleichschenkelige* (Fig. 7 und 8) mit zwei gleichen und *gleichseitige* (Fig. 9) mit drei gleichen Seiten. Bei den *gleichschenkeligen* heißt die dritte ungleiche Seite *Grundlinie* (*Basis*). Nach den Winkeln heißt ein Dreieck *spitzwinklig* (Fig. 6), *rechtwinklig* (Fig. 21) oder *stumpfwinklig* (Fig. 8), je nachdem es drei spitze, oder einen rechten und zwei spitze, oder einen stumpfen und zwei spitze Winkel hat; im *rechtwinkligen* heißt die dem rechten Winkel gegenüberliegende Seite *Hypotenuse*, die ihn einschließenden *Katheten*. Die wichtigsten Lehrsätze über allgemeine Dreiecksbeziehungen sind: In jedem Dreieck ist die Summe zweier Seiten größer als die dritte und die Differenz zweier Seiten kleiner als die dritte (Fig. 10: $AC + BC > AB$ und $AC - BC < AB$). Die Summe der drei Winkel eines Dreiecks beträgt zwei Rechte (Fig. 10: $\angle a + \angle b + \angle c = 180^\circ$, denn $a = m, b = n$ und $m + c + n = 180^\circ$).

Ein *Außenwinkel* eines Dreiecks ist gleich der Summe der beiden innern gegenüberstehenden (Fig. 10: $\angle d = a + c$).

Für die Bedingungen der *Congruenz* zweier Dreiecke gibt es folgende vier Lehrsätze: Zwei Dreiecke (z. B. $\triangle ABC$ und $\triangle DEF$, Fig. 11) sind *congruent*, wenn sie übereinstimmen 1) in zwei Seiten und dem eingeschlossenen Winkel, 2) in einer Seite und den beiden anliegenden oder einem anliegenden und dem gegenüberliegenden Winkel, 3) in allen drei Seiten und 4) in zwei Seiten und dem der größeren Seite gegenüberliegenden Winkel. Diese letztere Winkelbedingung ist nöthig, denn der der kleinern Seite gegenüberliegende genügt nicht. So z. B. stimmt in Fig. 12 $\triangle ABC$ sowohl mit $\triangle DFG$ als auch mit $\triangle DEG$ in zwei Seiten und dem der kleinern Seite gegenüberliegenden Winkel überein, denn $AC = DG, BC = EG = EG$ und $\angle A = \angle D$, aber es ist $\triangle ABC$ nur mit DFG , nicht mit DEG congruent.

Einige andere wichtige Sätze über Dreiecke sind folgende: Der größere von zwei Seiten eines Dreiecks liegt auch ein größerer Winkel und dem größeren von zwei Winkeln eine größere Seite gegenüber (wenn in Fig. 10 $AC > BC$, so ist auch $\angle b > \angle a$). Ferner: Sind zwei Seiten eines Dreiecks gleich zwei Seiten eines andern, die eingeschlossenen Winkel aber in beiden ungleich, so sind es auch die dritten Seiten, und zwar liegt dem kleinern Winkel die kleinere Seite gegenüber (z. B. Fig. 13: wenn $AC = DG$ und $BC = EG$, aber $\angle C < \angle G$, so ist auch $DE < AB$). Fundamentalsätze für das *gleichschenkelige* Dreieck sind: Die Winkel an der Basis sind gleich, und ein Dreieck mit zwei gleichen Winkeln ist *gleichschenkelig* (z. B. Fig. 15 ist $AC = BC$, so ist auch $\angle A = \angle B$ und umgekehrt). Die *Halbirungslinie* des Winkels an der Spitze des gleichschenkeligen Dreiecks halbt die Grundlinie und steht auf ihr senkrecht. (Wenn in Fig. 14 CM den Winkel C halbt, so $AM = BM$ und CM senkrecht ($\perp$) auf AB .) Hieraus folgt auch, daß ein in der Mitte der Basis errichtetes Loth durch die Spitze des Dreiecks geht. Ferner: Liegen zwei gleichschenkelige Dreiecke auf derselben Grundlinie und werden ihre Spitzen durch eine Gerade verbunden, so halbt diese den Winkel an den Spitzen und die Grundlinie und steht auf letzterer senkrecht. (Sind in Fig. 14 AB die gemeinschaftliche Basis, C und D die Spitzen, so halbt CD die Winkel C und D und steht in der Mitte M von AB auf AB senkrecht.)

Auf diese Sätze sowie auf einige frühere gründen sich unmittelbar eine Reihe wichtiger, elementargeometrischer Constructionen, z. B. das Halbiren von Linien und Winkeln, sowie das Errichten und Fällen von Lothen und das Ziehen von Parallelen. Man halbt z. B. eine Linie AB (Fig. 15), wenn man von A und B aus mit gleicher Zirkelöffnung die Durchschnitte C und D bildet, an beide das Lineal legt und dessen Durchschnitt mit AB in M bemerkt (vgl. Fig. 14). Man errichtet auf einem Punkt A (Fig. 16) einer Linie ein Loth, wenn man von A aus auf der Linie gleiche Stücke AB und AC abschneidet, von B und C aus mit gleicher Zirkelöffnung den Durchschnitt D bildet, dann ist AD das gesuchte Loth. Man fällt von einem Punkte C (Fig. 17) außerhalb einer Geraden ein Loth auf dieselbe, wenn man mit passender Zirkelöffnung die Gerade zweimal von C aus in A und B durchschneidet und von diesen Punkten aus mit gleicher Öffnung den Durchschnitt D bildet. Dann ist die Richtung CD senkrecht auf AB . Man halbt einen Winkel BAC (Fig. 18), wenn man vom Scheitel aus gleiche Stücke AB und AC auf den Schenkeln abschneidet und von B und C

mit gleicher Oeffnung den Durchschnitt D bildet. Dann ist AD die Halbierungslinie. Geometrisch genau in drei gleiche Theile kann man nur den rechten Winkel theilen (Fig. 19: $\angle BAC = R$), wenn man mit dem Radius AB von B und C aus auf dem Bogen in D und E durchschneidet; dann ist $\angle BAE = \angle DAE = \angle EAC = 30^\circ$. Eine Parallele durch irgendeinen Punkt A (Fig. 20) zieht man zu irgendeiner Linie BC, wenn man mit passender Zirkelöffnung AB die Linie in B durchschneidet, auch BC = AB macht und von C und A aus mit eben derselben Oeffnung den Durchschnitt D bildet; dann muß AD die verlangte Parallele zu BC sein, denn die Wechselwinkel x und y sind gleich wegen der Gleichseitigkeit der Dreiecke.

B. Von den Vierecken und den Vielecken überhaupt.

Sind die gegenüberstehenden Seiten eines Vierecks parallel, so heißt es ein Parallelogramm (Fig. 22, 23, 24 und 25). Zieht man im Parallelogramm eine Diagonale, so läßt sich leicht aus der Congruenz der beiden entstandenen Dreiecke der Satz beweisen: In einem Parallelogramm sind die gegenüberstehenden Seiten und Winkel einander gleich. Was die Einteilung des Parallelogramms betrifft, so heißt ein schiefwinkliges Parallelogramm mit zwei ungleichen Seitenpaaren Rhomboid (Fig. 22), ein schiefwinkliges mit gleichen Seiten Rhombus (Fig. 23), ein rechteckwinkliges mit ungleichen Seiten Rechteck oder Oblongum (Fig. 24), und ein rechteckwinkliges mit gleichen Seiten Quadrat (Fig. 25). Von den Diagonalen der Parallelogramme gelten folgende Lehrsätze: Die beiden Diagonalen eines Parallelogramms halbiren sich gegenseitig (Fig. 22). Im Oblongum und Quadrat sind die Diagonalen einander gleich (Fig. 24 und 25). Im Rhombus und Quadrat stehen die Diagonalen aufeinander senkrecht und halbiren die Winkel, deren Scheitel sie verbinden (Fig. 23 und 25).

Vierecke mit nicht parallelen Seiten heißen Trapeze (FBCE, Fig. 33) und solche mit nur einem Paare parallelen Seiten Paralleltapeze (Fig. 26). Von diesen lethern gilt folgender Satz: Die Linie, welche die Halbierungspunkte der nicht parallelen Seiten eines Paralleltapezes verbindet, ist zu den beiden andern Seiten parallel und ihre Länge ist gleich der halben Summe der lethern.

Ähnlich wie für das Dreieck läßt sich auch für jedes andere Polygon ein Lehrsatz über die Winkelsumme aufstellen; es ist nämlich die Summe der Winkel eines Polygons von n Seiten gleich $2n - 4$ Rechten. Also z. B. im Sechseck ABCDEF (Fig. 27) gleich $2 \times 6 - 4 = 8$ Rechten, da dies von einem beliebigen Punkte M aus in 6 Dreiecke zerfällt werden kann, welche 6×2 Rechte haben, von denen die 4 Rechten, welche um den Punkt M liegen, abgezogen werden müssen.

III. Von der Gleichheit der geradlinigen Figuren.

Nennt man irgendeine Seite eines Parallelogramms oder Dreiecks seine Grundlinie, so heißt das von der Gegenseite oder beim Dreiecke von der Spitze auf die Grundlinie gefällte Loth die Höhe. Mit diesen Ausdrücken läßt sich folgender wichtige Satz formuliren: Parallelogramme von gleicher Grundlinie und Höhe haben gleichen Flächeninhalt (z. B. in Fig. 28: $ABCD = ABEF$). Da jedes Dreieck als die Hälfte eines Parallelogramms aufgefaßt werden kann, so gilt obiger Satz auch von Dreiecken (z. B. in Fig. 29: $\triangle ABC = \triangle ABD = \triangle ABE = \triangle ABF$). Zieht man durch einen Punkt M (Fig. 30) einer Diagonale AD eines Parallelogramms ABCD Parallelen EF und HG zu

den Seiten, so heißen die kleinen Parallelogramme EMHC und GBFM, durch welche die Diagonale nicht geht, Ergänzungsparallelogramme, und von solchen gilt der Satz: Ergänzungsparallelogramme haben gleichen Flächeninhalt.

Ein anderer sehr wichtiger Satz über Flächengleichheit ist der sogenannte Pythagoräische. Er lautet: Das Quadrat über der Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks ist gleich der Summe der Quadrate über den beiden Katheten. Also z. B. in Fig. 31: Das Quadrat AE über der Hypotenuse AB gleich der Summe der Quadrate CG und CH über den Katheten BC und AC; denn es läßt sich leicht, wenn man sich Hülfslinien CE und AG gezogen denkt, vermittlest der dann entstehenden Dreiecke zeigen, daß das Rechteck LE gleich dem Quadrat CG ist, und in ganz analoger Weise, daß das Rechteck LD gleich dem Quadrat CH. Die beiden Rechtecke LE und LD bilden aber eben das Hypotenusenquadrat.

Fällt man in irgendeinem Dreieck, z. B. ABC (Fig. 31) von einer Ecke C ein Loth CL auf die Gegenseite AB, so nennt man die Abkürzung AL und BL die Projectionen der Linien AC und BC auf AB.

Der Pythagoräische Lehrsatz (Pythagoras um das J. 550 v. Chr.) läßt sich auch zu dem für jedes Dreieck gültigen sogenannten Cotes'schen Lehrsatz erweitern. In jedem Dreieck ist das Quadrat über einer Seite, die einem spitzen (resp. stumpfen) Winkel gegenüberliegt, gleich der Summe der Quadrate über den beiden andern Seiten, vermindert (resp. vermehrt) um das doppelte Rechteck aus der einen der lethern und der Projection der zweiten auf dieselbe. Denn in Fig. 32 läßt sich ganz analog wie beim letzten Satze zeigen, daß das Rechteck LE = Rechteck NG, ebenso $NF = PI$ und $PI = LD$. Es ist demnach das Quadrat AE über der Dreiecksseite AB gleich den Quadraten BF und AL über den Seiten BC und AC, vermindert um die Rechtecke NF und PI oder um das doppelte Rechteck NF oder PI.

Mit Hülfe des Pythagoräischen Satzes kann man leicht die Aufgaben lösen, ein Quadrat zu zeichnen, welches der Summe oder dem Unterschied zweier gegebener Quadrate gleich ist. Mit Hülfe des Satzes von der Gleichheit der Dreiecke bei gleicher Grundlinie und Höhe kann man die Aufgabe lösen, ein Vieleck in ein anderes, ihm an Fläche gleiches zu verwandeln, welches eine oder mehrere Seiten weniger hat, z. B. das Fünfeck ABCDE (Fig. 33) in das ihm gleiche Dreieck FGD. Man ziehe zur Diagonale BD durch die Ecke C eine Parallele und nehme in dieser in G eine neue Ecke in der Verlängerung von AB an, so hat man für $\triangle DCB$ das ihm gleiche $\triangle DGB$ gesetzt. Ähnlich setzt man für $\triangle AED$ das ihm gleiche $\triangle AFD$, und erhält so durch den Wegfall der Ecken A und B ein Dreieck.

IV. Vom Kreise.

Eine Gerade OA (Fig. 34), welche einen Kreis schneidet, heißt Secante, das Stück AB derselben innerhalb des Kreises heißt Sehne oder Chorde. Eine Sehne AC durch den Mittelpunkt M heißt Durchmesser, und eine Linie ED, die nur einen Punkt A mit dem Kreise gemein hat, heißt Tangente. Winkel wie $\angle AMB$, $\angle AMC$ und $\angle CMB$ (Fig. 35), die ihren Scheitel im Centrum haben, heißen Centriwinkel, solche wie $\angle BAC$, die den Scheitel in der Peripherie haben, Peripheriewinkel. Jede Sehne theilt den Kreis in zwei Kreisabschnitte (Segmente), und zwei Radien wie MA und MB schneiden aus dem Kreise einen Kreisabschnitt (Sector). Ein Polygon dessen Seiten Sehnen sind, wie $\triangle ABC$ (Fig. 34) ist dem Kreise eingeschrieben, der Kreis ihm umschrieben.

Die wichtigern elementaren Sätze der Kreislehre sind: Das Loth vom Mittelpunkt auf die Sehne halbt die (Fig. 25): wenn $AD = BD$, so ist $DM \perp AB$, ebenso $FM \perp AC$). Ein Kreis ist vollständig bestimmt durch drei Punkte seiner Peripherie, denn da (Fig. 35) der Scheitelpunkt von FM und DM der Mittelpunkt sein muß, so sind die drei gleichen Schenkel BM , AM und CM der Dreiecke AMB und CMC Radien eines Kreises durch A , B und C . Ferner: Eine Linie, welche auf einem Radius senkrecht steht, ist eine Tangente; denn die Verbindungslinie jedes andern Punktes als A (Fig. 34) z. B. E mit M ist eine Hypotenuse und daher größer als die Kathete AM .

Auch über die Winkelverhältnisse am Kreise gibt es einige wichtige Sätze, z. B.: Jeder Peripheriewinkel ist gleich der Hälfte des Centralwinkels, der mit ihm auf gleichem Bogen steht (z. B. in Fig. 36 $\angle ACB = \frac{1}{2} \angle AMB$; denn $\angle x$ ist als Außenwinkel des gleichschenkeligen Dreiecks AMC doppelt so groß wie der Basiswinkel y , und aus ähnlichem Grunde z doppelt so groß wie u). Hieraus folgt auch, daß alle Peripheriewinkel auf gleichem Bogen gleich sind, z. B. (Fig. 37): $\angle ACB = \angle AC'B = \angle AC''B$ u. s. w. Ferner folgt: Der Peripheriewinkel im Halbkreise ist ein rechter; denn $\angle BAD + \angle BCD = 2R$; denn die beiden Centralwinkel bei $M = 4R$.) Ähnlich findet man, daß ein Tangentenwinkel gleich dem Peripheriewinkel im entgegengesetzten Kreisabschnitt ist. Aus obigen Sätzen ergibt sich die Lösung mehrerer Aufgaben. Um ein Dreieck einen Kreis beschreiben kann man bei Hälfte des Satzes, daß der Kreis durch drei Punkte bestimmt ist. Tangenten an einen Kreis von einem außerhalb desselben gelegenen Punkte A aus (Fig. 40) kann man ziehen, wenn man die Verbindungslinie AM in B halbt und durch einen Kreis vom Radius MB den gegebenen in C und D durchschneidet, dann sind C und D die Berührungspunkte der beiden möglichen Tangenten AC und AD . Einem Dreiecke (z. B. ABC , Fig. 41) einen Kreis einschreiben (so daß dieser alle drei Seiten berührt), kann man, wenn man vom Durchschnitte M der Winkelhalbierungslinien CE , MD , MF auf die Seiten fällt; dann sind M der Mittelpunkt, ME der Radius und E , D und F die Berührungspunkte des gesuchten Kreises.

V. Von der Aehnlichkeit der Figuren.

Zwei Polygone heißen ähnlich ($\sim$), wenn sie gleiche Winkel zwischen proportionirten Seiten haben. Es würde also z. B. $\triangle ABC$ (Fig. 42) $\sim \triangle A'B'C'$ sein, wenn $\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'} = \frac{BC}{B'C'}$, und wenn $\angle A = \angle A'$, $\angle B = \angle B'$, $\angle C = \angle C'$.

Von diesen Bedingungen brauchen jedoch immer nur einige besaunt zu sein, um von ihnen auf die Existenz auch der übrigen, also auf die Aehnlichkeit der fraglichen Dreiecke schließen zu können. Diese Fälle sinden ihren Ausdruck in den vier (gewissermaßen den vier Congruenzsätzen analogen) Aehnlichkeitssätzen. Es sind nämlich zwei Dreiecke einander ähnlich 1) wenn zwei Seiten des einen zweien des andern proportionirt und die eingeschlossenen Winkel einander gleich sind, 2) wenn zwei Winkel des einen denen des andern gleich sind, 3) wenn die Seiten des einen denen des andern proportionirt sind, 4) wenn zwei Seiten des einen zweien des andern proportionirt und die der größern Seite gegenüberliegenden Winkel gleich sind. Diese Sätze lassen sich sehr leicht nachweisen, wenn man bei

Vergleichung der Dreiecke ABC und $A'B'C'$ das dem letztern congruente Hälfbreieck DFC benutzt.

Andere hierhergehörige Sätze sind: 1) Eine Linie (z. B. CD , Fig. 43), welche einen Winkel eines Dreiecks (z. B. C in $\triangle ABC$) halbt, theilt die Gegenseite in zwei Segmente (AD und BD), welche sich verhalten wie die anliegenden Seiten (hier AC und BC); also hier $\frac{AD}{BD} = \frac{AC}{BC}$, da, wenn $BF \parallel DC$, die $\angle x$, y , u

und z gleich, die Dreiecke ADC und ABF ähnlich sind, und $\triangle BCF$ gleichschenkelig ist. 2) Zieht man durch einen Punkt (A oder A' , Fig. 44) gerade Linien, die einen Kreis schneiden, so ist das Product der Entfernungen dieses Punktes von den beiden Durchschnittspunkten bei allen Geraden gleich (also $AB \cdot AC = AD \cdot AE$ und ebenso $A'B' \cdot A'C' = A'D' \cdot A'E'$).

Auch eine Anzahl wichtiger Constructionen gründen sich auf die Aehnlichkeit: und die daraus abgeleiteten Sätze; so die der vierten und mittlern Proportionalen, der goldene Schnitt und die harmonische Theilung. Um zu drei gegebenen Linien a , b , c die vierte Proportionale x (z. B. das vierte Glied x der Proportion $\frac{a}{b} = \frac{c}{x}$) zu construiren, trägt a und b auf dem einen

und c auf dem andern Schenkel eines beliebigen Winkels EAC (Fig. 45) ab, zieht BD und parallel dazu CE , so ist $DE = x$. Um zu zwei gegebenen Geraden a und b (Fig. 46) die mittlere Proportionale x (z. B. die Größe x in der Proportion $\frac{a}{x} = \frac{x}{b}$) zu finden, setzt

man $AD = a$ und $DB = b$ nebeneinander und errichtet über AB als Durchmesser einen Halbkreis, dann ist das Loth $DC = x$, wegen Aehnlichkeit der Dreiecke ABD und CDB .

Um eine Linie AB (Fig. 47) nach dem goldenen Schnitt, d. h. so zu theilen, daß der eine Theil die mittlere Proportionale zwischen der ganzen Linie und dem andern Theile ist, errichte man in B ein Loth $BC = \frac{1}{2} AB$, ziehe mit CB als Radius einen Kreisbogen, verbinde A mit C und lege AD nach AF , so ist F der gesuchte Schnitt.

Um eine Gerade harmonisch zu theilen, d. h. zu zwei auf ihr gegebenen Punkten A und B (Fig. 48) zwei andere C und D so zu bestimmen, daß die Abstände des C von A und B dasselbe Verhältniß (etwa $= \frac{m}{n}$)

haben wie die des D von A und B (also $\frac{CA}{CB} = \frac{DA}{DB} = \frac{m}{n}$), trägt man an A in beliebiger Richtung m an und

an B parallel mit m nach oben und unten n , und zieht FH und FD , so sind deren Durchschnitte C und D mit der gegebenen Geraden die gesuchten harmonischen Punkte.

Zieht man von irgendeinem Punkte O (Fig. 49) Gerade durch vier harmonischen Punkte A , B , C , D , so nennt man diese Geraden harmonischen Strahlen. Diese haben unter andern die Eigenschaft, daß auch jede andere durch sie gelegte Linie in vier harmonischen Punkten (etwa A', B', C', D') geschnitten wird. Man findet die harmonische Theilung auch wieder bei den Diagonalen des vollständigen Vierseits (Fig. 50). Es ist dies eine Figur, die durch vier sich schneidende Gerade (AB , AC , BD , CD) gebildet wird. Sie hat sechs Ecken (A , F , B , G , C , D) und drei Diagonalen (AG , FD , BC). Jede derselben wird von den beiden andern harmonisch getheilt, z. B. AG in H und I .

Will man zu einem Polygon, z. B. $ABCD$ (Fig. 61) ein ähnliches construiren, so zieht man von irgendeinem Punkte O aus Strahlen nach den Ecken und trägt

darauf den Strahlen OA, OB u. f. w. proportionirte Größen OA', OB' u. f. w. (oder OA'', OB'' u. f. w.) ab; dann sind A' B' C' D' sowohl als auch A'' B'' C'' D'' zu ABCD ähnliche Polygone, und O heißt im ersten Falle der äußere, im andern der innere Ähnlichkeitspunkt.

Auf der Lehre von der Ähnlichkeit der Dreiecke beruht auch die Construction der Transversalmaßstäbe (Fig. 52).

VI. Von den regulären Polygonen und der Kreismessung.

Ein Polygon von lauter gleichen Seiten und Winkeln heißt regulär, wenn es lauter gleiche Seiten und Winkel hat. Man erhält es dadurch, daß man den Kreis in die verlangte Anzahl gleicher Theile theilt und die Theilpunkte mit Sehnen verbindet. Am einfachsten erhält man das Sechseck (Fig. 54). Seine Seite AB ist gleich dem Radius des Kreises. Zieht man aber an den 6 Theilpunkten Tangenten wie CD, so erhält man ein umschriebenes Sechseck.

Ueberspringt man von den 6 Theilpunkten je einen, so erhält man das reguläre Dreieck (Fig. 53). Durch Halbierung des Sechseckbogens kann man das Zwölfeck, aus diesem das Vierundzwanzige u. f. w. erhalten. Die Theilpunkte für das reguläre Viereck (Fig. 62) erhält man durch zwei aufeinander senkrechte Durchmesser. Durch Halbierung des Bogens erhält man das Achteck u. f. w. Die Seite EA des Fünfecks (Fig. 55) ergibt sich, wenn man den Radius MB in C halbirte, das Loth MA errichtet und die Zirkelöffnung CA nach CD legt, dann ist AD = AE gleich der Fünfeckseite, und das Stüd DM ist die Seite des Zehnecks (Fig. 57). Man kann ein Vieleck im allgemeinen auch so construiren, daß man den Durchmesser AB (Fig. 59 oder 60) in die verlangte Anzahl (hier 7) gleicher Theile theilt, dann wie in Fig. 59 noch solch einen Theil von A bis D und von C bis E setzt und DE zieht, dann ist die Entfernung des Durchschnitts G vom Punkte 3 gleich der gesuchten Vieleckseite. Oder man sucht wie in Fig. 60 mit der Zirkelöffnung AB von A und B aus den Durchschnitt bei C und zieht C und D, dann ist BD der gesuchte Bogen. Statt durch Verbindung der auseinanderfolgenden Theilpunkte kann man ein Vieleck auch durch regelmäßige Ueberspringung von 1, 2 oder mehr Punkten in einem Zuge darstellen; so das Fünfeck (Fig. 56), das Siebenedeck (Fig. 60), das Achteck (Fig. 61), das Zehneck (Fig. 58) und das Sechszehneck (Fig. 63).

Je mehr ein reguläres Polygon Seiten hat, desto mehr nähert sich sein Umfang dem des eingeschriebenen oder umschriebenen Kreises. Auf diese Weise läßt sich leicht das Verhältniß des Kreisumfangs zum Durchmesser berechnen. Das ganze Problem läuft darauf hinaus, aus der bekannten Größe einer Polygonseite AB (Fig. 64) die Größe der Seite AC oder BC des Polygons mit der doppelten Seitenzahl zu berechnen, was sich leicht mit Hilfe der Ähnlichkeit der Dreiecke ACD und MCF finden läßt.

Auf diese Weise ergibt sich der Kreisumfang für den Durchmesser 1 (auch π oder die Ludolfsche Zahl genannt) = 3,14159265358979... Diese Zahl ist bis auf mehrere Hundert Decimalstellen berechnet worden, für die meisten Fälle genügt es aber kurz $\pi = 3,14$ zu setzen.

Die Länge irgendeines Kreisumfangs erhält man aus der Multiplication des Durchmessers mit der Zahl π .

VII. Von der Flächenberechnung geradliniger Figuren und des Kreises.

Da, wie schon oben bemerkt, ein Rechteck und schiefes Parallelogramm (z. B. ABDC und ABFE, Fig. 28)

einander an Fläche gleich sind, so erhält man den Flächeninhalt eines Parallelogramms durch Multiplication von Grundlinie und Höhe desselben. Da nach dem eben dort Gesagten ein Dreieck als die Hälfte eines Parallelogramms von gleicher Grundlinie und Höhe anzusehen ist, so ist auch seine Fläche gleich dem halben Product aus Grundlinie und Höhe. Jedes andere Polygon läßt sich in Dreiecke zerlegen, und daher auch seine Flächenberechnung auf die des Dreiecks zurückführen. Auch der Kreis läßt sich als eine Summe schmalere Dreiecke betrachten, die auf dem Umfange stehen und alle mit den Spitzen im Mittelpunkte zusammenlaufen. Daher ist seine Fläche gleich dem halben Product aus dem Halbmesser und dem Umfange, oder, was dasselbe ist, gleich dem Product des Halbmessers mit sich selbst und der Zahl π . Als Maß für Flächen benutzt man ein Quadrat mit der gewählten Längeneinheit gleichen Seiten (Quadratzoll, Quadratfuß, Quadratmeter u. f. w.).

Ebene Trigonometrie.

Es ist sehr wichtig, in einem Dreieck die Beziehungen zwischen der Größe der Winkel und den Verhältnissen der anliegenden und gegenüberliegenden Seiten zu kennen.

Diese Erörterungen bilden einen besondern Abschnitt der Geometrie unter dem Namen der Trigonometrie, und zwar zunächst der Ebene. Betrachtet man zunächst in einem rechtwinkligen Dreieck, wie z. B. ABC (Taf. 1, Fig. 65), die Beziehungen eines Winkels, z. B. a zu den Seiten, so nennt man das Verhältniß der Gegenkathete zur Hypotenuse ($\frac{BC}{AC}$) den Sinus des Winkels a, ($= \sin a$), das der anliegenden oder Weilkathete zur Hypotenuse ($\frac{AB}{AC}$) den Cosinus von a, ($= \cos a$), das der Gegenkathete zur Weilkathete ($\frac{BC}{AB}$) die Tangente von a, ($= \tan a$), und das der Weilkathete zur Gegenkathete ($\frac{AB}{BC}$) die Cotangente von a, ($= \cot a$); endlich hat man die beiden seltener gebrauchten, nämlich das der Hypotenuse zur Weilkathete ($\frac{AC}{AB}$) oder die Secante von a, ($= \sec a = \frac{1}{\cos a}$), und das der Hypotenuse zur Gegenkathete ($\frac{AC}{BC}$) oder die Cosecante von a, ($= \csc a = \frac{1}{\sin a}$). Diese Ver-

hältnisse oder Functionen des Winkels sind natürlich in allen rechtwinkligen Dreiecken bei gleicher Größe von a gleich, ändern sich aber, wenn a sich ändert. Diese Aenderung der Functionen bei Aenderung des Winkels und Durchgang desselben durch alle vier Viertel (Quadranten) des Kreises wird deutlicher bei Betrachtung von Fig. 67.

Setzt man in dem Kreise die Radien MA = ME = ME u. f. w. gleich der Einheit, so werden es auch in den obigen Verhältnissen (Functionen) die Nenner, und man kann dann jagen für den Winkel A ME = a ist dann EF der Sinus, FM der Cosinus, AK die Tangente, LC die Cotangente, MK die Secante, ML die Cosecante. Ueber die allmähliche Veränderung dieser Werthe mit der Größe des Winkels möge Folgendes als Beispiel dienen. Da in Fig. 67 FE = F'E' = F'E' = FE''' ist, die beiden letztern aber nach der entgegengesetzten Richtung liegen, so sieht man, daß die Sinus der Winkel AME, AME', AME'', AME'''

numerisch gleich, die beiden Leetern aber negativ sind. Man sieht also, im ersten Quadranten des Kreises wachsen die Sinus von 0 bis 1, nehmen im zweiten wieder bis 0 ab, sind aber im ganzen Verlaufe positiv; im dritten und vierten gehen sie wieder von 0 durch 1 bis 0, sind aber in beiden negativ. Ähnliche periodische Aenderungen zeigen die andern Functionen. Man hat schon längst trigonometrische Tafeln berechnet, in welchen man für die Zwecke der Dreiecksberechnung für jeden Winkelwerth die zugehörige Größe der Functionen und umgekehrt finden kann.

Wie die Functionen zur Dreiecksberechnung benutzt werden können, möge zunächst für das rechtwinkelige Dreieck durch ein Beispiel angedeutet werden. Im Dreieck ABC (Fig. 65) sei BC die Höhe eines Hauses oder Baums. Irgendeine horizontale Länge (Standlinie) AB werde gemessen und mit einem Winkelmessinstrumente die Größe des Winkels α bestimmt. Da

nun das Verhältniß $\frac{BC}{AB} = \operatorname{tg} \alpha$ ist, so hat man auch $BC = AB \cdot \operatorname{tg} \alpha$. Wenn man also in den Tafeln die Tangente für den Winkel α anschlägt und mit der Länge von AB multiplicirt, erhält man die Höhe BC.

Will man schiefwinkelige Dreiecke betreffende Berechnungen vornehmen, so gehört dazu noch die Kenntniß einiger besonderer Beziehungen der Seiten zu den Functionen der Winkel. So z. B. gilt der Satz, daß in jedem Dreieck sich die Seiten verhalten wie die Sinus der gegenüberliegenden Winkel. Wenn also z. B. im Dreieck ABC (Fig. 66) die Seite AB und die beiden anliegenden Winkel α und β gemessen, also auch der dritte γ als Supplement von α und β bekannt wäre, und es sollte eine der beiden andern Seiten, etwa BC berechnet werden, so hätte man nach obigem

Satz die Proportion $\frac{BC}{AB} = \frac{\sin \alpha}{\sin \gamma}$, oder hieraus die

Gleichung: $BC = \frac{AB \cdot \sin \alpha}{\sin \gamma}$; d. h. man fände die Größe

der Seite BC, wenn man die Länge von AB mit dem Sinus von α multiplicirt und dann das Product durch den Sinus von γ dividirt. In ähnlicher Weise lassen sich nach den Lehren der Trigonometrie immer aus einer genügenden Anzahl gegebener Stücke (Winkel und Seiten) die andern noch unbekannten Stücke eines Dreiecks berechnen.

Stereometrie.

I. Von der Lage der Ebenen und Geraden im Raume.

Eine Gerade EF (Taf. 2, Fig. 1), welche zwei Punkte E und F einer Ebene ABCD verbindet, fällt ganz in die Ebene hinein. Schneidet eine Gerade wie LM (Fig. 1) eine Ebene, so kann dies nur in einem Punkte (N) geschehen. Schneidet sie dieselbe in keinem Punkte, (wie GH, Fig. 1), so sagt man, sie sei der Ebene (ABCD) parallel. Das Loth GI (= HK) ist ihr Abstand von der Ebene. Alle Lothe auf einer Ebene (wie GI und HK auf ABCD) sind einander parallel (Lehrsatz). Die Aufgabe, auf eine Ebene ABCD (Fig. 2) von einem Punkte E außerhalb derselben ein Loth zu fällen, löst man wie folgt. Man ziehe in der Ebene eine Gerade HI, dann EG senkrecht auf HI, dann in der Ebene selbst GM senkrecht auf HI, und hierauf EF senkrecht auf GM, so ist EF das verlangte Loth, denn es ist senkrecht auf GM und KL. Von zwei Geraden im Raume, die weder parallel sind noch sich durchschneiden sagt man, sie kreuzen sich (z. B. die beliebig verlängerten Geraden AC und FD in der ein Prisma vorstellenden Fig. 18). Zwei Ebenen wie AB und CD (Fig. 4) schneiden sich, und

zwar in der Geraden EF. Zwei Ebenen, wie AB und CD (Fig. 3), welche sich nicht durchschneiden, heißen parallel.

II. Von den körperlichen Ecken und Polyedern.

Wenn man durch je zwei von drei Geraden (AB, AC und AD, Taf. 2, Fig. 5), welche sich in einem Punkte A des Raums durchschneiden, eine Ebene legt, so schließt diese drei Ebenen eine dreiseitige körperliche Ecke ein. Ebenjo bestimmen fünf Geraden (AB, AC u. s. w., Fig. 6) eine fünfseitige, überhaupt n Geraden eine n seitige körperliche Ecke. Der Schnittpunkt A der Geraden heißt der Scheitel, die Geraden selbst heißen die Kanten, die von den Kanten eingeschlossenen Winkel die Seiten und die Neigungswinkel je zweier Ebenen die Winkel der körperlichen Ecke.

Ähnlich wie in der Planimetrie die beiden Schenkel eines Winkels noch keinen endlichen Raum begrenzen, hierzu vielmehr meistens noch eine, beide Schenkel schneidende Gerade gehört, so muß auch, damit ein allseitig von Ebenen begrenzter Körper, oder wie man einen solchen nennt, ein Polyëder entsteht, die offene körperliche Ecke durch mindestens noch eine schneidende Ebene geschlossen und begrenzt werden. So entsteht, wenn in Fig. 5 die drei Ebenen BAC, CAD, DAB der dreiseitigen körperlichen Ecke noch durch die vierte Ebene BCD geschnitten werden, ein vierflächiges Polyëder oder Tetraëder, auch eine dreiseitige Pyramide genannt. Ebenjo schließt bei der fünfseitigen körperlichen Ecke in Fig. 6 die sechste Ebene BCEFG eine fünfseitige Pyramide ab, deren Basis BCEFG und deren Spitze A ist.

Sind die begrenzenden Flächen eines Polyëders ihrer Figur nach reguläre Polygone, so heißt es ein reguläres Polyëder. Es kann deren im ganzen nur fünf geben, drei begrenzt von regulären Dreiecken, eins von Quadraten und eins von regulären Fünfecken, nämlich 1) das reguläre Tetraëder, von vier regulären Dreiecken umschlossen. Fig. 7 stellt den Körper dar auf der Fläche ABC ruhend und die Spitze D dem Auge zuwendend, Fig. 8 sein Körpernetz, d. h. die Entwicklung seiner Oberfläche in einer Ebene (hier wie bei den folgenden in kleinerm Maßstabe). D', D'', D''' bilden durch Herummklappen die Spitze D (Fig. 7). 2) Das Octaëder, von acht regulären Dreiecken umschlossen. Fig. 9 ist eine Ansicht des Körpers; alle Kanten sind der Kante AB gleich. Fig. 10 ist sein Netz. 3) Das Ikosaëder, von zwanzig Dreiecken gebildet. In Fig. 11 ist eine Fläche, in Fig. 12 eine Ecke dem Auge zugewendet. Fig. 13 ist das Körpernetz des Ikosaëders, auch in kleinerm Maßstabe. 4) Das Hexaëder (Würfel), von sechs Quadraten ungrenzt (Fig. 14). Die Gestaltung seines Körpernetzes ist aus Fig. 15 ersichtlich. Endlich 5) das Dodekaëder (Fig. 16), ein von zwölf regulären Fünfecken (Pentagonen) umschlossener Körper. Sein Netz ist in Fig. 17 dargestellt. Zur Construction der Netze dieser regulären Körper, und daraus ihrer Modelle, braucht immer nur die Größe der Seite AB des betreffenden Polygons gegeben zu sein.

Ein wichtiger für alle Polyëder geltender Lehrsatz ist folgender (der sogenannte Euler'sche Satz): Die Anzahl der Ecken eines Polyëders vermehrt um die Anzahl seiner Flächen ist um zwei größer als die Anzahl seiner Kanten.

III. Von den Prismen, Pyramiden und Körperkuppen.

Ein Prisma ist ein zwischen zwei parallelen Ebenen liegender Körper, dessen Seitenflächen Parallelogramme sind. Je nach der Anzahl dieser Seitenflächen hat

man drei-, vier-, fünfsseitige u. s. w. Prismen. Die beiden parallelen End- oder Grundflächen sind dann congruente Dreiecke, Vierecke, Fünfecke u. s. w. Der senkrechte Abstand der Grundflächen heißt die Höhe des Prismas. So stellt Fig. 18 ABCDEF ein dreiseitiges Prisma vor, dessen Grundflächen ABC und DEF sind. Fig. 19 ist sein Netz. Beim Zusammenklappen der Flächen fallen die Punkte F, F', F'' sowie C, C', C'' zusammen. Da die Seitenflächen hier Rechtecke sind, so stellt jede der Kanten AE u. s. w. zugleich die Höhe des Prismas dar.

Um die Größe des Rauminhaltes irgendeines Prismas, sowie auch gewisser anderer Körper bestimmen zu können, ist es vorerst nöthig, einen wichtigen Lehrsatz kennen zu lernen, das sogenannte Cavalieri'sche Princip. Es lautet: Zwei Körper (z. B. in Fig. 29 das dreiseitige Prisma a , a' und das vierseitige b , b' , b'' , sowie in Fig. 30 das sechseitige Prisma c , c' , c'' , sowie der Cylinder d , d' , d''), die sich zwischen zwei parallelen Ebenen befinden (z. B. in Fig. 29 und 30 zwischen den Ebenen 1 und 3) und von einer beliebigen dritten, den beiden ersten parallelen Ebene (z. B. 2 in Fig. 29 und 30) durchschnitten, stets gleiche Querschnitte geben (z. B. Querschnitt $a' = b'$ und $c' = d'$), haben gleichen Rauminhalt.

Als Maß für den Rauminhalt jedes Körpers benutzt man einen Würfel (Kubus), dessen Kante der Längeneinheit gleich ist und nennt dieses Maß je nach der gewählten Längeneinheit, Kubimeter, Kubfuß, Kubitzoll, Kubitaille u. s. w.

Ein vierseitiges, von drei Paar parallelen Ebenen begrenztes Prisma, heißt ein Parallelepipedon, und stehen die Kanten desselben senkrecht gegen die Grundflächen wie bei dem Körper b , b' , b'' (Fig. 29), so findet man durch eine leichte Ueberlegung, daß der Rauminhalt oder das Volumen (V) eines solchen rechtwinkligen Parallelepipedons gleich dem Product aus den Längenzahlen von drei in einer Ecke zusammenstoßenden Kanten sein muß, oder, da das Product zweier Kanten als Grundfläche und die dritte darauf senkrecht als die Höhe anzusehen ist, daß V gleich dem Product aus Grundfläche und Höhe gefunden wird.

Das Volumen irgendeines Prismas ist nun nach dem Cavalieri'schen Princip ebenfalls gleich dem Product aus Grundfläche und Höhe des Prismas.

Ein Körper, dessen Grundfläche ein ebenes Polygon (wie BCD in Fig. 20) ist, und dessen Seitenflächen und folglich auch deren Durchschnittskanten alle in einer Spitze (A) zusammenlaufen, heißt eine Pyramide, und zwar eine drei-, vier-, fünfsseitige u. s. w. je nachdem die Grundfläche ein Dreieck, Viereck, Fünfeck u. s. w. ist. Fig. 21 gibt das entwickelte Netz der in Fig. 20 dargestellten fünfsseitigen Pyramide.

Jedes dreiseitige Prisma, wie z. B. das in Fig. 28, läßt sich in drei an Volumen gleich große Pyramiden zertheilen. Hieraus ergibt sich leicht, daß das Volumen einer Pyramide gleich einem Drittel vom Volumen eines Prismas von gleicher Grundfläche und Höhe ist, d. h. auch gleich dem Drittel des Products aus Grundfläche und Höhe der Pyramide.

Ein Körperstumpf oder Obelisk (Fig. 22) ist ein Körper, der zwischen parallelen Ebenen (AB und CD) liegt und dessen Seitenflächen ebene Figuren sind, die sich von der einen der parallelen Ebenen zur andern erstrecken. Die in den parallelen Ebenen liegenden Polygone AB und CD heißen die Grundflächen, ihr senkrechter Abstand h die Höhe und der die Höhe halbirende Parallelschnitt EF die Mittelfigur des Schnittes. Denkt man sich alle Ecken des Obeliskens mit irgendeinem Punkte der Mittelfigur verbunden,

so wird derselbe dadurch derart in Pyramiden zerlegt, daß man sein Volumen gleichsetzen kann dem sechsten Theile eines Prismas von gleicher Höhe, dessen Grundfläche aus den beiden Grundflächen und dem vierfachen Querschnitte besteht.

IV. Von Cylinder, Kegel und Kugel.

Diese Körper sind Umdrehungskörper. Ein gerader Cylinder (Taf. 2, Fig. 23) entsteht, wenn man ein Rechteck ABCD um eine seiner Seiten BC als Achse gedreht denkt. Die gegenüberstehende Seite AD beschreibt dann den Mantel und die beiden andern Seiten AB und DC beschreiben die kreisförmigen Grundflächen des Cylinders. Setzt man den Radius AB der Grundfläche $= r$ und die Höhe BC des Cylinders $= h$, und bedeutet man ferner, daß man den Cylinder als ein Prisma mit unendlich vielen schmalen Seitenflächen betrachten kann, so ist mit Beachtung des in der Kreislehre besagten sein Rauminhalt $= \pi r^2 h$, und der Flächeninhalt seines Mantels $= 2\pi r h$. Fig. 24 stellt das Netz des Cylinders, d. h. die Grundflächen B und C und den aufgewickelten Cylinderdmantel AA'D'D dar.

Ein gerader Kegel (Fig. 25) entsteht durch Umdrehung eines rechtwinkligen Dreiecks ABC um eine Kathete AB. Diese Achse nennt man die Höhe (h) des Kegels, A die Spitze. Die Hypotenuse AC (auch die Seite (s) des Kegels genannt) beschreibt den Kegelmantel, die andere Kathete BC $= BD = r$ die kreisförmige Grundfläche. Durch ähnliche Betrachtungen wie beim Cylinder erhält man das Volumen des Kegels (analog dem der Pyramide) $= \frac{1}{3} \pi r^2 h$, die Fläche des Kegelmantels $= \pi r s$. Fig. 26 stellt den aufgewickelten Kegelmantel AD'CD' und die Grundfläche B dar.

Eine Kugel (Fig. 27) entsteht, wenn ein Halbkreis C'B'C' um seinen Durchmesser CC' gedreht gedacht wird. Der Mittelpunct des gedrehten Halbkreises ist auch der der Kugelfläche; alle Punkte derselben haben gleichen Abstand von ihm. Dieser Abstand ist der Radius (r) der Kugel. Jeder Kreis wie BCB'C' oder AB A'B' oder ACA'C', dessen Ebene durch den Mittelpunct der Kugel geht, heißt ein größter Kreis derselben. Ähnlich wie beim Kreis hat man auch bei der Kugel Sectoren, Segmente u. s. w.

Die Größe der Kugeloberfläche ist gleich der vierfachen Fläche des größten Kreises, also $= 4\pi r^2$. Für die Berechnung des Rauminhalts der Kugel dient ein schon von Archimedes gefundener Satz, der eine einfache Beziehung zwischen dem Volumen von Cylinder, Kugel und Kegel angibt. Denkt man sich in das Quadrat ABCD (Fig. 28) mit dem Radius BA $= r$ einen Viertelkreis von A bis C und außerdem eine Diagonale AC gezogen, und denkt man sich dann das Quadrat um die Seite AB im Kreise herumgedreht, so entsteht durch die Drehung der Diagonale AC ein Kegel, durch die des Viertelkreises eine Halbkugel und durch die des Quadrats ein Cylinder, deren Volumina sich zueinander verhalten wie 1 zu 2 zu 3, sodaß also die Halbkugel und demnach auch die ganze Kugel zwei Drittel vom Raume des sie genau umschließenden, gleichhohen Cylinders füllt. Da nun für die Höhe $h = 2r$, der Rauminhalt des Cylinders $= 2\pi r^2 h$ ist, so muß der der Kugel $= \frac{1}{2} \pi r^2 h$ sein.

Ein von zwei größten Halbkreisen, wie z. B. CAC' und CBC' (Fig. 27) begrenzter Theil der Kugeloberfläche heißt ein Kugelzweieck, und ein von drei Bogen, wie CA, CB und AB, welche Stücke größter Kreise sind, eingeschlossenes Stück ein sphärisches oder Kugeldreieck. Die drei erwähnten Bogen heißen

die Seiten und die von diesen eingeschlossenen Winkel die Winkel des Dreiecks.

Sphärische Trigonometrie.

Stellt ABC (Taf. 2, Fig. 31) ein sphärisches Dreieck vor auf einer Kugel, deren Mittelpunkt in M liegt, so begrenzen die drei durch je zwei der Radien MA, MB, MC gelegenen Ebenen eine körperliche dreieckige Ecke, deren Seiten durch die Bogen AB, AC und BC gemessen werden. Setzt man Bogen $BC=a$, $AC=b$ und $AB=c$, ferner Winkel $A=\alpha$, $B=\beta$, $C=\gamma$ (wie auch aus Fig. 32 ersichtlich), setzt die Radien MA u. s. w. $=1$, und errichtet auf MA in A in den Ebenen MAB und MAC die Lote AE und AD, so ist offenbar $AD=\lg b$, $MD=\sec b$, $AE=\lg c$, $ME=\sec c$. Hieraus folgt durch Anwendung des Cotes'schen Lehrsatzes auf die Dreiecke MED und AED für die Seite DE:

$$DE^2 = \sec b^2 + \sec c^2 - 2 \sec b \sec c \cos \alpha$$

$$DE^2 = \lg b^2 + \lg c^2 - 2 \lg b \lg c \cos \alpha$$

Durch Subtraction und leichte Umordnung ergibt sich hieraus:

$$\cos \alpha = \frac{\cos a - \cos b \cos c}{\sin b \sin c}$$

und wenn man die halbe Summe der Seiten

$$\frac{a+b+c}{2} = s \text{ setzt, so folgt}$$

$$\cos \frac{1}{2} \alpha = \sqrt{\sin s \sin (s-a)} \frac{\sin b \sin c}{\sin b \sin c}$$

So kann man noch eine Anzahl von Formeln auf diesem Wege ableiten, welche für die Berechnung der Stücke (d. h. der Seite a , b , c und der Winkel α , β , γ) eines allgemeinen schiefwinkligen sphärischen Dreiecks wie ABC (Fig. 32) benutzt werden können.

Für das rechtwinklige sphärische Dreieck, wo also ein Winkel, z. B. der bei A (Fig. 33) gelegene $= \frac{1}{2} \pi$ (d. h. $= 90^\circ$) wird, vereinfachen sich die Formeln bedeutend, indem dann $\sin \alpha = 1$, $\cos \alpha = 0$, $\lg \alpha = \infty$, $\cotg \alpha = 0$ wird. Eine wirkliche Entwicklung dieser Formeln durchzuführen, kann natürlich hier nicht der Ort sein. Ihre hauptsächlichste Verwendung finden die Lehren der sphärischen Trigonometrie in der Astronomie und höhern Geodäsie.

Analytische Geometrie.

Wenn man die Lage irgendeines Punktes M (Taf. 2, Fig. 34) genau bestimmen will, so gibt man sie an in Bezug auf zwei in derselben Ebene liegende, sich im Punkte O unter irgendeinem Winkel, am einfachsten, wie in Fig. 34, einem rechten sich schneidende, nach beiden Seiten unendlich weit verlängert gedachte Geraden XX und YY. Die Richtung nach rechts bezeichnet man mit $+X$, die nach links mit $-X$, die nach oben mit $+Y$, nach unten mit $-Y$. Man nennt diese beiden Linien Coordinatenachsen. Um nun die Lage eines Punktes M gegen rechtwinklige Coordinatenachsen zu bestimmen, fällt man von ihm das (mit der Y-Achse parallele) Loth y auf die X-Achse und schneidet dadurch auf dieser von O aus gerechnet das Stück x ab. Dieses letztere heißt die Abscisse von M, y die Ordinate, beide heißen die Coordinaten, und O ist der Coordinatenanfang. Die Lage eines Punktes ist also offenbar bestimmt durch die Größe und das Vorzeichen seiner Coordinaten x und y; denn auch die Vorzeichen derselben ändern sich, wenn der Punkt aus dem Raumviertel $+XO+Y$ in ein anderes der vier durch die Coordinatenachsen abgegrenzten Raumviertel der Ebene übergeht; in dem zweiten, unten an das erste stoßenden Raumviertel $+XO-Y$ bleibt x offenbar nach

rechts liegend, also positiv, während y nach unten zu liegen kommt, also negativ wird; in dem links an dieses stoßenden zweiten untern Raumviertel wird sowohl x als auch y negativ sein, während in dem letzten vierten x zwar negativ bleibt, y aber wieder positiv ist.

Statt durch ein solches Coordinatensystem kann man auch die Lage eines beliebigen Punktes M durch sogenannte Polarcoordinaten bestimmen. Man muß dann seinen Abstand r von einem als fest angenommenen Punkte O, dem Pole, kennen, sowie den Winkel, welchen dieser Abstand r mit einer bestimmten Richtung $+XO$ macht. Die Richtung heißt die Achse, und der Abstand r der Radius vector oder Leitstrahl.

Ist die Lage des Punktes M nicht bloß auf eine Ebene beschränkt, sondern kann er sich irgendwo im Raume befinden, so muß man dem Coordinatensystem noch eine dritte, nicht in der Ebene der beiden andern gelegene Achse, die gewöhnlich sogenannte Z-Achse hinzufügen (Fig. 35), deren Richtung nach vorn mit $+Z$, nach hinten mit $-Z$ bezeichnet wird. Im allgemeinen kann man die Winkel zwischen diesen drei Achsen beliebig annehmen, am einfachsten ist es jedoch, sie alle im Coordinatenanfang O sich rechtwinklig durchschneiden zu lassen. Fällt man dann ein Loth von M auf die Ebene XOZ, so hat man die Coordinate y, das Loth von deren Fußpunkte auf die Achse OX ist die Coordinate z, und der Fußpunkt dieser Schnitte auf der Achse OX vom Coordinatenanfang O aus die Coordinate x ab. So ist in einem solchen Coordinatensystem die Lage des Punktes M im Raume durch seine Coordinaten x, y, z fest bestimmt.

Auch Polarcoordinaten kann man hier anwenden. Man muß dann die Lage des Radius vector OM $=r$ bestimmen, etwa dadurch, daß man den Winkel desselben mit einer der Coordinatenebenen, vielleicht der der XZ, bestimmt, und dann etwa noch den Winkel, den die Projection des Radius vector auf gedachte Ebene mit einer in dieser Ebene gegebenen Richtung (einer Achse) einschließt.

Betrachtet man nicht bloß einen Punkt, sondern will man irgendein anderes Raumgebilde durch seine Coordinaten bestimmen, so kann man auch hier Gebilde in der Ebene und solche im Raume mit drei Dimensionen unterscheiden.

Hier mögen nur die Methoden und Objecte der analytischen Geometrie an einigen einfachen Beispielen aus der analytischen Geometrie der Ebene illustriert werden.

Wenn, wie schon oben bemerkt, y und x (Fig. 34) die Coordinaten irgendeines Punktes M sind, so wird doch offenbar das Verhältniß beider zueinander irgendeiner bestimmten Größe, die wir a nennen wollen, gleich sein, das heiße in einer Formel ausgedrückt:

$$\frac{y}{x} = a,$$

wobei noch zu bemerken ist, daß a, als das Verhältniß der Gegenkathete (y) durch die Ankathete (x) nach dem in der ebenen Trigonometrie Gesagten gleich der Tangente des Winkels XOM ist. Nun ist aber augenscheinlich auch für jeden andern auf der Linie OM angenommenen Punkt das Verhältniß der jedesmaligen, zu ihm gehörigen Coordinaten genau dasselbe, also ebenfalls gleich a, und dasselbe muß ohne Zweifel auch für jeden Punkt gelten, der auf der geraden Verlängerung von OM über M sowohl wie über O hinausläge. Also für jeden Punkt dieser Geraden ist allemal y das a-fache von x oder: $y = ax$. Eine solche, für jeder Punkt einer Linie (hier beispielsweise einer Geraden)

stathabende Beziehung zwischen Abscisse und Ordinate (oder bei Polarcordinaten zwischen Radius vector und Winkel) heißt Gleichung der Linie. Demnach wäre also die Gleichung einer Geraden, welche durch den Coordinatenanfang O geht und mit der Achse der X einen Winkel einschließt, dessen Tangente gleich a ist: $y = ax$. Für irgendeine andere Lage der Geraden wird auch die Gleichung ihre Gestalt ändern, aber immer wird y und x nur in der ersten Potenz darin vorkommen können. Jede Linie, in deren Gleichung höhere Potenzen der Coordinaten vorkommen, als die erste, ist eine krumme. Man unterscheidet je nach der höchsten in der Gleichung der Linien vorkommenden Potenz der Coordinaten, Linien ersten, zweiten, dritten u. s. w. Grades. Eine krumme Linie, deren auf rechtwinklige oder schiefwinklige Achsen bezogene Gleichung teils algebraische, rationale ist, heißt eine transcendente Linie.

Es soll hier einiges über die Curven (krummen Linien) zweiten, über einige höherer Grade, sowie über die wichtigsten transcendenten Linien gesagt werden.

I. Linien zweiten Grades.

Die Linien zweiten Grades sind der Kreis, die Ellipse, die Parabel und die Hyperbel. Man nennt sie auch Kegelschnitte, weil man sie beim Schneiden eines Kegels (vgl. Stereometrie) durch eine Ebene entstanden denken kann. Schneidet eine Ebene einen Kegel (Fig. 36) senkrecht auf die Achse AC , so entsteht auf der Kegelfläche als Schnitttrand ein Kreis BD . Die wichtigsten elementaren Beziehungen des Kreises sind schon früher (vgl. Planimetrie) erörtert worden. Schneidet man denselben Kegel schief gegen Achse AC in der Richtung EF , sodaß EF und AB sich schneiden, so wird der Schnitttrand eine Ellipse sein. Ist aber, wie in Fig. 39, der schräge Schnitt so gerichtet, daß EF parallel mit AB ist, so ist der Schnitttrand keine geschlossene Curve, sondern eine solche, deren beide Äste vom Scheitel F aus immer weiter auseinander gehen, je weiter man sich den Kegel fortgesetzt denkt; sie heißt Parabel. Zu jedem Kegel gehört eigentlich immer ein gleicher Scheitelsegel, denn man kann sich einen Kegel dadurch entstanden denken, daß man eine im Punkte A (Fig. 42) befestigte Gerade BO mit ihrem Endpunkte B in einem auf der Achse AC senkrechten Kreise herumschleift; dann wird nicht nur der Theil AB , sondern auch der Theil AO derselben jeder einen Kegel beschreiben. Legt man eine Schnittebene so, daß sie etwa in der Richtung MN beide Kegel zugleich trifft, so wird als Schnitttrand eine aus zwei unendlichen, sich nicht schließenden Zweigen KFJ und KGZ bestehende Curve, die Hyperbel entstehen. Die Richtung EF bei der Ellipse (Fig. 36) heißt die große Achse derselben, die darauf in der Mitte senkrecht die kleine Achse. Auch bei der Parabel (Fig. 39) heißt die Richtung EF die Achse, sowie auch bei der Hyperbel (Fig. 42) die Richtung MN , speciell das Stück FG die Achse genannt wird.

In einer Ellipse (Fig. 37), deren halbe große Achse $AC = BC$ und halbe kleine Achse $DC = EC$ ist, erhält man, wenn man mit der Zirkelöffnung AC von D oder E aus die große Achse zweimal schneidet, zwei wichtige Punkte, die Brennpunkte F und F' . Der Abstand irgendeines Punktes M oder M' der Ellipse von deren Brennpunkten heißt Radius vector. Ein wichtiger Satz ist, daß die beiden Radii vectores eines Punktes M zusammen stets gleich der großen Achse sind, also $FM + F'M = AB$. Dies kann zur mechanischen Construction der Ellipse dienen, denn ein Faden von

der Länge AB in F und F' befestigt, wird einen Stift, der ihn spannt, auf der Peripherie der Ellipse herumzuziehen zwingen. Eine Tangente am Kreise steht bekanntlich senkrecht auf dem Radius des Berührungspunktes. Nicht so ist es bei der Ellipse; hier halbiert eine Tangente TM den Winkel zwischen dem einen Radius vector FM und der geraden Verlängerung NM des andern. Eine einfache Construction der Ellipse ergibt sich auch, wenn man mit der halben großen Achse AC und der halben kleinen FC als Radien Hülfskreise beschreibt. Zieht man dann irgendeinen gemeinsamen Radius CDE , und von D aus eine Parallele mit der großen, von E aus eine solche mit der kleinen Achse, so ist der Durchschnittspunkt dieser Parallelen allemal ein Punkt der Ellipse. Auf diese Weise können eine genügende Anzahl Punkte derselben construirt werden. Die Gleichung, welche die analytische Geometrie für die Beziehung der Abscisse x und die Ordinate y jeden Punktes der Ellipse entwickelt, für den Fall, daß die halbe große Achse gleich a , die halbe kleine gleich b gesetzt und die Richtung der ersten zur Abscissenachse, die der letztern zur Ordinatenachse genommen wird, sodaß der Mittelpunkt C (Fig. 37) den Coordinatenanfang bildet (Mittelpunkts-Gleichung der Ellipse), ist: $a^2 y^2 + b^2 x^2 = a^2 b^2$.

Die Parabel (Fig. 40) hat die Eigenschaft, daß jeder Punkt derselben von einem bestimmten Punkte F , dem sogenannten Brennpunkte, und einer Geraden BC , der Directrix, denselben Abstand hat. Für jeden beliebig gewählten Punkt M derselben ist daher stets $FM = CM$. Dies gilt also auch für den Scheitelpunkt A , d. h. $FA = BA$, der Scheitel der Parabel liegt demnach in der Mitte zwischen der Directrix und dem Brennpunkte. Da BP offenbar auch gleich CM , so ergibt sich die Construction irgendeines Punktes M der Parabel, also der ganzen Parabel, wenn man auf der durch A und F gehenden Achse der Parabel senkrechte Ordinaten errichtet, z. B. PM , zunächst noch verlängert über M , dann die Linie BP in den Zirkel nimmt, in F einsetzt und die Ordinate über P in M durchschneidet, dann ist M ein Parabelpunkt. Man kann einen Parabelbogen auch construiren, wenn man in einem Rechteck die eine Seite BD (Fig. 41) in eine gerade Anzahl gleiche Theile theilt (z. B. 8) und die andere Seite ED in halb so viel, die ersten von der Mitte an mit 1, 2 u. s. w., die andern von oben mit 1, 11, u. s. w. bezeichnet, von 1, 2 u. s. w. Parallelen mit AC zieht und 1, 11 u. s. w. mit A verbindet. Dann sind die Durchschnittspunkte der Verbindungslinie $1A$ mit der Parallele 1 u. s. w. Punkte der Parabel. A ist der Scheitel derselben. Die durch F nach beiden Seiten gezogene Ordinate heißt der Parameter und ist das Vierfache von FA . Man bezeichnet ihn gewöhnlich mit p . Setzt man $AP = x$ und $PM = y$, so ist die Gleichung der Parabel: $y = px$.

Die Hyperbel (Fig. 43) besteht, wie schon bemerkt, stets aus zwei zusammengehörigen Zweigen, deren Scheitel B und C um die Größe der Hauptachse BC voneinander absteht. Von dieser Achse wird die Hyperbel geschnitten, von der durch den Mittelpunkt A gehenden Nebenachse EH nicht. Zieht man um die Endpunkte der Achsen ein Quadrat $DGIK$, so sind die verlängerten Diagonalen desselben, $D1$ und GK die Asymptoten der Hyperbel. Zwischen diesen müssen, wie auch die Figur zeigt, die Hyperbeläste liegen. Ist das Rechteck $DGIK$ wie in Fig. 43 ein Quadrat, so nennt man die Hyperbel eine gleichseitige. Die Abstände FA und $F'A$ der Brennpunkte F und F' vom Mittelpunkte A sind gleich $BE = DA$. Die Entfernungen (Radii vectores) jedes Hyperbelpunktes von dem

Spirale. Bezeichnet man den Radius vector irgend eines Punktes derselben mit r , den Drehungswinkel desselben gegen A mit u , und die Größe $A1 = A1'$ mit r , so ist die sehr einfache Gleichung dieser Spirale in Polarcordinaten: $u = rt$.

Von all den zahlreichen Beziehungen an diesen Formen, den Tangenten, Normalen, Krümmungshalbmessern, Abwidelungslinien (Evoluten) u. s. w. derselben hier zu reden, würde weit über den engen Rahmen, der hier einzuhalten ist, hinausreichen, auch die Betrachtungen, welche die analytische Geometrie über die Formen im Raume anstellt, über die Curven doppelter Krümmung, über die verschiedenen Arten von Flächen, Umdrehungsflächen, windschiefen Flächen u. s. w., würden ohne tieferes Eingehen unverständlich bleiben, müssen daher hier übergangen werden. Dagegen sollen die wichtigsten Anwendungen der Geometrie, als die darstellende Geometrie, die Geodäsie und, ein wichtiger Zweig derselben, die Chorographie in ihren Grundjügen im Folgenden besprochen werden.

Darstellende Geometrie.

Will man räumliche Gebilde von drei Dimensionen (Länge, Breite, Höhe) nicht durch wirklich körperliche Modelle, sondern durch Zeichen auf einer Ebene darstellen, so stellt sich dem zunächst das Hinderniß entgegen, daß die Ebene nur zwei Dimensionen hat, Länge und Breite. Es lassen sich aber dennoch Methoden finden, auch in der Ebene, sowie auch auf andern Flächen ein deutliches Bild der dritten Dimension der körperlichen Objecte zu geben. Die Gesamtheit dieser Methoden heißt die darstellende oder descriptive Geometrie. Dieselbe bedient sich als unentbehrlichen Hülfsmittels der Projectionen. Läßt man nämlich von den Punkten eines Object's nach einer Zeichenebene (der Projectionsebene) gerade Linien gehen, die einem bestimmten Richtungsgeetze gegeneinander folgen (Projectionstrahlen), so nennt man die Fußpunkte dieser Strahlen die Projectionen der Punkte. Laufen die Projectionstrahlen alle parallel, so nennt man die Projectionen Parallelprojection, laufen sie aber alle durch einen festen Punkt (Projectionscentrum), in den man gewöhnlich das Auge verlegt denkt, so hat man die Centralprojection oder Perspective.

1. Parallelprojection.

Hier können nur die einfachsten Fälle erörtert werden, wenn nämlich die parallelen Strahlen auch senkrecht gegen die Projectionsebene stehen, die sogenannte rechtwinkelige oder orthogonale Projection. Den Fall, wo die parallelen Projectionstrahlen schief gegen die Projectionsebene stehen, nennt man schiefe Projection. Um die Lage und Gestalt eines zu zeichnenden Object's genau zu bestimmen, projectirt man es gewöhnlich auf zwei Ebenen, eine horizontale ab (Zaf. 3, Fig. 1) und eine verticale bc , zuweilen auch noch auf eine Seitenebene. Die horizontale Projection heißt auch kurz Grundriß, die verticale Aufriß. In Fig. 1 ist für einen Punkt d im Raume f der Grundriß, e der Aufriß. Der durch bg gehende Schnitt beider Ebenen ist die Basis der Projection. In Fig. 2 ist für eine Gerade de der Grundriß kl , der Aufriß fg . In Fig. 3 ist $efgh$ der Aufriß, $ikml$ der Grundriß einer Ebene $abcd$. Ebenso ist in Fig. 4 cd der Aufriß, ef der Grundriß des Parallelepipedons $a-b$. Um beide Risse auf eine Ebene verschieben zu können, denkt man sich (Fig. 5) die Grundrißebene $a-b$ um die Basis herabgedreht in

die Lage $b'e$; dann kommt die horizontale Projection g des Punktes d in die Lage h senkrecht unter seine verticale Projection f zu liegen. Ist in Fig. 6 $a'b''$ über der Basis der Aufriß einer verticalen Linie, so ist a' unter der Basis deren Grundriß. Denkt man sich diese Linie unter verschiedenen Winkeln (z. B. 30° , 60° und 90°) nach vorn geneigt, so sind ihre Auf- und Grundrisse b''' , b'' , b' . Man erhält diese Risse durch die in der Figur ausgeführte seitliche Wendung der Drehungsebene. Ganz ähnlich verfährt man, wenn, wie in Fig. 7, eine verticale allmählich nach vorn gedrehte Gerade in verschiedenen Momenten der Drehung projectirt werden soll. Man denkt sich dann die Drehungsebene auch in die Aufrissebene gelegt. Die Buchstaben haben ganz die analoge Bedeutung wie in Fig. 6. Will man umgekehrt aus den beiden Projectionen einer Geraden die Winkel finden, unter welchen dieselbe gegen die beiden Projectionsebenen geneigt ist, so hat man, wenn $a'b'$ und $a'b''$ (Fig. 8) ihr Grund- und Aufriß sind, den erstern nach $a'd$, den andern nach $a'e$ herumzulegen und von c und d Lothe zu fällen nach den mit der Basis Parallelen $b''d'$ und $b'e'$, dann ist H der gesuchte Winkel mit der horizontalen, V der mit der verticalen Ebene.

Die Construction der Projectionen irgendeiner im Raume in beliebiger Lage befindlichen ebenen Figur ist aus Fig. 9 und 10 ersichtlich, in Fig. 9 für ein Fünfeck, in Fig. 10 für einen Kreis. Denkt man sich ein in der Grundrißebene liegendes Fünfeck $abcde$ um die Seite $a-b$ als Achse gedreht und seine Projectionen für die Lage von 45° und 90° verzeichnet, so entsprechen die mit einem Strich versehenen Buchstaben der erstern, die mit zwei Strichen der letztern Lage. Die Projectionen trummer Linien erhält man, wenn man die Projectionen einer beliebigen Anzahl von Punkten derselben sucht und diese dann verbindet. So ist z. B. der in der Horizontalebene (Fig. 10) liegende Kreis mit dem Durchmesser ab in 8 Theile getheilt, und von diesen 8 Punkten die Projectionen construirt, welche sich ergeben, wenn man den Kreis um eine an den Durchmesser gezogene Tangente in 45° und 90° Erhebung gedreht denkt. Die Construction und Buchstabenbezeichnung ist ganz analog der in Fig. 9.

Als Beispiel für die Projectionen von Körpergeboten mag eine sechsseitige Pyramide (Fig. 11) und ein Cylinder (Fig. 12) dienen. Bei der Pyramide stellt $abcdefg$ Auf- und Grundriß in gerader Stellung, $a'd'g'$ in geneigter Stellung und $a''d''g''$ in geneigter und verwendeter Stellung dar. Dieselbe Bedeutung haben die ungestrichenen, ein- und zweigestrichenen Buchstaben beim Cylinder (Fig. 12).

Der Durchschnitt von Linien und Ebenen mit den Projectionsebenen und unter sich verdient besondere Betrachtung in Bezug auf seine Artstellung durch Projection. Eine Gerade, welche die beiden Projectionsebenen in a und b durchdringt (Fig. 13 und 15), projectirt sich durch die Lothe aa' und bb' , nach ba' und ab' . In Fig. 14 und 16 ist dies für den zum Zeichnen notwendigen Fall ausgeführt, daß, wie in Fig. 5, die Horizontalebene heruntergellappt und mit der Verticalebene zusammenfallend gedacht wird.

Werden die beiden Projectionsebenen von einer dritten beliebig schrägen Ebene $m-n$ (Fig. 17) geschnitten, so ist ab (Fig. 17 und 18) der Durchschnitt der letztern mit der verticalen, ac (Fig. 17 und 18) mit der horizontalen. Diese beiden Durchschnitte nennt man die Spuren oder Tracen einer Ebene. Durch dieselben ist die Lage der Ebene vollständig bestimmt. Von hierherbezüglichen Aufgaben nur folgende. Ein Dreieck abc ist in seinem Aufrisse $a'b'c'$ (Fig. 19)

und Grundrisse $a'b'c'$ gegeben. Es ist der Durchschnitt seiner verlängerten Ebene mit den Projectionsebenen zu bestimmen. Verlängert man die Projectionen zweier Seiten, etwa ab und bc , bis zum Durchschnitt mit der Projectionsebene, und errichtet auf den Durchschnittspunkten d' , g' , f' , e' Lothe, bis sie die zugehörigen anderen Projectionen in d , g , f , e schneiden, so sind durch diese letztern vier Punkte die beiden Spuren der verlängerten Dreiecksebene bestimmt. Solche Spuren müssen sich immer in einem Punkte (m) der Projectionsebene schneiden.

Zu zwei Ebenen seien die Projectionen ihrer Durchschnittslinien zu suchen. Die Spuren der einen seien ab und ac (Fig. 20), die der andern db und dc . Fällt man die Lothe be und cf , so sind ce und bf Grund- und Aufriss des Durchschnitts beider Ebenen. Von zwei ebenen Figuren, die sich durchdringen, z. B. von zwei Dreiecken (Fig. 21) sei die Durchdringungslinie zu konstruieren. Eine horizontale Hülfssebene durch eine Ecke (m' , m) des einen Dreiecks gibt als Aufriss ihrer Durchschnitte mit den beiden (beziehentlich verlängerten) Dreiecksebenen $o'm'$ und $p'q'$ daraus deren Grundrisse om und pq . Deren Durchschnitt x (und x') ist ein Punkt der Durchschnittslinie beider Dreiecke. Der zweite zur Bestimmung der Richtung derselben nöthige Punkt findet sich durch eine zweite durch die Ecke c , c' gelegte horizontale Ebene, als deren Durchschnitte mit den Dreiecksebenen im Aufriss $c'y'$ und $g'y'$, im Grundriss cy und gy sich ergeben. Will man den Durchschnitt einer Ebene mit einem Körper konstruieren, so verfährt man wie in Fig. 22 für den Durchschnitt einer Kugel (deren Kisse hier wie stets Kreise sind) mit einer Ebene, deren verticale Spur m ist. Die Verticalprojection $abcd$ der Schnittfigur ergibt deren Grundriss $a'b'c'd'$. Die Durchdringung von Körpern (Fig. 23 und 24) läßt sich in ähnlicher Weise darstellen. Fig. 23 stellt die Durchdringung einer Kugel durch ein sechsseitiges Prisma dar. Verlängert man im Grundriss die Seiten des Prismas bis ab und ef , so ergeben sich daraus im Aufriss die Durchschnittskreise $a'd'b'e'$ und $c'h'f'g'$. Fig. 24 stellt die Durchdringung eines Cylinders und eines Kegels dar. Aus den gegebenen Kissen der Kegel $a'bc$ und $a'b'c'$, und den Hülfslinien 1, 2, 3, 4, 5, sowie den Kissen des Cylinders $defg$ und $d'e'f'g'$, und der seitlichen, mit den Cylindereindflächen parallelen Hülfsprojection $a'b'c'$ lassen sich leicht die Punkte q , q' der Schnittlinie, sowie jeder andere Punkt derselben konstruieren.

Für die Lösung von Aufgaben, die Berührung von geraden Linien mit Körpern betreffend, mag die Berührung einer durch einen festen Punkt ($a'a'$ in Fig. 25) gehenden Geraden mit einer Kugel dienen. Denkt man die Linie berührend um den Kreis herumgeführt, so beschreibt sie einen die Kugel umhüllenden und in einem Kreise berührenden Kegelmantel. Die Projectionen dieses Berührungskreises sollen gesucht werden. Man drehe daher Linie und Kugel um letzterer verticalen Durchmesser, bis die Linie parallel mit der Verticale liegt und sich in cd , $c'd'$ projectirt. Dann ist $o'o'$ der Aufriss des umhüllenden Kegels und $e'f'$ der des Berührungskreises; daraus findet man leicht den elliptischen Grundriss desselben, sowie den ebenfalls elliptischen Aufriss für die Lage ab , $a'b'$ der Regellinie.

Schattenconstructionen.

Man unterscheidet Körperschatten, das sind die vom Lichte nicht beschienenen Stellen eines Körpers, und Schlag Schatten, das sind diejenigen Theile der

Oberflächen benachbarter Körper, auf welche zu scheinen das Licht durch einen Körper behindert wird. Die Construction beider Arten von Schatten mag durch folgende Beispiele erläutert werden. Fig. 26 (Taf. 3) stellt Grund- und Aufriss eines Cylinders dar. Durch die Projectionen $c'd'$ und $c'd$ ist die Richtung der auf fallenden parallelen Lichtstrahlen gegeben. Zieht man im Grundriss parallel mit $c'd'$ Tangenten an den Kreis, so bestimmen die Berührungspunkte $1'$ und $3'$ die Schattengrenzen, von denen im Aufriss nur die $1'$ entsprechende 1 sichtbar ist, die andere hinten liegt. Die auf $c'd'$ senkrechten Tangenten bestimmen in $4'$ und $4''$ die Mitte des beleuchteten, in $2'$ und $2''$ die Mitte des dunkeln, im Aufriss nicht sichtbaren Theils.

Für die Schlag Schattenconstruction mag der Schlag Schatten eines Pentagondeladeckers (Fig. 27) dienen, auf welches das Licht von links oben und vorn unter 45° gegen die Projectionsebenen geneigt in parallelen Strahlen auffällt. Den Schatten b' irgendeiner Ecke ($a'a'$) findet man, wenn man $a''b''$ parallel mit der Projection der Lichtrichtung zieht, auf b'' ein Loth errichtet und von c' mit der Horizontalprojection der Lichtrichtung parallel eine Linie zieht, bis sie in b' das Loth auf b'' durchschneidet. Durch ähnliche Behandlung der übrigen auf der Lichtgrenze liegenden Ecken findet man die ganze Begrenzung des auf einer horizontalen Ebene erzeugten Schlag Schattens des Pentagondeladeckers oder eines andern Körpers.

Wenn, wie z. B. für die Construction von Fig. 28 geschehen (die Bedeutung der einzelnen Theile dieser Figur wird bei der Centralprojection erörtert werden), die rechteckige Projection auf eine Ebene geschieht, welche gegen die drei (durch die Hauptdimensionen des Object's bedingten) Coordinatenebenen unter spitzen Winkeln geneigt ist, nennt man sie *anometrisch*, und zwar wenn die Projectionsebene gegen alle drei Coordinatenebenen gleich geneigt ist, *isometrisch*, wenn sie nur gegen zwei gleich geneigt ist, *dimetrisch*, und bei ungleicher Neigung gegen alle drei, *trimetrisch*. Ein tieferes Eingehen auf diesen Punkt würde die engen Grenzen dieser Uebersicht überschreiten.

II. Centrale Projection.

Bei der centralen Projection oder Perspective (auch Linearperspective) gehen die projectirenden Strahlen alle von einem Punkte aus, in welchen sich stets das Auge des das Bild Betrachtenden versetzen muß. Zur Verdeutlichung einiger Grundbegriffe der Perspective mag Fig. 28 (Taf. 3) dienen. Ist O der Gesichtspunkt und l die Projectionsebene oder Willebene, so ist das Loth OP die Hauptgesichtslinie (auch Abstand oder Distanz), P der Hauptpunkt, hr der Horizont. gew. nennt man die Grundebene, das Loth Os die Standlinie (Höhe des Auges), s den Standpunkt und $caug$ die Standebene. Der Durchschnitt dl der Bild- und Grundebene heißt Grundlinie. Die Ebene $kxys$ heißt die Vertical Ebene, die Linie vp die Verticale und p der Grundpunkt. Die Punkte D und D' , welche um die Entfernung OP vom Hauptpunkte P abliehen, sind die Distanzpunkte oder herabgeschlagenen Gesichtspunkte.

Es gibt für die perspectivische Entwurfung eines Bildes vorzüglich zwei Methoden, die Grundrissmethode und Methode der freien Perspective oder Verschwindungspunktmethode. Das Wesen derselben soll im Folgenden an einigen Beispielen erläutert werden. Von einem System unter sich paralleler Linien sagt man nämlich, daß sie sich in der

Unendlichkeit erst durchschneiden. Den Punkt in der Unendlichkeit kann man als Schnittpunkt irgendeines Systems paralleler Linien betrachten. Nach der perspectivischen Projection dieses Punktes hin müssen auf der Bildebene die Projectionen der betreffenden Parallelen zusammenlaufen. Daher heißt er ihr Verschwindungspunkt. Die Projectionen der Verschwindungspunkte horizontaler Linien liegen im Horizonte (hr, Fig. 28), deshalb sind sich alle in ein und denselben Punkte des Horizontes einer perspectivischen Zeichnung verschwindende Linien, wie z. B. die im Punkte M (Fig. 29) verschwindende wM, uM u. s. w., perspectivisch parallel und horizontal. Die Projectionen lothrechter Linien, wie aa', cc' u. s. w. (Fig. 29) stehen lothrecht auf dem Horizonte (nPM). Da wegen des perspectivischen Parallelismus der Linien wM und uM die Strecken wu, 01, xs, auch mit dem Horizonte parallelen Linien perspectivisch gleich sind, so kann man einen auf der Grundlinie gl in Fußten oder Metern aufzutragenden Maßstab 0, 1, 2, 3 leicht nach irgendeiner andern, mit dem Horizonte parallelen, näher oder entfernter als die Grundlinie gelegenen Richtung xy oder wz transportieren, wenn man durch die Punkte 0, 1, 2, 3 nach irgendeinem Punkte M des Horizontes Linien zieht. Es sind dann xsrt und wugv die verlangten perspectivisch gleichen Maßstäbe. Soll daher in der Linie ez eine dem verjüngten Maßstabe 0, 1, 2, 3 entsprechende Größe von 2 Metern aufgetragen werden, so mache man ea = wq und ebenso in der Lage sy die Länge se = xr, in der Grundlinie selbst hi = 02. Ebenso kann man für die verschiedenen Entfernungen vom Horizonte den Maßstab für lothrechte Linien finden. Will man z. B. in a oder c Lothe von ein Meter Höhe errichten, so mache man auf den Lothen aa' und cc' das Stück ab = wu und cd = xs. Ueberhaupt werden alle Lothe zwischen an und bn perspectivisch gleich sein. Ein Punkt wie M heißt seiner besprochenen Anwendung zur Theilung horizontaler paralleler Linien wegen der Theilpunkt derselben. Jeder Punkt des Horizontes kann für solche Linien Theilpunkt sein.

Gehen von einem Punkte A im Raume, dessen perspectivische Projection a (Fig. 30) ist, zwei zu einander normale Linien aus, die mit der Bildebene irgend bestimmte Winkel z. B. von 35° und 55° machen, so trägt man diese Winkel, wenn O Gesichtspunkt und P Hauptpunkt ist, bei O an eine zum Horizonte Parallele st so an, daß sOY = 35° und OZ = 55° wird, dann sind OY und OZ die sogenannten Parallelstrahlen der beiden Normalen und Y und Z ihre Verschwindungs- oder Fluchtpunkte. Die Theilpunkte ihrer perspectivischen Projectionen az und ay (siehe hat deren zwei) findet man, wenn man auf dem Horizonte von Z aus den Parallelstrahl OZ nach tz (= Theilpunkt zu Z) und t'z, und von Y aus OY nach ty und t'y (letzteres auf der Verlängerung des Horizontes) überträgt. Als ein Beispiel für obige Auseinandersetzungen möge zunächst die Construction der Perspective eines aus quadratischen Steinplatten bestehenden Fußbodens dienen. Fig. 31 stellt unter ABCE einen Grundriß derselben dar. QR gibt die Stellung der Bildebene an. Durch O und P sind die Orte für Gesichtspunkt und Hauptpunkt gegeben. Der Abstand OP betrage 18 Fuß. Das Auge befände sich 6 Fuß über dem Fußboden. Die Perspective soll in doppeltem Maßstabe construirt werden. Man zeichne zuerst den Horizont (Fig. 32), nehme darin beliebig den Hauptpunkt P, rechts davon in 18 Fuß Entfernung (nach dem beiseiglichen Maßstabe) den Distanzpunkt D, 6 Fuß unter dem Hori-

zonte der Grundlinie gl, dann durch P die Verticale Pp (O). Den herabgeschlagenen Punkt O selbst braucht man hier nicht. Auf gl werden von p aus in doppeltem Maßstabe die Punkte N, M u. s. w. in n, m u. s. w. notirt. Zieht man durch diese Punkte nach P Linien, so geben diese die Richtungen ab u. s. w. der mit AB parallelen Steinplatten. Die mit der Grundlinie und AE parallelen erhält man, wenn man bedenkt, daß die Diagonale AC beide Systeme in A, V, W, X, C schneidet. Trägt man daher die doppelte Entfernung PK von p nach k auf, und zieht durch diesen Punkt und D eine Linie, so geben deren Schnitte a, v, w, x, c mit den nach P laufenden Strahlen die Lage der Fugen ae u. s. w. an. Man kann auch zu diesem Zwecke die Größen FS, FE u. s. w. doppelt so groß von F aus auftragen und durch sie von D Linien bis zum Schnitte mit der Linie cP ziehen, oder wenn D zu weit außer der Bildebene läge, von der halben Entfernung D/2 aus Linien durch die von n aus nicht verdoppelt auf gl aufzutragenden Entfernungen NV, NA u. s. w.

Als zweites Beispiel mögen zwei Parallelepiped dienen, das eine liegend, das andere stehend. In Fig. 33 sind die geometrischen Grundrisse gegeben, ABCL ist der des liegenden, FGHI der des stehenden. Die Seite der Grundflächenquadrate soll 5 Fuß, die Länge der Körper 12 Fuß betragen. Y (Z) gibt die Stellung der Bildebene an. 24 Fuß vom Hauptpunkte P derselben ist der Gesichtspunkt O. Das Auge soll 9 Fuß über der Grundebene sein. Hierzu sollen nun die Projectionen im doppelten Maßstabe construirt werden. Es mag die Bildebene, wie in Fig. 34 angedeutet, so beschränkt sein, daß die Distanzpunkte D und zum Theil auch die Theilpunkte t nicht darauf verzeichnet werden können. Zunächst gebe man den Horizont an mit dem Hauptpunkte P, und 9 Fuß darunter durch p die Grundlinie. Dann trägt man auf letzterer pn, pv doppelt so groß als PN, PV (Fig. 33) auf; ebenso ps. Durch s/2 und D/2 findet man i, hieraus g, h und f. Auf v errichtet man die Höhe des Prismas, v'v' schneidet durch p' die Kanten l'l' und g'g' ab und bestimmt dadurch die obere Grundfläche. Für die Perspective des liegenden Prismas (ABCL im Grundriß, Fig. 33) ist zunächst die Perspective a des Punktes A durch die 1/2 Distanz construirt, die Kanten ab und al durch die 1/2 Distanz (des Raumes wegen nach oben getragen) POg. Die Bedeutungen mögen zur Verfolgung der Construction genügen. — Der Aufriß (Fig. 35) und der Grundriß (Fig. 36) eines Monumentes sei gegeben. Durch die Achse A und den Hauptpunkt P geht die Bildebene. 21 Fuß davon ist der Gesichtspunkt O, das Auge in 7 Fuß Höhe. Die Grundflächen aller Theile sind Quadrate, die im Aufrisse durch besondere Buchstaben (B, C u. s. w.), und deren vier Ecken im Grundrisse noch durch 1, 2, 3, 4 bezeichnet sind. Die Parallelstrahlen (OY, OZ) bilden die im Grundriß angegebenen Winkel. In P (Fig. 37) ist der Hauptpunkt, durch den 7 Fuß tiefer gelegenen Punkt p geht die Grundlinie. Es ist bequem, sich hier einen perspectivischen Fußsgrundiß (b¹, l² u. s. w.) in einer (hier etwa 5 1/2 Fuß) tiefer gelegenen Fußsgrundebene zu construiren. Es sind auf den wesentlichen Punkten des Grundrisses Lothe zu errichten, die nöthigen Höhen auf der Achse a aufzutragen und dann durch den Diagonalepunkt dg, sowie y/2 u. s. w. die Construction zu vollenden.

Als weiteres Beispiel möge folgendes dienen. Fig. 38 ist der Grundriß eines der Potsdamer Thorgebäude in Berlin. Aufriß und Höhenmaße sind

auss der perspectivischen Construction (Fig. 39) erkennbar. Für beide sind die Maßstäbe beigelegt. Die Höhe des Auges soll 6 Fuß, die Distanz OP des Gesichtspunktes 75 Fuß sein. Die Buchstaben im Grundrisse und der Construction entsprechen einander wie in den vorigen Beispielen, und die Bezeichnung der Verschwindungspunkte, Theilpunkte, Diagonalepunkte ist die nämliche wie früher. Es soll nur noch darauf aufmerksam gemacht werden, daß hier auch ein perspectivischer Hüßsgrundriß angewendet ist.

Für die Perspective von durch krumme Linien und gekrümmte Ebenen gebildeten Gestalten mag die perspectivische Construction eines Kreises, eines Kegels und eines Gewölbes dienen. Geht die Bildebene durch den Durchmesser II, IV (Fig. 40) des Kreises, so construirt man zunächst die Perspective des ihn in I, II, III, IV tangierenden Quadrats F, G, H, I . Die Seiten desselben ist und gh (Fig. 42) laufen im Hauptpunkte P zusammen. Die beiden andern laufen parallel der Grundlinie und gehen durch die, mit Hülfe von ad bestimmten Punkte f und g . Noch vier andere Punkte (V, VI, VII, VIII, in der Construction 5, 6, 7, 8) findet man von dem Punkte Q (q^b in dem der Deutlichkeit wegen vergrößerten Quadranten (Fig. 41) die Perspective q bestimmt, und durch die Linie Pqw die Punkte 5 und 8 ermittelt, in ähnlicher Weise auch 6 und 7. Die Perspectiven us, tr, rs, tu der Tangenten US, TR, RS, TU laufen nach den Distanzpunkten D . — In Fig. 43 ist durch KGL der Aufriß eines geraden Kegels gegeben, ka in Fig. 44 ist die Perspective seiner Achse KA . P ist hierzu der Hauptpunkt $OP = PD = P'D'$ die Distanz. Die Bildebene soll durch die Achse ka gehen. Man ziehe in der Bildebene den Durchmesser lg der Grundfläche, construirt die elliptische Perspective $lhgi$ derselben mittels des einschließenden Quadrats und dessen Diagonalen, und ziehe die als Umrisse auftretenden Kegelseiten als Tangenten von k an die Grundfläche.

Als fernerer Beispiel für perspectivische Darstellung krummer Flächen und Rinnen diene ein durch zwei sich kreuzende, verschiednen gekrümmten Gewölbschneiden gebildeter Gewölbsraum (Fig. 45). In a^b, c^d, e^f ist der perspectivische Grundriß der beiden sich kreuzenden Cylinder dargestellt. Die mit der Bildebene zusammenfallende Wölbungslinie des einen ist ac^b . Der andere hat nur die halbe Spannung. Zieht man vom Scheitel i und einem beliebigen Punkte e Lothe nach i^o und e^o , zieht von i und e , sowie von i^o und e^o Linien nach P und errichtet da, wo die letztern in m^o, h^o, l^o die Diagonalen des Grundrisses schneiden, Lothe bis zum Durchschnitt mit iP und eP in m (dem Durchschnitt der Gratbogen), h und l (andern so gefundenen Punkten der Gratbogen). Die Construction der Gurtbogen ng und kr ist nun leicht ersichtlich.

Construction der Perspectiven der Schattengrenzen.

Wenn ein Körper von einer Seite beleuchtet wird, so werden immer gewisse Theile seiner Oberfläche kein Licht erhalten. Diese mangelnde Beleuchtung gewisser Seiten heißt der Körper: oder Objectschatten. Seine Construction läuft auf die Construction der Schattengrenzen hinaus. Der Raum hinter einem Körper, welcher ebenfalls kein Licht erhält, heißt sein Schlagschatten. Im Raume selbst kann man diesen nicht wahrnehmen, vielmehr erst dann, wenn er durch eine Fläche aufgefangen wird. Die Grenzen des Schlagschattens auf derselben sind Projectionen der Körperschattengrenzen und werden zugleich mit diesen construirt.

In Betreff der Lichtquellen kann man unterscheiden solche mit parallelen Strahlen, wie Sonne und Mond, solche mit divergirenden Strahlen, wie die künstlichen Lichtquellen (Flammen u. s. w.), und solche mit convergirenden Strahlen, wie das von allen Seiten kommende Tageslicht, bei bedeckter Sonne. Hier mag nur ein Beispiel für von einem Punkte (L in Fig. 46) divergirend ausgehende Lichtstrahlen angeführt werden, welche auf eine Kugel, einen liegenden Cylinder, einen stehenden, gespaltenen Cylinder und einen Kegel fallen. P ist der Hauptpunkt, PD die halbe Distanz. Der Fußpunkt der in L befindlichen Kerzenflamme auf der obern Cylinderfläche sei F' , der auf der Grundebene F und auf der Wandfläche F'' . Die Construction der Körper- und Schlagschattengrenzen geschieht im allgemeinen so, daß mehrere durch die Lichtquelle LF und die Körper gehende lothrechte Lichtebenen angenommen, deren Schnittlinien mit den Oberflächen der Körper gesucht und vom Lichtpunkte aus tangierende Strahlen an die Schnittlinie gezogen werden. Die Berührungspunkte derselben sind dann Punkte der Objectschattengrenzen, und ihre Schnittpunkte mit den Schnittlinien Punkte der Schlagschattengrenzen. In der Figur sind zwei solcher Lichtebenen benutzt, deren Schnittlinien wF und yF durch alle Körper zugleich gehen. Noch andere Lichtebenen sind angewandt, um Schlagschattenschnittpunkte der obern Grundfläche des stehenden Cylinders auf der Grundebene, dem Kegel und dem liegenden Cylinder zu finden. Die Details der Construction ergeben sich aus dem Gesagten bei Betrachtung der Figur.

Geodäsie.

Eine andere wichtige Anwendung der Geometrie, und allerdings auch der mathematischen Analysis überhaupt, bildet die Geodäsie, als diejenige Wissenschaft, welche die Erdoberfläche oder beliebige Theile derselben ausmessen und durch Zeichnung darstellen lehrt. Die Geodäsie zerfällt im allgemeinen, je nachdem man nur sehr kleine Theile der Erdoberfläche der Messung unterwirft, oder größere, ganze Länder, Erdtheile und noch mehr umfassende aufnimmt und dabei Rücksicht auf die kugelförmige oder eigentlich nur kugelförmige (sphäroidische) Gestalt der Erde Rücksicht zu nehmen hat, in die niedere Geodäsie oder Feldmesskunst und die höhere oder Landmesskunst. Von beiden soll das Wichtigste hier erwähnt werden.

Vor allem sind die geodätischen Instrumente zu beschreiben, dann die Methoden des Messens und Aufnehmens, und drittens die Art und Weise der Darstellung der Aufnahmen durch Zeichnung. Diese letztere zerfällt wieder, je nachdem Objecte der niederen oder höhern Geodäsie dargestellt werden sollen, in die Topographie (Situationszeichnen) und die Chorographie (Landschaftenconstruction). Beide bedienen sich im wesentlichen der von der darstellenden Geometrie gegebenen Projectionsmethoden.

I. Instrumentenkunde.

1) Instrumente zur Bezeichnung von Punkten auf dem Felde. Die einfachsten sind die Absteckstäbe (Jalons, Valen), mächtig starke, mit eisernen beschlagener Spitze versehene Stäbe, die der weiteren Sichtbarkeit wegen in abwechselnden, schwarz oder viertelmeterlangen Strecken weiß und roth oder weiß und schwarz angestrichen sind (Taf. 4, Fig. 1). Für größere Entfernungen braucht man Signalfäße, die mit einer Scheibe (Fig. 2) oder mit einer Flagge (Fig. 3) versehen sind. Die Signalfäße von Eisen (Fig. 4 u. 5), die gemeinsam an einem Ringe auf-

bewahrt werden, steckt ein Gefälle beim Messen mit der Kette, jedesmal wenn ein Kettenstab aus der Erde gezogen wird, an die Stelle und ein anderer sammelt sie zur Controle ein.

2) Instrumente zur Distanzmessung. Hier ist zunächst der Distanzmesser auf unebenem Boden zu erwähnen, dessen Beschaffenheit und Anwendung aus Fig. 6 ersichtlich. In Fig. 7 sind ein Paar, meist eine Kette lange Meßstäbe dargestellt, welche an den Enden mit rechtwinklig zueinandergelegten Metallanten beschlagen sind, damit sie genau aneinandergehoben werden können. Zu dem gewöhnlichen Zweden braucht man zum Messen eine gefirniste Schnur oder eine Kette mit süßlangen Gliedern; in Fig. 8 ist das Mittelstück, in Fig. 9 das Ende einer Meßkette dargestellt. Man steckt die beiden Endringe R über Kettenstäbe (Fig. 10), an denen sie auf dem Quersitz ab liegen bleiben, und spannt sie auf diese Weise aus. Bei manchen Messungen von größerer Schärfe braucht man neben dem getheilten Maßstabe noch einen kleineren Hilfsmaßstab, Nonius (Fig. 11). Will man einen kleinsten Theil des Maßstabes noch in Zehntel theilen, so theilt man einen Raum, der gleich neun solcher Theile auf dem Nonius, in zehn. Dann gibt das Zusammenfallen des so- und sovielfachen Noniusstriches mit einem Hauptmaßstabtheile an, wie viel Zehntel über einen ganzen Theil noch zu nehmen sind.

3) Instrumente zum Ablesen bestimmter Winkel. Ist hat der Geometer auf dem Felde auf eine Richtung Loth zu fallen oder solche zu errichten. Dazu bedient er sich am einfachsten des Winkeltreuzes (Fig. 12). Mit der Hälfte H wird es senkrecht auf ein Stativ S gesteckt. Visirt man die Stifte a und b in der gegebenen Richtung ein, so gibt die Visur c die darauf senkrechte Richtung. Die Visuren a b und a d schließen einen Winkel von 45° ein. Bringt man noch einen Stift e so an, daß Winkel oae = 30° ist, so kann man durch die Visuren ao und ae 30° , durch ae und ed 60° , durch ac und oe 75° ablesen. Ebenfalls zur Ablesung rechter Winkel dient die Winkeltrommel (Fig. 13), der Winkelspiegel (Fig. 14) und das Prismenkreuz von Buerenfeind (Fig. 15 u. 16). Die Winkeltrommel wird ebenfalls mit der Hälfte E senkrecht auf ein Stativ gesteckt. Der hohle Messingcylinder ABCD enthält mehrere Spalten, sogenannte Dioptern, von denen in der Figur nur a, b, c, d, f sichtbar sind. a, c und f sind enge (Oculardiopter), b und d sind weite Spalten mit einem lothrechteten Haar zum Anvisiren (Objectivdiopter). Der enge steht immer eine weite Spalte diametral gegenüber. Der Winkelspiegel und das Prismenkreuz sind nicht zum Stativ, sondern zum Freihandgebrauch. Der erstere (Fig. 14) trägt in einem bei mnpq offenen Messinggehäuse, zwei ebene Glaspiegel a und b, die einen Winkel von 45° bilden. Richtet man im Standpunkte A die Oeffnung mnpq nach einem seitlichen Object B und blickt an der Kante pq vorbei, so sieht man in ihm durch doppelte Spiegelung von b aus das Object B in einer auf AB senkrechten Richtung BC und kann dann zugleich unter a durch die Oeffnung c diese Richtung durch einen mit dem Bilde von B sich deckenden Stab markiren lassen. Das Prismenkreuz (Fig. 15) enthält in einer mit Handgriff versehenen Messinghülse ABCD, die vorn ganz, an den Seiten zum Theil offen ist, zwei rechtwinklige Prismen P und P', deren Lage aus dem Durchschnitte in Fig. 16 besser ersichtlich ist. Durch die Kathetenseiten BC und B'C' blickt man hinein. Wenn dann von zwei rechts und links mit dem Beob-

achter in gerader Linie liegenden Punkten Strahlen durch die Kathetenseiten BA und B'A' in die Prismen dringen, werden sie von den beiden Hypotenusenflächen AC und A'C' beide genau in derselben Richtung in das Auge des Beobachters reflectirt, sodas man auf diese Weise einen mit zwei andern in gerader Linie liegenden Punkt auffuchen kann. Das Füllen und Errichten von Lothen geschieht ähnlich wie beim Winkelspiegel.

4) Instrumente zur graphischen Verzeichnung von Winkeln. Diese dienen dazu, im Felde abgelesene Winkel, ohne ihr Gradmaß zu suchen, auf dem Papier zu verzeichnen, und auf dem Papier verzeichnete auf dem Felde abzulesen. Der Rektisch (schon 1590 von Prof. Präterius in Altorf bei Nürnberg erfunden) besteht, wie aus Fig. 17 ersichtlich, aus einem ebenen Reißbrett, welches mittels eines Verbindungsstücks auf festbarem dreifüßigen Stativ ruht. Durch die Schrauben des Verbindungsstücks kann das mit Papier überzogene Reißbrett (Menselblatt) in horizontale Richtung gebracht und festgehalten werden. Soll ein Punkt des Reißbretts senkrecht über einen Punkt des Feldes gebracht werden, so legt man die Gabel AB (Fig. 18) mit der Spitze A auf den Punkt des Bretts und stellt den Tisch so, daß das mit dem hohlen Gegengewicht C balancirende Loth D über den Punkt des Feldes kommt. Das Diopterlineal (Fig. 19) ist ein genaues, bei me abgesehrägtes Lineal AB, welches in den Ansätzen CD und EF Dioptern ab, a'b' und c'd', cd trägt. Es dient, um abvisirte Richtungen und Winkelschenkel durch Zeichnen mit Bleistift auf den Rektisch zu übertragen. Bei der zu gleichem Zweck dienenden Kippregel CD (Fig. 26) sind für weiter entfernte Objecte die Dioptern durch das Fernrohr A B ersetzt. Das Stativ des Fernrohrs ist durch die Klamme NP und die Schraube x, y, u, w auf der Regel (Lineal) CD befestigt. Der am Nonius pq sich bewegende Grabbogen nn kann gleichzeitig benutzt werden, um kleine Elevationswinkel zu messen.

5) Instrumente zur Bestimmung des Winkel nach Gradmaß. Die Feldbussolle (Fig. 21) besteht aus dem Diopterlineal dppd mit darauf befestigtem Kompaß a an nebst Arretirung s, und dem Stativ qq. Die Schrauben v, v₁, v₂, v₃, v₄ dienen zur Horizontalstellung. Soll mit der Bussolle ein im Felde befindlicher Horizontalwinkel gemessen werden, so stellt man das Diopterlineal erst in den einen, dann in den andern Winkelschenkel ein und liest jedesmal den Stand des Nord- und des Südpols der Magnetnadel auf dem daneben befindlichen, in 360° getheilten Kreise ab. Der Unterschied der beiden Nordpol- sowohl als der beiden Südpolstände gibt den gesuchten Winkel. Zur Messung von Höhen oder Elevationswinkeln dient der in Fig. 22 abgebildete Quadrant (Vierteilkreis) FED auf der von drei Stellschraubenfüßen getragenen verticalen Säule AB. Die Verticalstellung ist erreicht, wenn das Loth pq auf die Marken m einpfeilt. Um den Mittelpunkt o dreht sich das zum Visiren bestimmte Fernrohr GH, das mit dg am Kreisbogen (Limbus) festgelenkt und durch die Mikrometerschraube lg zugleich mit dem Nonius ab fortbewegt werden kann. Da man bei steilen Stellungen schlecht durch das Fernrohr hindurchblicken könnte, wird das Licht durch eine Oeffnung bei h von einem Prisma seitlich herausgespiegelt. t und s sind Correctionschrauben. Der Theodolit (Fig. 23) dient dazu, sowohl Horizontal- als Verticalwinkel zu messen, und besteht daher wesentlich aus einem Horizontalkreise pp und einem Verticalkreise vv, beide in 360° und deren Unterabtheilungen getheilt. Die auf dem mit zwei diametral liegenden

Nonen und Ablefsungslapen vv versehenen drehbaren Kreise aa stehenden Träger bb tragen in den Lagern ll die Achse dd des Fernrohrs gg. q und q' sind Bremschrauben, w eine an der Platte l sitzende Mikrometerschraube. Die Achse c ruht auf drei Armen und diese auf den durch die Muttern t gebenden Stellschrauben s. Der Stab k geht durch das Stativ p, auf welchem das Instrument durch die mit der Mutter m zu spannende Spiralfeder u festgehalten wird. Durch ein an den Gelen x gebängtes Loth kann man die Aufstellung über einem gewissen Punkte bewirken.

6) Nivelirinstrumente. Um eine Fläche, z. B. die Nivellirplatte, horizontal zu stellen, braucht man die Libellen. Die Röhrenlibelle (Fig. 24) ist eine an der obern Seite innen ganz schwach gewölbte Röhre, sodas eine Luftblase, welche beim Füllen der Röhre mit Flüssigkeit darin gelassen wurde, in horizontaler Lage oben in der Mitte der Röhre bei o stehen bleibt. In der Construction (Fig. 24) ist die obere offene Messingfassung der Libellenröhre bei AB im Scharnier beweglich, bei D durch die Stellschraube C regulirbar. Bei der Röhrenlibelle muß man die Horizontalstellung in zwei aufeinander senkrechten Richtungen der Libelle vornehmen, bei der Dosenlibelle ABCDc (Fig. 25) genügt eine Stellung der Libelle. Will man die Höhe eines Punktes mit der des Standpunktes vergleichen (nivelliren), so richtet man die Dioptern des Nivelirinstrumentes (s. unten) auf eine in Felle oder Centimeter getheilte Nivelirrinne (Fig. 26), die ein Gefälle an den Handgriffen M haltend vertical aufsteht.

Die Nivelirrinne (Fig. 27) mit verstellbarer Wasserteiche ist für größere Niveaudifferenzen. Um den Neigungswinkel einer Böschung zu bestimmen, dient die Bergwaage (Böschungsmesser) in Fig. 28, mit den Füßen Aa, Bb setzt man sie auf eine auf die Böschung gelegte Latte. Das vom Scheitel C herabhängende Loth F hängt bei o° Neigung in der Mitte O des Grabbogens DE. Jede andere Neigung wird durch den Stand des Lothes angegeben. Auf dem Princip der communicirenden Gefäße beruht die mit Wasser bis x, y gefüllte Kanalwaage (Fig. 29) und die Quecksilberwaage (Fig. 30). In das Querrohr AB der Kanalwaage sind bei a und b Glasröhren eingefügt und bei b und d mit Kappen geschlossen. Mit der Hülse C und der Schraube f wird sie auf ein Stativ gesetzt und dann durch Büren über x, y die wagrechte Richtung beobachtet. Bei der Quecksilberwaage visirt man durch die Dioptern a, b auf den Bürseln C und D. Diese schwimmen auf dem Quecksilber der Gefäße A, B, die durch den Raum xx communiciren. Das Quecksilber bewahrt man gewöhnlich in dem mit der Schraube v verschlossenen Raum Z auf, die Diopternwinkel in den Räumen FF. Die Nivelirdioptern (C, D, C', D', Fig. 31) mit Libelle (EF) geben etwas genauere Büren. Der Träger AB der Libelle ruht auf dem Gelenke G und der durch die Feder c vor todttem Gange bewahrten Stellschraube Hl. Der Stativhals b kann auch durch die Schrauben a a vertical gestellt werden. Bei größeren Entfernungen, überhaupt auch für größere Genauigkeit, genügt das Absehen der Horizontalrichtung durch bloße Dioptern nicht. Man braucht dann ein Nivelirinstrument mit Fernrohr. Eine der besten Einrichtungen zeigt Fig. 32. Das mit Fadentreuz versehene Fernrohr FF, dessen Achse parallel mit der bei x aufgesetzten Libelle BE läuft, liegt mit seiner Achse L in den von der Säule E getragenen Lagern, und wird darin von den durch die Schrauben s, s' befestigten Schließen S festgehalten. Die Stellung des Fernrohrs kann durch die durch die Gewinde G, G' gehende, mit der am Zeiger z vorbeigehenden Trommel T versehenen Mikrometerschraube C regulirt werden. Mit der Schließe S verbunden sind zwei mit den Nonien versehene Grabbogen, welche zugleich als Verticalkreis für Höhenwinkelmessungen dienen können. Die Nonien werden durch die Stellschrauben ee' regulirt. Die Säule B steht auf einem mit Nonius versehenen Horizontalstreife und das Ganze befindet sich auf einem Stativ ähnlich dem des Theodoliten (Fig. 23).

7) Prehler's Meßknecht als Universalinstrument. Dieses von Hofrath Prehler in Ibarand construirte Taschensinstrument ist ein im Verhältniß zu seiner univerrsell Verwendbarkeit zum Niveliren, Messen von Horizontal- und Verticalwinkeln, sowie als Winkelkreuz und Böschungsmesser u. s. w. noch gar nicht genügend bekanntes und verbreitetes Hülfsmittel für alle messenden Praktiker, besonders aber auch für den Pädagogen, denn es erhebt für die meisten Schulen vollständig theurere Felsmeßapparate und kann dabei jedem einzelnen Schüler in die Hand gegeben werden (Fig. 33—37). In etwa $\frac{1}{10}$ der natürlichen Größe ist der aus gut planirter, gefirnister Pappe gefertigte Meßknecht völlig ausgebreitet in Fig. 33 dargestellt. Die Inschriften deuten den Inhalt der auf ihm zugleich befindlichen Tabellen an. Die Rückseite enthält eine vollständige fünfstellige Logarithmentafel von 1 bis 9999 nach der Maßstab- oder Scalentabelle. In der Mitte zusammengeklappt, wird der Meßknecht im Futteral oder der Brieftasche aufbewahrt. Zum Messen u. s. w. wird er in der aus Fig. 34 ersichtlichen und durch Vergleichung der Buchstaben A, B, C u. s. w. leicht verständlichen Weise zusammengeklappt, vorher aber durch in die Oeffnung a, b, d u. s. w. gesteckte Bürliste (ober auch Dioptern) armirt. Diese Stifte und Dioptern u. s. w. führt man in einem Pappplättchen (dem Zeughäuschen), oder will man den Knecht nicht aus freier Hand, sondern am Stativ gebrauchen, in dem hohlen abschraubbaren Handgriff BC des Stativstods (Fig. 35 und 36) bei sich. Ist dieser Griff bei A entfernt, so leßt man die drei Beine zunächst nach oben und leßt dann das Ganze um, daß das verborgene gewesene Stüd Aa nach oben kommt. Nachdem man die Mutter a (Fig. 36) entfernt und das Gelenk bei b rechtwinklig gebogen, leßt man den Knecht mit der Oeffnung h (Fig. 33) daran und preßt ihn mit der Mutter wieder fest. Man kann dann durch ein leichtes, aufgesetztes Diopternlineal DD Horizontalwinkel, und durch den Stand des Pendels an der Seitenwand Verticalwinkel messen. Durch Büren über die Stifte ba und bd (Fig. 34) kann man das Winkelkreuz einsetzen, und durch Büren über die Stifte e und g während der Pendel auf o° steht, kann man nivelliren. Durch Beobachtung des Pendelstandes, während die Sonne den Schatten des Stütes g in der Richtung ge wirft, kann man die Sonnenhöhe bis auf $\frac{1}{10}$ Grad genau messen und daraus durch leichte Rechnung den Gang der Uhr berichtigen. Eine Höhenwinkelmessung durch den Meßknecht zur trigonometrischen Berechnung einer Baumhöhe ist auch in Fig. 39 angegeben.

8) Instrumente zur Reduction und Ausmessung ausgenommener Flächen. Der Pantograph oder Storchschnabel (Fig. 38) dient zur Reduction von Zeichnungen, besonders Karten und Plänen auf irgendeinen gegebenen Maßstab. Vier Lineale sind durch Gelenke bei A, B, E, F miteinander verbunden, und während das Ganze sich um eine in den Tisch fest eingestochene Spitze drehen kann, beschreibt der bei D befestigte Stift den reducirten Plan mn, sobald man den Fahrstift G auf den Contouren des Originalplans MN herumführt. Die Punkte CD

und G müssen immer in gerader Linie liegen. Die proportionirte und parallele Bewegung der Punkte D und G beruht auf der Ähnlichkeit der Dreiecke CBD und CAG und das Verhältnis der beiden Maßstäbe ist wie CB zu CA. Durch Verschiebung der Stifte C, D und G an ihren Linealen kann das Verhältnis nach Belieben hergestellt werden. Vertauscht man den Jahrstift G und den Zeichenstift D, so kann man von einem Originale m_n eine Vergrößerung MN herstellen. — Will man den Flächeninhalt irgendeines völlig unregelmäßig begrenzten Terrainstücks auf einer Karte unmittelbar auf derselben ausmessen, so bedient man sich eines Planimeters, von denen das Amäler'sche Polarplanimeter (Fig. 39) das beste ist. Hier kann nicht die Theorie des Instruments gegeben, nur seine Anwendung gezeigt werden. Das in der Hälfte H auf Reibung sitzende Lineal A trägt den Fahrstift F, mit welchem man den Umfang Z der zu messenden Fläche umfährt. Das an der verticalen Achse C drehbare Lineal B trägt die Spitze oder den Pol E, welcher in das Papier festgestochen wird. Die in 100 Theile getheilte Rolle D, deren ganze Umdrehungen am Rädchen G und deren Theilumdrehungen am Nonius abgelesen werden, gibt durch ihre Umdrehungszahl den Inhalt der umfakren Fläche an. Je nachdem man das oben mit Maßstab versehene Lineal A bei m mehr oder weniger weit in die Hülse schiebt, kann man den Maßstab für die Angaben des Planimeters ändern.

II. Aesthen und Aufnehmen.

1. Elementare Aufgaben.

Die einfachste Aufgabe ist die des Messens einer geraden, abgesteckten Linie durch Maßstäbe, Messschnuren oder Messketten. Dies muß natürlich mit weit mehr Vorsichtsmäßigkeiten geschehen, wenn es die Standlinie einer Landestriangulation ist, als wenn man nur eine Flur aufnimmt. Die auf Meßtischplatten horizontal aufgelagerten Maßstäbe (Taf. 4, Fig. 7) müssen ganz genau mit der Kante c an d und dann wieder mit e an a stoßen, und stets genau in gerader Linie bleiben. Mit den Abweichungen aus denselben steht der Messungsfehler im quadratischen Verhältnis, mit der Zahl der Stäbe oder Kettenlängen ist er einfach proportional. Bei der Kette ist auch zu beachten, daß sie bei auch noch so starker Anspannung nie eine gerade, sondern stets eine trumme, sogenannte Seil- oder Kettenlinie bildet. Dieser Fehler steht im umgekehrten einfachen Verhältnis zur Länge und im directen quadratischen zur Senkung der Kette. Da man in Karten stets die auf den Horizont AB (Fig. 43) reducirte Entfernung zweier Punkte AG angibt, so bedient man sich zu Messungen auf unebenem Terrain des in Fig. 6 angegebenen Meßapparats in der aus Fig. 43 ersichtlichen Weise, indem man die horizontalen Abstände e, d, c, b, a der Punkte G, F, E, D, C, A ermittelt und addirt. — Um aus einer gegebenen Linie AB (Fig. 41) in einem Punkte C ein Loth zu errichten, befestigt man die Enden der Kette in a und b gleichweit von C, faßt dann die Mitte derselben und spannt sie bis nach c , dann ist cC das Loth. Oder man stellt den Meßtisch über c (Fig. 41) auf, visirt a in der Richtung AB ab, konstruirt auf dem Meßtische das Loth cd und läßt in der Collimationslinie (Absehlinie) cd in D einen Stab einsetzen. Dieselbe Construction läßt sich auch mit Winkelkreuz, Winkeltrammel u. s. w., vorzüglich auch mit Prehler's Meßlinecht ohne oder mit Stativ anführen. — Will man eine gerade Linie zwischen zwei durch einen Wald getrennten Punkten A und B (Fig. 42) abstecken, so zieht

man von C aus auf dem Meßtische mit dem Diopter lineal die Richtungen CA und cB, von D aus die Richtungen dA und dB, und erhält dadurch die Punkte a und b . Trägt man dann auf dem Felde in A an AC den Winkel cab an, so kann man den gefundenen Schenkel in den Wald hinein verlängern und muß schließlich in B eintreffen. — Um gerade Linien zu messen die entweder nicht ganz oder gar nicht zugänglich sind, kann man wie folgt verfahren. Sind die Punkte A und B (Fig. 44) durch ein Hinderniß, etwa Wasser, getrennt, so trägt man den Entfernungen AC, CC proportionale Stäbe aC, bC auf dem Meßtische in den betreffenden Richtungen auf, dann ist AB so viel mal größer wie ab , als ac in AC enthalten ist, wegen Ähnlichkeit der Dreiecke Cab und CAB. — Ist der eine Punkt B (Fig. 45) wol sichtbar aber nicht zugänglich, so stellt man durch Einvisiren von A und C aus wiederum ein solches ähnliches Dreieck Cab her und berechnet AB aus ab . — Sind beide Punkte A und B (Fig. 46) nicht zugänglich, so wird durch ein ähnliches Verfahren wie in Figur 42 ein dem Viereck ABCD ähnliches $abcd$ verzeichnet und AB durch ab gemessen.

2. Horizontale Aufnahmen.

A. Aufnahme einzelner Punkte. Die Bestimmung eines Punktes C (Fig. 47) durch Vornachts-einschneiden geschieht, wenn man von A aus B und C einvisirt und die Richtungen zieht, dann AB im verjüngten Maßstabe als Ab ($= aB$) aufträgt; hierauf b über B und ab in die Richtung AB stellt, die einvisirte Richtung BD zieht und dadurch c erhält. Das Dreieck Abc ist ähnlich ABC. Stellen dagegen die Punkte a und b (Fig. 44) auf dem Meßtische die schon aufgenommenen Punkte A und B vor und begibt man sich, weil in A und B der Meßtisch vielleicht nicht aufgestellt werden kann, nach dem noch aufzunehmenden Punkte C, und konstruirt man von dort aus sein Bild c mit Hülfe der Richtungen aA, bB , so hat man den Punkt durch Rückwärts-einschneiden aufgenommen. Kann man den Punkt C (Fig. 48) nicht von A und B, aber von einem seitlich gelegenen Punkte D aus einvisiren, und bestimmt man dadurch seine Lage c , so hat man ihn durch Seitwärts-einschneiden aufgenommen. Hierher gehört auch die von Snellius schon behandelte, später nach Vothenot benannte, Vothenot'sche Aufgabe, die Lage eines Standpunktes D (Fig. 49) gegen drei bekannte und in a, b und c verzeichnete Punkte A, B und C zu bestimmen. Hat man die richtige Stellung des Meßtisches gefunden, so müssen sich die Visirlinien aA, bB, cC alle in einem Punkte D, und nicht etwa in zwei verschiedenen D und D' schneiden.

B. Aufnahme ganzer Figuren (eigentliches Feldmessen). Man kann dabei folgende verschiedene Methoden anwenden. 1) Die Umfangs- (Perimeter-) Methode. Man messe die Seiten $a = AB$ (Fig. 50), $b = BC$ u. s. w. und die Winkel α, β, γ u. s. w. 2) Die Diagonalmethode. Man mißt alle Seiten AB u. s. w. (Fig. 51) und alle von einer Ecke z. B. A ausgehende Diagonalen, zur Controle vielleicht auch noch einige andere (hier punkirt). Dadurch sind alle Theildreiecke des Polygons bestimmt. 3) Die Triangulirmethode (Fig. 52). Man mißt eine Standlinie AB und bestimmt von dieser aus zunächst die Punkte C und D. Andere Punkte, wie etwa E, findet man, indem man eine in einem schon aufgenommenen Dreieck (etwa ABC) ermittelte Seite (BC) als Standlinie benützt. 4) Die Coordinatenmethode (Fig. 53). Man legt durch das Polygon irgendeine beliebige passende Richtung AE als Coordinatenachse,

bestimmt auf dieser die Lage der Fußpunkte B' , C' , u. s. w. der von den Eden B , C , D , F , G gefällten Lothe, und mißt diese Lothe selbst, so hat man durch die Zerfallung des Polygons in lauter Dreiecke und Paralleltreape ebenfalls wieder alle Stüde zur Berechnung oder Verzeichnung des auf dem Felde gegebenen Polygons. 5) Die Polarmethode (Fig. 54). Man nimmt einen beliebigen Punkt O an und mißt dessen Entfernungen OA , OB u. s. w. von den Eden des Polygons $ABCDEFG$, sowie die Winkel α , β , γ u. s. w., so hat man ebenfalls alle Stüde zur Bestimmung des Polygons. — Aufnahme einer kleinen Flur. Will man eine kleine Flur, wie eine solche etwa in Fig. 56 dargestellt ist, aufnehmen, so hat man zunächst das Terrain zu recognosciren, d. h. die Punkte I , II , III u. s. w. zu suchen und festzusetzen, welche zur Aufstellung der Instrumente u. s. w. am geeignetsten sind. Hierauf mißt man, wenn man nach der Triangulirmethode verfahren will, eine Standlinie und bestimmt von dieser aus die Lage und Entfernung der markirten Punkte, sobald man ein Netz erhält, wie in Fig. 55. Für die Aufnahme weiterer Details, sowie auch für die Festlegung krummliniger Grenzen, verfährt man, wie für die Linie I , X in vergrößertem Maßstabe in Fig. 57 ausgedeutet ist, nach der Coordinatenmethode. — Die eigentliche Darstellung von Aufnahmen durch Zeichnung wird weiter unten besprochen werden. Auf die noch unentschiedene Controverse, ob eine geneigte Fläche mehr Ertrag an Halmfrüchten u. s. w. liefert (Fig. 58) als ihre entsprechende Horizontalprojection, nimmt die Geodäsie keine Rücksicht, sondern bestimmt den Flächeninhalt stets nur nach der Größe der Horizontalprojection.

3. Verticale Messungen.

Durch die Horizontalprojection allein ist die Lage eines Punktes noch nicht genau bestimmt. Er kann sich in derselben verticalen Linie in verschiedenen Höhen befinden. Rechnet man die Höhe vom Meeresspiegel aus, so heißt sie absolute Höhe, relative dagegen, wenn man von irgendeiner andern horizontalen Ebene aus rechnet. Die Ermittlung beider heißt Höhenmessung oder Hypsometrie, und zwar im engeren Sinne, wenn der verticale Abstand der beiden zu vergleichenden Punkte groß ist im Verhältnis zu ihrem horizontalen Abstände. Ist letzterer groß gegen erstern, so nennt man die Operation Niveliren. Das Höhenmessen kann übrigens sein ein trigonometrisches, wenn man die zu messende Höhe als Seite eines Dreiecks betrachtet, von dem eine genügende Anzahl Stüde bestimmbar sind, oder ein barometrisches, wenn man die Höhenberechnung auf die Beobachtung der Barometerstände an beiden Stationen gründet. Hier kann natürlich nur von erstem die Rede sein.

A. Trigonometrisches Höhenmessen. Soll die verticale Erhebung eines Punktes A (Fig. 59 und 60) über einer horizontalen Ebene bestimmt werden, so kommt es darauf an, ob der Fußpunkt seiner Höhe zugänglich ist (Fig. 59) oder nicht (Fig. 60). Im ersten Falle mißt man einen Abstand $DE = BC = b$ und den Winkel α . Dann hat man nach den Lehren der Trigonometrie, $AB = b \tan \alpha$, wozu man, um die ganze Höhe AD zu erhalten, noch die Höhe des Auges $CE = BD$ addirt. Ist wie in Fig. 60 der Fuß B der Höhe AB unzugänglich, so mißt man eine zugängliche, horizontale Standlinie CD und die Winkel α und β . Aus dem so bestimmten Dreieck DCA berechnet man AD oder AC und findet dann die Höhe $AB = AC \sin \alpha$ oder $= AD \sin \beta$.

Correction von Höhenmessungen wegen der

Erdrümmung. Liegen der Standpunkt a (Fig. 61) und der Fußpunkt b der zu bestimmenden Höhe ab so weit voneinander, daß die lothrechten Richtungen aC und bC nach dem Erdmittelpunkte C nicht mehr als parallel betrachtet werden können, so hat man es schon mit einem Problem der höhern Geodäsie zu thun. Wäre AB der Meeresspiegel, so wäre AB auch der wahre Horizont für A ; der scheinbare wäre die Tangente AD . Die Erhöhung DB des Scheinbaren über dem wahren beträgt bei einer Entfernung $AB = 3568$ Meter schon 1 Meter. Sind a und b Punkte der Erdoberfläche, so sei für a der wahre Horizont ab , der scheinbare die Tangente aD . Der gemessene Höhenwinkel c (sein Complement ist die Zenithdistanz z) ist dann zu klein gefunden um den Winkel dab , und dieser ist als Tangentenwinkel halb so groß als der Centralwinkel z bei C . Aus dem so corrigirten Höhenwinkel baE kann man nun die relative Höhe bE über ab berechnen; die absolute Höhe BC über dem Meeresspiegel AB findet man, wenn man die Höhe aA ($= bH$) des Punktes a oder b über dem Meeresspiegel dazu addirt.

Correction wegen der Strahlenbrechung. In Fig. 62 ist C wieder der Erdmittelpunkt, A und B zwei Punkte der Erdoberfläche, Z und Z' deren Zenithrichtungen und D ein senkrecht über B gelegener Punkt. Da die Luftschichten nach unten zu immer dichter werden, so erscheint D in A nicht in der Richtung AD , sondern, da der von D nach A kommende Lichtstrahl in einer krummen Linie geht, in der Richtung der an diese gelegten Tangente AD' , also in D' . Der Winkel $DAD' = c$ ist die Correction wegen der atmosphärischen Strahlenbrechung oder Refraction, und man hat ihn zu der scheinbaren Zenithdistanz z zu addiren oder vom Elevationswinkel HAD' abzuziehen. Dieser ist natürlich zugleich wegen Erdrümmung um den Winkel BAA' ($= \frac{1}{2}z$) zu vermehren. Die Größe der Refraction: findet man, wenn man den Zenithdistanzwinkel φ mit dem empirisch aus vielen Beobachtungen gefundenen Coefficienten 0,0685 (nach Bessel) multiplicirt.

B. Niveliren. Will man den Höhenunterschied (hier auch Gefälle oder Steigung genannt) zweier entfernter Punkte durch Nivellement finden, so kann man folgende beide Methoden anwenden.

1) Das Niveliren aus den Endpunkten. Man stellt in A (Fig. 63) das Nivellementinstrument auf, mißt die Höhe des Auges Aa , stellt in F die Nivellementlatte auf und bestimmt durch Vision den Punkt f ; dann ist das gesuchte Gefälle $= Ff - Aa$. Ist F für das directe Vision zu weit entfernt, so nimmt man mehrere Zwischenstationen B , C , D , E an, und bestimmt deren Gefälle Bb' , Cc' , Dd' , Ee' , Ff' . Das Gesamtgefälle ist dann gleich der Summe der letztern.

2) Das Niveliren aus der Mitte. Man stellt das Instrument der Reihe nach ungefähr in der Mitte a , b und c (Fig. 64) zwischen den Stationen A , B , C , D auf und visirt jedesmal vor und zurück. Hierauf bildet man die Summe aller Vorvisionen $B\beta + C\gamma + D\delta$ und zieht davon die Summe aller Rückvisionen $A\alpha + B\beta' + C\gamma'$ ab. Der Unterschied beider Summen gibt das Gefälle zwischen A und D . Erstreckt sich ein Nivellement weit, so muß natürlich auch die Correction wegen Krümmung der Erde angebracht werden.

4. Triangulation für größere Aufnahmen und Gradmessungen.

Wenn man zu den Zwecken einer Landesvermessung oder Gradmessung ein großes Dreiecknetz, z. B. $ABCD$ u. s. w. (Taf. 5, Fig. 3) entworfen, d. h. die eine weite Fernsicht gewährenden Eckpunkte A , B , C u. s. w.

durch weithin sichtbare feste Signale markirt hat, so ist die direct gemessene Basis in der Regel viel kleiner als die großen Dreiecksseiten, und man ist genöthigt, eine der letztern möglichst scharf durch ein sogenanntes Multiplicationsnetz aus der gemessenen Basis abzuleiten. Man wendet dazu gewöhnlich ein Netz von der in Fig. 1 dargestellten Form an, wo zunächst aus der gemessenen Basis AB durch Winkelmessungen bei A und B die Punkte C und D bestimmt werden, dann von der Grundlinie CD aus die Linie EF, und von dieser wieder aus eine noch größere Seite GH bestimmt werden kann. Man macht die hierbei gebildeten Dreiecke möglichst gleichseitig, weil bei solchen ein Fehler in der Winkelmessung den geringsten Fehler bei Bestimmung der Seiten zur Folge hat. Hat man schon von einem Endpunkte der Basis AB (Fig. 2), z. B. von A aus, eine genügende Fernsicht, so könnte man auch ein Multiplicationsnetz von der in Fig. 2 ersichtlichen Form anwenden. Aus Fig. 3 ist ersichtlich, wie mit Hilfe einer Triangulation (ABCDEF) eine Meridiangradmessung vorgenommen werden kann. Hat man nämlich die Seiten und Winkel dieser Dreiecke ABC, BCD u. s. w. bestimmt und den Winkel, den der durch A gehende Meridian SN mit der Seite AB macht, gemessen, so kennt man die Winkel, die er mit den von ihm geschnittenen Seiten A'B', B'C', C'D', D'E' und EF bildet. Hieraus kann man die Größe der mit dem Meridian parallelen Projectionen AB', B'C', C'D', D'E', EF dieser Seiten berechnen; die Summe derselben ist gleich dem Meridianbogen AG. Hat man noch in A und F Höhenbestimmungen vorgenommen, so kennt man auch das Gradmaß des gemessenen Bogens AG.

III. Darstellung der geodätischen Aufnahmen durch Zeichnung.

A. Topographie.

1) Orthogonale Projection. Die Topographie beschäftigt sich mit Darstellung von Stücken der Erdoberfläche, bei denen die Krümmung derselben nicht in Betracht kommt. Die Horizontalsprojection heißt Situationsplan oder Grundriß; hat man bei Terrairndarstellungen noch einen Aufriß nöthig, so nennt man diesen Profil.

Die Ausführung des Plans beginnt man durch Eintragung der durch Triangulation oder sonstwie ermittelten Punkte. Hieran schließt sich die weitere Eintragung der Details. Die die Grenzen der einzelnen Objecte darstellenden Bleistiftlinien überziehe man sauber mit schwarzer Tusche. Die weitere Ausführung geschieht entweder mit ebensolcher Tusche (schwarze Manier) oder mit Farben. Bei der schwarzen Manier hat man für Darstellung der Objecte gewisse conventionelle Zeichen gewählt. So stellt auf Taf. 5 Fig. 4 u. 5 Gras dar, Fig. 6 Sand, Fig. 7 stehendes Wasser, Fig. 8 Heideland, Fig. 9 nassen Boden mit Graswuchs, Fig. 10 fließende Wasser, Fig. 11 Laubholz, Fig. 12 Nadelholz, Fig. 13 verschiedene Arten von Wegen (a Heerstraße, b Chaussee, c Poststraße, d Eisenbahn, e Landstraße, f Fahrweg, g Knüppeldamm, h Steinpflaster, i Felsweg, k Fußpfad), Fig. 14 Gebäude in kleinerm und größerm Maßstabe, Fig. 15 desgleichen nebst Ackerland, Fig. 16 Landesgrenzen, Fig. 17 Kreisgrenzen, Bezirksgrenzen, Weichbildsgrenzen, Flurgrenzen u. s. w., Fig. 18 Poststationen, Fig. 19 Mühlen, Fig. 20 Berg- und Hüttenwerke.

Bei Ausführung der Pläne mit Farben macht man Gebäude blaßroth, Wiesen blaßgrün, Sommerfelder blaßgelbgrün, Winterfelder blaßrothbraun, Wälder mit Mischung von schwarzer Tusche und rothem Karmin, Wege braun, Gewässer blaßblau u. s. w.

Will man auch die Höhenentwicklung des Terrains darstellen, so kann man verschiedene Hilfsmittel benutzen. Entweder man denkt sich eine Anzahl paralleler gleichweit (etwa je 10 oder 100 Meter) voneinander absteigender Ebenen und zeichnet (auf Grund möglichst zahlreicher Nivellements und Höhenmessungen) die Durchschnittslinien dieser Ebenen mit den Ueberbieten des Terrains. Man nennt sie Niveauulinien oder Niveau-curven. In Fig. 21 sind ab, c, d, e solche, eine Erhebung von je 100 Meter ausdrückende Niveau-curven. Die Darstellung gewinnt jedoch sehr an Deutlichkeit, wenn man zu gleicher Zeit noch senkrechte Terrairndurchschnitte oder Profile entwirft, wie in Fig. 21 das Profil AC'D'E'F'B. CC' entspricht also einem Maßstabe von 100 Metern. Meist stellt man Höhen des Profils in größerm, gewöhnlich 10mal größerm Maßstabe dar, als seine horizontalen Erstreckungen. Ein anderes Hilfsmittel, die Höhenverhältnisse auf einem Plane dem Auge sichtbar zu machen, bieten die überall auf den Niveau-curven senkrecht stehenden Böschungslinien (Fig. 22). Will man nun die Höhe irgend eines auf dem Abhange gelegenen Punktes p durch die Böschungslinie ermitteln, so muß zunächst auf einer derselben (hier der am weitesten rechts gelegenen) ein Höhenmaßstab aufgetragen sein. Zieht man dann durch p die alle Böschungslinien senkrecht durchschneidende Niveau-curve qpr, so gibt die Lage des Punktes r auf dem Maßstabe die gesuchte Höhe.

Die für die Uebersichtlichkeit der Höhenverhältnisse beste, nur wegen der Mäßigkeit der Ausführung etwas schwierigere Methode der Bergbezeichnung und der Terrairneigung überhaupt ist die vom sächsischen Major Lehmann ersonnene Benutzung der Böschungslinien. Sie beruht auf dem Satze, daß die Beleuchtungsstärke einer Fläche dem Cosinus des Steigungswinkels dieser Fläche proportional ist, also für senkrechte Incidenz auf der horizontalen Fläche am stärksten, auf der verticalen gleich Null sein muß. Man könnte daher die verschiedenen Steigungen von 0° bis 90° durch verschiedene helle bis dunkle Färbung der betreffenden Fläche ausdrücken, was man für das Auge dadurch erreicht, daß man die betreffende Fläche mit Böschungslinien bedeckt in Form einer sogenannten Schraffur mit mehr oder weniger weissen Zwischenräumen, je nach dem Grade der Steigung der Fläche. Da aber Steigungen über 45° nur in ganz einzelnen Fällen vorkommen, so hat Lehmann nur die Steigungen von 0° bis 45° durch allmähliche Abkühlung von Weiß in Schwarz ausgedrückt, alle Steigungen von 45° und darüber durch Schwarz. Fig. 23 gibt den Lehmann'schen Böschungsmassstab. Die unterste Spalte gibt die von 5 zu 5° steigende Steigung, die drei obern die dazu gehörige Verteilung von Licht und Spalten. Dabei ist es an sich gleichgültig, ob die schwarzen Striche mehr oder weniger stark sind, wie die der ersten, zweiten oder dritten Spalte, aber es ist gut sie so zu machen, daß sie in größerer Ferne den Eindruck gleichmäßiger Schattirung machen, in der Nähe jedoch das Verhältniß von Weiß und Schwarz genau taxiren lassen. Einige Gradationen mehr als die Lehmann'sche hat die Wäffling'sche oder (preussische) Generalstabsmanier. In Fig. 24 ist durch ein Beispiel gezeigt, wie die verschiedene Böschung des Terrains durch die Strichmanier ersichtlich gemacht wird.

2) Centrale Projection. Zuweilen benutzt man zur topographischen Terrairndarstellung auch diese Projectionsart, und zwar bei der sogenannten Vogelperspective und dem Panorama.

Vogelperspective. Auf einem Plane des so darzustellenden Terrainsstücks (z. B. einer Ortschaft,

Fig. 25) nimmt man einen außerhalb des Ortes BJ gelegenen Punkt A und denkt das Auge in einer senkrechten Erhebung AL über diesem Punkte. Man wählt den Punkt A und die Höhe AL am besten so, daß die Richtungslinien LB und LJ (nach dem vordersten und hintersten Punkte des hauptsächlich darzustellenden Terrains) respective Winkel von ungefähr 45° und $22\frac{1}{2}^\circ$ mit dem Horizonte einschließen. Dann denkt man sich in B senkrecht auf AB die Zeichnungsfläche errichtet, wie verkleinert bei A' b' durch h' m' angedeutet ist (m' ist der Horizont), und entwirft dann auf dieser Bildfläche nach den Regeln der Perspective die in Fig. 26 ausgeführte sogenannte Vogelperspective. Die arabischen Ziffern und kleinen Buchstaben entsprechen den römischen Ziffern und großen Buchstaben von Fig. 25.

Panorama. Für dieselbe Ortschaft ist in Fig. 27—29 die Construction des Panorama durchgeführt. Man nimmt innerhalb des panoramatisch darzustellenden Terrains einen passenden Punkt A (Fig. 27) an, und denkt sich auf BBBB einen Cylinder als Bildfläche errichtet. In Fig. 28 sind Bb, Bh die Durchschnitte der Cylinderwand, und Fig. 29 stellt die ganze, zu einer Ebene ausgebreitete Cylinderoberfläche Bbhh dar. Der Ort des Auges ist in passender Höhe Aa (Fig. 28) über A; hh (Fig. 28 und 29) gibt dann den Horizont. Die concentrischen Kreise mit den Radien Al, All u. s. w. die man auf dem Plane (Fig. 27) zieht, projectiren sich auf der Cylinderwand (Fig. 28) als Kreise in der Höhe 1, 2 u. s. w. und erscheinen auf der aufgewickelten Fläche als mit dem Horizont parallele Gerade 1, 2 u. s. w. Die Radien A 0° , A 90° und alle dazwischenliegenden erscheinen in Fig. 29 als verticale Parallelen. Innerhalb des so in letzterer Figur erhaltenen (dem in Fig. 27 befindlichen entsprechenden) Netzes läßt sich leicht die Construction der Details vollenden.

B. Chorographie.

Die Aufgabe der Chorographie, auch Mappirungspunkt oder Land- (resp. Himmels-, Mond-) u. s. w.) Kartenconstruction ist es, Bilder einer ganzen Kugeloberfläche, oder doch von so großen Theilen derselben, daß deren Krümmung nicht vernachlässigt werden darf, so auf einer Ebene zu entwerfen, daß diese Bilder dem Originale so ähnlich als möglich sind, oder doch wenigstens dem Zwecke genügen, den man mit der Darstellung erreichen will. Völlig entsprechend kann das Bild dem Originale hier nie sein, da man eine Kugeloberfläche nicht zu einer Ebene ausbreiten kann. Man bedient sich hierbei irgendeiner Projectionsmethode, und es läßt sich die Aufgabe im allgemeinen wie folgt auffassen. Durch den Mittelpunkt einer Kugel (Zaf. 5, Fig. 30) geht ein bis A und B beliebig verlängerter Durchmesser ZE. In A ist der Ort des Auges, Z der Punkt der Kugeloberfläche, der in der Mitte der Karte projectirt werden soll, P der Pol und M ein beliebiger Punkt der Kugeloberfläche, dessen Projection m auf der in B auf B senkrechten Bildebene in n Bp constructirt werden soll. Ist dann p Bn die Projection des ersten Meridians PZE, und betrachtet man diese als Abscissenachse, so daß Bn = x und nm = y als Coordinaten von m betrachtet werden, so kann man diese ausdrücken durch die Entfernung AC (= a) des Auges A vom Kugelmittelpunkt C, durch die Entfernung AB = b des Auges von der Projectionsebene, ferner durch Winkel ZCP = α , durch Winkel ZPM = λ , d. i. die geographische Länge des Punktes M, und durch MCP = $90^\circ - \varphi$, wenn φ die Breite von M bezeichnet. Es ist dann:

$$x = \frac{b (\cos \varphi \cos \lambda \cos \alpha - \sin \alpha \sin \varphi)}{a + \sin \alpha \cos \varphi \cos \lambda + \cos \alpha \sin \varphi}$$

$$\text{und } y = \frac{b \cos \varphi \cos \lambda}{a + \sin \alpha \cos \varphi \cos \lambda + \cos \alpha \sin \varphi}.$$

Denkt man sich die Entfernung AC (Fig. 30) des Auges von der Kugel unendlich groß, so werden die projectirenden Strahlen Ap, AB u. s. w. parallel und man erhält die orthographische Projection. Es ist dann gleichgültig, in welcher Entfernung man die Bildfläche p Bnm rückt. In obigen allgemeinen Formeln ist dann $a = b = \infty$ zu setzen. Hieraus ergeben sich dann die Constructionen der Meridiane und Parallelkreise in den Fig. 31, 32 u. 33. In Fig. 31 ist als der Ort, über dem das Auge senkrecht gedacht wird, d. h. als der Mittelpunkt der Karte, Leipzig angenommen. In Fig. 32 ist das Auge senkrecht über dem Pole (orthographische Polarprojection), in Fig. 33 senkrecht über einem Punkte des Aequators (orthographische Aequatorialprojection).

Denkt man das Auge A (Fig. 30) in die Oberfläche der Kugel selbst, so muß, wenn r den Radius der Kugel bezeichnet, in den für x und y gegebenen Formeln $a = r$ gesetzt werden, und man erhält dann die sogenannte stereographische Projection. Die Bildebene legt man gewöhnlich durch den Mittelpunkt der Kugel, und hat dann in den Formeln zur Berechnung der Lage der Meridiane und Parallelkreise auch $b = r$ zu setzen. Fig. 34 stellt als Beispiel die stereographische Projection der Erdoberfläche dar für den Horizont eines Ortes von 30° nördl. Breite, und Fig. 35 gibt die gewöhnlich zur Darstellung der Hemisphäre angewendete stereographische Aequatorialprojection.

Verlegt man den Ort des Auges in den Mittelpunkt der Kugel selbst und legt die Bildebene als Tangentialebene an die Kugel, so wird in den Formeln für Construction der Meridiane und Parallelkreise $a = 0$ und $b = r$ zu setzen sein und man erhält die Winkelpunktsprojection. Fig. 36 gibt die polare und Fig. 37 eine äquatorale Winkelpunktsprojection.

Außer diesen drei eigentlichen, streng perspectivischen Projectionen gibt es noch eine Anzahl Kartenprojectionen zu besonderen Zwecken. Da nämlich die besprochenen perspectivischen Projectionen der Natur der Sache nach das wahre Verhältniß der einzelnen Theile des Bildes, so wie es auf der Kugeloberfläche besteht, nicht wiedergeben können, so hat man versucht, durch andere Constructionen dieser Forderung in dieser oder jener Hinsicht zu genügen. Ganz kleine Stücke der Kugeloberfläche kann man sehr ähnlich auf einer Ebene darstellen, wenn man die Meridiane und Parallelkreise als ein quadratisches Netz von Geraden verzeichnet, wobei dann alle Breiten- und Längengrade einander gleich sind und auch, wie dies auf der Kugel gleichfalls stattfindet, rechtwinklig durchschneiden. Für größere Länderstrecken wird das Kartennetz unrichtig, weil auf der Kugel die Längengrade nach den Polen zu abnehmen, und zwar, wenn man einen Aequatorgrad gleich g setzt, für die geographische Breite φ stets $= g \cos \varphi$ sind. Man könnte dann ein Netz mit convergirenden geraden Meridianen anwenden, wie in Fig. 38. Man findet den Convergenzpunkt P (Fig. 39) derselben auf folgende Weise. Sind Aa und Bb Parallelkreise an den Rändern der Karte, ferner Cc und Dd irgend zwei feste Parallelkreise der Breite, φ und φ' entsprechend, und ist dann $Cc = g \cos \varphi = h$ und $Dd = g \cos \varphi' = h'$, so ist die Entfernung

$Pd = gh \frac{(\varphi' - \varphi)}{h - h'}$. Die Größe Xx irgendeines Längen-

grades ist $= h' \frac{(\varphi - \varphi') - h(\varphi'' - \varphi')}{\varphi' - \varphi''}$, wenn φ'' seine geographische Breite ist.

Nach etwas ähnlicher wird das Bild der Karte für größere Landstrecken, wenn man dem Netze zu den convergirenden geraden Meridianen auch noch kreisförmige Parallelen gibt, wie in den Constructionen von Delisle und von Sener und Vaugondy (Fig. 40 u. 41). Man trage nach der Delisle'schen Construction auf dem mittlern Meridian AB (Fig. 40) die Breitengrade nach einem beliebigen passenden Maßstabe auf. Sind C und D zwei Punkte von der geographischen Breite φ und φ' , so ziehe man durch sie von einem gemeinschaftlichen Mittelpunkte P die Parallelkreise Ccc' und Dd' und trage auf ihnen die Längengrade Cc $= g \cdot \cos \varphi = h$ und Dd $= g \cdot \cos \varphi' = h'$ auf. Den Punkt P findet man dadurch, daß man

$$CP = g \frac{h(\varphi' - \varphi)}{h - h'}$$
 berechnet.

Die Construction von Sener und Vaugondy ergibt sich auf folgende Weise. Sind auf einer Kugel vom Mittelpunkte O a'a' und b'b' die beiden äußersten Parallelkreise, die auf der Karte dargestellt werden sollen, so legt man an den mittlern c'c' Tangenten, deren Durchschnitt P der gesuchte Mittelpunkt ist. Die Punkte (p'β), durch welche von ihm aus die Parallelkreise gezogen werden sollen, findet man, wenn man Secanten durch h, h' u. s. w. legt. Liegt der Punkt P (Fig. 40) für die Construction der Karte zu weit entfernt, so bestimmt man durch Rechnung zwei Punkte M und M' eines Parallelkreises (c'c'), und ebenso zwei solche von derselben Länge auf einem andern, und erhält dann die Meridiane, indem man die Punkte gleicher Länge auf beiden Parallelkreisen verbindet. Hieran schließen sich noch die Karten nach Bonne's Projection mit trummen Meridianen und kreisförmigen Parallelen (Fig. 42), die von Flamsteed mit trummen Meridianen und geraden Parallelen (Fig. 43), sowie Murdoch's Kegelpjection (Fig. 44). Bonne's Projection besitzt den großen Vorzug, die Länder ihrem Flächeninhalt auf der Kugel gemäß darzustellen, und wird oft zur Entwerfung der Karten größerer Länder oder von Erdtheilen gebraucht. Die Entfernung des Mittelpunkts P der Parallelkreise von dem Mittelpunkte der Karte erhält man, wenn φ und φ' die Breiten der beiden äußersten Parallelkreise der Karte sind, und a der im Kartenmaßstabe ausgebrückte Halbmesser der

Erde ist, gleich $a \cotg \frac{\varphi + \varphi'}{2}$. Auf den Parallel-

kreisen trägt man dann die zu jeder Breite φ gehörigen Größen der Längengrade ($g \cos \varphi$) auf und erhält durch deren Verbindung die trummen Meridiane.

Die von Flamsteed zu seinen Himmelskarten gewählte Entwerfungsart (Fig. 43) ist der vorigen ähnlich, nur sind die in gleichem Abstände $Aa = ab = bc = \dots$ durch den mittlern Meridian gehenden Parallelkreise aa' , bb' gerade Linien. Liegt A im Aequator, und sind für irgendeinen Punkt p die Coordinaten Ap $= x$ und pm $= y$, so ist $y = g \lambda \cos \frac{x}{g}$,

die Gleichung eines Meridians vom Längengrade λ . Durch Eintragung der berechneten Werthe von y erhält man die Meridiane a'b'c'..., a'h'c'' u. s. w.

Bei Murdoch's Kegelpjection (Fig. 44) berührt die den Kreis erzeugende Linie nicht wie in Fig. 41,

sondern durchschneidet sie in zwei Punkten m und n, ist AO der Aequator, P der Pol, AP ein Meridian. Der nördlichste und südlichste Parallel der Karte mögen durch die den Breiten φ und φ' entsprechenden Punkte B und C gehen. Liegt M in der Mitte von BC, so ziehe man senkrecht auf OM die Linie pDβ, und zwar so, daß Dβ $= D\gamma$ = Bogen MB. Aus Cy und bβ kann man δD berechnen und so den Punkt D finden, durch welchen das Loth pβ zu ziehen ist.

In dieser Projection sind allerdings die Flächen der ganzen Zone der Karte und der Kugel einander gleich, aber nicht die einzelnen entsprechenden Theile derselben. Will man Karten entwerfen, auf denen auch die einzelnen Theile der dargestellten Zone denen der Kugel nahe gleich sind, so trägt man auf dem mittlern Meridian AP (Fig. 45) der Karte die Breitengrade zu gleichen Theilen auf, die Längengrade aber auf dem Aequator BAC nach dem Verhältniß der Sinus der Länge. Die Gleichung der Meridiane und Parallelkreise für irgendeinen Punkt M und den Coordinatenanfang A ist $y^2(1 + x^2 \sin^2 \lambda) = \cos^2 \lambda$ und $x^2(\cos^2 \varphi - y^2) = \sin^2 \varphi$.

Karten, in welchen alle durch den Mittelpunkt gehenden geraden Linien größte Kreise der Kugel darstellen, haben den Vortheil, daß in ihnen die Abstände aller Orte vom Mittelpunkt der Karte mit demselben geradlinigen Maßstabe gemessen werden können. Auch ihre Verzeichnung ist sehr leicht. Sei C (Fig. 46) der Mittelpunkt der kreisförmig und am Rande in Grade getheilt gedachten Karte, AB der Aequator, P und Q seine Pole. Sei ferner CMm ein drehbares Lineal mit irgendwie getheiltem Maßstabe (der Radius der Karte), M die Projection eines auf der Kugel gedachten Punktes M' überhaupt, CDM die Projection des Kugeldreiecks C'D'M', worin C'D' die Länge λ und D'M' die Breite φ ist, so läßt sich eine Tabelle berechnen, welche Winkelstellung Acm man dem Lineale zu geben und welche Lage der Punkt M auf dem Maßstabe Cm haben muß für jeden gegebenen Werth von λ und φ . Man kann nun den Radius theilen entweder in gleiche Theile (90 Grade), oder nach den Sinus der Distanzen (orthographische Aequatorealprojection), oder nach den Tangenten der Distanzen (Mittelpunkte, Aequatorealprojection), oder nach den Tangenten der halben Distanzen (stereographische Aequatorealprojection), oder auch nach den Sinus der halben Distanzen. In dieser Projection sind wie in den meisten bisher betrachteten die Winkel der Meridiane an den Polen P und Q, den Winkeln derselben auf der Kugel gleich. Man kann aber auch diese Winkel der Karte in irgendeinem Verhältniß kleiner, z. B. nur halb so groß als auf der Kugel nehmen. In diesem letztern Falle (Fig. 47) lassen sich beide Hemisphären der Erde zugleich innerhalb der Fläche eines einzigen Kreises darstellen.

Karten, welche der Seemann benutzt, müssen, um praktisch zu sein, gewissen Bedingungen entsprechen. Da der Schiffer nämlich oft längere Zeit in derselben Richtung segeln muß, durchschneidet er eine Anzahl von Meridianen unter demselben Winkel. Dieser Lauf kann aber auf den gewöhnlichen Karten nicht als gerade Linie dargestellt werden, sondern bildet eine eigenthümliche, trumme, dem Pol sich spiralförmig nähernde Linie, die sogenannte Logodrome. In Fig. 48 sind drei solche, von A ausgehende Logodromen dargestellt, nämlich ABBP nach Nord-Nordost, ACCP nach Nordost und ADDP nach Ost-Nordost. P bezeichnet den Pol. Als gerade Linien, wie sie der Schiffer beim Verzeichnen seines Laufes braucht, lassen sich diese Logodromen nur darstellen, wenn man alle Meridiane als parallele Grade zeichnet. Um aber

zugleich in allen Theilen der Karten das wahre Verhältniß der Längen- und Breitengrade zueinander zu erhalten, muß man, da bei parallelen Meridianen die Längengrade nach den Polen zu nicht kleiner werden, dafür die Breitengrade entsprechend vergrößern. Man nennt diese Darstellungsweise Mercatorprojection, nach Gerhard Mercator, der gegen die Mitte des 16. Jahrhunderts zuerst diese Karten construirte. Für den Kugelradius gleich 1 ist der Abstand y irgend-

eines Paralleltreises von der geographischen Breite φ durch die Formel $y = 2,3025851 \cdot \log \tan \frac{90 + \varphi}{2}$ gegeben. In Fig. 49 ist eine solche Karte entworfen.

Die Abstände der Meridiane a, a, a, a u. s. w. sind also gleich, während die Werthe von y , d. i. ab, ab, ab u. s. w. in der durch die Formel gegebenen Weise wachsen. Will der Schiffer die Richtung, oder wie er sagt den Kompaßstrich seines Weges AB finden, so zieht er durch die Mitte O der Karte eine gerade, mit AB parallele Linie OP , so ist der Winkel $aOP = \alpha$ (hier $= 63\frac{1}{2}^\circ$) der gesuchte Kompaßstrich. Um auch die Länge des Curves AB zu finden, nimmt er ein in der Mitte des Curves gelegenes Stück des Meridians, etwa $b''b''$ (5° also 5×60 Secunden lang) in den Zirkel und sieht, wie oft es auf dem Curve AB sich auftragen läßt. Ein Curve in der Richtung AC wird durch das Kartennetz selbst gemessen.

Physik.

Bearbeitet

von

Dr. Johann Müller,

großherzoglich badischem Hofrath, Professor der Physik an der Universität
zu Freiburg im Breisgau.

I n h a l t.

	Seite		Seite
Einleitung	3	D. Wärmelehre. (Tafel 6, Figur 11—59; Tafel 7, Figur 1—32.)	
A. Mechanik. (Tafel 1 und 2.)		I. Ausdehnung	27
I. Statik fester Körper	4	II. Schmelzen und Erstarren.	28
II. Hydrostatik.	7	III. Dampfbildung	28
III. Aerostatik	8	IV. Specifische Wärme	31
IV. Dynamik	9	V. Wärmestrahlung	31
B. Akustik (Tafel 3)	12	VI. Wärmeleitung	32
C. Optik. (Tafel 4, Tafel 5 und Figur 1—10 auf Tafel 6.)		VII. Wärmeerzeugung durch mechanische Mittel	33
I. Fortpflanzung des Lichts und Photometrie	16	E. Magnetismus (Tafel 8)	34
II. Reflexion des Lichts (Katoptrik)	16	F. Electricität. (Tafel 9, Tafel 10 und Figur 33—45 auf Tafel 7.)	
III. Brechung des Lichts (Dioptrik)	18	I. Reibungselectricität	38
IV. Farbentheorie	20	II. Galvanismus	42
V. Die Photographie	22	III. Wirkungen des Stroms auf die durch- strömten Leiter	43
VI. Das Auge und die optischen Instrumente	23	IV. Elektromagnetismus und Elektrodynamik	44
VII. Interferenz der Lichtstrahlen.	24	V Thermo-electrische Ströme	46
VIII. Polarisation und doppelte Brechung . .	25	VI. Inductionsströme	46
IX. Chromatische Polarisation.	26	VII. Diamagnetismus	48

Einleitung.

Die Physik ist derjenige Theil der Naturlehre, welcher es mit den Gesetzen solcher Erscheinungen der leblosen Natur zu thun hat, die nicht auf einer Veränderung der Bestandtheile der Körper beruhen; denn damit beschäftigt sich die Chemie. Es liegt übrigens in der Natur der Sache, daß sich die Grenze zwischen beiden Disciplinen nicht immer scharf ziehen läßt und daß manche Erscheinung in beide Gebiete hineingreift.

Die Physik zerfällt in folgende Hauptabtheilungen:

- 1) Die Mechanik oder die Lehre vom Gleichgewicht und der Bewegung (Statik und Dynamik);
- 2) die Akustik oder die Lehre vom Schall;
- 3) die Optik oder die Lehre vom Licht;
- 4) die Lehre von der Wärme;
- 5) die Lehre vom Magnetismus;
- 6) die Lehre von der Electricität.

Bei dem gegenwärtigen Standpunkte der Wissenschaften fallen eigentlich die beiden letzten Abtheilungen in eine einzige zusammen.

Die physikalischen Kenntnisse der Alten waren noch sehr gering. Alles was sie von den Gesetzen des Gleichgewichts fester Körper wußten, beschränkt sich auf die Lehre vom Hebel und vom Schwerpunkt, welche Archimedes bereits entwickelt hatte. Auch die Hydrostatik verdankt diesem genialen Mathematiker ihre Begründung, da er bereits das Gesetz vom Gewichtverlust der in Flüssigkeiten untergetauchten festen Körper bewiesen hatte. Die Aerostatik oder die Lehre vom Gleichgewicht der Gase ist neuern Datums und als ihre Begründer müssen Torricelli, der Erfinder des Barometers, und Otto von Guericke, der Erfinder der Luftpumpe, genannt werden.

Durch die Entdeckung des alle Bewegungserscheinungen beherrschenden Gesetzes der Trägheit ist Galiläi der Gründer der neuern Mechanik geworden.

Ueber die Entdeckung und Verbreitung des Schalles hatten die alten Griechen nur sehr mangelhafte Vorstellungen; erst Newton gab eine richtige Definition der Schallwellen und ihrer Verbreitung. Den Unterschied der Tonhöhe hatten die alten Griechen zwar musikalisch richtig erkannt, sie waren aber noch nicht im Stande, ihn physikalisch zu deuten. Allerdings hatte Pythagoras die musikalischen Intervalle durch Zahlen ausgedrückt, welche er durch Versuche mit gespannten Saiten ermittelt hatte; die physikalische Bedeutung dieser Zahlen ist aber erst im 17. Jahrhundert durch Werneke nachgewiesen worden, welcher zeigte, daß die Tonhöhe durch die Schwingungsdauer des tönenden Körpers bedingt ist.

Nachdem nun so der Grund der Tonlehre gelegt war, wurden der Reihe nach die Gesetze der Vibrationen tönender Luftsäulen, tönender Saiten, Stäbe und Platten erforscht und endlich die Akustik dadurch zu einem gewissen Abschluß gebracht, daß namentlich durch die Untersuchungen von Helmholtz in dem Mitlingen von Obertönen, welche den Grundton in verschiedener Anzahl und Stärke begleiten, der Grund

der Klangfarbe verschiedener musikalischer Instrumente nachgewiesen wurde.

Die optischen Kenntnisse der Alten beschränkten sich auf die Wahrnehmung der geradlinigen Fortpflanzung der Lichtstrahlen und das Reflexionsgesetz. Von der Brechung der Lichtstrahlen bei dem Uebergange aus einem Medium in ein anderes hatten sie zwar Kenntniß, wie denn z. B. Seneca die Erscheinung kennt, daß ein in Wasser eingetauchtes Ruder gebrochen erscheint, ohne jedoch eine richtige Vorstellung von dem Vorgange zu haben. Erst Alhazen, ein um das Jahr 1100 lebender arabischer Mathematiker, erkannte, daß ein Lichtstrahl beim Uebergange aus Luft in ein dichteres Medium dem Einfallslothe genähert wird. Das Refraktionsgesetz selbst wurde erst um das Jahr 1621 von Snellius entdeckt und von Cartesius publicirt.

Die Farben des Regenbogens erklärt Aristoteles aus dem durch ein dunstiges Medium gesehenen Lichte der Sonne, und diese Anschauung blieb das ganze Mittelalter hindurch die herrschende. Cartesius erkannte, daß durch ein Prisma eine ähnliche Reihe von Farben entstehe, wie man sie beim Regenbogen beobachtet; aber erst Newton stellte die noch heute von allen Physikern als richtig angenommene Lehre auf, daß das weiße Licht aus verschiedenfarbigen, ungleich brechbaren Strahlen besteht.

Lange Zeit standen sich zwei Hypothesen über das Wesen des Lichts einander gegenüber, die Emanationstheorie, nach welcher das Licht eine Materie eigener Art ist, welche von den leuchtenden Körpern nach allen Seiten hin ausgeendet wird, und die Undulationstheorie oder Vibrationstheorie, welche die Fortpflanzung des Lichts einer Wellenbewegung des Aethers zuschreibt. Newton suchte in seiner Optik die Gesetze der Lichterscheinungen auf die Emanationstheorie zurückzuführen, während sein Zeitgenosse Huyghens zuerst die Vibrationstheorie eine wissenschaftliche Begründung gab. Lange Zeit waren die Ansichten der Physiker zwischen diesen beiden Hypothesen getheilt und selbst Euler's Bemühungen für die Vibrationstheorie waren nicht im Stande, derselben einen entscheidenden Sieg zu verschaffen. Dies gelang erst den Bestrebungen Young's und Fresnel's im ersten Viertel unser's Jahrhunderts, nachdem die im Jahre 1811 durch Malus gemachte Entdeckung der Polarisation des Lichts zur Bestimmung der Richtung geführt hatte, in welcher die einen Lichtstrahl fortplanzenden Vibrationen des Aethers stattfinden.

Die Entdeckung der Fraunhofer'schen Linien im Jahre 1815 kam zunächst nur der Verbesserung astronomischer Fernrohre zugute; durch die von Wunjen und Kirchhoff ausgearbeitete Spectralanalyse führten sie aber zur nähern Kenntniß der physikalischen Beschaffenheit der Sonne und der Fixsterne.

Der Gebrauch der Sammellinsen als Vergrößerungsgläser war den Alten bekannt, denn man hat solche in Pompeji gefunden. Das erste zusammenge setzte Mikroskop wurde 1625 von Jontana construiert. Die Entdeckung des ersten (holländischen) Fernrohrs wurde zufällig durch einen Brillenmacher in Middel-

burg ums Jahr 1608 gemacht. Galilei konstruirte solche Fernrohre im Jahre 1609 und entdeckte mit ihrer Hilfe die Berge des Mondes, die Trabanten des Jupiter und die Pfaffen der Venus. Die Construction des astronomischen Fernrohrs wurde 1620 von Kepler angegeben.

Eine Erforschung der Gesetze der Wärmelehre wurde erst möglich, nachdem das Thermometer bekannt geworden war, als dessen Erfinder gewöhnlich Cornelius Drebbel (1630) genannt wird. Das von diesem benutzte Thermometer war ein Luftthermometer, wie solche vor ihm schon Galilei konstruirt und italienische Mergle sie angewandt hatten. Die Flüssigkeitsthermometer (Weingeist oder Quecksilber) wurden zuerst in den Schriften der Accademia del cimento in Florenz ohne Nennung des Erfinders beschrieben.

Die ersten genauern Versuche über die Ausdehnung fester, flüssiger und luftförmiger Körper wurden gegen Ende des vorigen Jahrhunderts angestellt.

Dass beim Schmelzen der Körper Wärme gebunden wird, haben nahezu gleichzeitig in der Mitte des 18. Jahrhunderts Deluc zu Genf und Black zu Edinburgh entdeckt. Eine richtige Erkenntnis von dem Wesen der Dampfbildung wurde erst durch Dalton zu Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts begründet, obgleich man die Spannkraft der Dämpfe schon vorher technisch zu verwenden wußte.

Die ersten eingehendern Versuche über Wärmestrahlung hatte Leslie angestellt, aber erst Melloni's Bemühungen gelang es, die vollständige Identität zwischen Licht- und Wärmestrahlen nachzuweisen, wodurch dann auch die Ansicht, daß die Wärme überhaupt einer lebhaften Oscillationsbewegung der kleinsten Körpertheilchen (mechanische Wärmetheorie) zuzuschreiben sei, eine wesentliche Unterstützung fand. Diese Ansicht, welche Rumford zu Ende des vorigen und Davy zu Anfang dieses Jahrhunderts mit Entschiedenheit vertreten hatten, wurde mit Erfolg wieder aufgenommen, nachdem Mayer im Jahre 1842 den Begriff des mechanischen Äquivalents der Wärme festgestellt, und Joule sowohl wie Hirn dasselbe experimentell bestimmt hatten, und führte zu einem unzweifelhaften Sieg der mechanischen Wärmetheorie, um deren Ausbildung sich namentlich Clausius die größten Verdienste erworben hat.

Von den Eigenschaften des Magneteisens kannten die Alten nur die Kraft desselben, Eisen anzuziehen. Die Chinesen sollen schon die richtende Kraft des Erdmagnetismus gekannt haben. Wann dieselbe in Europa bekannt wurde und wann der Kompaß in Gebrauch kam, läßt sich nicht mit Sicherheit ermitteln. Im 15. Jahrhundert war die Abweichung der Magnetnadel von der reinen Nordrichtung noch unbekannt, und Columbus kam auf seiner ersten Entdeckungsfahrt 1492 in Verlegenheit, als er die Veränderung dieser Abweichung beobachtete. Die Inclination der Magnetnadel wurde 1576 von Normann entdeckt. Die Gesetze der magnetischen Polarität wurden zuerst von Gilbert im Jahre 1600 entwickelt.

Von der Elektricität war den Alten gleichfalls nur das Vermögen geriebener Harze, leichte Körper anzuziehen, bekannt. Guericke, der erste, welcher elektrische Funken wahrnahm, beobachtete auch zuerst die elektrische Abstoßung. Grey entdeckte 1729 den Unterschied zwischen Leitern der Elektricität und Isolatoren; Dufay constatirte 1733 den Unterschied zwischen positiver und negativer Elektricität. Die Wirkungen der Leydener Flasche wurden fast gleichzeitig von Kleist in Pommern und von Cuväus in Leyden entdeckt.

Franklin gelang es 1752 mittels eines Drachens die

Elektricität der Gewitterwolken nachzuweisen: eine Entdeckung, die ihn alsbald zur Erfindung der Blitzableiter führte.

Um das Jahr 1790 war die Elektricitätslehre stationär geworden, als sie durch die Entdeckung Galvani's einen neuen Aufschwung erhielt, indem dieselbe alsbald zur Auffindung einer neuen Elektricitätsquelle und zur Construction der Volta'schen Säule führte. Hatte man bis dahin nur die elektrischen Spannungsercheinungen studirt, so lernte man nun auch die elektrischen Stromeswirkungen kennen; und zwar fällt die Entdeckung der chemischen Wirkungen des Stroms durch Nicholson und Carlisle in das Jahr 1801. Im Jahre 1820 entdeckte dann Oersted die Ablenkung der Magnetnadel durch den Strom, woran sich alsbald der Elektromagnetismus mit seinen so wichtigen wissenschaftlichen und praktischen Ergebnissen aufschloß.

Die thermoelektrischen Ströme wurden 1821 in Seebeck entdeckt.

Im Jahre 1831 entdeckte Faraday die Induction elektrischer Ströme durch Magnetismus, 1838 die Induction derselben durch elektrische Ströme und 1845 endlich entdeckte er den Diamagnetismus.

A. Mechanik.

(Tafel 1 und 2.)

I. Statik fester Körper.

In der Naturlehre unterscheidet man zweierlei Arten von Kräften, 1) solche, welche in die Ferne wirken, wie die Schwere, die elektrische und magnetische Anziehung und Abstoßung u. s. w., und 2) solche, welche nur in nächster Nähe auf die benachbarten Atome wirken und welche den Zusammenhang der Körpertheilchen, Cohäsion, Adhäsion, chemische Verwandtschaft u. s. w. bedingen.

Wenn eine Kraft der ersten Art, die wir als bewegende oder beschleunigende Kräfte bezeichnen wollen, auf einen Körper wirkt, so übt sie ein Schweben aus, denselben in Bewegung zu setzen. Wenn mehrere Kräfte auf einen Körper einwirkend sich gegenseitig aufheben, so find sie im Gleichgewicht.

Zwei Kräfte find im Gleichgewicht, wenn sie einen Körper gleich stark nach entgegengesetzter Richtung bewegen streben.

Wenn zwei Kräfte nach verschiedenen Richtungen auf einen Körper wirken, so theilen sie ihm eine Bewegung mit, welche in folgender Weise bestimmt ist: auf einem materiellen Punkt in a, Fig. 1, wirken zwei Kräfte, die eine in der Richtung a x ihn in der Zeiteinheit von a nach b führen würde, während er unter dem alleinigen Einfluß der zweiten, in der Richtung a y wirkenden Kraft in der Zeiteinheit von a nach c geführt werden würde, so beschreibet er unter dem gleichzeitigen Einfluß beider Kräfte in der Zeiteinheit den Weg ad, welcher die Diagonale des Parallelogramms a b c d ist.

Die beiden Seitenkräfte, welche für sich allein auf einen Körper in der Zeiteinheit von a nach b und von a nach c zu führen streben, wirken also zusammen ebenso wie eine einzige Kraft, die Resultirende, welche den Körper in der gleichen Zeit von a nach d führen würde.

Wenn z. B. der Wind für sich allein ein Schiff in Stunde quer über den Fluß von A Fig. 2 nach B treiben würde, während die Strömung des Flusses allein in der gleichen Zeit von A nach C treibt, so wird das Schiff unter der gleichzeitigen Wirkung beider Kräfte in $\frac{1}{2}$ Stunde durch die Diagonale AD des Parallelogramms ACDB geführt.

Zwei Kräften, welche in verschiedener Richtung auf einen materiellen Punkt einwirken, kann man dadurch das Gleichgewicht halten, daß man an demselben Punkt noch eine dritte Kraft anbringt, welche der Resultierenden der beiden andern gleich und entgegengekehrt ist.

Zur experimentellen Prüfung des Satzes vom Parallelogramm der Kräfte dient der Apparat Fig. 3.

Auf die Lehre vom Parallelogramm der Kräfte lassen sich nun die Gesetze des Gleichgewichts an allen sogenannten mechanischen Potenzen; Hebel, schiefe Ebene, Schraube, Flaschenzug u. s. w. ableiten. Ohne auf diese Ableitung weiter einzugehen, wollen wir die wichtigsten dieser Gesetze kurz betrachten.

Eine gerade unbiegsame Linie, welche um einen festen Punkt drehbar ist, wird ein Hebel genannt. Wenn eine Kraft in irgendeinem Punkte des Hebels schrägwinkelig zu seiner Richtung angreift, so wird der Abstand des Angriffspunktes vom festen Drehpunkt (Hebelarm) der Hebelarm der Kraft genannt. Zwei Kräfte, welche den Hebel nach entgegengesetzten Seiten zu drehen streben, halten sich das Gleichgewicht, wenn die entsprechenden Hebelarme umgekehrt proportional sind.

Bezeichnet man als statisches Moment einer Kraft als Product, welches man erhält, wenn man die Kraft mit ihrem Hebelarm multiplicirt, so läßt sich das eben ausgesprochene Gesetz auch so ausdrücken: Zwei Kräfte elche den Hebel nach entgegengesetzten Seiten zu drehen streben, halten sich das Gleichgewicht, wenn die statischen Momente gleich sind.

Fig. 4 stellt z. B. einen Hebel dar, dessen Drehpunkt m ist und an welchem die beiden Gewichte 10 und nach entgegengesetzten Seiten zu drehen streben. Die Kraft 10 greift an den Hebelarm 3 an, ihr statisches Moment ist also 30. Ebenso groß ist das statische Moment der am Hebelarm 6 angreifenden Kraft 6; also halten sich beide Kräfte das Gleichgewicht.

Wenn auf jeder Seite des Drehpunktes mehrere Kräfte angreifen, so halten sie sich das Gleichgewicht, wenn die Summe der statischen Momente auf beiden Seiten gleich ist. So ist z. B. für den in Fig. 5 dargestellten Fall die Summe der statischen Momente auf der linken Seite $3 \cdot 4 + 10 \cdot 3 = 42$, auf der rechten Seite aber $2 \cdot 2 + 2 \cdot 4 + 4 \cdot 6 = 42$; also auch hier sind die Bedingungen des Gleichgewichts erfüllt.

Wenn der Drehpunkt m zwischen den Angriffspunkten der beiden Kräfte liegt, so hat man mit einem zweiarmligen Hebel zu thun. Die Schnellwaage, Fig. 6, ein Beispiel des zweiarmligen Hebels.

Der Drehpunkt eines zweiarmligen Hebels hat (das Gewicht der Hebelstange abgerechnet) einen Druck auszuhalten, welcher gleich ist der Summe der rechtwinkelig angreifenden Kräfte. In den durch Fig. 4 und Fig. 5 dargestellten Fällen ist also der Druck auf den Drehpunkt m gleich 16 und 24. Es läßt sich dies experimentell durch die Anordnung Fig. 7 nachweisen; das Gewicht des Hebels abgerechnet ist $N = P + R$.

Denken wir uns den Punkt a in der Weise befestigt, daß er den Drehpunkt des Hebels ab bildet, so haben wir jetzt einen einarmigen Hebel, den die Kräfte N und N nach entgegengesetzten Seiten zu drehen streben. Es findet Gleichgewicht statt, wenn sich R zu N verhält, wie die Länge am zu ab . Beispiele der Anwendung des einarmigen Hebels sind in Fig. 8, 9 und 10 dargestellt.

Wenn in der Vorrichtung Fig. 7 die beiden Punkte a und b festgelegt werden, so haben sie zusammen einen gleich oben gerichteten Druck auszuhalten, welcher gleich ist, und zwar ist der Druck, den a auszuhalten hat, gleich P , der Druck, den b auszuhalten hat, ist R .

Wenn zwei Träger mittels einer Wabre, Fig. 11, eine Last tragen, so vertheilt sie sich nur dann gleich auf beide Träger, wenn sie in der Mitte liegt. Je mehr sie dem einen Träger zugehoben wird, desto größer wird der Antheil der Last, welchen er zu tragen hat.

Wenn an einem Hebel amh , Fig. 12, zwei Kräfte a und h (die Längen ac und hd sind den in a und h eingreifenden Kräften proportional aufgetragen) nicht rechtwinkelig, sondern schief angreifen, so wirken sie gerade so, als ob sie rechtwinkelig an den Hebelarmen mo und mn angriffen, welche man erhält, wenn man von dem Drehpunkt m ein Perpendikel auf die verlängerten Richtungen der beiden Kräfte fällt. Das statische Moment der einen Kraft ist also $ac \cdot mo$, das der andern ist $hd \cdot mn$ und Gleichgewicht findet statt, wenn $ac \cdot mo = hd \cdot mn$.

Die Hebelgesetze finden überall eine Anwendung, wo es sich um die Umdehnung irgendeines festen Körpers um eine Axe handelt, wie z. B. bei der Hebung von Lasten mittels des Haspels, Fig. 13, bei welchem sich die am Ende des Kurbelarms angreifende Kraft des Arbeiters zu der am Wellbaum hängenden Last verhält, wie der Halbmesser des Wellbaums zum Kurbelarm.

Auf die Lehre vom Hebel läßt sich die Lehre vom Schwerpunkt zurückführen. Jeder feste Körper ist als ein Complex einer kleinern oder größern Anzahl von Moleculen zu betrachten, welche in unveränderter gegenseitiger Stellung verharren und deren jedes von der Schwerkraft afficirt ist. Die Richtung, mit welcher die Schwere die einzelnen Moleculs des festen Körpers antreibt, ist für alle dieselbe, es ist die Richtung des Bleilothes; wir müssen also jeden schweren Körper betrachten, als sei er durch eine Reihe unter sich paralleler Kräfte angegriffen. Die Resultirende, die Summe, aller dieser unter sich parallelen Elementarkräfte ist das Gewicht des Körpers. Der Angriffspunkt dieser Resultirenden aber ist der Schwerpunkt des Körpers.

Ohne das Gleichgewicht zu stören, kann man sich das Gewicht des Körpers in seinem Schwerpunkt vereinigt denken. Ein fester Körper ist im Gleichgewicht, sobald sein Schwerpunkt unterstüht ist.

Wenn ein fester Körper in einem festen Punkte aufgehängt ist, um den er sich übrigens frei drehen kann, so lassen sich drei Fälle des Gleichgewichts unterscheiden:

1) der Unterstützungspunkt und Drehpunkt des Körpers geht durch seinen Schwerpunkt, Fig. 14. In diesem Falle findet Gleichgewicht statt, welches übrigens die Lage des Körpers sein mag. Er ist im Gleichgewicht, mag er nun die Lage AB oder die Lage CD oder irgendeine andere haben (indifferentes Gleichgewicht);

2) der Schwerpunkt liegt vertical unter dem Aufhängepunkt, Fig. 15. Wird der Körper durch irgendeine äußere Kraft aus dieser Lage herausgebracht, erhält er z. B. eine solche Lage, daß sein Schwerpunkt von s nach s' verschoben wird, so wirkt nun das Gewicht des Körpers auf s' in der Art, daß es ihn in seine ursprüngliche Lage zurückzuführen strebt (stabiles, festes Gleichgewicht);

3) der Schwerpunkt liegt vertical über dem Drehpunkt. Hier ist allerdings noch Gleichgewicht möglich, dasselbe wird aber durch die geringste Kraft vollkommen vernichtet, sobald, nachdem die störende Kraft zu wirken aufgehört hat, eine Rückkehr in die vorherige Gleichgewichtslage nicht stattfindet (labiles oder unsicheres Gleichgewicht).

Ein interessantes Beispiel des stabilen Gleichgewichts bietet Fig. 17. Ein Holzstück B , welches unten mit einer Stahlsäge versehen ist, wird mittels dieser auf

eine flach ausgehöhlte Stahlplatte gesetzt, welche die obere Endfläche des Stativs A bildet. Das Holzstück B wird umfallen, weil sein Schwerpunkt über dem Unterstützungspunkte liegt. Wenn aber durch B ein Drahtbogen MN gezogen wird, welcher an beiden Enden die Bleifügel P trägt, so fällt nun der gemeinschaftliche Schwerpunkt des Holzstücks B und der beiden Bleifügel P unter die Stahlspitze, es findet also jetzt ein stabiles Gleichgewicht statt. B fällt jetzt nicht mehr um, der Körper ist jetzt eigentlich aufgehängt.

Wenn ein Körper mit mehr oder weniger breiter Basis auf dem Boden steht, so muß die Basis seinen Schwerpunkt gezogene Verticale noch die Basis treffen, wenn der Körper nicht alsbald umfallen soll. Demnach muß der schiefe Cylinder, Fig. 18, im Gleichgewicht sein, wenn er nur die schattirte Höhe hat; er müßte umfallen, wenn er eine solche Höhe hätte, daß sein Schwerpunkt in b läge. — Ein Mensch steht fest, wenn ein vom Schwerpunkt seines Körpers gefälltes Perpendikel den Boden in einem Punkte trifft, welcher innerhalb des Raums liegt, welcher durch die Sohlen der beiden Füße begrenzt wird. Nimmt man eine Last in die linke Hand, Fig. 19, so beugt man den Körper auf die rechte Seite, trägt man eine Last auf dem Rücken, Fig. 20, so muß man den Oberkörper vorbeugen.

Wenn ein auf irgendeiner vielen Basis stehender Körper umgeworfen werden soll, so muß er um irgendeine seiner Grundkanten, etwa um a, Fig. 21, gedreht werden, bis sein Schwerpunkt s in s', vertical über a angekommen ist. Die Kraft, welche das Umwerfen bewirken soll, eher nach, als der Schwerpunkt in s' angekommen ist, so fiele der Klotz in seine ursprüngliche Lage zurück, hat man aber den Schwerpunkt nur im mindesten über s' hinausgebracht, so fällt nun der Klotz von selbst ganz um.

Ein Körper steht um so fester, d. h. seine Stabilität oder Standfestigkeit ist um so größer, je mehr Kraft man anwenden muß, um den Schwerpunkt von s nach s' zu bringen. Die Stabilität wächst mit dem Gewicht des Körpers und mit der Breite seiner Basis, und sie ist unter sonst gleichen Umständen um so größer, je tiefer sein Schwerpunkt liegt.

Die Lehre vom Schwerpunkt findet auch bei der Wage ihre Anwendung; sie besteht aus einem Stabe, oder einem durchbrochenen Balken Fig. 22, welcher um eine wagerechte Axe (Schneide) drehbar ist, die sich in der Mitte seiner Länge befindet. An den beiden Enden sind Schneiden angebracht, an welchen die Waagschalen aufgehängt werden. Die drei Schneiden liegen in einer geraden Linie. Der Waagebalken ist nun so geformt, daß sein Schwerpunkt unter der mittleren Schneide liegt. Bei gleicher Belastung auf beiden Seiten muß sich deshalb der Waagebalken horizontal stellen, bei einem Uebergewicht auf einer Seite muß er sich aber um so mehr nach dieser Seite neigen, er muß einen um so größeren Ausschlag geben, je größer das Uebergewicht ist.

Da zwei auf einem Punkt zusammenwirkende Seitenkräfte sich durch ihre Resultirende ersetzen lassen, so muß auch jede Kraft in zwei Seitenkräfte zerlegbar sein, wie dies am schönsten durch die schiefe Ebene erläutert wird. Wenn eine Last a, Fig. 23, auf einer Ebene RS liegt, welche mit der Horizontalen einen Winkel α bildet, so läßt sich die Schwerkraft des Körpers a, welche durch die Linie a dargestellt sein mag, in zwei Seitenkräfte zerlegen, von denen die eine da rechtwinklig gegen die Ebene RS als Druck wirkt, während die andere Seitenkraft ca den Körper zur schiefen Ebene heruntreibt. Die Seitenkraft ca wird um so kleiner, je kleiner der Winkel α , und zwar verhält sich ac zum Gewicht des Körpers, wie die Höhe

ST der schiefen Ebene zu ihrer Länge RS. — Jeder zu einer Anhöhe hinaufführende Weg ist eine schiefe Ebene.

Die Schraube ist eine um einen Cylinder herum gelegte schiefe Ebene. Es sei aof, Fig. 24, ein rechtwinkliges Stück Papier, dessen verticale Kante mit einem Cylinder befestigt ist. Wird nun das Papier um den Cylinder herumgewickelt, so bildet die Hypotenuse a f auf dem Cylinder eine Schraubenlinie, deren Lauf man in der Figur leicht verfolgen kann.

Denken wir uns längs der Schraubenlinie ein kleines Dreieck von entsprechender Größe fortgeführt, so entsteht ein scharfes Schraubengewinde, Fig. 25; denkt man sich dagegen ein kleines Quadrat längs der Schraubenlinie fortgeführt, so entsteht das flache Schraubengewinde, Fig. 26. Solche Schraubengewinde, welche um einen soliden Cylinder herumgeführt sind, wie das bei Fig. 25 und 26 der Fall ist, werden Schraubenspindeln genannt. Werden aber die Schraubengewinde in gleicher Weise an der innern Seite eines hohlen Cylinders herumgeführt, so entsteht ein Schraubemutter, Fig. 27. Einen mechanischen Effect kann man nur durch die Combination der Schraubenspindel mit einer dazu passenden Schraubemutter erzielen. Bei der Schraubengewinde Fig. 23, B. steht die Schraubenspindel s in der Schraubemutter, welche in die innere Höhlung des Gewindes m eingeschritten ist. Wird nun die Schraubenspindel gedreht, so werden ihre Windungen gegen die Schraubemutter wie auf einer schiefen Ebene auf- oder niedergleiten. Sollte also eine auf der Schraubenspindel liegende Last durch Umdrehung der Spindel gehoben werden, so ist klar, daß hier dieselben Principien zur Anwendung kommen, wie bei einer schiefen Ebene von gleicher Steigung.

Um das Verhältniß zwischen Kraft und Last diesem Apparat noch mehr zu steigern, bringt man eine Kraft, welche die Umdrehung der Spindel bewirken soll, auf den Umfang derselben, sondern am Ende eines Hebelarmes l an. — In gleicher Weise, wie bei der Schraube zur Hebung einer bedeutenden Last verwendet wird, gebraucht man sie bei der Schraubenzieher, um einen starken Druck zu erzeugen.

Der Flaschenzug, Fig. 29, ist eine Combination fester und beweglicher, durch Seile verbundener Rollen, durch welche eine größere Last mittels einer Kraft gehoben werden kann. Er besteht aus zwei festen, d. h. nicht verschiebbaren Rollen, welche in einem Gehäuse eines Halses aufgehängt sind, und zwei beweglichen Rollen, welche sich in einem beweglichen Flasche befinden. Diese Rollen sind durch ein Seil so verbunden, daß dasselbe abwechselnd an einer der obern festen zu einer der beweglichen Rollen geht; die obere Flasche ist also mit der unteren durch vier Seilstücke verbunden. Eine an der beweglichen Flasche angehängte Last Q vertheilt sich auf vier Seile, jedes ist also nur durch $\frac{1}{4} Q$ gespannt. Betrachten wir nun das Seilstück, welches die oberste feste Rolle geschlungen ist und welches die rechte Seite derselben frei ausläßt, so muß es offenbar auch mit der Kraft $\frac{1}{4} Q$ angespannt sein, wenn Gleichgewicht stattfinden soll. Eine Kraft am Seil bei a mit einer Kraft von 25 Pfund ist also im Stande, eine an der beweglichen Flasche hängende Last von 100 Pfund zu heben. Wenn aber die bei a ziehende Kraft einen Weg von 4 Fuß zurücklegt, wird die Last Q nur um 1 Fuß gehoben.

Ein ähnliches Resultat ergibt sich bei allen mechanischen Potenzen: Hebel, schiefe Ebene, Schraubenzieher u. s. w., welche dazu dienen, mit einer

nen Kraft eine große Last zu heben oder einen großen Druck auszuüben. Was auf der einen Seite an Kraft gewonnen wird, verliert man andererseits an Geschwindigkeit.

II. Hydrostatik.

Hydrostatik ist die Lehre vom Gleichgewicht der Flüssigkeiten. Infolge der leichten Verschiebbarkeit der Theilchen haben die Flüssigkeiten die Eigenschaft, jeden Druck, welcher auf einen Theil ihrer Oberfläche ausgeübt wird, nach allen Seiten gleichmäßig fortzupflanzen. Daraus beruht die Wirkung der hydraulischen Presse, welche in Fig. 30 im Durchschnitt dargestellt ist. Sie besteht aus zwei Haupttheilen, dem Presscylinder cc, in welchen von oben her ein Kolben pp eingesteckt ist, welcher von einem wasserdrückt schließlichen Ventile umfaßt, auf- und niederbewegt werden kann, und einer in das Wasserbehälter b b eingesezten Druckpumpe, deren Kolben s einen weit kleineren Durchmesser hat als der Presskolben p. Der Presscylinder cc ist mit der Druckpumpe durch das Metallrohr 11 verbunden. Wenn nun der Hohlraum des Cylinders cc, die Verbindungsrohre 11 und die Hohlräume der Druckpumpe vollständig mit Wasser gefüllt sind, so wird ein auf den Kolben s ausgeübter Druck sich gleichförmig durch 11 nach cc so fortpflanzen, daß jedes Flächenstück der Basis von pp, welches ebenso groß ist wie der Querschnitt von s, einen Druck auszuhalten hat, welcher demjenigen gleich ist, mit welchem s niedergedrückt wird. Nehmen wir an, der Durchmesser von p sei 10 mal größer als der Durchmesser von s, so ist die Grundfläche von p 100 mal so groß als die von s. Wenn also s mit einer Kraft von 25 Pfund niedergedrückt wird, so wird p mit einer Kraft von 2500 Pfund gehoben.

Wenn der Kolben s, nachdem er heruntergedrückt worden ist, wieder aufgezogen wird, so schließt sich das Ventil d und hindert den Rückgang des Wassers von c nach der Druckpumpe, in welche aber nun eine neue Quantität Wasser durch das jetzt geöffnete Ventil i aus dem Behälter b eintritt. Das Aufziehen und Niederdrücken des Kolbens s geschieht aber nicht unmittelbar, sondern durch Vermittelung eines einarmigen Hebels, wie man Fig. 31 sieht, welche die äußere Ansicht der Druckpumpe darstellt.

Da die Flüssigkeiten schwer sind, so müssen sie auch einen Druck auf den Boden der Gefäße ausüben, in welchen sie enthalten sind, und zwar ist die Größe dieses Drucks nur abhängig von der Größe der Bodenfläche und von ihrer Tiefe unter dem Wasserpiegel, der Bodendruck ist unabhängig von der Gestalt der Gefäße. So ist z. B. der Bodendruck in den drei Gefäßen a, b und c, Fig. 32, ganz derselbe, wenn ihr horizontaler Boden gleich groß ist und sie zu gleicher Höhe mit Wasser gefüllt sind, und zwar ist der Bodendruck gleich dem Gewichte der Wasserfülle in a, obgleich die Wassermasse in b viel kleiner, in c aber viel größer ist.

Aus einer Combination der Größe vom Bodendruck und der gleichförmigen Fortpflanzung des Drucks in Flüssigkeiten ergibt sich der Satz, daß in communicirenden Gefäßen oder Röhren, d. h. in solchen Gefäßen, welche unten miteinander in Verbindung stehen, für den Fall des Gleichgewichts die Flüssigkeit gleich hoch stehe, Fig. 33, welches auch die Gestalt der Gefäße sein mag, vorausgesetzt natürlich, daß in beiden Gefäßen oder Röhren die gleiche Flüssigkeit enthalten ist.

Sind in den beiden Röhren verschiedene Flüssigkeiten enthalten, so verhalten sich die Höhen der Flüssig-

keitssäulen, welche sich das Gleichgewicht halten, umgekehrt wie ihre specifischen Gewichte. Ist z. B. der untere Theil des Apparats, Fig. 34, mit Quecksilber gefüllt, so muß man im längeren Rohr eine Wasserfülle aufschütten, welche $13\frac{1}{2}$ mal so hoch ist, als die Quecksilbersäule, welcher sie das Gleichgewicht hält.

Eine weitere Folge der gleichförmigen Fortpflanzung des Drucks und der Schwere der Flüssigkeiten ist es ferner, daß jeder Körper, welcher in eine Flüssigkeit eingetaucht wird, einen Auftrieb auszuhalten hat, d. h. einen von unten nach oben gerichteten Druck, welcher den Körper zu heben strebt. Diesen Auftrieb kann man durch die Vorrichtung, Fig. 35 u. 36, anschaulich machen. Der untere Rand einer $1\frac{1}{2}$ — 2 Zoll weiten Glasröhre ist unten genau eben abgeschliffen; ab ist eine Metallscheibe, welche mit einem Haken versehen ist, so daß man sie an einer durch die Röhre hindurchgehenden Schnur aufhängen kann. Wenn man die Schnur anzieht, so ist die untere Öffnung der Röhre vollständig geschlossen. Wird sie nun so in ein Gefäß mit Wasser eingetaucht (Fig. 36), so ist es nicht mehr nöthig die Schnur anzuziehen, um das Herunterfallen der Platte zu verhindern. Sie wird jetzt durch den Auftrieb angehalten.

Eine Folge des Auftriebs ist das archimedische Princip, demzufolge jeder Körper, welcher in eine Flüssigkeit eingetaucht ist, so viel an seinem Gewicht verliert, als die von ihm verdrängte Flüssigkeitsmasse wiegt. Die Richtigkeit dieses Princips wird durch den Apparat Fig. 37 bewiesen. Die eine Waagschale der Wage Fig. 22 wird durch eine gleich schwere Kuglere ersetzt und an diese unten zwei Metallcylinder c und p angehängt, von denen p ein massiver Cylinder ist, welcher genau in die Höhlung von c paßt. Nachdem man auf die Waagschale links so viel Gewicht gelegt hat, daß das Gewicht der beiden Cylinder c und p equilibriert ist, wird nun p in Wasser eingetaucht und dadurch natürlich das Gleichgewicht gestört. Um es wiederherzustellen genügt es, die Höhlung von c mit Wasser zu füllen, also gerade so viel Wasser einzugießen, als durch p verdrängt worden ist.

Das archimedische Princip liefert ein treffliches Mittel, um das specifische Gewicht fester und flüssiger Körper zu ermitteln. Zunächst hängt man an der kurzen Waagschale Fig. 38 mittels eines feinen Fadens den zu bestimmenden Körper an und bestimmt sein absolutes Gewicht P. Dann taucht man ihn in Wasser ein und ermittelt den Gewichtsverlust p, so ist das specifische

$$\text{Gewicht des Körpers } s = \frac{P}{p}.$$

Noch bequemer als die hydrostatische Wage (Wage mit einer kurzen Waagschale) ist zur Bestimmung des specifischen Gewichts fester Körper das Nicholson'sche Aërometer, Fig. 39. In einem hohlen, beiderseits tonisch geschlossenen Cylinder B von Messingblech ist unten ein massiver Metallkonus angehängt, oben aber ein Stäbchen befestigt, welches ein Zellerchen zur Aufnahme der zu wägenden Körper und der Gewichte trägt. Der zu wägende Körper wird einmal oben, dann aber auf den Konus C gelegt und jedesmal so viel Gewicht beigelegt, daß das Instrument bis zu einer am Stäbchen angebrachten Marke O einsinkt.

Zur Bestimmung des specifischen Gewichts flüssiger Körper wendet man die Senkswagen oder Scalenaräometer, Fig. 40. Sie bestehen aus einer Glasröhre, an welche unten ein weiterer mit Schrot oder Quecksilber beschwerter Glaszylinder angehängt ist. Ein solcher Apparat sinkt in eine Flüssigkeit um so tiefer ein, je geringer deren specifisches Gewicht ist.

Es kommt also nur darauf an, in dem Rohr BXO eine entsprechende Scala anzubringen. Wissenschaftlichen Werth haben nur die Scalen (Volumeter und Densimeter), mittels deren man das specifische Gewicht der Flüssigkeit ermittelt, oder solche Scalen, welche den Procentgehalt einer Flüssigkeit (wie z. B. das Alkoholorometer den Alkoholgehalt eines verdünnten Weingeistes) angeben und welche man Procentaräometer nennt.

III. Aerostatik.

Dass die Luft schwer ist, lässt sich mittels eines Glasballons, Fig. 41 (auf Taf. 1 steht 14 statt 41) zeigen, welcher, mittels der Luftpumpe luftleer gemacht, an den einen Arm einer Wage angehängt und äquilibrirt wird. Öffnet man nun den Hahn, so sinkt wieder Luft in den Ballon einströmend, so senkt sich der Arm der Wage, an welchem er hängt, und man muß auf der andern Seite wieder Gewicht zulegen, um das Gleichgewicht herzustellen. Durch derartige Versuche hat man ermittelt, daß die atmosphärische Luft unter den gewöhnlichen Umständen ungefähr 1000 mal leichter ist, als ein gleiches Volumen Wasser.

Eine zweite Eigenschaft der Luft und anderer Gase ist ihre Expansionskraft, vermöge deren ein gegebenes Luftquantum auf $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{100}$ u. s. w. seines ursprünglichen Volumens zusammengepreßt werden kann, während es sich bei entsprechender Verminderung des Drucks auf das 2fache, 10fache u. s. w. Volumen auszudehnen im Stande ist. Die Expansibilität der Luft läßt sich auf folgende Weise zeigen. Man binde die Oeffnung einer runden Zelle, also nicht ganz mit Luft gefüllten Thierblase, Fig. 42, luftdicht zu und lege sie unter die Glode der Luftpumpe. Sobald die Luft im Recipienten verdünnt, also der Druck vermindert wird, welcher bisher auf der in der Blase eingeschlossenen Luft lastete, wird sich dieselbe auszudehnen und sie aufblähen. Sie schrumpft wieder zusammen, sobald man die Luft wieder in den Recipienten einläßt.

Infolge der Schwere der Luft muß die Atmosphäre einen Druck auf jeden Körper der Erdoberfläche ausüben, wie sich durch folgenden Versuch zeigen läßt: man spanne eine Thierblase über einen beiderseits offenen Metallcylinder und setze ihn auf den Teller der Luftpumpe, Fig. 43, so wird sich die Blase nach innen krümmen und endlich gersprengt werden, wenn man die Luft aus dem Innern des Cylinders herauszieht.

Wenn man eine Glasröhre in Wasser taucht, so stellt sich dasselbe im Rohr so hoch wie außen. Wenn man aber mit dem Mund die Luft aus dem Rohr herauszieht, Taf. 2, Fig. 1, so steigt das Wasser in der Röhre, weil der auf dem äußern Wasserspiegel lastende Luftdruck es in den verdünnten Raum im Rohre hineinpreßt.

Wenn man ein Rohr, an dessen untern Ende sich ein gut schließender Kolben befindet, in ein Gefäß mit Wasser taucht und dann den Kolben aufzieht, so steigt gleichfalls das Wasser im Rohr. Daraus gründet sich die Construction der Pumpen.

Der Luftdruck verhindert auch das Ausfließen des Wassers aus der engen Oeffnung des Hebels, Fig. 2 und 3, wenn derselbe mit Wasser gefüllt und oben zugehalten wird. Auch das continuirliche Ausfließen des Wassers aus dem untern Ende a, Fig. 4, des längern Schenkels eines Hebels, dessen kürzerer Schenkel in ein Gefäß mit Wasser eingetaucht ist, beruht auf dem Luftdruck. Das Ziehen des Hebels bei e, Fig. 5, hört auf, wenn man die Oeffnung des Röhrchens bei a zuhält.

Die Größe des Luftdrucks wird durch das Baro-

meter gemessen. Füllt man ein einerseits abgeschlossenes Rohr von nahe 1 Meter Länge ganz mit Quecksilber, schließt dann die Oeffnung mit dem Finger um bei umgekehrter Lage die Oeffnung in ein Gefäß mit Quecksilber einzutauchen, Fig. 6, so kann man den Finger von der Oeffnung weziehen, ohne daß das Quecksilber ganz aus dem Rohr herausfällt. Das Rohr bleibt vielmehr eine Quecksilberssäule von n. fast 28 Zoll stehen. Ueber der Quecksilberssäule befindet sich im Rohr ein luftleerer Raum, das Torricell'sche Vacuum. Die Höhe der Quecksilberssäule im Rohr ist ein Maß für die Größe des Luftdrucks. Die gewöhnlichsten Formen des Barometers sind: das Säbbarometer, Fig. 7, und das Heberbarometer, Fig. 8.

Das Gesetz, nach welchem sich das Volumen der gegebenen Luftmasse ändert, wenn der Druck vermindert wird nach seinem Entdecker das Mariotte'sche Gesetz genannt. Das Gesetz heißt: Das Volumen einer gegebenen Luftmenge ist dem Druck umgekehrt proportional, unter welchem sie steht. Zur Bestätigung dieses Gesetzes dient der Apparat Fig. 9. Er besteht aus zwei kurzen oben geschlossenen Röhren, welche mit einer Leinwand oben offen in Verbindung steht. Zunächst wird in das Quecksilber eingegossen, daß im kurzen Rohr ein bestimmtes Volumen abgesperrt ist, während das Quecksilber in beiden Schenkeln gleich hoch steht, Fig. 10. Die abgesperrte Luftmenge steht nun unter dem Druck der Atmosphäre. Um die abgesperrte Luft auf $\frac{1}{2}$, (Fig. 9) oder auf $\frac{1}{10}$, (Fig. 9) ihres ursprünglichen Volumens zu comprimiren, muß man im längern Rohr ein wenig Quecksilber aufgießen, daß es hier um die Höhe von 1 oder 2 Barometerböden über dem Niveau des Quecksilbers im kurzen Rohr steht.

Um die Luft in einem beliebigen Recipienten zu dünnen, bedient man sich der Luftpumpe. Eine solche Handluftpumpe ist in Fig. 12 dargestellt. In einem hohlen Messingcylinder A bewegt sich ein Kolben, welcher beim Aufziehen luftdicht schließt. Das obere Ende des Cylinders (Stiefels) A ist durch das Rohr t in Verbindung mit dem Teller d d, auf welchem eine Glasglocke luftdicht aufgesetzt ist. Die Glocke dieser Glode bildet den luftleeren zu machenden Raum des Recipienten. Wenn nun der Kolben K aufgezogen wird, so bildet sich unter ihm ein verdünnter Raum und in diesen strömt nun ein Theil der Luft aus dem Recipienten ein. Wenn der Kolben oben angekommen wird, er wieder niedergedrückt; dabei darf aber die Luft aus dem Stiefel nicht in den Recipienten zurückgeblieben, wird dies durch ein Blasenventil verhindert, welches sich auf dem Boden des Stiefels befindet und welches sich durch einen Druck von unten öffnet, durch einen Druck von oben aber geschlossen wird. Ein solches Ventil befindet sich in der Höhlung des Kolbens. Es öffnet sich beim Niederdrücken des Kolbens, und die Luft aus dem untern Theil des Stiefels entweicht. Bei einem abermaligen Aufziehen des Kolbens schließt sich das Kolbenventil wieder, das Bodenventil öffnet sich und eine neue Portion Luft geht aus dem Recipienten in den Stiefel aus u. s. w. Fig. 13 und 14 erläutern die Construction des Blasenventils des Kolbens.

Durch Öffnen des Hahns n kann die in ein Quecksilbergäß eintauchende Glasröhre b mit der Luft des Stiefels und des Recipienten in Verbindung gesetzt werden. Beim Auspumpen der Luft wird das Quecksilber in b steigen, und aus der Höhe der hier gebobenen Quecksilberssäule kann man den Druck der Verdünnung schließen.

Bei der Construction der Luftpumpen kann man die Ventile auch entsprechend construirte Säbne anwenden.

Man unterscheidet danach Ventils- und Hahnenluftpumpen. Fig. 15 und 16 stellen zwei Ansichten einer zweistufigen Ventilluftpumpe dar. Während der Kolben in einem Stiefel steigt, geht er im andern Stiefel nieder, so daß immer ein Stiefel auspumpend wirkt, wodurch das Evacuiren sehr beschleunigt wird.

Die wichtigsten Luftpumpen-Versuche sind folgende. Auf die Mitte des Luftpumpentellers wird eine Hohlkugel von Messing aufgeschraubt, Fig. 17, von welcher ein durch einen Hahn verschließbarer Kanal vertical herabgeht, und auf diese dann eine zweite Halbkugel (Magneburger Halbkugel) luftdicht schließend aufgesetzt. Wenn man nun die Luft aus dem Innern der Hohlkugel herauspumpt und dann den Hahn schließt, so kann man mit der größten Kraftanstrengung die Halbkugeln nicht mehr auseinanderreißen, Fig. 18.

Fig. 19 stellt eine 8—10 Fuß lange, oben und unten mit einer Messingfassung versehene Glasröhre dar. Die untere, durch einen Hahn verschließbare Fassung kann auf eine Luftpumpe aufgeschraubt werden. In der Röhre befindet sich ein großes Schrotkorn und ein Papierscheibchen. Kehrt man die Röhre schnell um, so daß das Ende, welches jetzt unten ist, das obere wird, so fällt das Papierscheibchen weit langsamer herab als das Schrotkorn, solange die Röhre mit Luft gefüllt ist. Sobald sie aber luftleer gemacht ist, fallen Schrotkorn und Papierscheibe gleich schnell.

Wenn man ein Gefäßbarometer von der Form Fig. 20 unter eine enge und hohe Luftpumpen-Glocke, Fig. 21, setzt, so wird die Quecksilberfäule des Barometers fallen, sobald man die Luft mehr und mehr aus dem Recipienten auszieht, sie steigt wieder, wenn man Luft einläßt.

Das archimedische Gesetz gilt auch für Luft. Jeder in Luft eingetauchte Körper verliert an seinem Gewicht so viel, als die verdrängte Luftmasse wiegt. Ist ein Körper leichter als die verdrängte Luftmasse, so muß er steigen. Der Luftballon steigt, wenn die Hülle desselben sammt dem eingeschlossenen leichten Gase (Wasserstoffgas oder Leuchtgas) weniger wiegt, als ein gleiches Volumen atmosphärischer Luft. — In Fig. 12 sehen wir unter der Glocke der Luftpumpe einen Apparat (Baroskop), welcher dazu dient, den Gewichtsverlust der Körper in der Luft zu erläutern. An einem kleinen Waagbalken hängt einerseits eine hohle Glas- kugel, andererseits eine massive Metallkugel, welche sich einander das Gleichgewicht halten, wenn der Apparat im luftgefüllten Raume steht. Unter die Glocke der Luftpumpe gebracht, sinkt aber die Glas- kugel um so tiefer, je weiter evacuiert wird.

Um kleinere Räume möglichst vollkommen luftleer zu machen, wendet man die Quecksilberluftpumpe, Fig. 22, an. Das Glasgefäß A steht durch die Glas- röhre C und den starken Gummischlauch D mit dem Glasgefäß B in Verbindung. Oben ist A durch einen Glasbahn geschlossen, dessen Contraction aus Fig. 23 deutlicher zu ersehen ist, und welcher je nach seiner Stellung die Verbindung von A mit der Höhlung der kleinen Glas- kugel p oder mit dem bei r anzusehenden kleinen Recipienten vermittelt. Während der Hahn so steht, daß A mit p verbunden ist, wird B so hoch gehoben, daß das Quecksilber bis in die Mitte der kleinen Kugel p steigt. Wird nun der Hahn um $\frac{1}{2}$ Um- drehung gedreht, so daß jetzt Verbindung zwischen A und dem Recipienten besteht, und dann B langsam gesenkt, so sinkt das Quecksilber in A, und die Luft tritt zum größten Theil aus dem Recipienten nach A. Nun wird der Hahn wieder in seine Anfangsstellung gebracht und durch Heben von B die Luft aus A durch p aus- getrieben, u. f. w.

Auch zum Comprimiren der Luft hat man Apparate

construirt, welche man als Compressionspumpen bezeichnet. Eine der bekanntesten Formen der Com- pressionspumpe ist die Windbüchse, Fig. 24. Der Re- cipient der Windbüchse ist durch ein Ventil geschlossen, welches sich durch einen Druck von außen öffnet, durch einen Druck von innen aber schließt. Dieser Recipient wird an das Laderohr aufgeschraubt, in welchem ein mas- siver Kolben aus, und abbewegt werden kann. Wenn sich der Kolben am untern Ende seiner Bahn befindet, so bringt die Luft durch die Oeffnungen a in das Lade- rohr ein; diese Luft wird nun beim Hinaustreiben des Kolbens in das Reservoir hineingepreßt; wird der Kol- ben dann wieder niedergezogen, so kann die Luft aus dem Recipienten nicht wieder zurücktreten, das Lade- rohr füllt sich aber, wenn der Kolben unten angelom- men ist, von neuem mit Luft, die abermals in den Re- cipienten hineingepreßt wird u. f. w.

Der Heronsball ist ein zum Theil mit Wasser, zum Theil mit Luft gefülltes geschlossenes Gefäß, in welches ein mit enger Oeffnung versehenes Rohr fast auf den Boden hinabreicht. Wird nun die Luft im Apparat comprimirt, so wird durch den Druck derselben ein Wasserstrahl durch die Röhre hinausgetrieben. Die einfachste Form des Heronsballs ist die Spritzflasche der Chemiker, Fig. 25, bei welcher die Compression durch Einblasen der Luft mit dem Munde bewerkstelligt wird. Fig. 26 stellt einen metallenen Heronsball dar, welcher, um Luft einzupressen, auf eine Com- pressionspumpe aufgeschraubt wird.

Solche Apparate, welche man braucht, um den Druck, die Spannkraft eingeschlossener Gase und Dämpfe zu messen, nennt man Manometer; eine der einfachsten Formen derselben, wie sie zum Messen des Gasdrucks in den Leuchtgas- Röhrenleitungen gebraucht wird, ist in Fig. 27 dargestellt, eine doppelt gebogene Glasröhre, welche mit dem unten offenen Schenkel bei a auf den Gasbehälter aufgesetzt wird, während die oben offene Mündung d mit der atmosphärischen Luft communiciert. Die Flüssigkeit steigt in cd, wenn der Druck des ein- geschlossenen Gases von a her größer ist als der der äußern Luft. Fig. 28 zeigt eine etwas andere Form des Manometers, wie sie von den Chemikern als Sicher- heitsröhre bezeichnet wird.

Wenn es sich nur um ganz geringen Ueberdruck des eingeschlossenen Gases handelt, dient Wasser als Sper- rungsflüssigkeit. Wird der Ueberdruck stärker, so muß man Quecksilber nehmen und die Manometerrohren lang genug machen, um Quecksilberfäulen von namhafter Höhe aufnehmen zu können.

Zur Messung sehr starken Gas- oder Dampfdrucks wendet man oben geschlossene, mit Luft gefüllte Mano- meterrohren, Fig. 29, an. Hier ist es also nicht allein der Druck der gehobenen Quecksilberfäule, welchem das eingeschlossene Gas oder der Dampf das Gleichgewicht zu halten hat, sondern der Druck der im Manometer vorher abgeperrten Luft, welcher auf 2, 4, 8 u. f. w. Atmosphären steigt, wenn sie auf $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ ihres ur- sprünglichen Volumens zusammengedrückt wird. Solche Manometer nennt man Compressionsmanometer.

IV. Dynamik.

Die Dynamik begreift die Lehre von der Bewegung. Die beiden Grundgesetze der Bewegung sind:

1) Das Gesetz der Trägheit, demzufolge jeder Körper in dem Bewegungszustand zu verharren strebt, in dem er sich eben befindet. Es ist also stets eine Kraft nöthig, um den Bewegungszustand eines Körpers zu ändern. Wenn keinerlei Kraft auf einen bewegten

Körper einwirkt, so bewegt er sich mit gleichförmiger Geschwindigkeit in gerader Richtung fort.

2) Wenn auf einen bewegten Körper eine Kraft einwirkt, so ist der Weg, welchen er in einem kleinen Zeittheilchen zurücklegt, die Resultirende derjenigen Bahnen, welche der Körper einerseits vermöge der bereits erlangten Geschwindigkeit, und andererseits unter dem alleinigen Einfluß der beschleunigenden Kraft zurücklegen würde.

Am einfachsten läßt sich dies beim Fallgesetz nachweisen. Ein Körper, der eine Zeit lang gefallen ist, hat dadurch eine gewisse Geschwindigkeit erlangt, vermöge deren er sich auch noch fortbewegen würde, wenn auch die Schwerkraft auf ihn zu wirken aufhörte; in jeder folgenden Secunde summirt sich also die schon erlangte Geschwindigkeit mit der neuen Wirkung der Schwere.

Aus einer mathematischen Discussion der eben angegebenen Grundsätze ergeben sich nun folgende Gesetze des freien Falls:

1) Die Fallräume sind dem Quadrate der Fallzeiten proportional. Der Fallraum der ersten Secunde beträgt ohngefähr 15 Fuß. Es sind demnach die Fallräume von

1	2	3	4	5	6	Secunden
15	60	135	240	375	540	Fuß.

2) Die Endgeschwindigkeiten sind den Fallzeiten proportional, und zwar ist die Endgeschwindigkeit von

1	2	3	4	5	6	Secunden
30	60	90	120	150	180	Fuß.

d. h. wenn die Schwere z. B. am Ende der vierten Secunde zu wirken aufhörte, so würde der Körper in jeder folgenden Secunde doch noch einen Weg von 120 Fuß zurücklegen.

Wie man sieht, sind für den freien Fall die wenigen Secunden entsprechenden Fallräume viel zu groß, als daß man die Richtigkeit des Gesetzes durch den Versuch bequem constatiren könnte. Zu diesem Zweck muß man dafür sorgen, daß der Fall nach dem gleichen Gesetz viel langsamer vor sich geht, wie dies bei der Fallrinne, Fig. 30, geschieht. Wenn man dem Stück a der Rinne eine solche Neigung gegen die Horizontale gibt, daß eine Kugel in 1 Secunde den Weg von 1 Decimeter (von 1 bis b) durchläuft, so werden in 2 und 3 Secunden die Wege von 4 und 9 Decimeter (also von 4 und 9 bis b) durchlaufen.

Ist die Kugel in 1 Secunde von 1 bis b herabgerollt, so hat sie nun eine solche Geschwindigkeit erlangt, daß sie auf der horizontalen Rinne bc, also ohne weitere Beschleunigung von b bis 2 läuft. Ist die Kugel in 2 oder in 3 Secunden von 4 oder von 9 bis b herabgerollt, so läuft sie in der folgenden Secunde auf der horizontalen Rinne noch bis 4 oder bis 6.

Noch genauer lassen sich diese Gesetze mit der Atwood'schen Fallmaschine, Taf. 1, Fig. 44, beweisen. Sie besteht im wesentlichen aus einer um eine horizontale Achse leicht drehbaren Rolle, welche auf dem Gipfel einer ohngefähr 6 Fuß hohen verticalen Säule befestigt ist. Ueber die Rolle ist eine Schnur geschlungen, an deren Enden gleiche Gewichte m und n hängen. Legt man auf der einen Seite auf n ein Uebergewicht r auf, so wird n und r fallen und m steigen. Der Fall von n und r geht aber um so langsamer vor sich, je kleiner r im Vergleich zu m + n. Hat man das Uebergewicht r so justirt, daß der Fallraum der ersten Secunde 1 Zoll beträgt, so beträgt der Fallraum von 2, 3, 4 u. f. w. Secunden 4, 9, 16 u. f. w. Zoll.

Fig. 45 zeigt das Gewicht n sammt dem Uebergewicht r, wie es für den eben besprochenen Versuch ein-

gerichtet sein muß. Um aber Versuche über die Endgeschwindigkeit zu machen, welche der fallende Körper in 2, 3, 4 Secunden erlangt, muß man dafür sorgen, daß das Uebergewicht nach 2, 3, 4 Secunden weggenommen wird. Zu diesem Zweck muß das Uebergewicht die Gestalt Fig. 46 haben, so daß es auf einem in Fig. 44 sichtbaren durchbrochenen Schieber liegen bleibt, während das Gewicht n frei durch die Höhlung dieses Schiebers hindurchgeht.

Stellt in Fig. 30, Taf. 2, a 1 den Fallraum der ersten Secunde dar, so ist a 2, a 3, a 4 und a 5 den Fallraum von 2, 3, 4 und 5 Secunden.

Beim freien Fall ist die Richtung der Bewegung die gleiche wie die Richtung der beschleunigenden Kraft; wenn dies nicht der Fall ist, so bewirkt die beschleunigende Kraft eine stetige Abweichung von der Bewegungsrichtung, infolge dessen der Körper eine krumme Linie beschreibt, wie dies z. B. bei der Wurfbewegung der Fall ist. Nehmen wir z. B. an, dem Körper in a, Fig. 31, werde in horizontaler Richtung ein Stoß erteilt, vermöge dessen er sich am Ende der 1., 2., 3., 4., 5. Secunde in den Punkten b, c, d, e, f befinden würde, so wird er durch die Schwerkraft in 1, 2, 3, 4, 5 Secunden um die Längen a 1, a 2, a 3, a 4 und a 5 von den Punkten b, c, d, e, f herabgezogen sein, kurz der horizontal geworfene Körper beschreibt die Bahn ab'cd'f, welche eine Parabel sein würde, wenn kein Luftwiderstand stattfände.

Wenn einem Körper, welcher durch eine beschleunigende Kraft stets gegen einen und denselben Anziehungsmittelpunkt angezogen wird, einmal ein seitlicher Impuls von entsprechender Größe mitgetheilt wird, so combinirt sich seine seitliche Geschwindigkeit in der Weise mit der Centralkraft (Centripetalkraft), daß er sich in einer krummen Linie um den Anziehungsmittelpunkt herumbewegt. Von dieser Art ist die Bewegung der Erde und der übrigen Planeten um die Sonne. Wie eine solche Centralbewegung zu Stande kommt, wird durch Fig. 32, Taf. 2, erläutert.

Nehmen wir an, der Körper a werde mit einer solchen Kraft gegen den Anziehungsmittelpunkt in geraden, daß er in der Zeittheilchen den Weg ac zurücklegen würde, gleichzeitig aber sei er mit einer seitlichen Geschwindigkeit befaßt, vermöge deren er sich in der Zeittheilchen von a nach b bewegen würde, so muß er unter dem gleichzeitigen Einfluß der Centralkraft und der seitlichen Geschwindigkeit in der Zeittheilchen den Weg ad zurücklegen. In d kommt er aber mit solcher Geschwindigkeit an, daß er sich nach dem Gesetze der Trägheit in den folgenden Zeittheilchen von d nach e bewegen würde; durch die neue Einwirkung der Centralkraft wird er aber abermals um d f gegen n hingetrieben, er wird also in diesem Zeittheilchen den Weg dg zurücklegen u. f. w. Die gebrochene Linie a dg geht aber in Wirklichkeit in eine krumme Linie über, da die Centralkraft nicht stoßweise, sondern stetig wirkt. Die Natur der krummen Linie, welche a um n beschreibt, hängt von dem Verhältniß der Centralkraft zu der seitlichen Geschwindigkeit (Tangentalkraft) ab.

Wenn die Centralkraft in einem bestimmten Moment auf den Körper zu wirken aufhörte, so würde er sich in der Richtung der Tangente seiner bisherigen Bahn, also in gerader Linie fortbewegen; durch die Centralkraft wird er aber beständig aus der tangentialen Richtung heraus gegen den Anziehungsmittelpunkt hingetrieben.

Wenn ein Körper um einen festen Mittelpunkt herumgeschleudert wird, wie z. B. der Stein (Fig. 3, Taf. 2) um die Hand, welche hier den Centralpunkt der Bahn bildet, welche der Stein beschreibt, so strebt er gleich-

falls beständig in tangentialer Richtung fortzufahren, die Schnur aber zieht ihn beständig aus der Richtung der Tangente in die Kreisbahn zurück, die Spannung der Schnur tritt also hier an die Stelle der oben betrachteten Centralkraft.

Die Kraft, mit welcher ein um eine feste Axe herumgeschwungener Körper sich von derselben zu entfernen strebt, in unserm Falle also die Kraft, welche die Schnur spannt, nennt man Schwingkraft, Fliehkraft, Centrifugalkraft. Sie wächst mit der Masse des herumgeschwungenen Körpers, mit dem Radius des beschriebenen Kreises und mit der Geschwindigkeit der Umdrehung.

Um Versuche über die Schwingkraft anzustellen, dient man sich der Schwingmaschine, Fig. 47, Taf. 1. Durch Umdrehung des größten Rades c wird die Axe a in rasche Rotation versetzt; auf der Axe a aber werden verschiedene Vorrichtungen, Fig. 48 bis 51, aufgesetzt, mit welchen man experimentiren will.

Fig. 48 ist ein bauchiges Glasgefäß, aus dessen Boden etwas Quecksilber und gefärbtes Wasser gegossen wird; wenn es rasch um seine Axe rotirt, so steigen die Flüssigkeiten in die Höhe und bilden einen im Bauch des Gefäßes schwebenden Ring, und zwar wird sich der Quecksilberring am weitesten von der Umdrehungsaxe entfernen. Der Apparat Fig. 49 zeigt zwei Eisenbeinageln von ungleichem Durchmesser, welche auf einem horizontal ausgepannten Metalldraht leicht verschiebbar durch Schnüre in bestimmter gegenseitiger Entfernung gehalten werden. Stellt man die Ägeln so, daß sich ihr Abstand von der Umdrehungsaxe umgekehrt verhält wie ihre Massen, so halten sie sich bei rascher Rotation des Apparats das Gleichgewicht, während sie nach der einen oder andern Seite hinfahren, wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist.

Wenn der Apparat Fig. 50 auf die Schwingmaschine aufgesetzt ist, so wird bei einer bestimmten Umdrehungsgeschwindigkeit die Schwingkraft der Messingkugel d im Stande sein, das im Centrum befindliche Gewicht c zu heben, bei doppelter Umdrehungsgeschwindigkeit wird ein 4 mal so großes bei c aufgelegtes Gewicht gehoben. Ist endlich der Apparat Fig. 51 auf die Schwingmaschine aufgesetzt, so werden sich bei rascher Rotation die elastischen Messingstreifen mehr und mehr krümmen, und dadurch wird die Hülse b, welche dieselben oben zusammenfaßt, mehr und mehr herabgezogen. Dieser Apparat dient dazu, zu zeigen, daß die Abplattung der Erde eine Folge ihrer Aendrehung ist.

Eine Axe, um welche die Masse eines um sie rotirenden Körpers symmetrisch vertheilt ist, wird eine freie Axe genannt. Eine solche freie Axe hat nie einen einseitigen Zug auszuhalten, weil jede Kraft, welche sie nach einer Seite zieht, durch eine vollkommen gleiche nach der entgegengesetzten Seite wirkende äquilibriert ist. Ein jeder um eine freie Axe rotirender Körper zeigt eine große Stabilität, d. h. ein Bestreben, in der Lage zu verharren, in welcher er sich befindet, und Kräften, die ihn aus dieser Lage zu verdrängen streben, einen Widerstand entgegenzusetzen. Man kann dies schon an jedem Kreisel sehen, welcher rotirend auf einer Spitze steht, ohne umzufallen, was unsehlbar erfolgen muß, wenn er ohne Rotation ist.

Am auffallendsten zeigt sich dies an dem Gyroskop, Fig. 34, Taf. 2. Eine mit einem viden Wulst umgebene messingene Scheibe a ist um eine Stahlaxe drehbar, welche in Spitzen läuft. Diese Spitzen sind in einem messingenen Ringe befestigt, welcher mit einem Ansatzstück n versehen ist, in dessen unterer Fläche sich eine kleine Vertiefung bei o befindet. Wird die ganze Vorrichtung in der Stellung, wie es die Figur zeigt, mittels dieser

Vertiefung auf eine Stahlspitze aufgesetzt, so fällt sie, um o sich drehend, durch ihr Gewicht rasch herab, bis z den Boden berührt, wenn die Scheibe a nicht rotirt. Ist aber die Scheibe in rasche Rotation versetzt, so behält der ganze Apparat, trotz seines bedeutenden Gewichtes, seine horizontale Lage bei, sich dabei langsam in horizontaler Ebene um eine vertikale Axe drehend.

Ein einfaches Pendel besteht aus einer schweren kleinen Kugel oder einem Doppeltegel, welcher an einem einfachen Faden oder besser an einem Doppelfaden aufgebängt ist, wie Fig. 35, Taf. 2, zeigt. Aus seiner Gleichgewichtslage etwas entfernt und sich dann selbst überlassen, wird die Pendellugel durch die Schwere in ihre Gleichgewichtslage zurückgeführt. Hier aber kommt sie mit einer solchen Geschwindigkeit an, daß sie auf der andern Seite ebenso hoch ansteigt, wie sie auf der einen herabfiel. So dauern denn diese Schwingungen eine Zeit lang fort, bis sie nach und nach wegen verschiedener Widerstände kleiner werden und endlich ganz aufhören. Die Gesetze der Pendelschwingungen sind

1) die Schwingungsdauer eines Pendels ist unabhängig von dem Stoff, aus welchem die Kugel verfertigt ist.

2) Die Schwingungsdauer ist unabhängig von der Größe des Ausschlagswinkels, solange derselbe überhaupt klein bleibt, sie bleibt also dieselbe, mag der Ausschlagswinkel 1, 2 oder 3 Grad betragen.

3) Die Schwingungsdauer ist der Quadratwurzel aus der Pendellänge proportional. Ein 4 mal, ein 9 mal längeres Pendel wird also eine 2 mal, eine 3 mal größere Schwingungsdauer haben, wie man dies mit Hilfe der Vorrichtung Fig. 35 nachweisen kann.

Das zuletzt ausgesprochene Gesetz bezieht sich nur auf einfache Pendel, es gilt nicht für materielle Pendel, welche aus einer Stange von namhaftem Gewicht bestehen, an welche an verschiedenen Stellen noch weitere schwere Massen angebracht sind, wie z. B. Fig. 36 und 37, Taf. 2, zeigt. Das um die Schneide a schwingende Pendel Fig. 36 wird offenbar langsamer schwingen, als wenn nur die obere, aber schneller, als wenn nur die untere Pfeilfinne vorhanden wäre. Die obere Linse ist also in ihrer Bewegung verzögert, die untere ist beschleunigt.

Wenn ein Theil der Masse des Pendels über der Schneide liegt, um welche es schwingt, wie dies z. B. bei dem Pendel Fig. 37 der Fall ist, so wird dadurch die Schwingungsdauer des Pendels vergrößert.

Ueberall da, wo ein fester Körper unter einem gewissen Druck über einem andern hinbewegt wird, muß ein Widerstand überwunden werden, welcher unter dem Namen der Reibung bekannt ist. So ist z. B. eine namhafte Kraft nöthig, um eine Last auf horizontaler Ebene fortzuschleifen. Die Größe dieser Kraft ist ein aliquoter Theil der Last. Das Verhältniß der Größe der Reibung zur Last wird Reibungscoefficient genannt. Der Reibungscoefficient ist abhängig von der Natur der übereinander bergleitenden Flächen. Er ist für

Eisen auf Eisen . . .	0,28
Eisen auf Kupfer . . .	0,18
Eichen auf Eichen . . .	0,42
Kiefern auf Kiefern . . .	0,57.

Um den Werth der Reibungscoefficienten zu ermitteln, bedient man sich des Tribometers, Fig. 52, Taf. 1, welches aus der Figur wol auch ohne weitere Beschreibung verständlich ist. Beträgt z. B. das Gewicht des Kästchens A sammt seinem Inhalt 1000 Gramm, so muß die Waagschale B sammt aufgelegtem Gewicht 280 Gramm wiegen, um das Kästchen über zwei parallele eiserne Schienen B wegzuziehen, wenn die untere Fläche des Kästchens A aus einer Eisenplatte besteht.

Wo ein Körper über einen andern wegrollt, findet wälzende Reibung statt, welche weit geringer ist, als die gleitende. Am Umfang unserer Wagenräder findet wälzende Reibung statt, an den Äxen aber gleitende Reibung.

Die Reibung ist ein Bewegungshinderniß, welches in allen unsern Maschinen einen namhaften Theil der bewegenden Kraft absorbiert, also hier sehr störend wirkt. Alle Nachtheile der Reibung sind aber unbedeutend gegen die großen Vortheile, welche sie uns gewährt. Ohne Reibung könnten wir weder stehen noch gehen (Glatteis), ohne Reibung könnten wir nichts in der Hand fest halten. Die Reibung bietet dem Huf des Pferdes, dem Treibrad der Locomotive den Stützpunkt, deren sie bedürfen, um die nachfolgenden Lasten nachzuziehen u. s. w. Eine interessante Anwendung der Reibung wird durch Fig. 38, Taf. 2, erläutert. Eine Last P hängt an einem Seil, welches mehrmals über einen nicht drehbaren Cylinder geschlungen ist. Die Last P kann nun nicht niedergehen, ohne daß das Seil am Umfang des Cylinders eine bedeutende Reibung zu überwinden hat, es bedarf deshalb nur einer geringen, am andern Ende des Seils wirkenden Kraft O , um der Last P das Gleichgewicht zu halten.

Die Bewegungserscheinungen flüssiger Körper unterscheiden sich dadurch wesentlich von denen fester Körper, daß sich einzelne Theile leicht von der ganzen Masse ablösen und für sich bewegen können; bringt man z. B. im Boden oder in der Seitenwand eines mit Wasser gefüllten Gefäßes eine Oeffnung an, so springt aus dieser ein Wasserstrahl hervor, während die Wassermasse im Gefäß fast ganz in Ruhe bleibt. Die Geschwindigkeit, mit welcher der Wasserstrahl aus einer in dünner Wand gemachten Oeffnung hervorschießt, ist gleich der Geschwindigkeit, welche ein freifallender Körper erlangt, wenn er vom Spiegel der Flüssigkeit im Gefäß bis zu der Ausflußöffnung herabfällt.

Um die Richtigkeit dieses Gesetzes nachzuweisen, kann man sich u. a. des Mariotte'schen Ausflußgefäßes, Fig. 39, Taf. 2, bedienen. Eine große Glasflasche ist unten mit einem kurzen Seitenrohr versehen, auf welches eine Messingfassung rs aufgeschlitten ist; auf diese wird dann die Messingplatte mit der Ausströmungsoffnung o aufgeschraubt. Oben ist die Flasche durch einen Kork luftdicht geschlossen, durch welchen ein bis unter den Wasserspiegel hinabreichendes Rohr ba hindurchgeht. Alles Wasser über a ist durch den Luftdruck äquilibrirt, der Ausfluß bei o erfolgt also unter dem Druck einer Wassersäule, deren Höhe gleich ist der Höhendifferenz zwischen a und o . Stellt man also die Röhre ba so, daß sich a 1, 2, 3, 4 Decimeter hoch über o befindet, so erfolgt der Ausfluß unter dem Druck einer Wassersäule von 1, 2, 3, 4 Decimeter Höhe. Der ausfließende Strahl beschreibt also eine Parabel, deren Gestalt man nach der berechneten Ausflußgeschwindigkeit construiren kann.

Das Ausströmen der Gase aus feinen Oeffnungen der Recipienten, in welchen sie enthalten und durch den Druck einer Wasser- oder Quecksilbersäule comprimirt sind, erfolgt nach denselben Gesetzen, nur muß man als Druckhöhe die Höhe einer Gassäule von gleicher Dichtigkeit mit dem eingeschlossenen Gase setzen, welche der comprimirenden Wasser- oder Quecksilbersäule das Gleichgewicht hält.

B. Akustik.

(Tafel 3.)

Akustik ist die Lehre vom Schall.

Der Schall wird hervorgebracht durch die rasche Oscillationsbewegung eines elastischen Körpers, welche

in den umgebenden Medien eine Wellenbewegung erzeugt und welche bis zum Ohre fortgepflanzt hier die Empfindung des Schalls hervorruft.

Wenn der oscillirende Körper nach einer Seite hin schwingt, so wird hier die Luft verdichtet und diese Verdichtung pflanzt sich mit gleichförmiger Geschwindigkeit fort; wenn aber der oscillirende Körper zurück schwingt, so wird dadurch eine Luftverdünnung erzeugt, welche der vorangegangenen Verdichtungsstelle mit der gleichen Geschwindigkeit folgt. Fig. 1 zeigt, wie sich die regelmäßig aufeinanderfolgenden Verdichtungs- und Verdünnungswellen von dem schallenden Körper aus bis zum Ohre verbreiten.

Fig. 2 soll dazu dienen, die Bildung der Schallwellen näher zu erläutern. Der Einfachheit wegen wollen wir eine Luftsäule betrachten, welche in einer Röhre eingeschlossen ist, an deren einem Ende ein Kolben q rasch hin- und her schwingt. Bei 1 hat der Kolben seine Bewegung noch nicht begonnen, die einzelnen Luftschichten in der Röhre sind gleich dicht. Sobald der Kolben q zu oscilliren beginnt, theilt sich seine Oscillationsbewegung den folgenden Luftschichten mit, aber h , daß die Bewegung die folgenden Schichten um so später erreicht, je weiter sie vom Kolben entfernt sind.

Nr. 11, Fig. 2 stellt den Moment dar, wo der Kolben q zum ersten mal seine Bewegung nach rechts vollendet hat; die Bewegung hat sich unterdeß bis zur Luftschicht 6 fortgepflanzt, welche in demselben Moment ihre Bewegung nach rechts beginnt, in welchem der Kolben q beendet hat. Zwischen dem Kolben und der Schicht 6 muß eine Luftverdichtung stattfinden, welche sich, da die verdichtete Luft sich wieder auszubehnen strebt, nach rechts und zwar mit gleichförmiger Geschwindigkeit fort pflanzt.

Unterdeß aber geht der Kolben in seine Anfangsstellung zurück. Ist er in derselben angekommen, Nr. 11, so ist nun die Bewegung bis zur Luftschicht 12, die größte Verdichtung bis zur Schicht 9 fortgeschritten, zwischen 6 und dem zurückgehenden Kolben hat sich aber nun eine Luftverdünnung gebildet, welche der vorangegangenen Verdichtungsstelle mit der gleichen Geschwindigkeit folgt.

Bei jeder folgenden Oscillation bildet sich nun von neuem eine Verdichtungs- und Verdünnungswelle, die einander mit gleichförmiger Geschwindigkeit folgen, wie Nr. IV und V anschaulich machen sollen, welche die Momente darstellen, in welchen der oscillirende Kolben seinen Hin- und Hergang zum zweiten und zum dritten male vollendet hat.

Der Abstand von der Mitte einer Verdichtungsstelle bis zur nächsten, oder von einem Maximum der Verdünnung bis zum folgenden, also in Fig. 2, Nr. V, von 9 bis 21 und von 3 bis 15 ist eine Wellenlänge.

Die Geschwindigkeit, mit welcher sich die Schallwellen in der Luft fortpflanzen, ist ungefähr 1050 Fuß in der Secunde. Für tiefe Töne ist die Wellenlänge größer, für hohe ist sie kleiner. Für das eingestrichene c ist die Wellenlänge ungefähr $4\frac{1}{2}$ Fuß.

Ebenso wie in Luft können sich die Schallwellen auch in festen Körpern und in Flüssigkeiten verbreiten, doch ist in beiden die Fortpflanzungsgeschwindigkeit weit größer als in Luft. Im leeren Raume kann sich der Schall nicht fortpflanzen, wie der Versuch zeigt, wenn man ein ausgepumptes Weidewort unter die Glocke der Luftpumpe bringt, Fig. 3, und dann evacuir.

Die Schallstrahlen werden nach denselben Gesetzen reflectirt, wie die Licht- und Wärmestrahlen, wie dies aus dem Hohlspiegelversuch Fig. 4 hervorgeht. Bringt man in den Brennpunkt A eines sphärischen Hohlspiegels rs eine Taschenuhr, so werden alle von

ihre ausgehenden Schallstrahlen parallel mit der Axe des Hohlspiegels rs reflectirt. Fängt man sie nun mit einem zweiten Hohlspiegel t auf, der so aufgestellt ist, daß seine Axe mit der von rs zusammenfällt, so wird das von rs kommende Strahlenbündel von t so reflectirt, daß die reflectirten Schallstrahlen im Brennpunkt B wieder vereinigt werden. Ein in B befindliches Ohr hört die Töne, selbst wenn der Abstand der beiden Hohlspiegel 20—40 Fuß und mehr beträgt.

Auf der Reflexion des Schalls beruht die Bildung des Chors, die Construction des Hörrohrs und des Sprachrohrs.

Wenn man eine durch Ausstreichen mit dem Fiedelbogen zum Tönen gebrachte Glasglocke über eine unten geschlossene Pappröhre, Fig. 5, hält, so vernimmt man eine bedeutende Verstärkung des Tons, wenn die Länge der Röhre gerade $\frac{1}{2}$ von der Wellenlänge des einfallenden Tons ist. Ebenso hört man eine Verstärkung, wenn man eine angeschlagene Stimmgabel (eingestrichenes a) über einen etwa $1\frac{1}{2}$ Zoll weiten Glaszylinder, Fig. 6, hält, der so weit mit Wasser gefüllt ist, daß oben ungefähr ein $\frac{7}{10}$ Zoll hoher Raum frei bleibt. Diese Verstärkung des Tons rührt daher, daß durch das Zusammenwirken (Interferenz) der einfallenden und der am Boden des Rohrs reflectirten Schallwellen die Luftsäule im Rohr in den Zustand stehender Schwingungen versetzt wird, so daß alle Luftschichten im Rohr gleichzeitig sich gegen den Boden hin und dann gleichzeitig wieder vom Boden weg bewegen, was bewirkt, daß am Boden abwechselnd eine Verdichtung und dann wieder eine Verdünnung der Luft stattfindet, wie Fig. 8 andeutet, während am Eingange der Röhre zwar die Luftschichten lebhaft hin- und hergehen, ohne daß jedoch hier eine Verdichtung oder Verdünnung stattfindet.

Die Luftsäule im Rohre, Fig. 5, kommt auch ins Selbsttönen, wenn man über dieselbe eine mit dem Fiedelbogen angestrichene Glocke hält, die einen Ton gibt, dessen Wellenlänge $\frac{1}{2}$ mal so groß ist als die Länge der Röhre. In diesem Falle bildet sich in dem Rohre ein Schwingungsknoten bei T , Fig. 9, welcher um $\frac{1}{4}$ der Röhrenlänge von der Mündung absteht; die Luftschicht an dieser Stelle bleibt ohne Bewegung, indem aber von beiden Seiten sich alle Luftschichten im Rohre gegen T hin bewegen, entsteht hier eine Luftverdichtung*) und gleichzeitig am Boden eine Luftverdünnung (Nr. I). Als bald aber bewegen sich alle Luftschichten im Rohre nach beiden Seiten hin von T weg, dann entsteht bei T eine Luftverdünnung und am Boden aber eine Verdichtung (Nr. II). In der Mitte zwischen T und dem Boden findet weder Verdichtung noch Verdünnung statt, hier aber gehen die Luftschichten zwischen den weitesten Grenzen hin und her. Solche Stellen bezeichnet man als Bäuche.

Auch in beiderseits offenen Röhren kann man die Luft zum Selbsttönen bringen, wenn man einen tönenden Körper vor die eine Mündung hält, Fig. 7, dessen Wellenlänge doppelt so groß oder gleich ist der Länge des Rohrs. Im ersten Falle bildet sich ein Schwingungsknoten in der Mitte des Rohrs, im letztern Falle entstehen zwei, deren jeder um $\frac{1}{4}$ der Röhrenlänge von der nächsten Mündung absteht.

Um die Luftsäule in einem offenen oder gedeckten Rohre zum Tönen zu bringen, ist es aber nicht nöthig, die Wellen eines schon gebildeten Tons in die Röhre einfallen zu lassen, es erfolgt auch, wenn man einen Windstrom in geeigneter Weise an den Rändern des Rohrs vorbeiführt, wie dies in zweckmäßigster Form bei den Orgelpfeifen, Fig. 10 und 11, geschieht. Die

in den Fuß der Pfeifen aus der Windlade eingeblasene Luft dringt aus einer schmalen Spalte hervor, um sich an der obern Kante des Mundes zu brechen. Man unterscheidet offene (Fig. 10) und gedeckte Pfeifen, Fig. 11.

Die Erzeugung des Schwingungsknotens in Pfeifen läßt sich experimentell mit gläsernen Pfeifen, Fig. 12, nachweisen, in welche ein mit dünnem Papier überspanntes Rähmchen herabhängt. Auf das Papier wird etwas Sand gestreut, welcher ruhig bleibt oder lebhaft tanzt, je nachdem sich das Rähmchen an der Stelle eines Knotens oder eines Bauchs befindet.

Der tiefste Ton, welchen eine Pfeife bei verhältnismäßig schwachem Winde gibt, ist ihr Grundton, bei verstärktem Winde gibt sie höhere Töne, welche man als Obertöne bezeichnet.

Die Höhe eines Tons hängt ab von seiner Schwingungszahl, d. h. von der Anzahl der Vibrationen, welche der tönende Körper in einer Secunde macht. Je größer die Schwingungszahl, desto höher der Ton. Man erhält die Schwingungszahl eines Tons, wenn man seine Wellenlänge in die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Schalls dividirt. Da man nun durch die Länge einer Pfeife die Wellenlänge ihres Grundtons kennt, so kann man danach auch seine Schwingungszahl berechnen. So ist z. B. die Wellenlänge des Grundtons einer zfüßigen offenen Pfeife gleich 4 Fuß, also seine Schwingungszahl $\frac{1050}{4} = 262,5$. Gibt eine

gegebene Pfeife einen bestimmten Grundton, so gibt also eine Pfeife von halber Länge einen Ton von doppelt so viel Schwingungen, welcher als Octav jenes Grundtons bezeichnet wird.

Daß die Octav doppelt so viel Schwingungen macht wie der Grundton, läßt sich auch dem Auge sichtbar machen. Um eine verticale Achse ist ein quadratisches Kästchen drehbar, Fig. 13, dessen vier Wände durch Spiegel gebildet sind. In der Nähe dieser Spiegel befindet sich eine flache Wache, deren Rückwand durch eine feste Metallplatte, deren Vorderwand aber durch eine dünne gespannte Kautschukplatte gebildet wird. In diese Wache wird von der Rückseite her durch einen Schlauch Leuchtgas eingeführt, welches durch einen kleinen Brenner wieder austritt. Das austretende Gas wird angezündet und bildet dann eine ruhige, durch ein Glasrohr vor Luftzug geschützte Flamme, welche in dem rotirenden Spiegel als ein continuirlicher Lichtstreif erscheint. Hält man aber vor die Vorderseite der Wache eine offene Pfeife, so wird der Lichtstreif, sobald die Pfeife angeblasen wird, in eine Reihe einzelner Flammen zerlegt erscheinen, Fig. 14, deren Anzahl sich verdoppelt, wie die untere Flammenreihe der Fig. 14 zeigt, wenn die erste Pfeife mit einer zweiten vertauscht wird, welche die Octav der ersten gibt.

Von irgendetem Ton ausgehend ist dessen Quint, dessen große Terz ein Ton, der $\frac{1}{2}$ mal, $\frac{1}{3}$ mal so viel Schwingungen macht als der erstere. Wird der Grundton durch eine Pfeife von der Länge l erzeugt, so erhält man seine Terz, seine Quint und seine Octav durch Pfeifen von der Länge $\frac{2}{3}l$, $\frac{3}{4}l$ und $\frac{1}{2}l$.

Genauer als durch Pfeifen kann man die Schwingungszahl eines Tons durch die Sirene bestimmen, deren einfachste Form in Fig. 15 dargestellt ist. An einer horizontalen Axe, welche in rasche Rotation versetzt werden kann, ist eine starke Pappscheibe angebracht, in welcher sich 4 concentrische Löcher befinden; die innerste hat 48, die zweite hat 48 $\cdot \frac{1}{2} = 60$, die folgende 48 $\cdot \frac{2}{3} = 72$, die äußerste hat 48 $\cdot 2 = 96$ Löcher. Durch ein Kautschukrohr B , in welchem ein Holzrohr steckt, dessen Mündung etwas enger ist als ein

*) In Fig. 9, I steht T an der unternen Stelle; es muß verlesen aber T in Fig. 9, II stehen.

Loch der Scheibe, wird nun ein Luftstrom gegen eine rotirende Köcherreihe geblasen und dadurch ein Ton erzeugt, dessen Schwingungszahl gleich ist der in einer Secunde vor der Mündung passirenden Köcher. Macht z. B. die Scheibe 18 Umdrehungen in der Secunde, so wird durch die innerste Köcherreihe ein Ton erzeugt, dessen Schwingungszahl $18 \cdot 48 = 864$ ist. Es ist dies das zweigestrichene a (a''). Die zweite, dritte und äußerste Köcherreihe gibt dann bei gleicher Umdrehungsgeschwindigkeit der Scheibe die große Terz, die Quint und die Octav von a'' .

Mit großer Genauigkeit läßt sich die Schwingungszahl einer Stimmgabel mit Hülfe des Phonographen, Fig. 16, bestimmen. Ein eiserner Stab, welcher an seinem einen Ende A mit einem durch die Schraubenmutter b geführten Schraubengewinde versehen ist, auf der andern Seite aber mittels einer Kurbel umgedreht werden kann, trägt in seiner Mitte eine messingene Trommel T. Auf dieser Trommel wird ein Papiermantel befestigt und mit einer stark ruhenden Flamme geschwärzt. An die beruhte Fläche wird alsdann eine große, in einem passenden Stativ befestigte Stimmgabel so herangerückt, daß der an der einen Zinke befestigte metallene feine Schreibstift r schwach gegen die Papierfläche angeedrückt ist. Wird nun die Stimmgabel durch Anstreichen mit dem Fiedelbogen in Vibrationen versetzt und gleich der Cylindrer gedreht, so schreibt der Metallstift r auf der beruhten Fläche eine Sinuscurve in der Art, wie Fig. 17 zeigt. Nun ist aber die Stimmgabel mit dem einen, die Aere der metallenen Walze mit dem andern Pole der Nebenpirale eines kräftigen Inductionsapparats verbunden. So oft der Hauptstrom desselben unterbrochen wird, schlägt ein Funke zwischen r und der Metallwalze über, welcher ein feines Loch in das geschwärzte Papier macht, wie solche bei a, b und c angedeutet sind. Wenn nun dafür gesorgt ist, daß der Hauptstrom genau alle Secunden einmal unterbrochen wird, so wird das Ende jeder Secunde durch ein solches Pünktchen markirt und man kann dann leicht die Anzahl der Schwingungen zählen, welche in 1" gemacht worden sind.

Eine gespannte Saite kann entweder ihrer ganzen Länge nach schwingen, wie bei a, Fig. 18, angedeutet ist, und dann gibt sie ihren Grundton, oder sie kann durch einen Schwingungsknoten in 2 gleiche Theile getheilt sein, wie bei b, Fig. 18, und dann gibt sie die Octav des Grundtons, oder sie kann durch zwei Schwingungsknoten in 3 gleiche Theile getheilt sein, wie bei c, Fig. 18, und dann gibt sie die Duodecim (die Quint der Octav) ihres Grundtons.

Um Versuche über die Gesetze tönender Saiten anzustellen, gebraucht man das Monochord, Fig. 19. Die Schwingungszahl einer Saite ist unter sonst gleichen Umständen ihrer Länge umgekehrt proportional; man braucht also nur die hintere der beiden Saiten, Fig. 19, welche durch einen Stimmgast gespannt ist, mittelst der Klemme, Fig. 20, auf $\frac{1}{2}$, auf $\frac{2}{3}$, auf $\frac{1}{3}$ ihrer ganzen Länge zu verkürzen, um die große Terz, die Quint und die Octav ihres Grundtons zu erhalten.

Die Schwingungszahl einer Saite ist der Quadratwurzel aus der Spannkraft proportional. Wenn also die vordere Saite bei Anhängung des Gewichts p einen bestimmten Ton gibt, so muß das Gewicht 4 p angehängt werden, wenn man die Octav jenes Tons erhalten will.

Die Transversalschwingungen elastischer Stäbe hängen davon ab, auf welche Weise sie befestigt sind. Seiner ganzen Länge nach ohne Schwingungsknoten kann ein elastischer Stab schwingen, wenn er an einem

Ende befestigt ist. Dieser Art sind die Schwingungen, welche jeder der beiden Scheitel einer tönenden Stimmgabel macht. Um den Ton der Stimmgabel hörbarer zu machen, setzt man ihn auf ein Resonanztäfelchen, Fig. 21, dessen Länge gleich ist $\frac{1}{4}$ der Wellenlänge der Stimmgabeltons.

Legt man einen Stahlstab über zwei gespannte Schnüre, wie Fig. 22 andeutet, so gibt er mit einem hölzernen Hämmerchen angeschlagen einen vollen Ton; dabei bilden sich zwei Schwingungsknoten, deren jeder um $\frac{1}{4}$ der Stablänge vom nächsten Ende absteht. Je kürzer der Stab, desto höher der Ton; die Schwingungszahl ist bei sonst unveränderten Dimensionen dem Quadrat der Stablänge umgekehrt proportional; man muß also den Stab $\sqrt{\frac{1}{2}} = 0,7$ mal kürzer machen als einen andern gleichbreiten und gleichdicken, wenn die Octav desselben geben soll. Man hat dies benutzt, um die obere Grenze der Hörbarkeit ausfindig zu machen. Ein Stahlstab von 149 Millimeter Länge um 20 Millimeter Durchmesser gibt den Ton c, (zweigestrichene c). Es müssen also Stäbe von gleichem Durchmesser, die nur $149\sqrt{\frac{1}{2}} = 105,3$; $149\sqrt{\frac{1}{3}} = 86,6$ oder $149\sqrt{\frac{1}{4}} = 74,5$ Millimeter lang sind, die Töne c_2 und c_3 geben. Es lassen sich auch leicht Stäbe stellen, welche das e und das g der 5., 6. und 7. gestrichenen Octave geben müßten. Die längeren dieser Stäbe werden ausgelegt wie Fig. 23, die kürzeren werden aufgebängt, wie Fig. 24 zeigt. Weniger seine Ohren können schon c_2 (12288 Schwingungen in 1") nicht mehr hören, während selbst die besten Ohren c_3 (24576 Schwingungen in 1") nicht mehr wahrnehmen können.

Man hat in neuerer Zeit Mittel gefunden, das akustische Intervall zweier Stimmgabeln sehr genau optischem Wege zu controliren. In dem Wiederschlag, welcher die Flamme einer Argand'schen Lampe, Fig. 25, umgibt, ist eine kleine Oefnung an angebracht, durch welche ein Lichtstrahl auf einen kleinen Spiegel B, der an einer horizontal gestellten großen Stimmgabel befestigt ist; der hier reflectirte Strahl trifft einen zweiten kleinen Spiegel, der von einer vertical aufgestellten Stimmgabel getragen wird. Die hier zum zweiten male reflectirten Strahlen werden endlich von einer Linse aufgefangen, welche auf einem hinter ihr aufgestellten Schirm das Bild des Lichtpunkts A entwirft. Sind beide Stimmgabeln ruhig, so erscheint dieses Bild als ein heller Punkt, welcher zur horizontalen Lichtlinie wird, wenn nur die horizontale, zur verticalen Lichtlinie aber, wenn nur die verticale Stimmgabel durch Anstreichen mit dem Fiedelbogen zum Vibriren gebracht worden ist. Wenn aber beide Stimmgabeln gleichzeitig vibriren, so bildet der Lichtpunkt eine Curve, deren Gestalt von dem Intervall der beiden Stimmgabeln abhängt.

Wenn beide Stimmgabeln unisono sind, so ist resultirende Curve entweder eine schiefstehende gerade Linie oder eine Ellipse, kurz eine der Curven der oberen Reihe der Fig. 26 oder eine Zwischenform, wenn aber in eine Stimmgabel die Octav der andern ist, so entwirft eine der Curven der untern Reihe oder eine ihrer Zwischenformen.

Wenn das Intervall der beiden Stimmgabeln genau ist, wenn also beide genau unisono sind, so wenn die eine genau die Octav der andern ist, so bleibt die Gestalt der Curve unverändert, sie wird nur etwas kleiner, weil die Vibrationen der Stimmgabeln kleiner werden. Wenn aber das Intervall der Stimmgabeln nicht ganz genau ist, so nimmt die Curve an drehender Bewegung an. Sind z. B. die beiden Stimmgabeln nahezu unisono, so geht nach und nach die Form

a in b, b in c, c in d, d in e und dann wieder umgekehrt e in d u. s. w. über. Wenn nun zu einer vollen Drehung etwa 5 Sekunden erforderlich sind, so kann man daraus schließen, daß die eine Stimmgabel in 5 Sekunden 1 Schwingung mehr macht als die andere. Auf diese Weise wird die geringste Abweichung vom genauen Intervall bemerkt.

Elastische Stäbe können auch in longitudinaler Richtung vibriren und befolgen dann die Gesetze vibrierender Luftsäulen in Pfeisen. Wenn z. B. Holzstäben, welche in einen Holzstöß eingeleimt sind, wie Fig. 27 zeigt, mit den Fingern, zwischen denen man etwas Kolophonium zerrieben hat, von oben nach unten gestrichen werden, so geben sie einen reinen Ton. Das zweite, dritte und vierte Stäbchen gibt die große Terz, die Quint und die Octav des ersten, wenn ihre Länge $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$ und $\frac{1}{4}$ derselben beträgt.

Um ebene Platten von Metall oder Glas zum Tönen zu bringen, spannt man sie in eine Zwinge ein, wie Fig. 28 zeigt. Mit einem Fiedelbogen angestrichen theilen sie sich in einzelne, durch Knotenlinien getrennte Abtheilungen, welche für sich schwingen. Man kann die Lage der Knotenlinien sichtbar machen, wenn man feinen Sand auf die Platte streut und sie dann zum Tönen bringt; der Sand häuft sich dann an den ruhenden Stellen an und bildet Figuren, wie deren einige in Fig. 29 abgebildet und unter dem Namen der Chladni'schen Klangfiguren bekannt sind. Die in Fig. 29 dargestellten Figuren entstehen, wenn die eine quadratische Platte in der Mitte festgehalten wird und man am Rande an der mit b bezeichneten Stelle streicht, während man die mit a bezeichneten Stellen mit dem Finger berührt. Runde Platten, welche in der Mitte eingepannt sind, geben radiale Figuren, und zwar vier Strahlen, wenn der angehaltene und angestrichene Punkt des Randes um 45° , sechs Strahlen, wie Fig. 30b, wenn der gestrichene Punkt um 30° vom angehaltenen abliegt. Die Klangfiguren runder Scheiben bilden concentrische Ringe, wie Fig. 30, wenn sie auf irgendeine Weise vom Mittelpunkt aus in Vibrationen gesetzt werden.

Die Vibrationen dünner metallischer Plättchen sind an und für sich fast ganz klanglos, sie können aber die Bildung eines kräftigen Klangs vermitteln, wenn ein Luftstrom aus einer Duesnung hervorbringt, welche durch die Vibrationen einer solchen elastischen Platte in regelmäßigen Intervallen geschlossen und wieder geöffnet wird. Derartige Instrumente werden Zungenwerke genannt. Die einfachste Form der Zungen wird durch Fig. 31 und 32 erläutert; es ist diejenige, welche bei der Mund- und Blasebalgharmonica (Harmonium) vorkommt. In der Mitte einer Messingplatte aa, welche in Fig. 31 perspectivisch, in Fig. 32 aber im Durchschnitt dargestellt ist, befindet sich eine rechteckige Duesnung bb, welche durch ein elastisches Metallblättchen zz bedeckt wird. In ihrer Ruhelage sowohl, wie in der Lage z₁, Fig. 32, wird die Duesnung durch die Zunge geschlossen, während sie frei wird, wenn die Zunge in die Lage z₂ kommt. Die Messingplatte aa bildet nun die untere Grenzfläche einer geschlossenen Kammer, in welcher die Luft durch Einblasen verdichtet wird. Die verdichtete Luft übt einen Druck auf die Zunge aus, durch welchen die Vibrationen derselben eingeleitet werden. So oft die vibrierende Zunge in die Lage z₂ kommt, dringt durch die freigewordene Duesnung ein Luftstoß in die Richtung des Pfeils hindurch, der eine Verdichtungsstelle erzeugt, und so entsteht ein Ton, welcher von der Schwingungsdauer der vibrierenden Zunge abhängt.

In etwas anderer Form kommen auch Zungenwerke bei Orgeln in Anwendung.

Eine zweite Art der Zungenwerke besteht aus membranösen elastischen Platten, welche die beiden Lippen eines schmalen Spaltes bilden und welche durch ihre Oscillationen den Spalt abwechselnd öffnen und schließen. Eine solche membranöse Zungenpfeife läßt sich auf folgende Weise herstellen. Von einer $\frac{1}{2}$ bis $\frac{1}{4}$ Zoll weiten Röhre dünnen Kautschuks schneide man ein 2 Zoll langes Stück ab und stecke es auf das eine Ende eines gleichweiten Glasrohrs, wie Fig. 33 zeigt. Wenn man nun die Kautschukröhre an ihrem obern Ende an zwei gegenüberliegenden Punkten faßt und auseinanderzieht, so bildet sich eine Röhre, deren Ränder von Kautschuk sind, und wenn man nun von der andern Seite her in das Rohr hineinbläst, so erhält man einen Ton, der um so höher wird, je stärker die beiden Lippen angespannt werden.

Im Kehlkopf, dem menschlichen Stimmorgan, entstehen die Töne gleichfalls auf die durch Fig. 33 erläuterte Weise.

Es bleibt uns nun noch übrig zu besprechen, woher der Unterschied der Klangfarbe verschiedener Instrumente rührt, woher es kommt, daß z. B. der auf einer Flöte gespielte Ton von demjenigen zu unterscheiden ist, welcher der gleichen Note auf dem Klavier, der Violine, der Trompete u. s. w. entspricht. Es rührt das nach den neuesten Untersuchungen daher, daß die Klänge der meisten Instrumente nicht einfach sind, sondern daß neben dem Ton, welcher einer bestimmten Note zukommt, noch eine Reihe von Obertönen mitklingt, d. h. Töne, welche durch 2, 3, 4 mal u. s. w. so viel Schwingungen erzeugt werden als der Grundton. Wenn man z. B. auf dem Klavier die Taste anschlägt, welche der Note c entspricht, so hört man nicht allein den Ton c (128 Schwingungen in 1"), sondern einen zusammengesetzten Klang, in welchem außer dem allerdings vorherrschenden c auch noch die Töne c₁, c₂, c₃, c₄ mit 2, 3, 4, 5 und 6 mal so viel Schwingungen in der Secunde enthalten sind. — Der Klangcharakter eines Instruments hängt nun davon ab, welche Obertöne und in welcher Stärke dieselben den Grundton begleiten.

Ein geübtes Ohr kann die Obertöne aus der Klangmasse herausgehören; um dieselben aber mit größerer Sicherheit nachzuweisen, wendet man die sogenannten Resonatoren an, d. h. gläserne oder messingene Hohlkugeln von der Form Fig. 35, oder tonische aus Zinkblech verfertigte Röhren, Fig. 34, oder endlich einerseits offene Bappdröhen von der Form Fig. 36, welche solche Dimensionen haben, daß die eingeschlossene Luftmasse ins Selbsttönen kommt, wenn die Wellen eines bestimmten Tons einfallen, wie wir dies bei dem Apparat Fig. 5 gesehen haben. Der Duesnung gegenüber sind diese Resonatoren mit einer engern Mündung versehen, mittels deren man sie in das Ohr einführen kann. Um z. B. die Obertöne von c nachzuweisen, muß man mehrere Resonatoren haben, deren Eigenton der Reihe nach das eingestrichene c und g, das zweigestrichene c, e und g u. s. w. ist. Hält man nun einen dieser Resonatoren an das Ohr, so hört man den ihm entsprechenden Oberton (z. B. g₁), wenn auf dem Klavier c angeschlagen wird. Man hört diesen Ton g nicht, trotzdem daß man den entsprechenden Resonator ans Ohr hält, wenn man auf dem Klavier d anschlägt, weil g₁ kein Oberton von d ist, man hört den Ton g, aber auch nicht, wenn der Ton c auf einer weiten geböhten Pfeife angeblasen wird, weil die Töne weiter geböhter Pfeisen keine Obertöne haben.

C. Optik.

(Tafel 4, Tafel 5 und Figur 1–10 auf Tafel 6.)

I. Fortpflanzung des Lichts und Photometrie.

Optik ist die Lehre vom Licht.

Von einem leuchtenden oder von einem erleuchteten, Licht zerstreuten Körper aus verbreitet sich das Licht geradlinig nach allen Seiten hin, solange die Lichtstrahlen in dem gleichen Stoffe (Mittel) bleiben, solange also ein Lichtstrahl im Wasser, solange er in Glas, solange er in Luft von gleichförmiger Dichtigkeit sich fortbewegt, findet keine Richtungsänderung statt.

Eine Folge der geradlinigen Fortpflanzung des Lichts ist der Schatten. Wenn die von einem leuchtenden Punkte s , Fig. 1, Taf. 4, ausgehenden Strahlen einen undurchsichtigen Körper treffen, so wird sich hinter demselben ein Raum befinden, in welchen von s aus kein Lichtstrahl eindringen kann, und dieser Raum wird der Schatten genannt.

Wenn der leuchtende Körper eine namhafte Ausdehnung hat, so ist außer dem vollen Schatten, Kernschatten, in welchen gar kein Licht vom leuchtenden Körper aus eindringt, noch ein Halbschatten, d. h. ein Raum zu unterscheiden, in welchem eine theilweise Erleuchtung stattfindet. Fig. 2 erläutert die Bildung des Schattens für den Fall, daß der leuchtende Körper A größer ist, als der Schatten gebende B . Der Kernschatten bildet hier einen Kegel, dessen Spitze in s liegt. Während der Durchmesser des Kernschattens mit der Entfernung von B abnimmt, nimmt der Durchmesser des Halbschattens zu. Jenseit s verschwindet der Kernschatten vollständig, während der immer breiter werdende Halbschatten allmählich schwächer und verschwommener wird.

Durch einen Schirm m , Fig. 2, aufgefangen, würde der Schatten das Ansehen Fig. 3 haben.

Es werde ein Theil des vom leuchtenden Punkte L , Fig. 4, ausgehenden Lichts durch einen quadratischen Papierschirm $a b c d$ aufgefangen, welcher etwa in 1 Meter Entfernung von L aufgestellt ist, so wird die Erleuchtung dieser Fläche eine bestimmte Stärke (Intensität) haben, die wir mit J bezeichnen wollen; hinter der Fläche $a b c d$ aber wird sich ein Schatten bilden, dessen quadratischer Querschnitt mit der Entfernung von L zunimmt. Denken wir uns den Schatten von $a b c d$ durch eine Fläche aufgefangen, welche um 2 Meter von L entfernt ist, so wird er auf dieser Fläche ein Quadrat $A B C D$ bilden, dessen Seiten doppelt so groß sind als die des schattengebenden Quadrats $a b c d$. Daraus folgt aber, daß der Flächeninhalt des Quadrats $A B C D$ viermal so groß ist als der des Quadrats $a b c d$. Wird nun der Schirm $a b c d$ entfernt und das von L ausgehende Licht auf einem 2 Meter weit von L entfernten Papierschirm aufgefangen, so wird sich nun alles Licht, welches vorher die Fläche $a b c d$ erleuchtete, über eine 4mal größere Fläche $A B C D$ verbreiten. In der doppelten Entfernung ist also die Stärke der Erleuchtung 4mal geringer, sie ist nur $\frac{1}{4} J$. In derselben Weise läßt sich darthun, daß in der 3fachen, 4fachen u. s. w. Entfernung die Stärke der Erleuchtung 3 mal 3 oder 9 mal, 4 mal 4 oder 16 mal geringer ist als in der 1fachen Entfernung. Kurz, die Stärke der Erleuchtung nimmt ab im umgekehrten Verhältniß des Quadrats der Entfernung.

Dieser eben theoretisch abgeleitete Satz läßt sich auch experimentell beweisen. In die Mitte eines etwas über 12 Fuß langen, auf der Seite mit einem Maßstab, oben mit einer Rinne versehenen Ballens, Fig. 5, in welche passend sich mehrere Holzklöße leicht hin- und herschieben lassen, wird einer dieser Holzklöße gestellt, welcher einen mit Papier überspannten Rahmen s trägt. In der Mitte

des Papierbildes ist ein Fettstück angebracht, welches hell auf dunkeln Grund erscheint, wenn er flücker von der Rückseite, dunkel auf hellem Grunde, wenn er flücker von der Vorderseite beleuchtet ist; bei gleichartiger Beleuchtung von vorn und hinten muß also dieser Fettstück verschwinden. Dies erfolgt aber in der That, wenn man in einer beliebigen Entfernung vom Papierbild s einen Schieber b mit vier Kerzenflammen aufstellt, wie es unsere Figur zeigt, und dann den nur eine Kerzenflamme tragenden Schieber a dem Schirm s so weit nähert, daß er nur noch halb so weit von s entfernt ist als b .

Man kann dieselbe Vorrichtung auch benutzen, um die Stärke zweier Lichtquellen zu vergleichen. Handelt es sich z. B. um die Vergleichung einer Kerzenflamme mit einer Argand'schen Lampe, so wird die Lampe auf die eine, die Kerze auf die andere Seite des Schirms s gestellt und leuchtende Lichtquelle so lange verschoben, bis der Fettstück nicht mehr sichtbar ist. Nehmen wir an, dies sei erreicht, wenn die Lampe 6 , die Kerzenflamme 2 Fuß vom Schirm entfernt ist, so verhält sich die Lichtstärke der Lampe zu der der Kerzenflamme wie $6 \cdot 6$ oder 36 zu $2 \cdot 2$ oder 4 , die Leuchtkraft der Lampe ist also gleich der Leuchtkraft von 9 Kerzenflammen.

Fig. 6 erläutert eine andere Methode, die Leuchtkraft zweier Lichtquellen zu vergleichen. Vor einer weißen Wand wird ein etwa bleistiftoides Stäbchen s angebracht und die beiden Lichtquellen k und g so gestellt, daß das Stäbchen zwei Schatten a und b auf die Wand wirft. Wenn diese beiden Schatten ungleich dunkel erscheinen, so nähert man die schwächere Lichtquelle, bis die Gleichheit der beiden Schatten erreicht ist. Nun werden die Abstände der beiden Lichtquellen von der Wand gemessen und danach dann das Verhältniß der Lichtstärken auf die oben erläuterte Weise berechnet.

II. Reflexion des Lichts (Katoptrik).

Lichtstrahlen, welche irgendeinen Körper treffen, werden

- entweder I. an der Oberfläche desselben zurückgeworfen und zwar
 - a) regelmäßig gespiegelt, oder
 - b) unregelmäßig zerstreut,
- oder II. sie bringen in den Körper ein und werden
 - a) von demselben durchgelassen, oder
 - b) von demselben verschluckt, absorbiert.

Die regelmäßig gespiegelten, reflectirten Strahlen pflanzen sich von jedem Punkte der Oberfläche des spiegelnden Körpers aus nur nach einer einzigen bestimmten Richtung fort, die alsbald näher bestimmt werden soll, während sich die unregelmäßig zerstreuten Strahlen von der zurückwerfenden Fläche aus nach allen Seiten hin verbreiten. Die von der rauhen Oberfläche der meisten Körper unserer Umgebung unregelmäßig zerstreuten Strahlen sind es, welche uns diese Körper in ihrer wahren Gestalt sichtbar machen.

Wenn ein Lichtstrahl sn , Fig. 7, auf eine spiegelnde Fläche ss' trifft, so wird derselbe nach der Richtung reflectirt, welche mit dem so gleich zu definirenden Einfallslot np und dem einfallenden Strahl sn in der Ebene liegt und einen Winkel r mit dem Einfallswinkel i macht, welcher dem Winkel zwischen dem Einfallslot und dem einfallenden Strahl gleich ist, oder mit andern Worten: der Reflexionswinkel ist dem Einfallswinkel gleich.

Mit dem Namen des Einfallslot p bezeichnet man das Perpendikel np , welches man sich in denjenigen Punkte n der spiegelnden Ebene, in welcher derselbe vom Lichtstrahl sn getroffen wird, auf der senkrecht denken kann.

Die Wichtigkeit dieses Spiegelungsgesetzes läßt sich nit Hülfe des Apparats, Fig. 8, nachweisen. Der kleine Spiegel f , welchen unsere Figur von der Rückseite zeigt, ist auf einer horizontalen, um einen verticalen Zapfen drehbaren, mit der radienartigen Verankerung $b c$ versehenen Messingscheibe b befestigt, daß der Zeiger $b c$ rechtwinklig auf der Ebene des Spiegels f steht, daß also $b c$ die Richtung des Einfallslotes für den Spiegel f bezeichnet.

Der Zapfen nun, um welchen sich die fragliche Messingscheibe mit dem Spiegel f und dem Zeiger $b c$ drehen läßt, befindet sich im Mittelpunkt des halbkreisförmigen Bretes A , um dessen gekrümmten Theil ein, dasselbe überragender Streifen von Messingblech gelegt ist, in dessen Mitte bei a ein verticaler Spalt angebracht ist. Der Viertelkreis von a nach der rechten Seite hin ist in 90° getheilt. Stellt man nun der Reihe nach den Zeiger $b c$ auf die Theilstriche 10, 20, 30 und 40, so wird ein durch den Spalt a einbringendes Strahlenbündel, welches auf die Mitte des Spiegels f trifft, von diesem nach den Theilstrichen 20, 40, 60 und 80 reflectirt werden.

Aus dem Spiegelungsgesetz erklärt sich nun auch die Entstehung der Spiegelbilder. Es sei $s s'$, Fig. 9, in ebener Spiegel, A ein vor der Ebene desselben befindlicher leuchtender Punkt. Die in n und in p den Spiegel von A aus treffenden Strahlen werden dem Spiegelungsgesetz zufolge nach $n o$ und nach $p q$ reflectirt. Verlängert man nun die reflectirten Strahlen $n o$ und $p q$ rückwärts, so schneiden sich diese Verlängerungen in dem Punkte a , welcher auf dem von dem leuchtenden Punkte A auf die Spiegelebene gefällten Perpendikel ebenso weit hinter der Spiegelebene liegt, wie A sich vor derselben befindet.

Alle von A aus auf den Spiegel fallenden Strahlen werden sich also nach der Reflexion so fortpflanzen, als ob sie von dem hinter der Spiegelebene gelegenen Punkte a kämen, a ist das Spiegelbild von A .

In Fig. 10 sei AB ein vor der Ebene des Spiegels $s s'$ befindlicher Gegenstand, so ist nach dem oben Gesagten a das Bild von A , b ist das Bild von B und ab das Bild des Gegenstandes AB . Man übersieht leicht, daß Bild und Gegenstand zur Ebene des Spiegels symmetrisch sind. Ein in o befindliches Auge sieht das Bild von B nach der Richtung op , das Bild von A nach der Richtung on .

Zu den wissenschaftlichen Anwendungen ebener Spiegel gehört das Helioskop; es ist ein ebener Spiegel, mittels dessen ein Bündel Sonnenstrahlen in horizontaler Richtung durch eine im Fensterladen angebrachte Oeffnung in ein verfinstertes Zimmer hineingeworfen werden kann. Fig. 11 stellt ein einfaches Helioskop in Verbindung mit dem später zu besprechenden Sonnenmikroskop dar. Damit die vom Spiegel A reflectirten Strahlen stets dieselbe Richtung behalten, während doch die Sonne ihre Stellung am Himmelsthorizonte fortwährend ändert, muß die Stellung desselben in entsprechender Weise verändert werden können. Es wird dies dadurch erreicht, daß der Spiegel M um eine zur Ebene des Ladens rechtwinklige horizontale Axe mittels des Knopfes A gedreht und seine Neigung gegen die Ebene des Ladens mittels des Knopfes B und einer kleinen Schraube ohne Ende beliebig geändert werden kann. Bei andern Helioskopen wird die Drehung des Spiegels durch ein Uhrwerk vermittelt.

Wenn man zwei ebene Spiegel unter einem Winkel zusammenstellt und irgendeinen Gegenstand A , Fig. 12, zwischen dieselben bringt, so sieht man außer dem Gegenstand zunächst noch ein Bild desselben nach einmaliger Reflexion in jedem Spiegel (B und B'). Das Bild

jedes Spiegels dient aber wieder als Object für den andern, und so sieht man zwei weitere Bilder C und C' , nach zweimaliger Reflexion. Wenn der Winkel, den die Spiegel miteinander machen $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ des ganzen Kreisumfangs ist, so sieht man ihn 2mal, 3mal, 4mal, 10mal. Daraus beruhen das Kaleidoscop und das Debusskop.

Die Spiegelung des Lichts auf gekrümmten Flächen folgt ganz den Gesetzen, welche wir für ebene Spiegel kennen lernten. Von einer krummen Fläche wird nämlich ein Lichtstrahl nach derselben Richtung reflectirt, als ob er die Berührungsebene der krummen Fläche an der fraglichen Stelle getroffen hätte. Denkt man sich also in dem vom Lichtstrahl getroffenen Punkt einer krummen Oberfläche eine Normale gezogen, d. h. eine Linie, welche rechtwinklig auf der Berührungsebene des getroffenen Punktes steht, so ist dies das Einfallslot.

In der optischen Praxis werden wol kaum andere gekrümmte Spiegel gebraucht, als solche, deren Oberfläche ein Stück einer Kugeloberfläche ist. Wenn die innere, dem Krümmungsmittelpunkt zugewendete Fläche die spiegelnde ist, so nennt man die Spiegel Hohlspiegel, Concavspiegel oder auch Sammelspiegel. Wenn dagegen die Reflexion der Strahlen auf der dem Krümmungsmittelpunkt abgewendeten Fläche stattfindet, so nennt man sie Convex- oder Zerstreuungsspiegel.

In Fig. 13 stellt MM' den Durchschnitt eines sphärischen Hohlspiegels mit einer durch seine Mitte d und seinen Krümmungsmittelpunkt c gelegten Ebene dar. Die durch d und c gelegte gerade Linie ist die Hauptaxe des Hohlspiegels.

Wenn irgendein Lichtstrahl ab , Fig. 14, einen Hohlspiegel in einem Punkt b trifft, so ergibt sich die Richtung des reflectirten Strahls durch folgende Construction: man ziehe den Radius $b c$, welcher das Einfallslot für den Strahl ab ist, und ziehe alsdann eine Linie $b g$, welche mit $b c$ einen Winkel r macht, welcher gleich ist dem Einfallswinkel i .

Führt man diese Construction für einen Strahl aus, welcher sich parallel mit der Hauptaxe des Spiegels fortpflanzt, wie dies für den Strahl ab , Fig. 14, der Fall ist, so schneidet der reflectirte Strahl bg die Axe des Hohlspiegels in einem Punkte F , welcher zwischen d und C in der Mitte liegt, vorausgesetzt, daß die Krümmung von d bis b , also der Winkel r nur sehr klein ist.

Daraus folgt dann ferner, daß wenn ein Bündel Lichtstrahlen parallel mit der Hauptaxe auf einen schwach gekrümmten Hohlspiegel fällt, Fig. 15, daß alsdann alle diese Strahlen so reflectirt werden, daß sie die Axe in demselben Punkte F schneiden, welcher der Hauptbrennpunkt, Focus, des Hohlspiegels genannt wird. Die Entfernung dF , welche dem halben Krümmungshalbmesser gleich ist, heißt die Brennweite oder Focaldistanz.

Ein parallel mit der Axe auf einen Hohlspiegel fallendes Strahlenbündel kann man betrachten, als sei es ausgegangen von einem auf der Hauptaxe liegenden unendlich weit entfernten leuchtenden Punkte. Rückt der leuchtende Punkt auf der Axe dem Hohlspiegel näher, so entfernt sich der Vereinigungspunkt vom Spiegel. Die Construction ergibt z. B., daß alle von dem leuchtenden Punkt A , Fig. 16, ausgehenden Strahlen in einem Punkte a wieder vereinigt werden, welcher weiter vom Hohlspiegel entfernt ist als F . Je näher A dem Spiegel rückt, desto mehr entfernt sich sein Bild a von demselben. Ist der leuchtende Punkt bis zum Krümmungsmittelpunkt C vorgedrückt, so werden alle

von C auf den Hohlspiegel fallenden Strahlen auch nach C zurückgeworfen. Rührt der leuchtende Punkt von C dem Spiegel noch näher, so rückt der Vereinigungspunkt immer noch weiter weg, wäre z. B. der leuchtende Punkt in a, so würden alle von ihm auf den Hohlspiegel fallenden Strahlen in A vereinigt werden.

Die so zusammengehörigen Punkte A und a werden conjugirte Punkte genannt.

Be findet sich der leuchtende Punkt im Brennpunkt F selbst, so liegt der Vereinigungspunkt in unendlicher Entfernung, oder mit andern Worten, alle von dem Brennpunkt F, Fig. 15, auf den Hohlspiegel fallenden Strahlen werden als ein mit der Hauptaxe paralleles Strahlenbündel reflectirt. Wenn der leuchtende Punkt innerhalb der Brennweite liegt, wenn er sich z. B. in A, Fig. 17, befindet, so kann der Spiegel die ihn treffenden Strahlen nicht mehr convergent machen, sie divergiren nach der Reflexion, so als ob sie von einem hinter dem Spiegel gelegenen Punkt a kämen.

Wir haben bisher nur die Bilder solcher leuchtender Punkte besprochen, welche auf der Hauptaxe des Hohlspiegels liegen. Wenn nun ein leuchtender Punkt A, Fig. 18, außerhalb der Hauptaxe liegt, so kann man sich von ihm aus eine gerade Linie Aa durch den Krümmungsmittelpunkt C nach dem Hohlspiegel gezogen denken, welche den Namen einer Nebenaxe führt. Das Bild eines auf einer Nebenaxe liegenden leuchtenden Punktes befindet sich gleichfalls auf dieser Nebenaxe. Zwischen den gegenseitigen Entfernungen des leuchtenden Punktes und seines Bildes bestehen aber für die Nebenaxen genau dieselben Beziehungen wie für die Hauptaxe. Die von A ausgehenden Strahlen werden also durch den Hohlspiegel in a, die von B ausgehenden werden in b gesammelt, ab ist das Bild von AB. Befände sich umgekehrt in ab ein Gegenstand, so würde AB sein Bild sein.

Von einem Gegenstand, welcher um mehr als die doppelte Brennweite von dem Hohlspiegel absteht, entwirft derselbe ein verkleinertes verkleinertes, von einem Gegenstand aber, welcher zwischen dem Brennpunkt F und dem Krümmungsmittelpunkt C sich befindet, entwirft er ein vergrößertes vergrößertes Sammelbild.

Be findet sich ein Gegenstand AB, Fig. 20, innerhalb der Brennweite, so werden die von einem Punkt des Gegenstandes ausgehenden Strahlen nach der Spiegelung so divergiren, als ob sie von einem Punkt hinter dem Spiegel kämen. a ist der Divergenzpunkt der von A ausgehenden, b ist der Divergenzpunkt der von B ausgehenden Strahlen, ab ist also das aufrechte vergrößerte Bild des Gegenstandes AB.

Zwischen den Bildern entstehen, wenn der Gegenstand weiter vom Hohlspiegel entfernt ist als der Brennpunkt, wie in Fig. 18, und den Bildern solcher Gegenstände, welche sich innerhalb der Brennweite befinden, wie bei Fig. 20, besteht ein wesentlicher Unterschied. Im ersten Fall werden die von einem Punkte des Gegenstandes ausgehenden Strahlen im entsprechenden Punkte wirklich wieder vereinigt, sie werden hier gesammelt, weshalb man solche Bilder auch Sammelbilder nennt; im letztern Fall dagegen scheinen bloß die reflectirten Strahlen von einem Punkt hinter dem Spiegel her zu kommen, ohne daß sie in diesem Punkte wirklich vereinigt waren. Man kann deshalb diese Bilder, die man gewöhnlich als virtuelle Bilder bezeichnet, auch Scheinbilder nennen. Auch die Bilder ebener Spiegel gehören zu den Scheinbildern.

Wenn ein Bündel Strahlen parallel mit der Axe auf einen Converspiegel fällt, so werden sie, wie dies Fig. 21 erläutert, so reflectirt, als ob sie von

dem Hauptstreuungspunkte F kämen, der in der Mitte zwischen dem Spiegel und dem Krümmungsmittelpunkt C liegt.

Von irgendeinem vor einem Converspiegel befindlichen Gegenstand AB gibt derselbe, wie durch Fig. 22 erläutert wird, stets ein aufrechtes verkleinertes Scheinbild ab, wie nah oder fern vom Spiegel sich der Gegenstand AB befinden mag.

Die Sammelbilder kann man auf zweierlei Weise beobachten, entweder 1) indem man die vom Vereinigungspunkt aus wieder divergirenden Strahlen direct ins Auge gelangen läßt, als ob sie von einem an der Stelle des Bildes befindlichen Gegenstande kämen, oder 2) indem man das Sammelbild auf einem Papierschirm oder auf einer mattgeschliffenen Glasplatte auffängt und es dadurch von allen Seiten der sichtbar macht.

Der auf einem Papierschirm aufgefangenen Hohlspiegelbilder kann man sich bedienen, um mittels der optischen Bank auf die durch Fig. 19 erläuterte Weise darzutun, wie sich das Bild vom Spiegel entfernt, wenn sich ihm der Gegenstand nähert.

III. Brechung des Lichts (Dioptrik).

Wenn ein Lichtstrahl aus einem Mittel in ein anderes übergeht, z. B. aus Luft in Wasser, so ist dieser Uebergang stets mit einer Richtungsänderung verbunden, welche man als Brechung oder Refraction des Lichts bezeichnet.

Betrachten wir z. B. die Richtungsänderung, welche ein Lichtstrahl beim Uebergang von Luft in Wasser erleidet. Ein Lichtstrahl in, Fig. 23, welcher in die Grenzfläche zwischen Luft und Wasser trifft und mit dem in n errichteten Einfallslot einen Winkel i macht, wird sich nach dem Uebergang in Wasser nach der geraden Linie ns bewegen, welche mit dem Einfallslot einen Winkel r macht, der kleiner ist als i.

Zwischen dem Einfallswinkel i und dem Brechungswinkel r findet keine einfache Beziehung statt. Zeilen wir uns aber um den Punkt n einen Kreis gezogen, und von den Punkten a und b, in welchen derselbe den einfallenden und den gebrochenen Strahl schneidet, die Perpendikel ad und bf auf das Einfallslot gefällt, so verhält sich ad zu bf stets wie 4 zu 3.

Beim Uebergang aus Luft in Glas verfolgt der gebrochene Strahl eine solche Richtung, daß sich die beiden Perpendikel stets verhalten wie 3 zu 2.

Das Verhältniß dieser beiden Perpendikel nennt man den Brechungscoefficienten der Substanz. So ist z. B.

$\frac{4}{3} = 1,333$ der Brechungscoefficient des Wassers, $\frac{3}{2} = 1,5$ aber (nahezu) der Brechungscoefficient des klaren Glases.

Der Brechungscoefficient des bleihaltigen Flintglases ist 1,66, der des Aënils ist 1,81. Je größer der Brechungscoefficient einer Substanz ist, desto stärker lenkt sie die auf sie fallenden Lichtstrahlen ab.

Um das Brechungsgesetz zu erläutern, kann man sich des Apparates Fig. 24 bedienen, eines halbkreisförmigen Gefäßes, dessen gekrümmte Wand von der Mitte aus nach beiden Seiten hin in Grade getheilt ist. vorn ist das Gefäß durch eine ebene, undurchsichtige Wand begrenzt, welche in der Mitte mit einer kreisförmigen, durch eine Glasplatte verschlossenen Spalte versehen ist. Läßt man, nachdem das Gefäß bis zur Hälfte seiner Höhe mit Wasser gefüllt ist, ein Bündel Lichtstrahlen in schräger Richtung gegen die Fläche ab durch den Spalt eintreten, so wird der obere Theil desselben in Luft in unveränderter Richtung fortgehen

ährend der untere Theil desselben, in das Wasser tretend, gebrochen wird. An der Gradeintheilung der Rückwand kann man aber die Größe des Einfallswinkels des Brechungswinkels ablesen.

Wenn ein Lichtstrahl aus einem Mittel A in B und in B wieder in A übergeht (etwa aus Luft in Glas und dann wieder aus Glas in Luft), so ist der austretende Strahl $n'l$, Fig. 25, dem eintretenden in der Richtung parallel, wenn die beiden Grenzflächen von B parallel sind. Ist dies aber nicht der Fall, so weicht die Richtung $n'l$, Fig. 26, des austretenden Strahls von der des eintretenden ab, und zwar um so mehr, je größer der Winkel ist, den die Austrittsfläche CD mit der Eintrittsfläche AB macht, und je größer der Brechungscoefficient der zwischen den Grenzflächen AB und CD befindlichen Substanz ist.

Als Prisma bezeichnet man in der Optik ein von zwei gegeneinander geneigten ebenen Flächen begrenztes, durchsichtiges Mittel. Die Kante des Prismas ist die gerade Linie, in welcher sich die beiden Grenzflächen schneiden oder schneiden würden, wenn sie hinreichend verlängert wären. Die Basis eines Prismas ist die rechteckige Kante gegenüberliegende Begrenzungsfläche des Prismas, deren Lage bei dem Gang der Strahlen durch das Prisma gar nicht in Betracht kommt. Der brechende Winkel ist der Winkel, welchen die beiden brechenden Flächen des Prismas miteinander machen. Hauptschnitt nennt man den Querschnitt eines Prismas mit einer auf der brechenden Ebene rechtwinkligen Ebene. Sind $abcd$ und $abgf$ die brechenden Flächen des Glasprismas Fig. 30, so ab die brechende Kante, cdg die Basis und chg der auf der Hauptschnitt des Prismas. Bei den meisten Prismen beträgt der brechende Winkel 60, oft auch nur 45 Grad. Um ein Prisma leicht in beliebige Stellungen bringen zu können, wird dasselbe auf ein messingenes Stativ befestigt, wie es Fig. 31 zeigt. Wenn von irgendeinem Gegenstande a , Fig. 27, von einer brennenden Kerze, ein Lichtstrahl in der Richtung ad auf ein Prisma fällt und in der Richtung o austritt, so wird ein in o befindliches Auge die lamme a nach der Richtung oa' sehen, der Gegenstand erscheint also nach der Seite der brechenden Fläche hin abgelenkt. Das abgelenkte Bild erscheint scheinbar in einer eigentümlichen, später näher zu besprechenden Weise gefärbt.

Wenn ein Sonnenstrahl durch eine kleine Oeffnung der Richtung bd Fig. 28 in ein dunkles Zimmer tritt und man ihn durch ein Prisma auffängt, so beobachtet man eine Ablenkung und eine Färbung; man sieht das weiße Sonnenbild d , welches auf einer Oeffnung b gegenüberstehenden weißen Wand entstehen würde, wenn das Prisma nicht vorhanden wäre, in der Richtung bd der einfallenden Sonnenstrahlen nun so abgelenkt, daß bei rv ein in die Länge gezogenes, gebogenes Sonnenbild, das Spectrum entsteht, welches weiter noch ausführlicher besprochen werden soll.

Die Ablenkung, welche ein Prisma hervorbringt, ist abhängig von der Richtung der einfallenden Strahlen, ist am kleinsten, wenn die Strahlen symmetrisch durchgehen, wie $inop$, Fig. 29, der auf seinem Wege durch das Prisma gleiche Winkel mit der Eintrittsfläche d mit der Austrittsfläche macht.

Von großer Wichtigkeit für die Construction der optischen Instrumente ist die Brechung des Lichts in Linsen, mit welchem Namen man in der Optik einen jeden durchsichtigen Körper bezeichnet, dessen beiden Flächen Stücke von Kugeloberflächen sind. Meistens werden die Linsen aus Glas verfertigt. Man unterscheidet zwei Hauptklassen von Linsen, nämlich

1) Convergenz- oder Sammellinsen, und 2) Divergenz- oder Zerstreuungslinsen.

Fig. 32 stellt den Durchschnitt der drei verschiedenen Formen der Sammellinsen dar, nämlich Nr. 1 den einer biconvexen, Nr. 2 den einer planconvexen und Nr. 3 den einer concavconvexen Sammellinse. Diese drei Formen der Sammellinsen haben das Gemeinsame, daß sie in der Mitte dicker sind als am Rande, während die Zerstreuungslinsen, Fig. 33 (Nr. 1 biconcav, Nr. 2 planconcav, Nr. 3 concavconcav), in der Mitte dünner sind als am Rande.

Die Axe einer Linse ist die gerade Linie, welche die Krümmungsmittelpunkte der beiden sphärischen Grenzflächen miteinander verbindet, oder bei Linsen, deren eine Grenzfläche eben ist, das Perpendikel, welches man von dem Krümmungsmittelpunkte der gewölbten Fläche auf diese Ebene fallen kann.

Bei den Linsen wiederholen sich im wesentlichen dieselben Erscheinungen, die wir bei den gekrümmten Spiegeln bereits kennen lernten, und zwar entsprechen die Convergenzlinse den Hohlspiegeln, die Divergenzlinse den Konvexspiegeln.

Alle Strahlen, welche parallel mit der Axe auf eine Convergenzlinse fallen, Fig. 34, werden durch dieselbe so gebrochen, daß sie jenseit der Linse die Axe in einem und demselben Punkte F schneiden (vorausgesetzt, daß die Krümmung der Linse von der Mitte bis zum Rande nur unbedeutend ist), welcher der Brennpunkt oder der Focus der Linse genannt wird. Die Lage dieses Brennpunktes (dessen Abstand von der Linse die Brennweite genannt wird) hängt von dem Krümmungshalbmesser der sphärischen Flächen und von dem Brechungscoefficienten der Linsensubstanz ab. Für eine aus bleisubstanz (Crownsglas) verfertigte gleichgewölbte, biconvexe Linse fällt der Brennpunkt ungefähr mit dem Krümmungsmittelpunkt der einen Fläche zusammen.

Die parallel mit der Axe auf eine Linse fallenden Strahlen kann man, wie schon bemerkt, als von einem auf der Axe liegenden, aber unendlich weit entfernten leuchtenden Punkte herkommend, betrachten. Näher der leuchtende Punkt auf der Axe der Linse näher, so entfernt sich der Vereinigungspunkt auf der andern Seite von derselben. Befindet sich der leuchtende Punkt in S , Fig. 35, so ist der Vereinigungspunkt in R . Näher der leuchtende Punkt S bis zur doppelten Brennweite vor, Fig. 36, so entfernt sich der Sammelpunkt R gleichfalls bis zur doppelten Brennweite. Näher sich der leuchtende Punkt noch mehr, liegt er zwischen der einfachen und der doppelten Brennweite, so liegt der Vereinigungspunkt weiter entfernt als die doppelte Brennweite, und zwar um so mehr, je näher der leuchtende Punkt gerückt ist; so ist $g. B. S$, Fig. 36, der Vereinigungspunkt für die von R aus auf die Linse fallenden Strahlen. Befindet sich endlich der leuchtende Punkt im Brennpunkte F , Fig. 34, selbst, so liegt der Vereinigungspunkt in unendlicher Entfernung oder mit andern Worten, ein Strahlenbündel, welches vom Brennpunkt aus divergierend auf eine Linse fällt, tritt als ein mit der Axe paralleles Strahlenbündel aus.

Befindet sich ein leuchtender Punkt auf der Axe noch innerhalb der Brennweite, wie $g. B.$ der Punkt T , Fig. 37, so kann die Linse das von T aus auf sie fallende Strahlenbündel nicht mehr convergent, sondern nur weniger divergent machen, nach dem Durchgang durch die Linse divergieren die ursprünglich von T ausgehenden Strahlen so, als ob sie von einem weiter entfernten Punkte V herkämen.

Denken wir uns von einem Punkte A , Fig. 38, außerhalb der Hauptaxe eine gerade Linie durch den Mittelpunkt o der Linse gezogen, so ist dies eine $Re-$

benare. Alle von einem Punkte A der Nebenaxe aus auf eine Sammellinse fallenden Strahlen werden in einem Punkte a derselben Nebenaxe jenseit der Linse wieder geeinigt. Für die conjugirten Punkte A und a einer Nebenaxe bestehen in Beziehung auf ihre Abstände von der Linse dieselben Gesetze, wie für die Hauptaxe.

Daraus erklärt sich nun, daß eine Sammellinse von einem entfernten Gegenstande AB, Fig. 38, ein verkehrtes verkleinertes Bild ab entwirft. Von der Mitte der Linse aus gesehen, erscheinen Bild und Gegenstand unter gleichem Winkel. Die Größe des Gegenstandes verhält sich also zur Größe des Bildes wie der Abstand des Gegenstandes zum Abstand des Bildes.

Wenn der Gegenstand sehr weit entfernt ist, so erscheint das Bild ganz nahe beim Brennpunkt. Dem Gegenstand AB entspricht das verkleinerte Bild ab. Je näher der Gegenstand rückt, desto mehr entfernt sich das Bild, wobei es dann auch stets größer wird. Befindet sich der Gegenstand in der doppelten Brennweite, so ist auch das Bild um die doppelte Brennweite von der Linse entfernt, Bild und Gegenstand sind gleich groß. Liegt der Gegenstand der Linse näher als die doppelte Brennweite, so ist das Bild weiter von derselben entfernt, das Bild ist alsdann größer als der Gegenstand. Dem Gegenstand ab entspricht das verkehrte vergrößerte Bild AB.

Um die Beziehungen zwischen dem Gegenstand und seinem durch eine Sammellinse entworfenen Bilde durch den Versuch nachzuweisen, kann man sich der optischen Bank bedienen, wie es Fig. 15, Taf. 5, erläutert.

Wenn der Gegenstand sich noch innerhalb der Brennweite der Linse befindet, wie AB, Fig. 39, Taf. 4, so kann kein Sammelbild mehr entstehen, weil die von einem Punkte des Gegenstandes, etwa von A ausgehenden und auf die Linse fallenden Strahlen nach dem Durchgang durch dieselbe so divergiren, als ob sie von einem auf derselben Nebenaxe liegenden, aber weiter von der Linse entfernten Punkte a kämen. So entsteht denn von dem innerhalb der Brennweite befindlichen Gegenstand AB ein vergrößertes aufrechtes Scheinbild ab. Dieses Scheinbild betrachtet man, wenn man eine Sammellinse als Lupe benutzt.

Wie die Sammelbilder der Hohlspiegel, so lassen sich auch die Sammelbilder der Converglinsen auf Schirmen auffangen. Von den auf Schirmen aufgefangenen Bildern der Sammellinsen macht man Gebrauch bei der Camera obscura, der Zauberlaterne, sowie bei dem Sonnen- und Gasmikroskop.

Die Camera obscura besteht im wesentlichen aus einer Sammellinse von etwas großer Brennweite, durch welche das Bild mehr oder minder entfernter Gegenstände entworfen wird. Damit dieses Bild möglichst lichtstark erscheint, muß von dem dasselbe auffangenden Schirme alles fremde Licht möglichst abgehalten sein; daher der Name. Fig. 40 stellt die Camera obscura in der Form dar, wie sie gegenwärtig zum Photographiren verwendet wird. Auf der Vorderseite des Kastens a ist eine messingene Hülse b befestigt, in welcher sich eine zweite i mittels des Triebes r aus- und einschieben läßt. Die Hülse i enthält die Linse, welche ihre Bilder auf der ihr gegenüberstehenden matt-geglänzten Glasstafel g entwirft.

Diese Glasstafel g ist in einem Schieber befestigt, welcher die Rückwand des in den Kasten a hineinpassenden, nach vorn hin offenen Kastens b bildet. Unsere Figur zeigt den Schieber mit der Glasstafel g etwas in die Höhe gezogen. Je näher der Gegenstand rückt, desto mehr muß man den Kasten b aus a herausziehen.

Die feinere Einstellung geschieht durch Verschiebung der Linse mittels des Triebes r.

Um von der Glasstafel g möglichst alles fremde Licht abzuhalten, wird über den hintern Theil des Apparates ein schwarzes Tuch gehängt, unter welches der Beschaue des Bildes der Kopf steckt.

Die Einrichtung der Laterna-magica (Zaublaterne) wird durch Fig. 41 erläutert. Der auf irgendwelchen Figuren bemalte Gläschieber wird bei a eingeschoben und durch das Licht einer in einem möglichst verschlossenen Blechkasten K befindlichen Lampe erleuchtet. Um die Strahlen auf dem Gemälde möglichst zu concentriren, besteht die Rückwand des Kastens a aus einem metallischen, wohlpolirten Hohlspiegel h zu weiterer Concentrirung der Lichtstrahlen auf bei a eingeschobenen Glasgemälde dient dann mit die Linse m. Von dem gemalten Gegenstand bei a wird nun durch das Linsensystem nn und oo, welches zusammen wie eine einzige stärkere Linse wirkt, auf einem weißen Schirm ein verkehrtes vergrößertes Bild entworfen.

Um sehr bedeutende Vergrößerungen zu erhalten, muß man zunächst Linsen oder Linsensysteme von geringerer Brennweite wählen, damit das Object der Linse recht nahe gebracht werden kann, dann aber für eine sehr intensive Beleuchtung des Gegenstandes sorgen, wie dies beim Sonnenmikroskop, Fig. 11, der Fall ist. In die Öffnung, durch welche der Spiegel h in horizontaler Richtung ein Bündel Sonnenstrahlen in das verfinsterte Zimmer wirft, ist ein Rohr eingeschoben, welches an dem dem Spiegel zugewendeten Ende durch eine Sammellinse geschlossen ist. Ungefähr im Brennpunkt dieser Linse, und deshalb also sehr hell erleuchtet, befindet sich der auf einem entsprechenden Schirme zwischen zwei Glasplatten eingeschlossene Gegenstand, von welchem dann das in dem kleinen Rohr l enthaltene Linsensystem von kurzer Brennweite auf einen weißen Schirm ein vergrößertes Bild entwirft.

Ganz nach denselben Principien sind auch das Gasmikroskop und das elektrische Mikroskop construirt, nur wird bei diesen der Gegenstand entweder durch das Drummond'sche Kallicht oder durch das elektrische Kohlenlicht erleuchtet.

Die Wirkung der Hohlinsen ist ganz derjenigen der Converglinsen analog. Die Strahlen, welche von einem auf der Axe liegenden, unendlich weit entfernten Punkte kommend, als ein mit der Axe paralleles Strahlenbündel auf die Hohllinse fallen, divergiren nach dem Durchgang durch die Linse so, als ob sie von dem Hauptzerstreuungspunkte F, Fig. 42, kämen. Rückt der leuchtende Punkt näher, so rückt auch der Zerstreuungspunkt näher an das Glas heran; die von A, Fig. 43, divergirend auf die Hohllinse fallenden Strahlen werden durch dieselben noch divergirender gemacht, sie divergiren nach dem Durchgang durch die Linse so, als ob sie von B kämen. Daraus folgt dann auch, daß eine Hohllinse von jedem Gegenstande AB, Fig. 44, ein aufrechtes verkleinertes, innerhalb der Zerstreuungsweite liegendes Scheinbild, also ein Sammelbild liefert.

IV. Farbenlehre.

Die Farben des bereits oben erwähnten Spectrums rv, Fig. 28, Taf. 4, sind, wie es in Fig. 1, Taf. dargestellt ist, der Reihe nach roth, orange, gelbgrün, hellblau, dunkelblau, violett. Das weiße Licht wird also durch die Brechung in eine Reihe verschiedenfarbiger Strahlen zerlegt, von welchen die roth am wenigsten, die violetten am meisten abgelenkt werden.

iese Verschiedenheit der Ablenkung rührt nur daher, daß der Brechungscoefficient einer und derselben Substanz für die verschiedenfarbigen Lichtstrahlen verschieden ist. So ist z. B. der Brechungscoefficient der mittlern Strahlen des

	roth	gelb	grün	blau	violett	z
in Wasser	1,331	1,334	1,336	1,338	1,344	0,013
Kronglas	1,526	1,530	1,533	1,536	1,547	0,021
Flintglas	1,628	1,635	1,642	1,648	1,671	0,043
Schwefelkohlenstoff	1,618	1,631	1,644	1,655	1,702	0,084

e größer die Differenz z zwischen dem Brechungscoefficienten der violetten und rothen Strahlen für eine bestimmte Substanz ist, desto stärker zerstreut wird z, desto breiter ist also unter sonst gleichen Umständen das Spectrum, welches sie gibt. Stellt man also Prismen von Wasser, Kronglas, Flintglas und Schwefelkohlenstoff her, welche bei gehöriger Aufstellung die rothen Strahlen gleichförmig ablenken, so ist das Spectrum für Wasser ganz kurz (d. h. die Entfernung vom rothen Ende bis zum violetten ist klein), für Kronglas ist dasselbe fast doppelt, für Flintglas fast 4 mal, für Schwefelkohlenstoff fast 8 mal so groß.

Da das weiße Licht in verschiedene Farben zerlegbar ist, so muß sich aus den Farben des Spectrums auch wieder weiß zusammensetzen lassen. Annähernd läßt sich dies mit der Newton'schen Farbenscheibe, (Fig. 16, Taf. 5, zeigend; eine kreisförmige Scheibe, die ungefähr in dem Verhältniß, wie es die Figur zeigt, in sieben Sectoren getheilt ist, welche mit Farben angetrichen (oder mit farbigen Papieren beklebt) sind, welche den prismatischen Farben möglichst nahe kommen. Bei rascher Rotation um ihre Ase erscheint die Scheibe weiß oder vielmehr graulichweiß. Daß man kein ganz reines Weiß erhält, rührt daher, daß man nicht mit prismatischen Farben, sondern mit Pigmenten experimentirt.

Weit schöner läßt sich die Zusammensetzung des weißen Lichts aus den Farben des Spectrums durch folgenden, gleichfalls von Newton herrührenden Versuch artbun: Man erzeuge ein Spectrum mittels eines Prismas und fange dasselbe mittels einer Linse auf, (Fig. 17, Taf. 5, zeigt). Stellt man dann einen Papierschirm so auf, daß die von einem Punkte des Prismas aus divergirenden Strahlen wieder in einem Punkte vereinigt werden, so erblickt man auf dem Schirme ein vollkommen weißes Bild; durch die Vereinigung der divergirend auf die Linse fallenden farbigen Strahlen wird also wieder Weiß erzeugt.

Aus der ungleichen Brechbarkeit der verschiedenfarbigen Strahlen geht hervor, daß eine Linse eigentlich in jede andere Farbenart aus einem andern Brennpunkt habe, und zwar liegt der Brennpunkt der rothen Strahlen weiter von der Linse weg als der Brennpunkt der violetten. Dieses Auseinanderfallen der Brennpunkte verschiedenfarbiger Strahlen wird als chromatische Aberration bezeichnet.

Die chromatische Aberration verursacht aber eine Unklarheit der Linsenbilder, welche namentlich beim Mikroskop und beim Fernrohr störend wird, und welcher nur durch achromatische Linsen abgeholfen werden kann. Achromatische Linsen werden hergestellt durch die Combination einer Sammellinse A von Kronglas, (Fig. 18, ist einer Hohlbinse B von Flintglas, deren Zerstreungswirkung ungefähr doppelt so groß ist als die Brennweite von A.

Wenn man das Sonnenspectrum in voller Reinheit stellt, so beobachtet man in demselben dunkle, zu seiner Längsrichtung rechtwinkelige Streifen, welche man nach

ihrem Entdecker Fraunhofer'sche Linien nennt, und welche stets genau an derselben Stelle des Spectrums erscheinen. Am zahlreichsten sind diese bald breiten bald schmälern, bald schärfern bald verwischenen Linien im blau und violett. Fraunhofer bezeichnet sieben der charakteristischsten unter diesen Linien, welche auch in dem Spectrum, (Fig. 1, Taf. 5, dargestellt sind, mit A, B, C, D, E, F, G und H. Im Roth liegen A, B und C, im Gelb liegt D, im Grün E, im Blau F, im Indigo G und im Violett die beiden breiten dunkeln Linien H. Diese Linien zeigen sich am besten bei subjectiver Beobachtung des Spectrums durch ein Fernrohr. Durch einen feinen verticalen Spalt läßt man in horizontaler Richtung ein Bündel Sonnenstrahlen in das dunkle Zimmer eintreten und in einer Entfernung von 10 bis 15 Schritten auf ein Prisma s, (Fig. 19, fallen. Die aus dem Prisma austretenden Strahlen beobachtet man dann durch ein Fernrohr.

Was nun die natürlichen Farben der Körper betrifft, so sind dieselben nie reine prismatische Farben, sondern stets aus verschiedenen Spectralfarben zusammengesetzt. Am leichtesten läßt sich dies mit durchsichtigen farbigen Körpern, z. B. mit farbigen Gläsern oder mit farbigen Flüssigkeiten zeigen. Man erzeuge ein Spectrum auf einem weißen Papierschirm und halte dann das farbige Glas vor die Desingung, durch welche die Sonnenstrahlen in das dunkle Zimmer eintreten, so wird sofort ein Theil des Spectrums verschwinden. Ein rothes Glas z. B. läßt alle Strahlen zwischen den Fraunhofer'schen Linien D und A durch, wie Fig. 2 zeigt, während es alle andern Farben verschluckt. Eine Lösung von schwefelsaurem Kupferoxyd-Ammonial absorbirt dagegen alle Strahlen vom mittlern Grün bis zum äußersten Roth, dagegen läßt sie die violetten, dunkel- und hellblauen und einen Theil der grünen durch, wie Fig. 3 zeigt.

In gleicher Weise ist das Absorptionsspectrum einer Lösung von Berlinerblau in Fig. 4, des durch Kobalt blau gefärbten Glases in Fig. 5, einer grünen Lösung von Chlorlupin in Fig. 6, einer gelben Lösung von saurem chromsaurem Kali in Fig. 7 dargestellt.

Sehr interessante und wichtige Erscheinungen bietet die prismatische Zerlegung farbiger Flammen. Die Weingeistflamme und auch die Flamme des Leuchtgases, wenn es mit der genügenden Menge von Luft gemengt ist, wie dies beim Bunsen'schen Brenner der Fall ist, sind an sich schwachleuchtend und farblos, sie werden aber starkleuchtend und gefärbt, wenn man gewisse Substanzen in die Flamme bringt. Bringt man etwas Kochsalz oder ein anderes Natriumsalz in die Flamme, so wird sie intensiv gelb gefärbt. Bringt man einen schmalen Spalt vor diese gelbe Flamme und betrachtet man diesen Spalt durch ein Prisma, so reducirt sich das ganze Spectrum auf eine einzige helle, scharfe gelbe Linie, welche in dem Spectralstreifen Fig. 8 dargestellt ist. Derselbe Spectralstreifen, Fig. 8, zeigt aber außer der gelben Natriumlinie auch noch die rothe Linie, auf welche sich das Spectrum reducirt, wenn die Flamme durch Lithium gefärbt ist, sowie auch die grüne Linie der durch Bismuth, und die blaue der durch Indium gefärbten Flamme. Fig. 9 zeigt das Spectrum der durch Strontium roth gefärbten Flamme. In gleichem Sinne zeigt Fig. 10 das Spectrum einer durch ein Kalisalz, und Fig. 11 das Spectrum einer durch ein Bariumsalz gefärbten Flamme.

Fig. 1, Taf. 6, stellt einen Spectralapparat dar, wie man ihn zur genauen Beobachtung der eben besprochenen Erscheinungen anwendet. A ist ein Metallrohr, dessen hinteres Ende bis auf eine feine Spalte geschlossen ist. Die durch die Spalte in das Rohr A

eintretenden Strahlen werden durch eine Linse, welche das vordere Ende des Rohrs A verschließt, parallel gemacht und treffen so auf das Prisma P. Das durch dies Prisma erzeugte Spectrum wird durch das Fernrohr B beobachtet.

Das Rohr C enthält bei S eine kleine, auf Glas photographirte Scala mit weißen Theilstrichen auf schwarzem Grunde. Wenn diese Scala durch eine Flamme erleuchtet ist, so sieht man durch das Fernrohr B das von der Vorderfläche des Prismas P erzeugte Spiegelbild der Scala und somit erscheinen die hellen Linien des zu beobachtenden Spectrums auf diese Scala projectirt.

Läßt man den elektrischen Funken zwischen Spitzen von Eisen überschlagen, so zeigt die prismatische Zerlegung dieses Funken ein Spectrum, welches aus mehr als 100 hellen, scharfen Linien verschiedener Farben besteht. Ein anderes System heller Linien zeigt der zwischen Kupfer überschlagene Funken. Kurz jedem Metall kommt ein eigenthümliches System heller Spectrallinien zu.

Nun hat man gefunden, daß die Natriumlinie, Fig. 8, Taf. 5, genau mit der Fraunhofer'schen Linie D zusammenfällt, daß jeder hellen Linie des Eisenspectrums eine dunkle Fraunhofer'sche Linie entspricht, und daraus den Schluß gezogen, daß sowohl Natrium als Eisen in der Sonnenatmosphäre enthalten sind. Dasselbe gilt für alle Metalle, deren helle Spectrallinien genau mit Fraunhofer'schen Linien zusammenfallen.

Die meisten farbigen Körper können nur solche Farbenstrahlen zerstreuen, welche schon im auffallenden Licht enthalten sind, wie man dies sehr schön mit farbigen Papieren zeigen kann. Rothcs Papier erscheint nur dann roth, wenn das auffallende Licht rothe Strahlen enthält. Es zeigt keine Spur von rother Färbung, wenn es von einer durch Kochsalz gefärbten Weingeistflamme beleuchtet wird.

Manche sonst durchsichtige Körper haben die merkwürdige Eigenschaft, unter dem Einfluß gewisser Lichtstrahlen selbstleuchtend zu werden, und Licht von einer Farbe zu zerstreuen, welche von der Farbe des auffallenden Lichts verschieden ist. Solche Körper nennt man fluorescirende Körper. Sie zeigen, dem weißen Lichte ausgesetzt, einen eigenthümlichen Schiller, welcher sich am schönsten beobachten läßt, wenn man mittels einer Sammellinse einen Strahlenkegel auf dieselben fallen läßt, wie Fig. 20, Taf. 5, erläutert. Der so concentrirte Strahlenkegel bildet einen leuchtenden Büschel, welcher lichtblau in einer Chininlösung und in Petroleum, grün in einem weingeistigen Extract von Stachapelsamen und in Glas, welches durch Uranoxyd gefärbt ist; roth in einer ätherischen Lösung von Blattgrün erscheint.

Die Farbe des Büschels bleibt ungedändert, wenn man die auf die Linse fallenden Strahlen erst durch ein blaues Glas geben läßt. Die blauen Strahlen können also im Uranglas den grünen Büschel erzeugen, während dies die grünen, gelben und rothen nicht vermögen.

Am schönsten zeigt sich das Verhalten der fluorescirenden Substanzen, wenn man das Spectrum auf dieselben projectirt. Fängt man z. B. auf einer Platte von Uranglas das Spectrum auf, so gehen die rothen, gelben und grünen Strahlen durch, wie durch farbloses Glas; da aber, wo die hellblauen, dunkelblauen und violetten Strahlen auffallen, zerstreut das Uranglas ein grünes Licht, man sieht hier einen grünen Spectralstreifen, welcher ungefähr an der Grenze zwischen grün und blau des Spectrums beginnt und sich noch weit über das violette Ende des Spectrums hinauserstreckt.

Auf diesem Spectrum zeigen sich die Fraunhofer'schen Linien sehr schön, und man beobachtet sie am in dem ultravioletten Theil des Spectrums. Enden also die blauen und violetten Strahlen, noch brechbarere, welche unmittelbar gar nicht bar sind, durch das Uranglas in grünes Licht wandeln.

Es sind vorzugsweise die brechbareren, also die violetten und ultravioletten Strahlen, welche Erscheinungen der Fluorescenz erzeugen.

V. Die Photographie.

Das Licht ist im Stande, chemische Wirkungen hervorzubringen; so wird z. B. das weiße Silber durch den Einfluß der Lichtstrahlen gelb, was nur eine Folge seiner Zersetzung ist, das Chlor entweicht und das Silber, in seinem Zustande schwarz erscheinend, zurüchbleibt. Auf chemischen Wirkungen des Lichts beruht die Photographie.

An die Stelle, an welcher das scharfe Bild eines Gegenstandes in der Camera obscura entsteht, wird ein Schieber g, Fig. 40, Taf. 4, eingesetzt, welchem eine mit einer durch Jodsilber imprägnirten Collobiumschicht überzogene Glasplatte befestigt ist. Das Jodsilber ist in gleicher Weise empfindlich für das Licht wie das Chlor Silber. Nachdem eine Zeit lang auf die Collobiumschicht eingewirkt ist, die chemische Zersetzung des Jodsilbers in Silber gleichsam eingeleitet, und wenn nun eine reüssige Flüssigkeit, d. h. eine solche darauf gegossen wird, welche grobe Verwandschaft zum Jod hat, so wird dieselbe das Jodsilber an den Stellen zersetzt, auf welche das Licht eingewirkt hatte.

An den hellsten Partien des Bildes wirkt das Silber ganz zersetzt, sie werden also ganz schwarz, in den halb dunklen Partien tritt nur eine partielle Schwärzung ein, an den ganz dunklen Partien des Bildes aber bleibt das Jodsilber ganz unangeführt, hat also nun auf der Glasplatte ein negatives Bild, d. h. ein Bild, in welchem die hellen Partien des Gegenstandes dunkel, die Schattenpartien des Gegenstandes hell erscheinen.

Das so hergestellte negative Bild würde durch von kurzer Dauer sein, weil an allen Stellen, auf welche Licht gar nicht oder nur schwach eingewirkt hat, unzerlegtes Jodsilber vorhanden ist, welches durch den Einfluß des Lichts nach und nach auch zersetzt wird, sodas nach einiger Zeit die ganze Collobiumschicht geschwärzt sein würde.

Um dies zu verhindern, muß man sogleich nach Herstellung des negativen Bildes dasselbe dadurch fixiren, daß man alles noch unzerlegte Jodsilber entfernt, wodurch geschieht, daß man die Platte mit einer Flüssigkeit übergießt, welche das Jodsilber auflöst, z. B. eine Lösung von unterphosphorigsaurem Natrium in Wasser.

Nehmen wir z. B. an, der zu photographirende Gegenstand sei ein großer, auf eine weiße Wand gezeichnete Buchstabe, so würde man nach dem eben beschriebenen Verfahren von demselben das verkehrte negative Bild, Fig. 21, Taf. 5, auf der Glasplatte erhalten.

Von diesem negativen Glasbild muß nun eine positive Copie gemacht werden, was dadurch geschieht, daß man auf die Collobiumseite des Glasbildes ein mit Chlor Silber imprägnirtes Papier legt. Um dasselbe sanft andrücken zu können, man sich des Copierrahmens, Fig. 2, Taf. 4, bedienen, man sich des Copierrahmens kommt man

egative Glasbild, darauf das Chlor Silberpapier, darauf in Lage von Tuch oder Filz und darauf endlich ein Bret, welches mittels Schrauben angebrückt werden kann. Wird nun die Glasseite des Copierrahmens gegen die Sonne gelebt, so bringen ihre Strahlen durch die ungeschwärzten Partien des negativen Bildes auf das Chlor Silberpapier, welches also gerade da geschwärzt wird, wo die hellen Partien des negativen Bildes sind, während es da weiß bleibt, wo die dunkeln Stellen des negativen Bildes die Sonnenstrahlen von ihm abhalten. Die so erhaltene positive Copie, Fig. 22, muß aber auch durch eine Lösung von unterschwefligsaurem Natron fixirt werden, denn sonst würde das Bild in kurzer Zeit ganz schwarz werden.

Die chemische Wirkungsfähigkeit der verschiedenartigen Strahlen ist sehr ungleich. Im allgemeinen wirken die weniger brechbaren Strahlen, also die rothen, gelben und grünen, am wenigsten; während die brechbareren am stärksten wirken. Dieselben Strahlen, welche die Erscheinung der Fluorescenz hervorrufen, bringen auch die stärkste chemische Wirkung hervor. Wenn man das Spectrum auf einer photographisch präparirten Kollodiumschicht ausfängt, so findet man, daß die rothen, gelben, grünen und ein Theil der blauen Strahlen unwirksam sind, denn man erhält ein negatives Bild des Spectrums, welches erst zwischen den Fraunhofer'schen Linien F und G beginnt und noch weit über H hinausgeht. Also auch die für sich unsichtbaren ultravioletten Strahlen bringen noch chemische Wirkungen hervor.

In photographischen Bildern werden deshalb auch alle rothen, gelben und grünen Gegenstände viel zu dunkel erscheinen, was die malerische Färbung derselben ist wesentlich beeinträchtigt.

VI. Das Auge und die optischen Instrumente.

Das Auge des Menschen und der höhern Thiere ist, was seine optische Construction anlangt, eine Camera obscura. Der ganze Augapfel, Fig. 23, Taf. 5, ist von einer festen harten Haut (tunica sclerotica) umschlossen, welche nur an der vordersten Stelle bei a durchsichtig und hier auch etwas stärker gewölbt ist (Hornhaut). Hinter der Hornhaut befindet sich ein andurchsichtiger Schirm bb', die Regenbogenhaut, oder Iris, mit einer kreisförmigen Oeffnung ss' (die Pupille), durch welche allein die Lichtstrahlen in das Innere des Auges eindringen können. Nicht hinter der Pupille befindet sich die Kristalllinse k. Der Zwischenraum zwischen der Linse und der Hornhaut ist mit einer wässrigen, der Zwischenraum zwischen der Linse und der Rückwand des Augapfels ist mit einer gallertartigen Flüssigkeit (Glaskuchtigkeit) ausgefüllt.

Die Rückwand des Augapfels ist innen mit der Netzhaut (retina) überzogen, welche eine Ausbreitung des optischen Nervs n ist. Auf dieser Netzhaut entsteht in verkehrtes verkleinertes Bild der äußeren Gegenstände, wie dies Fig. 45, Taf. 4, erläutert.

Daß wirklich ein solches Netzhautbildchen vorhanden ist, davon kann man sich leicht überzeugen, wenn man den Augapfel eines frisch geschlachteten Ochsen oben in eine kleine Oeffnung bei a, Fig. 24, Taf. 5, einschneidet und durch diese nach der Netzhaut hinschaut, während ein beliebiger Gegenstand in passender Entfernung vor dem Auge aufgestellt ist.

Man kann nur dann einen Gegenstand deutlich sehen, wenn sein Bild auf der Netzhaut scharf ist.

Es gibt für jedes Auge eine kleinste Entfernung, über welche hinaus man ihm den Gegenstand nicht nähern darf, wenn man ihn noch deutlich sehen will. Es

ist dies die Weite des deutlichen Sehens, welche bei Kurzsichtigen kleiner, bei Fernsichtigen größer ist als 10 Zoll.

Jeder auf der Netzhaut gemachte Lichteindruck wirkt noch eine Zeit lang nach; daher kommt es, daß eine im Kreis geschwungene glühende Kohle als ein unterbrochener feuriger Ring erscheint, daß man die einzelnen Sectoren einer abwechselnd schwarz und weiß bemalten, rasch um ihren Mittelpunkt rotirenden Scheibe, Fig. 46, Taf. 4, nicht mehr unterscheiden kann.

Auf der Dauer des Lichteindrucks beruht auch die Wunderscheibe (stroboskopische Scheibe), Fig. 25, Taf. 5. An dem Umfang einer Scheibe von Pappe bedeckt sind in gleichen Abständen voneinander 12 gleiche Oeffnungen eingeschnitten. Innerhalb dieses Oeffnungsringes ist nun eine Scheibe befestigt, auf welcher ein und derselbe Gegenstand in 12 aufeinanderfolgenden Stellungen abgebildet ist. Hält man nun die Vorderfläche der Scheibe vor einen Spiegel, so sieht man durch irgenb eine, etwa die oberste Oeffnung das Spiegelbild der Figuren, und wenn nun beide Scheiben zusammen rasch um eine durch ihren Mittelpunkt gehende Axe rotiren läßt, so scheint es dem durch die Löcher nach dem Spiegel schauenden Auge, als ob der auf der kleinen Scheibe gemalte Gegenstand sich bewege.

Wenn man das Auge eine Zeit lang auf einen lebhaft gefärbten, hellerleuchteten Gegenstand blickt, so wird die Empfindlichkeit der Netzhaut für diese Farbe abgestumpft, während sie für die übrigen Farben ungeändert bleibt. Wendet man das Auge, nachdem es eine Zeit lang den farbigen Gegenstand fixirt hatte, auf eine weiße Fläche, so sieht man ein Nachbild des Gegenstandes von complementärer Farbe. Man bestimme z. B. das Auge eine Zeit lang auf 7 gelbgrüne Scheibchen, welche auf ein weißes Papier aufgeklebt sind, wie Fig. 26, Taf. 5, und wende dann das Auge etwas seitwärts, so glaubt man nun 7 rothe Scheibchen auf weißem Grunde zu sehen (subjective Farben).

Das Sehen mit zwei Augen trägt wesentlich zur richtigern Schätzung der Entfernung näherer Gegenstände bei. Von einem nicht gar weit entfernten Gegenstande gibt uns das rechte Auge eine etwas andere Ansicht als das linke; durch die gegenseitige Ergänzung dieser beiden Bilder erhalten wir aber erst einen wahrhaft plastischen Eindruck des Gegenstandes, wie ihn ein einzelnes Bild nie geben kann. Damit hängt nun auch die überraschende Wirkung der Stereoskopbilder zusammen. Zwei zusammengehörige Stereoskopbilder sind nie ganz gleich, denn das eine stellt den Gegenstand dar, wie er dem rechten, das andere, wie er dem linken Auge erscheint. Das Stereoskop, Fig. 27, bewirkt nun, daß jedes Auge nur das für es bestimmte Bild und zwar in solcher Richtung sehen kann, daß sich die beiden Bilder zu einem Totaleindruck vereinigen. Fig. 28 stellt die beiden Gläser eines Stereoskops, welche den doppelten Zweck erfüllen, die Bilder etwas vergrößert zu zeigen und sie etwas gegeneinander zu rücken, im Durchschnitt dar.

Denkt man sich von den äußersten Punkten A und B, Fig. 45, Taf. 4, eines Gegenstandes gerade Linien nach den äußersten Punkten a und b seines Netzhautbildchens im Auge gezogen, so ist der Winkel, welchen diese beiden Visirlinien miteinander machen, der Sehwinkel, unter welchem der Gegenstand AB dem Auge erscheint. Die scheinbare Größe des Gegenstandes ist diesem Sehwinkel proportional. Ein größerer Gegenstand A'B', Fig. 29, Taf. 5, kann unter demselben Sehwinkel erscheinen, wie ein kleinerer AB, wenn er entsprechend weiter entfernt ist.

Die scheinbare Größe eines Gegenstandes wächst, wenn man ihn dem Auge nähert; um einen kleinen Gegenstand recht groß zu sehen, muß man ihn also dem Auge möglichst nähern. Da man aber den Gegenstand nicht innerhalb der Scheitweite des Auges bringen darf, wenn man ihn noch deutlich sehen will, so ist dadurch einer fernern Annäherung und Vergrößerung des Sehwinfelds eine Grenze gesetzt. Will man einen kleinen Gegenstand größer sehen, als es mit bloßem Auge möglich ist, so muß man ein einfaches oder zusammengesetztes Mikroskop anwenden.

Das einfache Mikroskop ist eine Sammellinse von kurzer Brennweite (Lupе), welche man dicht vor das Auge bringt, und dann den Gegenstand innerhalb der Brennweite der Linse hält, wie Fig. 39, Taf. 4, erläutert. Man hält den Gegenstand AB so, daß das aufrechte vergrößerte Scheinbild ab in der Weite des deutlichen Sehens ist. Für stärkere Vergrößerungen muß man das zusammengesetzte Mikroskop anwenden, dessen Einrichtung durch Fig. 30, Taf. 5, erläutert wird. Einer Sammellinse ab von kurzer Brennweite (dem Objectiv), wird der zu betrachtende Gegenstand rs (Object) fast bis zum Brennpunkt genähert. Die Linse ab entwirft dann vom Objecte rs ein verkehrtes vergrößertes Sammelbild RS , und dieses Sammelbild RS wird dann durch das Ocular cd wie durch eine Lupe betrachtet, so daß man es vergrößert in $R'S'$ erblickt.

Die äußere Construction des Mikroskops wird durch Fig. 31 erläutert. Die Objectivlinse o ist an das untere Ende eines Metallrohrs angeschraubt, während das Ocular am oberen Ende desselben bei n eingesteckt wird. Das Object wird auf das in der Mitte durchbrochene Tischlein pp gelegt und von unten her durch den Spiegel ss erleuchtet.

Die Construction des Fernrohrs beruht auf denselben Principien. Die verständlichste Form desselben ist das astronomische Fernrohr, dessen Wirkung durch die schematische Fig. 32, Taf. 5, erläutert wird. Von dem entferntesten zu betrachtenden Gegenstand AB wird durch eine Sammellinse o von größerer Brennweite (das Objectiv) ein verkehrtes verkleinertes Bild ab entworfen und dieses durch die Ocularlinse vv , welche auch hier als Lupe dient, betrachtet, so daß man es vergrößert in $a'b'$ erblickt. Fig. 34 erläutert die äußere Einrichtung des astronomischen Fernrohrs. Das Objectiv ist bei k , das Ocular ist bei o angeschraubt. Wenn der Gegenstand AB , Fig. 32, dem Ocular näher rückt, so entfernt sich das Bild ab von demselben, man muß also auch die Ocularlinse vv vom Objectiv mehr entfernen; aus diesem Grunde muß das Ocular etwas gegen das Objectiv verschiebbar sein. Größere Fernrohre werden auf Stativen aufgestellt, wie Fig. 33 zeigt.

Das astronomische Fernrohr gibt ein verkehrtes Bild der Gegenstände, was bei Betrachtung irdischer Objecte, wie Landschaften, sehr störend ist. Zu diesem Zweck eignen sich deshalb besser das holländische oder Galilei'sche Fernrohr und das terrestrische oder Erdfernrohr. Bei dem holländischen Fernrohr wird das Ocular durch eine Hohllinse, Fig. 35, gebildet, welche die vom Objectiv kommenden Strahlen auffängt, ehe sie sich noch zum Bild ab vereinigt haben, so daß die Strahlen, welche gegen einen Punkt des nicht zu Stande kommenden Bildes ab convergiren, nach dem Durchgang durch die Hohllinse v so divergiren, als ob sie von einem Punkt des vergrößerten Bildes $a'b'$ kämen.

Das holländische Fernrohr erlaubt nur schwächere Vergrößerungen, weil sein Gesichtsfeld für einigermaßen starke Vergrößerungen sehr klein wird. Die be-

kannten Theaterperspective, welche nur eine 2 bis 3 malige Vergrößerung geben und deren innere Einrichtung durch Fig. 36 erläutert wird, sind holländische Fernrohre.

Bei dem Erdfernrohr ist das als Lupe wirkende Ocular des astronomischen Fernrohrs durch ein schwach wirkendes Mikroskop ersetzt, welches das verkehrte Bild des Objectivs wieder umkehrt, also ein aufrechtes Bild des Gegenstandes gibt.

Die verbreitetste Form des Erdfernrohrs findet in allgemein bekannten Zuckerröhren, deren Einrichtung durch Fig. 37 erläutert wird. Die Ocularröhre enthält 4 Sammellinsen, welche zusammen wie ein schwaches Mikroskop wirken.

Ehe man gelernt hatte, achromatische Linsen zu construiren, waren die dioptrischen Fernrohre wegen der chromatischen Aberration ziemlich mangelhaft, man suchte sie deshalb durch katoptrische zu ersetzen. b . Man gegenwärtig die Objectivlinse durch einen Hohlspiegel und so entstanden die Spiegelteleskope.

Die Construction des Newton'schen Spiegelteleskops wird durch Fig. 38 erläutert. An dem Ende eines offenen Rohrs ist ein metallener Hohlspiegel ss angebracht, der von einem weit entfernten Gegenstand ein verkehrtes verkleinertes Bild bei a entwerfen würde, wenn die von ss kommenden Strahlen nicht durch den metallenen Planspiegel p aufgefangen würden; durch diesen Planspiegel werden aber die Strahlen seitwärts reflectirt, so daß das Bild des entfernten Gegenstandes bei b entsteht. Dieses Bild bei b wird nun durch das Ocular o betrachtet.

Fig. 39 erläutert die Construction des Gregory'schen Spiegelteleskops. Der in seiner Mitte durchbrochene Objectivspiegel ss entwirft von dem entferntesten Gegenstand ein verkehrtes verkleinertes Bild in a . Dieses Bild a befindet sich aber nahe bei dem Brennpunkt des kleinen Hohlspiegels v , welcher vom Bilde a ein vergrößertes aufrechtes Bild b entwirft, und dieses Bild b wird endlich durch das Ocular o betrachtet. Fig. 40 stellt das Äußere eines Gregory'schen Spiegelteleskops dar.

VII. Interferenz der Lichtstrahlen.

Die Grundlage zur Erklärung der Lichterscheinungen bildet die gegenwärtig von allen Physikern angenommene Vibrations- oder Undulationstheorie, nach welcher das Licht durch eine sehr rasche Oscillationsbewegung der Atome des leuchtenden Körpers erzeugt und durch eine Wellenbewegung des Aethers, einer imponderablen, höchst feinen und elastischen Substanz, welche alle Himmelsräume und die Zwischenräume zwischen den Atomen der ponderablen Körper ausfüllt, weitergepflanzt werden.

Es sei AB , Fig. 41, die Richtung, nach welcher sich ein elementarer Lichtstrahl fortpflanzt, so werden alle Aethertheilchen, welche in ihrem Ruhezustand auf der geraden Linie AB liegen, rechtwinklig zu dieser Richtung hin- und herbewahren, so daß sie in einem bestimmten Moment etwa die gegenseitige Stellung haben, wie es die Figur andeutet. Das Theilchen b schwingt zwischen b' und b'' , das Theilchen c schwingt zwischen c' und c'' . In demselben Moment, in welchem b in b' ankommt, kommt c in c' an, u. s. f. w.

Der Abstand von b nach c ist eine halbe, der Abstand von c nach d ist eine ganze Wellenlänge. Zwei Aethertheilchen, welche um eine halbe Wellenlänge voneinander entfernt sind, befinden sich stets in entgegengesetzten, solche, welche um eine ganze Wellenlänge entfernt sind, befinden sich in gleichen Schwingungszuständen.

Denn demnach von einer gemeinsamen Lichtquelle gehend zwei Lichtstrahlen auf verschiedenen Wegen einem und demselben Punkte gelangen, so können sich entweder unterstügen, wenn der Unterschied r Wege (Gangunterschied) eine, oder ein ganzes faches einer Wellenlänge beträgt; oder sie müssen in ihrer Wirkung aufheben, wenn ihr Gangunterschied eine halbe oder ein ungerades Vielfaches einer Wellenlänge beträgt.

Ein solches Zusammenwirken zweier Lichtstrahlen, bei dem sie sich je nach den Umständen gegenseitig vertöken oder aufheben, wird Interferenz genannt. Die Interferenz der Lichtstrahlen läßt sich am ein- fachen mit Hilfe der Fresnel'schen Interferenz- regel zeigen. Zwei ebene Spiegel von schwarzem as sind so zusammengestellt, daß sie einen sehr mpfen (wenig von 180° abweichenden) Winkel mit- ander machen. Wenn man auf dieselben von einer jernen Lichtquelle, etwa von einer verticalen Lich- ie c , Fig. 4, Taf. 6, in sehr schräger Richtung Strah- auf diese Spiegel fallen läßt, so werden sich die von den Spiegeln reflectirten Strahlen unter sehr spähem inkel schneiden. Je zwei der reflectirten, in irgend- em Punkte d sich schneidenden Strahlen haben nun r meist ungleich lange Wege csd und $cs'd$ zurück- egt. Je nachdem nun die Differenz dieser Wege ein- izes Vielfaches einer Wellenlänge, oder ein ungerades- lfaches einer halben Wellenlänge beträgt, werden sich in d zusammentreffenden Strahlen unterstügen oder sbeben, man sieht hier also abwechselnd helle und- nstle Streifen, Fig. 42, Taf. 5. Weil diese Streifen r fein sind, muß man sie mit der Lupe betrachten. z 3, Taf. 6, erläutert die Construction der Inter- enzspiegel.

Ein zweites Beispiel von Interferenz der Lichtstrahlen fern die Beugungserscheinungen, welche beim- ugang des Lichts durch sehr enge Oeffnungen- zeugt werden. Der einfachste Fall des Beugungs-- anomens ist folgender: Die Sonnenstrahlen, welche an durch einen verticalen Spalt in ein dunkles Zim- er ganz in der Weise eintreten läßt, als ob man ein- ismatisches Spectrum erzeugen wollte, werden durch- en 10 bis 15 Fuß entfernten Schirm aufzufangen,- welchem sich nur ein $\frac{1}{2}$ bis 1 Millimeter breiter, m ersten paralleler Spalt befindet. Läßt man nun- : durch den zweiten Spalt hindurchgegangenen Strah- in einer Entfernung von abermals 10 bis 15 Fuß- einen Schirm von weißem Papier fallen, so sieht- n auf demselben nicht etwa bloß einen schmalen- iticalen Lichtstreif, wie man nach der geradlinigen- rtpflanzung des Lichts erwarten sollte, sondern die- eungungsfigur Fig. 44, Taf. 5: ein breites, weißes,- lles Feld in der Mitte, welches zu beiden Seiten von- wechselnd hellen und dunklen farbigen Streifen ge- mt ist. Das Beugungsbild wird um so breiter- d lichtschwächer, je schmaler der Spalt ist.

Am einfachsten gestaltet sich die Erscheinung für ho- ogenes (einfarbiges) Licht. Läßt man das auf die- eite Spalte fallende Licht erst durch ein rothes Glas- hen, so besteht das Beugungsbild aus abwechselnd- then und schwarzen Streifen. Wendet man statt des- then Glases ein grünes an, so ist das Beugungsbild- r Art nach dasselbe, nur rüden die Streifen etwas- her zusammen; noch mehr rüden sie aber für blaues- ht zusammen.

Mit der Gestalt der beugenden Oeffnung ändert sich- die Gestalt des Beugungsbildes. Fig. 45 stellt- is Beugungsbild dar, wie es durch eine kleine rauten- rüige Oeffnung der nebenstehenden Form erzeugt

wird. Fig. 5, Taf. 6, zeigt das Beugungsbild einer- kleinen kreisförmigen Oeffnung.

Weit schöner als beim Auffangen auf einem Schirme- zeigen sich die Beugungserscheinungen bei subjectiver- Beobachtung, d. h. wenn man gleichsam die Netzhaut- zum Auffangen des Beugungsbildes benützt. Am besten- geschieht dies, wenn man die beugende Oeffnung vor- das Objectiv eines Fernrohrs setzt, Fig. 6, Taf. 6, und dann durch das Fernrohr nach der Lichtquelle- schaut.

Eine weitere Reihe von Interferenzerscheinungen bis- den die Farben dünner Blättchen. Jeder durch- sichtige Körper glänzt nämlich mit den brillantesten Far- ben, wenn er nur hinlänglich dünn ist. Das bekannteste- Beispiel sind die Seifenblasen.

Newton brachte diese Farben in der größten Re- gelmäßigkeit dadurch hervor, daß er eine Glaslinse von- sehr großer Brennweite auf eine ebene Glasplatte legte. Es bildet sich dann eine sehr dünne Luftschicht zwis- chen den beiden Gläsern, welche von der Mitte bis zum- Rande hin allmählich dicker wird, und welche bei aus- fallendem weißem Licht eine Reihe brillanter Farben- ringe zeigt, deren Centrum durch einen dunkeln Fleck- gebildet wird, wie dies durch Fig. 46, Taf. 5, an- schaulich gemacht werden soll.

Durch die dunkelsten Stellen dieser Ringe werden- sie gleichsam in verschiedene Abtheilungen (Ordnungen)- getheilt. Die Farben von der Mitte bis zum ersten dun- keln Ring, heißen die Farben erster Ordnung; vom- ersten bis zum zweiten dunkeln Ring heißen sie Farben- zweiter Ordnung, u. s. w.

Die Erscheinung rührt daher, daß die an der Vor- derfläche der dünnen Schicht reflectirten Strahlen mit- denjenigen zur Interferenz kommen, welche an der- hintern Fläche reflectirt werden, welche also einen grö- ßeren Weg zurückgelegt haben, wie dies Fig. 47, Taf. 5, andeutet. Da nun aber die Wellenlänge der verschiede- nen Farben ungleich ist, so kommt es, daß für gewisse Farben- die interferirenden Strahlen sich gegenseitig unterstügen, während sie sich an derselben Stelle des dünnen Blät- tens gegenseitig aufheben. An solchen Stellen, welche- die Farben zweiter und dritter Ordnung zeigen, herrscht- eine Farbe entschieden vor, während andere im Mini- mum sind, wie sich am besten durch prismatische Zer- legung darthun läßt.

Fig. 12, Taf. 5, zeigt die prismatische Zerlegung des- Grüns vierter Ordnung. Allerdings herrscht hier das- Grün vor, allein es kommt von andern Farben doch- noch so viel hinzu, daß das Grün vierter Ordnung- ziemlich matt erscheint.

Für Blättchen, welche so dick sind, daß sie in weißem- Licht keine Farben mehr zeigen, hört deshalb die In- terferenz nicht auf, nur wirken die verschiedenen Farben- so zusammen, daß keine vorherrschen kann, wie man- dies am besten durch die prismatische Zerlegung der- Farben solcher dicker Blättchen (Fig. 13 und 14) nach- weisen kann.

VIII. Polarisirten und doppelte Brechung.

Ein Lichtstrahl ist polarisirt, wenn die rechtwin- kelig zu seiner Fortpflanzungsrichtung stattfindenden- Vibrationen der Aethertheilchen sämmtlich in einer- und derselben Ebene stattfinden.

Solche polarisirte Strahlen entstehen z. B., wenn ein- gewöhnlicher Lichtstrahl ab, Fig. 49, Taf. 5, so auf eine- Glasplatte RS fällt, daß der Winkel abn , den er mit ihr- macht, 35° beträgt. Der reflectirte Strahl bc ist als- dann polarisirt, seine Schwingungen sind der Ebene- des Spiegels RS parallel, sie gehen sämmtlich in der- Ebene $icdm$ vor sich.

Um die Erscheinungen der Polarisation an Glas-
spiegeln zu zeigen, muß man schwarzes Glas oder doch
auf der Rückseite geschwärztes Glas anwenden. In
Fig. 48 sei sg ein schwarzer Glas Spiegel, welcher in
der Richtung bc einen polarisirten Strahl reflectirt.
Fällt dieser Strahl auf eine zweite, ebenfalls auf der
Rückseite geschwärzte Glasplatte, welche der untern pa-
rallel ist, so wird dieser zweite Spiegel den Strahl bc
in der Richtung cd reflectiren; dreht man jedoch den
obern Spiegel so, daß die Richtung des Strahls bc
die Umdrehungsaxe bildet, so bleibt zwar der Winkel,
welchen der einfallende Strahl bc mit der Spiegel-
fläche macht, ungeändert, allein der Parallelismus der
beiden Spiegel hört auf; der reflectirte Strahl wird
um so schwächer, je weiter man dreht, die Reflexion am
obern Spiegel hört ganz auf, wenn man um 90° ge-
dreht hat.

Fig. 7, Taf. 6, stellt einen Polarisationsapparat
dar, mit welchem sich die eben angegebenen Versuche aus-
führen lassen. Bequemer ist der Nörrenbergische Po-
larisationsapparat, Fig. 8, bei welchem die polari-
sirten Strahlen in verticaler Richtung zum obern
Theil des Apparats gelangen. Der Polarisationspie-
gel AB ist auf der Rückseite nicht geschwärzt. Die von
ihm polarisirten Strahlen gehen vertical nach unten,
wo sie, durch den in gewöhnlicher Weise belegten Spie-
gel s vertical nach oben reflectirt, durch den Polari-
sationspiegel AB ungeändert hindurchgehen, um endlich
zum Zerlegungsspiegel CD zu gelangen.

In der Mitte des Apparats befindet sich ein Tisch-
lein m von Glas, welches für gewöhnlich horizontal
steht, welches man aber in horizontaler Ebene umdrehen
und etwas gegen die Horizontale neigen kann.

Ein zweites Mittel, polarisirtes Licht zu erhalten,
bieten solche Turmalinplatten, welche parallel mit
der krystallographischen Hauptaxe dieses meist grün
oder braun gefärbten Minerals geschnitten sind. Eine
solche Platte läßt nur solche Strahlen durch, deren
Schwingungsebene parallel ist der krystallographischen
Hauptaxe, wie dies durch Fig. 47, Taf. 4, erläutert
werden soll, in welcher $abcd$ eine Turmalinplatte dar-
stellen soll, deren Axe parallel der Kante ab (also auch
parallel der Schraffurung) ist. Der in der Richtung RS
hindurchgegangene Strahl ist so polarisirt, daß seine
Schwingungen in der Ebene sg stattfinden.

Legt man zwei Turmalinplatten $abcd$, Fig. 48,
Taf. 4, und $efgh$ so aufeinander, daß die krystallogra-
phischen Azen beider parallel sind, so wird das Licht,
welches durch die untere Platte hindurchgegangen ist,
auch durch die zweite hindurchgehen. Dreht man aber
die eine, etwa $efgh$, in ihrer Ebene aus dieser Lage
des Parallelismus heraus, so wird das durchgelassene
Licht schwächer und schwächer, bis es endlich ganz
verschwindet, wenn man die eine Platte um 90° ge-
dreht hat, bis also die Azen der beiden Platten gekreuzt
sind, Fig. 49.

Um mit den Turmalinplatten bequem experimentiren
zu können, werden sie in eine Turmalinlange,
Fig. 9, Taf. 6, gefaßt, welche erlaubt, jede der mittels
Kork in ein gerändertes Messingscheibchen eingesetzten
Turmalinplatten bequem in ihrer Ebene umzudrehen.
Fig. 43, Taf. 5, stellt eine andere Form der Turmalin-
lange dar.

Wenn man aus irgendeinem Krystall, welcher nicht
zum regulären System gehört, ein Prisma bildet und
durch dasselbe nach irgendeinem kleinen Gegenstand
hinschaut, so erblickt man in der Regel zwei Bilder
des Gegenstandes, welche ungleich starke Ablenkung durch
das Prisma erlitten haben; die einfallenden Lichtstrahlen
sind also in zwei ungleich stark brechbare Bündel ge-

theilt worden, welche, wie sich durch die Untersuchung
mit der Turmalinplatte ergibt, polarisirt sind, wo-
deren Schwingungsebenen rechtwinklig zu einander
stehen. Die Schwingungen, welche die Strahlen bei
einem Bildes fortplanzen, finden in der Richtung der
krystallographischen Hauptaxe statt, die Schwingungen
des andern sind rechtwinklig zu derselben.

Der rechtwinklig zur Hauptaxe vibrierende Strahl
wird der ordinäre, der andere wird der extra-
ordinäre genannt. Der ordinäre Strahl pflanzt sich
nach allen Richtungen im Krystall mit gleicher Ge-
schwindigkeit fort, für den extraordinären Strahl ist die
Geschwindigkeit veränderlich, je nach der Richtung,
in welcher er den Krystall durchläuft. Bei den Krystallen
des quadratischen und des hexagonalen Systems haben
der ordinäre und der extraordinäre Strahl in der
Richtung der krystallographischen Hauptaxe gleiche
Geschwindigkeit; in der Richtung der Hauptaxe findet
also keine doppelte Brechung statt. Solche Richtungen
im Krystall, nach welchen sich alle Strahlen mit gleicher
Geschwindigkeit fortplanzen, werden optische Azen
genannt. Für die Krystalle der obengenannten
Systeme gibt es nur eine optische Aze, für die übrigen
folgenden Krystallisationsysteme gibt es deren zwei.
Danach unterscheidet man optisch einaxige und zwei-
axige Krystalle.

IX. Chromatische Polarisation.

Legt man ein dünnes Plättchen irgendeines dop-
pelt brechenden Krystalls, etwa ein dünnes Gips-
plättchen auf das Tischlein m des Polarisationsapparats,
Fig. 8, Taf. 6, so erscheint sein Bild, im obern Spiegel
betrachtet, schon gefärbt. Die Farbe ändert sich mit der
Dicke des Plättchens, mit seiner Lage und mit der
Stellung des Zerlegungsspiegels.

Das Gipsplättchen sei so gelegt, daß seine Azen
möglichst brillant erscheint, während die Schwingungs-
ebenen der beiden Polarisationspiegel AB und CD
gekreuzt sind, so geht die Farbe in die complemen-
täre über, wenn man den obern Spiegel um 90°
dreht. Er scheint z. B. das Plättchen bei gekreuzten
Spiegeln grün, so ist es roth bei parallelen Spiegel-
ebenen.

Ganz eigenthümliche Ringfiguren beobachtet man,
wenn man senkrecht zur Aze geschnittene Krystallplatten
in die Turmalinlange legt. Näheres darüber lehrt die
Mineralogie.

Im normalen Zustande zeigt Glas keine doppelte
Brechung und folglich auch keine chromatische Polari-
sation; dieselbe erscheint aber, sobald durch einseitigen
Druck, durch Erwärmung, durch rasche Abkühlung ge-
hend gemachter Glasplatten u. s. w. die Homogenität
der Masse zerstört wird. Fig. 50, Taf. 4, zeigt die
Erscheinung einer dicken, schnell gefühlten quadratischen
Glasplatte zwischen gekreuzten Spiegeln, wenn man sie
auf das mittlere Tischlein des Polarisationsapparats
Fig. 8, Taf. 6, legt.

Wenn man eine senkrecht zur Aze geschnittene Quarz-
platte zwischen die gekreuzten Spiegel des Polari-
sationsapparats, Fig. 8, Taf. 6, auf das Tischlein
legt, so scheint sie je nach ihrer Dicke verschieden ge-
färbt.

Diese Farbe ändert sich nun, wenn man den Zer-
legungsspiegel CD dreht, aber in ganz anderer Weise,
als es bei dünnen Gipsplättchen geschieht; sie durch-
läuft eine Reihe von Nuancen, in denen bald roth,
gelb, grün, blau oder violett vorherrscht. Es ist
dies daher, daß durch die Quarzplatte die Schwin-
gungsebene der von unten kommenden Strahlen ge-
dreht wird (Circularpolarisation).

Auch bei Flüssigkeiten wird die Erscheinung der Circularpolarisation beobachtet, so z. B. im Zerpentinöl (linksdrehend), in Zuckersüßungen (rechtsdrehend) u. s. w., und dadurch hat die Circularpolarisation auch eine praktische Bedeutung gewonnen, weil sie zur Ermittlung des Concentrationsgrades zuckerhaltiger Lösungen angewandt wird. Fig. 10, Taf. 6, stellt das zu diesem Zweck von Soleil construierte Saccharometer dar; es ist eine 20 Centimeter lange, an beiden Enden mit Glasplatten verschlossene Röhre, welche zur Aufnahme der zuckerhaltigen Flüssigkeit bestimmt ist. Sie liegt zwischen zwei polarisirenden Kalkspatprismen, welche die Stelle der beiden Polarisationsspiegel im Apparat Fig. 8 vertreten; bei e sind zwei senkrecht zur Aze geschliffene leinsförmige Platten von Vergulthall angebracht, von denen die eine rechts, die andere linksdrehend ist, durch deren gegenseitige Verschiebung man die rechtsdrehende Wirkung der Zuckersüßung compensiren kann. Mit dem Zuckergehalt der Lösung wächst natürlich auch die Größe der Drehung der Polarisationsebene.

D. Wärmelehre.

(Tafel 6, Figur 11 — 39, Tafel 7, Figur 1 — 32.)

I. Ausdehnung.

Die Wärme hat die Eigenschaft, alle Körper auszuweichen, und zwar am stärksten die gasförmigen, am schwächsten die festen.

Um die geringe Längenausdehnung fester Körper sichtbar zu machen, wendet man Hebelpyrometer, Fig. 11, Taf. 6, an. Der Stab t, dessen Ausdehnung gemessen werden soll, stößt mit seinem einen Ende bei v gegen eine feste Widerlage, mit seinem andern Ende gegen den kürzern Arm eines Winkelhebels an, dessen längerer Arm l auf eine Scala bei s zeigt. Wenn die Stange t erwärmt wird, so geht das Ende des langen Hebelarms in die Höhe.

Genaue Messungen haben ergeben, daß für eine Temperaturerhöhung von 0 bis 100° (von der Temperatur des schmelzenden Schnees bis zu der des siedenden Wassers) sich ausdehnen:

ein Glasstab um $\frac{1}{1200}$ ein Kupferstab um $\frac{1}{1000}$
ein Eisenstab um $\frac{1}{910}$ ein Zinkstab um $\frac{1}{800}$

ihrer ursprünglichen Länge.

Die festerliche, luftliche Ausdehnung der festen Körper ist drei mal so groß als ihre lineare Ausdehnung, wie durch Anschauung der Fig. 12 erläutert wird. Bei einer Temperaturerhöhung von 0 bis 100° wird sich also

ein Glasgefäß um $\frac{1}{400}$
ein Kupfergefäß um $\frac{1}{300}$

seines ursprünglichen Inhalts ausdehnen.

Ein durch eine Metallstange gebildetes Pendel wird bei heißem Wetter länger sein als bei kaltem; bei heißem Wetter wird es also etwas langsamer oscilliren. Diesem Uebelstand wird durch die Compensationspendel (Rostpendel) abgeholfen, deren Construction sich auf die ungleiche Ausdehnung verschiedener Metalle gründet. Fig. 14 stellt ein aus Eisen- und Zinkstäben construiertes Rostpendel dar. Durch die Ausdehnung der beiden Eisenstäbe R und des mittlern Eisenstabes S wird die Linse des Pendels gesenkt, durch die Ausdehnung der beiden Zinkstäbe T wird sie aber um ebenso viel gehoben.

Fig. 13 stellt einen Streifen dar, welcher aus zwei verschiedenen Metallen (etwa Eisen und Zink) zusammengefeßt ist. Wenn die beiden Streifen bei mittlerer Temperatur zusammengelegt eine gerade Linie bilden, so werden sie sich bei höherer Temperatur so krümmen müssen, daß das stärker sich ausdehnende Metall das

äußere wird; bei niedrigeren Temperaturen nimmt der zusammengefeßte Streifen eine entgegengesetzte Krümmung an.

Fig. 15 stellt Brequet's Metallthermometer dar. Drei Metallstreifen, Silber, Gold und Platin, sind so aufeinander gelötet, daß sich das Gold in der Mitte zwischen dem stärker ausdehnbaren Silber und dem weniger ausdehnbaren Platin befindet. Die zusammengefeßten Metallstreifen sind zu einem sehr dünnen Bande ausgewalzt. Nachdem dieses Band spiralförmig aufgewunden worden ist, wird das eine Ende desselben bei A befestigt und an dem untern Ende der Spirale eine leichte Nadel angehängt. Jede Temperaturveränderung bewirkt, daß sich das Spiralband mehr auf- oder mehr zuwindet, wobei sich die Spitze der Nadel über die empirisch ausgeführte Gradtheilung hinbewegt.

Die Flüssigkeiten dehnen sich schon weit stärker aus als die festen Körper. Um die Ausdehnung einer Flüssigkeit zu messen, wendet man Gefäße von der Form Fig. 16 oder 17 an. Dieselben werden erst leer auf einer Waage tarirt; dann bei 0° mit der zu untersuchenden Flüssigkeit gefüllt (Fig. 17 bis zur Marke a) und das Gewicht der bei 0° im Gefäß enthaltenen Flüssigkeit bestimmt. Wird jetzt das Gefäß bis 100° erwärmt, so tritt ein Theil der Flüssigkeit aus, und man hat nun zu bestimmen, wie viel die bei 100° das Gefäß füllende Flüssigkeit wiegt. Aus diesen beiden Wägungen ergibt sich alsdann die scheinbare Ausdehnung der Flüssigkeit.

Die wahre Ausdehnung der Flüssigkeit würde man durch diesen Versuch erhalten haben, wenn sich die Gefäße nicht auch ausdehnten hätten. Man erhält die wahre Ausdehnung der Flüssigkeit, wenn man zu der scheinbaren Ausdehnung noch die Ausdehnung des Gefäßes hinzuaddirt. So ergibt sich z. B. für eine Temperaturerhöhung von 0 bis 100° die Ausdehnung

des Quecksilbers $\frac{1}{10}$ des Alkohols $\frac{1}{10}$
des Wassers $\frac{1}{20}$ des Aethers $\frac{1}{7}$

Die Ausdehnung der Flüssigkeiten benutzt man zur Construction der Thermometer. Es sind diese enge Glasröhren, an welche ein kugelförmiges oder cyllinderförmiges Gefäß angeblasen ist. Das Gefäß und ein Theil der Röhre, Fig. 18, ist mit der Flüssigkeit (meist Quecksilber, manchmal auch gefärbter Weingeist) gefüllt; oben ist die Röhre zugeschmolzen. Um das Thermometer zu graduiren, wird das Gefäß zunächst in schmelzendem Schnee gebracht, Fig. 19, und der Punkt der Röhre markirt, bei welchem der Gipfel der Quecksilbersäule sich feststellt (der Gefrierpunkt); alsdann bringt man das Thermometer in ein Gefäß, auf dessen Boden Wasser ins Kochen gebracht wird, Fig. 20 oder 21, sobald die Kugel und ein Theil der Röhre von den Dämpfen des kochenden Wassers umgeben sind. Das Quecksilber steigt nun in der Röhre bis zu einem bestimmten Punkt (dem Siedepunkt). Der Zwischenraum zwischen diesen beiden festen Punkten wird nun bei dem Celsius'schen Thermometer in 100, bei dem Réaumur'schen in 80 gleiche Theile getheilt. Bei beiden wird der Gefrierpunkt mit 0 bezeichnet, während der Siedepunkt bei erstem mit 100, beim letztem mit 80 bezeichnet ist. Beim Fahrenheit'schen Thermometer ist ein künstlicher Nullpunkt gewählt, nämlich die Temperatur, auf welche ein Gemenge von Schnee und Salmial sinkt. Den Siedepunkt hat das Fahrenheit'sche Thermometer mit den übrigen gemein. Der Zwischenraum zwischen dem Fahrenheit'schen Nullpunkt (—17½ Celsius) und dem Siedepunkt ist in 212 gleiche Theile getheilt, sobald unser Nullpunkt mit 32° der Fahrenheit'schen Scala zusammenfällt.

In Fig. 22 ist die Réaumur'sche Scala mit der Celsius'schen und der Fahrenheit'schen zusammengestellt.

Sehr merkwürdig ist die ungleichförmige Ausdehnung des Wassers. Wenn man ein Wasserthermometer in großem Maßstab herstellt und den Punkt markirt hat, bei welchem sich die Wassersäule feststellt, wenn das Gefäß mit schmelzendem Schnee umgeben ist, so findet man, daß das Thermometer steigt, wenn man es vorsichtig noch weiter erkaltet, daß es aber sinkt, wenn man es erwärmt. Es sinkt bis die Temperatur auf 6° gestiegen ist, wie man aus Fig. 23 ersieht, welche die genaue Copie der Scala eines Wasserthermometers zeigt. Wenn man die Ausdehnung des Glasgefäßes mit in Rechnung bringt, so ergibt sich, daß das Wasser bei 4° C. die größte Dichtigkeit (Dichtigkeitsmaximum) hat, daß also Wasser von 4° sich ausdehnt, mag man es nun erwärmen oder erkalten.

Beim Gefrieren dehnt sich das Wasser nochmals aus, so daß das specifische Gewicht des Eises nur $\frac{1}{10}$ von dem des Wassers ist, weshalb denn das Eis auch auf Wasser, selbst auf kochendem Wasser schwimmt.

Die Gewalt, mit welcher sich das Wasser beim Gefrieren ausdehnt, ist so groß, daß es die stärksten Gefäße, selbst eiserne Bomben sprengen kann, wie durch Fig. 24 und 25 erläutert wird.

Weit stärker noch als die flüssigen Körper dehnen sich die gasförmigen aus, und zwar ist die Ausdehnung für alle Gase gleich groß, sie beträgt $\frac{1}{273}$ für eine Temperaturerhöhung von 100°.

II. Schmelzen und Erstarren.

Durch gesteigerte Erwärmung kann man die meisten festen Körper schmelzen, wenn sie nicht schon vorher eine chemische Zersetzung erleiden. Die Temperatur, bei welcher ein fester Körper schmilzt, ist für den gleichen Stoff stets derselbe. Sie ist z. B. der Schmelzpunkt für

Eisen	1600° C.	Wachs	68° C.
Eis			0
Eis	334	Eis	0
Schwefel	109	Quecksilber	—40.

Wenn ein fester Körper schmilzt, so wird eine mehr oder minder große Menge Wärme gebunden, d. h. er nimmt eine große Menge Wärme auf, welche lediglich zur Schmelzung gebraucht wird, ohne die mindeste Temperaturerhöhung zu bewirken. So bedarf es einer großen Wärmemenge um Schnee von 0° in Wasser von 0° zu verwandeln. In einen kleinen Holzkelb, Fig. 26, fülle man 2 Pfund Schnee von 0° und schütte darauf 2 Pfund Wasser von 79°, so wird bei gehörigem Umrühren alsbald aller Schnee geschmolzen sein, und man hat nun 4 Pfund Wasser von 0°. Alle Wärme also, welche die 2 Pfund Wasser abgaben, während sie von 79° auf 0° erkalteten, hat lediglich dazu gedient, 2 Pfund Schnee zu schmelzen.

In ähnlicher Weise wird Wärme bei der Schmelzung jedes festen Körpers gebunden.

Wenn einem festen Körper beim Uebergang in den flüssigen Zustand nicht genug Wärme von außen zugeführt wird, so muß seine Temperatur sinken. Jede rasche Auflösung eines Salzes im Wasser ist von einer Temperaturerniedrigung begleitet. Darauf beruht der Eisapparat, Fig. 27. Die einzelnen Blechröhren des Gefäßes, welches in Fig. 28 im Durchschnitt dargestellt ist, werden mit Wasser gefüllt und nachdem der Dedel aufgeschraubt ist, in den Holzkelb eingesetzt, wie Fig. 27 zeigt. In diesen Kelb werden nun zunächst 5 bis 6 Pfund salpetersaures Ammoniak eingefüllt und darauf dann ebenso viel Wasser gegossen. Nachdem nun auch der Kelb durch einen Dedel geschlossen ist, wird durch rasche Umdrehung des Röhrengefäßes die Auflösung des Salzes beschleunigt. Wenn man die Umdrehung

ungefähr 5 Minuten fortgesetzt hat, ist die Temperatur der Salzlösung auf 10° unter Null gesunken und das Wasser in den Röhren gefroren.

Eine sehr große Temperaturerniedrigung wird auch durch andere Kältemischungen erzeugt, so namentlich durch Mischung von Schnee oder gestoßenem Eis mit Kochsalz.

Die beim Schmelzen gebundene Wärme muß bei Erstarren eines flüssigen Körpers wieder frei werden. Beim Wasser läßt sich dies mit Hülfe des Apparats, Fig. 29, zeigen. Das Gefäß eines Thermometers ist von einem zweiten Gefäß umgeben, in welchem sich was Wasser, und über demselben ein luftleerer Raum befindet. Taucht man dies Gefäß in eine Kältemischung, so bleibt das Wasser flüssig, bis es auf 10 oder 12° unter Null erkaltet ist, dann erstarrt die ganze Masse auf einmal und das Thermometer steigt auf 0°.

Einen ähnlichen Versuch kann man mit einer schwefelsauren Natron machen, welches man in einem Glasstöbchen, Fig. 30, schmilzt und dann, nachdem man ein Thermometer hineingesetzt hat, stehen läßt. Die geschmolzene Masse erkaltet bis zur Temperatur der Umgebung, also weit unter dem Schmelzpunkt (56° C.), ohne zu erstarren; wenn man aber dann ein kleines Kristallstückchen hineinwirft, so beginnt eine massenhafte Kristallbildung, während das Thermometer um mehr als 20° steigt.

III. Dampfbildung.

Durch Zuführung von Wärme können tropfbarflüssige Körper in Gasform übergeführt werden. Solche in Gasform übergeführte Flüssigkeiten nennt man Dämpfe. Daß sich Dämpfe im leeren Raume bilden, läßt sich mit Hülfe des Apparats, Fig. 31, nachweisen. In einem gemeinschaftlichen Gefäß stehen drei Röhren, die in die Röhren des Barometers hineingeführt sind. Das Rohr b auf der linken Seite bleibt unverändert ein vollständiges Barometer, während das in den leeren Raum des Barometers b' einige Zeit Wasser aufsteigen läßt. Alsbald wird der Stand der Quecksilberäule bis zur Höhe t niedergebückt, und sich nun im Vacuum des Barometers b' Dämpfe bilden. Noch auffallender wird diese Depression (bis wenn man in dem dritten Barometer b'' einige Tropfen Aether aufsteigen läßt, dessen Dämpfe bei gleicher Temperatur eine weit bedeutendere Spannkraft haben).

Am besten lassen sich die wichtigsten Gesetze der Dampfbildung an einem Dampfkeffel, etwa an einem Papin'schen Topfe, Fig. 32, erläutern. In dem geschraubten Dedel befinden sich drei Oeffnungen, von denen eine ein Sicherheitsventil angebracht, die Belastung durch Verschiebung des Gewichts q regulirt; in die zweite Oeffnung ist ein in den Röhren hineingestülptes Rohr aus Eisenblech eingefügt, welches zum Theil mit Quecksilber ausgefüllt ist, in das Quecksilber eingesetztes Thermometer zeigt die Temperatur des im Keßel enthaltenen Wassers. Auf der dritten Oeffnung endlich befindet sich ein kurzes Rohr, welches durch einen Hahn verschlossen werden, und auf welches man verschiedene Auslassungsöffnungen aufschrauben kann.

Der Keßel wird ungefähr bis zu $\frac{1}{2}$ seiner mit Wasser gefüllt und dann auf ein genügend hohes Feuer gebracht. Wenn nun der Hahn offen ist, steigt alsbald die Temperatur des Wassers bis Siedepunkt, d. h. bis 100°. Das Wasser kocht, das Kochen noch so lange fortgesetzt werden, so daß es in ein eingeseiftes Thermometer doch nicht über 100° steigt. Alle dem Wasser zugeführte Wärme entweicht mit dem Wasser zusammen mit dem ausströmenden Dampf.

ausströmenden Dämpfe nehmen auch alsbald alle Luft aus dem obern Theil des Kessels mit fort.

Sobald aber nun durch Schließung des Hahns dem Abströmen des Dampfes ein Ende gemacht wird, beginnt das Thermometer in *a* zu steigen; in dem obern Theile des Kessels bilden sich mehr und mehr Dämpfe, ihre Spannkraft, d. h. der Druck, den sie gegen die Gefäßwände ausüben, wächst, bis sie endlich im Stande sind, das Ventil zu heben und aus demselben auszufließen.

Wird das Feuer entfernt, so sinkt allmählich die Temperatur des Wassers und die Spannkraft der Dämpfe nimmt ab; bei 100° ist die Spannkraft der Dämpfe wieder gleich dem Druck der äußern Atmosphäre. Sinkt die Temperatur noch mehr, so sinkt der Dampfdruck im Innern des Kessels unter den Druck der Atmosphäre.

Sehr schön läßt sich dies auch mit dem Apparat Fig. 33 zeigen. Durch den Kork, welcher den Ballon *a* schließt, gehen zwei Glasröhren, die eine *c* geht fast bis auf den Boden von *a*, die andere *b* mündet dicht unter dem Kork. Bringt man das Wasser in *a* ins Kochen, während *c* oben verklopft ist, so entweichen die Dämpfe mit der Luft durch *b*. Leuchtet man nun das untere Ende von *b* in Wasser und entfernt man die Flamme, welche unter *a* war, so werden die Dämpfe in *a* condensirt, und das Wasser steigt durch die Röhre *b* in den Ballon. Ist dieser etwa zur Hälfte mit Wasser gefüllt, so verklopft man *b*, öffnet *c* und bringt wieder eine Weingeistflamme unter *a*; die nun in *a* entwichelten Dämpfe pressen auf das Wasser im Ballon und heben es in die Röhre *c*, sobald es oben aus derselben ausfließt.

Die Spannkraft des Wasserdampfes, welche einer bestimmten Temperatur entspricht, läßt sich mit Hilfe des Manometers *rr*, Fig. 34, bestimmen, welches mit dem Kessel *C* in Verbindung steht, oder auch durch Apparate von der Form der Fig. 35 (auf Taf. 6 irrthümlich mit 53 bezeichnet) welche einem Barometer gleichen, in dessen zugeschmolzenem Gefäß sich über dem Quecksilber nur noch Wasser befindet. Sobald das Gefäß erwärmt wird, bilden sich Wasserdämpfe in demselben, welche eine Quecksilbersäule im längern Rohre heben, aus dessen Höhe man auf die Spannkraft der Dämpfe schließen kann.

Zur Messung der Spannkraft für Temperaturen, welche unter der des Siedepunktes liegen, wendet man Dampfbarometer von der Form Fig. 31 an.

Die Spannkraft des Wasserdampfes ist

1/2 Atmosphären bei 50° C.	2 Atmosphären bei 121° C.
1/4 " " 65 " 4	" " 145
1/3 " " 81 " 8	" " 173
1 " " 100 " 16	" " 204.

Zu den wichtigsten Anwendungen der Spannkraft der Dämpfe gehört ebenfals die Dampfmaschine, deren Beschreibung der Maschinenlehre zufällt.

In einem gegebenen Raume kann sich bei gegebener Temperatur nur eine bestimmte Menge Dampf bilden, und diese Dampfmenge bildet sich in einem leeren Raume augenblicklich, wenn eine hinreichende Menge Flüssigkeit vorhanden ist. So können z. B. bei einer Temperatur von 100° C. in einem Raume von 1 Kubitdecimeter gerade 600 Milligrammen und nicht mehr Wasserdampf enthalten sein. Wenn die möglichst große Quantität Dampf in einem Raume enthalten ist, so nennt man den Dampf gesättigt. Fig. 36 stellt einen Cylinder von 1 Quadratdecimeter Querschnitt dar, in welchem ein Kolben luftdicht auf- und abgehoben werden kann. Unten steht dieser Cylinder durch ein Rohr mit einem Dampfessel in Verbindung, welche durch

den Hahn *h* unterbrochen werden kann. Der Dampfseßel sei auf 100° C. erwärmt, und auch der Cylinder befinde sich seiner ganzen Länge nach in einer Umgebung von 100°. Zu Anfang stehe der Kolben auf dem Boden auf und werde dann 1 Decimeter hoch in die Höhe gezogen, so befindet sich nun unter dem Kolben ein Raume von 1 Kubitdecimeter, in welchem sich 600 Milligrammen gesättigter Wasserdampf verbreiten.

Wird jetzt der Hahn *h* geschlossen und dann der Kolben soweit in die Höhe gezogen, daß unter ihm ein freier Raume von 2, 3 bis 6 Kubitdecimetern entsteht, so verbreiten sich die 600 Milligrammen Dampf auch in den größern Raume, welcher 1200, 1800 . . . 3600 Milligramm Dampf aufnehmen könnte, jetzt ist also der Dampf nicht mehr gesättigt, er verhält sich wie atmosphärische Luft. Man kann ihn wieder bis auf 1 Kubitdecimeter zusammenbrücken, ehe er gesättigt ist.

Wenn aber der gesättigte Wasserdampf noch weiter comprimirt wird, so kann die ganze Dampfmenge nicht mehr gasförmig bleiben, bei unveränderter Spannkraft wird dabei um so mehr Dampf zu flüssigem Wasser verdichtet, je weiter man den Kolben niederdrückt.

Mit Wasserdampf läßt sich dies nicht wohl sichtbar machen, wohl aber mit schwefeliger Säure, welche unter mittlerem Luftdruck und bei mittlerer Temperatur gasförmig ist. Die gesättigte schwefelige Säure übt bei 16° C. einen Druck von 4 Atmosphären aus, unter dem Druck von 1 Atmosphäre kann sie also bei dieser Temperatur nicht gesättigt sein. In einem eisernen, mit Quecksilber gefüllten Gefäße *C*, Fig. 37, sind mehrere Glasröhren eingesezt, von denen das eine mit atmosphärischer Luft, ein zweites mit schwefeliger Säure, ein drittes mit Euphonia u. s. w. gefüllt ist. Das Gefäß *C* wird nun sammt seinen Glasröhren in einen starken Glaszylinder *A* eingesezt, auf dessen obere Fassung eine Druckpumpe aufgeschraubt werden kann. Wenn *A* ganz mit Wasser gefüllt ist und mittels der Druckpumpe noch mehr Wasser eingepreßt wird, so werden auch die Gase in den Glasröhren comprimirt, welche sich anfangs ganz so verhalten wie die Luft. Sind aber alle Gase auf 1/2 ihres ursprünglichen Volumens, so wird nun zunächst bei fortgesetztem Einpressen von Wasser die schwefelige Säure zur Flüssigkeit verdichtet, während die Condensation des Euphonia ungefähr bei einem Druck von 7 Atmosphären erfolgt.

Bei 0° ist die Spannkraft der gesättigten Kohlensäure ungefähr gleich 39 Atmosphären. Die unter dem Druck der Atmosphäre stehende Kohlensäure muß man also bei 0° auf 1/39 ihres Volumens comprimiren, ehe sie in flüssigen Zustand übergeht. — Um Kohlensäure in größeren Quantitäten flüssig zu machen, dient der Rother'sche Apparat, Fig. 38. Mittels einer Vorrichtung, welche dem Laderoß der Windbüchse ähnlich ist, deren Kolbenstange aber durch Kurbel und Schwungrad in Bewegung gesetzt wird, wird in den Recipienten *r* die Kohlensäure eingepreßt. An dem untern Ende des Laderoßes bei *s* wird ein Kautschuchschlauch angeheft, welcher zu dem Kohlensäure-Entwicklungsapparat, Fig. 39, führt. Wenn der Kolben im Laderoß seine tiefste Stellung hat, so gelangt die Kohlensäure von dem Apparat, Fig. 39, durch den Kautschuchschlauch in das Laderoß, beim Aufgang des Kolbens aber wird alle in das Laderoß eingebrungene Kohlensäure in den Recipienten *r* gepreßt.

Die Einrichtung des Recipienten ist aus Fig. 40 zu ersehen. Unten ist ein Ventil angebracht, welches dem Gase zwar den Eintritt, aber nicht den Austritt gestattet. Oben ist der Recipient mit einem Ausströmungsröhrchen *n* versehen, welches durch Drehen der Schraube *t* geöffnet oder geschlossen werden kann. Wäh-

rend des Einpumpens ist der Recipient r mit einem Gefäße umgeben, welches eine Kältemischung enthält.

Der Siedepunkt einer Flüssigkeit ist die Temperatur, bei welcher sich bei hinlänglicher Wärmezufuhr Dampfblasen im Innern der Flüssigkeit bilden, welche dann aufsteigen und an der Oberfläche der Flüssigkeit entweichen. Die Siedetemperatur hängt vom Druck ab, welcher auf der Oberfläche der Flüssigkeit lastet. Der normale Siedepunkt ist die Temperatur, bei welcher das Kochen stattfindet, wenn der auf der Flüssigkeit lastende Druck gleich ist dem mittlern Atmosphärendruck (Barometerstand 28 Zoll oder 760^{mm}). Mit vermindertem Druck wird der Siedepunkt erniedrigt. Stellt man ein Glas mit Wasser von 60 bis 70° unter den Recipienten der Luftpumpe, so kommt es nach einigen Kolbenzügen ins Kochen. Wenn man in einem Glas Kolben Wasser so lange im Kochen erhält, daß alle Luft ausgetrieben ist, und dann, nachdem die Öffnung mit einem gutschließenden Kork geschlossen worden ist, das Gefäß umkehrt, wie Fig. 41 zeigt, und die verkorkte Mündung unter Wasser bringt, so befindet sich über dem Wasser im Ballon ein luftleerer, nur mit Dämpfen gefüllter Raum. Kühlt man diese Dämpfe durch Ausgießen von kaltem Wasser ab, so kommt die noch warme Flüssigkeit sogleich wieder ins Kochen. Daß durch vermehrten Druck der Siedepunkt erhöht wird, kann man mit Hilfe des Papinianschen Topfes, Fig. 32, zeigen.

Regnault benutzt das Sieben des Wassers unter einem bestimmten, nach Willkür veränderlichen Druck, um die Spannkraft der Dämpfe zu messen. Fig. 32, Taf. 7, stellt den dazu verwendeten Apparat dar. Der kleine Dampfkeßel A, in dessen Dedel mehrere Thermometer eingelassen sind, steht durch die (mittels Wasser fast gehaltene) Nöhre CB in Verbindung mit dem in kaltem Wasser stehenden Ballon G. In dem Ballon G wird nun die Luft mittels einer bei J angeschraubten Compressionspumpe beliebig comprimirt und der entsprechende Druck an dem Manometer N abgelesen.

Während nun der Druck in G, also auch der Druck, welcher auf der Flüssigkeit in A lastet, ungewändert bleibt, wird das Wasser in A durch Feuer in O erwärmt. Die Thermometer in A steigen, bis das Wasser in A ins Sieden kommt, dann bleibt ihre Stellung konstant, und man erhält so die Temperatur, welche der am Manometer abgelesenen Spannkraft entspricht.

Den normalen Siedepunkt einer Flüssigkeit kann man mit Hilfe des Apparats Fig. 21, Taf. 6, oder des Apparats Fig. 42, Taf. 6, bestimmen.

Wenn man Wasser in eine Platinschale, Fig. 43, Taf. 6, tröpfelt, welche durch eine untergelegte Weingeistflamme glühend gemacht ist, so kommt das Wasser nicht ins Kochen, weil sich zwischen dem heißen Metall und dem Wasser eine Dampfsschicht bildet, welche den Uebergang der Wärme hindert. Die Wassermasse nimmt unter fortwährendem zitternder Bewegung die sternförmige Gestalt Fig. 44 an (Leidenfrostsche Tropfen).

Eine ähnliche Erscheinung tritt ein, wenn man ein Gemisch von fester Kohlen säure und Aether in einen glühenden Platintiegel, Fig. 45, bringt. Die Masse bleibt so kalt, daß, wenn man einen kleinern Platintiegel mit Quecksilber in dieselbe eintaucht, das Quecksilber nach kurzer Zeit gefriert.

Beim Uebergang einer Flüssigkeit in Dampf form wird stets eine gewisse Wärmemenge gebunden; so muß man z. B. einem Pfund Wasser von 100° eine gewisse Wärmemenge zuführen, um dasselbe in Dampf von 100° zu verwandeln. Umgekehrt wird eine entsprechende Wärmemenge frei, wenn eine bestimmte Dampfmenge zur Flüssigkeit condensirt wird.

Diese Proceß der Wärmebindung durch Verdampfung und des Freiwerdens der Wärme durch Condensation von Dämpfen finden in jedem Destillirapparat statt. In der Retorte a, Fig. 46, wird z. B. die Flüssigkeit verdampft, während die gebildeten Dämpfe in der kühler gehaltenen Vorlage b wieder condensirt werden. In a wird Wärme gebunden, in b wird Wärme frei. Fig. 47 stellt eine andere Form des Destillirapparats dar. Die in A gebildeten Dämpfe werden durch ein langes Glasrohr geleitet, welches von einem warmen, stets von kaltem Wasser durchströmten, umgeben ist. Fig. 48 endlich stellt einen größern Destillirapparat dar. Die im Kessel B entwickelten Dämpfe werden durch den Helm AC in das Schlangenrohr D geleitet, aus welchem unten bei O die condensirte Flüssigkeit abfließt. Das Schlangenrohr D befindet sich in einem mit kaltem Wasser gefüllten Bottich. Durch die im Schlangenrohr frei werdende Wärme wird das Kühlwasser erwärmt.

Kennt man die Quantität und die Temperaturerhöhung des Kühlwassers und die Quantität der im Schlangenrohr condensirten Flüssigkeit, so kann man dann die latente Wärme der Dämpfe berechnen. Um die Berechnung der latenten Wärme der Dämpfe nöthigen Data mit möglicher Genauigkeit zu erhalten, hat Regnault dem Condensationsapparat die Gestalt Fig. 49 gegeben. Die Dämpfe treten von der rechten Seite her zuerst in die Kugel A, aus dieser in B und aus B in das bei a mündende Schlangenrohr. Die condensirte Flüssigkeit wird durch den Hahn q abgelassen.

Wenn eine rasche Verdampfung stattfindet, ohne daß die dazu nöthige Wärmemenge schnell genug von außen zugeführt wird, muß eine Erhaltung stattfinden. Umwidelt man z. B. die Kugel eines Thermometers mit Baumwolle, die man mit Aether tränkt, so sinkt das Thermometer unter den Gefrierpunkt, wenn man durch kräftiges Schwenken eine rasche Verdampfung bewirkt.

In ein ganz dünnwandiges Schälchen von Kupfer gieße man etwas Schwefelsäure und setze es auf ein Holzbretchen, Fig. 50, auf welches man etwas Wasser gegossen hat, sobald das Kupferschälchen unten von einer Wasserschicht umgeben ist. Wenn man nun durch vorsichtiges Blasen mit einem Blasebalg den Aether rasch verdampfen macht, so gefriert das Wasser.

In Wollaston's Rhyophor, Fig. 51, gefriert das Wasser durch seine eigene Verdunstung. Der ausgedehnte Apparat ist durch Ausstochen luftleer gemacht, sobald er außer etwas Wasser nur noch Wasserdampf enthält. Bringt man nun die Kugel A in eine Kältemischung, so werden hier die Dämpfe condensirt, und infolge davon findet in B eine so rasche Verdampfung statt, daß das Wasser gefriert.

Unter die Glode der Luftpumpe, Fig. 1, Taf. 7, läßt man ein breites Gefäß mit concentrirter Schwefelsäure, welches mittels dünner Drähte ein flaches, innen verkrustetes, einige Wassertropfen enthaltendes Schälchen von Korkholz trägt. Wenn man nun rasch möglichst weit evacuir und dann die Verbindung des Recipienten mit dem Stiefel der Luftpumpe unterbricht, so ist das Wasser nach einigen Minuten gefroren, weil die Schwefelsäure die Wasserdämpfe stark absorbiert und dadurch eine schnelle Verdampfung des Wassers in A bewirkt.

Je niedriger der Siedepunkt einer Flüssigkeit liegt, desto rascher verdampft sie, eine desto stärkere Erhaltung wird also durch ihre Verdampfung hervorgerufen.

Der Siedepunkt der flüssigen Kohlen säure liegt ungefähr 80° C. unter Null. Kehrt man nun den mit flüssiger Kohlen säure gefüllten Recipienten Fig. 40, Taf. 6, um, sobald die Partie g+n unten ist, öffnet man dann durch Drehen der Schraube t das Ausströmungsdröhrchen n, so ver-

pft ein Theil der hier ausströmenden flüssigen Kohlsäure so rasch, daß die dadurch hervorgerufene Kälte leicht, um den Rest der ausgeströmten Kohlsäure einen festen Körper zu verwandeln; um die fest-ordene Kohlsäure, die eine schneearartige Form annimmt, zu sammeln, wendet man den Apparat Fig. 2 3, Taf. 7, an. Zwei kurze Cylinder von Messingblech, und CD, welche auf der einen Seite durch einen ölbten Boden geschlossen sind, werden so zusammen-ge-
setzt, daß sie einen geschlossenen Raum bilden. Das Strömungsrohr n, Fig. 40, Taf. 6, wird in die Hülse gesetzt, so daß durch d die Kohlsäure in das Innere des Apparats einströmt. Die Handgriffe des Apparats sind hohl, so daß die verdampfte Kohlsäure durch die Löcher im Boden und die Öffnung der Handgriffe entweichen kann. Öffnet man den Apparat, nachdem das Ausströmen durch d eine genügende Zeit gedauert hat, so findet man ihn mit einer schneearartigen Masse, der festen Kohlsäure, gefüllt.

IV. Spezifische Wärme.

Um in gleichen Gewichtsmengen verschiedener Substanzen gleiche Temperaturerhöhung hervorzubringen, darf man verschiedene Warmemengen. Um 1 Pfund Eisen um 1° C. zu erwärmen, bedarf man nur 1/2 der Warmemenge, welche zu einer gleichen Temperaturerhöhung von 1 Pfund Wasser nöthig ist.

Um die Ungleichheit der spezifischen Wärme verschiedener Substanzen anschaulich zu machen, lege man eine Kugel von Kupfer und eine gleichschwere Kugel von Zinn, welche beide in kochendem Wasser auf 100° C. erwärmt worden sind, auf eine entsprechend dicke Scheibe von Wachs, Fig. 52, Taf. 6. Die Kupferkugel wird in kurzer Zeit die Wachsplatte durchgeschmolzen haben und abfallen, während die Zinnkugel durch die von ihr zugegebene Wärme die Wachsplatte nicht ganz durchzumelzen vermag.

Nimmt man die Warmemenge zur Einheit, welche nöthig ist, um 1 Gramm Wasser um 1° zu erhöhen, so ist die spezifische Wärme irgendeines Stoffs diejenige Einheit gemessene Warmemenge, welche erforderlich ist, um 1 Gramm der Substanz gleichfalls 1° zu erwärmen. In diesem Sinne ist $\frac{1}{1000}$ die spezifische Wärme des Eisens und $\frac{200}{1000}$ die des Zinns.

Um die spezifische Wärme verschiedener Stoffe zu bestimmen, kann man verschiedene Methoden anwenden. Methode des Eis schmelzens läßt sich am einfachsten in folgender Weise ausführen. In einem Local, in dem die Temperatur etwas unter 0° ist, höhle man einen Block, Fig. 53, Taf. 6, etwas aus, werfe ein Gefäß, auf eine bestimmte Temperatur erwärmtes Wasser, in der zu prüfenden Substanz (z. B. 1 Pfund Eisen, welches auf 100° erwärmt ist) hinein und bedecke die Öffnung mit einem Eisdeckel z. Aus der Menge des Eis, welches der eingeworfene Körper zu schmelzen vermag, kann man auf seine spezifische Wärme schließen. Die Methode der Mischung führt Regnault in folgender Weise aus. Der zu untersuchende Stoff wird in Form kleiner Stüchchen in ein Körbchen von einem Draht gebracht und mit diesem in einem Raum Fig. 4, Taf. 7, aufgehängt, der ringsum von einem kochenden Wassers umgeben ist, welche bei 100° und bei c austreten. Ist der in A aufgehängte Körper auf 100° erwärmt, so wird er herabgelassen in das Kühlwasser des Gefäßes D gebracht, welches dann sogleich unter dem Erwärmungsapparat vorgezogen wird. Aus der Temperaturerhöhung, welche das Kühlwasser in D durch die Abkühlung der

hineingefestigten Substanz erleidet, kann man auf die spezifische Wärme der letztern schließen. Fig. 5 ist eine äußere Ansicht des eben besprochenen Regnault'schen Apparats.

Kopp führt die Mengungsmethode in anderer Form aus. Eine gewogene Menge der zu behandelnden Substanz wird in Form kleiner Stüchchen in ein Glasröhrchen, Fig. 6, Taf. 7, gebracht und dann eine Flüssigkeit von bekannter spezifischer Wärme, etwa Steinöl daraufgegossen. Nachdem auch das Gewicht dieser Flüssigkeit ermittelt ist, wird die Röhre sammt ihrem Inhalt in das Quecksilber des Gefäßes B eingetaucht, welches durch ein Oelbad auf einer constanten Temperatur von 50 bis 60° erhalten wird. Hat die Röhre sammt Inhalt diese Temperatur angenommen, so wird sie rasch in das Wasser des Calorimeters D, Fig. 7, eingetaucht und die Temperaturerhöhung beobachtet, welche durch die Abkühlung in der gewogenen Wassermasse des Calorimeters D hervorgerufen wird.

Das wichtigste Resultat der Untersuchungen über spezifische Wärme ist das von Dulong und Petit aufgestellte Gesetz, daß für Gemisch einfache Stoffe in fester Form, die spezifische Wärme dem Atomgewicht umgekehrt proportional ist.

Um die spezifische Wärme der Gase zu untersuchen, wendete Regnault einen Apparat an, der zum Theil in Fig. 8, Taf. 7, dargestellt ist. In einem 30 Liter haltenden Ballon von starkem Kupferblech wird das zu untersuchende Gas stark comprimirt. Aus diesem Behälter strömt es nun durch die Röhren a und c in das Schlangentrohr des Erwärmungsapparats O. Dieses Schlangentrohr ist mit Oel umgeben, welches durch eine untergelegte Weingeistlampe auf constanten Temperatur erhalten wird. Aus dem Schlangentrohr in O tritt das Gas mit einer am Thermometer T abzulesenden Temperatur in das Schlangentrohr des Calorimeters C, welches mit kaltem Wasser umgeben ist, dessen Temperatur allmählich durch die Abkühlung des durchströmenden Gases erhöht wird.

Eine bei K angebrachte Vorrichtung macht es möglich, daß das Gas längere Zeit hindurch mit gleichförmigem, am Manometer M abzulesendem Druck durch den Apparat hindurchstreicht. Die Quantität des in einer bestimmten Zeit durch den Apparat streichenden Gases ergibt sich, wenn man die Spannkraft des im großen Ballon befindlichen Gases zu Anfang und zu Ende des Versuchs mißt, vorausgesetzt, daß man das Volumen des Ballons genau kennt.

Bei gleichem Druck ist die spezifische Wärme gleicher Volumina für alle Gasarten dieselbe.

V. Wärmestrahlung.

Jeder heiße oder warme Körper sendet Wärmestraahlen aus, welche durch Luft und andere Körper in ähnlicher Weise hindurchgehen, wie die Lichtstrahlen durch durchsichtige Körper.

Die Wärmestraahlen, welche durch einen Körper hindurchgehen, erwärmen denselben nicht; erst wenn sie von einem Körper absorbiert, verschluckt werden, werden sie in fühlbare Wärme verwandelt. Dies läßt sich mit Hülfe zweier metallener Hohlspiegel, Fig. 9, Taf. 7, nachweisen, welche in einer Entfernung von 10—20 Fuß so aufgestellt sind, daß ihre Axen in eine gerade Linie zusammenfallen. Bringt man in den Brennpunkt des einen Spiegels eine weißglühende Eisenkugel, in den Brennpunkt des andern ein Stück Zunder, so geräth dieser in Brand. Dieser Versuch beweist zugleich, daß die Wärmestraahlen nach denselben Gesetzen reflectirt werden, wie die Lichtstrahlen.

Um genauere Versuche über strahlende Wärme zu machen, wandte man früher Leslie's Differenzthermometer, Fig. 10, an. Zwei Glasröhren, welche nur verdünnte Luft enthalten, sind durch eine Glasröhre verbunden, deren Gestalt man aus der Figur ersieht. Ungefähr in der Mitte der Röhre befindet sich ein kleines Flüssigkeitskölchen, welches bei Erwärmung der einen Kugel gegen die andere hingetrieben wird. Die Kugeln sind mit Kienruß überzogen, welcher die Wärmestrahlen stark absorbiert, sobald schon eine geringe Wärmestrahlung, welche eine solche Kugel trifft, eine merkliche Erwärmung hervorbringt.

Noch empfindlicher und sicherer in seinen Angaben ist Melloni's Thermomultiplicator. Er besteht aus zwei Theilen, einer thermo-electrischen Säule, Fig. 59, Taf. 6, welche erst in der Electricitätslehre besprochen werden kann, und einem Multiplicator, dessen nähere Betrachtung bis zur Lehre vom Electromagnetismus verschoben werden muß. Hier genügt die Bemerkung, daß der Multiplicator aus zwei an einem einfachen Seidenband aufgehängten Magneten besteht, deren untere von zahlreichen Windungen übersponnenen Kupferdrahts umgeben ist. Sobald ein schwacher elektrischer Strom durch die Drahtwindungen hindurchgeht, wird das Nadelpaar aus seiner Gleichgewichtslage abgelenkt.

Wie ein solcher Multiplicator mit dem Melloni'schen Apparat verbunden ist, sieht man in Fig. 11, Taf. 7, wo p die in eine Messinghülse gefasste Thermosäule und M den Multiplicator darstellt. Von jedem Pole der Thermosäule geht ein Verbindungsdraht zu einem Ende der Multiplicatorwindungen. Die Thermosäule ist nun auf der einen Seite mit einer cylindrischen Hülse a , auf der andern mit einer konischen Hülse b versehen. Die Hülse, durch welche Wärmestrahlen auf die Thermosäule fallen sollen, ist offen, die andere ist durch einen Dedel geschlossen, wie b in unserer Figur.

Läßt man nun von der einen Seite her Wärmestrahlen auf die Thermosäule fallen, so entsteht ein elektrischer Strom, welcher eine mehr oder minder bedeutende Ablenkung der Magnetnadel im Multiplicator bewirkt.

Es wird nun der Thermosäule gegenüber ein Hohlwürfel H , Fig. 11, von Messingblech aufgestellt, welcher durch eine untergestellte Weingeistlampe lebend erhaltenes Wasser enthält. Die eine Seite dieses Würfels ist mit Ruß überzogen, eine zweite ist polirt. Beträgt die Ablenkung des Multiplicators 30° , wenn die berußte Seite der Thermosäule zugekehrt ist, so geht sie auf 4° zurück, wenn man die polirte Seite des Würfels der Thermosäule zulehrt. Die berußte Fläche hat also ein stärkeres Ausstrahlungsvermögen, als die polirte Metallfläche.

Die Fähigkeit verschiedener Substanzen, die Wärmestrahlen durchzulassen, ist sehr ungleich. Solche Körper, welche die Wärmestrahlen gut durchlassen, nennt man diatherman, durchwärmig, solche dagegen, welche die Wärmestrahlen nicht durchlassen, heißen atherman.

Fig. 12 stellt den Melloni'schen Apparat dar, wie er arrangirt ist, um die Diathermanität verschiedener Substanzen zu vergleichen. Vor der Wärmequelle, als welche entweder eine kleine Oellampe L mit metallischem Reflector, oder der mit heißem Wasser gefüllte Hohlwürfel H , oder das durch eine Weingeistlampe auf ungefähr 400° erwärmte, geschwärzte Kupferblech, Fig. 12, u. f. w. dienen kann, ist ein Schirm s aufgestellt, welcher mit einer kreisförmigen Oeffnung versehen ist, hinter dieser Oeffnung wird dann eine Platte r der zu prüfenden Substanz aufgestellt.

Derartige Versuche haben nun ergeben, daß Stein-

salz der einzige feste Körper ist, welcher Strahlen aller Wärmequellen gleichgut durchläßt, welcher also vollkommen diatherman ist.

Glas läßt nur 39 Procent der von dem Oellampfen, und nur 6 Procent der von dem erbigsten Kupferblech kommenden Strahlen durch, während die von Hohlwürfel H kommenden Strahlen fast gar nicht durch vom Glas durchgelassen werden. Ähnlich verhalten sich andere durchsichtige Körper, sie absorbiren Zugeweiße die Strahlen dunkler Wärmequellen.

Die Luft ist so vollkommen diatherman, daß eine Luftsäule von 10 bis 20 Fuß Länge kaum eine merkliche Absorption von Wärmestrahlen bewirkt. Daher durchsichtige Gase aber üben wenigstens auf dunkle Wärmestrahlen eine bedeutende Absorption aus. Läßt die eine Seite eines ungefähr 2 Fuß langen Glasrohrs, Fig. 14, stelle man die Thermosäule auf, an dem andern Ende des Rohrs aber das durch eine Weingeistlampe auf 400° erwärmte Kupferblech, Fig. 12, so werden die von dem heißen Blech durch die Luft im Rohr auf die Thermosäule fallenden Strahlen eine namhafte Ablenkung der Multiplicatornadel bewirken. Sobald man aber durch ein Gummiröhr bei o Wasser gas in das Rohr eintreten läßt, findet ein bedeutender Rückgang der Multiplicatornadel statt.

Die Durchbarkeit der Wärmestrahlen läßt sich mit Hülfe des in Fig. 15 dargestellten Arrangements des Melloni'schen Apparats zeigen, wobei welchem freilich der Hohlwürfel H in den meisten Fällen durch die kleine Oellampe L , Fig. 12, zu ersetzen ist.

Um die Vertheilung der Wärme im Sonnenspectrum zu studiren, wendet man statt der Thermosäulen mit quadratischen Endflächen lineare Thermosäulen an, d. h. solche, bei welchen ungefähr 15 Thermoelemente in einer Ebene liegen. Fig. 16 stellt eine solche lineare Thermometer Säule in ihrer Fassung dar. Erzeugt man nun mittels eines Prismas ein Sonnenspectrum, so zeigt sich kaum eine Spur von Wärmewirkung, wenn man die Thermosäule am violetten Ende des Spectrums aufstellt. Die Wärmewirkung wächst aber um so mehr, je weiter man die Thermosäule gegen das rothe Ende des Spectrums verschiebt, wie dies durch die thermische Intensitätscurven, Fig. 17, erläutert wird, welche über dem Spectrum gezeichnet ist. In dem sichtbaren Theil des Spectrums sind die Orientirung wegen die wichtigsten Fraunhofer'schen Linien eingetragen. Mit dem rothen Ende des Spectrums hört aber die Wärmewirkung keineswegs auf, sie erstreckt sich noch so weit über das sichtbare Spectrum hinaus, ja das Maximum der Wärmewirkung fällt noch über die rothe Grenze des sichtbaren Spectrums hinaus, wie man aus dem Verlauf der beiden Intensitätscurven sieht, von denen die untere einem Glas-, die obere einem Steinjalzprisma entspricht. In Fig. 18 sind die Intensitätscurven I des optischen, II des chemischen und III des thermischen Spectrums zusammengestellt.

VI. Wärmeleitung.

Um die ungleiche Wärmeleitung verschiedener Stoffe anschaulich zu machen, dient der Apparat Fig. 54, Taf. 6, von Ingenhousz. In die eine Seitenwand eines Blechkastens sind mehrere aus den zu vergleichenden Substanzen verfertigte Stäbchen eingesteckt, welche sämtlich gleichen Durchmesser haben und mit einer Schicht von Wachs überzogen sind. Wenn man nun lebendes Wasser in den Kasten gießt, so wird die Wachsfläche auf den einzelnen Stäbchen in gleicher Zeit um je weiter weggeschmolzen sein, je besser leitend das Stäb-

1 ist. Wenn auf dem Kupferstäbchen die Wachs-
t bereits bis ans Ende weggeschmolzen ist, ist die
melzung auf dem Eisenstäbchen ungefähr nur bis
die Hälfte, auf einem Bleistabchen nur bis auf ein
ittel der Stablänge vorgegangen, während sie auf
em Glas- oder Holzstäbchen kaum begonnen hat.
Wenn ein Metallstab AB, Fig. 19, Taf. 7, an einem
e von einer konstanten Wärmequelle erhitzt wird, so
d sich die Wärme allmählich in demselben verbreiten;
angs wird seine Temperatur an allen Stellen steigen,
h einiger Zeit aber hört dies Steigen auf, und der
ab zeigt dann überall eine konstante Temperatur,
che mit der Entfernung von der Wärmequelle ab-
immt. Diese Temperaturabnahme ist um so rascher,
schlechter die Substanz des Stabes die Wärme leitet.
die Temperatur des Stabes an verschiedenen Stellen
ermitteln, sind Löcher in denselben eingebohrt, welche
ed Silber enthalten und in welche man Thermometer
enkt.

ält man ein Drahtgitter, Fig. 20, in eine Flamme,
1 in eine Gasflamme, so erscheint diese viel abge-
eitten. Unten brennt das Gas, über dem Drahtnetz
nicht, obgleich das Gas frei durch die Maschen
urchgeht. Läßt man das nicht brennende Gas durch
Maschen des Netzes hindurchgehen, um es oberhalb
elben anzuzünden, Fig. 21, so sieht man oberhalb
Gasflamme, während das Gas unterhalb des Netzes
brennt. Die Entzündung lann sich durch das
hnetz nicht fortpflanzen, weil dasselbe als guter
rmeleiter zu viel Wärme seitlich ableitet.

Dar auf gründet sich Davy's Sicherheitslampe,
22 und 23. Hier ist die Flamme eines Dellamp-
s ringsum von einem Cylinder von Drahtnetz um-
en, durch welchen sich die Entzündung nach außen
t fortpflanzen kann, wenn man sich auch in einer
nosphäre befindet, welche, wie das in Kohlenberg-
en vorlomm, mit brennbaren Gasen gemengt ist.
Die Flüssigkeiten sind schlechte Wärmeleiter. Wenn
n ein Gefäß mit Wasser von unten her erwärmt,
heilt sich allerdings die Wärme ziemlich rasch
ganzes Wassermasse mit; diese Mittheilung geschieht
r nicht durch Leitung, sondern sie wird durch
ömungen vermittelt, wie man sehen kann, wenn
a das Wasser eines Glasgefäßes, Fig. 55, Taf. 6,
hem man einige Sägepläne zugelegt hat, durch
te untergesetzte Weingeistlampe erwärmt. In der
te steigen die erwärmten und dadurch specifisch
er gewordenen Wassertheilchen in die Höhe, wäh-
o das kältere Wasser seitlich niederströmt.

oll sich die Wärme nur durch Leitung im Wasser
breiten, so muß man es von oben erwärmen, dann
r schreitet auch die Erwärmung sehr langsam vor.
ie eine Seitenwand eines aus dünnem Blech ver-
igten Gefäßes, Fig. 56, wird mittels eines Kork-
hthermometer eingeseht und dann das Gefäß so weit
Wasser gegossen, daß sich die Thermometerkugel
2 2 Linien tief unter dem Wasserpiegel befindet.
st man nun heißes Del auf das Wasser oder
as Weingeist, den man anzündet, so wird es
geraume Zeit dauern, bis das Thermometer nur
1° steigt.

in anderer Versuch, welcher die schlechte Leitungs-
igkeit des Wassers erläutert, ist der in Fig. 24, Taf.
7, gestellte. In ein mit möglichst kaltem Wasser gefülltes,
as langes Reagensröhrchen wirft man ein Stüch-
en, welches mit Draht umwickelt ist, damit es zu
den sinkt. Man lann dann das Wasser am obern Ende
Röhrchens ins Kochen bringen, ohne daß unten ein
liches Wegschmelzen des Eises stattfindet.

ase sind schlechte Wärmeleiter, obgleich sich die
Wärmerück- 2. Auf. — Physik.

Wärme in ihnen leicht durch Strömung und Strahlung
verbreitet. Die Wärmeleitfähigkeit verschiedener
Gase ist übrigens sehr ungleich und namentlich Wasser-
stoffgas ein viel besserer Wärmeleiter als Luft, Koh-
lenäure u. s. w. Fig. 25 stellt zwei Glasröhren dar,
deren eine Wasserstoffgas enthält, während die andere
mit Luft oder Kohlenäure gefüllt ist. Die Gase sind
durch Quecksilber gesperrt. a und a' sind zwei gleich
lange und dicke Platindrähte, welche durch bidere Zu-
leitungsdrähte in den Schließungsbogen einer Volta'schen
Säule eingefügt sind. Wenn man einen Strom durch
diese Drähte sendet, so kommt zuerst der von Luft oder
Kohlenäure umgebene ins Glähen, während der von
Wasserstoff umgebene noch dunkel bleibt.

VII. Wärmeerzeugung durch mechanische Mittel.

Jede Compression der Gase ist von einer Wärme-
mentwicklung, jede Expansion ist von einer Temperatur-
erniedrigung begleitet. Es läßt sich dies sehr schön
mit Hülfe des Silbermann'schen Apparats, Fig. 26,
zeigen. In einem metallenen Cylinder läßt sich ein
luftdicht schließender Kolben auf- und abstoßen. In
dem untern Theil des Apparats sind Oeffnungen an-
gebracht, die durch Glasplatten luftdicht geschlossen sind,
und durch welche man ein im Innern befindliches
Breguet'sches Metallthermometer beobachten lann. Ist
der Apparat mit Luft oder einem andern Gase gefüllt
und die Communication mit der äußern Luft vollkom-
men abgesperrt, so wird beim Niederdrücken des Kolbens
das Thermometer steigen, es wird fallen, wenn man
den hinabgedrückten Kolben wieder in die Höhe zieht.

Bei hinlänglich starker und rascher Compression der
Luft lann die Temperaturerhöhung bedeutend genug
werden, um Zunder in Brand zu setzen, wie man mit
Hülfe des pneumatischen Feuerzeugs, Fig. 57,
Taf. 6, zeigen lann. Der Zunder wird in die untere
Höhlung des Kolbens eingesteckt, welchen Fig. 58 in grö-
ßerm Maßstabe zeigt.

Wird die Luft in einem Ballon A, Fig. 27, Taf. 7, etwas
verdünn't, so wird in dem mit dem Innern von A com-
municirenden und in ein Gefäß mit Wasser eingetauchten
Glasrohr d das Wasser bis zu einer bestimmten Höhe
aufsteigen. Oeffnet man nun momentan den etwas
weit gebohrten Hahn c, so wird sich augenblicklich
das Gleichgewicht mit der äußern Luft wiederherstellen,
das Wasser in d sinkt sogleich bis auf das Niveau
im äußern Gefäß. Bleibt nun aber der Hahn c ge-
schlossen, so steigt das Wasser wieder etwas in d,
weil das rasche Eindringen von Luft durch c von einer
Verdichtung, also auch mit einer Temperaturerhöhung
der Luft in d begleitet ist. Wenn sich nun diese Tem-
peraturerhöhung allmählich verliert, so muß das Wasser
in d wieder etwas steigen.

Wenn man in einen starken, mit Draht überflochtenen
Glasballon, Fig. 28, einige Tropfen Wasser bringt,
dann die Luft in demselben mittels der Compressions-
pumpe bis auf ungefähr 3 Atmosphären comprimirt
und den so präparirten Ballon an einem warmen Orte
einige Zeit lang ruhig liegen läßt, so wird sich beim
Oeffnen des Hahns der ganze Ballon mit Nebel füllen,
weil bei dem Ausströmen der Luft eine solche Erstaltung
erfolgt, daß ein Theil der Wasserdämpfe, welche sich
im Ballon gebildet hatten, condensirt wird.

Auch durch die Compression anderer Körper wird
Wärme erzeugt, wie z. B. die starke Erhitzung beim
Prägen der Münzen zeigt. Eine andere wichtige me-
chanische Quelle der Wärme ist die Reibung. Auf
Reibung beruht das Feuermachen mit Stahl und Stein,
mit Streichhölzchen u. s. w. Wilde Vögel machen Feuer

durch Reiben trockener Holzstücke. Fig. 29 erläutert eine Vorrichtung, deren sich die Tacota-Indianer bedienen, um Feuer zu machen. Ein Stab *ab* von trockenem hartem Holz wird zwischen zwei Bretter *A* und *B* eingesezt, welche mit einer kleinen Vertiefung zur Aufnahme der Stäbchen versehen sind; das obere Brett wird schwach aufgedrückt und dann der Stab durch die in der Figur ersichtliche Vorrichtung in rasche Rotation versetzt. Sobald sich Feuer zeigt, nähert eine zweite Person ein Stück Zunder.

Rumford brachte durch die beim Bohren einer Kanone frei werdende Wärme Wasser ins Kochen. In kleinem Maßstab läßt sich dies auch mit der Vorrichtung Fig. 30 erreichen. In ein Messingröhrchen *a*, welches auf die Rotationsaxe einer Schwungradmaschine aufgeschraubt ist, wird heißes Wasser eingegossen und dann dasselbe mit einem Kork geschlossen. Wird nun das Röhr zwischen zwei Holzbadern gefaßt, welche mit Nuten versehen sind, in welche das Röhrchen paßt, und dann die Maschine rasch gedreht, so wird nach einigen Minuten das Wasser bis zum Sieden erhitzt sein, sobald die gebildeten Dämpfe den Kork weg-schleudern.

Einerseits kann also durch mechanische Arbeit Wärme producirt, andererseits kann durch Wärme mechanische Arbeit geleistet werden, wie wir z. B. an der Dampfmaschine sehen, es muß also ein bestimmtes Größenverhältniß zwischen mechanischer Arbeit und Wärme-production bestehen. Um das mechanische Aequivalent der Wärme zu bestimmen, sind eine Reihe von Versuchen in sehr verschiedener Weise ausgeführt worden; einer der einfachsten wird durch Fig. 31 erläutert. Ein schwerer eiserner Cylinders *A* ist an 3 Meter langen Seilen aufgehängt; ihm gegenüber hängt ein schwerer Block von Sandstein. Zwischen beiden befindet sich ein Stück Blei. Wird nun der eiserne Cylinders aus der Lage *A* bis *A'* zurückgezogen und dann losgelassen, so wird er herabfallen und einen gewaltigen Stoß gegen das Bleistück ausüben, welches dadurch zusammengebrüht und erwärmt wird. Einerseits kennt man hier die mechanische Kraft des Stoßes, andererseits kann man die Temperaturerhöhung des Bleistücks messen, also die durch den Stoß entwickelte Wärmemenge ermitteln und danach das mechanische Aequivalent der Wärme berechnen.

Derartige Bestimmungen bilden den Ausgangspunkt der mechanischen Wärmetheorie, derzufolge die Wärme nicht mehr der ruhenden Gegenwart eines imponderablen Wärmestoffes, sondern einer intensiven Vibrationsbewegung der Körperatome zugeschrieben wird.

E. Magnetismus.

(Zofst 8.)

Schon im Alterthum kannte man Eisenerze, welche die Eigenschaft besaßen, Eisen anzuziehen; man nannte sie Magnete, weil sie vorzugsweise in der Nähe der Stadt Magnesia in Kleinasien gefunden wurden.

Das Magneteisen besteht aus gleichen Aequivalenten Eisenoxyd und Eisenorybul.

Solche Stücke dieses Erzes, welche die Eigenschaft haben, Eisen anzuziehen, nennt man natürliche Magnete. Wählt man sie in Eisenstücke, so bleibt diese an vielen Stellen ihrer Oberfläche in Form von mehr oder weniger großen Büscheln hängen; doch zeigt sich die anziehende Kraft, welche der Magnet auf das Eisen ausübt, keineswegs an allen Stellen seiner Oberfläche gleich stark.

Dieselbe Eigenschaft, Eisen anzuziehen, kann man aber auch dem Stahl mittheilen. Solche Stahlmagnete, welche man im Gegensatz zu den eben besprochenen als

künstliche Magnete bezeichnet, bieten den großen Theil, daß man ihnen beliebige und für die Untersuchung geeignete Formen geben kann. Wenn man einen gebogenen Stahlstab nach einer der später zu besprechenden Methoden magnetisirt hat und ihn mit Eisenstücke streut, so bleibt diese vorzugsweise an den Enden, die Pole, hängen, wie Fig. 1 auf Taf. 8 zeigt. In der Mitte fällt die Eisenstücke vollständig ab.

Jeder Magnet hat eine neutrale Mittellinie und zwei Pole. Diese beiden Pole sind aber durchaus nicht gleichartiger Natur. Um dies nachzuweisen, bedarf man einer natürlichen Magnete, welche man dadurch erhält, daß man einen in einer dünnen Messinghülle liegenden Magnet an einem ungebrochenen Faden aufhängt, wie Fig. 2 zeigt, oder daß man eine Magnetnadel, Fig. 3, auf eine Stahlspitze aufsezt, daß sie sich in horizontaler Ebene frei drehen kann.

Nähert man nun einen und denselben Pol eines Magnetstabes, den wir mit *A* bezeichnen wollen, dem Pole *n*, dann dem Pole *s* des Magnetstabes *B* oder der Magnetnadel Fig. 3, so sieht man, daß der Pole des beweglichen Magnetes von *A* angezogen, von *s* aber von *A* abgestoßen wird.

Man stelle nun zwei Magnetnadeln, etwa von der in Fig. 3 dargestellten Art, in einiger Entfernung voneinander auf, ermittle an jeder derjenigen Pole, der von einem angezogen wird, und bezeichne ihn durch Aufstecken eines weißen Papiercheitens, wie Fig. 4 andeutet, so daß der andere Pole einer jeden dieser beiden Magnetnadeln, welcher etwa durch ein schwarzes Papiercheitens bezeichneter ist, von A abgestoßen werden. Die so gezeichneten Pole der beiden Magnetnadeln sind also gleichnamig, d. h. gleichartig, ebenso wie die beiden schwarzgezeichneten.

Geht man nun eine der beiden Magnetnadeln an ihrer Spitze ab, um sie der andern, noch auf ihrer Spitze stehenden zu nähern, so findet man alsbald, daß die beiden weißen Pole einander abstoßen und ebenso die beiden schwarzgezeichneten, daß aber zwischen einem weiß gezeichneten Pole und einem schwarzgezeichneten Anziehung stattfindet.

Gleichnamige Pole stoßen sich also ab, ungleichnamige Pole ziehen sich an.

Aus später anzuführenden Gründen nennt man einen Pol eines Magnets den Nordpol, den andern aber den Südpol.

Zur Erklärung der eben besprochenen magnetischen Erscheinungen nimmt man an, daß es im Eisen und Stahl zwei imponderable Fluida (das nordmagnetische und das süd magnetische Fluidum) gebe, welche die Eigenschaft haben, daß die Theilchen eines und desselben Fluidums sich gegenseitig abstoßen, während zwischen den Theilchen des einen Fluidums und denen des andern eine Anziehung stattfindet.

Wenn man ein dünnes hartes Magnetstäbchen (als eine magnetisirte Stabnadel) in der Mitte durchschneidet, so ist jedes der beiden Stücke wieder ein vollständiger Magnet, der einen Nordpol und einen Südpol hat.

Fährt man mit Durchbrechen fort, so hat jedes Stück wieder seine zwei Pole, Fig. 5, jedes noch so kleinen Stückchen ist also ein vollständiger Magnet. Es folgt, daß jedes einzelne Stahlpartikelchen für sich ein vollständiger Magnet, d. h. daß die eine Hälfte eines jeden Stahlpartikelchens mit nordmagnetischen die andere Hälfte aber mit süd magnetischen Fluidum geladen ist. Man hat sich also einen vollständig magnetisirten Stahlmagnet ungefähr so vorzustellen, wie Fig. 6 anschaulich macht.

Ein Eisenstab wird durch die Einwirkung eines Magnets gleichfalls in einen Magneten verwandelt.

Man klemme einen vier bis fünf Zoll langen Eisenstab in ein passendes Stativ, Fig. 7, und nähere von oben einen kräftigen Magnetpol, während man das untere Ende des Eisenstabes in Eisenfeile taucht. Es bleibt dann ein Büschel Eisenfeile an dem untern Ende hängen, ein Beweis, daß der Eisenstab wirklich selbst zum Magnet geworden ist. Wenn man nun aber den Magnetpol oben langsam wegbiegt, so fällt die Eisenfeile ab, der Eisenstab verliert also seinen Magnetismus soogleich wieder, wenn die magnetisirende Kraft entfernt wird.

Ersetzt man bei diesem Versuch den Eisenstab durch einen gehärteten Stahlstab, so werden kaum einzelne Spandchen der Eisenfeile hängen bleiben, der Stahl läßt sich also nicht so leicht magnetisiren, wie das Eisen. Wenn man aber den Stahlstab durch wiederholtes Streichen an einem kräftigen Magnetpol einmal magnetisch gemacht hat, so verliert er seinen Magnetismus auch nicht so leicht, wie ein Eisenstab.

Man benutzt die Eigenschaft des Eisens, durch Berührung mit einem Magneten leicht magnetisch zu werden, um durch eiserne Anfaßstücke, welche den Namen magnetische Armaturen führen, den Magnetismus natürlicher oder künstlicher Magnete in zweckmäßiger Weise zur Wirkung zu bringen.

So wird z. B. an jede der Polflächen eines natürlichen Magnets eine ungefähr 1 Linie dicke Eisenplatte (die Flügel) 1 und 1', Fig. 8 und Fig. 9, angelegt und durch messingene Bänder befestigt, welche unten in den hervorragenden Eisenstüben p und p' (den Füßen) enden. Durch den magnetisirenden Einfluß des natürlichen Magnets werden die beiden Füße zu entgegengesetzten Magnetpolen gemacht, an die man nur einen eisernen Anker anzusetzen braucht, um eine ziemlich bedeutende Tragkraft zu erzielen.

Um bei künstlichen Magneten eine möglichst große Tragkraft zu erzielen, gibt man ihnen eine U-förmige Gestalt, Fig. 10. Solche Hufeisenmagnete bestehen entweder aus einer einzigen Stahl-Lamelle, oder sie sind aus mehreren Lamellen zusammengesetzt. Setzt man den aus weichem Eisen gebildeten Anker m an, so wird sowohl der Pol S als auch der Pol N im Anker einen Südpol in s und einen Nordpol in n zu erzeugen streben, jeder Pol des Hufeisenmagnets unterstützt die Wirkung des andern.

Man benutzt auch eiserne Armaturen zur Erhaltung und Kräftigung des Magnetismus in Stahlstäben. Zwei gleiche Magnetstäbe NS und NS', Fig. 11, werden parallel so nebeneinandergelegt, daß der Nordpol des einen nach derselben Seite gerichtet ist, wie der Südpol des andern und sagt dann zwei Stücke weichen Eisens ah und cd so an, daß dadurch das Rechte geschlossen wird.

Die Wirkung eines Magnetpols nimmt, wie alle von einem Punkte ausgehenden Fernwirkungen im umgekehrten Verhältniß des Quadrats der Entfernung ab, d. h. in der doppelten, dreifachen, vierfachen u. s. w. Entfernung ist seine magnetische Wirkung 2 · 2 oder 4 mal, 3 · 3 oder 9 mal, 4 · 4 oder 16 mal u. s. w. schwächer.

Von diesem für die einzelnen Magnetpole geltenden Gesetze ausgehend haben Gauß und Weber nachgewiesen, daß die Totalwirkung eines Magnets in die Ferne im umgekehrten Verhältniß der dritten Potenz der Entfernung abnimmt, daß sie also in der doppelten Entfernung 2 · 2 · 2 oder 8 mal, in der dreifachen Entfernung 3 · 3 · 3 oder 27 mal geringer ist, vorausgesetzt, daß die Dimensionen des Magnets sehr klein sind im Verhältniß zu der Entfernung des Punktes, auf den

er wirkt. Dies Gesetz der Totalwirkung eines Magnets läßt sich mit der Vorrichtung Fig. 12 prüfen, auf welche wir später zurückkommen.

Es ist schon davon die Rede gewesen, daß ein Stahlstab durch wiederholtes Streichen an einem Magnetpol magnetisch wird. Die einfachste Streichungsmethode ist folgende: Man streiche wiederholt (10, 20, 50 mal) die eine Hälfte des Stahlstabes, welche ein Nordpol werden soll an dem Südpol eines kräftigen Magnets, mit der andern Hälfte des Stahlstabes aber in gleicher Weise an dem Nordpol desselben, wie dies Fig. 13 anbeutet, also so, daß man den Stahlstab mit seiner Mitte auf den Magnetpol aufsetzt und ihn dann in der Richtung des Pfeils von demselben abzieht.

Härtere und größere Stahlstäbe werden nach diesem Verfahren magnetisirt, indem man sie in der angegebenen Weise an den Polen eines kräftigen Elektromagnets streicht.

Es bleibt uns jetzt noch die Wirkung zu besprechen übrig, welche der Erdbörper auf Magnete ausübt. — Wenn man einen Magnetstab (oder eine Magnetnadel), welcher so aufgehängt ist, daß er sich in horizontaler Ebene frei drehen kann, also den Magnetstab Fig. 2 (oder die Magnetnadel Fig. 3) sich selbst überläßt, so stellt er sich immer in einer bestimmten Lage ein und zwar so, daß die verlängerte Magnetaxe stets nach einem bestimmten Punkte des Horizontes hinweist. Aus dieser Gleichgewichtslage herausgebracht, oscillirt der Stab eine Zeit lang um seine Gleichgewichtslage, um endlich wieder in derselben zur Ruhe zu kommen.

Das eine Ende der Magnetnadel weist in unsern Gegenden ungefähr nach Norden, das andere ungefähr nach Süden, weshalb denn auch der eine (nach Norden zeigende Pol) der Nordpol, der andere der Südpol der Magnetnadel genannt wird.

Denkt man sich durch die beiden Pole der in ihrer Gleichgewichtslage befindlichen horizontalen Magnetnadel eine Verticalebene gelegt, so ist dies der magnetische Meridian. Wenn die Magnetnadel genau nach Norden schaute, so würde der magnetische Meridian mit dem astronomischen zusammenfallen. Es ist dies aber für die meisten Orte der Erde nicht der Fall; der magnetische Meridian macht mit dem astronomischen meistens einen Winkel, welcher die magnetische Declination oder Abweichung genannt wird. Die Declination ist östlich oder westlich, je nachdem das Nordende der Nadel östlich oder westlich vom astronomischen Meridian liegt. Stellt z. B. s n, Fig. 14, den astronomischen Meridian, ab aber die Richtung der horizontalen Magnetnadel in ihrer Gleichgewichtslage dar, so ist die Declination eine westliche.

Jeder Apparat, welcher dazu dient, die Declination zu messen, heißt eine Declinationsbussole, während man mit dem Namen einer Bussole überhaupt eine Magnetnadel bezeichnet, deren Umdrehungsaxe den Mittelpunkt eines getheilten Kreises bildet.

Nach diesen Erklärungen können wir nun auch zur Betrachtung des Apparates Fig. 12 zurückkehren. Ein 1 Meter langer in halbe Decimeter getheilter Stab wird rechtwinklig zum magnetischen Meridian gelegt und auf die Mitte desselben eine kleine Bussole gesetzt. Die Nadel der Bussole wird sich, wenn weiter keine magnetische Kraft auf sie einwirkt, in den magnetischen Meridian einstellen und auf den Nullpunkt der Theilung zeigen. Wird nun aber ein kräftiger, 1 Decimeter langer Magnetstab, ns, auf den Stab ausgelegt, so wird dieser eine Ablenkung der Nadel aus dem magnetischen Meridian bewirken und zwar eine 8 mal oder 27 mal kleinere, wenn man ihn in die zweifache oder dreifache Entfernung von der Nadel bringt.

Fig. 15 stellt eine Declinationsbusssole der einfachsten Art dar. Die Spitze, auf welcher die Nadel aufgesetzt ist, bildet den Mittelpunkt eines in Grade getheilten Horizontalkreises, welcher um eine verticale Aze in seiner eigenen Ebene umgedreht werden kann. An der Seite des Gehäuses ist ein Fernrohr angebracht, dessen Aze mit derselben Linie parallel läuft, welche man sich von dem Nullpunkt des getheilten Kreises über seinen Mittelpunkt zum Theilstrich 180 gezogen denken kann. Wenn man den Apparat so stellt, daß die Nadel gerade auf den Nullpunkt der Theilung zeigt, so ist die Aze des Fernrohrs mit der Nadel parallel, sie fällt mit dem magnetischen Meridian zusammen; bei jeder andern Stellung aber zeigt die Nadel auf denjenigen Theilstrich des Kreises, welcher angibt, wie viel Grade der Winkel beträgt, welchen die Richtung der Nadel mit der Aze des Fernrohrs macht. Wenn man also das Fernrohr genau in den astronomischen Meridian bringt, so kann man auf dem Theilstrich ablesen, welchen Winkel der magnetische Meridian mit dem astronomischen macht, oder mit andern Worten, wie groß die magnetische Abweichung ist.

Dieses Instrument kann überhaupt als Winkelmehrinstrument dienen, weil man mit Hülfe desselben jederzeit bestimmen kann, welchen Winkel die Visirlinie des Fernrohrs mit dem magnetischen Meridian macht. Die Busssole wird vorzugsweise zum Winkelmessen bei unterirdischen Arbeiten, also z. B. in Bergwerken benutzt. Auch der Kompaß der Seefahrer ist eine Declinationsbusssole, wenn auch von etwas abgeänderter Construction.

Im mittlern Deutschland ist die Declination eine westliche und zwar beträgt sie ungefähr 17° . Nach Osten hin nimmt die westliche Declination ab, um an der Grenze zwischen Europa und Asien Null zu werden und dann in eine östliche Declination überzugehen. Von Deutschland aus nimmt nach Westen hin die westliche Declination noch zu, um über eine gewisse Grenze hinaus wieder abzunehmen. Im größten Theile von Asien und dem westlichen Theile von Amerika ist die Declination eine östliche.

Der Erdbörper übt also auf die Magnetnadel eine richtende Kraft aus, die Erde wirkt also wie ein großer Magnet. Seinen Hauptzügen nach verhält sich der Erdmagnetismus ungefähr so, als ob der Erdbörper in seinem Innern einen großen Magneten enthielte, ungefähr so, wie es Fig. 16 darstellt. In dieser Figur stellt NS die Umdrehungsaxe der Erde, also N den Nordpol, S den Südpol dar. Die punktirten Ellipsen sind größte Kreise, welche durch den Nord- und den Südpol der Erde gehen, also astronomische Meridiane. Der ideale Magnet AB, den wir uns im Innern der Erde denken wollen, um die Erscheinungen des Erdmagnetismus zu erklären, fällt aber nicht mit der Erdaxe zusammen, sondern er macht einen Winkel mit derselben, so daß die verlängerte Aze des Erdmagnets AB die Erdoberfläche in zwei Punkten MN und MS trifft, welche wir als magnetische Pole der Erde bezeichnen wollen und welche, wie man sieht, nicht mit den Umdrehungspolen der Erde zusammenfallen.

Denken wir durch irgendeinen Punkt a der Erdoberfläche und die beiden magnetischen Pole der Erde MN und MS einen größten Kreis gelegt, so ist dies der magnetische Meridian für a, und man sieht, daß der magnetische Meridian für a mit dem astronomischen Meridian SaN einen Winkel macht, und dieser Winkel ist eben die magnetische Declination für den Punkt a.

So regelmäßig, wie es nach der durch Fig. 16 erläuterten Hypothese sein mußte, zeigen sich aber die Erscheinungen der Declination auf der Erdoberfläche durchaus nicht. Nach den zahlreichen Beobachtungen der magnetischen Declination, die zu Wasser und zu Lande an

den verschiedensten Orten der Erdoberfläche angestellt worden sind, hat man Karten entworfen, auf welchen die isogonischen Curven gezogen sind, d. h. solche Curven, welche alle Orte gleicher magnetischer Abweichung miteinander verbinden. Fig. 17 ist eine solche Abweichungs- oder Declinationskarte. Die beiden Linien ausgezogenen, mit o bezeichneten Curven sind die Linien ohne Abweichung, sie gehen also über solche Orte, an welchen die Magnetnadel genau nach Norden schaut. Die Curven westlicher Declination sind schwächer ausgezogen, die Curven östlicher Declination aber sind punkirt.

Nach der durch Fig. 16 erläuterten Hypothese müssen die beiden magnetischen Erdpole MN und MS diametral gegenüberliegen, was in der That nicht der Fall ist. Dieser Umstand ließe sich durch eine excentrische Lage des idealen Magnets AB, Fig. 16, d. h. dadurch erklären, daß derselbe seitwärts vom Mittelpunkt der Erde liege. Die magnetische Declination gibt uns keineswegs die wahre Richtung an, nach welcher der Erdmagnetismus auf die Magnetnadel wirkt, denn durch die Aufhängung ist dafür gesorgt, daß sie sich nur in der horizontalen Ebene umbrehen kann (weil der Schwerpunkt der Nadel unter dem Aufhängepunkt liegt); es ist also nur der horizontale Theil des Erdmagnetismus, welcher beim Richten des Magnetstabes, Fig. 2, ober der Magnetnadel, Fig. 3, zur Wirkung kommt. Um die Richtung zu finden, nach welcher die magnetische Totalkraft der Erde wirkt, muß man die Nadel nach allen Richtungen hin beweglich machen, wie es bei der Inclinationsnadel, Fig. 18, der Fall ist. Diese Magnetnadel ist zunächst um eine horizontale, durch ihren Schwerpunkt gehende Aze, also in verticaler Ebene drehbar. Die Spitzen, in welchen die horizontale Drehungsaxe ab endet, werden von einem messingenen Rahmen getragen, welches an einem ungedrehten Faden hingelassen wird, so daß sich also der ganze Apparat auch noch um eine verticale Aze drehen kann. Zunächst stellt sich nun der Rahmen so, daß die Ebene der Nadel in die Ebene der magnetischen Meridians fällt, dann aber stellt sich die Nadel nicht wagerecht, sondern das Nordende senkt sich, wie es die Figur andeutet.

Der Winkel, welchen die so beweglich gemachte Inclinationsnadel mit der Horizontalen macht, wird die Inclination genannt. Im mittlern Deutschland beträgt die Inclination ungefähr 65° .

Ein Apparat, bei welchem die horizontale Umdrehungsaxe der Inclinationsnadel den Mittelpunkt eines verticalen getheilten Kreises bildet, Fig. 19, heißt eine Inclinationsbusssole oder ein Inclinatorium.

Wenn man von Deutschland aus nach Norden geht, nimmt die Inclination zu, sie nimmt ab nach Süden hin. Nach Süden hin fortgehend, kommt man endlich an einen Ort, für welchen die Inclination gleich Null ist, an welchen sich also die Inclinationsnadel horizontal stellt; über diesen Punkt hinaus senkt sich dann das Südende der Nadel, die bis dahin nördliche Inclination geht in eine südliche über.

Die um die ganze Erde herumlaufende Linie der Inclination wird der magnetische Aequator genannt. Auf der Inclinationskarte, Fig. 20, ist der mit o bezeichnete magnetische Aequator stärker ausgezogen, als die übrigen isoclinischen Linien (Linien gleicher Inclination), für welche die Größe der Inclination stets beigefügt ist.

Auf den magnetischen Polen der Erde stellt sich die Inclinationsnadel ganz vertical, die Inclination ist hier gleich 90° . Den magnetischen Nordpol der Erde hat Kapitän Ross im Jahre 1832 wirklich erreicht, an dem magnetischen Südpol der Erde ist bis jetzt noch niemand gelangt, doch läßt sich seine Lage aus dem Verlaufe der

isoclinischen und isogonischen Linien bestimmen. In den Karten Fig. 17 und Fig. 20 ist die gegenwärtige Lage des magnetischen Nordpols verzeichnet. Der magnetische Südpol liegt außerhalb des auf diesen beiden Karten dargestellten Theils der Erde.

In ihren Hauptzügen wird auch die magnetische Inclination durch die Hypothese des idealen Magnets A B, Fig. 16, erklärt. Denken wir uns durch die Mitte des idealen Magnets eine Ebene rechtwinklig zur Axe desselben gelegt, so schneidet dieselbe die Erdoberfläche in einem größten Kreise, welcher einen Winkel mit der Ebene des Erdaequators macht. Auf allen Punkten dieses größten Kreises, welcher in Fig. 16 zu einer geraden Linie R T verkürzt erscheint, wird sich die Inclinationsnadel horizontal stellen müssen, wie es in t angedeutet ist, weil sie hier gleichweit von den Polen A und B entfernt ist. Der größte Kreis R T stellt demnach den magnetischen Aequator dar, wie er sein würde, wenn der Erdmagnetismus keine Unregelmäßigkeiten zeigte. Nördlich von R T wird die Einwirkung des Pols A, südlich von R T wird die Einwirkung des Pols B auf die Nadel überwiegen; nördlich von R T wird sich also das Nordende, südlich von R T wird sich das Südenbe der Nadel senken müssen, wie es in r, s, u und v angedeutet ist.

Durch Declination und Inclination ist die Richtung der magnetischen Erbkraft bestimmt; ein weiter zu beachtendes Element des Erdmagnetismus aber ist die Intensität, die Stärke, mit welcher der Erdmagnetismus auf die Nadel wirkt. Um die Intensität des Erdmagnetismus an verschiedenen Orten der Erdoberfläche miteinander zu vergleichen, läßt man einen und denselben Magnetstab, Fig. 2, in seiner horizontalen Ebene um seine Gleichgewichtslage oszilliren. Je stärker der Erdmagnetismus auf den Stab einwirkt, desto rascher werden die Schwingungen sein, desto mehr Oscillationen werden in einer Minute gemacht werden.

Man hat auf Erbkarten die Linien gleicher magnetischer Intensität, die isodynamischen Linien in gleicher Weise aufgetragen, wie die Linien gleicher Declination und gleicher Inclination, der Maassersparnis wegen ist jedoch die Aufnahme einer Karte mit den isodynamischen Curven auf unsern Tafeln unterblieben.

Declination, Inclination und Intensität des Erdmagnetismus für einen bestimmten Ort werden die magnetischen Constanten desselben genannt.

Die magnetischen Constanten eines Ortes sind keineswegs unveränderliche Größen, sondern sie erleiden mannichfache Variationen, und zwar unterscheidet man säculare Variationen, tägliche Variationen und Störungen.

Die Declination war zu Paris

im Jahre 1580	11° 30' östlich
1663	0
1780	19° 55' westlich.
1814	22° 34' "
1862	19° 36' "

Im Jahre 1671 betrug die Inclination zu Paris 75°, während sie gegenwärtig daselbst ungefähr nur noch 67° beträgt.

Diese in längern Zeiträumen sich allmählich vollziehenden Veränderungen der magnetischen Constanten sind es, welche man als säculare Variationen bezeichnet.

Infolge der säcularen Variationen erleiden auch die magnetischen Curven eine Umgestaltung; so war z. B. der Lauf der isogonischen Linien vor 100 Jahren ganz anders als jetzt.

Die säcularen Variationen des Erdmagnetismus gehen nicht in der Art vor sich, daß die Nadel sich ganz langsam und gleichförmig nach einer bestimmten Richtung hin fortbewegt, sondern die Magnetnadeln sind beständigen

Schwankungen um ihre mittlere Gleichgewichtslage unterworfen, in denen sich zunächst eine tägliche Periode auspricht.

Was die Declination betrifft, so ist der Verlauf ihrer täglichen Variationen in Deutschland ungefähr folgender: um 8 Uhr morgens hat das Nordende der Nadel im Durchschnitt seine östlichste Stellung; ziemlich rasch geht es dann nach Westen und erreicht zwischen 1 und 2 Uhr seinen westlichen Wendepunkt, um sich dann wieder nach Osten zu wenden und zwar anfangs rasch bis zum Abend und langsamer während der Nacht. In Fig. 21 ist dieser normale Verlauf graphisch dargestellt.

Allein auch diese tägliche Bewegung erfolgt keineswegs stetig, sondern die Magnetnadel weicht von der Stellung, die sie bei vollkommen regelmäßigem Verlauf dieser täglichen Schwanung einnehmen müßte, unregelmäßig bald östlich bald westlich, bald mehr bald weniger ab. Diese unregelmäßigen Abweichungen von dem normalen Gange sind es, welche man als magnetische Störungen bezeichnet.

Auf Humboldt's Veranlassung wurde seit dem Jahre 1828 an vorausbestimmten Tagen an verschiedenen Orten stündlich der Stand der Declinationsnadel mit großer Genauigkeit beobachtet, wobei sich ein merkwürdiger Parallelismus der Bewegung der Nadeln an verschiedenen Orten herausstellte. Einen großartigen Aufschwung nahmen diese erdmagnetischen Terminsbeobachtungen, nachdem Gauß durch Anwendung des Poggendorff'schen Spiegelapparates eine Vorrichtung konstruirt hatte, welche die geringsten Veränderungen in der Lage des magnetischen Meridians zu beobachten gestattete.

Das Gauß'sche Magnetometer besteht aus einem Magnetstab, welcher an einem Bündel ungedrehter Seidenfäden aufgehängt und an welchem ein kleiner Spiegel angebracht ist, etwa wie es Fig. 22 darstellt. Diesem Spiegel gegenüber, dessen Ebene wir der Einfachheit wegen als rechtwinklig auf der Axe des Magnetstabes stehend annehmen wollen, ist in einer Entfernung von 5—15 Fuß ein Fernrohr aufgestellt, wie es Fig. 23 zeigt. Das Fernrohr steht etwas höher als der Spiegel und ist so abwärts geneigt, daß seine Axe auf die Mitte des Spiegels gerichtet ist. Unterhalb des Fernrohrs ist dann eine 1 Meter lange in Millimeter getheilte Scala ss in horizontaler Lage so angebracht, daß man durch das Fernrohr im Spiegel das Bild eines Theils dieser Scala erblickt. Wenn die Axe des Magnets wirklich mit der Verticalen der Fernrohr zusammenfällt, so erscheint das Bild des mittlern Punktes a der Scala gerade am verticalen Faden des Fadentreuzes im Fernrohr; sobald aber der Magnetstab nur im mindesten aus dieser Lage abweicht, so erscheint das Bild anderer Theilstriche am verticalen Faden, sobald man die geringste Abweichung mit Sicherheit erkennen und messen kann.

Fig. 24 stellt ein transportables Magnetometer dar. Den 6 Zoll langen Magnetstab nebst seiner Spiegelvorrichtung haben wir bereits in Fig. 22 kennen gelernt. Ein Bündel ungedrehter Seidenfäden, welches den Magnetstab trägt, ist durch das Rohr r, in dessen Mitte es sich befindet, vor Luftzug geschützt. Der Magnetstab selbst hängt in einem länglichen Gehäuse von hartem Kupferblech, dessen seitliche Oeffnungen, welche in unserer Zeichnung offen geblieben sind, damit man den Magnetstab besser sehen kann, durch Glasfenster geschlossen sind. Auch die Stelle bei d wird mit einem Blechcylinder umgeben, welcher nur dem Spiegel gegenüber eine mit einer geschliffenen Glasplatte geschlossene Oeffnung hat. Das Gehäuse, in welchem der Magnet spielt, ist mit mehreren Lagen von überspanntem Kupferdraht umwickelt, welche dazu dienen, die Einwirkung schwacher elektrischer Ströme auf den Magnetstab zu untersuchen. Bei Beobachtung der

Schwankungen des magnetischen Meridians bleiben diese Drabtrindungen ganz aus dem Spiel.

Mit solchen oder ähnlichen Magnetometern wurden nun jahrelang (und werden zum Theil noch) an vorausbestimmten Tagen an vielen Orten Europas und auch anderer Welttheile 24 Stunden lang die Variationen in der Lage des horizontalen Magnetstabes von 5 zu 5 Minuten beobachtet. Der besten Uebersicht halber wurden dann diese Beobachtungen für jeden Terminstag graphisch zusammengestellt und in den Resultaten des magnetischen Vereins publicirt. Als Beispiel einer solchen graphischen Darstellung der Störungsschwankungen eines bestimmten Tags mag Fig. 25 dienen, in welcher übrigens nur für zwei Orte (Upsala und Göttingen) die von Stunde zu Stunde gemachten Beobachtungen aufgetragen sind.

Die Zusammenstellung solcher Terminsbeobachtungen hat nun im wesentlichen folgende Resultate gegeben:

1) Für Orte der nördlichen Hemisphäre, welche nahezu auf demselben Meridian liegen, sind die Störungen gleichzeitig und gleichgerichtet.

2) Die Störungen auf der südlichen Hemisphäre stehen nahezu in vollkommenem Gegensatz zu denen, welche gleichzeitig an Orten gleicher geographischer Länge auf der nördlichen Hemisphäre beobachtet werden. Wenn das Nordende der Magnethabel in Göttingen nach Westen geht, so geht es auf dem Cap der guten Hoffnung gleichzeitig nach Osten.

3) Für Orte, welche nahezu gleiche geographische Breite, aber verschiedene Länge haben, zeigt sich der Zusammenhang der Störungen in der Art, daß wenn an irgend-einem Orte eine besonders starke Störung auftritt, dieselbe auch nach Osten und nach Westen hin gleichzeitig in gleicher Richtung, aber mit abnehmender Stärke beobachtet wird. 90° östlich und 90° westlich von dem Orte der größten Schwankung wird in demselben Momente gar keine oder doch nur eine unbedeutende Schwankung beobachtet, während die gleichzeitigen Störungsschwankungen auf der andern Hälfte des Parallels die entgegengesetzte Richtung haben und zwar zeigt sich ein östliches Maximum ungefähr 180° von dem Punkte entfernt, an welchem gerade das westliche Maximum auftritt.

Die Erscheinung von Nordlichtern ist in der Regel von ungewöhnlich starken Störungsschwankungen der Magnethabel begleitet. Auch Erdbeben veranlassen starke magnetische Störungen, selbst an Orten, wo sie nicht unmittelbar wahrgenommen werden.

P. Elektricität.

(Tafel 9, Tafel 10 und Figur 33 bis 45 auf Tafel 7.)

I. Reibungselektricität.

Manche Körper, wie z. B. Schellack, Siegellack, Horn, gummi, Bernstein (das Elektrion der Alten, daher: Elektricität), Guttapercha, Glas, Porzellan u. s. w., erlangen durch Reiben mit Wolle, Fels, Seide u. s. w. die Eigenschaft, leichte Körperchen, wie z. B. Papier-schnitzelchen, Hollundermarkstückchen u. s. w., anzuziehen, wie dies durch Fig. 1, Taf. 9, erläutert wird.

Noch auffallender zeigt sich diese Anziehung am elektrischen Pendel, Fig. 2, welches aus einem an einem leinenen Faden hängenden Korkkugeln besteht. Wenn das Korkkugeln, Fig. 2, an einem seidenen Faden aufgehängt ist, so zeigt sich die Anziehung, welche der geriebene Körper auf das Kugeln ausübt, weit schwächer; ist aber einmal das Kugeln mit dem Stabe in Berührung gekommen, so erfolgt eine Abstoßung desselben.

Die Ursache dieser Anziehungs- und Abstoßungs-

erscheinungen wird als Elektricität bezeichnet und imponderablen elektrischen Flüssigkeiten zugeschrieben, welche manche Ähnlichkeit mit den hypothetischen magnetischen Flüssigkeiten haben.

Die Abstoßung des an dem Seidenfaden hängenden Korkkugeln durch den Schellackstab, mit dem es kurze Zeit in Berührung war, erklärt sich dadurch, daß ein Theil des elektrischen Fluidums vom Schellackstab auf das Kugeln überging und nun eine Abstoßung zwischen den mit dem gleichen elektrischen Fluidum geladenen Körpern erfolgt. Diese Abstoßung zeigt sich auch sehr schön an zwei Streifen Propapier, Fig. 3, welche man zwischen den Fingern durchgezogen hat.

Das von dem geriebenen Schellack- oder Harzstab abgestoßene Korkkugeln, Fig. 2, wird von einem mit Wolle geriebenen Glasstab angezogen. Die Elektricität des Glasstabes ist demnach verschieden von der des Harzstabes, und man unterscheidet positive oder Glaselektricität und negative oder Harzelektricität. Ein zwischen den Fingern durchgezogener Streifen von Propapier ist negativ elektrisch.

Gleichnamig elektrisirte Körper stoßen sich ab, ungleichnamige ziehen sich an.

Wenn zwei Körper, miteinander gerieben, elektrisch werden, so nimmt der eine positive, der andere negative Elektricität an. Wird ein Glasstab mit einem Lappen von vulkanisirtem Kautschuk gerieben, Fig. 4, so stößt der Kautschuklappen einen negativ elektrischen Streifen vom Propapier ab, der Glasstab zieht ihn an.

In ihrem Verhalten gegen die Elektricität zeigen verschiedene Stoffe ein ungleiches Verhalten; sie zerfallen in Leiter der Elektricität (Conductoren) und Nicht-Leiter (Isolatoren). Die Leiter nehmen das elektrische Fluidum leicht auf und geben es leicht wieder ab, bei den Isolatoren ist dies nicht der Fall. Die einem Leiter mitgetheilte Elektricität verbreitet sich über seine ganze Oberfläche, während eine solche Ausbreitung der elektrischen Ladung bei den Isolatoren nicht stattfindet.

Die Metalle sind vorzugsweise gute Leiter, die Stoffe, von welchen oben gesagt wurde, daß sie durch Reiben elektrisch werden, sind Isolatoren.

Um auf einem Leiter Elektricität anzuhäufen, muß er von lauter Isolatoren umgeben sein. Ein Metallcylinder, welchen man elektrisch machen will, muß deshalb von Glasfäden getragen oder an Seiden-schnüren aufgehängt, d. h. er muß isolirt sein. Die trodne Luft, welche alle Körper umgibt, ist ein Isolator, feuchte Luft ist ziemlich gut leitend.

Der menschliche Körper ist ein Leiter der Elektricität; um ihm eine elektrische Ladung ertheilen zu können, muß er auf einem Isolirschmel, d. h. auf einem von Glasfäden getragenen Bret, Fig. 5, stehen.

Wenn man einem isolirten Metallcylinder CB, Fig. 6, mittels der Elektrisirmaschine eine elektrische Ladung ertheilt, so divergiren die an seinen beiden Enden aufgehängten elektrischen Pendel (Kugeln von Hollundermark an leinenen Fäden hängend). Berührt man den geladenen Cylinder unmittelbar mit der Hand oder mittels eines Metallstabes, so fallen die Pendel zusammen, weil die Elektricität des Cylinders durch die ihn berührenden Leiter abströmt. Wenn man aber den geladenen Cylinder CB mit einem Glas- oder Harzstab berührt, so fallen die Pendel nicht zusammen, weil weder Glas noch Harz die Elektricität des Cylinders ableiten.

Ein Körper befindet sich im natürlichen, nicht elektrischen Zustande, wenn er gleichviel positive und negative Elektricität enthält, eine elektrische Ladung erfolgt erst, wenn ihm ein Ueberschuß des einen Fluidums mit-

getheilt wird, oder wenn eine Trennung der bis dahin verbundenen elektrischen Fluida erfolgt.

Stellt man den unelektrischen, isolirten Leiter CB, Fig. 6, in die Nähe eines mit positiver Electricität geladenen Leiters A, so wird dieser theilweis auf die bis dahin verbundenen Electricitäten von CB wirken, er zieht die negative nach B und treibt die positive nach C zurück. Die Pendel in B divergiren nun, weil beide mit negativer Electricität geladen sind, die Pendel bei C aber divergiren mit positiver Electricität.

Wenn man nun den Cylinder CB ableitend berührt, wie dies in Fig. 7 durch ein Kettenchen angedeutet ist, so fallen die Pendel bei C zusammen, weil jetzt die von A abgestoßene $+E$ entweichen kann, die Pendel bei B aber divergiren noch mehr, weil von neuem durch A angezogene $-E$ durch die Kette zufließen kann. Man kann die negative Electricität in B nicht ableiten, weil sie durch die auf A befindliche $+E$ hier zurückgehalten, gebunden wird.

Die Electricitäts-erregung durch Vertheilung wird zur Construction von Elektrometern und Elektroskopen benutzt. In den Hals eines Glasgefäßes, Fig. 8, ist in einer Glasröhre stehend ein Metallstab eingesetzt, welcher unten mit einem Paar elektrischer Pendel, oben mit einer Metallplatte p oder auch mit einer Metallkugel endigt. Näherst man von oben einen (etwa positiv) elektrischen Körper, so wird die gleichnamige Electricität in die Pendel getrieben, welche deshalb divergiren, während die ungleichnamige (in unserm Fall die $-E$) in die Platte gezogen und da gebunden wird. Berührt man nun, während der vertheilende Körper r in der Nähe bleibt, die Platte p ableitend mit dem Finger, so fallen die Pendel zusammen, weil nun die von r abgestoßene Electricität entweicht. Entfernt man aber nun zunächst den ableitenden Finger und dann die vertheilende Stange r, so divergiren die Pendel aufs neue, weil nun ein Theil der bis dahin in p gebundenen Electricität in die Pendel verabschiedet, das Elektrometer ist nun geladen (und zwar in unserm Fall mit $-E$).

Näherst man dem geladenen Elektrometer von oben einen mit seiner Ladung gleichnamigen elektrischen Körper, so nimmt die Divergenz der Pendel noch mehr zu, sie nimmt dagegen ab, wenn der genäherte Körper mit der Electricität im Elektrometer ungleichnamig ist.

Die Pendel des Elektroskops, Fig. 8, sind entweder aus feinen Grasschälchen (Strohhalm-elektrometer) oder aus zwei schmalen Streifen Blattgold (Goldblatt-elektrometer) gemacht.

Um stärkere elektrische Ladungen zu erzielen, wendet man das Elektrophor oder vorzugsweise die Elektrisirmaschine an. Das Elektrophor ist ein Harzluch a, Fig. 9, der entweder in eine flache Blechschüssel gegossen, oder nur auf ein mit Stanniol überzogenes Bret c gelegt ist. Der Harzluch wird durch Schlagen mit einem Zuckerschwanz negativ-electrisch gemacht und dann auf denselben ein metallener Dedel b aufgesetzt, der entweder mit einem isolirenden Glasstab versehen ist oder an isolirenden Seidenfäden hängt. Setzt man den Dedel b auf den Harzluch a auf, so wirkt die negative Electricität des letztern vertheilend, sie zieht die $+E$ des Dedels an seine untere Fläche, während die abgestoßene $-E$ sich an der oberen Fläche des Dedels anhäuft. Berührt man jetzt den Dedel mit dem Finger, so entweicht die vom Harzluch abgestoßene $-E$, und in den Dedel bleibt nur $+E$ zurück, welche an der untern Dedelfläche gebunden ist, welche aber sofort frei wird, wenn man den Dedel mittels der isolirenden Schnüre

aufhebt. Näherst man dem aufgehobenen Dedel den Finger, so springt ein glänzender Funken über.

Eine weit ausgiebigere Electricitätsquelle ist die Elektrisirmaschine, deren wesentlichster Theil aus einer Glasscheibe (Scheibenmaschine) oder einem hohlen Glaszylinder (Cylindermaschinen) besteht. Fig. 10 stellt eine Scheiben-, Fig. 11 stellt eine Cylindermaschine dar.

Die um ihre horizontale Axe EI drehbare Glasscheibe S bewegt sich bei ihrer Umdrehung mit sanfter Reibung zwischen zwei Leberscheiben hindurch, welche, mit Amalgam (aus Quecksilber und Zink bestehend) überzogen und auf Holzbrethen befestigt sind. Dieses Reibzeug ist von einem Glasfuß H getragen und mit einem messinginen Conductor o versehen. Die durch Reibung positiv-electrisch gemachte Glasscheibe gelangt nun nach weiterer Drehung zwischen die beiden Holzringe D, um hier ihrer Ladung wieder beraubt zu werden; damit sich aber auf dem Wege vom Reibzeug bis D die Electricität nicht verliert, ist das Reibzeug mit zwei Lappen von Wachsstaffet (eine isolirende Substanz) versehen, zwischen denen sich die Glasscheibe eine Strecke weit fortbewegt.

Die beiden Holzringe D stehen an der von der Glasscheibe G getragenen hohlen Messingkugel A, welche den Hauptconductor der Maschine bildet. Auf ihrer gegen die Glasscheibe gerichteten Seite sind diese Holzringe mit Metallspitzen versehen, welche mit dem Conductor A leitend verbunden sind. Die positiv-electrische Glasscheibe wirkt vertheilend auf diese Vorrichtung, die angezogene $-E$ strömt durch die Spitzen auf die Scheibe aus, während der Conductor A mit $+E$ geladen bleibt.

Damit nun am Reibzeug stets eine lebhafteste Electricitätsentwicklung stattfinden könne, muß die $-E$ des Reibzeugs stets abgeleitet werden, was dadurch geschieht, daß der Conductor o durch eine Metallkette mit dem Boden leitend verbunden wird.

Aus dem Conductor A kann man Funken positiver Electricität ziehen. Wird aber A mit dem Boden leitend verbunden, während o isolirt bleibt, so gibt der Reibzeug-Conductor o negativ-electrische Funken.

An der Cylindermaschine, Fig. 11, finden sich im wesentlichen dieselben Theile, nur in anderer Form. Mit dem Reibzeug rr sind die kleinen Conductoren nn verbunden. Der messingine Saugcylinder vv steht mit dem Hauptconductor k der Maschine in leitender Verbindung. Der Conductor A, Fig. 10, ist mit verschiedenen Dessnungen versehen, wie man aus Fig. 12 sieht, welche denselben im Durchschnitt darstellt. In die Höhlung rechts wird der Träger der Saugringe D eingesetzt, in die obere Dessnung aber wird, wenn es sich um die Erzielung langer und kräftiger Funken handelt, ein Holzring eingesetzt. In die Dessnung links kann man Drähte einstecken, die mit Messingkugeln von 1 bis 3 Centimeter Durchmesser enden, und an die man verschiedene Apparate anhängen kann.

Um ein Maß für die Ladung des Conductors zu erhalten, wird in die obere Dessnung statt des Holzringes das Quadrantenelektrometer, Fig. 13, eingesetzt, wie man in Fig. 14 sieht. Das Pendel cd, welches aus einem das Korngläschen d tragenden Strohhalm besteht, wird an dem Gradbogen um so weiter aufsteigen, je stärker die Ladung ist.

Mit Hülfe der Elektrisirmaschine lassen sich die elektrischen Anziehungs- und Abstoßungs-Erscheinungen in größerem Maßstabe wiederholen. So der Korngläsang Fig. 15. Ein Glaszylinder ist oben und unten durch einen Dedel von Pappe geschlossen, der mit Stanniol überzogen ist. Im Innern befindet sich eine Partie

Korkkugeln. Wird der untere Dedel mit dem Boden, der obere mit dem Conductor der gedrehten Elektrifizirmaschine in leitende Verbindung gesetzt, so tanzen die Kugeln lebhaft zwischen beiden Dedeln hin und her.

Stedt man statt des Ringes, Fig. 12, die Vorrichtung Fig. 16 in die obere Oeffnung des Conductors A, Fig. 10, so werden sich die gerade herabhängenden Papierstreifen sächerartig ausbreiten, sobald die Maschine gedreht wird.

Der elektrische Funken ist im Stande, leicht brennbare Stoffe zu entzünden. Sehr leicht gelingt die Entzündung des Knallgases (eines Gemenges von Sauerstoff- und Wasserstoffgas) mittels der elektrischen Pistole, Fig. 17, deren Hals man mit einem Korkpfropfen schließt, nachdem man etwas Wasserstoffgas hat eintreten lassen. In der Wand des Gefäßes ist nun mittels eines isolirenden Glasröhrchens *t* ein Messingdraht eingeseht, welcher einerseits das Metallkugeln *b*, andererseits das Messingkugeln *a* trägt. Läßt man nun, während man das Blechgefäß in der Hand hält, einen Funken auf die Kugel *b* schlagen, so schlägt gleichzeitig ein solcher zwischen *a* und der Blechwand über, welcher das Knallgas entzündet und den Pfropfen, welcher das Gefäß verschließt, unter lautem Knalle fortgeschleudert.

Zur Entzündung des Schwefeläthers kann man die Vorrichtung Fig. 18 anwenden. Der Hals eines kleinen Glasrichters ist durch einen Kork geschlossen. Durch diesen Kork geht ein Metalldraht hindurch, der unten hakenförmig umgebogen, oben eine kleine Kugel *h* trägt. Ist diese Vorrichtung mittels eines passenden Stativs gehörig aufgestellt, so wird der Haken *a* durch eine Kette mit dem Boden in leitende Verbindung gesetzt und in den Trichter zunächst Wasser und auf dieses eine dünne Schicht Aether gegossen, und zwar so weit, daß die Kugel *h* eben bedeckt ist. Schlägt dann ein Funken von der Kugel *l* auf *h* über, so geräth der Aether in Flammen.

Wenn man einem isolirten Leiter eine elektrische Ladung mittheilt, so verbreitet sich dieselbe nur auf seiner Oberfläche, sie dringt nicht in sein Inneres ein, wie sich am leichtesten mittels des Apparats Fig. 19 zeigen läßt. Er besteht aus einer von einem Glasstab getragenen Hohlkugel von Messingblech, welche oben mit einer runden Oeffnung versehen ist. Wenn man die mit Electricität geladene Kugel an irgendeiner Stelle ihrer äußern Oberfläche mit einem Probeklebechen (ein Scheibchen von Messingblech, welches an einem wohlisolirenden Stiel befestigt ist) berührt, so nimmt das Scheibchen einen Theil der Ladung auf, und wenn man dann mit dem so geladenen Scheibchen die Platte eines Elektrometers berührt, so divergiren dessen Pendel. Wenn man dagegen den Versuch so wiederholt, daß man das Probeklebechen durch die Oeffnung in das Innere der Hohlkugel einführt und mit der innern Fläche derselben in Berührung bringt, so zeigt es nun, abermals an das Elektrometer gebracht, keine elektrische Ladung mehr.

Bei der Dampf- oder Hydroelektrifizirmaschine, Fig. 20, wird die Electricität durch die Reibung des aus engen Oeffnungen austretenden Wasserdampfes erzeugt. Sie besteht aus einem von Glasfüßen getragenen Dampfkessel mit innerer Heizung, aus welchem der hochgepannte Dampf durch mehrere Röhren ausströmt, die durch ein mit kaltem Wasser gefülltes Behälter *F* hindurchgehen, welches in Fig. 21 für sich allein dargestellt ist. Die Auströmungsöffnungen *d* haben die in Fig. 22 dargestellte Einrichtung. In die Mündung ist ein Holzröhrchen eingeseht.

Der Dampf strömt gegen eine Reihe von Saugspitzen, die mit dem isolirten Conductor *C* verbunden sind. Ist dieser Conductor mit dem Boden leitend verbunden, so gibt der Kessel kräftige Funken negativer Electricität, wird aber der Kessel selbst zum Boden abgeleitet, so nimmt der isolirte Conductor *C* eine kräftige positive Ladung an.

Auf der Oberfläche eines isolirten kugelförmigen Leiters verbreitet sich eine elektrische Ladung vollkommen gleichförmig. Auf der Oberfläche nicht kugelförmiger Leiter aber wird sich die Electricität vorzugsweise an solchen Stellen anhäufen, welche am weitesten vom geometrischen Mittelpunkt entfernt sind. Ist einem Leiter von der Form Fig. 23 *A. B.* man mit Hülfe des Probeklebechens bei *b* und *c* eine weit stärkere Ladung finden als in der Mitte bei *a*.

Wenn man irgendeinen isolirten Leiter mit einer metallenen Spitze versehen, so findet hier eine so starke Anhäufung der Electricität statt, daß sie fortwährend ausströmt. Setzt man eine metallene Spitze auf den Hauptconductor der Elektrifizirmaschine, so kann man demselben keine merkwürdige Ladung mehr ertheilen, wie sehr man auch die Scheibe drehen mag, weil alle dem Conductor zugeführte Electricität sogleich ausströmt. Die Electricität geht nämlich zunächst von der Spitze auf die sie umgebende Luft über, die nun abgeleitet als elektrischer Wind wegstirmt, wie man mit Hülfe einer Kerzenflamme, Fig. 24, nachweisen kann.

Daß auf einer Stahlspitze spielende, aus Metallröhren, die alle nach der gleichen Richtung umgebogen und zugespitzt sind, gebildete Flugrad, Fig. 25, geräth in Rotation, wenn ihm von dem Conductor der Maschine Electricität zugeführt wird, und zwar in Folge der Reaction der aus den Spitzen austretenden Electricität.

Wenn man dem Conductor der Elektrifizirmaschine eine zum Boden abgeleitete Metallspitze entgegenhält, so kann man demselben keine Ladung mehr beibringen.

Fig. 26 stellt einen durch einen Glasstab getragenen Metalldraht dar, welcher einerseits in eine feine Spitze ausläuft, andererseits die Metallkugel *e* trägt. Wenn *e* mit der zum Boden abgeleiteten Metallkugel *l* in Berührung ist und man die Spitze *c* dem Conductor der gedrehten Maschine nähert, so strömt aus der Spitze fortwährend —E auf den Conductor über, während die +E zum Boden abströmt. Wird aber *e* von *l* entfernt, so strömt noch fortwährend —E von der Spitze zum Conductor über, während die abströmende +E zwischen *e* und *l* in Form von Funken überspringt.

Wenn man dem ableitend berührten Conductor *C*, Fig. 7, den mit +E geladenen *A* mehr nähert, so wird bei *B* mehr —E gebunden, bis endlich ein Funke zwischen *B* und *A* überspringt.

Um durch gegenseitige Bindung bedeutendere Quantitäten entgegengesetzter Electricitäten anhäufen zu können, muß man die beiden Leiter durch einen Isolator trennen, welcher nicht so leicht durchbrochen wird, wie die Luftschicht zwischen *B* und *A*, Fig. 7, also etwa durch eine Glascheibe, wie bei der Franklin'schen Tafel, Fig. 27 und 28. Auf jeder Seite einer wohlisolirenden Glascheibe ist in der Mitte ein Eboniolblatt so aufgestellt, daß das Glas ringsum etwas noch handbreit frei bleibt. Auf jeder Seite wird dann ein an einem leinenen Faden hängendes Korkkugeln angebracht, wie es die Figur zeigt. Bringt man nun die eine Belegung der Scheibe mit dem Conductor der Elektrifizirmaschine, die andere mit dem Boden in leitende Verbindung, so wird sich erstere mit +E, letztere aber mit —E laden, welche sich eben der gegenseitigen Bindung wegen hier in bedeutendem Maße anhäufen lassen, als es sonst möglich wäre.

Setzt man nun die Verbindung der einen Seite (der rechten in Fig. 28) mit dem Conductor der Maschine auf, so steigt hier das Pendel, während es auf der andern, ableitend berührten Seite gerade herunterhängt. Es muß also auf der rechten Seite ein Ueberschuß von freier $+$ E vorhanden sein, damit alle $-E$ auf der linken Seite gebunden ist.

Setzt man aber nun die Verbindung der linken Seite mit dem Boden auf, während man die rechte Seite ableitend berührt, so fällt hier das Pendel herab, auf der linken Seite aber steigt das Pendel, weil jetzt hier ein Ueberschuß von $-E$ ist. So kann man den Ueberschuß freier Electricität abwechselnd auf der einen und dann wieder auf der andern Seite wegnehmen, und so den Apparat allmählich entladen.

Die Leydener Flasche, welche in Fig. 29, 30 und 31 in drei verschiedenen Gestalten dargestellt ist, ist eigentlich nur eine bequemere Form der Franklin'schen Tafel, denn auch hier sind zwei Metallbelegungen durch eine Glasschicht getrennt.

Um zu zeigen, daß durch die Leydener Flasche eine weit größere Anhäufung von Electricität möglich ist, als ohne gegenseitige Bindung erzielt werden kann, bedient man sich des Arrangements Fig. 14. Die Flasche steht auf einem wohlisolirten Holzfüßchen, während die innere Belegung mit dem ein Quadrantenelektrometer tragenden Conductor der Elektrisirmaschine leitend verbunden ist. Wird die Maschine gedreht, so steigt die Kugel des Elektrometers augenblicklich, schon nach einer Umdrehung hat sie ihren höchsten Stand erreicht; wenn aber nun die äußere Belegung zum Boden abgeleitet wird, so fällt das elektrische Pendel herab und es bedarf nun 10 bis 20 Umdrehungen, bis das Pendel wieder zu seiner vorigen Höhe aufsteigt; die Flasche hat also auch eine 10 bis 20 mal so große Electricitätsmenge aufgenommen als vorher, wo ihre äußere Belegung isolirt war.

Eine Combination von mehreren Leydener Flaschen, deren äußere Belegungen einerseits miteinander verbunden sind, während andererseits auch alle innern Belegungen in leitender Verbindung stehen, wie Fig. 32, heißt eine elektrische Batterie.

Zur Entladung einer Leydener Flasche oder einer Batterie bedient man sich des Ausladers, Fig. 33 oder Fig. 34. Letztere besteht aus einem mit Guttapercha überzogenen Kupferdraht, der an beiden Enden mit Messingkugeln versehen ist. Der Henlev'sche Auslader, Fig. 35, dient, um beliebige Körper bequem in den Schließungskreis einer Leydener Flasche einzuschalten.

Durch den menschlichen Körper geleitet bringt der Entladungsschlag der Leydener Flasche eine eigenthümliche Nervenernährung hervor.

Dünne Metalldrähte, durch welche man den Entladungsschlag der Leydener Flasche oder einer Batterie leitet, werden erwärmt, und wenn der Draht dünn, die Ladung aber stark genug ist, selbst glühend gemacht und zerstäubt. Den zu diesem Versuch dienenden feinen Eisen- oder Platindraht kann man zwischen den Kugeln d und f des Ausladers Fig. 35 ausspannen.

Ein Kartenblatt, welches man zwischen die hinlänglich genähten Augen des Ausladers Fig. 35 bringt, wird vom Entladungsschlag der Flasche durchbohrt. Selbst Glasplatten kann man durch den Entladungsschlag durchbohren.

Auf demselben Princip wie die Leydener Flasche beruht auch der Condensator, eine Vorrichtung, welche zur Condensation der Electricität schwache Spannung dient. Fig. 36 stellt einen Condensator dar, welcher mit einem Goldblatt-Elektrometer verbunden ist. Auf das

Elektrometer ist zunächst eine Messingplatte (die untere Condensatorplatte) aufgeschraubt, deren obere Fläche mit einer Firnißschicht überzogen ist. Auf diese Platte wird dann eine zweite, an einem isolirenden Glasstiel befestigte aufgesetzt, deren untere Fläche ladirt ist. Die beiden Metallplatten sind also jetzt durch eine isolirende Schicht getrennt, sie entsprechen also den beiden Belegungen der Franklin'schen Tafel, nur mit dem Unterschied, daß man die obere Condensatorplatte leicht abheben kann, während sich die beiden Belegungen der Franklin'schen Tafel nicht voneinander entfernen lassen.

Berührt man nun die untere Platte mit einer Electricitätsquelle, deren Spannung nicht hinreicht, eine merkliche Divergenz der Goldblättchen zu bewirken, während man die obere Condensatorplatte ableitend mit dem Finger berührt, Fig. 37, so wird der Condensator geladen, d. h. die Electricität jener Quelle wird an der Firnißschicht der untern Platte condensirt, während sich die entgegengesetzte E auf der untern Fläche der obern Platte anhäuft. Entfernt man zunächst den Finger von der obern, dann die Electricitätsquelle von der untern Platte, so divergiren die Pendel, wenn man die obere Platte abhebt und dadurch die in der untern bisher gebunden gewesene E gleichsam in Freiheit setzt.

Wenn man aus dem Conductor der Elektrisirmaschine mittels eines nahegehaltenen Leiters Funken zieht, so sind dieselben glänzend weiß und geradlinig, wenn dagegen aus dem Conductor einer kräftigen Maschine Funken auf größere Entfernung überspringen, so ist ihr Licht weniger glänzend, sie erscheinen gegad und verästelt, wie Fig. 39 zeigt. Der verästelte Funke geht in einen violetten Lichtbüschel, Fig. 42, über, wenn man auf den Conductor eine etwas abgerundete Metallspitze aufsetzt. Solche Büschel zeigt aber nur die positive Electricität. Die austretende negative Electricität erscheint als leuchtendes Sternchen.

Interessante Erscheinungen erhält man durch Vielfältigkeit des Funken.

Fig. 41 stellt eine ungefähre zollweite Glasröhre dar, welche an jedem Ende mit einer Metallfassung versehen ist. Auf dieser Röhre sind Stanniolblättchen spiralförmig so aufgelegt, daß zwischen je zwei aufeinanderfolgenden Blättchen ein Zwischenraum von 1 bis 2 Millimetern bleibt. Näher man nun die eine Metallfassung dem Conductor der Maschine, während man die andere in der Hand hält, so springt gleichzeitig in allen jenen Zwischenräumen ein Funken über, und all diese Funken bilden eine glänzende Spirallinie (Vibriröhre).

Fig. 40 stellt eine Bliztasse dar. Es ist dies eine in passender Fassung aufgestellte Franklin'sche Tafel, deren vordere Belegung durch eine Reihe kreuzweise geführter Schnitte in viele rautenförmige Stücken getheilt ist, welche nicht mehr in leitender Verbindung stehen. Wenn nun die hintere Belegung zum Boden abgeleitet, die vordere aber mit dem Conductor verbunden wird, so kann die Ladung der vordern Belegung nur dadurch erfolgen, daß der Funke, die isolirenden Zwischenräumen überspringend, sich blitzartig verbreitet.

Im luftverdünnten Raume verbreitet sich der elektrische Funke als ein violettes Strahlenband auf weit größere Entfernungen hin als im luftgefüllten, wie sich dies mit Hülfe des elektrischen Gies, Fig. 43, zeigen läßt, welches auf die Luftpumpe geschraubt und evacuir werden kann.

Wenn man den Knopf einer mit positiver Electricität geladenen Leydener Flasche mit einer Scheide

von Schellad berührt und dann semen lycopodi aus einem leinenen Beutelchen auf diese Scheibe siebt, so entsteht eine Stauffigur, welche durch dendritisch sich verästelnde Strahlen gebildet wird, Fig. 44. Wodagegen die innere Belegung der Flasche mit $-E$ geladen, so entstehen nur rundliche Fleden, deren Ausdehnung weit geringer ist als die der positiven Stauffigur.

Endlich muß noch angeführt werden, daß die Intensität der elektrischen Anziehung und Abstoßung im umgekehrten Verhältniß des Quadrats der Entfernung abnimmt, d. h. in der 2fachen, 3fachen Entfernung ist sie 4 mal, 9 mal schwächer. Dies kann unter anderm mittels der Vorrichtung Fig. 38 nachgewiesen werden. Eine isolirte Metallkugel B wird mit der einen, eine kleine, an einem Schelladstiel befestigte und an einem Seidenfaden aufgehängte Messingkugel A wird mit der entgegengesetzten Electricität geladen. Aus ihrer Gleichgewichtslage herausgebracht, oscillirt die kleine Kugel in horizontaler Ebene, und zwar um so rascher, je näher B ist. Aus der für verschiedene Entfernungen zwischen B und A beobachteten Schwingungszahl kann man auf die Intensität der Anziehung für diese Entfernungen schließen.

II. Galvanismus.

Galvani machte im Jahre 1786 die Beobachtung, daß ein Froschpräparat, Fig. 1, Taf. 10, zuckt, so oft man die Schenkelnerven durch einen metallischen Bogen mit dem Wadenmuskel in leitende Verbindung bringt; Volta aber zeigte, daß es zum Gelingen dieses Versuchs wesentlich sei, daß der metallische Bogen aus zwei verschiedenen Metallen, etwa aus Zink, Z, und aus Kupfer, C, zusammengesetzt sei. Er suchte die Ursache dieser Erscheinung in einer bei der Verührung von Zink und Kupfer stattfindenden Electricitätsentwicklung.

Diese Electricitätsentwicklung beim Contact zweier verschiedener Metalle suchte er mit Hülfe des Condensators zu beweisen. Berührt man die untere Fläche der untern messingnen Condensatorplatte mit einem in der einen Hand gehaltenen Zinkstäbchen, Fig. 37, Taf. 9, während man mit der andern Hand die obere Condensatorplatte ableitend berührt, so wird der Condensator geladen, und wenn man dann die obere Platte abbett, so divergiren die Goldblättchen mit negativer Electricität. Volta schloß daraus, daß Kupfer (oder Messing) in Verührung mit Zink negativ-electrisch werde. Später gab man diesem Versuch eine andere Deutung, indem man den Sitz der Electricitäts-erregung an die Verührungsstelle des Zinks mit der feuchten Hand verlegte. Nach dieser Theorie wird Zink in Verührung mit der Flüssigkeit negativ, die Flüssigkeit aber positiv-electrisch.

Daß in der That Zink in Verührung mit einer Flüssigkeit negativ-electrisch wird, läßt sich auf folgende Weise zeigen. Auf ein Goldblatt-Electrometer, Taf. 9, Fig. 44, wird eine Zinkplatte aufgeschraubt, welche auf seiner Seite geföhrt ist; auf diese wird eine möglichst dünne übertragene Glasplatte gelegt, auf welcher wieder eine Scheibe Löschpapier liegt. Das Löschpapier wird mit Salzwasser getränkt und dann durch einen Zinkbügel eine leitende Verbindung zwischen dem feuchten Papier und der Zinkplatte hergestellt. Hat diese kurze Zeit gedauert, so wird der Zinkbügel entfernt und die Glasplatte abgehoben; die Goldblättchen divergiren nun mit negativer Electricität, welche nur von der Verührung des Zinkbügels mit der Flüssigkeit herrühren kann.

Wiederholt man diesen Versuch mit einer Kupferplatte und einem Kupferbügel, so erhält man kaum merklliche negative Ladung; die Electricitäts-erregung zwischen Kupfer und Flüssigkeit ist so unbedeutend, daß wir sie hier unberücksichtigt lassen können.

Legt man auf eine Kupferscheibe eine mit Salzwafler befeuchtete Zuchscheibe, so findet also keine merklliche Electricitäts-erregung statt, wird aber auf die Zuchscheibe eine Zinkplatte gelegt, Fig. 45, Taf. 9, so nimmt diese eine negative Ladung von einer Stärke an, welche wir mit $-E$ bezeichnen wollen, während die Flüssigkeit der Zuchscheibe und die Kupferscheibe die Ladung $+E$ annehmen.

Eine solche Combination, wie Fig. 45, nennt man ein Volta'sches Element. Wie man denselben auch Electricität entziehen oder zuführen mag, immer bleibt das Zink um eine bestimmte Quantität, und zwar um 2 E mehr negativ electricisch als die Flüssigkeit an der Kupferscheibe. Wird z. B. die Kupferplatte ableitend berührt, so wird ihr die positive Ladung entzogen, und die Spannung der negativen Electricität der Zinkplatte wird $-2E$, Fig. 46. Würde dem Element Fig. 45 so viel freie negative Electricität zugesetzt, daß die Ladung desselben $-2E$ wäre, wenn gar keine Electricitäts-erregung stattfände, so steigt die Ladung der Zinkplatte auf $-4E$. Legt man auf das Volta'sche Element, Fig. 46, ein zweites ganz gleiches in gleicher Ordnung, so verbreitet sich die Ladung $-2E$ von der untern Zinkplatte über das ganze aufgelegte Element, und die Ladung der obern Zinkplatte, Fig. 47, wird nun $-4E$ sein. Würde ein drittes, viertes Element aufgelegt, so würde die Spannung der freien Electricität der obersten Zinkplatte auf 6 E, 8 E u. s. w. steigen. So auf beruht die Construction der Volta'schen Säule, Fig. 48. Nehmen wir an, dieselbe sei aus 50 Elementen aufgebaut und die unterste Kupferscheibe ableitend berührt, so würde die Ladung der obersten Zinkplatte $+100E$ sein. Bleibt die ganze Säule stehen, so ist ihre electricische Spannung in der Mitte gleich 0, in der obersten Zinkplatte ist alsdann $+50E$, in der untersten Kupferscheibe ist $+50E$.

Die beiden Enden der Volta'schen Säule werden die Pole derselben genannt.

Nach dem Princip der Volta'schen Säule ist auch Zamboni's trodrene Säule construiert. Ein unechten Goldpapiers (Kupfer) wird mit der Kupferseite auf einen Bogen unechten Silberpapiers aufgelegt und dann runde Scheibchen von 10 bis 40 Millimeter Durchmesser ausgeschlagen. Ein solches Scheibchen repräsentirt ein Volta'sches Element, nämlich eine dünne Kupferplatte und eine dünne Zinnplatte (Zinn wirkt fast wie Zink) und zwischen beiden eine Papierdicke, welche immer etwas hygroskopische Feuchtigkeit enthält. Von solchen Scheibchen kann man nun eine Säule aufbauen, was am bequemsten geschieht, wenn man sie stets in gleicher Ordnung in eine unten mit einer Messingfassung geschlossenen Glasröhre schichtet und dann, wenn die Füllung vollendet ist, die Glasröhre durch eine gleiche Messingfassung schließt. Die beiden Fassungen Z und K, Fig. 2, Taf. 10, bilden die beiden Pole der trodrenen Säule.

Solche trodrene Säulen zeigen sehr starke Spannungs-erscheinungen, da man leicht solche von mehreren Hunderten oder Tausenden von Scheibchen aufbauen kann.

Das electricische Perpetuum-mobile, Fig. 2, Taf. 10, besteht aus zwei Zamboni'schen Säulen, jede ungefähr 2000 Paaren. Bei der einen ist der negative Pol bei der andern ist der positive Pol nach oben gerichtet, während die beiden untern Pole durch einen Metallstreifen verbunden sind, so daß das System eine complete

ule von 4000 Plattenpaaren darstellt. In der Mitte schen den beiden obern Polen ist ein ganz leichtes, allsichs Pendel leicht beweglich und isolirt aufgesetzt, welches zwischen den beiden Polen beständig hin- und her oscillirt.

Vennet's Säulenelektrometer, Fig. 4, besteht aus zwei kleinen Jamboni'schen Säulen, welche übrigenfalls so arrangirt sind, wie beim Apparat Fig. 3. Zwischen den beiden obern Polen befindet sich ein isolirt gehängtes Goldblättchen, welches nach dem positiven oder negativen Pol ausschlägt, wenn ihm eine negative oder positive Ladung ertheilt wird. Fig. 5 stellt eine etwas kleinere Form des Säulenelektrometers dar.

Während die trodene Säule starke Spannungseffekte vorbringt, zeigt sie kaum Spuren der kräftigen Stromwirkungen, welche auftreten, wenn die Volta'sche Säule geschlossen, d. h. wenn der positive oder negative Pol derselben in leitende Verbindung gesetzt wird.

Durch diesen Verbindungsbogen strömt dann beständig die positive Electricität nach dem negativen, die active nach dem positiven Pol hin ab, während die rückwärtige Electricität durch die elektromotorische Kraft der Säule sogleich wieder ersetzt wird, so daß in der Uele stets $+E$ dem positiven und $-E$ dem negativen Pol zufließt.

Um kräftige Stromwirkungen zu erhalten, ist die pringliche Form der Volta'schen Säule wenig geeignet. Man hat deshalb die Form der Elemente (sach abgeändert, und Fig. 6 stellt das Schema

Volta'schen Elemente dar, wie sie jetzt meistens benutzt werden. In das gesäuerte Wasser eines Gefäßes ist eine Zinkplatte und ihr gegenüber eine Kupferplatte eingetaucht, ohne daß die beiden Platten sich metallisch berühren. Um nun solche Elemente zur Säule zu verbinden, wird die Zinkplatte des jeden Bechens mit der Kupferplatte des vorhergehenden leitend verbunden, wie Fig. 7 andeutet. Die letzte Zinkplatte des ersten Bechens bildet den negativen, die freie Kupferplatte des letzten bildet den positiven Pol.

Um eine möglichst große wirksame Zinkfläche zu erhalten, wird die Kupferplatte eines jeden Elements mit einer Zinkplatte herumgelegt, Fig. 49, Taf. 9, und die Berührung zwischen der Kupferplatte und der Zinkplatte durch zwischengelegte Holzstücken verhindert. Die aus solchen Elementen zusammengesetzte Säule wird nach ihrem Erfinder eine Wollaston'sche genannt. Bei allen Säulen, bei welchen Zink und Kupfer dieselbe Flüssigkeit (verdünnte Schwefelsäure) eintaucht, nimmt die Stromstärke sehr rasch ab. — Um dies zu vermeiden, wenn die Kupferplatte in eine Lösung von Kupfervitriol eingetaucht ist, während die Zinkplatte allein in verdünnte Schwefelsäure eintaucht, schließt man die Säulen mit zweierlei Flüssigkeit verbunden zusammen, die Säulen oder Batterien genannt. Die eben beschriebene Combination aber heißt die Daniell'sche oder „aqua-regia'sche Säule. Zur Trennung der beiden Flüssigkeiten dient eine poröse Thonzelle. Fig. 50, Taf. 9, stellt ein Daniell'sches Element dar. In dem Glasgefäß befindet sich verdünnte Schwefelsäure, in welche eine cylindrisch gebogene Zinkplatte eingetaucht ist. Innerhalb des hohlen Zinkcylinders steht eine poröse Thonzelle, welche mit einer Lösung von Kupfervitriol gefüllt ist, welche endlich die gleichfalls cylindrisch gebogene Kupferplatte aufnimmt.

Bei der Grove'schen Batterie ist die Kupferplatte durch Platin, bei den Bunsen'schen ist sie durch einen aus harter Kohlenmasse gebildeten Cylinder ersetzt. Das Platin (sowol wie die Kohle) stehen in concentrirter Salpe-

tersäure. Die konstante Zinkplattensäule sowol wie die Zinkkohlen- oder Zinkkupfer-Säule wirken ungleich kräftiger wie die Zinkkupfer-Säule. Fig. 51 stellt ein Bunsen'sches Zinkkohlenelement dar.

Fig. 8, Taf. 10, stellt eine aus fünf Bunsen'schen Bechern zusammengesetzte Säule dar.

Zu manchen Zwecken braucht man eine Säule von vielen kleinen Bechern, zu andern Zwecken aber braucht man Säulen von wenigen aber großen Plattenpaaren. Um nun alle diese Zwecke mit einer gegebenen Anzahl von mittelgroßen Bechern zu erreichen, kann man dieselben in verschiedener Weise combiniren, wie dies durch die schematischen Figuren, Fig. 52—55, Taf. 9, erläutert wird. Fig. 52 stellt 8 Becher dar, welche zur Säule verbunden sind. Fig. 54 stellt eine Säule von 4 Plattenpaaren dar, von denen jedes durch zwei Becher gebildet wird. Fig. 53 ist eine Säule von zwei vierfachen Plattenpaaren. In Fig. 55 endlich sind 8 Becher zu einem einzigen Plattenpaar verbunden.

III. Wirkungen des Stroms auf die durchströmten Leiter.

Wenn man den elektrischen Strom durch einen Metalldraht leitet, so wird derselbe erwärmt, und zwar um so stärker, je stärker der Strom und je dünner der Draht ist. Um die Gesetze dieser Erwärmung zu untersuchen, wendet man die Vorrichtung Fig. 9, Taf. 10, an. Der dünne Metalldraht, welcher der Untersuchung unterworfen werden soll, ist mit seinen beiden Enden an beiden Zuleitungsdraht angelastet und befindet sich im Innern eines mit Weingeist gefüllten Gefäßes. Ein in den Weingeist eingetauchtes Thermometer liefert ein Maß für die durch einen elektrischen Strom im Draht entwickelte Wärmemenge. Schlechtleitende Metalldrähte werden stärker erwärmt als gutleitende. Ist die Stromstärke bedeutend genug, so erfolgt ein Erglühen der Drähte. Schaltet man in den Schließungsbogen einer hinlänglich starken Säule eine Kette, Fig. 10, ein, welche abwechselnd aus Stücken von Platin- und von Silberdraht besteht, so werden die Platinstücke glühend, während die Silberstücke noch dunkel bleiben.

Wenn man zwei Spitzen von Glasröhren, Fig. 11, von welchen die eine mit dem positiven, die andere mit dem negativen Pole einer Säule von mindestens 40 Bunsen'schen Bechern verbunden ist, in Berührung bringt, so entsteht ein blendendes Licht. Man kann alsdann die weißglühenden Polspitzen wieder etwas auseinanderziehen, und es geht alsdann ein Lichtbogen zwischen ihnen über. Man hat dieses elektrische Licht zur Beleuchtung von Theatern und Sälen, zu objectiven und mikroskopischen Darstellungen u. s. w. benutzt.

Wenn die Kohlenspitzen, zwischen denen der Flammenbogen übergeht, von einem Kasten mit undurchsichtigen Wänden umgeben sind, in dessen vorderer Seite sich ein entsprechendes Röhrensystem befindet, so wird dasselbe auf einem passend aufgestellten Schirme ein vergrößertes Bild der glühenden Kohlenspitzen und des Flammenbogens entwerfen, wie Fig. 12 zeigt. Man beobachtet dann, daß der positive Pol ausgehöhlt erscheint, und daß fortwährend ein Strom glühender Kohlentheilchen vom positiven zum negativen Pol übergeht. Die Wärmeentwicklung ist übrigens am positiven Pole stärker als am negativen, sie genügt um Platin- und Eisendrähte zu schmelzen.

Wenn man den galvanischen Strom durch chemisch zusammengesetzte Flüssigkeiten leitet, so werden dieselben, insofern sie überhaupt den Strom zu leiten im Stande sind, in ihre Bestandtheile zerlegt. Versteht man jeden

der beiden Poldrähte einer Säule von ungefähr 6 Bunsenschen Bechern mit einer Platinplatte, taucht man dann die beiden Platinplatten, ohne daß sie sich berühren, in gesäuertes Wasser, so steigen an beiden Platten Gasbläschen auf. Fängt man das aufsteigende Gas in Glasröhren auf, die mit Wasser gefüllt über die Polplatten gestülpt sind, Fig. 13, so zeigt sich bald, daß von der negativen Polplatte doppelt so viel Gas ausfließt als von der positiven, und eine Untersuchung der Gase zeigt, daß sich an der negativen Platte Wasserstoffgas, an der positiven aber Sauerstoffgas entwickelt. Fig. 14 zeigt einen Wasserzerseßungsapparat, bei welchem die entwickelten Gase nicht getrennt aufgefangen werden, sondern vermengt als Knallgas durch dieselbe Glasröhre entweichen. Man kann das aus diesem Rohr entweichende Gas in einer graduirten Röhre, Fig. 15, auffangen. Die Menge des in einer gegebenen Zeit, etwa in 1 Minute, entwickelten Gases ist ein Maß für die Stärke des Stroms. Ein Wasserzerseßungsapparat, Fig. 14, verbunden mit dem graduirten Rohr, Fig. 15, bildet ein Voltameter.

Davy hat durch den galvanischen Strom zuerst Kali zerlegt, und zwar scheidet sich dabei Sauerstoff am positiven, Kalium am negativen Pole aus. In gleicher Weise werden auch die andern Alkalien und Erden in Sauerstoff und in Metall zerlegt.

Geschmolzene Chlormetalle werden durch den Strom in Chlor (am + Pol) und Metall (am - Pol) zerlegt.

Die Lösung eines Alkalisalzes (z. B. des Glaubersalzes) wird durch den Strom so zerlegt, daß sich am + Pol Sauerstoff und die Säure, am - Pol Wasserstoff und die Basis ausscheidet. Um dies zu zeigen, gießt man die durch Malventinctur gefärbte Salzlösung in eine Glasröhre von der Form Fig. 16, und taucht die aus Platin bestehenden Polplatten in die beiden Schenkel ein. Die Lösung am + Pol färbt sich alsbald roth (durch den Einfluß der freigewordenen Säure), am - Pol aber grünlich (durch die Basis).

Anders verhalten sich die Lösungen der Salze schwerer Metalle, aus ihnen scheidet sich am negativen Pol das reine Metall aus. So schlägt sich z. B. aus einer Lösung von Kupfervitriol am - Pol metallisches Kupfer nieder. Dieser Kupferniederschlag, welcher sich von dem metallischen - Pol leicht ablösen läßt, wird in der Galvanoplastik benutzt. Mittels der Galvanoplastik werden kupferne Copien von beliebigen Gegenständen, z. B. von Münzen dargestellt. Von dem zu copirenden Gegenstand wird zunächst ein Abdruck in Wachs oder Guttapercha genommen und dessen Oberfläche durch Graphit leitend gemacht, welcher dann in eine Lösung von Kupfervitriol eingetaucht wird. Die Graphitschicht wird dann mit dem negativen Pol eines Bunsenschen Bechers, Fig. 17, verbunden und ihr gegenüber eine Kupferplatte eingehängt, welche mit dem + Pol des Bechers verbunden wird. Es scheidet sich nun auf der mit Graphit überzogenen Form eine Schicht von Kupfer ab, welche nach ein bis zwei Tagen dick genug ist, um abgenommen werden zu können, und welche eine genaue kupferne Copie des ursprünglichen Originals ist.

Wendet man statt der Lösung von Kupfervitriol die Lösung eines Silber- oder Goldsalzes an, so wird sich auf einer metallischen Oberfläche, welche mit dem - Pol verbunden in die Lösung herabhängt, Silber oder Gold ausscheiden, wenn der Strom durch die Lösung hindurchgeht. Darauf beruht die galvanische Versilberung und Vergoldung.

IV. Elektromagnetismus und Elektrodynamik

Wenn ein durchströmter Leitungsdraht in der Nähe einer Magnetnadel vorübergeführt wird, so wird dieselbe aus ihrer durch den Erdmagnetismus bestimmten Gleichgewichtslage abgelenkt. Fig. 18, Taf. 10, zeigt einen quadratisch gebogenen Bügel von Kupferblech, welcher so aufgestellt wird, daß die Ebene des Quadrats mit der Ebene des magnetischen Meridians zusammenfällt. In der Mitte der horizontalen Enden c d ist über und unter dem Kupferstreifen eine Silberspitze angebracht, auf welcher eine Magnetnadel ruht. In gleicher Weise spielt eine Magnetnadel über dem horizontalen Arm e g. Solange das Kupferblech nicht durchströmt ist, bleiben die Nadeln im magnetischen Meridian, schraubt man aber bei b den positiven und bei g den negativen Pol einer Säule ein, so werden die Nadeln abgelenkt, und zwar in der durch die Pfeile angedeuteten Richtung, wenn S nach Süden, N nach Norden schaut.

Eine umströmte Magnetnadel wird stets so abgelenkt, daß ihr Südpol nach derjenigen Seite hinschaut, in welcher aus gesehen der Strom in der Richtung der Nadel, wie der Zeiger einer Uhr.

Die Ablenkung der Magnetnadel wird benutzt, um galvanische Ströme nachzuweisen und zu messen.

Um stärkere Ströme zu messen, dient die Tangentenbusssole, Fig. 19, ein Ring von Kupfer, welcher in zwei isolirt nebeneinander herlaufenden Kupferbögen ab und c d endet. In der Mitte dieses in der Ebene des magnetischen Meridians vertical aufgestellten Ringes befindet sich eine Busssole, deren Nadel zeigt, wenn kein Strom durch den Ring hindurchfließt. Sobald aber der Ring durchströmt wird, findet eine Ablenkung der Nadel statt, und zwar ist die Stromstärke der Tangente des Ablenkungswinkels proportional, daher der Name des Instruments.

Um schwache galvanische Ströme nachzuweisen, benützt man den Multiplikator (Galvanometer) Fig. 20, an. Er besteht aus einer, an einem Commutator aufgehängten Magnetnadel, um welche ein in der Ebene der aufgespannten Kupferdrähte in vielen Windungen herumgeführt ist. Um das Instrument empfindlicher zu machen, wird statt einer Nadel ein astatisches Nadelpaar angewandt. Die untere Nadel desselben befindet sich in der Hohlung der Windungen, die obere hängt über denselben. Die obere Nadel bewegt sich über einem getheilten Kreise hin, auf welchem die Größe der Ablenkung abliest. Je nach Umständen muß man einen Multiplikator mit vielen Windungen (bis zu 40000) sehr dünnen Drahtes, oder einen solchen anwenden, welcher nur aus wenigen (30 bis 40) Windungen eines dicken Drahtes gebildet ist.

Eine andere Form des Multiplikators ist das Spiegelgalvanometer, Fig. 24, Taf. 8. Der schon früher beschriebene, mit einem Spiegel versehene Magnetnadelstab ist mit einer Reihe von Multiplikatorwindungen umgeben. Wenn diese von einem schwachen Strom durchlaufen werden, erfolgt eine freilich nicht bedeutende Ablenkung des Magnetstabes, durch die Spiegelablenkung wird aber schon die geringste Ablenkung meßbar.

Wenn man einen Stab von weichem Eisen mit Wollse überspannenen Kupferdraht in vielen Windungen herumwickelt und dann einen galvanischen Strom durch diese Windungen hindurchschickt, so wird das Eisen magnetisch; es verliert aber seinen Magnetismus augenblicklich wieder, sobald der Strom aufhört zu fließen, so umkreisen. Solche temporäre Magnete nennt man Elektromagnete.

Statt den Draht unmittelbar auf das Eisen aufzuwickeln, ist es zweckmäßiger, ihn auf eine Spule von 3 oder 4 Pappentwischen aufzuwickeln, so eine Magnetisirungsspirale, Fig. 21, Taf. 10, herzustellen, welche der Eisenstange eingeschoben wird.

Die Polarität eines solchen Elektromagnets folgt: durch Fig. 22 erläuterten Gesetz.

Der Magnetismus der Elektromagnete ist ungleich, als man ihn je in permanenten Stahlmagneten finden kann. Fig. 23 zeigt einen kleinen hufeisenförmigen Elektromagnet.

In vielen Fällen ist es nothwendig, daß beide Pole des Elektromagnets nach oben gekehrt sind, wie dies dem großen Elektromagnet, Fig. 24, der Fall ist. Spirale eines jeden Schenkels ist hier aus drei Drähten zusammengeflochten, deren jedes 18 bis 20 Pfund Sphäradraht enthält.

Zu den wichtigsten Anwendungen des Elektromagnetismus gehört ohne Zweifel die elektrische Telegraphie. Nachdem man einmal die Erfahrung gemacht hatte, daß der elektrische Strom sich in den besten Leitungsdrähten mit momentaner Geschwindigkeit fortpflanzt, versuchte man verschiedene Stromwirbel zur Signalisirung in die Ferne anzuwenden, nur die magnetischen zeigten sich praktisch anwendbar, namentlich aber der Elektromagnetismus.

Fig. 25 stellt Morse's Dradtelegraph dar. er den Polen des Elektromagnets b schwebt, von einem Hebel d getragen, der eiserne Stab c c. Sobald Strom durch die Windungen des Elektromagnets hindurchgeht, werden seine Eisenkerne magnetisch, ziehen den Anker c c herab, wodurch dann ein Stift, welcher am linken Ende des Hebels d befestigt ist, gehoben wird. Sobald der Strom in b unterbrochen wird, wird aber der Hebel d sammt dem Stift durch die Feder f wieder zurückgezogen. Dem ist bei d links gegenüber befindet sich nun ein Papierstreifen, welcher mit gleichförmiger Geschwindigkeit zwischen den Messingrollen r und h nach links fortgezogen wird, wenn diese Rollen durch ein Uhrwerk in Drehung gesetzt werden. Wird nun der Stift bei d links nach oben gedrückt, so preßt er die entsprechende Stelle des Papierstreifens in eine hinter denselben befindliche Rinne der Rolle r hinein, wodurch im Papier bleibender Eindruck gemacht wird. Wird der Strom des Elektromagnets nur momentan geschlossen, so wird diese Weise ein Punkt auf dem Papierstreifen erzeugt, ein Strich dagegen, wenn die Schließung etwas länger dauert.

Sind nun die Zuleitungsdrähte des Elektromagnets zu einer meilenweit entfernten Station fortgeführt, welcher eine galvanische Säule aufgestellt ist, so wird durch eine an jener entfernten Station ausgeführte momentane Schließung des Stroms auf dem Papierstreifen des Schreibapparats ein Punkt markiert, ein Strich, wenn die Schließung etwas länger dauert. Aus Punkten und Strichen ist nun das Alphabet zusammengeflochten; so bezeichnet z. B.

a e i o u b m n t
leicht und sicher den Strom schließen und öffnen können, dient der Schlüssel, Fig. 26. Die Verbindung zweier Stationen wird durch Fig. 27 erläutert. Man der Schlüssel der Station rechts niedergebracht, so geht der Strom der Säule b durch diesen Schlüssel und den Leitungsdraht zum Schlüssel der linken Station, von diesem durch den Schreibapparat zur Bodenplatte p, um dann durch den zweiten Draht, welcher den zweiten Leitungsdraht ersetzt, zu der Station rechts zurückzuführen.

Auch als Triebkraft hat man den Elektromagnetismus zu benutzen gesucht und hoffte sogar die Dampfmaschinen durch elektromagnetische Motoren ersetzen zu können, ohne jedoch praktisch brauchbare Resultate zu erzielen. Von den mannichfachen Formen elektromagnetischer Motoren mag hier beispielsweise nur eine betrachtet werden.

Vier starke Elektromagnete A, B, C und D, Fig. 28 und 29, sind in einem Gestell von Gußeisen so befestigt, daß jeder einen Winkel von 60° mit dem folgenden macht. Zwischen diesen Elektromagneten befindet sich ein System von zwei gußeisernen, auf derselben horizontalen Umkreisung befestigten Rädern, welche auf ihrem Umfang 8 Stäbe M von weichem Eisen tragen, deren jeder um 45° vom folgenden absteht. Der Strom geht nun nicht gleichzeitig durch die Umwindungen aller 4 Elektromagnete, sondern der Reihe nach erst durch die Umwindungen von A und B, dann durch die von D, nachher durch die von C u. s. w. Der Gang der Maschine wird durch Fig. 29 erläutert.

Wie der galvanische Strom ablenkend auf eine bewegliche Magnetnadel wirkt, so wirkt er auch ablenkend auf einen beweglich aufgehängten galvanischen durchströmten Leitungsdraht, wie dies Ampère gezeigt hat, welcher damit die Lehre von der gegenseitigen Einwirkung der galvanischen Ströme, die Elektrodynamik, begründet hat. Fig. 30 zeigt das Ampère'sche Gestell in einfachster Form. Zwei voneinander isolirte Metallsäulen tragen zwei Quecksilbernäpfehen, in welche ein rechteckig gebogener Leiter so eingehängt ist, daß er sich frei drehen kann. Wird nun der positive Polendraht einer Säule in dem vordern, der negative im hintern Säulchen eingeschraubt, so wird der bewegliche Leiter durchströmt, wie die Pfeile andeuten. Der so durchströmte Leiter wird nun zunächst durch den Erdmagnetismus gerichtet, er stellt sich rechtwinklig zum magnetischen Meridian. Stellt man nun dem beweglichen Leiter einen andern Leitungsdraht so gegenüber, wie die Figur zeigt, so wird Anziehung oder Abstoßung stattfinden, je nachdem der Strom in rs aufsteigt oder niedergeht.

Es folgt daraus, daß parallele gleichgerichtete Ströme sich anziehen, während parallele entgegengesetzte gerichtete Ströme sich abstoßen.

Die Anziehung paralleler Ströme wird auch durch den Apparat Fig. 34 erläutert. Ein Spirale von Kupferdraht ist so aufgehängt, daß ihre untere Spitze eben in ein Quecksilbernäpfehen eintaucht. Ist nun das Quecksilbernäpfehen mit dem einen Pol einer Säule verbunden, während vom andern ein Draht zur Kleinschraube K führt, so sind alle Windungen der Spirale in gleicher Richtung durchströmt, sie ziehen sich an, dadurch wird die Spirale verflügt und die Spitze aus dem Quecksilber herausgezogen, also der Strom unterbrochen. Die Spitze sinkt wieder in das Quecksilber herab und dasselbe Spiel beginnt aufs neue.

Fig. 35, Taf. 7, stellt zwei Bandspiralen dar, d. h. Spiralen, deren jede aus einem Streifen dünnen Kupferblechs so aufgewunden ist, daß die einzelnen Windungen durch Seiden- oder Baummollenband voneinander isolirt sind, und deren jede an zwei Streifen von Kupferband hängt, durch welche der Strom zu- und abgeleitet wird. Sind die Spiralen entgegengesetzt durchströmt, so stoßen sie einander ab, sie fahren also auseinander; sind sie aber in gleicher Richtung durchströmt, so ziehen sie einander an, sie klappen also zusammen, selbst wenn man die obern Enden der Aufhängebänder um 2—3 Zoll auseinanderhält.

Hängt man in das Ampère'sche Gestell, Fig. 30,

Zaf. 10, statt des rechteckigen Leiters den Schraubendraht (Solenoid), Fig. 31, auf, so verhält sich dieser ganz wie eine Magnetnadel, wenn ein galvanischer Strom ihn durchläuft; seine Axe stellt sich in den magnetischen Meridian, und einem Magnetstab gegenüber verhält sich das eine Ende des durchströmten Schraubendrahts wie ein Nordpol, das andere Ende wie ein Südpol.

Eine durchströmte Magnetisierungsspirale, Fig. 21, wirkt auf den durchströmten und beweglich aufgehängten Schraubendraht, Fig. 31, wie ein Magnetstab.

Es findet also vielfache Analogie statt zwischen einem Magnetstab und einer durchströmten Spirale, und darauf baut Ampère seine Theorie des Magnetismus, derzufolge die Erscheinungen des Magnetismus zurückzuführen sind auf die gegenseitige Einwirkung galvanischer Ströme.

Nach Ampère hat man sich jedes Eisenmolecul als beständig von einem elektrischen Strome umkreist zu denken. Ein Eisenstab ist bis zu seinem Maximum magnetisirt, wenn alle Molecularströme eines jeden Querschnitts einander parallel gerichtet sind, wie dies Fig. 32 anschaulich macht; der Stab verliert seinen Magnetismus mehr und mehr, wenn die Elementarströme aus der parallelen Anordnung mehr und mehr in eine regellose gegenseitige Lage übergehen, bei welcher sich die Wirkungen nach außen hin nicht mehr summiren, sondern gegenseitig aufheben.

Statt aller der elementaren parallelen Ströme des Querschnitts eines Magnetstabes, wie sie in Fig. 32 dargestellt sind, kann man sich diesen Querschnitt von einem einzigen Strome umkreist denken, welcher die Resultirende aller elementaren Ströme ist, und somit läßt sich ein Magnetstab als ein System unter sich paralleler geschlossener Ströme denken, wie es Fig. 33 anschaulich macht.

V. Thermo-elektrische Ströme.

Wenn ein geschlossener metallischer Ring aus zwei oder mehreren verschiedenen Metallen zusammengesetzt ist, so kann kein Strom entstehen, solange alle Lötstellen gleiche Temperatur haben. Sobald aber eine Lötstelle erwärmt wird, während die andern kalt bleiben, entsteht sogleich ein Strom, welcher seines Ursprungs wegen als thermo-elektrischer Strom bezeichnet wird.

In Fig. 36, Taf. 10, stellt p o einen Wismutstab dar, auf welchem ein kupferner Nägel m n aufgelötet ist. In der Mitte des Raums, welcher zwischen beiden bleibt, ist eine Stahlspitze angebracht, welche eine Magnetnadel trägt. Wird nun der Apparat so aufgestellt, daß die Längskanten von p o in der Richtung des magnetischen Meridians liegen, so stellt sich die Magnetnadel in der Mitte des Wägelns ein. Sobald aber eine der Lötstellen, etwa o erwärmt wird, erfolgt eine Ablenkung der Nadel.

Noch leichter lassen sich die thermo-elektrischen Ströme mit Hülfe der Vorrichtung Fig. 35 nachweisen. An einen Wismutstab ist an einem Ende der Kupferstreifen ca, am andern Ende der Kupferstreifen bd angelötet. Wird nun c mit dem einen, d mit dem andern Ende der Drahtwindungen eines Multiplikators in Verbindung gebracht, so erfolgt eine Ablenkung der Multiplikatornadel, sobald die eine der beiden Lötstellen, etwa die bei a, erwärmt wird.

Die verschiedenen Metalle lassen sich in eine Reihe ordnen, welche die Eigenschaft hat, daß, wenn man aus zwei Metallen dieser Reihe einen geschlossenen Ring bildet und eine Lötstelle erwärmt, alsdann der

positive Strom an der erwärmten Stelle von dem in der Reihe höher stehenden Metall zu dem tiefer stehenden geht. Folgendes ist eine solche thermo-elektrische Spannungsreihe:

Wismut,	Kupfer,
Platin,	Eisen,
Kupfer,	Antimon.

Bei gleicher Temperaturdifferenz ist der elektrische Strom, welchen die Combination zweier Metalle liefert, um so stärker, je weiter sie in der thermo-elektrischen Spannungsreihe auseinanderstehen. So z. B. eine Combination von Wismut und Antimon einen stärkeren Strom geben als eine solche von Wismut und Kupfer.

Zwei Stäbe verschiedener Metalle bilden, wenn sie zusammengelegt werden, ein thermo-elektrisches Element. So wie mehrere Volta'sche Elemente zu einer Säule verbunden werden können, so können auch mehrere thermo-elektrische Elemente zu einer thermo-elektrischen Säule verbunden werden. Fig. 37 stellt eine aus 4 Wismut-Antimon-Elementen zusammengesetzte thermo-elektrische Säule dar. Die linke Thermo-säule, deren äußere Ansicht Fig. 16, 17 darstellt, ist aus 15 in einer Verticalebene liegenden Thermo-Elementen zusammengesetzt. Die Thermo-säule Fig. 59, Taf. 6, besteht aus 25 Wismut-Antimon-Elementen, welche zu einem quadratischen Bündel zusammengefaßt sind.

Wenn nun an einer thermo-elektrischen Säule die Lötstellen 1, 3, 5, 7 u. s. w. erwärmt werden, während die auf der andern Seite liegenden Lötstellen 2, 4, 6, 8 u. s. w. kalt bleiben, so entsteht ein Strom, welcher n mal stärker ist als der eines einzelnen Elements, wenn die Säule aus n Elementen gebildet ist.

Wir haben schon oben Seite 32 gesehen, wie sich aus Wismut-Antimon-Elementen gebildete Säulen zu Untersuchungen über strahlende Wärme benutzt werden.

Diese Säulen, welche dazu dienen, geringe Temperaturdifferenzen merklich zu machen, können nicht zur Erzeugung starker Ströme verwendet werden, weil die bedeutender Erhitzung eine Schmelzung eintritt. In Erzeugung starker thermo-elektrischer Ströme muß man Metalle wählen, welche nicht so leicht schmelzen. Es stellt z. B. Fig. 38, Taf. 10, die Röntgen'sche Thermo-säule dar, welche aus Streifen von Nickelblech und Stäben einer Legirung von Zinn und Antimon gebildet ist. Die obern Verbindungspunkte werden durch Weingeist- oder Gasflammen erwärmt, während die untern in kaltes Wasser eingetaucht sind.

Die thermo-elektrischen Ströme bringen alle Wirkungen gewöhnlicher galvanischer Ströme nur in ungleich schwächerer Maße hervor.

VI. Induktionsströme.

Fig. 33, Taf. 7, stellt eine Magnetisierungsspirale dar, welche aus etwas didem überspannendem Kupferdraht gebildet ist, und welche in der Hohlung einer ähnlichen Spirale A steht, die aus viel mehr Windungen eines weit dünnern überspannenden Kupferdrahts gebildet ist.

Die Spirale B heißt die Haupt-, A heißt die Nebenspirale. Die Drahtenden a und b der Nebenspirale sind durch Leitungsdrähte mit den Drahtenden des entfernt aufgestellten Multiplikators verbunden. Von dem einen Pole n eines Daniell'schen Bechers führt ein Leitungsdraht zu dem Drahtende a der Hauptspirale, vom Pol p führt ein Draht zu einem Quecksilbernäpfchen. Sobald nun ein Draht, welcher an dem Drahtende c der Hauptspirale befestigt ist,

gleichfalls in das Quecksilbernapfchen eingetaucht wird, bildet die Hauptspirale den Schließungsbogen des Bechers, es circulirt nun ein Strom in der Hauptspirale B.

In dem Moment, in welchem dieser Strom entsteht, wird auch ein Strom im Nebendraht A inducirt, wie man aus der Ablenkung der Nadel des Multiplikators M ersieht. Wenn aber der Hauptstrom in B geschlossen bleibt, so kehrt die Multiplikatornadel nach einigen Schwanlungen wieder in ihre Gleichgewichtslage zurück, der continuirliche Strom der Hauptspirale bleibt also ohne Wirkung auf die Nebenspirale.

Zieht man nun, nachdem die Multiplikatornadel zur Ruhe gekommen ist, das von c kommende Drahtstück wieder aus dem Quecksilbernapfchen heraus, so erfolgt ein abermaliger Ausschlag der Multiplikatornadel, aber nach einer Richtung, welche der des ersten Ausschlags entgegengesetzt ist. Beim Schließen des Hauptstroms wird im Nebendraht ein entgegengesetzt gerichteter, beim Öffnen (Unterbrechen) des Hauptstroms wird ein ihm gleichgerichteter Strom im Nebendraht inducirt.

Ist p mit c und n mit d durch hinlänglich lange Drähte verbunden, so kann man die durchströmte Hauptspirale nach Belieben in die Nebenspirale einschieben und sie nachher wieder herausziehen. Beim Einschieben der durchströmten Hauptspirale wird ein entgegengesetzt gerichteter, beim Herausziehen wird ein gleichgerichteter Strom im Nebendraht inducirt.

Das Einschieben und Ausziehen eines Magnetstabes in und aus der Spirale A, Fig. 34, wirkt wie das Einschieben und Ausziehen der durchströmten Hauptspirale B, Fig. 33.

Die Inductionsströme bringen die gleichen Wirkungen hervor, wie die galvanischen Ströme, besonders ausgezeichnet aber sind ihre physiologischen Wirkungen. Wenn man an dem Apparat, Fig. 33, den Multiplikator M entfernt und statt dessen in a und b metallene Handgriffe einsetzt, welche an metallenen Schrauben hängen, wie solche an dem Apparat Fig. 43, Taf. 7, angebracht sind, so wird man bei jeder Öffnung und bei jeder Schließung des Hauptstroms einen Schlag fühlen, ähnlich dem Entladungsschlag einer Leydener Flasche, wenn man den einen Handgriff in die rechte, den andern in die linke Hand nimmt. Diese Schläge werden bedeutend verstärkt, wenn ein Bündel dünner Eisendrähte in die Hohlung der Hauptspirale eingeschoben wird. Uebrigens sind die Öffnungsschläge geringer als die Schließungsschläge.

Um Öffnungs- und Schließungsschläge in rascher Aufeinanderfolge durch den Körper senden zu können, hat man verschiedene Unterbrechungsvorrichtungen konstruirt, welche zwischen dem Volta'schen Becher und der Hauptspirale eingeschaltet werden. Wenn das Unterbrechungsrad, Fig. 36, eingeschaltet ist, so erfolgt eine Unterbrechung und Wiederschließung des Hauptstroms, so oft beim Drehen des gezahnten Metallrades z die Metallfeder b von einem Zahn zum andern überspringt. Bei dem magnetischen Hammer, Fig. 37, erfolgt die Öffnung und Schließung des Stroms bei c in folgender Weise: Wenn der Strom durch die Windungen des kleinen Elektromagnets hindurchgeht, so wird der Eisentern magnetisch und zieht den eisernen Anker n herab, welcher auf einer Messingfeder befestigt ist; dadurch wird aber auch das Platinplättchen herabgezogen, auf welchem die Platinspitze c aufsitzt, und somit der Strom unterbrochen. Infolge davon verliert sich der Magnetismus, die Messingfeder schnellt wieder in die Höhe, und das Platinplättchen kommt wieder mit der

Platinspitze in Berührung, der Strom ist geschlossen, und dasselbe Spiel beginnt von neuem.

Fig. 40, Taf. 10, stellt einen sogenannten Schlitzenapparat dar, d. h. einen Inductionsapparat, bei welchem die Nebenspirale B nach Belieben mehr oder weniger über die Hauptspirale A geschoben werden kann, wodurch man es in der Gewalt hat, den Inductionsstrom stärker oder schwächer zu machen. Bei p und q werden die Handgriffe eingeschrraubt, die Drähte x und y führen zum elektromotorischen Becher und dem Unterbrecher.

Die kräftigen Schläge, welche Inductionsapparate geben, beweisen, daß die Inductionsströme eine namhafte Spannung haben. Durch Vergrößerung der Dimensionen und sonstige zweckmäßige Arrangements hat man die Spannung der Inductionsapparate so verstärkt, daß sie Funken von namhafter Größe zu liefern im Stande sind, wie dies namentlich beim Ruhmors'schen Apparat, Fig. 41, der Fall ist. Die 25 Centimeter lange, aus 2 Millimetern didem Kupferdraht gebildete Hauptspirale steckt in einer Nebenspirale von gleicher Länge, welche aus 100000 Meter Kupferdraht von $\frac{1}{2}$ Millimeter Dide gebildet ist. Als Unterbrechungsvorrichtung dient ein eigenhümlich konstruirtes magnetischer Hammer. Wenn von dem positiven Polende A der Inductionsspirale eine Drahtleitung zu der Platinspitze s führt, während die Metallplatte t mit dem negativen Pol B der Nebenspirale leitend verbunden ist, so schlagen zwischen s und t bei jeder Unterbrechung des Hauptstroms kräftige Funken auf eine Länge von $\frac{1}{2}$ Meter über, während der Schließungsstrom nicht Spannung genug hat, um den Zwischenraum zwischen s und t zu überpringen.

Mit einem großen Ruhmors'schen Apparate kann man Leydener Flaschen und Batterien sehr rasch laden, vide Glasplatten durchschlagen u. f. w.

Sehr schöne Lichterscheinungen beobachtet man, wenn man die Funken des Ruhmors'schen Apparats durch luftverdünnte Räume gehen läßt, wozu sich die Geißler'schen Röhren besonders eignen. Es sind dies theilweise erweiterte Röhren, Fig. 38, Taf. 7, an deren Enden Platindrähte eingeschmolzen sind und welche nur noch ganz verdünnte Gase enthalten. Werden die beiden Platindrähte mit den Polen eines Ruhmors'schen Apparats verbunden, so erfüllt sich die Röhre mit einem rothen Lichtstrom, welcher vom positiven Platindraht ausgeht, während der negative Platindraht mit einem blauen Glümlicht umhüllt erscheint.

Fig. 39, Taf. 7, stellt eine Geißler'sche Röhre dar, in welche von unten her ein Eisenstab hineintragt, der ringsum luftdicht von einem Glasrohr umgeben ist. Der Platindraht a endet unten mit einem Metallplättchen n, der Platindraht d trägt einen um den Eisenstab herumgehenden Drahttring m. Werden a und d mit den Polen eines Inductionsapparats verbunden, so geht ein Lichtstrom von n nach m, welcher um den Eisentern h rotirt, wenn man den Apparat auf den einen Pol eines Elektromagnets setzt und dadurch H magnetisch macht.

Wenn eine stromleitende Spirale nicht von einer zweiten umgeben ist, so wirken beim Schließen und Öffnen des Stroms die einzelnen Windungen inducirt aufeinander. Im Moment der Schließung wird ein Strom inducirt, welcher dem entstehenden Hauptstrom entgegenwirkt, im Moment des Öffnens aber ein dem verschwindenden Hauptstrom gleichgerichteter. Diese im stromleitenden Drahte selbst inducirt Ströme heißen Extraströme. Fig. 43, Taf. 7, erläutert das Arrangement eines Extrastrom-Apparats. In den Schließungsbogen des Volta'schen Bechers k ist eine Spirale s und ein Unterbrechungsrad u mit

Handgriffen eingeschaltet. Nimmt man den einen Handgriff in die rechte, den andern in die linke Hand, so bildet der menschliche Körper eine Nebenschleifung des Verschers k. So oft nun durch Drehen des Rades u der Hauptstrom in der Spirale s unterbrochen wird, geht der Schlag des Galvanometers durch den Körper.

Um auf bequeme Weise mit den durch Magnete inducirten Strömen experimentiren zu können, hat man die magnetoelektrischen Rotationsmaschinen (auch Magnetelektrifirmaschinen genannt) construiert. Fig. 39, Taf. 10, stellt eine solche dar. Ein aus mehreren Lamellen zusammengefügter Hufeisenmagnet liegt wagerecht; in der Mitte zwischen seinen beiden Schenkeln ist eine horizontale Rotationsaxe angebracht, auf deren vorderer Hälfte eine eiserne Platte befestigt ist, welche, gegen die Magnetpole geneigt, zwei Cylindern von weichem Eisen trägt, auf denen die Inductionspiralen R aufgesteckt sind.

Wenn nun die besprochene Ase mit jener Eisenplatte, ihren Eisenkernen und Inductionspiralen in Rotation versetzt wird, so werden die Eisenkerne bald dem einen, bald dem andern Pole des Hufeisenmagnets genähert, und dadurch werden in den Inductionspiralen Ströme inducirt, deren Richtung bei jeder halben Umdrehung einmal wechselt. Die in den Spiralen abwechselnd nach der einen und andern Richtung gehenden Ströme werden nun durch einen hier nicht näher zu beschreibenden Commutator stets in gleicher Richtung durch den Körper geleitet, welcher in den Schließungsbogen des Apparats eingeschaltet ist. Faßt man z. B. mit den beiden Händen die in unserer Figur dargestellten Handgriffe, so erhält man kräftige Schläge. — Der Strom der Magnetelektrifirmaschine bringt chemische und thermische Effecte hervor, wie die gewöhnlichen galvanischen Ströme.

Auch der Erdmagnetismus inducirt elektrische Ströme in Spiralen, welche um eine feste Ase umgedreht werden, und zwar am stärksten, wenn die Umdrehungsaxe des Erbinductors s, Fig. 43, Taf. 10, rechtwinklig auf dem magnetischen Meridian steht. Die in der rotirenden Spirale MN durch den Erdmagnetismus inducirten Ströme werden mittels eines Commutators stets in gleicher Richtung durch einen Multiplicator geleitet, dessen Ablenkung ein Maß für die Stärke der inducirten Ströme ist.

Wenn ein Magnet in der Nähe eines guten Leiters oder ein Leiter in der Nähe kräftiger Magnetpole bewegt wird, so werden in dem Leiter Ströme inducirt, welche der sie hervorruhenden Bewegung hemmend entgegenwirken. Auf das obere Ende der Spiralen des Elektromagnets, Fig. 24, Taf. 10, wird ein Bret A, Fig. 44, Taf. 10, aufgeschoben, welches zwei runde Löcher enthält, aus welchen die beiden Eisenkerne noch etwas vorragen. Auf jeden der Eisenkerne wird dann ein Halbanter aufgesetzt, wie ihn die Figur zeigt. Auf die Mitte des Bretes A wird sodann der Träger, Fig. 40, Taf. 7, aufgeschraubt, an welchem von einem Faden getragen ein massiver Kupferwürfel so hängt, daß er sich gerade zwischen den Polspitzen N und S, Fig. 44, Taf. 10, befindet. Während nun der Strom des Elektromagnets nicht geschlossen, also der Magnetismus der Eisenkerne nicht erregt ist, wird der Faden, an welchem der Würfel hängt, klar und blickt und dann losgelassen. Der Faden dreht sich nun wieder auf und der Würfel geräth in rasche Rotation, welche aber sogleich aufhört, wenn der Strom geschlossen wird, welcher die Spiralen durchlaufend den Elektromagnet in Thätigkeit setzt.

Fig. 42, Taf. 10, zeigt einen Magnetstab, welcher an einem Bündel ungedrehter Seidenfäden aufgehängt und von einem in sich geschlossenen Kupferbügel umgeben ist. Wenn nun der Magnetstab durch irgendeine Ursache in Schwingungen versetzt wird, so nehmen dieselben viel rascher ab, der Magnet kommt viel rascher zur Ruhe, als wenn der Kupferbügel fehlt, weil der bewegte Magnetstab in dem Bügel Ströme inducirt, welche seinen Oscillationen hemmend entgegenwirken. Eine solche Dämpfung ist z. B. auch an dem transportablen Magnetometer Fig. 24, Taf. 8, angebracht, indem der Multiplicator durch auf einem massiven Rahmen von Kupfer aufgewunden ist.

VII. Diamagnetismus.

Wenn man ein von einem Faden getragenes Stäbchen, Fig. 45, Taf. 10, irgendeiner Substanz zwischen den Polen N und S, Fig. 44, eines großen Elektromagnets aufhängt, so wird es irgendeine durch den Faden bedingte Gleichgewichtslage annehmen, solange der Elektromagnet noch nicht in Thätigkeit gesetzt ist. Wird aber der Elektromagnet erregt, so stellt sich das Stäbchen entweder in die Verbindungslinie der beiden Pole, oder rechtwinklig zu derselben, Fig. 41, Taf. 7. Ersteres wird die axiale, letzteres wird die äquatoriale Einstellung genannt. Die axialen einstellenden Substanzen sind die magnetischen, die äquatorialen einstellenden nennt man diamagnetisch.

Die magnetischen Körper werden von den Magnetpolen angezogen, die diamagnetischen werden abgestoßen.

Außer dem Eisen ergeben sich bei dieser Prüfung, wenn auch bedeutend weniger intensiv, als magnetisch die Metalle Kobalt und Nickel, und noch weit schwächer als diese Mangan, Platin und Palladium. Fast alle übrigen Körper sind diamagnetisch; besonders stark ist der Diamagnetismus des Wisnits.

Zu Versuchen über Diamagnetismus ist auch die in Fig. 42, Taf. 7, dargestellte Form des Elektromagnets sehr geeignet.

Um Flüssigkeiten auf ihr magnetisches oder diamagnetisches Verhalten zu prüfen, setzt man sie in Ubrgläsern auf die mehr oder weniger genäherten Halbanter, Fig. 44 oder 45, Taf. 7. Ist die Flüssigkeit magnetisch, wie z. B. eine Lösung von Eisenchlorid, so erhebt sie sich zu einem oder zu zwei Hügeln über den Polen der Halbanter, je nachdem diese Pole mehr (Fig. 44) oder weniger (Fig. 45) einander genähert sind. Für diamagnetische Flüssigkeiten, z. B. für Schwefelkohlenstoff, bilden sich Abflüsse an der Stelle, wo für magnetische Flüssigkeiten Hügel aufsteigen.

Zum Schluß haben wir noch die Wirkung kräftiger Elektromagnete auf durchsichtige Körper zu betrachten. Die Aeren des Elektromagnets, Fig. 42, sind durchbohrt, und bei a sowohl wie bei b ist ein Nicol'sches Prisma eingesetzt. Zwischen den einander zugekehrten Polen der durchbohrten Eisenkerne ist ein durchsichtiges Stäbchen c, etwa ein Prisma von schwerem Glase (Nieselbor-saures Bleioxyd) eingesetzt. Wenn die Nicols gekreuzt sind, so erscheint, wenn man von a aus durch den Apparat hindurch nach der Lampenflamme schaut, das Gesichtsfeld dunkel, solange der Elektromagnet nicht erregt ist; sobald er aber in Thätigkeit gesetzt wird, erblickt man die Flamme, und man muß das Nicol a um einen bestimmten Winkel nach rechts oder nach links drehen, um das Gesichtsfeld wieder dunkel zu machen.

Durch den Einfluß kräftiger Magnetpole wird also in durchsichtigen diamagnetischen Stoffen die Erscheinung der Circularpolarisation hervorgerufen.

Astronomie.

Bearbeitet

VON

Dr. Karl Bruhns,

Professor an der Universität, Director der Sternwarte zu Leipzig.

I n h a l t.

	Seite	Ein
Einleitung	3	
I. Die sphärische Astronomie. (Tafel 1, 2, 3.)		
1. Die Eintheilung der Himmelskugel	3	
2. Die Fixsterne	4	
a) Eintheilung in Constellationen, Namen derselben und einiger der Hauptsterne	4	
b) Eintheilung in Größenklassen. Zahl der Fixsterne in jeder Größenklasse, Sternkataloge, Sternarten	6	
c) Die Veränderungen des Sternhimmels durch die Präcession, Nutation und Aberration	8	
d) Veränderliche Sterne	12	
e) Neu erschienene Sterne	14	
f) Die Milchstraße	15	
g) Sternhaufen und Nebelflecke	15	
h) Die Doppelsterne	19	
i) Die Eigenbewegungen der Fixsterne	22	
k) Ueber die Entfernungen der Fixsterne	24	
l) Die Durchmesser und physische Beschaffenheit der Fixsterne	24	
II. Die theoretische Astronomie. (Tafel 4, 5, 6, 7, 11, 12.)		
1. Einleitung. Erklärungen	25	
2. Das Sonnensystem	27	
a) Die Sonne	27	
b) Die Planeten	28	
c) Die Satelliten oder Monde	35	
d) Die Kometen	38	
e) Die Sternschnuppen, Meteorströme, Feuerkugeln	46	
III. Die physische Astronomie	47	
IV. Die praktische Astronomie. (Tafel 8, 9, 10.)		
a) Instrumente in alten Zeiten	49	
b) Erfindungen zur Verbesserung der Instrumente, Uhren	50	
c) Passageninstrument, Meridiankreis, Gnomon und Höheninstrumente	51	
d) Teleskope, Refractoren, Aequatoreale	53	
e) Helioskop. Sonstige Apparate und Instrumente auf Sternwarten	55	
f) Sternwarten	56	

Einleitung.

Das Alter der Astronomie läßt sich mit Bestimmtheit nicht angeben; dasselbe ist sehr groß, da der gestirnte Himmel von Anfang an das Interesse der Menschheit erregte und der scheinbare Lauf der Sonne und der Gestirne sehr bald zu Beobachtungen Anlaß gab. Die stattfindenden Erscheinungen an der Himmelskugel waren genauer kennen zu lernen, war sicher einer der ersten Wünsche, wonach der menschliche Geist strebte, und der Theil der Astronomie, welcher die Orte der Gestirne an der Himmelskugel kennen lehrt und unter dem Namen der sphärischen Astronomie bekannt ist, wol der älteste Theil der Himmelskunde.

Als man außer der allgemeinen täglichen Bewegung der Gestirne am Himmel auch noch andere Bewegungen einzelner Sterne wahrnahm, gelangte man zu der Unterscheidung zwischen Fixsternen und Wandelsternen, und die Begründung der Bahnen und des Laufs der letztern ist die Aufgabe, welche ein anderer Theil der Astronomie, die theoretische, sich stellt.

In neuerer Zeit führte man alle Bewegungen am Himmel zurück auf die Wirkung von Kräften, die durch den ganzen Himmelsraum einem einzigen Gesetze folgen. Aus dem Gravitationsgesetze leitete man die Theorie der Bewegung her und nennt den Theil der Astronomie, dem diese Aufgabe gestellt ist, die physikalische Astronomie.

Zu der Mathematik heißt die Lehre von den Kräften die Mechanik, und da die physikalische Astronomie sich mit den Kräften beschäftigt, welche die Ursache der Bewegung der Himmelskörper sind, wird dieser Theil auch öfter die Mechanik des Himmels genannt.

Eine andere Eintheilung der Astronomie ist die in theoretische und praktische. Wenn man diese Eintheilung wählt, so gehört in die theoretische Astronomie vollständig die physikalische und theoretische und ein großer Theil der sphärischen; jedoch ist derjenige Theil der sphärischen Astronomie, welcher das Beobachten lehrt und die Hilfsmittel zum Beobachten, sowie deren Theorie und Anwendung behandelt, die eigentliche praktische Astronomie.

Für einen kurzen Ueberblick über das ganze Gebiet der Astronomie wird es am vorteilhaftesten sein, einen Theil der sphärischen Astronomie, dann die theoretische Astronomie, die physikalische Astronomie und schließlich die Theorie der astronomischen Instrumente nacheinander zu betrachten. In die sphärische Astronomie nehmen wir die Astrologie und das Wissenstheile von den Fixsternen, in die theoretische die Topographie und Uebersicht des Sonnensystems hinein.

I. Die sphärische Astronomie.

1. Die Eintheilung der Himmelskugel.

Das Himmelsgewölbe erscheint uns als eine hohle Kugel, deren Radius nach unserm Scheitelpunkte in uns kleiner erscheint als nach den Seiten. Eine andere gleiche Halbkugel befindet sich unter uns, und deren größte Kreis, welcher, wenn wir eine freie

Rundsicht haben, unsern Gesichtskreis begrenzt, der also die uns sichtbare Halbkugel von der uns unsichtbaren trennt, wird der Horizont genannt. Der höchste Punkt des Himmels über uns heißt Scheitelpunkt oder Zenith, und da wir alle Kreisbogen am Himmel, wie überhaupt jeden Kreis, in 360 Grade eintheilen, so ist der Zenith von dem Horizont überall um einen Viertelkreis oder 90° entfernt. Eine Ebene, die wir uns durch den größten Kreis des Horizonts gelegt denken, wird, abgesehen von kleinen später zu besprechenden Correctionen, durch unser Auge gehen und heißt die Fundamentalebene des Horizonts. Die Richtung nach dem Zenith steht senkrecht auf dieser Ebene und der Zenithpunkt ist daher der Pol des Horizonts. Verlängern wir die Richtung nach dem Zenith entgegengekehrt, so treffen wir auf einen Punkt, der genau unter uns liegt und Fußpunkt oder Nadir genannt wird; es ist dies der zweite Pol des Horizonts.

Die ganze Himmelskugel dreht sich scheinbar in 24 Stunden um eine Achse, deren Endpunkte die Welt- oder Himmelspole heißen. Der uns sichtbare Pol heißt der Nordpol, der andere, uns unsichtbare, der Südpol. Alle Sterne beschreiben Kreise, deren Mittelpunkte in der vom Nordpol zum Südpol gehenden Weltachse liegen und deren Durchmesser um so größer, je weiter die Sterne von beiden Polen entfernt stehen. Derjenige Kreis, welcher von beiden Polen gleichweit um einen Viertelkreis absteht, ist ein größter Kreis und heißt der Aequator, während die andern von den Sternen zwischen Pol und Aequator beschriebenen Kreise kleinere Kreise sind und Parallelkreise genannt werden.

Verfolgt man den Lauf unsers Tagesgestirns, der Sonne, so findet man sehr bald, daß dieselbe von Tag zu Tag unter den Sternen einen andern Ort einnimmt und erst nach einem langen Zeitraum, einem Jahre, zu demselben Orte am Himmel zurückkehrt. Die scheinbare Bahn der Sonne ist ebenfalls ein größter Kreis und heißt die Elliptik; diejenigen Punkte des Himmels, welche von derselben nach Norden und Süden um 90° abstehen, sind die Pole der Elliptik.

Die Ebenen, welche durch den größten Kreis des Aequators und der Elliptik gelegt werden können, sind mit der Ebene des Horizonts die drei Fundamentalebene der Astronomie, auf welche alle Beobachtungen der Orte im Weltraum bezogen werden, und diejenigen Daten, welche nöthig sind, um die Lage eines Punktes im Raume anzugeben, heißen die Coordinaten dieses Punktes.

Verfolgt man den Lauf der Sonne und der Gestirne überhaupt, so sieht man dieselben an einem bestimmten Punkte des Horizonts sichtbar werden, aufgehen, sich immer mehr und mehr über den Horizont erheben, einen höchsten Punkt, Culminationspunkt, einnehmen, von da an niedersteigen, um an einem andern Punkte des Horizonts zu verschwinden, unterzugehen. Ein aufmerksamer Beobachter wird leicht finden, daß die Culminationspunkte verschiedener Sterne alle in einem größten Kreise liegen, der verlängert das Zenith trifft und auch durch den Weltpol gehen muß. Dieser größte

Kreis schneidet an zwei Punkten den Horizont und heißt der Meridian, und der im Horizont dem Nordpol zunächst liegende Punkt wird der Nordpunkt, der an der entgegengesetzten Seite liegende Südpunkt genannt. Zwei Punkte im Horizont, die genau 90° vom Nordpunkt und Südpunkt entfernt liegen, heißen, derjenige, der dem Aufgange der Sonne am nächsten liegt, der Ostpunkt, der, welcher dem Untergange der Sonne am nächsten liegt, der Westpunkt, und Nord, Ost, Süd, West sind die vier Cardinalpunkte des Horizonts.

Wenn man den Ort eines Sterns in Bezug auf den Horizont bestimmen will, denke man sich vom Zenith aus durch den Stern gehend senkrecht auf den Horizont das Bogenstück eines Viertelkreises gezogen, alsdann heißt das Stück vom Zenith bis zum Stern die Zenithdistanz, der Bogen vom Stern bis zum Horizont die Höhe und unmittelbar folgt, daß:

$$\text{Zenithdistanz} + \text{Höhe} = 90^\circ \text{ sind.}$$

Der Winkel, welcher zwischen diesem Höhenkreise und dem Meridian am Zenith gebildet und der gleich ist dem Bogen am Horizont zwischen dem Südpunkt und dem Durchschnittspunkt des Höhenkreises mit dem Horizont, heißt das Azimuth des Sterns. Man unterscheidet, wenn der Winkel von Süd aus nach West liegt, das westliche Azimuth, wenn er nach Osten liegt, das östliche Azimuth, oder man zählt das Azimuth von Süd durch West, Nord nach Ost und Süd bis 360° . Durch Angabe der Höhe und des Azimuths ist die Richtung, in der ein Stern steht, vollständig gegeben, und Höhe und Azimuth sind die Polarcoordinaten des Sterns in Bezug auf den Horizont.

Um für den Aequator die Coordinaten eines Sterns anzugeben, denke man sich vom Nordpol oder Südpol durch den Stern auf den Aequator einen größten Kreis gezogen; man nennt alsdann die Entfernung vom Pol bis zum Stern die Polidistanz, das Bogenstück vom Stern bis zum Aequator die Declination, und wiederum ist leicht ersichtlich, daß

$$\text{Polidistanz} + \text{Declination} = 90^\circ \text{ sind.}$$

Ist der Stern nördlich vom Aequator, hat der Stern nördliche Declination, ist er südlich vom Aequator, südliche Declination. Die Polidistanz wird aber immer vom Nordpol an bis zu 180° gerechnet.

Der Winkel, welchen der vom Pol durch den Stern auf den Aequator senkrecht gezogene Kreisbogen mit dem größten Kreise des Meridians, und zwar am Pole, macht, oder der Bogen, welcher auch auf dem Aequator zwischen den beiden Durchschnittspunkten beider größten Kreise mit dem Aequator entsteht, heißt der Stundenwinkel. Wieder unterscheidet man, je nachdem der Stern östlich oder westlich vom Meridian steht, den östlichen oder westlichen Stundenwinkel, oder man rechnet den Stundenwinkel von Süd durch West, Nord, Ost nach Süd bis zu 360 Graden oder 24 Stunden, so daß auf jede Stunde 15 Grade gehen.

Die Sonne durchschneidet auf ihrer scheinbaren Bahn im Jahre zweimal den Aequator, und wenn sie in diesen Punkten sich befindet, haben wir den Anfang des astronomischen Frühjahrs oder Herbstes. Infolge dessen heißen diese Punkte Frühlings- und Herbstanfangspunkt, und Aequator und Elliptik haben beide Punkte gemeinsam. Um nun einen Uebergang vom Aequator zur Elliptik zu haben, zählt man auch auf dem Aequator das Bogenstück von dem Frühlingsanfangspunkt bis zu dem Durchschnittspunkt, in welchem der durch den Stern gelegte Stundenkreis den Aequator schneidet, und nennt dies Bogenstück die gerade Aufsteigung oder Rectascension des Sterns. In Bezug auf den Aequator sind daher Declination und Rectascension die

Polarcoordinaten, und wenn beide gegeben, ist die Richtung des Sterns vollständig bekannt.

Nimmt man endlich die Elliptik als Fundamentelebene und zieht vom Pol der Elliptik durch den Stern auf die Elliptik senkrecht das Bogenstück eines größten Kreises, so heißt der Bogen vom Stern bis zur Elliptik die Breite und zwar die nördliche, wenn der Stern nördlich von der Elliptik, die südliche, wenn der Stern südlich von der Elliptik steht. Der Winkel am Pol der Elliptik, welchen der durch den Stern gezogene Kreisbogen mit dem Kreisbogen nach dem Frühlingspunkt bildet, oder der Bogen auf der Elliptik vom Frühlingspunkt bis zum Durchschnittspunkt des vom Pol durch den Stern gezogenen Kreisbogens, ist die Länge des Sterns, und Länge und Breite sind die Polarcoordinaten des Sterns in Bezug auf die Elliptik. Die sphärische Astronomie hat die Aufgabe, die Richtungen oder die ebengenannten Polarcoordinaten in Bezug auf irgendeine der Fundamentelebenen zu bestimmen.

Die besprochenen Fundamentelebenen und ihre begrenzenden größten Kreise nebst den Cardinalpunkten sind Taf. 11, Fig. 1 dargestellt. Der größte Kreis NWSO stellt den Horizont dar, der Punkt S den Südpunkt, O den Ostpunkt, N den Nordpunkt, W den Westpunkt, Z ist der Zenithpunkt über dem Horizont, Z' der Nadirpunkt. Der größte Kreis A Y B A stellt den Aequator dar, welcher den Horizont in Ost und West schneidet und auf welchem Y den Anfangspunkt der Länge für die Rectascension bedeutet. P und P' sind der Nordpol und der Südpol für den Aequator, das Bogenstück SA ist die größte Höhe des Aequators über dem Horizont und ein Stück des Meridians SAZM. Endlich stellt der größte Kreis EPDG die Elliptik dar, welche den Horizont in G und F, den Aequator in E und A schneidet.

Durch ähnliche Kreise, wie den Himmel, hat man sich die Erde, deren Gestalt wir vorläufig als kugelförmig annehmen, eingetellt. Die die Welpole miteinander verbindende Kasse geht durch unsere Erde, deren Durchschnittspunkte an der Oberfläche der Nordpol und der Südpol genannt werden. Der größte Kreis, welcher genau unter dem Himmelsäquator liegt, heißt auf der Erde der Erdaequator, und senkrecht auf dem Aequator gezogene größte Kreise, die durch die Pole gehen, nennt man Meridiane genannt. Das Bogenstück des Meridians von einem Orte auf der Oberfläche der Erde bis zum Aequator heißt die geographische Breite, und der Winkel, den der Meridian mit einem andern Meridian bildet, welchen man als den ersten annimmt, heißt die geographische Länge des Ortes von diesem ersten Meridian an gerechnet. Erwähnt sei gleich, daß die Deutschen als ersten Meridian den von Berlin, die Franzosen den von Paris, die Engländer den von Greenwich nehmen, während die Geographen bei dem Planiglob, um die Erdoberfläche darzustellen, einen Meridian 20° westlich von Paris annehmen, der nahe bei der Insel Ferro geht und als Meridian von Ferro bezeichnet wird. Eine besondere Hauptaufgabe der sphärischen Astronomie ist auch Ermittlung der Länge und Breite der Orte auf der Erde, d. h. die geographische Ortsbestimmung.

2. Die Fixsterne.

- a) Einteilung in Constellationen, Namen derselben und einiger der Hauptsterne.

Kehren wir zu den Himmelserscheinungen zurück und betrachten in einer heitern Nacht den Himmel, so wird man von den uns sichtbaren Sternen sehr bald unterscheiden, die ihren Ort gegeneinander schein-

verbleiben, und solche, die ihren Ort unter den Fixsternen auffallend verändern, erstere werden Fixsterne, diese Wandelsterne genannt. Unter den Wandelsternen unterscheidet man erstens Planeten im engeren Sinne, zu welchen auch unsere Erde gehört und die sich um die Sonne bewegen, zweitens Nebenplaneten oder Monde, welche theils um die Erde, theils um andere Planeten Bahnen beschreiben, drittens Kometen, die sich ebenfalls um die Sonne bewegen, sich aber durch ihre Bahnen und ihr Aussehen wesentlich von den Planeten unterscheiden, und endlich viertens gehören auch die Meteore, Sternschnuppen und Feuerkugeln in dieses Gebiet.

Die Fixsterne sind von sehr verschiedener Helligkeit, und die hellsten unter ihnen, deren Zahl nicht groß ist, werden Sterne 1. Größe genannt, während eine größere Anzahl schwächerer zur 2. Größe gerechnet wird, noch schwächere zur 3. Größe gehören und diejenigen, welche man eben noch mit bloßem Auge sehen kann, zur 6. Größe gezählt werden. Das unbewaffnete Auge kann nach diesem alten Brauche nicht mehr als sechs Größenklassen unterscheiden, je stärker jedoch das Fernrohr, mit dem man den Himmel beobachtet, desto schwächere Sterne sieht man und um so höher ist die Größenklasse.

Gehen wir zunächst zur Gruppierung der Fixsterne untereinander über, so haben wir eine Einteilung des festen Himmels in Gruppen oder Konstellationen schon von den Alten überliefert erhalten. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist festgestellt, daß das Alter der Sternbilder nicht über das 15. Jahrhundert v. Chr. hinausreicht und Chiron, der etwa 1400 v. Chr. lebte, also kurz vor dem Argonautenzuge, soll zuerst Konstellationen eingeführt haben.

Im Buche Job werden der Orion, die Plejaden und die Hyaden erwähnt, doch ist die Uebersetzung der ursprünglichen hebräischen Namen zweifelhaft und nur so viel geht hervor, daß zu jener Zeit schon einzelne Sterngruppen am Himmel benannt waren. Homer nennt in der Iliade und Odyssee den Bären, den Orion, die Hyaden, die Plejaden und den Bootes; Hesiod hat noch den Arktur und den Sirius.

Ein Gürtel von Sterngruppen, welche in der Nähe der scheinbaren Sonnenbahn, der Mondbahn oder der Bahnen der hellern Planeten sich befindet, wird der Zodiacus oder Thierkreis genannt, weil die Konstellationen bis auf einige wenige nach Thieren benannt sind. Derselbe zählt 12 Sternbilder. Nördlich vom Thierkreis führt der größte Astronom des Alterthums, Ptolemäus, noch 21 Sternbilder auf, südlich vom Thierkreis noch 15. Zu diesen 48 Sternbildern sind im Mittelalter und in neuerer Zeit noch 60 hinzugekommen, obgleich wir gegenwärtig im ganzen 108 Sternbilder zählen, von welchen einige aber so unmotiviert gewählt und benannt sind, daß manche Astronomen sie nicht anerkennen. Mehrfach ist sogar vorgeschlagen, die Sternbilder ganz abzuschaffen, doch hat dieser Vorschlag nicht viel Beifall gefunden. Ebenso ist die Einführung anderer Namen für die Sternbilder, christlicher Namen z. B. durch einen gewissen Schiller im 17. Jahrhundert, veralteter Namen durch den früheren Professor Erhard Beigel (gest. 1699) in Zena, längst der Vergessenheit anheimgefallen und der Geschichte gehören auch die von den Arabern angenommenen Namen der Sternbilder, die jedoch nur aus dem Griechischen den arabischen Zügen und Gebräuchen angepaßt waren, an. Die alten überlieferten Konstellationen, deren Namen wie die alten vom Zahn der Zeit fast vernichteten Ruinen zu uns reden, die uns die Mythologie, die Kenntnisse, die Ideen, die Thaten, die Schicksale, die Geschichte, die Götter und Helden, ja selbst die Irrthümer und

den Aberglauben des Alterthums vergegenwärtigen, sind die folgenden im „Almagest“ verzeichneten.

Die 48 Sternbilder des Ptolemäus (in deutscher und lateinischer Bezeichnung):

a) die nördlichen:

- 1) Der kleine Bär, *Ursa minor*.
- 2) Der große Bär, *Ursa major*.
- 3) Der Drache, *Draco*.
- 4) Cepheus, *Cepheus*.
- 5) Der Bootes, *Bootes*.
- 6) Die nördliche Krone, *Corona borealis*.
- 7) Der Hercules, *Hercules*.
- 8) Die Leier, *Lyra*.
- 9) Der Schwan, *Cygnus*.
- 10) Die Cassiopeia, *Cassiopeja*.
- 11) Der Perseus, *Perseus*.
- 12) Der Fuhrmann, *Auriga*.
- 13) Der Schlangenträger, *Ophiuchus*.
- 14) Die Schlange, *Serpens*.
- 15) Der Pfeil, *Sagitta*.
- 16) Der Adler, *Aquila*.
- 17) Der Delfin, *Dolphinus*.
- 18) Das kleine Pferd, *Equuleus*.
- 19) Der Pegasus, *Pegasus*.
- 20) Die Andromeda, *Andromeda*.
- 21) Der Triangel, *Triangulum*.

b) Die Sternbilder des Thierkreises:

- 1) Der Widder, *Aries*.
- 2) Der Stier, *Taurus*.
- 3) Die Zwillinge, *Gemini*.
- 4) Der Krebs, *Cancer*.
- 5) Der Löwe, *Leo*.
- 6) Die Jungfrau, *Virgo*.
- 7) Die Waage, *Libra*.
- 8) Der Skorpion, *Scorpio*.
- 9) Der Schütze, *Sagittarius*.
- 10) Der Steinbock, *Capricornus*.
- 11) Der Wassermann, *Aquarius*.
- 12) Die Fische, *Pisces*.

c) Die südlichen:

- 1) Der Walfisch, *Cetus*.
- 2) Der Orion, *Orion*.
- 3) Der Eridanus, *Eridanus*.
- 4) Der Fale, *Lepus*.
- 5) Der große Hund, *Canis major*.
- 6) Der kleine Hund, *Canis minor*.
- 7) Das Schiff Argo, *Argus*.
- 8) Die Wasserschlange, *Hydra*.
- 9) Der Becher, *Crater*.
- 10) Der Rabe, *Corvus*.
- 11) Der Centaur, *Centaur*.
- 12) Der Wolf, *Lupus*.
- 13) Der Altar, *Ara*.
- 14) Die südliche Krone, *Corona australis*.
- 15) Der südliche Fisch, *Pisces austrinus*.

Ueber die Entstehung dieser Sternnamen sind eine große Anzahl von Muthen vorhanden, und fast die ganze griechische Mythologie würde erzählt werden müssen, wenn man auf den Ursprung der Namen zurückgehen wollte.

Zu diesen 48 Sternbildern sind nach und nach in chronologischer Reihenfolge hinzugekommen die folgenden:

- 1) Das Haupthaar der Berenice, *Coma Berenicens*.
- 2) Der Antinous, *Antinous*.
- 3) Der Phönix, *Phoenix*.
- 4) Der Taucan, *Tucan*.
- 5) Die kleine Wasserschlange, *Hydrus*.
- 6) Die Taube, *Columba*.
- 7) Der Schwertfisch, *Dorado*.

- 8) Der fliegende Fisch, Piscis volans.
- 9) Das Kreuz, Crux.
- 10) Das Chamäleon, Chamaeleon.
- 11) Die Biene, Apis.
- 12) Der südliche Triangel, Triangulum australe.
- 13) Der Paradiesvogel, Avis Indica.
- 14) Der Pfau, Pavo.
- 15) Der Indianer, Indus.
- 16) Der Kranich oder Flamingo, Grus.
- 17) Das Kamelopard, Camelopardalus.
- 18) Die Fliege, Musca.
- 19) Das Einhorn, Monoceros.
- 20) Die Karleiche, Robur Caroli II.
- 21) Das Herz Karl's II., Cor Caroli II.
- 22) Die Jagdhunde, Canes Venatici.
- 23) Der Berg Mänalus, Mons Maenalus.
- 24) Der Cerberus, Cerberus.
- 25) Der Fuchs, Vulpecula.
- 26) Die Eidechse, Lacerta.
- 27) Das Sobiesky'sche Schild, Scutum Sobiesci.
- 28) Der Luchs, Lynx.
- 29) Der kleine Löwe, Leo minor.
- 30) Der kleine Triangel, Triangulum minus.
- 31) Der Sextant, Sextans.
- 32) Die Bildhauerkunst, Apparatus sculptoris.
- 33) Der chemische Ofen, Apparatus chemicus.
- 34) Die Pendeluhr, Horologium Pendulum.
- 35) Das Rhomboidische Netz, Reticulum rhomboidalis.
- 36) Der Grabstichel, Caela sculptoris.
- 37) Die Malerkassette, Pluteum Pictoris.
- 38) Der Schiffskompaß, Pyxis nautica.
- 39) Die Luftpumpe, Antlia.
- 40) Der Octant, Octans.
- 41) Der Cirkel, Circinus.
- 42) Das Winkelmaß und Lineal, Norma et Regula.
- 43) Das Fernrohr, Tubus astronomicus.
- 44) Das Mikroskop, Microscopium.
- 45) Der Tafelberg, Mons mensae.
- 46) Das Renthier, Rangifer.
- 47) Das Brandenburgische Scepter, Sceptrum Brandenburgicum.
- 48) Der Poniatowski'sche Stier, Taurus Poniatovii.
- 49) Die Friedrichsruhe, Honores Friderici.
- 50) Der Erntehüter, Custos messium.
- 51) Der Einsiedler, Turdus solitarius.
- 52) Der Mauerquadrant, Quadrans muralis.
- 53) Die Georgsbarre, Harpa Georgii.
- 54) Herschel's Teleskop, Telescopium Herschelii.
- 55) Der Luftballon, Globus aerostaticus.
- 56) Die Buchdruckerwerkstatt, Officina typographica.
- 57) Die Elektrismaschine, Machina electrica.
- 58) Die Rake, Felis.
- 59) Die große Wolle, Nubecula major.
- 60) Die kleine Wolle, Nubecula minor.

Die ersten 2 Sternbilder stammen noch aus dem Alterthum her, die nächsten 14 sollen berühmte Seefahrer, z. B. Amerigo Vesputi, Andreas Corsalis und Petro de Medina eingeführt haben. Jakob Barisch (der Schwiegerohn von Kepler) hat 7 neue Sternbilder, Halley die Sternbilder Nr. 20 und 21, Hevel Nr. 22—31, Lacaille Nr. 32—45, Lemmonier Nr. 46 und 51, Kirch Nr. 47, Poczobut Nr. 48, Bode Nr. 49, 56 und 57, Lalande Nr. 50, 52 und 58 eingeführt. Mehrere dieser Sternbilder sind jedoch in unsern Karten (Taf. 1 und 2) nicht aufgenommen, überhaupt sind der Deutlichkeit wegen daselbst nur die Grenzen der Sternbilder angegeben und die Bilder, welche man daselbst hat, sind fortgelassen.

Auch einzelnen Sternen, besonders den hellsten, hat

man Namen gegeben, welche theils aus dem Griechischen und Lateinischen, zumeist aber aus dem Arabischen genommen sind. Nur wenige von diesen Namen werden noch gebraucht, vielmehr haben für die hauptsächlichsten Fixsterne die Astronomen allgemein die Sternbezeichnungen angenommen, welche der ausburger Rechenwalt und Astronom Johann Bayer in seiner zu Jahr 1603 zu Wien erschienenen „Uranometria“ angibt. Die Sterne in jedem Sternbilde bezeichnete er fast durchgängig der Helligkeit folgend mit den griechischen Buchstaben $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon$ u. s. w., wozu, wenn das griechische Alphabet erschöpft war, noch einige lateinische Buchstaben gekommen sind. Einzelne Sterne sind auch mit Zahlen bezeichnet, die sie durch die Reihenfolge in den Beobachtungskatalogen erhielten. So nannte man z. B. den hellsten Stern im Fuhrmann α , den nächsten hellen β , im Löwen den hellsten α , den nächsten β u. s. w.

Die bis jetzt noch öfter gebrauchten Namen für die hellern Sterne meistens 1. Größe sind die folgenden:

α Eridani = Achernar	α Canis minoris = Procyon
β Persei = Algol	β Geminorum = Pollux
α Tauri = Aldebaran	α Leonis = Regulus
α Aurigae = Capella	α Virginis = Spica
β Orionis = Rigel	α Bootis = Arcturus
γ „ = Bellatrix	α Coronae = Gemma
α „ = Deneb	α Scorpii = Antares
α Argus = Canopus	α Lyrae = Vega
α Canis majoris = Sirius	α Aquilae = Altair
α Geminorum = Castor	α Cygni = Deneb
	α Piscis austrini = Fomalhaut.

b) Eintheilung in Größenklassen, Zahl der Fixsterne in jeder Größenklasse, Sternkataloge, Sternarten.

Die schon erwähnte Eintheilung der Sterne in Größenklassen muß man sich nicht so denken, daß alle Sterne 1. Größe gleich hell, dann die Sterne 2. Größe einander wieder gleich hell, aber schwächer als die Sterne 1. Größe sind u. s. w. Die Sterne 1. Größe untereinander sind an Helligkeit sehr verschieden, der Uebergang zu den Sternen 2. Größe ist ein allmählicher, ebenso der Uebergang zu der 3. Größe. Wenn man daher verschiedene Astronomen über die Anzahl der Sterne 1., 2., 3. u. s. w. Größe fragt, wird man nicht genau dieselben Zahlen erhalten, sondern der eine zählt diesen, der andere jenen Sterne einer Größenklasse, welche ein anderer zu einer kleiner oder schwächeren rechnet; jedoch hat man sich ziemlich geeinigt und auch durch besondere Instrumente, die Photometer, die Helligkeitsverhältnisse der Sterne 1. u. 2., 2. zur 3. Größe u. s. w. bestimmt. Im Durchschnitt nimmt man an, daß ein Stern 1. Größe $2\frac{1}{2}$ mal so viel Licht als ein Stern 2., dieser wieder $2\frac{1}{2}$ mal so viel Licht als ein Stern 3. Größe u. s. w. hat, so daß ein Stern 6. Größe circa 100 mal so viel Helligkeit geringer ist, als ein Stern 1. Größe. Wird diese Zahl gleich sehr verändert, wenn man das Verhältniß der Lichtmengen einer Größenklasse zur nächsten nur ein wenig ändert, nimmt man hier das Verhältniß z. B. statt $2\frac{1}{2}$ nur $2\frac{1}{10}$ an, so erhält man einen Stern 6. Größe 172 mal schwächer als einen Stern 1. Größe, welche Zahl mehr mit der von Steinheden gefundenen 182 übereinstimmt.

Gleich sei hier erwähnt, obwohl wir bei der Beschreibung der Sonne wieder darauf zurückkommen, daß nach den neuesten Messungen der uns nächsten Fixsterne, die Sonne, etwa 56000 Mill. mal mehr Licht hat als ein Stern 1. Größe von der Helligkeit der Capella.

Die Zahl der Sterne 1. Größe wird zwischen 17 und 24 angegeben, Argelander zählt 20, welche wir hier nennen wollen:

α Eridani, Achernar	η Argus
α Tauri, Aldebaran	α Crucis
α Aurigae, Capella	α Virginis, Spica
β Orionis, Rigel	β Centauri
α Orionis, Betelgeuze	α Bootis, Arcturus
α Argus, Canopus	α Centauri
α Can. maj., Sirius	α Scorpii, Antares
α Can. min., Procyon	α Lyrae, Vega
β Geminorum, Pollux	α Aquilae, Altair
α Leonis, Regulus	α Piscis austrini, Fomalhaut.

Sterne 2. Größe zählt man 65, 3. Größe 190, 4. Größe 425, 5. Größe nahe 1100, 6. Größe circa 3200. Da man nun mit bloßem Auge die Sterne 6. Größe noch eben sieht, ist die Zahl der dem unbewaffneten Auge sichtbaren Sterne am ganzen Himmel nur etwa 5000.

Ungemein vermehrt sich diese Zahl, wenn man das Auge bewaffnet, d. h. wenn man Fernrohre zu Hülfe nimmt. Es genügt schon ein gewöhnliches Theaterperspectiv, um Sterne 7. Größe zu sehen, deren Anzahl etwa 13000 ist; ein etwas stärkeres Fernrohr, etwa ein kleines Reiskefernrohr, zeigt schon Sterne der 3. Größenklasse, deren Zahl auf 40000 geschätzt wird, und von jeder nächstfolgenden Größenklasse gibt es circa dreimal so viel Sterne. Von der 9. Größenklasse wird nach den gemachten Beobachtungen die Zahl auf nahe 140000 angegeben, so daß die Summe aller Sterne bis zur 9. Größe sich über 200000 beläuft.

Wenn man mit einem Fernrohr Sterne 10. Größe, deren Anzahl über 400000 ist, 11. Größe, von denen schon 1 $\frac{1}{2}$ Mill., 12. Größe, deren es an 4 Mill. gibt, sehen kann, so sind bald die Sterne für das bewaffnete Auge unzählbar, und wie viel Millionen Sterne man überhaupt mit unsern besten Instrumenten sehen kann, läßt sich kaum angeben.

Um jedoch eine genauere Zahl dafür angeben zu können, wollen wir, wie es jetzt allgemein gebräuchlich ist, annehmen, daß die Lichtmengen der einzelnen Sterngrößen zueinander in einem geometrischen Verhältnis stehen, d. h. daß jede höhere Größenklasse etwa $2\frac{1}{2}$ mal weniger Licht hat als die vorhergehende, und wenn man die Absorption des Lichts in den Gläsern berücksichtigt und dafür, weil bei größern Fernrohren die Gläser räder sind, für jedes größere Fernrohr in dem folgenden Verzeichniß 10 Procent mehr rechnet als für das vorhergehende, findet sich nach der Erfahrung, daß man mit einem Fernrohr von

10 Wm. Oeffnung u. mindestens 16 Zoll Fernröhrlänge	Stärke der Vergrößerung	Stärke der Vergrößerung	Stärke der Vergrößerung
17	4	8	8
27	7	9	9
45	11	10	10
76	19	11	11
130	32	12	12
220	55	13	13
370	90	14	14
630	160	15	15

sehen kann; für ein Fernrohr von den letztgenannten Dimensionen würde die Zahl der sichtbaren Sterne auf etwa 150 Mill. Sterne steigen.

Unsere größten Fernrohre haben kaum die zuletzt angegebenen Verhältnisse. Die Refractoren in Berlin, Dorpat, Upsala, Hamburg, Rom, haben nahe 250 Wm. Oeffnung, die in Kopenhagen, München, Greenwiche, fast 300 Wm., die in Pulkowa und Cambridge (America) 400 Wm. und einige neuere Instrumente dieser Gattung in Amerika und England 500—600 Wm. Oeffnung.

Die großen Reflectoren mit Spiegeln von 1 Meter und mehr Durchmesser zeigen wenig mehr Sterne, so-

daß mit unsern bis jetzt hergestellten optischen Hülfsmitteln wol die Zahl der Sterne noch unter 100 Mill. bleibt.

Das Verhältniß der Lichtmengen der Sterne zueinander haben wir, wie es jetzt gebräuchlich ist, in einer geometrischen Progression angegeben. Es ist dies jedoch nicht immer gewesen und man hat dafür auch arithmetische Verhältnisse angenommen. Erwähnt sei nur, daß J. B. W. und J. Herschel von Sternen 20. und noch höherer Klasse sprechen, die wir jetzt kaum 14. Größe nennen. Diese Differenz in der Größenklasse ist jetzt mehr gehoben, seitdem wir eine genauere Definition der Größenklassen haben und photometrische Messungen angestellt werden.

Wie verschieden aber selbst die Sterne 1. Größe in ihrer Lichtmenge sind, ist auch schon gesagt; einzelne dieser Sterne sind beträchtlich heller als andere, und in neuerer Zeit hat man theils den Stern Procyon im kleinen Hund, theils Vega in der Leier oder Capella im Fuhrmann, als Sterne von der mittlern Helligkeit 1. Größe angenommen. Die Sterne Regulus im Löwen, Aldebaran im Stier haben kaum die Hälfte des Lichts wie Vega, während Sirius nach verschiedenen photometrischen Bestimmungen mindestens doppelt so viel, nach einigen viermal so viel Licht hat als Vega oder Capella.

Verzeichnisse in welchen die Sterne nach ihren Polar-coordinaten, Länge und Breite oder gerade Aufsteigung und Abweichung aufgezeichnet sind, heißen Sternkataloge, deren wir jetzt eine große Menge besitzen. Von den historisch merkwürdigen mögen hier nur erwähnt werden der Katalog von Hipparch, den Ptolemaeus in „Almagest“ gibt, mit 1026 Sternen; ein anderer Katalog von dem Astronom Alugh Beg, Tamerlan's Enkel, mit 1019 Sternen, zu dem ein Commentar mit 300 Sternen hinzugekommen ist; ein anderer Katalog von Tycho Brahe, in dem sich 770 von ihm beobachtete Sternpositionen befinden. Unter den spätern Katalogen von Hevel, Halley, Lacaille, Tobias Mayer, Flamsteed und Bradley hat der letztere mit 3222 Sternpositionen, die Vessel genau reducirte und herausgab in einem Werke „Fundamenta astronomiae“ die größte Bedeutung. Piazzis Katalog für 1800 enthält 7646 Sterne, Landau's Katalog „Histoire céleste française“ nach der englischen Ausgabe 47319 Sternpositionen; Vessel's Zonen erstreckten sich auf 75011 Sternbeobachtungen, die innerhalb des Gürtels am Himmel von 15° südlicher Declination bis 45° nördlicher Declination liegen, woran sich Argelander's Zonen von 45° bis 80° nördlicher Declination mit 26425 Sternen und die südlichen Zonen von 15° bis 31° südlicher Declination mit 23250 Sternen anschließen. Die größte Anzahl von genäberten Sternpositionen enthält die Argelander'sche „Durchmusterung“, die sich von 2° südlicher Declination bis zum Nordpol erstreckt und in welcher 324198 Sterne von der 1. bis zur 9.—10. Größe vorkommen.

Unter den Sternarten sind die berühmtesten: die im Jahr 1603 herausgegebene „Uranometria“ von Bayer, der 1729 ebirte Atlas von Flamsteed (welcher in mehreren Auflagen erschienen ist), dann die „Uranographie“ von Bode (große und kleine Ausgabe), der Atlas von Harding (Sterne bis zur 9. Größe enthaltend, bei dessen Anfertigung zu Anfang dieses Jahrhunderts einer der ersten kleinen Planeten, die Juno, gefunden wurde), ferner für Sterne bis zur 6. Größe die vortreffliche „Uranometria nova“ von Argelander.

Unter den Sternarten für teleskopische Sterne sind vor allem die 24 von der Berliner Akademie heraus-

gegebenen Blätter, welche von -15° bis $+15^\circ$ reichen und unter dem Namen der „Akademischen Sternkarten“ bekannt sind, zu erwähnen; die umfangreichsten von allen Sternkarten sind aber die Argelander'schen „Atlas des nördlichen gestirnten Himmels“ auf 40 großen Blättern, die die Verter von den oben erwähnten 324198 Sternen enthalten.

Unsere Tafeln 1, 2, 3 enthalten den Sternhimmel und zwar Taf. 1, Fig. 1 den nördlichen Himmel vom Pol bis zum Aequator mit allen Sternen bis zur 5. Größe, die durch verschiedene Zeichen voneinander unterschieden und leicht kenntlich sind; die Taf. 2, Fig. 1 den südlichen Himmel in gleicher Weise, und da dadurch die Sternbilder des Aequators und des Thierkreises getrennt sind, enthält Taf. 3 einen Aequatorgürtel von -30° bis $+30^\circ$, alle drei Karten gültig für das Jahr 1875.

Die Sternbilder sind als Bilder nicht angegeben, sondern nur die Grenzen durch punktirte Linien. In jedem Sternbild steht der lateinische Name, die Hauptsterne tragen die griechischen Buchstaben. Die Milchstraße und die dem bloßen Auge sichtbaren Sternhaufen und Nebel sind durch punktirte Gruppen gegeben.

Außerdem enthalten die Karten die Parallelkreise von 15 zu 15 Grad, die Stundenkreise von Stunde zu Stunde und die Ekliptik. Die am Rande stehenden Monatsnamen auf Taf. 1 und 2 bezeichnen die Zeit, zu der die Sonne in dem darüberstehenden Sternbild des Thierkreises steht. Dieses Sternbild culminirt daher um Mittag und das gerade gegenüberstehende ober das um 6 Thierkreissternbilder davon entfernte um Mitternacht.

Um die Sternbilder kennen zu lernen wendet man ein einfaches Verfahren an. Man geht von irgend einem schon bekannten oder leicht aufzufindenden Sternbilde aus, verbindet, wie es auch auf den Karten geschehen ist, die hellern Sterne durch gerade Linien, verlängert selbige um eine bestimmte Größe und trifft dann andere Sternbilder und Sterne. Geht man z. B. vom großen Bären aus, zieht durch α und β eine Linie, verlängert diese über α hinaus etwa um das fünffache, so trifft man den Polarstern, welcher zum kleinen Bären gehört und nahe dem Nordpol ist. Auf der entgegengesetzten Seite vom Nordpol, ebenso weit etwa von ihm entfernt als der große Bär, steht ein Sternbild, dessen Hauptsterne ein großes W bilden — es ist dies die Cassiopeja. Denkt man sich eine den großen Bären und die Cassiopeja verbindende Linie, die auch durch den Nordpol geht, und läßt eine senkrechte Linie im Nordpol diese Linie schneiden, so trifft man in etwas größerer Entfernung, als der Bär vom Pol steht, auf beiden Seiten zwei helle Sterne 1. Größe, die Wega in der Leier und die Capella im Fuhrmann. Die Fortsetzung solcher Linien führt zur Kenntniß aller Sternbilder; diese Kenntniß heißt die Astrognosie und das Verfahren die Methode der Alignedis.

c) Die Veränderungen des Sternhimmels durch die Präcession, Nutation und Aberration.

Unsere Sternkarten gelten für das Jahr 1875, aber der Nullpunkt der Theilung, der Durchschnittspunkt zwischen Aequator und Ekliptik, ändert sich vermöge der Anziehungskraft des Mondes und der Sonne auf unsere abgeplattete Erde (s. physische Astronomie) unauflöslich in der Weise, daß dieser Nullpunkt jedes Jahr um $50''.2$ zurückweicht. Dieses Zurückweichen des Nullpunktes heißt die Präcession und bringt hervor, daß der Pol des Aequators sich in einem Zeitraum von 26000 Jahren um den Pol der Ekliptik dreht, wie aus Taf. 11, Fig. 3 sichtbar ist, wo A B

den Aequator für eine bestimmte Epoche, A' B' denselben für eine um 13000 Jahre entfernte Epoche bezeichnet. Abgesehen von einer kleinen Schwanung der Erdschne, welche man Nutation heißt und welche durch die wellenförmige Linie pp' in Fig. 3, Taf. 11, sichtbar gemacht ist, ändert sich durch die Präcession die Länge jedes Sterns um die schon oben genannte Größe von $50''.2$, während die Breite der Sterne fast un verändert bleibt. Diese Aenderung der Länge überträgt sich auf Aenderungen in der Rectascension und Declination, welche die Präcession in Rectascension und Declination genannt werden.

Vermöge der Präcession ändert sich nun der Pol des Aequators am Himmel und der Stern 2. Größe ϵ Ursae minoris, welcher gegenwärtig dem Pol am nächsten steht und deshalb der Polarstern genannt wird, führte diesen Namen vor Christi Geburt noch nicht, der schon genannte Astronom Hipparch konnte die Bezeichnung Polarstern für diesen Stern nicht gebrauchen. Gegenwärtig steht der Polarstern vom Pol nur $1^\circ 22'$ entfernt, ihm nähert sich der Pol noch 300 Jahre immer mehr und mehr, und dann wird die Entfernung nur $21'$ sein. Nach 2300 Jahren wird ein anderer Stern, γ Cephei, Anspruch auf den Namen Polarstern machen können, obwohl derselbe $1^\circ 51'$ vom Pol entfernt bleibt. Noch später werden β und α Cephei sowie δ Cygni dem Pole am nächsten stehen, und nach etwa 12000 Jahren wird der Stern 1. Größe Wega im Sternbild der Leier den schönsten Polarstern darstellen; dann folgen ϵ Herculis, τ Herculis, ϵ Draconis, α Draconis, χ Draconis, bis nach 25000 Jahren der jetztige Polarstern wieder das Recht in Anspruch nimmt.

Der Nullpunkt der Theilung, 0° im Zeichen des Widder, fiel im Jahre 300 vor Christi Geburt mit dem Anfange des Sternbildes des Widder, im Jahre 1400 vor Christo mit der Mitte dieses Sternbildes zusammen, jetzt liegt er nahe im Anfange des Sternbildes der Fische und nach 10000 Jahren wird dieser Punkt in das Sternbild der Waage fallen.

Für einen bestimmten Punkt auf der Erde ändern sich infolge dessen die über dem Horizonte sichtbaren Sternbilder, und nach Tausenden von Jahren werden für unsere Breiten die Sternbilder Raab, Bock, Wasserschlange, großer Hund (mit dem glänzendsten Fixstern Sirius), Einhorn, Orion, kleiner Hund, Widder, Walfisch und süßlicher Fisch verschwinden. Dagegen kommen nach und nach zum Vorschein: die Sternbilder Centaur, südliches Kreuz, ein Hahn der Karlsche, Wolf, südlicher Triangel, Altar, südliche Krone, Pfau, Indianer, Paradiesvogel, Zoolon, Kranich, Phönix und der jetzt unsichtbare Theil des Eridanus.

Außer durch die Nutation, deren Periode nahe 18 Jahre ist und die die Sternörter nur etwa 10 Bogensekunden (im größten Kreise) ändert (s. physische Astronomie), erfahren die Sternörter dadurch noch eine kleine Aenderung, daß die Bewegung des Lichts nicht unendlich groß, nicht momentan ist. Da nun auch die Erde im Weltraum sich fortbewegt, so trifft ein Lichtstrahl der jetzt von einem Himmelskörper, z. B. von der Sonne nach der Erde gerichtet ist, nicht die Erde mehr, sondern er geht neben derselben vorbei, weil selbige sich fortbewegt hat, und wenn der Lichtstrahl die Erde treffen soll, darf er nicht in der Linie, in der momentan die Erde steht, gerichtet sein, sondern nach einem Orte, den die Erde vermöge ihrer Bewegung in der Zeit erreicht, welche das Licht zu seiner Bewegung nach der Erde gebraucht. Die Abweichung zwischen den beiden Richtungen, heißt die Aberration

des Lichtes. Sie beträgt, da das Licht in der Sekunde 42000 Meilen und in gleicher Zeit die Erde 1.1 Meilen durchläuft, im Maximum, wenn beide Bewegungen senkrecht aufeinander gerichtet sind, 20.4 Billionenfunden.

Der Ort, an welchem man ein Gestirn in Wirklichkeit sieht, sollte der scheinbare genannt werden, gewöhnlich aber versteht man unter scheinbarem Ort denjenigen, welcher sich ergibt, wenn man von der Strahlenbrechung in der Atmosphäre abstrahirt und sich in den Mittelpunkt der Erde versteht denkt. — In dem scheinbaren Orte sind die Werthe der Nutation und Aberration mit enthalten. Der Ort eines Sterns, welcher von der Aberration und Nutation und dem Theile der Präcession, welcher von einer bestimmten Epoche an sich anhäuft, befreit ist, heißt der mittlere

Ort des Sterns für die Epoche und um einen Uebersicht zu geben, wie die Sterncataloge eingerichtet sind, wollen wir die Positionen aller Sterne bis zur 4. Größe zusammenstellen, und zwar gültig für den Anfang des Jahres 1875. Um die Sterne auf eine andere Epoche leicht reduciren zu können, sind die Werthe der Präcession aufgeführt. In der folgenden Tabelle enthält die erste Columne die Bezeichnung des Sternes und des Sternbildes, in welchem er steht, die zweite die Größe, die dritte die gerade Aufsteigung (Ascensio recta, AR.), die vierte die Präcession in gerader Aufsteigung, die fünfte die Abweichung (Declination, δ), und zwar bedeutet + nördlich vom Aequator, — südlich vom Aequator, und endlich die sechste Columne die Präcession in der Abweichung. In der Präcession ist, wo es möglich war, die jährliche Eigenbewegung gleich hinzugefügt.

Katalog aller Fixsterne bis zur 4. Größe, gültig für das Jahr 1875.

Name.	Größe.	Größe Aufsteigung.	Nördliche Abweichung.	Nördliche Abweichung.
Andromedae	2	h m s	°	
Cassiopeiae	2.3	0 1 55 + 3° 09	+ 98 24' 0	+ 0' 33
Phoenicis	4	2 31 + 3 16	+ 58 27.6	+ 0' 33
Pegasi	3.2	3 4 + 3 06	+ 46 26.1	+ 0' 33
Andromedae	3.5	6 48 + 3 08	+ 14 29.3	+ 0' 34
Ceti	4.4	11 47 + 3 12	+ 35 5.5	+ 0' 33
Hydri	3.4	13 4 + 3 06	+ 9 31.0	+ 0' 33
Phoenicis	3	18 9 + 3 36	+ 77 57.5	+ 0' 33
Toucanae	2	20 6 + 2 97	+ 49 58.9	+ 0' 33
Cassiopeiae	4.5	25 48 + 2 78	+ 63 38.8	+ 0' 33
Andromedae	4	25 54 + 3 36	+ 62 14.5	+ 0' 33
Andromedae	4	30 1 + 3 31	+ 53 12.5	+ 0' 33
Andromedae	4	30 12 + 3 18	+ 33 1.9	+ 0' 33
Andromedae	4	31 57 + 3 16	+ 28 37.9	+ 0' 33
Cassiopeiae	3	32 39 + 3 19	+ 30 10.6	+ 0' 33
Cassiopeiae	2.3	33 25 + 3 36	+ 55 51.1	+ 0' 33
Ceti	2	37 19 + 3 01	+ 18 41.0	+ 0' 33
Andromedae	4	40 43 + 3 17	+ 23 35.2	+ 0' 33
Cassiopeiae	4.3	41 33 + 3 58	+ 57 9.1	+ 0' 32
Andromedae	4.5	42 12 + 3 10	+ 6 54.3	+ 0' 33
Andromedae	4	42 55 + 3 27	+ 40 23.9	+ 0' 33
Cassiopeiae	2	49 11 + 3 57	+ 60 23.3	+ 0' 33
Andromedae	4	49 49 + 3 30	+ 37 49.2	+ 0' 33
13 H. Cephei	4.5	52 1 + 3 16	+ 85 35.1	+ 0' 33
Pisium	4	56 27 + 3 11	+ 7 13.0	+ 0' 32
Phoenicis	3	1 31 + 3 20	+ 47 32.5	+ 0' 32
Ceti	3	2 18 + 3 00	+ 10 56.6	+ 0' 32
Andromedae	2.3	2 44 + 3 34	+ 34 57.4	+ 0' 32
Cassiopeiae	4.5	3 29 + 3 58	+ 54 29.1	+ 0' 32
Pisium	4	4 47 + 3 29	+ 29 25.5	+ 0' 32
Ursae minoris	4	12 36 + 3 28	+ 26 36.4	+ 0' 32
Cassiopeiae	2	12 59 + 20.24	+ 88 38.6	+ 0' 32
Ceti	3	17 39 + 3 46	+ 58 35.1	+ 0' 31
Phoenicis	3	17 47 + 3 00	+ 8 49.7	+ 0' 31
Pisium	4.3	22 57 + 2 62	+ 43 57.4	+ 0' 31
Phoenicis	4	24 48 + 3 20	+ 14 42.0	+ 0' 31
Andromedae	4.5	26 3 + 2 49	+ 49 43.5	+ 0' 31
Andromedae	4.3	29 28 + 3 50	+ 40 46.3	+ 0' 31
Eridani	1	30 20 + 3 64	+ 47 59.6	+ 0' 31
Persei	1	33 3 + 2 23	+ 57 52.3	+ 0' 31
Ceti	4	35 50 + 3 72	+ 50 3.5	+ 0' 31
Pisium	4	38 19 + 2 90	+ 16 36.1	+ 0' 30
Ceti	3	38 48 + 3 16	+ 8 31.7	+ 0' 30
Cassiopeiae	3	45 26 + 2 96	+ 10 57.2	+ 0' 30
Trianguli	4.3	45 26 + 2 96	+ 10 57.2	+ 0' 30
Arietis	4.3	45 58 + 3 40	+ 28 58.1	+ 0' 30
Pisium	4	46 40 + 3 28	+ 18 40.8	+ 0' 30
Arietis	3.2	47 5 + 3 10	+ 2 34.2	+ 0' 30
Eridani	4	47 44 + 3 30	+ 20 11.8	+ 0' 30
Eridani	4	51 3 + 2 27	+ 52 14.0	+ 0' 30
Cassiopeiae	4	52 48 + 4 57	+ 71 48.9	+ 0' 29
Ceti	4	54 7 + 2 28	+ 21 41.0	+ 0' 29
Hydri	3	54 49 + 1 55	+ 62 10.7	+ 0' 29
Pisium	3.4	55 35 + 3 09	+ 2 9.5	+ 0' 29
Andromedae	2.3	56 14 + 3 65	+ 41 43.7	+ 0' 29
Arietis	2	0 8 + 3 37	+ 22 52.2	+ 0' 29
Trianguli	3	2 6 + 3 55	+ 30 23.7	+ 0' 29
Eridani	4.5	9 53 + 3 55	+ 33 16.1	+ 0' 28
Eridani	4	12 3 + 2 14	+ 52 5.4	+ 0' 28
Ceti	var.	13 2 + 3 03	+ 3 32.8	+ 0' 28
Cassiopeiae	4	18 47 + 4 84	+ 66 50.3	+ 0' 27
Hydri	4	19 32 + 1 05	+ 69 13.8	+ 0' 27
Ceti	4	21 31 + 3 18	+ 7 53.9	+ 0' 27
Ceti	3	23 4 + 3 07	+ 12 12.7	+ 0' 26
Persei	4	35 40 + 4 06	+ 48 41.9	+ 0' 26
Eridani	4	35 44 + 2 36	+ 40 23.4	+ 0' 26
Ceti	3.4	36 49 + 3 10	+ 2 42.5	+ 0' 26
Andromedae	4	38 11 + 3 23	+ 9 35.1	+ 0' 26

Name.	Größe.	Größe Aufsteigung.	Nördliche Abweichung.	Nördliche Abweichung.
Andromedae	4.5	h m s	°	
Persei	4.3	2 39 16 + 2° 17	+ 19 6' 9	+ 0' 26
41 Arietis	4	41 35 + 4 33	+ 55 22.5	+ 0' 25
Persei	4	42 38 + 3 51	+ 26 44.6	+ 0' 25
Persei	4	45 24 + 4 21	+ 52 14.9	+ 0' 25
Eridani	3	50 19 + 2 33	+ 9 23.8	+ 0' 24
Arietis	4.5	52 4 + 2 43	+ 20 50.4	+ 0' 24
Eridani	3	53 31 + 2 28	+ 40 48.4	+ 0' 24
Ceti	2.3	55 45 + 3 13	+ 3 35.9	+ 0' 24
Persei	3	55 45 + 4 30	+ 53 0.9	+ 0' 24
Eridani	4.3	56 53 + 2 65	+ 24 6.9	+ 0' 24
Persei	4.3	57 10 + 3 62	+ 38 21.3	+ 0' 24
Persei	var.	0 3 + 2 36	+ 40 28.4	+ 0' 24
Arietis	4.5	0 3 + 4 29	+ 49 8.0	+ 0' 24
12 Eridani	3	4 29 + 3 42	+ 19 15.1	+ 0' 23
Arietis	3	6 45 + 2 52	+ 29 29.1	+ 0' 23
Eridani	4.5	7 43 + 3 44	+ 20 35.9	+ 0' 23
Eridani	4	9 46 + 2 91	+ 9 17.1	+ 0' 23
Eridani	3	13 57 + 2 66	+ 22 12.8	+ 0' 22
Eridani	4.5	14 48 + 2 12	+ 43 33.3	+ 0' 22
Persei	2	15 24 + 4 25	+ 49 24.8	+ 0' 22
Tauri	4.3	18 5 + 3 22	+ 8 35.2	+ 0' 22
Eridani	4.3	20 94 + 3 24	+ 9 17.7	+ 0' 21
Eridani	4	23 58 + 3 30	+ 12 30.4	+ 0' 21
Eridani	3	27 2 + 2 62	+ 9 53.0	+ 0' 21
Tauri	4.5	28 16 + 2 64	+ 22 9.2	+ 0' 21
10 Tauri	4.5	30 30 + 3 07	+ 0 4.0	+ 0' 20
Persei	3	34 2 + 4 24	+ 47 23.1	+ 0' 20
Persei	4	36 29 + 3 74	+ 31 53.4	+ 0' 20
5 H. Camelopardi	4.5	36 42 + 4 05	+ 42 10.9	+ 0' 20
Eridani	3	37 12 + 6 21	+ 70 56.6	+ 0' 19
Eridani	3	37 16 + 2 88	+ 10 11.5	+ 0' 19
17 Tauri	3	37 27 + 3 55	+ 23 43.1	+ 0' 19
Eridani	3	40 3 + 3 35	+ 23 43.0	+ 0' 19
Eridani	4	41 44 + 3 55	+ 23 40.2	+ 0' 19
Eridani	4	42 37 + 0 68	+ 65 12.0	+ 0' 19
Persei	3	46 17 + 3 76	+ 31 30.6	+ 0' 18
Eridani	4	48 24 + 2 53	+ 24 59.2	+ 0' 18
Hydri	3	49 12 + 4 09	+ 74 37.4	+ 0' 18
Persei	3.4	49 28 + 4 00	+ 39 38.8	+ 0' 18
Eridani	4	50 51 + 3 37	+ 35 25.8	+ 0' 18
Eridani	3	52 12 + 2 80	+ 13 51.9	+ 0' 18
Tauri	4	53 45 + 3 32	+ 12 8.1	+ 0' 17
Eridani	4	54 46 + 2 55	+ 24 29.2	+ 0' 17
Tauri	4	56 30 + 3 15	+ 51 45.2	+ 0' 17
Persei	4	59 35 + 4 33	+ 47 22.6	+ 0' 17
Eridani	4	5 43 + 4 33	+ 48 5.4	+ 0' 16
Eridani	4.5	5 46 + 2 93	+ 7 9.9	+ 0' 16
Eridani	4.5	8 45 + 3 25	+ 8 34.8	+ 0' 16
Eridani	4	12 41 + 3 41	+ 15 19.4	+ 0' 15
Doradus	4	12 45 + 3 41	+ 51 45.2	+ 0' 15
Eridani	3	12 49 + 0 75	+ 62 47.3	+ 0' 15
Eridani	3.4	13 10 + 2 26	+ 34 6.3	+ 0' 15
Tauri	4	15 44 + 3 46	+ 17 14.4	+ 0' 15
Eridani	4	19 20 + 2 25	+ 34 17.5	+ 0' 14
Tauri	4.3	21 19 + 3 50	+ 18 54.1	+ 0' 14
Eridani	4	21 26 + 3 41	+ 15 41.0	+ 0' 14
Eridani	4	21 32 + 3 41	+ 15 35.5	+ 0' 14
Eridani	4	28 37 + 2 36	+ 30 1.0	+ 0' 13
Tauri	1	28 45 + 3 44	+ 16 15.4	+ 0' 13
Eridani	3.4	30 4 + 2 29	+ 3 36.6	+ 0' 13
Eridani	4.3	30 42 + 2 33	+ 30 49.2	+ 0' 13
Doradus	3	31 18 + 1 28	+ 55 18.3	+ 0' 13
Eridani	4	32 28 + 2 75	+ 14 32.9	+ 0' 12
Tauri	4.5	34 45 + 3 59	+ 22 42.9	+ 0' 12
Eridani	4.3	39 15 + 3 00	+ 3 29.1	+ 0' 12
Camelopardi	4	41 38 + 5 91	+ 66 7.6	+ 0' 11
Orionis	4	43 3 + 3 22	+ 6 44.5	+ 0' 11

Name.	Größe.	Gerabe Aufleitung.	Säbtilae Abänderung.	Abänderung.	Säbtilae Abänderung.	Name.	Größe.	Gerabe Aufleitung.	Säbtilae Abänderung.	Abänderung.
		h m s						h m s		
π^4 Orionis	4.5	44 38	+ 37' 19"	+ 523' 4"	+ 0' 11"	γ Cancri	4.5	36 3	+ 39' 49"	+ 21' 25"
ϵ Eridani	4.5	46 45	+ 2' 37"	+ 539' 5"	+ 0' 11"	γ Argus	4	36 4	+ 39' 49"	+ 21' 25"
π^3 Orionis	4	47 44	+ 8' 12"	+ 2 14.0	+ 0' 10"	ϵ^2 Cancri	4	37 35	+ 3' 42"	+ 18' 36"
α Aurigae	3	48 51	+ 3.10	+ 32 58.0	+ 0' 10"	ϵ^1 Argus	4	38 34	+ 2' 41"	+ 32 44.0
10 Camelopardalis	4	52 18	+ 5' 31"	+ 60 15.4	+ 0' 10"	ϵ Cancri	4	39 8	+ 3' 65"	+ 29 12.0
α Aurigae	4	53 0	+ 4' 29"	+ 43 38.2	+ 0' 10"	ϵ Hydras	3.4	40 9	+ 3' 18"	+ 6 52.5
ϵ Aurigae	4	53 45	+ 4' 18"	+ 40 53.5	+ 0' 10"	ϵ Argus	3	41 15	+ 1' 65"	+ 54 18.1
γ "	4.3	57 45	+ 4' 20"	+ 41 3.4	+ 0' 09"	ϵ Hydras	3.4	48 47	+ 3' 18"	+ 6 25.3
ϵ Leporis	4	5 10	+ 2' 53"	+ 22 32.4	+ 0' 09"	ϵ Ursae majoris	3	50 38	+ 2' 14"	+ 48 31.0
α Eridani	3	1 42	+ 2' 35"	+ 5 15.0	+ 0' 08"	ϵ^2 Cancri	4	51 39	+ 3' 38"	+ 12 20.4
ϵ Aurigae	4	3 10	+ 2' 87"	+ 8 55.0	+ 0' 08"	10 Ursae majoris	4	52 31	+ 3' 32"	+ 42 16.6
ϵ Leporis	3.4	7 19	+ 2' 69"	+ 16 21.3	+ 0' 08"	ϵ Argus	3.4	55 5	+ 4' 13"	+ 47 38.3
ϵ Aurigae	4	7 27	+ 4' 42"	+ 45 52.1	+ 0' 07"	ϵ Hydras	3	58 24	+ 2' 30"	+ 70 2.3
ϵ Leporis	4	7 28	+ 2' 77"	+ 13 5.4	+ 0' 08"	ϵ Caninae	4.5	1 36	+ 2' 52"	+ 2 50.4
ϵ Orionis	4	8 32	+ 2' 88"	+ 8 20.9	+ 0' 07"	ϵ Hydras	4	7 52	+ 2' 33"	+ 37 19.3
ϵ "	4	11 32	+ 2' 91"	+ 6 57.9	+ 0' 07"	ϵ Lynceae	4	11 4	+ 3' 75"	+ 69 12.3
ϵ "	4	13 49	+ 2' 76"	+ 13 18.4	+ 0' 07"	ϵ Argus	1	11 50	+ 0' 71"	+ 34 35.3
ϵ Tauri	3.4	18 12	+ 3' 01"	+ 2 30.5	+ 0' 06"	40 Lynceae	3.4	13 26	+ 3' 67"	+ 56 49.2
ϵ Orionis	2	18 23	+ 3' 79"	+ 28 30.0	+ 0' 06"	ϵ Argus	2	13 45	+ 1' 60"	+ 80 24.3
ϵ Leporis	4	18 26	+ 3' 22"	+ 6 14.1	+ 0' 06"	ϵ "	3	18 3	+ 1' 86"	+ 41 55.4
ϵ Orionis	4	22 53	+ 3' 57"	+ 20 51.6	+ 0' 06"	1 H. Draconis	4.5	19 5	+ 3' 31"	+ 81 55.4
ϵ Columbae	2.3	25 37	+ 3' 07"	+ 0 23.6	+ 0' 05"	ϵ Hydras	2	21 27	+ 2' 95"	+ 8 7.1
ϵ Leporis	4	26 46	+ 2' 13"	+ 35 33.8	+ 0' 05"	ϵ Ursae majoris	3.4	21 39	+ 4' 81"	+ 63 36.4
ϵ Orionis	3	27 13	+ 2' 65"	+ 17 54.8	+ 0' 05"	ϵ "	2	24 29	+ 4' 05"	+ 52 18.1
ϵ "	4	28 15	+ 3' 30"	+ 9 50.9	+ 0' 05"	ϵ Argus	4	25 47	+ 2' 37"	+ 39 35.3
ϵ "	5.4	29 8	+ 2' 33"	+ 5 28.4	+ 0' 05"	ϵ Hydras	4.5	33 29	+ 3' 35"	+ 53 24.3
ϵ "	3	29 13	+ 2' 39"	+ 5 59.6	+ 0' 04"	ϵ Leonis	4.3	34 29	+ 3' 06"	+ 19 21.6
ϵ Tauri	3.4	29 52	+ 3' 04"	+ 1 17.0	+ 0' 04"	ϵ "	3	38 45	+ 3' 42"	+ 24 20.3
ϵ Orionis	4	30 11	+ 3' 58"	+ 21 3.8	+ 0' 04"	ϵ Ursae majoris	4.3	42 5	+ 4' 33"	+ 59 37.3
ϵ Boracis	3.4	32 28	+ 3' 01"	+ 2 40.4	+ 0' 04"	ϵ Argus	4	43 59	+ 1' 50"	+ 64 29.6
ϵ Orionis	4	32 33	+ 3' 51"	+ 62 34.3	+ 0' 04"	ϵ Leonis	4	45 39	+ 3' 42"	+ 26 35.3
ϵ Columbae	2	34 27	+ 3' 02"	+ 2 0.6	+ 0' 04"	ϵ Argus	4	52 29	+ 2' 10"	+ 42 23.3
ϵ Leporis	4	35 7	+ 3' 17"	+ 6 5.5	+ 0' 04"	21 Leonis min.	4.5	53 49	+ 3' 21"	+ 60 25.3
ϵ Orionis	4	39 26	+ 3' 52"	+ 22 29.2	+ 0' 03"	ϵ "	3.4	0 31	+ 3' 55"	+ 17 22.3
ϵ "	4.3	41 18	+ 2' 73"	+ 14 52.2	+ 0' 03"	15 Sextantis	4.5	1 32	+ 3' 07"	+ 0 14.3
ϵ Orionis	3.2	41 50	+ 2' 84"	+ 9 43.0	+ 0' 03"	ϵ Leonis	1.2	1 43	+ 3' 20"	+ 12 34.6
ϵ Aurigae	4	42 50	+ 4' 15"	+ 39 6.6	+ 0' 03"	ϵ Hydras	4	4 30	+ 2' 94"	+ 11 44.3
ϵ Leporis	4	45 56	+ 3' 56"	+ 20 53.2	+ 0' 02"	ϵ Veiorum	4	9 30	+ 2' 52"	+ 41 20.3
ϵ Columbae	3	46 38	+ 2' 11"	+ 35 49.2	+ 0' 02"	ϵ Ursae majoris	3.4	9 44	+ 3' 64"	+ 24 21.6
ϵ Orionis	1	48 24	+ 3' 25"	+ 7 22.9	+ 0' 02"	ϵ Leonis	3	9 44	+ 3' 64"	+ 24 21.6
ϵ Aurigae	4.5	49 14	+ 4' 34"	+ 54 16.3	+ 0' 01"	ϵ Argus	4	10 46	+ 1' 44"	+ 69 25.3
ϵ "	2	50 22	+ 4' 40"	+ 44 55.9	+ 0' 01"	ϵ Leonis	2	13 4	+ 3' 30"	+ 20 25.3
ϵ Leporis	4	50 43	+ 4' 73"	+ 14 11.6	+ 0' 01"	ϵ Ursae majoris	3	14 53	+ 3' 60"	+ 42 7.1
ϵ Aurigae	3	51 22	+ 4' 09"	+ 37 12.1	+ 0' 01"	ϵ Hydras	4	20 3	+ 2' 91"	+ 16 15.3
ϵ Columbae	4	53 6	+ 3' 12"	+ 37 17.0	+ 0' 01"	31 Leonis min.	4.5	20 3	+ 3' 49"	+ 30 25.3
ϵ Geminorum	3.4	57 20	+ 3' 62"	+ 22 32.4	+ 0' 01"	ϵ Hydras	4.5	21 31	+ 3' 49"	+ 30 25.3
ϵ "	2.3	15 24	+ 3' 63"	+ 22 34.5	+ 0' 02"	ϵ Leonis	4	26 14	+ 3' 16"	+ 9 36.3
ϵ Canis majoris	2.3	15 31	+ 3' 20"	+ 30 0.6	+ 0' 02"	ϵ Caninae	4	27 35	+ 2' 12"	+ 61 2.3
ϵ Columbae	4	17 12	+ 2' 64"	+ 17 53.7	+ 0' 02"	ϵ Argus	3	38 30	+ 2' 13"	+ 63 44.3
ϵ Argus	4	17 33	+ 2' 19"	+ 33 22.4	+ 0' 03"	ϵ "	var.	40 13	+ 2' 31"	+ 49 1.3
ϵ Canis majoris	4.5	23 32	+ 2' 22"	+ 32 30.1	+ 0' 03"	ϵ Hydras	3.4	43 27	+ 2' 56"	+ 48 23.3
ϵ Geminorum	2.3	30 29	+ 3' 47"	+ 16 30.2	+ 0' 04"	46 Leonis min.	4	46 19	+ 3' 37"	+ 34 43.3
ϵ Argus	3	33 56	+ 1' 83"	+ 43 5.2	+ 0' 05"	54 " maj.	4.5	48 51	+ 3' 27"	+ 23 25.3
15 Monocerotis	4	34 6	+ 3' 31"	+ 10 0.6	+ 0' 05"	ϵ Crateris	4	53 42	+ 2' 95"	+ 17 38.3
ϵ Geminorum	3.4	36 14	+ 3' 70"	+ 25 15.2	+ 0' 05"	ϵ Ursae majoris	2.3	54 17	+ 3' 67"	+ 51 8.3
ϵ "	4.3	38 17	+ 3' 37"	+ 13 1.7	+ 0' 06"	ϵ Leonis	4.5	55 39	+ 3' 21"	+ 60 25.3
ϵ Canis majoris	1	39 38	+ 2' 65"	+ 16 32.9	+ 0' 06"	ϵ Ursae majoris	4.5	59 19	+ 2' 90"	+ 26 37.3
ϵ Geminorum	4	44 33	+ 3' 36"	+ 34 6.6	+ 0' 06"	ϵ Hydras	4.5	59 19	+ 2' 90"	+ 26 37.3
ϵ Canis majoris	4	45 10	+ 2' 24"	+ 32 21.9	+ 0' 07"	ϵ Ursae majoris	3	11 2 38	+ 3' 40"	+ 45 10.6
ϵ Argus	4	46 50	+ 1' 48"	+ 50 28.0	+ 0' 07"	ϵ Crateris	4	5 31	+ 2' 94"	+ 22 8.3
ϵ Pictoris	4	46 55	+ 0' 63"	+ 61 48.6	+ 0' 07"	ϵ Leonis	2.3	7 27	+ 3' 16"	+ 21 12.3
ϵ Canis majoris	4.5	48 23	+ 2' 80"	+ 28 48.2	+ 0' 08"	ϵ Ursae majoris	4.3	11 31	+ 3' 21"	+ 32 12.3
ϵ "	2	53 43	+ 2' 36"	+ 20 45.1	+ 0' 08"	ϵ "	3.4	11 43	+ 3' 26"	+ 33 46.6
ϵ Geminorum	4	56 42	+ 3' 56"	+ 23 39.1	+ 0' 08"	ϵ Crateris	3.4	13 5	+ 3' 00"	+ 14 6.1
ϵ Canis majoris	3.4	57 48	+ 2' 50"	+ 15 26.9	+ 0' 08"	ϵ Leonis	4	14 41	+ 3' 10"	+ 6 42.3
ϵ "	4.5	58 6	+ 2' 71"	+ 26 11.7	+ 0' 09"	ϵ Centauri	4	15 18	+ 2' 72"	+ 53 69.6
22 Monocerotis	3	7 3 19	+ 2' 44"	+ 0 16.3	+ 0' 09"	ϵ Leonis	4	17 24	+ 3' 13"	+ 11 13.3
ϵ Geminorum	4.3	10 54	+ 3' 45"	+ 16 45.8	+ 0' 10"	ϵ Crateris	4	18 38	+ 3' 00"	+ 38 12.3
ϵ "	3.4	12 39	+ 3' 59"	+ 22 12.6	+ 0' 10"	ϵ Draconis	3.4	23 58	+ 3' 64"	+ 70 1.3
π Argus	3	12 44	+ 2' 12"	+ 36 52.4	+ 0' 10"	ϵ Hydras	4	26 52	+ 2' 95"	+ 31 9.3
ϵ Geminorum	4	17 58	+ 3' 74"	+ 28 2.7	+ 0' 11"	ϵ Centauri	4	30 3	+ 2' 74"	+ 3 6.3
ϵ Canis majoris	3.2	19 9	+ 2' 37"	+ 29 3.6	+ 0' 11"	ϵ Crateris	4	30 21	+ 3' 04"	+ 9 6.3
ϵ minoris	3	20 22	+ 3' 28"	+ 8 32.2	+ 0' 12"	ϵ Ursae majoris	4.5	39 26	+ 3' 09"	+ 46 24.3
ϵ Argus	4	25 38	+ 1' 31"	+ 43 9.0	+ 0' 12"	ϵ Leonis	4	41 33	+ 3' 20"	+ 50 54.3
ϵ Geminorum	2.1	26 37	+ 3' 84"	+ 32 9.8	+ 0' 12"	93 Leonis	4.5	41 33	+ 3' 20"	+ 50 54.3
ϵ "	4.5	28 13	+ 3' 71"	+ 27 10.4	+ 0' 13"	ϵ "	2	42 41	+ 3' 07"	+ 13 16.3
ϵ Canis minoris	1	32 45	+ 3' 14"	+ 5 32.6	+ 0' 15"	ϵ Virginis	3.4	44 11	+ 3' 12"	+ 2 39.3
ϵ Puppis	4.5	33 42	+ 2' 46"	+ 26 31.1	+ 0' 13"	ϵ Hydras	4	46 36	+ 3' 02"	+ 33 12.3
26 Monocerotis	4.5	35 17	+ 2' 87"	+ 9 15.6	+ 0' 13"	ϵ Ursae majoris	2.3	47 15	+ 3' 19"	+ 7 14.3
ϵ Geminorum	4.3	36 54	+ 3' 64"	+ 24 41.8	+ 0' 14"	π Virginis	4.5	54 28	+ 3' 07"	+ 7 14.3
ϵ "	1.2	37 40	+ 2' 68"	+ 28 19.6	+ 0' 14"	ϵ "	4	58 50	+ 3' 06"	+ 9 23.3
ϵ Puppis	4.5	40 48	+ 2' 14"	+ 37 39.9	+ 0' 14"	ϵ Centauri	3	12 1 53	+ 3' 08"	+ 30 14.3
ϵ Argus	4.3	44 2	+ 2' 52"	+ 24 32.8	+ 0' 15"	ϵ Corvi	3	3 42	+ 3' 08"	+ 21 33.3
ϵ "	3	53 36	+ 1' 53"	+ 52 38.9	+ 0' 16"	ϵ Centauri	4	5 6	+ 3' 11"	+ 31 40.3
ϵ "	2	59 12	+ 2' 11"	+ 39 39.1	+ 0' 17"	ϵ Crateris	3	8 21	+ 3' 15"	+ 53 12.3
15 "	3	2 13	+ 2' 56"	+ 23 56.5	+ 0' 17"	ϵ Ursae majoris	3.4	9 14	+ 3' 09"	+ 37 42.3
γ "	2	5 41	+ 1' 85"	+ 46 56.1	+ 0' 17"	ϵ Corvi	3.1	9 23	+ 3' 09"	+ 16 30.3
γ Cancri	4.3	9 41	+ 3' 26"	+ 9 34.2	+ 0' 18"	π Virginis	2	13 31	+ 3' 07"	+ 9 1.3
30 Monocerotis	4.3	19 25	+ 3' 00"	+ 3 30.0	+ 0' 19"	ϵ Crateris	1	19 39	+ 3' 37"	+ 62 10.3
ϵ Ursae majoris	3.4	19 52	+ 5' 04"	+ 61 8.0	+ 0' 19"	ϵ Centauri	4.5	21 43	+ 3' 17"	+ 38 70.3
ϵ Argus	2	19 57	+ 1' 24"	+ 59 6.4	+ 0' 19"	ϵ Corvi	2.3	23 25	+ 3' 11"	+ 15 0.3
ϵ Hydras	4.3	51 2	+ 3' 18"	+ 6 8.4	+ 0' 20"	ϵ Crateris	2	24 15	+ 3' 28"	+ 36 3.3

Nome.	Größe.	Größe Aufsteigung.	Größe Absteigung.	Absteigung.	Größe Absteigung.
h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s
Muscae	4	12 25 2	37 51	11 26 5	0 33
Corvi	2.3	27 46	3 14	22 33	0 33
Canum ven.	4.5	27 48	2 86	42 22	0 33
Draconis	3.4	28 8	2 60	70 28 6	0 33
Muscae	4	29 45	3 51	68 28 6	0 33
Centauri	3	34 38	3 30	48 16 4	0 33
Virginis	3	35 20	3 04	0 45 8	0 33
Muscae	4	38 38	3 01	67 25 4	0 33
Crucis	2	40 26	3 46	59 0 2	0 33
Ursae majoris	2	48 31	2 66	56 35 3	0 33
Virginis	2	49 18	3 02	4 4 6	0 33
Canum ven.	3	50 11	2 82	38 59 6	0 33
Muscae	4	53 45	3 57	70 52 4	0 33
Virginis	3.2	55 57	2 99	11 37 9	0 32
Canum ven.	4.5	13 29	3 10	4 52 3	0 32
Muscae	4	6 2	2 81	28 30 7	0 31
Hydrae	4	6 48	3 99	67 13 8	0 32
Centauri	3	12 8	3 24	22 30 6	0 32
Virginis	3	13 35	3 38	36 3 1	0 32
Ursae majoris	2.3	18 37	3 49	10 30 5	0 32
Hydrae	var.	18 53	2 43	55 34 7	0 32
Centauri	3.4	22 53	3 27	22 35 0	0 31
Virginis	3.4	23 48	3 45	38 45 6	0 31
Centauri	3.4	28 19	3 05	0 2 6	0 31
Virginis	3.4	32 2	3 76	52 49 8	0 31
Centauri	3.4	38 37	3 49	5 30 6	0 30
Ursae majoris	4	42 1	3 57	41 3 8	0 30
Hydrae	4	42 6	3 59	41 51 0	0 30
Centauri	4.5	42 37	2 37	49 56 3	0 30
Ursae majoris	4.5	43 29	2 90	16 25 1	0 30
Centauri	4.5	44 37	3 44	32 24 4	0 30
Ursae majoris	4.5	46 1	3 45	3 40 5	0 30
Centauri	4.5	47 43	3 71	46 40 3	0 30
Ursae majoris	4.5	48 44	2 86	19 1 5	0 30
Centauri	1	55 1	4 16	59 46 1	0 29
Virginis	4	55 17	3 05	2 9 0	0 29
Hydrae	4.3	59 15	3 40	26 4 7	0 29
Centauri	4	59 21	3 55	21 45 0	0 29
Draconis	3.4	14 1	0 162	64 58 4	0 29
Virginis	4.5	6 14	3 19	9 41 5	0 28
Ursae majoris	4.5	9 0	2 15	52 25 5	0 28
Virginis	4	9 28	3 14	5 24 2	0 29
Ursae majoris	1	9 56	2 73	19 50 0	0 31
Ursae majoris	1	11 25	3 81	45 29 3	0 28
Ursae majoris	4	11 38	3 29	46 39 8	0 28
Ursae majoris	4.5	11 44	2 13	51 56 7	0 28
Ursae majoris	4.5	20 56	2 04	52 25 7	0 28
Ursae majoris	3.2	26 27	2 59	30 55 3	0 27
Ursae majoris	4	27 35	3 42	38 51 4	0 27
Ursae majoris	4	27 85	3 73	5 27 5	0 27
Ursae majoris	1	31 8	3 05	60 18 9	0 26
Ursae majoris	4	32 27	4 40	64 25 6	0 26
Ursae majoris	4	33 38	3 96	46 51 0	0 26
Ursae majoris	4	34 51	2 82	16 57 3	0 26
Ursae majoris	3.4	35 11	2 86	14 15 9	0 26
Ursae majoris	2.3	36 28	3 16	5 5 8	0 26
Ursae majoris	4	39 32	2 63	27 36 8	0 26
Ursae majoris	4.3	39 56	3 03	2 25 2	0 26
Ursae majoris	4	43 45	3 31	15 28 6	0 25
Ursae majoris	4	45 37	2 76	15 31 2	0 25
Ursae majoris	4	58 21	3 90	42 37 7	0 25
Ursae majoris	3	58 2	3 88	41 26 0	0 25
Ursae minoris	2	51 5	0 25	74 40 0	0 25
Scorpii	3.4	56 45	3 50	24 47 3	0 24
Ursae majoris	3	57 14	2 26	40 53 1	0 24
Ursae majoris	4.5	59 5	2 57	27 26 2	0 24
Ursae majoris	4	61 19	4 28	51 37 3	0 23
Ursae majoris	4	7 16	3 1	27 36 1	0 23
Ursae majoris	2	10 17	3 23	8 55 2	0 23
Ursae majoris	4	10 28	2 42	33 46 9	0 23
Ursae majoris	4	13 10	3 91	40 11 7	0 22
Ursae majoris	4	14 12	4 05	44 14 3	0 22
Ursae minoris	4.3	19 46	2 27	37 49 0	0 21
Draconis	3	20 57	2 14	72 16 7	0 21
Coronae bor.	3	29 9	1 33	59 24 3	0 21
Ursae bor.	4.3	22 41	2 48	29 32 3	0 21
Ursae pr.	4.5	26 26	2 15	41 15 6	0 21
Ursae seq.	4.5	27 18	2 14	41 19 5	0 21
Coronae	4	27 33	2 41	31 46 9	0 19
Ursae	4.5	28 32	3 34	14 22 3	0 21
Serpentis	3.4	28 50	2 87	10 57 5	0 21
Coronae bor.	2	29 34	2 54	27 8 2	0 21
Scorpii	4.5	29 26	3 63	27 43 1	0 20
Ursae	4.5	30 59	3 67	22 21 9	0 20
Coronae	3.4	34 40	2 26	37 2 5	0 20
Serpentis	4	37 30	2 52	96 41 6	0 19
Serpentis	2.3	38 7	2 95	6 49 2	0 19
Serpentis	4.5	40 23	2 92	7 44 8	0 19
Serpentis	3.4	40 25	2 77	15 48 9	0 19
Serpentis	3.4	43 6	3 13	3 2 8	0 19
Serpentis	4	43 7	2 70	18 31 7	0 19
Trianguli aust.	3	44 10	5 25	63 2 3	0 19

Nome.	Größe.	Größe Aufsteigung.	Größe Absteigung.	Absteigung.	Größe Absteigung.
h m s	h m s	h m s	h m s	h m s	h m s
Serpentis	3.4	15 44	2 49	3 51 3	0 19
Ursae minoris	4.5	48 33	2 30	78 10 7	0 18
Serpentis	4.3	50 41	2 77	16 4 3	0 18
Scorpii	3	51 18	3 62	25 45 2	0 20
Coronae	4	52 35	2 48	27 14 5	0 18
Scorpii	2.3	52 57	3 54	22 15 8	0 18
Scorpii	4.5	55 1	2 97	35 15 1	0 17
Scorpii	4.5	57 30	2 50	11 14 5	0 17
Scorpii	2	58 10	3 48	19 27 7	0 17
Herculis	4.5	58 54	1 86	46 23 1	0 17
Draconis	4.3	59 33	1 11	55 54 0	0 16
Scorpii	4	64 44	3 47	19 8 0	0 16
Scorpii	4	65 50	1 88	45 15 8	0 16
Ophiuchi	3	7 48	2 14	3 22 3	0 16
Scorpii	3.4	11 42	3 17	4 23 2	0 15
Scorpii	3.4	13 36	3 64	25 17 4	0 15
Herculis	3.4	15 59	1 80	46 36 7	0 15
Scorpii	3	16 24	2 64	19 26 9	0 15
Scorpii	1	21 45	3 67	26 9 1	0 14
Scorpii	2.2	22 18	3 81	43 47 9	0 14
Ophiuchi	4.3	24 37	3 03	2 15 6	0 14
Herculis	2.3	24 51	2 58	21 45 8	0 13
Scorpii	3.4	28 6	3 72	27 57 2	0 13
Herculis	4	30 4	1 93	42 41 8	0 13
Ophiuchi	3.2	30 17	3 30	10 18 7	0 13
Draconis	4.5	33 14	1 41	53 9 1	0 12
Trianguli aust.	2	35 27	6 28	68 47 7	0 12
Herculis	3.2	36 35	2 26	31 49 8	0 11
Scorpii	3	38 37	2 06	39 9 7	0 12
Ursae	4	39 0	5 14	58 49 9	0 12
Scorpii	3	42 6	3 92	34 3 7	0 11
Scorpii	3	43 24	4 05	37 49 1	0 11
Scorpii	4	43 52	4 05	37 48 1	0 11
Herculis	4.5	45 34	1 75	46 12 9	0 11
Scorpii	3	45 43	4 22	42 8 7	0 11
Ophiuchi	4.5	45 6	2 84	10 22 3	0 10
Ursae	3	48 17	4 94	55 47 4	0 10
Ophiuchi	4	49 39	4 76	32 58 0	0 10
Ophiuchi	3.4	51 45	2 83	19 34 3	0 10
Herculis	3.4	55 30	2 29	31 6 7	0 09
Ursae minoris	4.5	55 51	6 39	82 14 4	0 09
Scorpii	3	57 12	4 28	43 4 2	0 08
Ophiuchi	2.3	58 13	3 43	15 34 1	0 08
Draconis	3	58 26	4 06	65 52 1	0 07
Herculis	3.4	58 57	2 73	14 32 1	0 07
Ursae	3	59 54	2 46	24 59 3	0 07
Ophiuchi	3.4	10 42	2 09	36 57 1	0 07
Ursae	3.4	14 20	3 68	24 52 4	0 07
Ursae	3	14 33	5 03	56 15 4	0 07
Ursae	3	14 55	4 97	55 94 5	0 07
Herculis	4	19 22	2 07	37 15 7	0 07
Ursae	4	19 49	5 40	60 34 5	0 06
Scorpii	3	22 11	4 63	49 46 4	0 06
Scorpii	3	22 16	4 07	37 11 6	0 06
Ursae	3	25 8	4 07	37 0 6	0 05
Draconis	3.2	27 37	1 55	52 23 7	0 05
Scorpii	4	28 20	4 50	40 50 0	0 05
Ophiuchi	2	29 8	2 78	12 39 2	0 05
Draconis	4.5	29 43	1 13	55 16 2	0 04
Serpentis	4.3	30 26	3 43	15 20 2	0 04
Scorpii	3	33 51	4 14	38 57 8	0 04
Herculis	3.4	35 56	1 70	46 4 4	0 04
Ophiuchi	3	37 18	2 96	4 37 3	0 03
Scorpii	3	38 51	4 19	40 4 6	0 03
Ursae	4	41 21	4 08	37 0 1	0 03
Herculis	3.4	41 34	2 34	27 47 7	0 04
Ophiuchi	4.5	41 37	3 00	2 45 3	0 03
Draconis	4.3	44 9	1 09	72 19 3	0 02
Ursae	3.4	45 22	2 57	56 43 6	0 01
Herculis	4	51 58	2 05	37 16 1	0 01
Ophiuchi	4.3	52 9	3 30	9 45 4	0 01
Herculis	4.3	52 54	2 33	29 15 7	0 01
Draconis	2.3	53 42	1 39	51 30 2	0 01
Ophiuchi	4.5	53 43	2 29	30 11 4	0 01
Ophiuchi	4	54 25	3 01	2 52 2	0 01
Ursae	4.5	55 35	3 04	1 18 5	0 01
Ursae	4.5	56 12	2 54	21 45 9	0 01
Ursae	4	56 54	4 67	50 5 9	0 01
Sagittarii	4	57 2	3 83	29 35 0	0 01
Sagittarii	4	57 47	3 84	30 25 4	0 01
Ursae minoris	4.5	59 18	3 01	2 52 2	0 01
Ophiuchi	3.4	18 1 25	2 34	2 52 2	0 00
Herculis	4.3	2 40	2 34	28 48 0	0 00
Herculis	4.5	3 25	2 56	20 47 8	0 00
Sagittarii	4	6 17	3 59	21 5 4	0 01
Scorpii	4	9 10	4 07	36 47 7	0 01
Ursae minoris	4.5	12 39	1 40	86 36 4	0 02
Ursae minoris	3.4	12 59	3 44	29 52 8	0 02
Serpentis	3	14 50	3 10	2 55 8	0 01
Sagittarii	3.2	15 53	3 99	34 26 4	0 02
Herculis	4	17 42	4 45	46 21 1	0 02
Scorpii	4	18 22	2 55	21 42 9	0 02
Sagittarii	3	20 23	3 71	25 29 3	0 02
Draconis	4.5	22 33	0 85	71 16 2	0 02

Nam.	Größe.	Größe Aufsteigung.	Nödrliche Steigung.	Abweichung.	Nödrliche Steigung.	Nam.	Größe.	Größe Aufsteigung.	Nödrliche Steigung.	Abweichung.	
h	m	s	°	'	''	h	m	s	°	'	''
γ Draconis	4.3	18 23	+1° 08	+72 40.7	+0.03	ω Capricorni	4.5	20 41	+3° 59	-27 37.1	-0.01
δ Pavonis	4	23 26	+7.04	-71 31.6	+0.04	β Indi	4	45 2	+4.74	-58 53.5	-0.01
ε Lyrae	1	32 42	+2.03	+39 40.1	+0.05	γ Cygni	4	52 31	+2.23	+40 41.2	-0.01
φ Sagittarii	4.3	37 51	+3.75	-27 7.1	+0.05	δ Capricorni	4	58 56	+3.37	-17 62.5	-0.01
ψ Lyrae	4.5	40 12	+1.99	+39 32.4	+0.06	ε Cygni	4	21 0 23	+2.18	+43 25.4	-0.01
110 Hercules	4.5	40 17	+2.58	-20 25.7	+0.05	ν Aquarii	4.5	2 47	+3.27	-11 42.5	-0.01
ζ Lyrae	4.5	40 26	+2.06	+37 28.6	+0.06	ξ Cygni	3	7 37	+3.55	-27 45.7	-0.01
111 Hercules	4.5	41 30	+2.64	+1 10.2	+0.07	α Equulei	4	9 34	+3.00	+4 43.0	-0.01
η Lyrae	4	45 28	+2.21	+33 13.1	+0.07	τ Cygni	4	9 48	+2.39	+37 30.2	-0.01
θ Sagittarii	2.3	47 31	+3.72	-26 27.1	+0.07	σ "	4.5	12 30	+2.35	+38 52.3	-0.01
113 Hercules	4.5	47 28	+2.53	+22 29.3	+0.07	ζ Capricorni	4.5	12 47	+2.46	+34 22.4	-0.01
δ Serpentis	4	50 0	+2.98	+4 2.6	+0.07	η Capricorni	4.5	15 17	+3.33	-17 41.2	-0.01
ε Lyrae	4.5	50 8	+2.10	+36 45.5	+0.08	α Cephei	3.2	15 36	+1.44	+59 41.1	-0.01
ζ Sagittarii	3.4	50 8	+3.55	-21 15.1	+0.07	γ Pavonis	3	16 5	+3.03	-63 56.2	-0.01
α Aquilae	4	53 57	+2.72	-14 54.0	+0.08	ι Pegasi	4.5	16 18	+2.77	-19 15.2	-0.01
γ Lyrae	3.4	54 16	+2.25	+32 31.2	+0.08	ζ Capricorni	4	19 32	+3.44	-22 51.1	-0.01
ζ Sagittarii	3.4	54 40	+3.82	-30 3.4	+0.08	α Aquarii	3	24 59	+3.16	-6 13.2	-0.01
σ "	4	57 11	+3.39	-21 55.3	+0.08	β Cephei	3	27 2	+0.60	+70 8.2	-0.01
τ "	4.3	59 8	+3.73	-27 50.9	+0.08	ρ Cygni	4.5	29 17	+2.25	+48 61.2	-0.01
λ Aquilae	3.4	59 37	+4.19	-5 2.1	+0.08	γ Capricorni	4.3	33 10	+3.27	-17 13.5	-0.01
κ Sagittarii	3	59 40	+2.75	+13 40.7	+0.08	ε Pegasi	2.3	38 3	+2.95	+9 18.2	-0.01
γ Lyrae	4.5	9 30	+2.04	+38 56.3	+0.10	μ Cygni	4.5	38 32	+2.66	+28 10.7	-0.01
δ Draconis	4.5	12 2	+2.05	+37 54.7	+0.10	ξ Capricorni	3	40 8	+3.30	-16 41.2	-0.01
η Sagittarii	3	12 31	+0.03	+67 26.3	+0.10	π Cygni	4.5	42 11	+2.21	+48 51.2	-0.01
θ Sagittarii	3	12 39	+4.33	-44 41.6	+0.10	γ Gruis	3	45 31	+3.64	-37 57.1	-0.01
κ Cygni	4	14 13	+4.38	-45 2.0	+0.10	α Aquarii	3	59 22	+3.08	-0 35.1	-0.01
ρ Sagittarii	4	14 13	+4.38	-53 8.3	+0.11	ε Gruis	4.5	59 41	+3.24	-14 23.2	-0.01
σ "	4	14 26	+3.48	-18 4.8	+0.11	α Gruis	2	22 0	+3.81	-47 33.2	-0.01
δ Aquilae	3.4	15 14	+4.16	-40 50.8	+0.11	ι Pegasi	4	1 12	+2.79	+28 44.1	-0.01
ε Vulpeculae	3	19 12	+3.03	+2 59.0	+0.11	ζ "	3.4	3 54	+3.03	+47 33.2	-0.01
β Cygni	3	23 30	+2.50	+24 34.5	+0.11	ε "	4	4 26	+3.03	+47 33.2	-0.01
γ "	4	25 41	+2.42	-27 41.9	+0.12	ζ Cephei	3	6 31	+2.65	+57 51.1	-0.01
δ Aquilae	4	26 33	+1.51	-51 27.8	+0.12	α Toucanae	3	9 56	+4.18	-60 52.2	-0.01
α Sagittae	4.5	30 15	+3.10	+1 33.7	+0.13	β Aquarii	4.5	10 14	+3.15	-5 24.2	-0.01
β "	4.5	34 31	+2.68	+17 43.7	+0.13	γ Lacertae	4.3	15 12	+3.10	-2 18.2	-0.01
γ Aquilae	4.5	35 26	+2.62	+17 11.3	+0.13	δ Gruis	4.5	18 39	+2.35	+51 25.2	-0.01
ζ Cygni	3	40 19	+2.85	+10 18.6	+0.14	ζ Aquarii	4	21 48	+3.61	-44 9.2	-0.01
δ Sagittae	4	41 4	+1.87	-44 49.6	+0.14	α Piscis aust.	4	22 24	+3.88	-0 29.2	-0.01
α Aquilae	1.2	44 41	+2.93	-8 32.5	+0.15	β Cephei	4	24 24	+3.42	-32 52.2	-0.01
η "	4	46 6	+3.06	+0 41.2	+0.15	α Lacertae	4	26 8	+2.21	+49 35.4	-0.01
ε Pavonis	4	46 6	+7.04	-73 14.2	+0.15	γ Aquarii	4.3	28 56	+3.03	-0 45.2	-0.01
δ Draconis	4	48 35	+1.07	+69 57.0	+0.15	α Piscis aust.	4	33 45	+3.33	-47 33.2	-0.01
β Aquilae	4	49 10	+2.95	+6 5.8	+0.15	β Gruis	3	36 5	+3.69	-47 33.2	-0.01
γ Cygni	4.5	51 37	+2.25	+34 55.1	+0.16	ζ Pegasi	3.4	35 14	+2.89	+10 10.2	-0.01
γ Sagittae	4.3	53 12	+2.67	+19 9.2	+0.16	η "	3	37 9	+2.81	+29 24.1	-0.01
δ Pavonis	4	56 21	+5.76	-66 29.3	+0.16	λ "	4	40 31	+2.88	-22 54.2	-0.01
δ Aquilae	3	20 4	+3.10	+1 11.4	+0.17	α Gruis	4	41 0	+3.65	-21 58.2	-0.01
α Cygni	4	42 12	+1.89	+46 21.8	+0.18	τ Aquilae	4.5	42 58	+3.18	-51 25.2	-0.01
32 "	4	10 30	+1.40	+11 1.0	+0.18	ι Pegasi	4	43 58	+3.42	-47 33.2	-0.01
α Capricorni	3.4	10 43	+3.33	-12 53.5	+0.18	ζ Cephei	4.3	45 14	+2.12	+63 12.2	-0.01
α "	3.4	11 7	+3.33	-12 53.8	+0.18	λ Aquarii	4	46 3	+3.13	-8 18.2	-0.01
α Cephei	4.5	13 4	+1.90	+77 20.0	+0.18	δ "	3	48 1	+3.19	-16 29.2	-0.01
β Capricorni	3	13 59	+3.37	-15 10.5	+0.18	α Piscis aust.	1.2	50 44	+3.35	-30 17.2	-0.01
α Pavonis	3	15 45	+4.79	-57 8.0	+0.19	α Andromedae	4	56 10	+2.73	-41 19.2	-0.01
γ Cygni	3	17 45	+2.15	+39 51.5	+0.19	β Pegasi	2.3	57 43	+2.90	-37 21.2	-0.01
δ Delphini	4.5	24 17	+2.45	+29 57.1	+0.20	α "	2	58 32	+2.96	-14 12.2	-0.01
θ Cephei	4	27 14	+2.87	+10 52.8	+0.20	α Aquarii	4.5	59 58	+3.23	-24 21.2	-0.01
α Indi	3	28 46	+4.24	-47 43.6	+0.20	α "	4	23 2	+4.72	-21 15.2	-0.01
β Delphini	3.4	31 41	+2.81	+14 5.7	+0.20	γ Toucanae	4	10 8	+3.53	-6 42.2	-0.01
α Aquilae	4.5	31 53	+3.10	+1 22.4	+0.21	γ Piscium	4	10 41	+3.11	-11 19.2	-0.01
β Pavonis	3	33 41	+5.50	-66 39.0	+0.21	δ "	4.5	21 38	+0.05	+5 41.2	-0.01
α Delphini	4.3	33 50	+2.79	+15 25.3	+0.21	λ Andromedae	4	31 27	+2.92	+45 46.2	-0.01
α Cygni	2.1	37 10	+2.04	+44 50.1	+0.21	τ "	4	32 0	+2.92	+42 24.2	-0.01
δ Delphini	4	37 37	+2.80	+14 37.6	+0.21	α Piscium	4.5	33 31	+3.09	+4 56.2	-0.01
ζ Capricorni	4.5	38 42	+3.57	-25 43.0	+0.21	γ Cephei	3.4	34 14	+2.40	+15 35.2	-0.01
52 Cygni	4.5	40 30	+2.47	+30 15.8	+0.21	λ Andromedae	4	34 15	+2.93	-43 24.2	-0.01
γ Delphini	3.4	40 51	+2.50	+15 40.5	+0.21	α Aquarii	4	35 1	+3.15	-18 20.2	-0.01
α Aquarii	4.3	40 54	+3.25	+9 57.1	+0.21	ω Aquarii	4.5	36 14	+3.11	-15 14.2	-0.01
β Cygni	3.2	41 9	+2.43	+33 30.2	+0.22	α Piscis aust.	4.5	42 25	+3.13	-28 49.2	-0.01
β Aquarii	4.5	41 9	+3.17	+5 29.1	+0.22	ω Piscium	4	52 54	+3.08	-6 10.2	-0.01
γ Cephei	4.3	42 45	+1.23	+61 21.2	+0.23	2 Ceti	4.5	57 20	+3.08	-15 17.2	-0.01

d) Veränderliche Sterne.

Durch genaue Beobachtungen hat man festgestellt, daß ein Theil der Fixsterne nicht immer dieselbe Helligkeit behält, sondern zu gewissen Zeiten schwächer oder heller wird; solche Sterne heißen veränderliche Sterne.

Die Angaben der Alten über die Helligkeit der Sterne sind leider so mangelhaft und widersprechend, daß man allein auf neuere Beobachtungen angewiesen ist, und da es an Instrumenten noch fehlt, mit welchen man ganz geringe Aenderungen in der Helligkeit beobachten kann, können wir bis jetzt nur diejenigen veränderlichen

Sterne berücksichtigen, deren Helligkeit schon jetzt Schwankungen unterworfen ist.

Die Zahl der mit Sicherheit als veränderliche bekannten Sterne ist gegenwärtig über 130. Von diesen sind aber die meisten, selbst in ihrer größten Helligkeit, telestrophisch, d. h. schwächer als 6. Größe.

Man unterscheidet bei den veränderlichen Sternen drei Klassen: 1) solche, die sich regelmäßig zwischen die in jedem Maximum und ebenso in jedem Minimum ihrer Helligkeit dieselbe Größe zeigen, oder die in einer Periode ein Maximum und ein Minimum haben; 2) Sterne, die mehrere Maxima und Minima

verschiedener Helligkeit haben; 3) Sterne, deren Veränderlichkeit sich noch in kein Gezeig bringen läßt (irregulär veränderlich).

Vor dem Jahre 1700 waren nur 3 oder 4 veränderliche Sterne bekannt: α Ceti (Mira), dessen Veränderlichkeit 1638 von Holwarda entdeckt*) wurde, und der im Maximum zuweilen heller als ein Stern 2. Größe, im Minimum unter 12. Größe ist. Die Periode des Lichtwechsels beträgt im Durchschnitt $331\frac{1}{2}$ Tage, doch ist sie starken Schwankungen unterworfen, da sie zwischen 306 und 367 Tagen liegt. Von seiner größten Helligkeit bis er so schwach als ein Stern 6. Größe wird, braucht der Stern im Durchschnitt 74 Tage, dagegen von der 6. Größe bis zu seinem Maximum nur 43 Tage.

Zer zweite veränderliche Stern, β Persei oder Algol, wurde 1667 von Geminiano Montanari als veränderlich erkannt, und seine Periode ist gegenwärtig 2 Tage 20 Stunden 48 Minuten 54 Sekunden. Im Maximum gleicht er einem Stern 2. bis 3. Größe, im Minimum einem Stern 4. Größe, er bleibt in jeder Periode 2 Tage 13 Stunden in gleichem Glanze und nur 8 bis 9 Stunden ist er schwächer. Argelander hat gefunden, daß seine Periode mit der Zeit etwas kürzer geworden ist.

Der dritte veränderliche ist χ Cygni, entdeckt im Jahre 1687 von Kirch; er gleicht manchmal in seinem Maximum der Helligkeit einem Stern 4., manchmal nur einem Sterne 6. bis 7. Größe.

Auch kann man ρ Cygni dazu rechnen, dessen Veränderlichkeit Jansen im Jahre 1600 erkannte, der 1657 von der 3. Größe erschien und jetzt nahe constant 6. Größe ist.

Bis zum Jahre 1800 kannte man 11 oder 13 veränderliche Sterne. Die 8 oder 9, welche im vorigen Jahrhundert hinzukamen, sind α Hydrae, 1704 von Paraldi, α Leonis, 1782 von Koch, η Aquilae, 1784 von Pigot, β Lyrae und δ Cephei, 1784 von Goodricke, α Herculis 1795 von W. Herschel, α Coronae und α Scuti, 1795 von Pigot. Ebenso wurde die Veränderlichkeit von μ Cephei schon von W. Herschel entdeckt, doch kennt man die Periode derselben noch nicht. Die Entdeckung der andern Veränderlichen gehört diesem Jahrhundert an.

Unter den Sternen 1. Größe ist sicher veränderlich α Orionis und η Argus, unter den 2. Größe α Cassiopeja, β Persei, δ Orionis und β Pegasi, also 4. α Ceti und γ Coronae sind nicht hierher zu rechnen, weil sie nur für kurze Zeit von der 2. Größe sind. Wenn W. Herschel meint, daß der dreifigste Theil der Sterne überhaupt veränderlich sei, ist diese Annahme wol etwas zu hoch gegriffen, doch ganz geringen Aenderungen scheinen viele Sterne unterworfen zu sein. Bemerkenswerth ist ferner, daß ein großer Theil dieser veränderlichen Sterne röthliches Licht hat und das Spectrum sich wesentlich von dem Spectrum anderer Sterne unterscheidet.

Woher diese Veränderlichkeit kommt, können wir mit Bestimmtheit noch nicht sagen. Von den Hypothesen, welche darüber existiren, führen wir die folgenden auf:

Man kann annehmen, daß die Sterne auf ihrer Oberfläche an verschiedenen Stellen verschiedene Leuchtkraft haben und sich in Rotation befinden, alsdann erklären sich, wenn man die Rotationszeit gleich der Periode der Veränderlichkeit annimmt, die Erschei-

nungen, welche wir bei der ersten Klasse der veränderlichen Sterne aufgeführt haben. In immer gleichen Perioden müssen dann immer gleich helle Maxima und gleich helle Minima stattfinden. Nimmt man mehrere dunkle oder helle Stellen auf der Oberfläche an, so erklären sich auch verschiedene Maxima und Minima in der Helligkeit.

Für diejenigen Sterne, welche nur ganz kurze Zeit schwächer werden, ist die zweite Hypothese, daß die veränderlichen Sterne von dunkeln Himmelskörpern (Planeten) umkreist werden, die, wenn sie zwischen uns und dem Stern sich vorüber bewegen, uns das Licht entziehen, hinreichend.

Eine dritte Hypothese setzt eine Achsendrehung bei stark abgeplatteter Gestalt und eine starke Schwantung der Umdrehungsaxe gegen die Gesichtslinie voraus, wodurch wir manchmal die sogenannte Breitseite des Himmelskörpers, ein anderes mal die schmale Seite sehen und infolge dessen auch mehr oder weniger Licht empfangen werden.

Als vierte Hypothese kann man endlich annehmen, daß auf Fixsternen Lichtanhäufungen, etwa Verbrennungen, oder Lichtverminderungen vorkommen, die sich entweder periodisch wiederholen oder auch unregelmäßig stattfinden. Ein Analogon haben wir in den Sonnenscheiden und Sonnensfleden. Während die ersten drei Hypothesen nur die Erscheinungen einzelner veränderlicher Sterne erklären, lassen sich durch die vierte Hypothese fast alle Erscheinungen darstellen.

Werkwürdig ist noch, daß bei den meisten veränderlichen Sternen die Lichtzunahme schneller vor sich geht, als die Lichtabnahme.

Endlich ist auch noch zu bemerken, daß die Mehrzahl der veränderlichen Sterne in der Nähe der Milchstraße sich befindet.

In dem folgenden Verzeichnisse der veränderlichen hellern Sterne, die in ihrem größten Lichte wenigstens die fünfte Größenklasse haben, weil unsere Sternkarten mit dieser Größenklasse abschließen, ist gegeben: in der ersten Columne der Name, in der zweiten und dritten der Ort für 1875, in der vierten und fünften die jährliche Veränderung des Ortes durch die Präcession, in der sechsten und siebenten die Helligkeit im Maximum und Minimum, in der achten die Periode der Veränderlichkeit, in der neunten die Epoche, in welcher das Minimum oder Maximum stattfindet, nebst einigen Bemerkungen.

Bei der Bezeichnung der veränderlichen Sterne sind die Grundzüge beobachtet, daß die veränderlichen Sterne mit den Sternbildern und in diesen mit lateinischen Buchstaben bezeichnet sind, und zwar um eine Vertauschung mit den von Bayer 1603 eingeführten möglichst zu vermeiden, mit den großen Buchstaben des Alphabets von R an. Für die veränderlichen Sterne, welche jedoch bereits Bezeichnungen, meistens mit griechischen Buchstaben, hatten, sind selbige, um keine Verwirrung herbeizuführen, beibehalten.

Unter den hier nicht aufgeführten teleskopischen veränderlichen Sternen sind durch ihre kurze Periode so wol als durch ihre Lichtschwankung merkwürdig: δ Cancri, bei welchem die Periode 9 Tage 11 Stunden 37.8 Minuten ist, während 8 Tage 19 Stunden ist er 8.2. Größe, dann geht er innerhalb 6 Stunden bis zur 10.2. Größe herab, um in den nächsten 10 Stunden wieder bis zur 8.2. Größe zu steigen. Bei U Saggiarii ist die Periode 6 Tage 17 Stunden 51.2 Minuten, die Helligkeit schwankt zwischen 7.5 und 9. Größe, bei W Virginis ist die Periode 17.3 Tage, die Helligkeit schwankt zwischen 8.8 und 10.4. Größe.

*) Schon 1596 sah Fabricius diesen Stern als Stern 3. Größe, er erschien im October desselben Jahres, 1609 erblühte derselbe Beobachter ihn von neuem.

Katalog der hellern veränderlichen Sterne.

Name.	Grobe Auflebung 1875.	Abweichung 1875.	Jährliche Veränderung in großer Auflebung.	Größe im Maximum.	Größe im Minimum.	Periode.	Epoch.
α Cassiopejae	h m s	° ' "	"	"	"		
α Ceti (Mira)	0 33 25	+ 55 51	3.36	+ 0.33	2.2	2.8	Irregulär
β Persci	2 13 2	+ 3 33	3.02	+ 0.28	1.7	9.5	331. 3363
α Tauri	2 57 10	+ 38 21	3.81	+ 0.24	3.4	4.0	Irregulär
α Aurigae	3 0 2	+ 40 28	3.87	+ 0.24	2.2	3.7	21 201 48 ^m 54 ^s
δ Orionis	3 53 45	+ 12 8	3.31	+ 0.18	3.4	4.3	21 221 52 ^m 4 ^s
α " "	4 53 0	+ 43 38	4.29	+ 0.10	3.5	4.5	Irregulär
α " "	5 25 37	+ 0 24	3.06	+ 0.05	2.2	2.7	Irregulär
α " "	5 48 34	+ 7 23	3.25	+ 0.02	1.0	1.4	196? Farbe sehr roth.
α Monocerotis	6 34 6	+ 10 1	3.31	+ 0.05	4.9	5.6	31 101 38 ^m
α Gemminorum	6 56 41	+ 20 45	3.56	+ 0.08	3.7	4.5	101 31 40 ^m
β Leonis	9 40 50	+ 12 0	3.23	+ 0.28	5.0	12.2	312.6
γ Argi	10 10 13	+ 32 2	2.51	+ 0.31	1.0	6.0	Irregulär
β Hydrae	13 22 53	+ 22 35	3.27	+ 0.31	4.0	11.0	442?
δ Librae	14 54 18	+ 8 1	3.20	+ 0.24	4.9	6.0	21 71 51 ^m 20 ^s
β Coronae	15 54 16	+ 26 16	2.51	+ 0.18	2.0	9.3	Irregulär
γ Herculis	16 24 32	+ 42 10	1.97	+ 0.13	4.9	6.2	Irregulär
α " "	17 8 57	+ 14 32	2.73	+ 0.07	3.1	3.9	Irregulär
α Sagittarii	17 39 41	+ 27 47	3.77	+ 0.03	4.0	6.0	71 01 25 ^m 34 ^s
α " "	17 57 2	+ 22 35	3.83	+ 0.01	5.0	6.5	71 141 51 ^m 35 ^s
β Scuti	18 40 49	+ 5 50	3.21	+ 0.06	4.7	9.0	711?
β Lyrae	18 45 28	+ 33 13	2.21	+ 0.06	3.5	4.5	121 211 51 ^m 05 ^s
α " "	18 51 32	+ 43 47	1.83	+ 0.08	4.3	4.6	46?
α Cygni	19 45 46	+ 32 36	2.31	+ 0.15	4.0	13.0	406.12
γ Aquilae	19 46 6	+ 0 41	3.06	+ 0.15	3.5	4.7	71 141 14 ^m 4 ^s
β Cygni	20 13 11	+ 37 39	2.21	+ 0.18	3.0	6.0	Irregulär
α " "	20 42 12	+ 33 55	2.39	+ 0.22	5.0	6.0	Irregulär
μ Cephei	21 39 41	+ 58 12	1.83	+ 0.27	4.0	5.0	Irregulär
δ " "	22 24 32	+ 57 47	2.21	+ 0.31	3.7	4.9	51 201 47 ^m 40 ^s
β Pegasi	22 57 43	+ 37 24	3.90	+ 0.32	2.2	2.7	Irregulär
α Cassiopejae	23 52 4	+ 50 41	3.01	+ 0.33	4.8	12.0	428.9

e) Neu erschienene Sterne.

Mit den veränderlichen Sternen nahe verwandt sind die plötzlich erschienenen und wieder verschwundenen Sterne, jedoch ist jetzt sicher, daß ein Theil dieser neuen Sterne, wie man sie nennt, zu den veränderlichen gehört, wenn auch ihre Veränderlichkeit keine regelmäßige ist. Auch diese Sterne haben sich meistens in der Nähe der Milchstraße gezeigt und ihre Farbe häufig geändert.

In den alten Chroniken, besonders aber in den chinesischen Annalen, sind vielfach neue Sterne aufgeführt, jedoch ist die Beschreibung so mangelhaft, daß man nicht weiß, ob man es mit wirklichen neuen Sternen, oder nur mit plötzlich erschienenen Meteoriten zu thun hat. Für uns genügt es, von einigen dieser Sterne, welche mit Sicherheit beobachtet sind, kurze Notizen zu geben.

Nach den chinesischen Annalen sowol als auch nach der Nachricht des Plinius erschien im Jahr 134 vor Christi Geburt im Skorpion ein heller Stern, welcher den Astronomen Hipparch veranlaßte, ein genaues Verzeichniß derjenigen Sterne anzufertigen, welche man damals sah. Es entstand daraus der schon erwähnte Katalog von 1026 Sternen, welchen Ptolemäus im „Almagest“ gibt.

Der berühmteste der neu erschienenen Sterne ist der Tycho'sche vom Jahre 1572 (1875 AR = $0^h 17^m 52^s$, $\delta = + 63^\circ 27'$). Tycho Brahe beobachtete ihn am 11. Nov. und sein Lichtglanz übertraf den des Sirius, der Vega und des Jupiter, er konnte am besten mit der Venus verglichen werden. Doch schon im December nahm seine Helligkeit ab, im Januar 1573 glich er dem Jupiter, im Februar und März nur noch Sternen 1. Größe; für April und Mai war er so hell als Sterne 2. Größe und so nahm er ab, bis er im Nov. 1573 nur noch einem Sterne 4. Größe glich und im März 1574 für das bloße Auge spurlos verschwand,

nachdem er 17 Monate sichtbar gewesen war. Farbe dieses Sterns war in den ersten 2 Monaten seiner Sichtbarkeit weiß, dann wurde sie gelb, im Jahr 1573 nennt Tycho sie roth, im Mai bekam sie weiße Farbe zurück und so blieb der Stern bis zu Verschwinden.

Im Jahre 1604 erschien im Sternbilde des Krebses (1875 AR = $17^h 23^m 9^s$, $\delta = - 21^\circ 22'$) ein den besonders Kepler beobachtete und der deshalb Kepler'sche Stern genannt wird. Am 10. Oct. glänzte er heller als Jupiter und Saturn, doch mehr hell als Venus. Anfang Jan. 1605 war er noch heller als Antares, aber von geringerer Helligkeit als Aktur; Ende März glich er nur noch einem Sterne 3. Größe und zwischen Febr. und März 1606 schwand er dem bloßen Auge.

Im Jahr 1670 am 20. Juni sah Athanasius Kircher bei β Cygni einen neuen Stern 3. Größe (1875 AR = $19^h 42^m 26^s$, $\delta = + 27^\circ 0'$), welcher am 20. Juli nur noch 5. Größe war und der nach drei Monaten verschwand; am 17. März 1671 war er wieder 4. Größe und Ende März 1672 verschwand er und ist seitdem nicht wieder gesehen.

Im Jahre 1848 wurde ein von Hind im Capricorn gefundenen Stern (Mira Ophiuchi) (1875 AR = $52^m 30^s$, $\delta = - 12^\circ 42'$) zu den neuen Sternen gerechnet, doch gehört selbiger, obwohl er zu seiner Helligkeit, in der Hind ihn sah (5. Größe), nicht zurückgekehrt, wahrscheinlich zu den Veränderlichen; er geht im Fernrohr als ein schwacher, oft mehr oder weniger heller Stern erscheint.

Ebenso ist ein Stern in der Krone (T Coronae AR = $15^h 54^m 16^s$, $\delta = + 26^\circ 16'$), im Jahre 1848 im Mai plötzlich als Stern 2. Größe gesehen und seitdem als ein Stern zwischen 8. und 10. Größe sichtbar, unter den veränderlichen aufgeführt.

Wie diese neuen Sterne entstehen, was für

Körper sie sind, darüber ist man bei weitem noch nicht im Klaren. Verschiedene von den Alten, von Tycho Brahe, Riccioli u. a. aufgestellte Hypothesen sind nicht mehr stichhaltig. Höchst wahrscheinlich sind es Himmelskörper, auf denen Ansammlungen von Gasen durch irgendeine Ursache entzündet werden, dann nach und nach verbrennen, sobald nur während dieser Zeit die Sterne hell aufleuchten und nachher in durch die weite Entfernung bedingte Unsichtbarkeit zurückkehren. Möglicherweise auch, daß sich im Weltraum kosmisches Gewölde durch irgendwelche Kräfte zusammenballt, plötzlich durch irgendeine Ursache leuchtend wird und die Erscheinung neuer Sterne hervorruft.

5) Die Milchstraße.

Jeder aufmerksame Beobachter wird am Himmel in der Verteilung der Sterne eine große Verschiedenheit wahrnehmen, an einigen Stellen sind nur wenig, an andern Stellen viele Sterne aufgebäuft. Ganz besonders aber fällt ein über den ganzen Himmel gehender, sich oft in mehrere Theile spaltender Streifen ins Auge, der weißlich, milchig schimmert und daher die Milchstraße (via lactea) genannt wird. Auf der nördlichen Halbkugel des Sternhimmels zieht durch das Sternbild der Cassiopeja die Milchstraße (Zaf. 1, Fig. 1), welche hier nahe am schwächsten ist; nur ein Hauptstrom ist erkennbar, welcher durch den Perseus geht und mit geringer Helligkeit im Fuhrmann erscheint. Im Stier wird die Milchstraße breiter und scheint sich zu theilen, da sie in der Mitte dunkler ist. Sie schließt in sich das Sommerstizium der Ekliptik, berührt den Orion, zieht sich nach dem Aequator, den sie im Einhorn durchschneidet. Von hier an auf der südlichen Halbkugel (Zaf. 2, Fig. 1) nimmt ihre Helligkeit an beiden Rändern beträchtlich zu, im Schiffe Argo erscheint sie wieder ganz schmal, wird etwas schwächer in der Nähe von γ und ϵ Argus, dann wieder breiter, aber schnell wieder schwächer gegen das südliche Kreuz, wo sie einen Streifen von nur $3-4^\circ$ Breite bildet. Gleich darauf dehnt sie sich zu einer hellen und breiten Masse aus, welche den Stern α Crucis einschließt, darauf trennt sich ein Zweig ab, welcher sich bis in den Wolf (Lupus) hineinzieht und dort verschwindet. Bei β und α Centauri sieht man einen schwarzen birnförmigen Fleck — Nehelejad — eine sehr merkwürdige Gegend des südlichen Himmels, die ihre auffallende Dunkelheit nur dem Contraste mit einer der hellsten Gegenden der Milchstraße verdankt. Bei dem Sternbild des Winkelmahes (Norma) entsteht eine neue Theilung der Milchstraße. Der südliche Strom ist der Hauptstrom, geht durch den Altar, einen Theil des Skorpions, nach dem Schützen, wo er in der Nähe des Winterstiziumpunktes die Ekliptik durchschneidet, dann läuft er in ununterbrochen flüchtiger Gestalt fort durch den Adler (vgl. wieder Zaf. 1), den Pfeil, den Fuchs bis zum Schwan, wo er sich mit dem nördlichen Zweige, welcher anfangs unregelmäßige Formen hat, sich durch den Ophiuchus und Fuchs zieht, vereinigt. Hier beginnt eine sehr unregelmäßige Gegend, zwischen ϵ , γ und α im Schwan ist eine breite dunkle Lücke, die gleichsam einen Mittelpunkt bildet, von dem wieder mehrere Ströme auslaufen. Der Hauptstrom geht zur Cassiopeja, von wo wir ausgegangen sind.

Die Milchstraße erscheint im Fernrohr ganz anders als mit bloßem Auge: der Lichtschimmer verschwindet und an dessen Stelle treten eine große Anzahl teleskopischer Sterne, die für das bloße Auge zu schwach und zu nahe beieinander stehen, um ohne Teleskope einzeln und voneinander getrennt gesehen werden zu können. An einzelnen Stellen sind die Sterne so zahl-

reich zu kleinen Haufen vereinigt, daß nur die stärksten Fernrohre im Stande sind, erkennen zu lassen, daß es einzelne Sterne sind. Solche Haufen heißen Sternhaufen, und wegen der großen Anzahl von Sternen in ihnen werden diese wieder einem Beobachter, der sich in dem Sternhaufen selbst, sei es in der Mitte, sei es nahe an der Grenze, befindet, als eine neue Milchstraße erscheinen müssen.

Andere Stellen in der Milchstraße lassen sich aber selbst in den stärksten Fernrohren nicht in einzelne Sterne auflösen, sie bleiben immer von nebelhaftem Ansehen und gleichen weißen, wolligen Floden, welche Nebelflecke heißen. Sternhaufen und Nebelflecke sind aber, wenn auch minder zahlreich als in der Milchstraße, über den ganzen Himmel verbreitet, und man hat diesen Objecten seit etwas mehr als hundert Jahren besondere Beobachtung geschenkt.

g) Sternhaufen und Nebelflecke.

Einige dieser Objecte sind bald nach der Entdeckung des Fernrohrs wahrgenommen. Ein Nebelfleck in der Andromeda wurde bereits im Jahre 1612 von Simon Marius gesehen, der große Nebel im Orion ist zuerst im Jahre 1659 von Huygens beschrieben worden. Einige andere, dem bloßen Auge leichter sichtbare, hat man schon sehr früh gekannt und gehören hierher, wenn man die Sternhaufen im weitesten Sinne des Wortes nimmt, auf der nördlichen Halbkugel die Plejaden, die Krippe im Krebs, auf der südlichen Gemisphäre zwei weiße, helle Flecken, welche die Magellanischen Wolken oder Capwollen genannt werden und schon vor der Entdeckung Amerikas den Schiffen, welche von Babel-Mandeb nach Indien gingen, nicht unbekannt waren.

Doch erst Messier brachte die Nebelflecken und Sternhaufen, welche er mit schwachen Fernrohren sah und die viele Ähnlichkeit mit kleinen Kometen haben, in ein Verzeichniß, weil er ihre Lage kennen mußte, um sie bei seinen Nachforschungen von neu entdeckten Kometen unterscheiden zu können.

William Herschel durchsuchte systematisch mit seinen guten Teleskopen den Himmel nach diesen Objecten und entdeckte mehr als 3000, welchen sein berühmter Sohn John Herschel durch Beobachtungen, besonders am Cap der guten Hoffnung, noch mehrere Tausende hinzufügte und in neuester Zeit ist die Zahl der Nebel durch andere Astronomen, wenn auch nicht bedeutend, doch mehrfach vergrößert worden.

William Herschel theilte die Nebel und Sternhaufen in acht verschiedene Klassen, die wenigstens im allgemeinen einen Ueberblick über die eigenthümliche, oft wunderbare Form und Gestaltung geben.

Die erste Klasse enthält die hellglänzenden Nebel, die sich auch durch die besten Teleskope nicht in Sterne auflösen lassen, deren führt Herschel 288 auf. In die zweite Klasse rechnet er lichtschwächere Nebel, sein Verzeichniß hat 907, in die dritte die sehr mattschimmernden, ebenfalls unauflösbaren Nebel, die Zahl ist 978. Die vierte Klasse nennt er planetarische Nebel, die sich durch kreisrunde Gestalt von 5, 10 und mehr Secunden Durchmesser und durch gleiche Lichtmenge in allen ihren Theilen auszeichnen, während die Gestalt der Objecte der ersten drei Klassen eine völlig unregelmäßige und die Lichtmenge in den einzelnen Theilen eine sehr verschiedene ist. In die vierte Klasse rechnet er auch die Nebelsterne und Sternnebel, von welchen die erstern hellleuchtende Fixsterne mit kreisrunden, nebeligen Atmosphären sind, deren Grenzen sich allmählich verlieren, während die Sternnebel aus Fixsternen bestehen, um welche ein Nebel von besond-

Gestalt, etwa der eines Fächers oder eines Wulstes, befindlich ist.

Die fünfte Klasse enthält 52 sehr große und oft mehrere Quadratgrade ausgebreitete Nebelstellen mit auslaufenden Zweigen oder Armen.

Die sechste, siebente und achte Klasse enthalten die Sterngruppen, die Sternhaufen und die eigentlichen Anhäufungen kleiner, dichtgedrängter Sterne. In die sechste Klasse gehören die sehr herrlichen Flecke am Himmel, in die siebente mehr dichtgedrängte und meistens kreisrunde Sternhaufen und in die achte unordentlich zerstreute Gruppen von kleinen Fixsternen, deren erster Anblick aber zeigt, daß sie zusammengehören und ein eigenes System von Fixsternen am Himmel bilden.

Erwähnt ist schon, daß eine große Zahl dieser Sternhaufen und Nebelflecke in der Milchstraße oder deren Nähe sich befindet; sie sind hauptsächlich im Orion, im Schiff Argo, im Schützen und Schwan und besonders in einer Zone, welche durch den Löwen, den großen Bären, die Jagdhunde, das Haupthaar der Berenice, den Bootes und die Jungfrau geht, angehäuft. Am südlichen Sternhimmel sind sie verhältnismäßig gleichmäßiger vertheilt als am nördlichen, nur in den Capvellen sind sie allgemein concentrirt. Die Nebelmassen nehmen am Himmel einen bedeutenden Raum ein und W. Herschel schätzt die Flächenräume, welche die von ihm beobachteten Nebel einnehmen, auf über 200 Quadratgrade, ein Beweis, wie groß diese Massen sind.

Ueber Veränderungen der Nebelflecke in Betreff des Ortes haben wir noch keine ganz sichere Grundlage, obwohl es scheint, daß bei einem Doppelnebel in den Zwillingen ($AR = 7^h 17^m 40^s$, $\delta = +29^\circ 44'$) die Entfernung zwischen beiden sich geändert hat. Dagegen ist mit ziemlicher Sicherheit constatirt, daß einige ihre Helligkeit geändert haben. So wurde ein Nebel im Stier ($AR = 3^h 21^m 37^s$, $\delta = +30^\circ 57'$) 1859 mit einem dreifölligen Objectiv, 1862 kaum mit einem zehnfölligen gesehen; ebenso ist ein Nebel in den Plejaden ($AR = 3^h 38^m 45^s$, $\delta = +23^\circ 24'$) jetzt nur mit Nähe zu finden, während er 1859 schon mit einem kleinen

Fernrohr zu sehen war. Endlich ein dritter in Mondschein gesehen werden und 1862 war er dem großen pulkowaer Refractor eben sichtbar.

Ueber die Natur der Nebel wissen wir noch so Kosmische, im ganzen Weltraum verbreitete Massen fallen sich vielleicht zusammen und nehmen nach den ihnen vorgehenden Kämpfen um das Uebergewicht die verschiedensten Formen an, und die Zeit, welcher man eine Zeit lang früher zugethan war, alle Nebelflecke nur zu dicht gedrängte Sternhaufen seien, als daß man sie mit unsern jetzigen Hilfsmitteln auflösen könnte, hat durch die neueren Untersuchungen der Spectralanalyse eine, wenn nicht absolut sichere, doch sehr wahrscheinliche Bestätigung gefunden. Das Spectrum dieser Nebel ist nicht wie das der Fixsterne continuirlich, d. h. regelmäßig fortgehend und nur durch zahlreiche dunkle unterbrochen, sondern discontinuirlich, bestehend aus mehreren hellen Linien, ähnlich dem Spectrum der Sterne.

Das vollständigste Verzeichniß von Sternhaufen und Nebelflecken mit Benutzung der früheren hat John Herschel in den „Philosophical Transactions“ für 1864 unter dem Titel: „Catalogue of Nebulae and Clouds Stars. By Sir John Frederick William Herschel“ welches 5079 Objecte enthält, herausgegeben.

Wir führen hier die hellern, welche schon mit den Fernrohren sichtbar und meistens schon von bloßem Auge beobachtet sind, und einige der interessantesten merkwürdigsten auf. In dem folgenden Verzeichniß enthält die erste Columne die laufende Nummer, die zweite Columne die Nummer im obigen Cataloge, die dritte Columne die Nummer im Messier'schen Verzeichniß, die vierte und fünfte Columne die gerade Aufsteigung (AR) und Abweichung (δ), beides für 1875, die sechste und siebente Columne die Veränderung in AR und δ , und endlich die Bemerkungen über die Eigenthümlichkeiten, das Alter u. s. w.

Katalog vorzüglicher Nebel und Sternhaufen.

Laufende Nummer.	Herschel.	Messier.	Gerade Aufsteigung für 1875.	Abweichung für 1875.	Veränderung in AR.	Veränderung in δ .	Bemerkungen.
1	20	.	h m s	°			Sternnebel, ein Stern 10. Gr. mit runder gutbegrenzter Helligkeit.
2	52	.	0 19 28	+ 72 49.6	+ 0.33		Großer Sternhaufen im Toucan, in der Mitte verdichtet. S. Taf. 2, Fig. 1.
3	116	31	0 35 53	+ 40 35.0	+ 0.33		Der große Andromeda-Nebel, schon dem bloßen Auge sichtbar. Der Stern 10. Gr. in ihm eine große Anzahl Sterne gesehen.
4	117	32	0 35 54	+ 40 10.7	+ 0.33		Großer, runder, schöner Nebel, nach der Mitte zu heller.
5	256	.	1 11 21	+ 57 40.2	+ 0.32		Doppelstern, der hellere 10. Größe, in der Mitte eines runden Sternhaufens.
6	307	.	1 18 14	+ 8 52.9	+ 0.31		Sehr heller, runder und gegen die Mitte rasch an Licht zunehmender Stern 1. Durchmesser.
7	352	33	1 36 47	+ 30 1.2	+ 0.31		Großer, runder, sehr heller Nebel mit vielen Sternen.
8	372	74	1 29 59	+ 15 8.8	+ 0.31		Kugelförmiger Sternhaufen.
9	385	76	1 34 19	+ 50 53.7	+ 0.31		Heller Doppelnebel.
10	400	.	1 42 25	+ 5 17.3	+ 0.30		Ein Stern 9. Größe steht am äußersten Ende eines sehr feinen Nebelfaden.
11	428	.	1 45 49	+ 40 6.8	+ 0.30		55 Andromedae. Feiner Doppelstern mit einer runden Helligkeit 20" Durchmesser.
12	.	.	2 10 19	+ 56 33.4	+ 0.28		Sternhaufen im Vericus, dem bloßen Auge als lichte Wölke ansehend, besteht aus Sternen 6.—14. Größe; er hat zwei Mittelpunkte und ist in der Mitte einen roten Stern und bildet ein der interessantesten teleskopischen Objecte am Himmel. Die Position gilt für den Stern h Persei.
13	527	.	2 14 46	+ 41 47.4	+ 0.28		Feiner, stark elliptischer Nebel, 4" lang, 40" breit, in der Mitte ein kleiner Stern mit zwei kleinen Sternchen.
14	584	34	2 34 0	+ 42 15.0	+ 0.26		Heller, großer Sternhaufen von länglicher Form.
15	600	77	2 36 16	+ 0 32.0	+ 0.26		Heller, großer Nebel von unregelmäßiger Gestalt; Durchmesser 7".
16	731	.	3 28 52	+ 36 33.5	+ 0.20		Großer, schöner Nebel, umgeben von einem ausgebreiteten Sternhaufen.
17	.	45	3 40 3	+ 23 43.0	+ 0.19		Die Plejaden. Die Gruppe enthält 1 Stern 3. Größe, 4 Sterne 4. Größe, 4 Sterne 5. Gr., 2 Sterne 6. Gr. Der Ort gilt für den Stern 1. Gr. (Alcyon).
18	810	.	4 1 25	+ 20 27.0	+ 0.16		Stern 3. Größe mit einem Nebel von 25" Durchmesser.
19	822	.	4 7 9	+ 33 10.3	+ 0.16		Sehr heller, länglicher Nebel, in der Mitte und an dem einen Ende als am Rande; ihm folgt ein zweiter Nebel. Nebel im S. Taf. 2, Fig. 2.

Numm.	Rekt.	Decl.	Größe	Abstände	Abstände	Abstände	Abstände	Abstände	Abstände	Bemerkungen.
20	875	h m s	4 28 53	+1° 52'	- 54 52'	+ 0° 13'				Heller, großer, ausgebreiteter Nebel.
21	1060	5 9 20	- 0° 31'	- 68 54'	+ 0° 07'					Großer, heller Sternhaufe, von länglicher Form.
22	1061	5 9 59	+ 1° 17'	- 40 11 3	+ 0° 07'					Kugelförmiger Sternhaufe, in der Mitte beträchtlich besser.
23	1067	5 11 29	+ 1° 41'	+ 39 12 5	+ 0° 07'					Reiche Gruppe mit einem orangefarbenen Stern 7. Größe.
24	1112	7 9 19	+ 2° 47'	- 24 38 8	+ 0° 06'					Sehr reich und großer Sternhaufe von kugelförmiger Gestalt.
25	1119	5 20 17	+ 4° 02'	+ 35 43 2	+ 0° 06'					Heller, großer Sternhaufe von unregelmäßiger Form, aus vielen Sternen bestehend.
26	1137	5 23 10	+ 3° 57'	+ 44 8 7	+ 0° 05'					Dreifacher Stern, von einem runden Nebel umgeben. Die Sterne bilden ein kleines gleichseitiges Dreieck.
27	1157	1 5 26 58	+ 3° 00'	+ 31 55 4	+ 0° 05'					Ein eigentümliches, sehr schönes Nebelgebilde mit sehr vielen kleinen Sternen, von Herschel „Crab-Nebula“ genannt.
28	1166	3 6 29 3	+ 3° 07'	+ 34 3 2	+ 0° 05'					Heller, großer, reicher Sternhaufe von länglicher Form mit Sternen von 9.—11. Größe.
29	1179	4 2 28 8	+ 2° 54'	- 5 28 5	+ 0° 04'					Der große Nebel bei 8° Orionis. Siehe Taf. 2, Fig. 4.
30	1185	4 3 22 23	+ 2° 05'	- 5 21 1	+ 0° 04'					(144 Bode Orionis.) Großer Nebel, in der Mitte ein Stern 8. Größe.
31	1193	5 29 52	+ 2° 01'	- 1 17 1	+ 0° 04'					(a Orionis.) Hitzstern, in einen großen Nebel eingebüllt.
32	1225	5 35 16	+ 3° 28'	+ 9 1 5	+ 0° 03'					Planetarischer, etwas elliptischer Nebel von 12" Durchmesser.
33	1269	7 39 34	+ 3° 42'	- 69 9 9	+ 0° 03'					Sehr heller und großer Nebel, am Rande fastig.
34	1267	7 40 28	+ 3° 42'	- 0 9 1	+ 0° 03'					Großer, heller Nebel, in welchem drei Sterne stehen.
35	1295	3 44 6	+ 3° 32'	- 32 30 6	+ 0° 02'					Großer Sternhaufe mit vielen hellen und schwachen Sternen.
36	1360	3 6 1 8	+ 3° 08'	- 24 20 7	- 0° 00'					Reicher Sternhaufe in Spiralform.
37	1425	6 25 48	+ 3° 31'	+ 10 14 8	- 0° 04'					Stern 11. Größe mit rundem, milchigem Nebel, 70—80" Durchmesser.
38	1437	6 32 20	+ 3° 28'	- 8 50 9	- 0° 05'					Stern 11. Größe mit sächerartigem Nebelschweif.
39	1440	6 34 6	+ 3° 30'	+ 9 59 8	- 0° 05'					(15 Monoceros.) Ein Stern 4. Größe, 15 schwache und eine Anzahl sehr schwache Sterne sind von einem Nebel umhüllt.
40	1454	6 41 39	+ 2° 58'	- 20 36 9	- 0° 06'					Großer, reicher Sternhaufe von länglicher Form mit einem Stern 8. Größe.
41	1465	6 45 21	+ 3° 09'	+ 0 36 3	- 0° 07'					Sterngruppe in drei Rehe gespalten, 20" Durchmesser, an der Hauptseite ein Doppeltstern.
42	1467	6 47 48	+ 3° 50'	+ 18 9 8	- 0° 07'					Sächerartig ausgebreiteter Sternhaufe, 6' lang und breit.
43	1503	6 56 56	+ 2° 58'	- 8 9 8	- 0° 08'					Großer, ausgebreiteter Sternhaufe mit schwachen Sternen.
44	1507	6 58 15	+ 2° 52'	- 11 8 1	- 0° 08'					Doppeltstern in der Mitte eines runden Nebels.
45	1530	7 17 41	+ 3° 19'	- 29 44 0	- 0° 11'					Doppeltstern, Durchmesser des Kerns 30".
46	1532	7 21 46	+ 3° 56'	- 21 9 7	- 0° 12'					Planetarischer, runder Nebel von 12" Durchmesser.
47	1564	7 36 6	+ 2° 54'	- 14 31 9	- 0° 14'					Planetarischer Nebel von 56" Durchmesser, mit gleichmäßigem Lichte.
48	1571	9 39 27	+ 2° 15'	- 23 34 8	- 0° 14'					Großer, länglicher, sehr reicher Sternhaufe mit Sternen 8.—13. Größe.
49	1593	7 47 51	+ 2° 13'	- 38 13 4	- 0° 15'					Niemlich ausgebreiteter, heller Sternhaufe.
50	1594	7 49 2	+ 2° 13'	- 15 5 6	- 0° 15'					Sternhaufen ohne Nebel.
51	1637	8 7 35	+ 2° 46'	- 5 25 2	- 0° 18'					Reiche Gruppe von Sternen 9.—13. Größe mit vielen kleinen hellen Punkten, in der Mitte ein Doppeltstern.
52	1678	8 32 5	+ 2° 57'	- 29 31 4	- 0° 21'					Feiner Sternhaufen, bestehend aus Sternen 11.—13. Größe; Durchmesser 6'.
53	1681	8 33 1	+ 3° 46'	+ 20 24 3	- 0° 21'					Die Krippe in Krebs. Besteht aus 11 Sternen 7. Größe, 18 Sternen 8. Gr. und vielen schwachen.
54	1684	8 34 43	+ 4° 24'	+ 50 39 1	- 0° 21'					Elliptischer Nebel, in der Mitte hell, 30" lang, 20" breit.
55	1698	8 40 19	+ 3° 37'	+ 13 3 6	- 0° 22'					Schöne Sterngruppe. Viele Sterne 9.—10. Größe stehen um einen Centralstern.
56	1712	8 44 24	+ 3° 29'	+ 12 16 1	- 0° 22'					Heller, großer Sternhaufe mit Sternen 10.—15. Größe.
57	1721	8 48 6	+ 3° 03'	- 2 35 4	- 0° 22'					Elliptischer, an den Enden sehr kugelförmiger Nebel, an jedem Ende ein Sternchen.
58	1729	8 49 53	+ 4° 41'	+ 54 14 7	- 0° 23'					Stern 11. Größe mit einem hellen, sächerartigen Nebel.
59	1783	9 7 44	+ 2° 25'	- 41 55 5	- 0° 24'					Planetarischer Nebel, einem Stern 9. Größe einschließend.
60	1793	9 9 28	+ 1° 18'	- 64 27 8	- 0° 25'					Großer, kugelförmiger Sternhaufe, in der Mitte verdichtet; Durchmesser 11'.
61	1801	9 10 58	+ 2° 42'	- 36 6 8	- 0° 25'					Großer, ziemlich heller, planetarischer Nebel.
62	1843	9 17 54	+ 1° 09'	- 57 46 8	- 0° 25'					Planetarischer Nebel, an Hellheit einem Sterne 8. Größe gleichend.
63	1949	9 45 5	+ 2° 57'	+ 69 39 7	- 0° 28'					1774 von Bode entdeckt. Elliptischer, sehr breiter Nebel, schwache Strahlen am Rande, der höchste Teil 4' lang, 4' breit.
64	1950	9 45 9	+ 5° 14'	+ 70 21 6	- 0° 28'					Sehr großer, heller, ausgebreiteter Nebel.
65	2017	10 1 46	+ 2° 52'	- 39 49 4	- 0° 29'					Großer, planetarischer Nebel, in der Mitte ein Stern 9. Größe.
66	2063	10 10 44	- 0° 51'	- 80 14 8	- 0° 30'					Planetarischer, ziemlich heller, kleiner Nebel, in der Nähe drei schwache Sterne.
67	2067	10 12 18	+ 2° 13'	- 57 20 1	- 0° 30'					Heller, großer Nebel mit einem Doppeltstern.
68	2099	10 18 20	+ 2° 45'	- 17 47 2	- 0° 30'					Stern 9. Größe mit elliptischem Nebel.
69	2102	10 18 45	+ 3° 29'	- 18 0 4	- 0° 30'					Planetarischer Nebel, zwei elliptische Ringe, im Centrum ein Kern (Abbildung Taf. 2, Fig. 5).
70	2138	10 30 56	+ 3° 77'	+ 54 9 5	- 0° 31'					Runder, heller, gegen die Mitte stark zunehmender Nebel, Kern 15", Nebelhülle 1' Durchmesser.
71	2184	9 55 10 37 24	+ 3° 17'	+ 12 20 9	- 0° 31'					Großer, runder Nebel, nach der Mitte zu heller werdend.
72	2194	9 56 10 40 8	+ 3° 47'	+ 12 28 4	- 0° 31'					Sehr großer, heller, langgestreckter Nebel, in der Mitte verdichtet.
73	2197	10 40 11	+ 2° 51'	- 59 1 5	- 0° 31'					Der große Nebel bei γ Argus.
74	2306	11 1 19	+ 2° 53'	- 57 59 9	- 0° 32'					Sehr großer runder Sternhaufe mit Sternen 8.—12. Größe.
75	2343	9 7 17	+ 3° 51'	+ 55 41 5	- 0° 33'					Planetarischer, heller Nebel von 3' Durchmesser.
76	2373	6 5 12 24	+ 3° 14'	+ 13 66 3	- 0° 33'					Elliptischer großer Nebel mit rundem, spiralförmig gebundenen Kern.
77	2377	6 6 13 36	+ 3° 14'	+ 13 39 8	- 0° 33'					Großer, heller Nebel, in der Mitte verdichtet, zwei Sterne gehen nördlich voraus.
78	2445	11 26 34	+ 3° 28'	+ 47 44 1	- 0° 33'					Langer, heller, elliptisch geformter Sternnebel, 4' lang, 2' breit.
79	2457	11 46 18	+ 3° 15'	+ 44 49 4	- 0° 33'					Schöner, heller, runder Nebel, am Rande sehr verdichtet; Durchmesser 3—4'.
80	2671	11 55 30	+ 2° 06'	- 18 10 2	- 0° 33'					Der nördlichere von zwei runden ineinander verschlungenen Nebeln, beide in der Mitte heller.
81	2786	9 12 7 26	+ 3° 06'	+ 15 36 0	- 0° 33'					Nebel in Streifenform von 10' Länge.
82	2795	12 8 31	+ 3° 06'	+ 13 51 0	- 0° 33'					Elliptischer, spindelförmiger Nebel, im Kern Nebel ein kleiner Stern.
83	2838	12 12 28	+ 3° 05'	+ 15 6 9	- 0° 33'					Großer Nebel, in der Mitte heller, aus drei spiralförmigen Zweigen bestehend.
84	2878	6 12 15 31	+ 3° 05'	+ 5 10 1	- 0° 33'					Sehr großer, heller Nebel, mit doppeltem Kern.
85	2892	100 12 16 36	+ 3° 04'	+ 16 31 1	- 0° 33'					Großer, schwacher Nebel mit zwei spiralförmigen Zweigen.
86	2915	12 17 55	+ 3° 04'	+ 5 37 5	- 0° 33'					Stern 8.—9. Größe mit einem hellen, runden Ellipsoid.
87	2946	84 12 18 43	+ 3° 04'	+ 13 24 9	- 0° 33'					Heller, runder, ziemlich großer Nebel.
88	2946	85 12 19 5	+ 3° 03'	+ 18 52 8	- 0° 33'					Heller, ziemlich großer, runder Nebel, in der Mitte verdichtet, ein Stern geht nördlich voraus.
89	2958	12 19 37	+ 2° 99'	+ 34 14 4	- 0° 33'					Zwei aneinanderhängende Nebel, 10' lang, 3' breit.
90	2961	86 12 19 46	+ 3° 04'	+ 13 37 8	- 0° 33'					Heller, großer, runder Nebel mit Kern.
91	3021	49 12 23 25	+ 3° 03'	- 8 41 3	- 0° 33'					Heller, großer Nebel, nach der Mitte zu verdichtet.
92	3035	87 12 26 30	+ 3° 04'	+ 13 4 5	- 0° 33'					Heller, großer, runder Nebel, in der Mitte verdichtet.
93	3049	88 12 25 40	+ 3° 05'	+ 15 6 6	- 0° 33'					Sehr großer, ausgebreiteter, ziemlich heller Doppeltstern.
94	3097	89 12 29 21	+ 3° 03'	+ 13 14 9	- 0° 33'					Ein nach der Mitte heller werdender, runder, kleiner Nebel.
95	3106	12 30 8	+ 2° 99'	+ 26 40 5	- 0° 33'					Nebelflecken von 15' Länge mit schwachem Kern, in dessen Mitte ein Stern 11. Größe.
96	3111	90 12 30 38	+ 3° 03'	+ 13 50 7	- 0° 33'					Niemlich großer Nebel mit Kern.
97	3121	55 12 31 22	+ 3° 03'	+ 12 30 2	- 0° 33'					Großer, heller, unregelmäßig geformter Nebel, in der Mitte verdichtet.

Reihen- nummer.	Stellzeit.	Rekt.	Decl.	Größe Helligkeit für 1000.	Jährliche Ver- änderung.	Wendung für 1000.	Jährliche Ver- änderung.	Bemerkungen.
96	3123	68	12 32 53	+ 3.17	- 26 3.7	- 0.33		Großer, kugelförmiger Sternhaufe, sehr reich, ein rötlicher Stern in der Mitte, elliptischer Nebel 2' lang, 1' breit. Zwischen dem lichten Kern und dem Nebel ein dunkler Ring.
99	3132	-	12 33 31	+ 3.11	- 10 55.2	- 0.33		Sehr kleiner, elliptischer Nebel, 2' lang, 1' breit. Zwischen dem lichten Kern und dem Nebel ein dunkler Ring.
100	3155	59	12 35 42	+ 3.03	+ 12 21.0	- 0.33		Niemlich großer, ausgebeuteter Nebel, dem zwei Sterne vorangehen.
101	3165	-	12 36 7	+ 2.93	+ 33 13.7	- 0.33		Langer, elliptischer Streifen mit schwachem Kern, worin ein heller Stern.
102	3182	60	12 32 20	+ 3.02	+ 12 14.4	- 0.33		Niemlich heller, großer, runder Doppelnebel.
103	3189	-	12 37 52	+ 2.93	+ 32 51.2	- 0.33		Zwei elliptische Nebel, der größere heller.
104	3190	-	12 35 0	+ 2.92	+ 32 55.6	- 0.33		Großer, irregulär geformter Nebel mit hellem Kern.
105	3258	91	12 45 0	+ 2.84	+ 41 45.5	- 0.33		Munter Nebel von 40" Durchmesser.
106	3270	-	12 45 33	+ 2.17	+ 73 33.5	- 0.33		x Crucis. Auf einem Flächenraum von 1/40° zeigen sich über 1000
107	3275	-	12 46 15	+ 3.13	- 59 40.3	- 0.33		7.-15. Größe, von denen mehrere rot, grün und blau gefärbt sind.
108	3321	64	12 50 36	+ 2.95	+ 22 21.8	- 0.33		Sehr feiner Doppelstern mit hellem, rundem Nebel von 6" Durchmesser.
109	3340	-	12 53 6	+ 2.85	+ 35 33.1	- 0.33		Schwacher, elliptischer Nebelstrahl mit zwei Sternen an seinen Enden.
110	3356	-	12 54 20	+ 3.03	+ 3 10.1	- 0.32		Quadr. Nebel, an dem einen Ende ein Stern 10. Größe.
111	3453	53	13 6 46	+ 2.94	+ 18 50.1	- 0.32		Sternhaufen mit Sternen 10.-15. Größe, in der Mitte sehr hell, ganz wie ein Stern.
112	3474	63	13 10 12	+ 2.70	+ 42 41.5	- 0.32		Hand frummlinige Baden, Durchmesser 2'.
113	3525	-	13 18 7	+ 3.48	+ 42 21.9	- 0.31		Heller, großer Nebel von länglicher Form mit Kern.
114	3531	-	13 19 17	+ 3.55	+ 46 39.5	- 0.31		Großer, heller, langgestreckter Nebel, weißlich.
115	3572	51	13 24 34	+ 2.54	+ 47 50.3	- 0.31		Wunderbarer Sternhaufe bei 10 Centauri, dem bloßen Auge als Stern erscheinend, von Sternen 12.-15. Größe gebildet; Durchmesser 10'.
116	3570	-	13 24 43	+ 4.13	- 65 19.9	- 0.31		Von einem lichten, strahligen Kern gehen spiralförmige Windungen aus, durch ein schwächeres Herdfeuer als Nebelring erscheinen. Nach Jagdbunden, f. Taf. 1, Fig. 1.
117	3606	83	13 29 59	+ 3.36	- 29 14.2	- 0.31		Beträchtlich länglicher, ziemlich großer, gekrümmter Nebel, in welchem Sterne stehen.
118	3636	-	13 36 22	+ 2.77	- 29 0.3	- 0.30		Großer, heller Nebel mit Kern und drei spiralförmigen Zweigen.
119	3705	-	13 50 14	+ 3.58	- 39 22.2	- 0.30		Wenigstens 1000 Sterne 11. Größe; nahe in der Mitte des Himmels.
120	3770	101	13 58 45	+ 2.13	+ 54 58.3	- 0.29		Ein großer, heller Nebel von länglicher Form mit Doppelstern.
121	3776	-	13 59 49	+ 2.70	+ 29 7.5	- 0.29		Großer, ziemlich heller Nebel von unregelmäßiger Gestalt mit kleinem Kern.
122	4051	-	15 1 43	+ 2.72	+ 20 2.5	- 0.23		Sehr große, runde Gruppe von 8-10" Durchmesser, mit einem lichten Kern.
123	4052	-	15 1 50	+ 2.72	+ 30 7.5	- 0.23		Zwei elliptische, aneinandergehende Nebel.
124	4083	5	15 12 13	+ 3.03	- 29 33.5	- 0.22		Großer, sehr reicher, aus Sternen 11.-13. Größe bestehender Sternhaufen.
125	4118	-	15 31 22	+ 2.95	+ 6 23.8	- 0.20		Sehr reicher, runder Sternhaufe, in der Mitte sehr verdichtet.
126	4132	-	15 37 52	+ 3.90	- 37 22.3	- 0.19		Niemlich heller, kleiner, planetarischer Nebel.
127	4173	80	16 9 35	+ 3.57	- 22 39.9	- 0.15		Kugelförmiger Sternhaufe mit Sternen 12.-15. Größe, nach der Mitte verdichtet.
128	4183	4	16 15 58	+ 3.66	- 20 13.4	- 0.15		Großer, heller, kugelförmiger Sternhaufe, in der Mitte stark verdichtet.
129	4230	13	16 37 13	+ 2.14	+ 36 41.9	- 0.12		Sternhaufe mit mehreren hellen Sternen.
130	4238	12	16 40 45	+ 3.11	- 1 43.5	- 0.11		Von Halley 1718 entdeckt. Mehrere laufend Sterne 10.-15. Größe.
131	4256	10	16 50 35	+ 3.16	- 3 53.6	- 0.10		Wunder in Strahlen auslaufend; Durchmesser 7-8".
132	4260	-	16 51 42	+ 4.33	- 44 28.3	- 0.10		Percules, f. Taf. 1, Fig. 2.
133	4261	62	16 53 16	+ 3.81	- 29 53.1	- 0.10		Großer, heller, kugelförmiger Sternhaufe, in der Mitte sehr verdichtet.
134	4264	19	16 54 55	+ 4.72	- 41 36.6	- 0.07		Großer, heller, kugelförmiger Sternhaufe mit ziemlichem Kern. Durchmesser 10'.
135	4284	-	17 10 52	+ 3.70	- 36 4.0	- 0.07		Großer, sehr reicher, aus Sternen 11.-13. Größe bestehender Sternhaufen.
136	4287	9	17 11 50	+ 3.51	- 18 24.0	- 0.07		Großer, runder, heller Sternhaufe, in der Mitte sehr verdichtet.
137	4294	92	17 13 25	+ 1.84	+ 43 15.5	- 0.07		Niemlich heller, kleiner, planetarischer Nebel.
138	4302	-	17 21 45	+ 3.65	- 23 38.6	- 0.05		Nebel von 3-4" Durchmesser, in fasten Herdfeuer in sehr nahe Sterne auflösbar.
139	4315	14	17 31 3	+ 3.15	- 3 10.0	- 0.04		Großer, heller, kugelförmiger Sternhaufe, in der Mitte sehr verdichtet.
140	4318	6	17 31 54	+ 3.90	- 32 7.7	- 0.04		Niemlich heller, kleiner, planetarischer Nebel.
141	4340	7	17 45 40	+ 4.00	- 34 46.9	- 0.02		Großer, sehr reicher, aus Sternen 11.-13. Größe bestehender Sternhaufen.
142	4346	23	17 49 34	+ 3.53	- 19 0.0	- 0.01		Großer, heller, kugelförmiger Sternhaufe, in der Mitte sehr verdichtet.
143	4355	20	17 54 47	+ 3.64	- 23 1.8	- 0.01		Niemlich heller, kleiner, planetarischer Nebel.
144	4361	8	17 56 13	+ 3.68	- 24 21.3	- 0.01		Großer, sehr reicher, aus Sternen 11.-13. Größe bestehender Sternhaufen.
145	4367	21	17 57 8	+ 3.63	- 22 32.2	- 0.00		Großer, sehr reicher, aus Sternen 11.-13. Größe bestehender Sternhaufen.
146	4390	-	18 6 1	+ 2.91	+ 6 49.5	+ 0.01		Großer, sehr reicher, aus Sternen 11.-13. Größe bestehender Sternhaufen.
147	4395	-	18 9 40	+ 3.53	- 19 54.9	+ 0.01		Großer, sehr reicher, aus Sternen 11.-13. Größe bestehender Sternhaufen.
148	4397	24	18 11 6	+ 3.52	- 18 27.9	+ 0.02		Großer, sehr reicher, aus Sternen 11.-13. Größe bestehender Sternhaufen.
149	4400	16	18 11 48	+ 3.40	- 13 49.8	+ 0.02		Großer, sehr reicher, aus Sternen 11.-13. Größe bestehender Sternhaufen.
150	4401	18	18 12 37	+ 3.48	- 17 10.9	+ 0.02		Großer, sehr reicher, aus Sternen 11.-13. Größe bestehender Sternhaufen.
151	4403	17	18 13 29	+ 3.46	- 16 13.3	+ 0.02		Großer, sehr reicher, aus Sternen 11.-13. Größe bestehender Sternhaufen.
152	4406	28	18 16 51	+ 3.69	- 24 56.1	+ 0.02		Großer, sehr reicher, aus Sternen 11.-13. Größe bestehender Sternhaufen.
153	4411	69	18 23 12	+ 3.92	- 32 26.0	+ 0.03		Großer, sehr reicher, aus Sternen 11.-13. Größe bestehender Sternhaufen.
154	4424	22	18 28 47	+ 3.66	- 23 59.8	+ 0.04		Großer, sehr reicher, aus Sternen 11.-13. Größe bestehender Sternhaufen.
155	4428	70	18 35 3	+ 3.91	- 32 24.4	+ 0.05		Großer, sehr reicher, aus Sternen 11.-13. Größe bestehender Sternhaufen.
156	4432	26	18 38 22	+ 3.29	- 2 31.0	+ 0.06		Großer, sehr reicher, aus Sternen 11.-13. Größe bestehender Sternhaufen.
157	4437	11	18 44 26	+ 3.22	- 6 25.2	+ 0.06		Großer, sehr reicher, aus Sternen 11.-13. Größe bestehender Sternhaufen.
158	4442	54	18 47 4	+ 3.85	- 30 37.5	+ 0.07		Großer, sehr reicher, aus Sternen 11.-13. Größe bestehender Sternhaufen.
159	4447	57	18 48 33	+ 2.23	+ 32 52.1	+ 0.07		Großer, sehr reicher, aus Sternen 11.-13. Größe bestehender Sternhaufen.
160	4485	56	19 11 42	+ 3.34	+ 29 57.9	+ 0.10		Großer, sehr reicher, aus Sternen 11.-13. Größe bestehender Sternhaufen.
161	4499	-	19 25 36	+ 2.87	+ 8 58.2	+ 0.12		Großer, sehr reicher, aus Sternen 11.-13. Größe bestehender Sternhaufen.
162	4503	55	19 32 5	+ 3.82	- 31 13.8	+ 0.13		Großer, sehr reicher, aus Sternen 11.-13. Größe bestehender Sternhaufen.
163	4510	-	19 36 54	+ 3.39	+ 14 26.8	+ 0.14		Großer, sehr reicher, aus Sternen 11.-13. Größe bestehender Sternhaufen.
164	4520	70	19 47 9	+ 2.67	+ 18 27.4	+ 0.15		Großer, sehr reicher, aus Sternen 11.-13. Größe bestehender Sternhaufen.
165	4532	27	19 54 8	+ 2.59	+ 22 22.7	+ 0.16		Großer, sehr reicher, aus Sternen 11.-13. Größe bestehender Sternhaufen.
166	4543	75	19 58 42	+ 3.55	- 22 16.0	+ 0.16		Großer, sehr reicher, aus Sternen 11.-13. Größe bestehender Sternhaufen.
167	4550	-	20 2 44	+ 2.64	+ 20 44.7	+ 0.17		Großer, sehr reicher, aus Sternen 11.-13. Größe bestehender Sternhaufen.
168	4565	-	20 11 22	+ 2.49	+ 30 11.2	+ 0.18		Großer, sehr reicher, aus Sternen 11.-13. Größe bestehender Sternhaufen.

Verhel.	Messr.	Größe Ausführung für 1853.	Jährliche Ver- änderung.	Veränderung in 1873.	Jährliche Ver- änderung.	Bemerkungen.
4572	.	h m s 20 16 49	+ 2 ^m .68	+ 19 42 ^m .5	+ 0 ^m .19	Feiner, planetarischer Nebel, Durchmesser 20–30". In der Nähe stehen vier kleine Sterne.
2078	99	20 12 25	+ 2.21	+ 38 6.5	+ 0.19	Länglicher Sternhaufe.
4600	.	20 40 34	+ 2.48	+ 30 16.0	+ 0.22	x Cygn. Langer, gewundener Streifen, milchfarbig, 30" lang.
4608	72	20 46 34	+ 3.30	+ 13 0.3	+ 0.22	Runder Sternhaufe, gegen die Mitte ziemlich hell; Durchmesser 2".
4616	.	20 31 12	+ 2.48	+ 31 13.2	+ 0.23	Ueber einen Grad langer Nebel, die eine Hälfte gabelförmig gespalten.
4617	73	20 52 6	+ 3.31	+ 13 7.1	+ 0.23	Sternhaufe, sehr verdichtet, nicht nebelartig.
4640	.	21 3 14	+ 1.95	+ 50 20.4	+ 0.24	Unentbar zerstreute Gruppe mit mehreren reichlichen Sternen.
4670	15	21 23 53	+ 2.89	+ 51 26.6	+ 0.26	1745 von Paraldi entdeckt. Unregelmäßiger, runder, gegen die Mitte hellerer Sternhaufe.
4676	.	21 26 13	+ 2.04	+ 51 20.0	+ 0.26	Nicht sehr gedrängte Gruppe von 8' Durchmesser, in der Mitte ein Stern 11. Größe.
4678	2	21 26 59	+ 3.09	+ 1 22.8	+ 0.26	Gegen die Mitte sehr hell, gleichsam flammend, die Gruppe gleicht einem Haufen Goldsternchen. Der hellste Theil hat 1 1/2' Durchmesser und gleicht einem Stern 6. Größe.
4681	39	21 37 45	+ 2.16	+ 47 53.0	+ 0.26	Großer Sternhaufen, aus 5 Sternen 7.–12. Größe bestehend.
4687	30	21 33 17	+ 3.42	+ 23 44.0	+ 0.27	Kugelförmiger, großer, heller Sternhaufe, in der Mitte verdichtet.
4701	.	21 39 53	+ 2.05	+ 53 7.3	+ 0.27	Ein ovaler Ring von kleinen Sternen; Durchmesser 4". In der Mitte des Ringes ein Stern 9. Größe von rubinrother Farbe.
4702	.	21 40 6	+ 1.39	+ 65 31.8	+ 0.27	Dreieckiger Stern in der Mitte eines schwachen, schlechtbegrenzten Nebels.
4815	.	22 31 22	+ 2.74	+ 33 44.6	+ 0.31	Sehr heller, elliptischer Nebel, rasch gegen die Mitte hell werdend, 90" lang, 30" breit. An demselben ein anderer Nebel von 16" Durchmesser.
4892	.	22 58 41	+ 3.00	+ 11 38.9	+ 0.32	Langer, fadenförmiger Nebel, 2' lang, 30" breit. An beiden Enden steht ein Stern 12. Größe, im Innern des Nebels noch drei sehr feine Sternchen.
4902	.	23 6 5	+ 2.54	+ 59 53.5	+ 0.33	Reicher, sehr dichter Sternhaufe mit ziemlich hellen Sternen.
4957	52	23 18 43	+ 2.64	+ 60 54.6	+ 0.33	Großer, reicher, runder Sternhaufe, in der Mitte verdichtet.
4964	.	23 19 53	+ 2.86	+ 41 51.0	+ 0.33	Heller, runder, planetarischer Nebel von bläulicher Färbung.

unserer Tafeln 1 und 2 zeigen in ihren Ecken von genannten Nebelflecken und Sternhaufen die folgenden bildlichen Darstellungen:

1, Fig. 2 die Plejaden, wie sie in einem Kometenrohr (einem Fernrohr mit etwa zehnfacher Vergrößerung) sichtbar sind. Der hellste Stern in der Mitte η Tauri = Alcyone ($AR = 3^h 40^m 3^s$, $\delta = +23^\circ 43'$) ist 3. Größe, von dem ihn umgebenden sind zwei Sterne von der 4., drei Sterne von der 5. Größe, welche das bloße Auge leicht unterscheidet, außerdem zwei von schwach 6. und einige 40 teleskopische.

f. 1, Fig. 3 stellt den Sternhaufen im Hercules ($AR = 16^h 37^m 13^s$, $\delta = +36^\circ 42'$) dar, der nach der Mitte hin sehr verdichtet ist, so daß man die einzelnen Sterne kaum unterscheiden kann; nach dem Rande zu läßt er seine Natur deutlich erkennen.

f. 1, Fig. 4 ist ein interessanter spiralförmiger Nebel in den Jagdhunden ($AR = 13^h 24^m 34^s$, $\delta = +47^\circ 50'$), der in der Mitte eine starke Verdichtung hat, ebenso in einem Nebenzweige; in der Nähe des Nebels stehen einige Sterne.

if. 1, Fig. 5 zeigt uns einen interessanten ringförmigen Nebel ($AR = 18^h 48^m 53^s$, $\delta = +32^\circ 52'$), der zwischen β und γ Lyrae sich befindet und in dessen Nähe zwei schwache Sternchen stehen.

if. 2, Fig. 2 zeigt ein Nebelsystem im Eridanus ($AR = 4^h 7^m 9^s$, $\delta = -33^\circ 10'$), bestehend aus einem länglichen Nebel, der in der Mitte und nach dem einen Ende hin verdichtet ist und außerdem noch einen kleinen runden Nebel neben sich hat.

af. 2, Fig. 3 stellt einen Sternhaufen im Toucan ($AR = 0^h 18^m 28^s$, $\delta = -72^\circ 47'$) dar, der in der Mitte ebenso verdichtet ist, wie der Nebel im Hercules, einen viel größeren Raum einnimmt und an den Rändern viel zerstreute Sterne, darunter zwei hellere nahe der Verdichtungsstelle hat.

af. 2, Fig. 4 zeigt uns den schon von Huyghens gezeichneten Orionnebel ($AR = 5^h 29^m 8^s$, $\delta = -5^\circ 28'$), nach einer Zeichnung, wie ihn Lord Rosse in seinem großen Spiegelteleskop in Parsonstown gesehen hat. In der Nähe des mittlern hellsten Theils

erkennt man vier ganz nahe beieinanderstehende Sterne von der 4. (θ^1 Orionis), 6., 7. und 8. Größe, welche das Trapez genannt werden. In starken Fernrohren sind darin noch ein 5. Stern und ein schwacher 6. Stern sichtbar. Der Nebel breitet sich von der Mitte nach beiden Seiten sehr unregelmäßig aus, die linke Seite des Nebels ist viel breiter als die rechte, doch mit dem mittlern Theile in Zusammenhang, während nach oben (nach Süden) hin, nur durch ganz feine Brücken mit dem Hauptnebel verbunden, zwei Nebelstreifen sichtbar sind und nach unten isolirt, ziemlich verdichtete Nebelmassen sich zeigen, die von einem Nebelbogen eingefasst sind.

Zaf. 2, Fig. 5 zeigt uns einen Nebel von eigenthümlicher Gestalt in der Schlange ($AR = 10^h 18^m 45^s$, $\delta = -18^\circ 0'$); zwei elliptische concentrische Ringe von Nebelmasse sind sichtbar und das Centrum wird eingenommen durch eine Art Kern, der intensiver als seine Umgebung, gleichsam als Mittelpunkt der Nebelmassen erscheint.

h) Die Doppelsterne.

Unter der großen Anzahl von Sternen sieht schon das bloße Auge einige, welche sehr nahe beieinander stehen, z. B. ζ im großen Vären: Mirzar, ein Stern 2. Größe, und Altor, ein Stern 5. Größe, deren Entfernung 11' ist, α^1 und α^2 Capricorni, 6 1/2' Entfernung, ϵ und δ Lyrae, 3 1/2' Entfernung; solche Sterne werden Doppelsterne genannt. Als das Fernrohr auf die Fixsterne angewandt wurde, entdeckte man eine sehr große Anzahl Doppelsterne, und stellte sich zuerst William Herschel in größerem Umfange die Aufgabe der Beobachtung derselben und war viele Jahre damit beschäftigt.

Als bei einzelnen Doppelsternen constatirt wurde, daß sie sich um einen gemeinschaftlichen Schwerpunkt bewegten, erlangten diese Himmelskörper das ihnen gebührende Recht, zu den interessanten Objecten am Himmel gerechnet zu werden.

Gleich als man die große Zahl der Doppelsterne erkannte, hatte man mit Hülfe der Wahrscheinlichkeitsrechnung gefunden, daß ein großer Theil dieser Doppelsterne in irgendeinem Zusammenhange stehen müsse,

weil die Zahl derjenigen Doppelsterne, die unter einer großen Menge von Sternen, bei denen jede Vertheilung zulässig ist, nach der Rechnung zufällig beieinanderstehen könnten, eine ganz geringe sein würde. Die Doppelsterne, bei welchen die Sterne nur so nahe beieinander erscheinen, ohne daß irgendeine nähere Beziehung zwischen den Sternen stattfindet, heißen optische, während diejenigen Doppelsterne, welche infolge gegenseitiger Nähe aufeinander einwirken, sodaß sie umeinander Bahnen beschreiben physikalische genannt werden.

Das erste Verzeichniß von 80 Doppelsternen besitzen wir von dem Astronom Mayer in Mannheim im „Berliner Jahrbuch“ für 1784, aber vollständiger Kataloge erhielten wir erst durch W. und J. Herschel und W. Struve. Während Mayer in seinem Verzeichniß Sterne von 2" bis 72" Distanz hatte und schon ganz abjah von den für das bloße Auge sichtbaren Doppelsternen, stellte W. Herschel bestimmte Grenzen auf und theilte die von ihm beobachteten Doppelsterne in sechs Klassen. Zur ersten Klasse rechnete er alle diejenigen, welche weniger als 4" Distanz, zur zweiten die zwischen 4" und 8", zur dritten die zwischen 8" und 16", zur vierten die zwischen 16" und 32", zur fünften die zwischen 32" und 60", zur sechsten alle über 60". Struve schränkte bei der großen Anzahl von Doppelsternen die größte Entfernung bis auf 32" Distanz ein und bildete acht Klassen.

Es gehören zu seiner ersten Klasse Doppelsterne zwischen 0" bis 1", zur zweiten zwischen 1" bis 2", zur dritten von 2" bis 4", zur vierten von 4" bis 8", zur fünften von 8" bis 12", zur sechsten zwischen 12" bis 16", zur siebenten zwischen 16" bis 24", zur achten bis zu 32", und diese Struve'sche Eintheilung ist jetzt ziemlich allgemein im Gebrauch.

Von 2634 beobachteten Doppelsternen gehören nach Struve 91 der ersten Klasse, 314 der zweiten, 535 der dritten, 582 der vierten, 452 der fünften, 231 der sechsten, 429 den letzten zwei Klassen an.

Unter den 20 Sternen 1. Größe sind, da wir α Crucis und η Argus auch dazu rechnen, mindestens fünf Doppelsterne, unter den 65 Sternen 2. Größe wenigstens sieben.

In einem besondern Werke: „Mensurae micrometricae stellarum duplicium et multiplicium“, hat Struve von 2634 Sternpaaren die Stellungen der Doppelsterne zweinander bestimmt. Man nennt den Winkel, den die Richtung zwischen den beiden Sternen mit der Richtung bildet, die durch den Declinationskreis bestimmt ist, den Positionswinkel und zählt ihn von 0 bis 360°, von Nord an durch Ost, Süd und West gehend, und gibt außer diesem Positionswinkel noch die Distanz zwischen den beiden Sternen an.

Doch nicht nur Doppelsterne, sondern auch mehrfache gibt es am Himmel, und unter den erwähnten 2634 Sternpaaren finden sich bei Struve 64 dreifache, drei vierfache und ein sechsfacher Stern. Bis zu einer Entfernung von 75" gibt es 113 dreifache, 9 vierfache und zwei fünf- und mehrfache Sterne.

Schon ein gewöhnlicher Beobachter findet bei einer kurzen Betrachtung des Himmels die Sterne nicht alle von gleicher Farbe, er sieht allerdings die meisten im weißlichen Lichte schimmern, aber einige Sterne z. B. Aldebaran im Stier, Veteigeuze im Orion, Antares im Skorpion erscheinen ihm auch röthlich, andere z. B. Arktur im Bootes gelblich, noch andere bläulich und bei den veränderlichen Sternen ist schon auf die rothe Farbe vieler derselben aufmerksam gemacht. Ganz besonders aber treten die Farben bei den Doppelsternen

hervor, weil bei den verschiedenfarbigen die unmittelbare Vergleichung stattfinden kann.

Struve fand unter 596 Doppelsternpaaren 375 von gleicher Farbe, 101 Paare von ähnlichen, 120 Paare von ganz verschiedenen Farben. Von den ersten 78 Paare glänzend weiß, 217 weiß, 27 weißgelb, 10 gelblich, 11 gelb, 2 goldfarbig und 5 grün; von denen mit ähnlichen Farben erschienen 30 Paare weißgelb und weiß, 53 Paare weiß und bläulich, 13 Paare von verschiedenem Gelb und 5 Paare blau in verschiedenen Graden; endlich von den verschiedenfarbigen bezeichnet er 52 Paare gelb und bläulich, 16 Paare grün und blau.

Die Schätzungen der Farben sind aber sehr individuell, und besonders leicht kann es vorkommen, daß bei complementären Farben, die eine Farbe eine subjective und keine reelle ist. Während wir die großen nach Struve ausgehen, sei doch erwähnt, daß die Herschel dieselben Doppelsterne größtentheils mit andern Farben bezeichnen. Ob die Farben sich um der Zeit ändern, darüber wissen wir bis jetzt noch nicht selbst nichts Sicheres über die hellen, dem bloßen Aug farbig erscheinenden, da die Angaben der alten Beobachter über diesen Gegenstand zu sehr widersprechend sind.

Die Nachmessung der Positionswinkel und Distanzen hat bei mehreren Doppelsternen starke Veränderungen dieser Größen ergeben, ja bei einigen derselben hat man in der Positionswinkel Veränderungen beobachtet, also mehr als einen ganzen Umlauf des einen Stern um den andern bereits beobachtet. Die theoretische Astronomie lehrt, wie unter Voraussetzung der Gesetze, welche für unser Sonnensystem gelten, aus den gemessenen Positionswinkeln und Distanzen, im Ganzen aus sieben Daten, die Bahnen (deren Bestimmungskräfte Elemente heißen) abgeleitet werden können. Die wahren Bahnen der Doppelsterne sind Ellipsen, in deren einem Brennpunkt der an der überwiegende Stern angenommen werden kann. Die wahren Bahnen erscheinen uns aber, da sie meist gegen unsere Gesichtslinie geneigt sind, in der Projection und wieder als Ellipsen, in denen der Hauptstern angenommene Körper nicht mehr im Brennpunkte steht. Aus den gemessenen Positionswinkeln und Distanzen werden meistens erst die projectirten Ellipsen und daraus die wahren Ellipsen abgeleitet.

Dem Verzeichniß der Doppelsterne, welches stehend gegeben ist und in dem nur die Doppelsternpaare aufgenommen sind, wo der hellere Stern wenigstens die 4. Größe erreicht, fügen wir als Anhang zu denjenigen Doppelsterne hinzu, von welchen die Bahnen berechnet sind.

In dem Verzeichniß der Doppelsterne enthält die erste Columne die Nummer des Struve'schen Verzeichnisses, die zweite die Nummer des Herschel'schen Katalogs (bei Struve die Nummer der „Mensuris micrometricis“, bei Herschel die Nummer aus den „Cape Observations“), die dritte und vierte Columne enthalten die gerade Aufsteigung und Declination, die dritte und fünfte Columne die jährlichen Veränderungen dieser Größen durch die Precession, die sechste Columne die Größen der Sterne, die siebente und achte Columne die zu der in der neunten Columne angegebenen Zeit (Epoche) gemessenen Positionswinkel und Distanzen, die zehnte Columne die Bemerkungen über Farbe u. s. w.

Bei den am Schluß gegebenen Bahnen ist die Zeit der kürzesten Distanz der beiden Sterne (in unserm Sonnensystem Perihel genannt), U die Dauer des Umlaufes, a die mittlere Entfernung der beiden Sterne voneinander (halbe große Achse), e die Excentricität, beides in der wahren Ellipse, i die Neigung

der projectirten und wahren Ellipse in Graden angegeben, Ω die Länge des einen Durchschnittpunktes der beiden Ellipsen (aufsteigender Knoten) und endlich ω die Entfernung des Punktes der kürzesten Distanz von

diesem Knoten. Schließlich ist noch die Richtung der Bewegung, ob rechtläufig (direct) wie die Bewegung unserer Planeten, oder rückläufig hinzugefügt. (S. über Elemente den Abschnitt: „Theoretische Astronomie.“)

Verzeichniß der hellern Doppelfterne nach W. Struve und J. Herschel.

Name.	Nummer nach Struve und Herschel.	A.R. 1875.	Rechtliche Abweichung.	z 1875.	Rechtliche Abweichung.	Größe.	Positionswinkel.	Distanz.	Geogr.	Bemerkungen.
1 Toucanae	60	h m s	+27.78	°		5	172° 27'	1835.8		
2 Caniopeiae	2	0 25 48	+3.58	63 38.8	+0.33	4.0	7.6	88.6	9.75	1832.6
3 Phoenixis	1	0 31 37	+2.70	47 25.3	+0.32	3.0	11	17.6	30	1835
4 Ursae minoris	93	1 12 59	+20.24	18 35.6	+0.32	2.0	9.0	210.1	18.27	1834.1
5 Arctis	186	1 40 46	+3.28	18 40.8	+0.30	4.2	4.4	0.0	6.63	1830.6
6 Eridani	3473	1 51 3	+2.27	52 14.0	+0.30	4	14	192.3	12	1835
7 Piscium	202	1 55 35	+3.09	2 9.6	+0.29	2.8	3.9	335.7	3.64	1831.2
8 Indomedae	205	1 56 14	+3.65	41 43.7	+0.29	3.0	5.0	62.4	10.33	1830.9
9 Castiopeiae	262	2 18 47	+4.64	66 50.3	+0.27	4.3	7.1	276.7	1.86	1829.7
10 Persei	296	2 35 40	+4.06	48 41.9	+0.26	4.2	10.0	294.6	15.40	1832.2
11 Ceti	299	2 36 49	+3.10	2 42.5	+0.26	3.0	6.8	287.4	2.59	1832.5
12 Persei	307	2 41 35	+4.33	55 22.5	+0.25	4.0	8.5	300.4	28.04	1831.2
13 Eridani	33	2 53 31	+2.28	40 48.4	+0.24	5	6	81.5	8.68	1835.8
14 Persei	335	3 6 45	+2.52	29 29.1	+0.23	3	8	310.0	5.30	1836.3
15 Persei	464	3 46 17	+3.76	21 30.6	+0.18	2.7	9.3	207.6	12.48	1830.5
16 Persei	471	3 49 26	+4.00	39 38.8	+0.18	3.1	13.3	9.2	8.81	1832.6
17 Eridani	3603	3 52 12	+2.80	13 51.9	+0.18	1.0	13	233.6	43	1835
18 Reticuli	3638	4 12 49	+0.75	62 47.3	+0.15	4	12	353.6	40	1835
19 Doradus	58	4 31 18	+1.28	55 18.3	+0.13	3	11	108.5	82.29	1836.0
20 Leporis	668	5 8 32	+2.88	8 20.9	+0.07	1.0	8.0	199.8	9.14	1831.5
21 Leporis	3761	5 22 55	+2.57	20 51.6	+0.06	4	13	145.9	70	1835
22 Leporis	3766	5 27 13	+2.65	17 51.8	+0.05	4.0	12	154.2	23	1835
23 Orionis	738	5 28 15	+3.30	5 58.4	+0.05	4.0	6.0	40.8	4.34	1830.8
24 Orionis	748	5 29 18	+2.93	5 58.4	+0.05	4.7	7.0	275.4	21.41	1832.5
25	752	5 29 19	+2.93	5 59.6	+0.04	3.2	7.3	142.2	11.32	1831.9
26	762	5 32 28	+3.01	2 46.4	+0.04	4.1	10.3	236.5	11.01	1831.4
27	774	5 34 27	+3.02	2 0.6	+0.04	2.0	5.7	151.3	2.35	1831.2
28 Columbae	3819	5 53 6	+2.12	35 17.9	+0.01	4	14	104.4	30	1835
29 Canis majoris	1061	6 39 39	+2.65	16 32.8	+0.08	1	9	73.6	11.2	1869.1
30 Gemmae	1066	7 10 54	+3.45	16 45.8	+0.10	3.2	10.3	30.9	9.56	1829.9
31 Argus	113	7 12 39	+3.59	22 12.6	+0.10	3.2	8.2	196.9	7.14	1829.7
32 Argus	113	7 12 42	+2.12	36 2.4	+0.09	2	8	211.8	70	1835
33 Geminorum	1110	7 26 37	+3.84	32 9.6	+0.12	2.7	3.7	255.5	4.73	1835.3
34 Argus	134	8 51 41	+1.85	46 58.1	+0.17	2	6	220.2	41.16	1835.1
35 Cancri	1268	8 59 8	+3.65	29 12.9	+0.22	4.4	6.5	307.1	30.46	1829.0
36 Hydrae	1273	8 40 40	+3.11	6 52.6	+0.22	3.8	7.8	195.6	3.21	1830.6
37 Argus	4136	8 41 15	+1.65	34 14.9	+0.12	2	10	64.0	80	1835
38 Lynceis	1334	9 11 4	+3.75	37 19.8	+0.25	4.0	6.7	240.2	7.20	1829.2
39 Cratae majoris	1351	9 21 39	+4.81	63 36.4	+0.26	3.8	9.0	272.4	22.81	1830.6
40 Argus	167	9 43 59	+1.50	64 29.6	+0.28	3	8	126.1	4.90	1836.9
41 Leonis	1424	10 13 4	+3.30	20 28.5	+0.30	2.0	3.5	103.4	2.50	1831.5
42 Argus	4266	10 40 13	+2.31	59 1.6	+0.31	2	16	46.8	1.27	1835
43 Argus	1523	11 11 3	+3.21	32 13.9	+0.34	4.0	4.9	164.1	1.87	1834.4
44 Cratae majoris	1524	11 17 43	+3.26	33 46.6	+0.33	3.7	10.1	146.6	7.10	1830.7
45 Leonis	1536	11 14 24	+3.13	11 13.0	+0.33	3.9	7.1	92.4	2.19	1832.0
46 Hydrae	4449	11 26 52	+2.95	31 9.9	+0.33	4	11	170.0	60	1835
47 Cratae	211	11 46 36	+3.02	33 12.7	+0.35	5	5	339.6	2.03	1835.8
48 Corvi	219	12 19 39	+3.27	62 24.3	+0.33	2	2	120.6	5.65	1835.8
49 Cratae	220	12 23 25	+3.11	15 49.1	+0.33	3	10	213.0	23.44	1837.5
50 Cratae	221	12 24 15	+3.28	56 24.6	+0.33	2	5	38.0	120	1835
51 Centauri	221	12 34 38	+3.30	48 16.4	+0.33	4	4	354.3	0.75	1835.9
52 Virginis	1670	12 35 20	+3.04	0 45.8	+0.33	3.0	3.0	231.7	0.91	1834.4
53 Canum ven.	1692	12 50 11	+2.82	38 59.6	+0.33	3.2	5.7	227.3	19.92	1830.5
54 Virginis	1724	13 3 39	+3.10	4 52.3	+0.32	4.0	9.0	344.0	7.07	1830.3
55 Cratae majoris	1744	13 18 53	+2.45	55 34.7	+0.32	2.1	4.2	147.6	14.37	1830.6
56 Centauri	4628	13 47 45	+3.71	11 46.3	+0.30	3	11	46.3	0.30	1835
57 Centauri	255	14 31 8	+4.03	60 18.9	+0.29	1	2	219.6	16.52	1836.3
58 Centauri	257	14 32 27	+4.80	64 25.6	+0.26	3	8	243.8	15.63	1837.1
59 Bootis	1864	14 34 51	+2.82	16 57.3	+0.26	4.9	6.0	99.2	3.83	1830.3
60 Centauri	1865	14 35 11	+2.86	14 15.9	+0.26	3.5	3.9	309.2	1.19	1830.5
61 Centauri	1877	14 38 32	+2.62	27 36.1	+0.26	3.0	6.3	321.0	2.64	1829.4
62 Centauri	1888	14 45 37	+2.76	19 37.2	+0.25	4.7	6.8	329.0	7.07	1835.4
63 Lupi	272	15 19 12	+4.28	51 37.3	+0.29	4	6	247.6	80	1835
64 Serpentis	272	15 14 12	+4.05	44 14.3	+0.29	4	9	174.9	26.35	1837.3
65 Serpentis	283	15 26 49	+3.98	40 44.7	+0.21	4	4	94.1	0.84	1835.5
66 Coronae	1954	15 28 50	+2.87	10 57.5	+0.21	3.0	4.0	197.3	2.66	1833.1
67 Serpentis	1965	15 34 40	+2.26	37 2.5	+0.20	4.1	5.0	309.9	6.00	1829.7
68 Lupi	1967	15 37 30	+2.92	26 41.6	+0.19	4.0	7.0	105.8	0.4	1833.3
69 Serpentis	1970	15 40 25	+2.77	15 48.9	+0.19	3.0	9.2	265.0	30.84	1832.1
70 Lupi	295	15 55 1	+3.97	28 15.1	+0.17	4	6	22.2	15.07	1834.6
71 Scorpil	298	15 58 10	+3.48	19 27.7	+0.17	3	5	25.6	13.65	1836.7
72 Scorpil	298	16 13 36	+3.64	25 17.4	+0.15	4	9	274.3	15	1835
73 Ophiuchi	295	16 24 39	+3.67	26 9.1	+0.14	1	(?)			
74 Herculis	2055	16 24 39	+3.03	2 15.6	+0.14	4.0	6.1	306.6	0.99	1834.4
75 Herculis	2084	16 36 35	+2.26	31 49.8	+0.11	3.0	6.3	203.3	0.91	1834.4
76 Aras	2140	17 8 57	+2.73	14 13.2	+0.07	3.0	6.1	184.5	4.65	1829.6
77 Aras	3127	17 9 54	+2.46	24 59.3	+0.07	3.0	8.1	174.3	24.88	1835.6
78 Aras	4942	17 14 53	+5.03	56 15.4	+0.07	3	12	327.2	12	1835

Bei Bezeichnung durch den Monat vorbestimmt.

Name.	Nummer nach Sterne und Verzeich.	AR 1875.	Declination 1875.	Größe.	Positionswinkel.	Distanz.	Epöche.	Bemerkungen.			
		h m s	° ' "								
β Herculis	2161	17 19 22	+25.07	+ 37 15.7	— 0.07	4.0	5.1	307° 2	3.60	1830.3	Grünlich und grün.
α Arne	4955	17 22 11	4.63	— 49 45.4	— 0.06	4	13	178.5	60	1835	
μ Herculis	2220	17 41 34	2.34	+ 27 47.7	— 0.04	3.8	9.5	241.3	29.58	1831.6	Weiß.
γ Draconis	2241	17 44 9	1.09	+ 72 12.2	— 0.02	4.0	5.2	15.1	30.89	1832.3	Weiß.
η Herculis	2264	17 56 12	2.54	+ 21 35.7	— 0.01	4.9	4.9	261.7	6.06	1829.9	Gelblichgrün und gelblichroth.
70 ρ Ophiuchi	2272	17 59 18	3.01	+ 2 32.2	— 0.01	4.1	6.1	130.8	6.11	1835.6	Weiß und roth.
μ^1 Sagittarii	5035	18 6 17	3.59	+ 21 5.4	+ 0.01	4	13	267.0	18	1835	
α Lyrae	339	18 40 12	1.99	+ 39 32.4	+ 0.06	4.6	6.5	26.1	3.03	1831.4	Weißlichgrün und bläulich.
δ Serpentis	2417	18 50 0	2.28	+ 4 2.6	+ 0.07	4.0	4.2	103.8	21.65	1830.0	Weißlichgelb.
γ Lyrae	2487	19 9 30	2.04	+ 38 56.3	+ 0.10	4.0	8.1	85.0	27.90	1830.9	Blau und gelblich.
β Sagittarii	359	19 13 39	4.33	+ 44 41.6	+ 0.10	4	8	78.6	29.09	1835.2	Blau und gelb.
δ Cygni	2579	19 41 4	1.87	+ 44 49.6	+ 0.14	3.0	7.9	37.9	1.78	1830.2	Grünlich und gelblich.
α Cephei	2675	20 13 4	1.90	+ 77 20.0	+ 0.18	4.0	8.0	124.1	7.37	1832.4	Grünlich und blau.
α Indi	5209	20 28 46	4.24	+ 47 43.6	+ 0.20	3	16	132.2	45	1835	
β Delphini	2704	20 31 41	2.51	+ 14 9.7	+ 0.20	3.0	11.0	343.8	32.48	1829.4	Grün.
52 γ Cygni	2726	20 40 30	2.47	+ 30 15.8	+ 0.21	4.0	5.2	57.2	6.62	1830.8	Tief gelb.
γ Delphini	2727	20 40 51	2.78	+ 15 40.5	+ 0.21	4.0	5.0	273.8	11.90	1830.9	Gelblich und blaugrün.
γ Cephei	2806	21 27 2	0.80	+ 70 0.7	+ 0.25	3.0	8.0	250.0	13.57	1832.3	Grünlich und blau.
μ Cygni	2822	21 38 32	2.66	+ 28 10.8	+ 0.27	4.0	5.0	114.5	5.56	1831.6	Weiß und bläulich.
α Pegasi	2824	21 38 59	2.71	+ 25 4.4	+ 0.27	3.9	10.8	308.5	11.01	1831.6	Gelblich.
α Aquarii	2909	22 22 24	2.08	+ 0 39.5	+ 0.30	4.0	4.1	355.3	3.46	1832.8	Grünlich.
β Piscis austr.	3393	22 24 24	3.42	+ 32 59.2	+ 0.31	4	8	173.3	29.09	1836.2	

Berechnete Bahnen einiger Doppelsterne.

	42 Comae	ζ Herculis	Σ 3121	η Comae	ζ Cancri	ϵ Ursae majoris	α Centauri
T	1839.60	1830.48	1846.77	1850.34	1816.69	1816.86	1871.23
U	25.5 Jahre	36.36 Jahre	40.62 Jahre	43.68 Jahre	58.27 Jahre	61.58 Jahre	77.81 Jahre
a	0° 50	1° 25	0° 71	0° 96	0° 39	2° 44	30° 57
α	0.075	0.448	0.380	0.286	0.444	0.431	0.703
i	90° 0	43° 7	75° 3	60° 7	24° 0	52° 9	61° 9
Ω	10° 5	214° 3	22° 5	22° 3	33° 6	275° 8	22° 3
ω	0°	284° 9	141° 6	215° 5	133° 0	309° 0	16° 4
Bewegung	Direct	Rückläufig	Direct	Direct	Rückläufig	Rückläufig	Direct

	τ Ophiuchi	λ Ophiuchi	70 ρ Ophiuchi	ϵ Labrae	Σ 3062	Σ 1938	γ Virginis
T	1840.07	1790.30	1808.27	1832.61	1835.20	1851.57	1836.0
U	87.04 Jahre	89.01 Jahre	95.97 Jahre	105.52 Jahre	112.64 Jahre	146.65 Jahre	163.12 Jahre
a	0° 82	0° 84	4° 36	1° 53	1° 31	1° 52	3° 53
α	0.037	0.453	0.494	?	0.501	0.854	0.880
i	51° 8	49° 4	57° 3	70° 2	30° 0	49° 5	23° 4
Ω	55° 1	32° 7	123° 1	4° 7	32° 2	94° 7	5° 6
ω	145° 7	126° 1	160° 5	?	97° 5	87° 1	215° 4
Bewegung	Direct	Direct	Rückläufig	Direct	Direct	Rückläufig	Rückläufig

	ω Leonis	δ Cygni	α Coronae	α Geminorum
T	1841.40	1904.10	1825.32	1750.33
U	277.77 Jahre	415.11 Jahre	420.24 Jahre	296.85 Jahre
a	1° 31	2° 31	2° 28	7° 54
α	0.722	0.286	0.590	0.344
i	86° 2	37° 8	40° 9	42° 1
Ω	169° 2	91° 1	20° 7	32° 0
ω	84° 3	203° 0	65° 9	294° 0
Bewegung	Direct	Rückläufig	Direct	Rückläufig

II Die Eigenbewegungen der Fixsterne.

Der Name Fixsterne ist, wenn wir diesen Weltkörpern eine besondere, ihnen eigenthümliche Bewegung zuschreiben, ein uneigentliches, jedoch sind die Eigenbewegungen erst in neuester Zeit von einem kleinen Theile derselben erwiesen und bestimmt, sodas wir kaum von einem Zwanzigstel der bis jetzt beobachteten Sterne die Eigenbewegung gewährt, von den teleskopischen Sternen aber nur von einigen wenigen kennen.

Die Ortsveränderung ist bei einigen Sternen nicht ganz unbedeutend. Der helle Stern Arktur im Bootes hat seit Hipparch's Zeiten seinen Ort gegen die benachbarten Sterne um $2\frac{1}{2}$ Vollmondbreiten geändert, unter den helleren Sternen ist nur einer, α Centauri (den wir über unsern Horizont nicht sehen), welcher eine noch etwas größere, eigene Bewegung hat; von den schwächeren Sternen ist sie bei wenigen noch größer und

steigt bis zu dem vierfachen Betrage, sodas ein Stern im Schiffe (2151 Puppis) nach Maclear sich jährlich $7''.87$, ein Stern im Indiarum (ϵ Indi) nach Bessel sich $7''.74$ bewegen soll. Von den 3222 hellern Sternen, welche der britische Astronom Bradley im vorigen Jahrhundert beobachtet hat, haben fast 900 eine sichere Eigenbewegung als $10''$ in 100 Jahren, 227 eine solche von über $25''$ und 50 eine von über $1'$.

Diese an und für sich geringen Eigenbewegungen konnten mit bloßem Auge selbstverständlich nicht wahrgenommen werden, es gehörten dazu mit Fernrohren versehene Meßinstrumente. Daher dachte auch vor Erfindung des Fernrohrs niemand an eine Ablesung von Eigenbewegungen, und Galley war der erste, der im Jahre 1717 eine Eigenbewegung bei Aldebaran, Sirius und Arktur vermutete und solche aus alten Beobachtungen berechnen wollte. Von einer größeren

unge von Sternen leitete darauf der Astronom Lalande die Eigenbewegung mit ziemlicher Sicherheit ab, besonders aber ist es erst das Verdienst anderer Astronomen, sie an einer größeren Anzahl von Sternen bestimmt zu haben.

Diejenigen Sterne, bei welchen die Eigenbewegung nach Wädel's und Argelander's Rechnungen jährlich er 1" beträgt, mögen hier einen Platz finden. Die von genannten 2151 Puppi's und ϵ Indi sind fortlassen, weil die Zahlen noch erst der Bestätigung harften.

Name.	Größe.	AR 1875.	1878.	Jährliche Eigenbewegung.
10 Groombridge	6.7	h m s	° ' "	7".05
Cygn	5.6	21 1 18	+ 38 38.9	5.22
lande 21185	7.3	10 56 31	+ 36 50.0	4.75
" 21253	8.7	10 59 24	+ 44 9.8	4.70
Eridani	4.6	4 33 35	+ 7 49.8	4.09
Cassiopeiæ	5.7	0 39 58	+ 54 11.3	3.83
Centauri	1.0	14 31 8	+ 0 18.9	3.57
Groombridge	8.2	0 11 10	+ 43 18.7	2.81
lande 4603	6.3	2 29 11	+ 6 16.8	2.36
" 25372	8.5	13 39 22	+ 15 34.7	2.32
Boottis	1.0	14 9 58	+ 19 50.1	2.26
lande 7443	8.5	3 54 49	+ 34 58.6	2.24
Cassiopeiæ	5.9	33 7 11	+ 56 28.6	2.09
Hydri	3.0	0 19 9	+ 77 57.5	2.06
lande 27173	4.9	14 50 9	+ 20 40.5	2.01
" 15290	8.3	7 45 33	+ 31 0.0	1.97
Draconis	5.0	19 32 33	+ 69 27.6	1.93
Centauri	4.0	1 38 19	+ 16 36.1	1.90
lande 18115	7.7	9 5 55	+ 53 13.3	1.69
Pegasi	4.0	19 46 6	+ 73 14.2	1.63
lande 30694	6.9	16 46 42	+ 0 14.6	1.61
" 38383	7.3	19 58 40	+ 23 1.6	1.54
Virginiæ	5.0	13 11 54	+ 17 36.5	1.45
scallie 147	5.6	0 30 53	+ 25 27.3	1.44
dorenko 1643	6.7	10 3 45	+ 50 5.4	1.43
lande 30044	7.8	16 24 20	+ 4 30.5	1.43
dorenko 1384	8.8	8 43 41	+ 71 16.7	1.40
lande 46650	8.7	23 42 39	+ 1 44.7	1.38
" 6888	8.2	3 38 29	+ 41 5.1	1.37
Canis minoris	1.0	7 32 45	+ 5 32.6	1.33
scallie 8381	5.3	20 7 28	+ 27 31.2	1.33
Scorpii	2.4	14 56 46	+ 24 47.3	1.32
lande 27744	7.0	15 7 37	+ 0 42.6	1.31
Pegasi	6.1	23 55 37	+ 26 25.7	1.30
lande 17415.6	8.0	17 37 11	+ 63 27.6	1.27
scallie 3386	6.7	8 28 0	+ 31 6.4	1.26
Canis majoris	1.0	6 39 39	+ 16 32.8	1.25
Scorpii	7.0	17 8 33	+ 26 21.4	1.23
Ophiuchi	5.0	17 7 41	+ 26 24.5	1.23
Cassiopeiæ	4.3	0 41 33	+ 57 9.1	1.23
Z. W. 17. 322	8.2	17 19 33	+ 2 16.3	1.21
Trianguli	5.0	9 2 24	+ 33 39.2	1.20
Crateris	6.0	11 28 26	+ 32 10.5	1.18
Comæ	5.0	13 6 4	+ 28 30.4	1.17
lande 15976	7.4	7 52 48	+ 29 36.0	1.17
Ursæ majoris	3.0	9 24 29	+ 52 14.7	1.13
p Ophiuchi	4.0	17 59 18	+ 2 32.2	1.11
lande 27298	7.6	14 51 40	+ 54 10.0	1.10
Herculis	5.7	17 15 59	+ 32 35.2	1.05
lande 16304	5.7	8 12 37	+ 12 12.2	1.01
Aquilæ	5.5	19 18 59	+ 11 40.5	1.00

Die 20 Sterne 1. Größe haben in 100 Jahren folgende Eigenbewegung:

α Eridani	42"	η Argûs	5"
α Tauri	21	α Crucis	16
α Aurigæ	44	α Virginis	6
β Orionis	3	β Centauri	9
α Orionis	5	α Bootis	226
α Argûs	5	α Centauri	367
α Canis majoris	125	α Scorpii	6
α Canis minoris	133	α Lyrae	35
β Argûs	19	α Aquilæ	66
α Leonis	25	α Piscis austrini	40

Im Durchschnitt beträgt für die Sterne 1. Größe die Eigenbewegung in 100 Jahren 60", für die Sterne

2. Größe nahe 13", für die 3. Größe 17", für die 4. Größe 14", für die 5. Größe 11", für die 6. Größe 9". Aus diesen Zahlen geht unter der Voraussetzung, daß die Sterne im Durchschnitt gleiche Bewegung haben, hervor, daß die schwächeren Sterne beträchtlich entfernter sind als die helleren, wenn auch bei weitem nicht in dem Maße, wie aus ihren Helligkeiten folgen würde.

Die absolute Bewegung einiger dieser Sterne läßt sich mit Hilfe der im nächsten Abschnitt vorkommenden Parallaxen berechnen und es findet sich die jährliche Bewegung von

α Lyrae	44	Millionen geogr. Meilen.
α Centauri	92	" " "
70 p Ophiuchi	130	" " "
34 Groombridge	181	" " "
21185 Lalande	181	" " "
1830 Groombridge	523	" " "

Da die Fixsterne eine Eigenbewegung haben, hat man die Frage aufgeworfen, ob nicht auch die Sonne mit ihrem Gefolge von Planeten und Kometen an der allgemeinen Bewegung im Weltraume theilnimmt. Unter der Voraussetzung, daß die Sonne nach einem festen Punkte hingeht, müßten die Sterne, wohin diese Bewegung sich richtet, sich scheinbar voneinander entfernen, diejenigen aber, von welchen sie kommt, näher einander rücken. Herschel sowohl wie Argelander und Struve haben unabhängig voneinander aus der Eigenbewegung der Fixsterne die Richtung, nach der unser Sonnensystem sich hinbewegt, berechnet und sehr nahe ein und denselben Punkt am Himmel gefunden, der im Sternbilde des Hercules nahe bei dem Sterne λ in etwa 260° AR und + 30° Decl. liegt.

Die schnell sich unser Sonnensystem jährlich oder an einem Tage bewegt, ist auch schon untersucht, aber die dafür angegebenen Zahlen weichen sehr beträchtlich voneinander ab, denn während ein Astronom dieselbe nur zu 100000 Meilen täglich angibt, findet ein anderer den acht- bis zehnfachen Betrag. Diese Größe zu bestimmen, müssen wir daher der Zukunft überlassen!

Die Eigenbewegungen, welche wir aufgeführt haben, sind regelmäßige, geradlinige, nur bei einigen Hauptsternen entdeckte man außer den regelmäßigen Bewegungen auch eine unregelmäßige, welche sich jedoch in eine regelmäßige und eine periodische zerlegen läßt und zu der Vermuthung Anlaß gab, daß diese Sterne möglicherweise doppelt sein könnten, in welchem Falle jedoch der eine Stern uns nicht sichtbar ist. Bei Sirius wies Vessel zuerst die Existenz eines solchen dunkeln Begleiters nach und bestimmte aus den periodischen Bewegungen des Sirius die Bahn des Begleiters. Gegenwärtig ist Sirius als Doppelstern bekannt, und wenn auch der Begleiter entfernter und dem Anschein nach viel kleiner ist als nach Vessel's Rechnung der dunkle Begleiter sein sollte, so scheint er doch die Umlaufzeit mit dem berechneten dunkeln Begleiter gemeinsam zu haben. Die von Auwers gerechnete Bahn ist

$$\begin{aligned}
 T &= 1793.88 \\
 U &= 49.407 \text{ Jahre} \\
 a &= 2''.33 \\
 e &= 0.615 \\
 i &= 47''.1 \\
 \Omega &= 62^\circ.0 \\
 \omega &= 18^\circ.9 \\
 &\text{Direct.}
 \end{aligned}$$

k) Ueber die Entfernungen der Fixsterne.

Die Fixsterne sind Sonnen, und da unsere Sonne 66000 Millionen mal heller ist, als ein Fixstern 1. Größe, würde sie, wenn man voraussetzt, daß der Weltraum vollkommen durchsichtig ist und das Licht im Quadrat der Entfernung abnimmt, um nahe das 240000fache ihrer jetzigen Entfernung von der Erde fortgerückt werden müssen, damit sie uns von der Helligkeit eines Sternes 1. Größe erschiene. Da die Entfernung der Sonne von uns nahe 20 Millionen Meilen ist, würde sie also, um als Fixstern 1. Größe zu erscheinen, von uns 5 Billionen Meilen entfernt sein müssen.

Dies Beispiel zeigt, daß, wenn wir die Fixsterne als unserer Sonne ähnliche Körper annehmen, selbst die hellsten Sterne schon Billionen von Meilen entfernt sind und die schwächeren, wenn wir ihr Schwächererscheinen nur der größeren Entfernung zuschreiben, noch ganz beträchtlich weiter von uns entfernt stehen müssen.

Wenn man die Entfernung eines Gegenstandes nicht direct messen kann, geschieht es dadurch, daß man von zwei Orten, deren Distanz man kennt, die Winkel zwischen den Orten und dem Gegenstande mißt und dann die Entfernung des Gegenstandes berechnet. Die Distanz der beiden Orte voneinander, die Grundlinie oder Basis genannt, darf, da Beobachtungsfehler bei der Messung der Winkel unvermeidlich sind, nicht zu klein zu der Entfernung des Gegenstandes sein und am wenigsten wirken die Beobachtungsfehler ein, wenn das durch die Messungen entstehende Dreieck nahe ein gleichseitiges ist.

Um die Entfernung der Fixsterne zu bestimmen, wird man daher wegen der Größe derselben nicht den Durchmesser oder Halbmesser der Erde als Grundlinie annehmen können, sondern eine größere Basis suchen müssen. Man wählt dazu die Erdbahn, indem man zu verschiedenen Jahreszeiten die Richtungen nach den Fixsternen bestimmt und daraus den Winkel, unter dem am Fixstern der Radius der Erdbahn erscheint, die jährliche Parallaxe des Fixsterns ermittelt.

Daß solche Messungen nur mit den genauesten Instrumenten angestellt werden können und die Parallaxenbestimmung zu den schwierigsten Problemen der Astronomie gehört, bedarf wol kaum der Erwähnung. Alle Versuche, welche bei dem Erwachen der Astronomie nach dem Mittelalter Nothmann, Tycho, Hoote, Flamsteed, Picard, Cassini, Römer u. a. anstellten, mißglückten. Bradley wollte die Parallaxe bestimmen und entdeckte bei diesen Versuchen zuerst die Aberration des Lichts und nachher die Nutation (Schwanken der Erdbachse).

Mit Sicherheit sind erst Parallaxen in neuerer Zeit von Bessel, W. Struve, Peters u. a. bestimmt.

Von folgenden Sternen hat man theils mit dem Heliometer, theils mit dem Refractor die Parallaxen ermittelt:

Von α Centauri ist die Parallaxe $0''.8$, die mittlere Entfernung also 5 Billionen Meilen.

Von ϵ Cygni ist die Parallaxe $0''.51$, die mittlere Entfernung also 8 Billionen Meilen.

Von α Lyrae ist die Parallaxe $0''.16$, die mittlere Entfernung also 26 Billionen Meilen.

Von 1830 Groombridge ist die Parallaxe $0''.27$, die mittlere Entfernung also 15 Billionen Meilen.

Von γ Ophiuchi ist die Parallaxe $0''.17$, die mittlere Entfernung also 24 Billionen Meilen.

Von 21185 Lalande ist die Parallaxe $0''.51$, die mittlere Entfernung also 8 Billionen Meilen.

Von 34 Groombridge ist die Parallaxe $0''.31$, die mittlere Entfernung also 13 Billionen Meilen.

Peters hat in Pulkowa versucht, von einer größeren Anzahl von Sternen durch andere Methoden als die, welche bei den eben genannten Parallaxenbestimmungen in Anwendung gekommen sind, die Entfernungen zu bestimmen und daraus Mittelwerthe abgeleitet, welche im Durchschnitt

von Sternen 1. Größe die Parallaxe $0''.21$, also die Entfernung 20 Billionen Meilen;

von Sternen 2. Größe die Parallaxe $0''.12$, also die Entfernung 35 Billionen Meilen;

von Sternen 3. Größe die Parallaxe $0''.08$, also die Entfernung 52 Billionen Meilen;

von Sternen 4. Größe die Parallaxe $0''.05$, also die Entfernung 83 Billionen Meilen

u. f. w. ergeben haben, doch sind dies theilweise nur Näherungswerthe, welche noch sehr der Befestigung bedürfen.

l) Die Durchmesser und physische Beschaffenheit der Fixsterne.

Daß es bei so großen Entfernungen schwer möglich ist, die Durchmesser der Fixsterne zu bestimmen, ist begreiflich. Unsere Sonne, die jetzt mehr als einen halben Grad Durchmesser hat, würde, wenn sie 240000 mal weiter wäre, nur den Durchmesser von $1/120$ haben und daß daher die von den ältern Astronomen angegebenen Durchmesser (Kepler gab dem Sirius 240'', Cassini demselben Stern 10'', Herschel $6''.3$ u. f. w.) sehr unrichtig sind, ist nicht zu verwundern. Selbst die von Herschel angegebenen Durchmesser der Vega zu $0''.36$, des Arktur zu $0''.20$ sind, da wir so kleine Durchmesser selbst mit unsern besten Instrumenten kaum messen können, nur hypothetisch. Einen sehr sinnreichen Versuch wenigstens annähernd die Durchmesser zu bestimmen, hat Stammer künstlich hergestellten Sternen gemacht und auch gefunden, daß wenn ein Stern 1. Größe so hell und groß als unsere Sonne ist, er nur einen Durchmesser von $1/120$ zu haben braucht. Wenn die schwächsten Sterne nur wegen ihrer größeren Entfernung schwächer erscheinen, wird ihr scheinbarer Durchmesser gar verschwindend klein werden, sobald gegenwärtig die Bestimmung so kleiner Größen noch ganz unmöglich erscheint.

Ueber die physische Beschaffenheit der Fixsterne wußten wir gar nichts, wenn nicht die Spectralanalysen wenigstens einige allgemeine Aufschlüsse gegeben hätten.

Schon Fraunhofer hatte festgestellt, daß die Spectra der Fixsterne im allgemeinen dem Spectrum der Sonne ähnlich sind. Man sieht, wenn man das Fernrohr in einem System von Prismen verfährt und auf die Sterne richtet, continuirliche, von dunkeln Linien durchzogene Spectra, und da ganz ähnliche Spectra mit denselben dunkeln Linien durch das Vertheilen irdischer Stoffe dargestellt werden können, nimmt man an, daß in den Atmosphären oder Photosphären der Fixsterne dieselben Stoffe enthalten sind. In den Spectren der Sterne Aldebaran und Betelgeuze erkannte der Engländer Guggins γ B. die im Sonnenpectrum so bekannte Doppellinie D und schließt daraus, daß in den Atmosphären dieser Sterne Natriumdampf enthalten ist. Ebenso hat man aus andern Linien abgeleitet, daß auf beiden Sternen Magnesium, Wisnium, Antimon, Tellur und Quecksilber sich vorfindet, daß in der Atmosphäre des Aldebaran auch Wasserstoffgas gibt, welches bei Betelgeuze fehlt.

Siecih unterscheidet nach den verschiedenartigen beobachteten Spectren vier Haupttypen von Sternen. Das Spectrum der weißen oder wenig bläulichen Sterne, z. B. der Vega, des Sirius, Altair, Regulus,

igel, von drei Sternen des großen Bären, mit Ausnahme von α Ursae majoris, zeigen ein Spectrum, welches sich durch vier dunkle Linien auszeichnet, die dem Spectrum des glühenden irdischen Wasserstoffs entsprechen. Da diese Linien in dem Sternspectrum eine große Breite haben, schließt man daraus, daß die absorbirende Schicht des Wasserstoffs sehr dick ist und unter einem großen Drucke steht, sowie daß die Temperatur derselben eine bedeutende ist.

Der zweite Typus der Fixsterne zeigt sich im Spectrum unserer Sonne, in Capella, Pollux, Arktur, Aldebaran, Procyon u. s. w., und man ist übereingekommen, daß diese Sterne ganz ähnliche stoffliche Zusammensetzung und sonstige physische Beschaffenheit wie die Sonne haben müssen.

Zu dem dritten Typus gehören die rothen Sterne Orionis, β Pegasi, Mira Ceti, Antares, α Herculis u. a. Die Absorptionslinien sind mehr Streifen als Linien und die Natriumlinie D erscheint besonders stark ausgebreitet, während die Wasserstofflinien weniger vorherrschend als bei den beiden ersten Typen sind. Die Linien sprechen für das Vorhandensein von Magnesium, Natrium und Eisen.

Der vierte Typus der Spectra endlich zeigt drei Linien, durch dunkle Zwischenräume getrennte Bänder, in denen das glänzendste im Grün liegt, das zweite schwächere im Blau; das dritte, im Gelb, erstreckt sich bis zum Roth und zerfällt oft in mehrere Abtheilungen. Dieses Spectrum ist sehr verschieden von dem andern Typen, gehört auch schwachen Sternen an und hat die größte Aehnlichkeit mit dem Kohlenpectrum.

Von den untersuchten Sternen gehört etwa die Hälfte dem ersten Typus, ein Drittel dem zweiten Typus, die meisten der übrigen dem dritten Typus an und nur schwächere Sterne zeigen den vierten Typus.

II. Die theoretische Astronomie.

(Tafel 4, 5, 6, 7, 11, 12.)

1. Einleitung Erklärungen.

Sobald die Bewegung einzelner Sterne erkannt, war sehr natürlich, daß man die Art der Bewegung, die Bahnen bestimmen wollte und sich bestrehte, die Bewegung der Himmelskörper in ein System zu bringen. Man schiene entsprechend setzten die Mehrzahl der alten Philosophen die Erde in den Mittelpunkt des Weltalls und ließen um die Erde nach der Größe der Laufzeit die Wandelsterne, zunächst den Mond, dann die Planeten Mercur, Venus, darauf die Sonne, die Planeten Mars, Jupiter und Saturn kreisen. Dem dieser Himmelskörper gab man eine besondere concentrische Hohlkugel, eine Sphäre, und in eine äußere Sphäre kamen alsdann die Fixsterne.

Obwohl im Alterthum schon einige andere Ansichten, besonders aus der Schule der Pythagoräer, von Aristarch von Samos u. a. ausgesprochen wurden, ist doch das Weltsystem, welches die Erde unbeweglich in ihrem Mittelpunkt setzte, und das auszüglich in dem ersten astronomischen Lehrbuche, dem „Almagest“, niedergelegt ist, eine historische Bedeutung erlangt und galt bis zum Schlusse des Mittelalters als das allein richtige. Das Ptolemäische Weltsystem, so wurde es nach dem berühmten Verfasser des „Almagest“, Ptolemäus, genannt, hatte zwölf durchsichtige, sphärische Kugelschalen, von welchen die ersten acht schon genannt sind, die neunte und zehnte hießen der erste und zweite Fixsternhimmel und dienten zur Erklärung des Vorwärtens der Nachtgleichen (der Präcession), die elfte

dagegen, das primum mobile, führte alle von ihm eingeschlossenen Kreise täglich um die Erde, während endlich die zwölfte, das empyreum, als der Aufenthalt der seligen Geister gedacht wurde.

Ein anderes Weltsystem, das ägyptische genannt, bestimmte, daß im Mittelpunkt des Weltalls die Erde stünde und um diese der Mond, die Sonne, Mars, Jupiter und Saturn sich bewegten, außerdem aber Mercur und Venus um die Sonne ihre Bahnen beschreiben.

Nikolaus Kopernicus, geb. 1473, gest. 1543, fand das Ptolemäische System den Bewegungen der Himmelskörper nicht entsprechend, denn nach demselben mußte man den Planeten, die theils von rechts nach links und dann rechtsläufig, theils von links nach rechts und dann rückläufig sich zu bewegen scheinen, noch eigenthümliche Bewegungen geben, welches dadurch geschah, daß man die Wandelsterne in den Sphären kleine Kreise beschreiben ließ, die man Epicyklen nannte.

Alle diese verwickelten Bewegungen, das ganze System der Epicyklen, hob Kopernicus dadurch auf, daß er die Erde in die Reihe der Planeten setzte und um die Sonne erst Mercur, dann Venus, darauf die Erde, Mars, Jupiter und Saturn sich bewegen ließ, dem Monde aber als Trabanten der Erde seine Bahn um die Erde gab. Erklärte er dadurch auf eine höchst einfache Art die scheinbar so eigenthümlichen schleifenförmigen Bewegungen der Planeten und die jährliche Bewegung der Sonne, indem diese nur Schein sei, die Erde sich vielmehr innerhalb eines Jahres um die Sonne drehte, so gab er, um die rasche Bewegung der Fixsternsphäre mit allem andern in Uebereinstimmung zu bringen, der Erde noch eine Umdrehung um ihre Achse innerhalb eines Tages.

Wenn nun auch Kopernicus schon selbst sein äußerst einfaches System, um die nicht gleichförmige Bewegung der Planeten zu erklären, dahin modificirte, daß er die Sonne nicht im Centrum der Planetenbahnen, sondern excentrisch hinstellte, so vollendete doch erst der große Kepler dieses System durch die Erkenntniß der wahren Bahnen der Himmelskörper. Kopernicus ist aber doch mit vollem Recht der Reformator der Astronomie und auf seinem System beruht gegenwärtig das ganze Gebäude der theoretischen Astronomie.

Das Kopernicanische System fand anfangs viele Feinde, zumal man glaubte, daß es mit den Lehren der Bibel nicht übereinstimme. Selbst der berühmte praktische Astronom Tycho de Brahe gehörte zu seinen Widerstrebenden, und nach seinem Tode fand man ein anderes Weltsystem vor, welches nach ihm das Tychonische heißt. Danach bewegten sich um die Sonne die Planeten Mercur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn, während die Erde fest im Weltraume angenommen wurde und um sie zuerst der Mond, dann die Sonne mit den sie umkreisenden Planeten ihren Lauf vollführen sollten.

Auf Taf. 11, Fig. 8 ist der scheinbare Lauf der Venus vom 1. Januar bis Anfang Mai 1870 dargestellt und man erkennt von Januar 1 bis Februar 1 die rechtsläufige Bewegung; dem kurzen scheinbaren Stillstande folgt die rückläufige Bewegung bis Mitte März, dann abermals ein kurzer Stillstand und darauf wieder rechtsläufige Bewegung.

Auf Taf. 5 ist in Fig. 1 das Ptolemäische System mit der Erde im Mittelpunkt und den zwölf Sphären enthalten, in Fig. 2 erscheint das Tychonische System, bestehend aus fünf Kreisen um die Sonne und zwei Kreisen um die Erde.

Taf. 4 enthält in Fig. 1 das Kopernicanische Sonnensystem, im Centrum die Sonne, in elliptischen Bahnen die Planeten Mercur, Venus, Erde, Mars, dann ein

schattirter Ring, welcher die Bahnen sämmtlicher neu entdeckter kleiner Planeten zwischen Mars und Jupiter einschließt, darauf folgen die Bahnen des Jupiter und Saturn, welche Planeten sämmtlich den Alten bekannt waren. Uraurus und Neptun, erst in den letzten 90 Jahren entdeckt, haben nicht Platz finden können, weil alsdann in dem schon sehr kleinen Maßstabe, $\frac{1}{15}$ Billionstel, die Tafel gerade dreimal so groß hätte sein müssen. Auf die Bahn der periodischen Kometen, welche in diesem System verzeichnet sind, werden wir später zurückkommen.

Der theoreischen Astronomie in ihrer jetzigen Gestalt liegen die von Kepler entdeckten Regeln zu Grunde, welche sich aus dem Princip der Anziehungskraft entwickeln lassen. Diese Kepler'schen Regeln sind:

- 1) Jeder Planet beschreibt eine Bahn, die in der Mathematik ein Kegelschnitt genannt wird und in einem der Brennpunkte dieser Kegelschnitte steht die Sonne.
- 2) Die Flächen, welche von dem Radiusvector (Entfernung der Himmelskörper von der Sonne) in der Bahn beschrieben werden, sind den Zeiten proportional, in welchen sie durchlaufen werden.
- 3) Es verhalten sich bei den verschiedenen Planeten unsern Sonnensystems die Quadrate der Umlaufzeiten wie die Kuben der mittlern Entfernungen.

Die beiden ersten Kepler'schen Regeln wurden (er entdeckte die zweite zuerst) im Jahre 1609 in der Schrift „*Astronomia nova, sive physica coelestis tradita commentariis de motibus stellarum Martis, ex Observationibus Tychoonis Brahe*. 1609 Heidelbergae“ aufgestellt. Die dritte Regel fand Kepler 1618, und zwar schon am 8. März, doch wies er sie nach Verichtigung eines Rechnungsfehlers erst am 15. Mai 1618 nach.

Die Bahnen, welche die Planeten um die Sonne beschreiben, sind Ellipsen mit meistens geringer Excentricität, während die Kometen entweder Ellipsen mit ziemlich bedeutender Excentricität oder Parabeln (mit der Excentricität 1) oder Hyperbeln (mit Excentricitäten über 1) beschreiben; die Bahnen der Sternschnuppenschwärme sind entweder Ellipsen (wenn die Schwärme nach bestimmten Perioden wiederkommen), Parabeln oder Hyperbeln. Die Art und Weise, wie aus den Beobachtungen die Bahnen berechnet werden, ist eine ziemlich complicirte, für die Kometen hat der Astronom Olbers zu Ende des vorigen Jahrhunderts eine sehr bequeme und leichte Methode gefunden, welche jetzt noch angewandt wird. Gaus hat, was die Bestimmung der Planetenbahnen betrifft, in seinem berühmten Werke: „*Theoria motus corporum coelestium etc.*“, dasjenige Verfahren angegeben, welches nicht allein durch seine Methode und Einfachheit, sondern auch durch Kürze sich auszeichnet. Erst in neuerer Zeit, seitdem die Zahl der Planeten ungemein groß geworden, hat man sich bemüht, die Methode noch zu vereinfachen und zu kürzen, und ist dies auch theilweise gelungen.

Die Darstellung einer Bahn geschieht durch verschiedene Größen, welche man Elemente nennt. Die theoreische Astronomie lehrt, daß in unserm Sonnensystem zur Bestimmung der Ellipse und Hyperbel, abgesehen von der Masse des Himmelskörpers, die bei den kleinen Planeten und den Kometen vernachlässigt wird, sechs Elemente gehören, während für die Parabel deren fünf genügen.

Zur Bestimmung der Bahn selbst gehören bei der Ellipse und Hyperbel zwei Elemente. Die längste Linie

in der Ellipse, welche durch deren Mittelpunkt gezogen werden kann, heißt die große Achse, die kürzeste und auch durch den Mittelpunkt gehende Linie die kleine Achse. Durch die große und kleine Achse, als durch zwei Elemente, ist die Ellipse bestimmt. Die Lehre von den Kegelschnitten zeigt aber, daß, wenn man die beiden Achsen kennt, auch die Excentricität, die Entfernung des Brennpunktes vom Mittelpunkt ausgedrückt in der Einheit der halben großen Achse, leicht gefunden werden kann, und daher ist die Ellipse auch sofort bestimmt, wenn statt einer der Achsen (gewöhnlich statt der kleinen Achse) die Excentricität gegeben ist.

Da die Sonne in einem Brennpunkt der Ellipse steht, so findet sich, daß der Planet der Sonne am nächsten, wenn er in einem Endpunkte der großen Achse angelangt ist (im Perihel), am entferntesten ist der Planet an dem andern Endpunkte der großen Achse (im Aphel). Bei der Parabel und der Hyperbel ist die halbe große Achse unendlich groß, es fällt dieses Element fort und man gibt bei der Parabel gewöhnlich die Entfernung im Perihel an; bei der Hyperbel ist noch die Größe der Excentricität nöthig.

Wenn die Excentricität 0 ist, fallen die Brennpunkte mit dem Mittelpunkt zusammen, es entsteht der Kreis; wenn die Excentricität 1 ist, so wird, wie schon gesagt, aus der Ellipse die Parabel.

Den Winkel, dessen Sinus gleich der Excentricität ist, nennt man auch den Excentricitätswinkel.

Die Bahnen, welche die Planeten und Kometen beschreiben, sind meistens gegen unsere Erdbahn oder gegen die Ebene, welche durch die Erdbahn gelegt wird, die Elliptik, geneigt und die Durchschnittspunkte der Planeten- und Kometenbahnen mit dieser Ebene heißen die Knotenpunkte. Derjenige Knoten, durch welchen der Himmelskörper geht, wenn er von südlicher Breite zu nördlicher übergeht, heißt der aufsteigende, der andere der niedersteigende Knoten. Die Angabe der Länge des aufsteigenden Knotens, d. h. wie viele Grade dieser vom Frühlingspunkt entfernt ist, und die Neigung der beiden Bahnen zu einander sind wieder zwei Elemente.

Gibt man nun noch an, welche Länge der Himmelskörper hat, wenn er im Perihel steht, außerdem die Zeit oder die Epoche des Durchgangs durch das Perihel, so hat man für die Ellipse und Hyperbel im ganzen sechs Elemente, für die Parabel nur fünf Elemente, für den Kreis, da bei selbigem kein Perihel vorhanden ist, nur vier Elemente. Bei den größten Planeten ist noch als siebentes Element die Angabe der Masse des Körpers nöthig.

Die Aufgabe der theoreischen Astronomie besteht nun darin, aus Beobachtungen die Bahn oder die Elemente der Bahn zu ermitteln. Bei den sechs Planetenelementen bedarf man dazu sechs einzelner Beobachtungen, welche in drei Längen und drei Breiten, oder vier Längen und zwei Breiten u. s. w., bestehen können, bei parabolischen Bahnen genügen fünf, bei kreisförmigen Bahnen sogar nur vier Daten.

Wenn man die Elemente der Bahn kennt, ist es nicht schwer, den Lauf des Himmelskörpers zu berechnen. Man ermittelt ihn zuerst, indem man sich in den Mittelpunkt der Sonne denkt, d. h. man bestimmt die heliocentrischen Dörter, dann versetzt man sich in den Mittelpunkt der Erde und bestimmt die geocentrischen Dörter. Die Angabe der Dörter in regelmäßigen Intervallen (etwa von Tag zu Tag) heißt eine Ephemeride.

Die Umlaufzeit eines Himmelskörpers ist die Zeit, welche er gebraucht, um seine ganze Bahn einmal

zu durchlaufen, und sie läßt sich, sobald man die halbe große Achse oder die mittlere Entfernung kennt, nach der dritten Keplerschen Regel leicht berechnen. Die mittlere tägliche Bewegung eines Himmelskörpers ergibt sich, wenn man den Umlreis oder 360° durch die Umlaufzeit, in Tagen ausgedrückt, theilt.

Wir haben aber gesehen, daß sich der Nullpunkt unserer Zählung am Himmel fortwährend ändert. Da man auch die Umlaufzeit als die Zeit, welche verfließt, zwischen einer Stellung des Objects am Himmel und dessen Wiederkehr in dieselbe erklären kann, so unterscheidet man, je nachdem diese Stellungen sich auf die Fixsterne, auf den Nullpunkt unserer Theilung, auf die Stellung zur Erde und Sonne beziehen, verschiedene Umlaufzeiten.

Die siderische Umlaufzeit ist die Zeit, welche verfließt zwischen zwei gleichen Stellungen des Planeten in Bezug auf die Fixsterne.

Die tropische Umlaufzeit ist die Zeit, welche der Planet gebraucht, um wieder zu demselben Punkte in Bezug auf den Nachtgleichenpunkt zu kommen, d. h. denselben Grad der Länge einzunehmen, welchen er gehabt hat.

Die synodische Umlaufzeit ist der Zwischenraum zwischen zwei gleichen Stellungen des Planeten in Bezug auf Erde und Sonne, z. B. die Zeit von einer Opposition oder Conjunction zur andern. Unter Conjunction versteht man die Stellung, wenn die Sonne und der Planet von der Erde aus gesehen dieselbe Länge haben, unter Opposition die Stellung, wenn die Länge der Sonne und des Planeten genau um 180° voneinander verschieden sind.

Der Winkel, welcher an der Sonne entsteht, wenn man einen Radiusvector vom Planeten nach der Sonne zieht und einen andern Radiusvector von der Sonne nach dem Punkte des Perihels, heißt die wahre Anomalie.

Denkt man sich einen Himmelskörper, der mit dem betrachteten Planeten dieselbe Umlaufzeit hat, dessen Bahn aber ein Kreis und dessen Bewegung daher eine ganz gleichförmige ist, so heißt der Winkel, welcher zwischen der früheren Perihelrichtung und der Richtung von der Sonne nach diesem imaginären Planeten gebildet wird, die mittlere Anomalie. Die Differenz, welche bei einer Bahn zwischen der wahren und mittleren Anomalie existirt, heißt die Mittelpunkts-Gleichung.

Endlich unterscheidet man noch eine Anomalie, welche entsteht, wenn man sich um den Mittelpunkt der Ellipse einen Kreis denkt, der die halbe große Achse als Radius hat. Zieht man von der halben großen Achse senkrecht durch den Ort des Planeten eine gerade Linie, so trifft man die Peripherie des Kreises in einem bestimmten Punkte. Der Winkel am Mittelpunkt der Ellipse, gebildet durch die Richtung nach dem Perihel und durch die Richtung nach dem eben bestimmten Punkte in der Peripherie des Kreises, heißt die excentrische Anomalie. Zwischen ihr und der wahren, sowie zwischen ihr und der mittleren Anomalie bestehen ziemlich einfache Gleichungen, welche schon von Kepler entwickelt sind und wovon die zwischen der excentrischen und wahren Anomalie von besonderer, nicht algebraischer, sondern transcendenter Form ist und die Keplersche Gleichung heißt.

Statt der Durchgangszeit durch das Perihel, welche man bei Kometenbahnen als Element einführt, hat man bei der Ellipse zu einer bestimmten Epoche die dazu gehörige mittlere Anomalie eingeführt.

Die Länge des Perihels unter der Angabe der Elemente ist, wenn die Planetenbahn eine Neigung

gegen die Elliptik hat, die Summe zweier Bögen, nämlich des Bogenstück von dem Nullpunkt der Theilung bis zum Knotenpunkte, die Länge des Knotens, und das Bogenstück vom Knoten bis zum Perihel.

Das Bogenstück vom Knotenpunkt bis zum Ort des Planeten heißt die Länge in der Bahn, auch Argument der Breite, und dazu die Länge des Knotens addirt, gibt die sogenannte mittlere Länge des Planeten.

Statt der halben großen Achse oder deren Logarithmus allein gibt man gewöhnlich noch die mittlere tägliche Bewegung an und erlangt dadurch und in Verbindung mit den eben erwähnten Daten mehr als sechs oder fünf Elemente. Es sind diese eigentlich überflüssige, von den notwendigen abhängige Elemente; sie dienen zur Controle und zur bessern Uebersicht.

Auf unserer Taf. 11 ist die Fig. 5 eine Veranschaulichung der zweiten Keplerschen Regel; die schattirten Flächen sind elliptische Sektoren von gleicher Größe, die also in gleichen Zeiten beschrieben werden. Der Sector ASB ist gleich dem Sector USG, gleich dem Sector CSD, gleich dem Sector FSE, und man erkennt die ungleiche Bewegung in der Bahn, indem in denselben Zeiten die Bogen AB, CD, EF, GH beschrieben werden.

In Fig. 6 derselben Tafel ist eine Darstellung der mittlern und wahren Anomalie; der Winkel ASP ist die wahre Anomalie, welche in derselben Zeit von dem Planeten beschrieben, für welche man sich die mittlere Anomalie A'S' zurückgelegt denkt, ebenso entspricht die mittlere Anomalie A'SQ' der wahren Anomalie ASQ, und den Halbkreis A'SS' denkt man sich in derselben Zeit durchlaufen, als die Halbellipse ASB.

Stellt die Linie SVF die Richtung nach dem Frühlingsanfangspunkt, dem Nullpunkt unserer Theilung am Himmel dar, so ist der Winkel VSA die Länge des Perihels, der Winkel VSP die mittlere Länge des Planeten.

Auf Taf. 4 sind bei den Planeten- und Kometenbahnen die Perihelien durch Punkte mit dem Buchstaben π , die aufsteigenden Knoten durch die Zeichen Ω , die niedersteigenden Knoten durch Υ angegeben.

2. Das Sonnensystem.

Zu unserm Sonnensystem gehören die Sonne, der man das Zeichen $\odot$ gegeben hat, die Planeten Mercur mit dem Zeichen $\mercurius$, Venus $\venus$, Erde $\earth$, Mars $\mars$, die kleinen Planeten zwischen Mars und Jupiter, deren gegenwärtig (November 1871) 117 bekannt sind, welchen allgemein jetzt die Zeichen (1) , (2) , ..., (117) gegeben werden, Jupiter $\jupiter$, Saturn $\saturn$, Uranus $\uranus$, Neptun $\neptune$; ferner die Monde oder Erabanthen, die Kometen und die Meteoriten oder Sternschnuppenschwärme, und das Wissenswerthe über diese Himmelskörper werden wir in möglichster Kürze angeben.

a) Die Sonne

ist der Centralkörper unsers Planetensystems und der uns am nächsten stehende Fixstern. Sie ist die Spenderin des Tageslichts und der Wärme, und ihre Helligkeit ist so groß, daß etwa 620000 Vollmonde und 56000 Millionen Fixsterne von der 1. Größe, von der Helligkeit der Capella, dazu gehören, um dasselbe Licht zu verbreiten.

Die mittlere Entfernung der Sonne von der Erde ist die Einheit in unserm System und zugleich die halbe große Achse der Ellipse, welche unsere Bahn um die Sonne beschreibt. Der Winkel, unter der

der Sonne aus der Halbmesser der Erde erscheint, heißt die Sonnenparallaxe und ist nach den neuesten Untersuchungen $8''.848$. Die mittlere Entfernung von uns ist 20,036000 geographische Meilen, deren 5400 auf den Umfang der Erde am Äquator gehen. Das Licht gebraucht, um diesen Weg zu durchlaufen, nach Struve 8 Minuten 17.88 Sekunden.

Der scheinbare Durchmesser der Sonne in der mittleren Entfernung ist $32' 4''.2$, doch steigt selbiger in der Erdnähe (am 1. oder 2. Januar) auf $32' 36''.5$ und nimmt ab in der Erdferne (am 1. oder 2. Juli) bis auf $31' 31''.9$. Der wahre Durchmesser der Sonne ist 187000 geographische Meilen, 109 mal größer als der der Erde, die Oberfläche daher 11900 mal größer als unsere Erdoberfläche, der körperliche Inhalt 1,280000 mal größer als der unserer Erde.

Die Sonnenmasse ist nach Hansen 319455 mal so groß als die der Erde, die mittlere Dichtigkeit dagegen nur $\frac{1}{4}$ der mittlern Dichtigkeit der Erde und das 1.4fache der Dichtigkeit des Wassers.

Die Schwerkraft auf der Oberfläche der Sonne ist 27 mal so groß als bei uns, sodaß ein Körper, der auf der Erde ein Pfund schwer ist, auf der Sonne 27 Pfund wiegen wird. In der ersten Sekunde fällt ein Körper auf der Sonnenoberfläche durch einen Weg von 133 Meter, während auf der Erde der Fallraum in derselben Zeit nur 4.9 Meter ist.

Auf der Sonne erblickt man zuweilen schon mit bloßem Auge dunkle Flecke, die im Fernrohr mit einem Halbschatten (Penumbra) umgeben sind, und durch deren Beobachtung man gefunden hat, daß sich die Sonne in 25 Tagen 7 Stunden um ihre Achse dreht. Doch haben die meisten Flecke selbst noch eine eigene Bewegung, und es zeigt sich, daß, wenn man die Rotation aus Flecken ableitet, die nördlich oder südlich vom Sonnenäquator stehen, für die Rotation eine etwas andere und zwar größere Zahl herauskommt. Aus den Beobachtungen der Flecke hat man auch gefunden, daß der Sonnenäquator gegen die Ekliptik um $7^{\circ} 30'$ geneigt ist und der Durchschnittspunkt ober der aufsteigende Knoten in 78° liegt. Die Flecke haben oft beträchtliche Dimensionen und bis zu 10000 Meilen und mehr im Durchmesser. Sie erscheinen nördlich und südlich vom Äquator der Sonne, geben aber selten über eine bestimmte Zone, die die Königszone genannt wird und sich bis zu 40° nördlich und südlich vom Äquator erstreckt, hinaus.

Außer größeren Flecken hat die Sonne, in starken Fernrohren betrachtet, eine große Menge äußerst kleiner Flecke oder Poren, zwischen welchen sich Lichtadern hindurchziehen. An einzelnen Stellen sind beträchtliche Lichtanhäufungen, die Sonnenfackeln genannt werden.

Nicht zu allen Zeiten sind gleichviel Sonnenflecke vorhanden; es gibt Jahre, wo deren sehr wenige sind, andere, in denen ungemein viel sich zeigen, und man hat gefunden, daß von einem Fleckenmaximum oder Fleckenminimum zum andern $11\frac{1}{2}$ Jahre verfließen. Die letzten Fleckenmaxima fielen in die Jahre 1848, 1859, 1870, die Minima in die Jahre 1856, 1868.

Bei totalen Sonnenfinsternissen hat man zuerst an den Rändern der Sonne rothe Hervorragungen, Protuberanzen, wahrgenommen, die sich mehrere Minuten über den Sonnenrand erstrecken und bis zu 20000 Meilen und mehr Höhe haben. Gegenwärtig ist es möglich, mit Spectralapparaten diese Protuberanzen bei unbedecktem Himmel zu jeder Tageszeit zu sehen. Außerdem genahrt man bei totalen Sonnenfinsternissen einen hellleuchtenden Lichtkreis um die Sonne, welcher die Krone (Corona) genannt wird.

Ueber die physische Beschaffenheit der Sonne

existiren zwei Hypothesen, die eine von Wilson und W. Herschel, nach welcher die Sonne selbst ein dunkler Körper ist, der mit mehreren Atmosphären, unter ihnen eine hellleuchtende, Photosphäre genannt, umgeben ist, und die Sonnenfackeln werden nach dieser Hypothese als Löcher in der Photosphäre erklärt, durch welche man den dunkeln Kern der Sonne sieht, die Sonnenfackeln werden als Lichtanhäufungen erklärt u. s. f. w.

Nach der andern Hypothese ist die Sonne noch im feurigflüssigen Zustande, ebenfalls mit mehreren Atmosphären umgeben, in welcher eine Menge gasförmige Substanzen sich befinden, die gewisse Sonnenstrahlen absorbiren und uns in dem Spectrum der Sonne als dunkle Linien erscheinen. Die Flecke sind danach Schluden, welche auf der feurigflüssigen Oberfläche schwimmen, über sich eine Temperaturerniedrigung eintreten lassen und dadurch die die Flecke umgebende Penumbra erzeugen. Die Protuberanzen werden als gasförmige Gebilde, Ströme, angenommen, die ähnlich unsern Wolken auf der Erde fortwährend ihre Form und Größe ändern.

Wenn man mächtige Eruptionen und Stürme auf der Sonnenoberfläche annimmt, lassen sich alle bis jetzt wahrgenommenen Erscheinungen mit der letztern Hypothese auf eine einfachere Art erklären, als mit Hilfe der ersten Wilson-Herschel'schen.

Taf. 7, Fig. 1 stellt die totale Sonnenfinsterniß vom Jahre 1860 am 18. Juli dar; die hellen Hervorragungen am Rande sind die Protuberanzen und der die schwarze Scheibe umgebende Lichtkreis die Krone.

Fig. 2 auf derselben Tafel stellt die eigenthümliche Form der Sonnenflecke dar, wie sie in dem großen Fernrohr der Leipziger Sternwarte am 13. September 1867 gesehen und gezeichnet wurden.

b) Die Planeten.

1) Mercur

ist der nächste, uns sicher bekannte, die Sonne umkreisende Planet. Obwohl man noch einen oder mehrere der Sonne nähere Planeten vermuthet, und einige auch glauben, daß ein solcher gesehen worden ist, kann doch nach reiflicher Prüfung aller Umstände die Beobachtung eines solchen Planeten höchstens als wahrscheinlich bezeichnet werden.

Die mittlere Entfernung von der Sonne ist 7.8 Millionen Meilen, die kleinste, da die Excentricität der Bahn nahe $\frac{1}{5}$, 6.2 Millionen, die größte 9.3 Millionen Meilen. Sein tropischer Umlauf beträgt 87 T. 23 St. 14 M. 32 S., sein synodischer 115 T. 21 St. Die Entfernung von der Erde schwankt zwischen 10.4 Mill. und 29.7 Mill. Meilen, der scheinbare Durchmesser zwischen $12''.9$ und $4''.5$, der wahre Durchmesser ist 650 Meilen.

Seine Masse ist nach Ende $\frac{1}{100000}$ der Sonnenmasse und die Dichtigkeit 1.4 im Vergleich zur Erde. Ein Körper, der auf der Erde 1 Pfund wiegt, ist auf dem Mercur 0.52 Pfund schwer.

Da er im Mittel der Sonne $2\frac{1}{2}$ mal näher als unsere Erde, so bekommt er circa sechsmal so viel Licht und Wärme. Seiner Nähe zur Sonne wegen sehen wir ihn auch immer in geringer Entfernung derselben, bald nach der Sonne untergehend, bald vor ihr aufgehend. Seine größte Entfernung von der Sonne, die größte Elongation, kann bis auf 28° steigen. Er erscheint dem bloßen Auge zur Zeit der größten Elongation etwa als Stern 2. Größe.

Da er ein innerer Planet ist, d. h. seine Bahn innerhalb der Erdbahn liegt, so erkennt man im Fernrohr Phasen, wie unser Erdmond sie zeigt: er erscheint

bald ganz, bald halb, bald als Sichel beleuchtet. Phasen sind nicht scharf begrenzt, und man hat aus auf die Existenz von Bergen und einer Atmosphäre geschlossen und die Rotation um seine Achse zu St. 5 M. bestimmt.

u gewissen Zeiten sehen wir ihn vor der Sonne vorbeiziehen, und solche Mercurdurchgänge finden diesem Jahrhundert statt am 6. Mai 1878, am November 1881, am 10. Mai 1891, am 10. November 1894.

2) Venus.

Die mittlere Entfernung der Venus von der Sonne 14.5 Millionen Meilen, und da die Excentricität Bahn nur $\frac{1}{40}$ ist, kann sie sich der Sonne bis 14.4 Mill. Meilen nähern und bis auf 14.6 Mill. Meilen entfernen.

Die tropische Umlaufszeit ist 224 T. 16 St. 41 M. S., die synodische 1 J. 218 T. 16 St., sodas der met in acht Jahren fast fünf synodische Umläufe ist und alle acht Jahre fast zu derselben Jahreszeit derselben Stelle des Himmels erscheint.

Die Entfernung der Venus von der Erde schwankt zwischen 5.3 Mill. und 35 Mill. Meilen, der scheinbare Durchmesser zwischen $65''.2$ und $9''.5$, der wahre Durchmesser ist 1640 Meilen. Die Masse ist $\frac{1}{41250}$ Sonnenmasse und die Dichtigkeit 0.89 im Vergleich Erde. Ein Pfund auf der Erde wiegt auf der Venus 0.85 Pfund.

Die Venus ist der Sonne 1.4 mal näher als der Erde, sie erhält daher etwa 1.9 mal soviel Licht und Wärme. Wegen ihrer Nähe zur Sonne erscheint sie bald als Morgenstern, bald als Abendstern, und größte Elongation übersteigt nicht 48° . Am hellsten (größten Glanze) erscheint sie uns 39 Tage vor oder nach ihrer untern Conjunction mit der Sonne.

Als innerer Planet zeigt auch Venus wie Mercur Phasen von der schmalen Sichel bis zur vollen Beleuchtung. Ihre Phasen zeigen keine scharfen Grenzen, man sieht auf ihr Fleden, aus welchen man auf eine Atmosphäre geschlossen hat und wodurch man die Rotation um die Achse auf St. 21 M. 22 S. ansetzt, doch ist diese Zahl noch sehr unsicher.

Wie der Mercur geht auch die Venus zu bestimmten Zeiten vor der Sonnencheibe vorüber und diese Venusdurchgänge sind für die Ermittlung der Sonnenparallaxe und der Entfernung der Sonne von der Erde von großer Wichtigkeit. Solche Vorübergänge finden aber nicht sehr oft statt, in der nächsten Zeit am 8. December 174, am 6. December 1882, und dann erst wieder 7. Juni 2004, am 5. Juni 2102, am 10. December 17, am 8. December 2125; die Perioden sind daher $121\frac{1}{2}$ J., 8, $105\frac{1}{2}$ Jahre.

Auf Taf. 11 sind in Fig. 2 die Beleuchtungsphasen von Mercur und der Venus in ihren scheinbaren Größen, gesehen von der Erde, dargestellt. Sowohl Mercur als die Venus sind ganz beleuchtet zur Zeit obren Conjunction, zur Zeit der untern Conjunction nicht, denn den dunkeln, schwarz gezeichneten Theil der Kugeln sieht man für gewöhnlich nicht.

3) Erde.

Ihre mittlere Entfernung von der Sonne ist nach den neuesten Bestimmungen 11650 mal größer als der Durchmesser oder 20,036000 geographische Meilen; Sonnenparallaxe wird zu $8''.848$ angenommen. Die Excentricität der Erdbahn ist $\frac{1}{60}$ und daher ihre mittlere Entfernung von der Sonne 19,704000 Meilen, die größte 20,372000 Meilen.

Die siderische Umlaufszeit ist 365 T. 6 St. 9 M.

9.5 S., die tropische oder die Länge des Sonnenjahrs 365 T. 5 St. 48 M. 46.1 S. Der Zeitraum, welchen die Erde gebraucht, um sich einmal um ihre Achse zu drehen, heißt ein Sterntag, welches Intervall sich bis auf ganz kleine periodische Schwankungen immer gleich bleibt, während der wahre Sonnentag oder die Zeit von einem Durchgange der Sonne durch den Meridian bis zum andern wegen der ungleichförmigen Bewegung der Erde und weil die Bewegung in der Elliptik und nicht in der Ebene des Aequators geschieht, ungleich ist. Der mittlere Sonnentag ist die Zeit, welche bei ganz gleichförmiger Bewegung der Erde um die Sonne in der Ebene des Aequators zwischen zwei Culminationen der Sonne durch den Meridian verfließen würde, und es sind 365.25636 solcher mittlern Sonnentage gleich 366.25636 Sterntage, sodas die Dauer eines Sterntags 23 St. 56 M. 4.091 S. nach mittlerer Zeit ist.

Zur Zeit des Frühlingsanfangs, wenn die Erde im Aequator steht, ist die Sternzeit der wahren Zeit gleich, zu allen andern Zeiten des Jahres ist sie von der wahren Zeit verschieden, und die Differenz wächst täglich um nahe 4 Minuten und ist zur Herbstnachtgleiche 12 Stunden.

Die Dauer des wahren Sonnentags schwankt zwischen 23 St. 59 M. 39 S. und 24 St. 0 M. 30 S.

Die Differenz zwischen der mittlern und der wahren Sonnenzeit heißt die Zeitgleichung.

Die mittlere Zeit und wahre Sonnenzeit fallen im Jahre viermal zusammen, und zwar am 14. oder 15. April, am 14. oder 15. Juni, am 31. August oder 1. September und am 23. oder 24. December. Der größte positive Werth der Zeitgleichung gegen Mitte Februar ist $14\frac{1}{2}$ Minuten, der größte negative Werth Anfang November $16\frac{1}{2}$ Minuten.

Der Aequator der Erde ist gegen die Elliptik (Erdbahn) gegenwärtig $23^\circ 27' 22''$ geneigt, welche Größe, sogenannte Schiefe der Elliptik, sich jetzt jährlich um $0''.476$ vermindert, später aber wieder zunimmt, in der Art, daß die Neigung des Aequators zwischen 21° und 27° schwankt.

Bis auf ganz kleine Schwankungen bleibt die Erdbachse im Laufe des Jahres immer parallel, und bei der Bewegung der Erde um die Sonne scheint wegen der Schiefe der Elliptik die Sonne über den Horizont eines Ortes höher zu steigen oder tiefer zu sinken. Es entstehen daraus die Ungleichheit des Tags und der Nacht sowie die Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Der astronomische Frühling fängt für die nördliche Erdhälfte an, wenn die Sonne in den Widder tritt, am 20. März, und dauert 92 T. 22 St. Der Sommer beginnt, wenn die Sonne 90° Länge hat und in das Zeichen des Krebses tritt, am 22. Juni, und dauert 93 T. 14 St. Der Anfang des Herbstes erfolgt, wenn die Sonne wieder im Aequator steht, am 23. September, die Dauer dieser Jahreszeit ist 89 T. 17 St. Der Winter beginnt, wenn die Sonne 270° Länge hat, am 22. December, und dauert 89 T. 1 St.

Für die südliche Erdhälfte treten die Jahreszeiten umgekehrt ein. Auf der nördlichen Hälfte ist daher der Frühling und Sommer 7 T. 18 St. länger als Herbst und Winter; auf der südlichen Hälfte ebenso viele Tage und Stunden kürzer.

Die Masse der Erde ist nach Hansen $\frac{1}{311300}$, die mittlere Dichtigkeit ist nach Baily und Reich 5.6, nach Airy 6.6 mal größer gefunden als die des Wassers und ist viermal größer als die der Sonne.

Die Gestalt der Erde ist die einer abgeplatteten Kugel, eines Umdrehungsellipsoids, dessen kleine Achse die Umdrehungsachse ist. Die Abplattung beträgt nach Bessel $\frac{1}{299.1509}$, der wahre Durchmesser der Erde ist

die kleinste Entfernung von der Sonne 27.7 Mill., größte 33.3 Mill. Meilen.

Die tropische Umlaufszeit ist 1 J. 321 T. 16 St. 11., die synodische 2 J. 48 T. 23 St.

Von der Sonne empfängt der Mars nur $\frac{1}{4}$ des Lichts und der Wärme als die Erde.

Er erscheint uns am Himmel als ein rother Stern, am hellsten zur Zeit seiner Opposition ist. In der letzten Opposition ist er achtmal heller als ein Stern der Größe von der Helligkeit der Capella und 7000 Malen mal schwächer als die Sonne in ihrer mittlern Entfernung. Die Rechnung hat aus den Beobachtungen eben, daß er von dem Sonnenlicht, welches er bekommt, nur 27 Procent zurükgibt.

Die Entfernung des Mars von der Erde schwankt zwischen 7.3 Mill. und 54 Mill. Meilen, der scheinbare Durchmesser zwischen 25".6 und 3".5, der wahre Durchmesser ist 910 Meilen, die Dichtigkeit 0.7 im Vergleich zur Erde, und ein Körper, welcher auf der Erde Pfund wiegt, ist auf der Oberfläche des Mars nur Pfund schwer.

Mit dem Fernrohr erkennt man auf der Oberfläche des Mars, und aus der Beobachtung derselben hat man geschlossen, daß der Mars sich in 24 St. 37 M. 30 S. seine Achse dreht. Die Neigung seines Aequators seiner Bahnebene ist 27°.3, so daß er ganz ähnliche Jahreszeiten hat als die Erde. Die Flecke auf der Oberfläche zeigen deutlich, daß eine Atmosphäre vorhanden ist, außerdem hat man an den Polen hellere Segmente bemerkt, die je nach der Jahreszeit größer, bald kleiner werden, und ist zu der Antarktis gekommen, daß diese Flecke von Schnee und Eis bedeckt, welche sich im Winter des Mars vergrößern, im Sommer verkleinern.

Auf Taf. 7, Fig. 10 ist eine Abbildung des Mars Maßstabe $\frac{1}{200,000,000}$ wie er am 25. April 1856 in dem Fernrohr gesehen und gezeichnet ist und worin die Flecke auf der Oberfläche, ebenso die Schnee- und Eisbedeckung, von welcher die nördliche bedeutend größer ist, die südliche ist, deutlich sichtbar sind.

5) Die kleinen Planeten.

Auf eine Lücke in der Entfernung der Planeten zwischen Mars und Jupiter, wenn man sie in einer entgegenseitigen Reihe aufstellt, wonach

Rechnung von der Sonne 8 Millionen Meilen
 Venus " " " $8 + 1 \times 6$ Mill. Meilen
 Erde " " " $8 + 2 \times 6$ " "
 Mars " " " $8 + 4 \times 6$ " "
 Jupiter " " " $8 + 16 \times 6$ " "
 Saturn " " " $8 + 32 \times 6$ " "
 Uranus " " " $8 + 64 \times 6$ " "

erkannt ist, hatten schon Kepler, später Titius, Bode aufmerksam gemacht, und als am 1. Januar 1801 Astronom Piazzi in Palermo einen kleinen Stern, dessen Bewegung ergab, daß sie einem Planeten zwischen Mars und Jupiter angehören mußte, glaubte die Lücke ausgefüllt. Dieser Planet bekam den Namen Ceres; am 28. März 1802 fand Olbers bei der Suche derselben noch einen Planeten, dem man den Namen Pallas gab, und es zeigte sich dadurch, in dieser Lücke nicht nur einer, sondern mehrere netten vorhanden seien, die man ihrer Kleinheit wegen „kleine Planeten“ oder „Asteroiden“ nannte.

Bei Aufertigung von Sternkarten entdeckte am September 1804 der Astronom Harding in Göttingen dritten kleinen Planeten, die Juno, am 29. März 1807 Olbers einen vierten, die Vesta. Es verfloßen Jahre, ohne die Zahl der kleinen Planeten zu ver-

mehren, da entdeckte ein Liebhaber der Astronomie, der Postsecretär Gentile in Triest, am 8. December 1845 einen fünften, die Asträa, und derselbe am 1. Juli 1847 einen sechsten, die Hebe. Seit jener Zeit wandte man besondern Fleiß auf die Herstellung genauer Sternkarten, verzeichnete besonders die Sterne in der Nähe der Elliptik und hat bis jetzt im ganzen 117 kleine Planeten gefunden, von welchen die in den letzten Jahren entdeckten noch viel lichtschwächer als die anfangs entdeckten sind.

Von den 117 Planeten, welche wir in dem folgenden Verzeichniß geben, sind entdeckt: 32 in Frankreich, 29 in Amerika, 25 in Deutschland, 16 in England, 11 in Italien, 3 in Ostindien, 1 in Dänemark.

Die mittlere Entfernung dieser kleinen Planeten von der Sonne schwankt zwischen 40 Mill. und 70 Mill. Meilen und ihre Umlaufszeit zwischen 3 J. 97 T. und 6 J. 194 T. Nur in der Nähe ihrer Opposition sind die meisten von der Erde aus sichtbar, weil sie alsdann ihre größte Helligkeit haben. Die Vesta erreicht manchmal die Helligkeit eines Sterns 6. Größe, so daß man sie eben mit bloßem Auge sehen kann, zur Wahrnehmung der andern sind Fernrohre nöthig, und einige unter ihnen selbst in der Opposition so schwach, daß sie nur mit unsern größern Fernrohren zu erblickt sind.

Unter der Hypothese, daß ihr Reflexionsvermögen dasselbe ist als das Mittel der großen Planeten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun, hat man näherungsweise ihre wahren Durchmesser berechnet, die zwischen 3 und 50 geographischen Meilen schwanken. Nur von einigen mögen hier die so hypothetisch berechneten Durchmesser folgen:

Vesta	49 Meilen	Thalia	9 Meilen
Ceres	49 "	Eutetia	9 "
Pallas	37 "	Pacida	7 "
Juno	24 "	Malante	4 " u. s. w.
Victoria	9 "		

Ueber die Massen dieser Himmelskörper wissen wir nichts, ihre Gesamtmasse wird sehr gering sein, und unsere Rechnungen, unter der Voraussetzung, daß ihre Massen gegen die der größern Planeten verschwindend klein sind, zeigen eine vollständige Uebereinstimmung mit den Beobachtungen.

Als man nur vier dieser kleinen Planeten hatte, glaubte Olbers die Hypothese aufstellen zu können, daß diese die Trümmer eines einzigen größern Planeten seien; jetzt ist man aber mehr geneigt, anzunehmen, daß ursprünglich ein Nebelring sich zwischen Mars und Jupiter um die Sonne bewegt habe, der durch irgendeine Ursache zerfallen ist, sich in viele kleine Stücke auflöste, aus denen durch allmähliche Verdichtung die kleinen Planeten entstanden sind.

In der folgenden Tabelle sind zunächst die kleinen Planeten nach der Reihenfolge ihrer Entdeckung mit der Zeit und dem Ort der Entdeckung und dem Namen des Entdeckers aufgeführt. In einer zweiten Tabelle sind die Bahnelemente gegeben, und zwar steht in der ersten Columnne derselben der Name des Planeten, in der zweiten die Länge des Perihels, in der dritten die Länge des aufsteigenden Knotens der Bahn, in der vierten die Neigung der Bahn gegen die Elliptik, in der fünften die halbe große Achse, ausgedrückt in Einheiten der Entfernung der Sonne von der Erde, in der sechsten die Excentricität, ausgedrückt in Einheiten der halben großen Achse, in der siebenten die siderische Umlaufszeit in Julianischen Jahren (zu $365\frac{1}{4}$ Tagen) und Tagen.

Die kleinen Planeten zwischen Mars und Jupiter.

Name.	Nummer.	Zeit der Entdeckung.	Name des Entdeckers.	Ort der Entdeckung.
Ceres	1	1. Jan. 1801	Piazzi	Palermo
Vulcan	2	28. März 1802	Oberst	Bremen
Juno	3	1. Sept. 1804	Höring	Bremen
Vesta	4	29. März 1807	Oberst	Bremen
Astraea	5	8. Dec. 1845	Hente	Dresden
Pallas	6	1. Juli 1847	Hente	Dresden
Joris	7	13. Aug. 1847	Hind	London
Venera	8	18. Oct. 1847	Hind	London
Hygiea	9	26. April 1848	Brassham	London
Erato	10	12. April 1849	de Gasparis	Neapel
Parthenope	11	11. Mai 1850	de Gasparis	Neapel
Victoria	12	13. Sept. 1850	Hind	London
Cybele	13	2. Nov. 1850	de Gasparis	Neapel
Erone	14	19. Mai 1851	Hind	London
Eunomia	15	29. Juli 1851	de Gasparis	Neapel
Vulpe	16	27. Nov. 1852	de Gasparis	Neapel
Themis	17	17. April 1852	Kutcher	Wien
Polymene	18	24. Juni 1852	Hind	London
Fortuna	19	22. Aug. 1852	Hind	London
Mallatia	20	19. Sept. 1852	de Gasparis	Neapel
Amelia	21	15. Nov. 1852	Goldschmidt	Paris
Calpurnia	22	16. Nov. 1852	Hind	London
Italia	23	15. Dec. 1852	Hind	London
Themis	24	5. April 1853	de Gasparis	Neapel
Vocacia	25	7. April 1853	de Gasparis	Neapel
Proserpina	26	5. Mai 1853	Kutcher	Wien
Euterpe	27	8. Nov. 1853	Hind	London
Helena	28	1. März 1854	Kutcher	Wien
Ampelitrte	29	1. März 1854	Warth	London
Urania	30	22. Juli 1854	Hind	London
Euphrosyne	31	2. Sept. 1854	Herajon	Washington
Venera	32	26. Oct. 1854	Goldschmidt	Paris
Polyhymnia	33	28. Oct. 1854	de Gasparis	Neapel
Ceres	34	16. April 1855	de Gasparis	Neapel
Pencostea	35	19. Sept. 1855	Kutcher	Wien
Alauda	36	5. Oct. 1855	Goldschmidt	Paris
Hygiea	37	5. Oct. 1855	Kutcher	Wien
Vesta	38	12. Jan. 1856	de Gasparis	Neapel
Kallia	39	8. Febr. 1856	de Gasparis	Neapel
Parthenope	40	31. März 1856	Goldschmidt	Paris
Daphne	41	22. April 1856	Goldschmidt	Paris
Joris	42	23. Mai 1856	Herajon	Washington
Ariadne	43	15. April 1857	Herajon	Washington
Hygia	44	27. Mai 1857	Goldschmidt	Paris
Eugenia	45	26. Juni 1857	Goldschmidt	Paris
Helia	46	16. Aug. 1857	Herajon	Washington
Alauda	47	15. Sept. 1857	Kutcher	Wien
Doris	48	19. Sept. 1857	Goldschmidt	Paris
Vesta	49	19. Sept. 1857	Goldschmidt	Paris
Virginia	50	4. Oct. 1857	Herajon	Washington
Remaula	51	22. Jan. 1858	Laurent	Wien
Europa	52	4. Febr. 1858	Goldschmidt	Paris
Calpurnia	53	4. April 1858	Kutcher	Wien
Alexandra	54	10. Sept. 1858	Goldschmidt	Paris
Pandora	55	10. Sept. 1858	de Gasparis	Neapel
Melete	56	9. Sept. 1857	Goldschmidt	Paris
Demofryne	57	22. Sept. 1859	Kutcher	Wien
Concordia	58	24. März 1860	Kutcher	Wien
Urania	59	12. Sept. 1860	de Gasparis	Neapel
Danae	60	14. Sept. 1860	Herajon	Washington
Erato	61	9. Sept. 1860	Goldschmidt	Paris
Erato	62	14. Sept. 1860	Förster u. Fessler	Berlin
Aufonia	63	11. Febr. 1861	de Gasparis	Neapel
Angelina	64	5. März 1861	Tempel	Maricelle
Hygiea	65	9. März 1861	Tempel	Maricelle
Alauda	66	1. April 1861	Tuttle	Cambridge (U. St.)
Alia	67	17. April 1861	Herajon	Washington
Vesta	68	29. April 1861	Kutcher	Wien
Heperia	69	29. April 1861	de Gasparis	Neapel
Pandora	70	5. Mai 1861	Goldschmidt	Paris
Hygiea	71	13. Aug. 1861	Kutcher	Wien
Terona	72	29. Mai 1861	Peters	Clinton (U. St.)
Clotia	73	7. April 1862	Tuttle	Cambridge (U. St.)
Calpurnia	74	29. April 1862	Tempel	Maricelle
Curviter	75	22. Sept. 1862	Peters	Clinton (U. St.)
Freia	76	21. Oct. 1862	Arrest	Kopenhagen
Friggera	77	12. Nov. 1862	Peters	Clinton (U. St.)
Diana	78	15. März 1863	Kutcher	Wien
Eunomia	79	14. Sept. 1863	Watson	Ann Arbor (U. St.)
Aspasia	80	2. Mai 1864	Herajon	Washington
Terpsichore	81	30. Sept. 1864	Tempel	Maricelle
Alfione	82	27. Nov. 1864	Kutcher	Wien
Beatrice	83	26. April 1865	de Gasparis	Neapel
Urania	84	25. Aug. 1865	Kutcher	Wien
Jo	85	19. Sept. 1865	Peters	Clinton (U. St.)
Emelia	86	4. April 1866	Tuttle	Berlin
Enodia	87	16. Mai 1866	Herajon	Washington
Diobbe	88	15. Juni 1866	Peters	Clinton (U. St.)
Julia	89	6. Aug. 1866	Stephan	Maricelle
Antiope	90	1. Oct. 1866	Kutcher	Wien

Name.	Nummer.	Zeit der Entdeckung.	Name des Entdeckers.	Ort der Entdeckung.
Regina	91	4. Nov. 1866	Stephan	Maricelle
Urania	92	7. Juli 1867	Peters	Clinton (U. St.)
Urania	93	24. Aug. 1867	Watson	Ann Arbor (U. St.)
Urania	94	6. Sept. 1867	Watson	Ann Arbor (U. St.)
Urania	95	23. Nov. 1867	Kutcher	Wien
Urania	96	17. Febr. 1868	Goggia	Maricelle
Urania	97	17. Febr. 1868	Tempel	Maricelle
Urania	98	18. April 1868	Watson	Clinton (U. St.)
Urania	99	28. Mai 1868	Borelli	Maricelle
Urania	100	11. Juli 1868	Watson	Ann Arbor (U. St.)
Urania	101	15. Aug. 1868	Kutcher	Ann Arbor (U. St.)
Urania	102	29. Aug. 1868	Watson	Ann Arbor (U. St.)
Urania	103	7. Sept. 1868	Watson	Ann Arbor (U. St.)
Urania	104	13. Sept. 1868	Watson	Ann Arbor (U. St.)
Urania	105	16. Sept. 1868	Watson	Ann Arbor (U. St.)
Urania	106	10. Oct. 1868	Watson	Ann Arbor (U. St.)
Urania	107	17. Nov. 1868	Watson	Maricelle
Urania	108	2. April 1869	Kutcher	Wien
Urania	109	9. Oct. 1869	Peters	Clinton (U. St.)
Urania	110	19. April 1870	Borelli	Maricelle
Urania	111	14. Aug. 1870	Peters	Clinton (U. St.)
Urania	112	19. Sept. 1870	Peters	Clinton (U. St.)
Urania	113	12. März 1871	Kutcher	Wien
Urania	114	23. Juli 1871	Peters	Clinton (U. St.)
Urania	115	6. Aug. 1871	Watson	Ann Arbor (U. St.)
Urania	116	8. Sept. 1871	Peters	Clinton (U. St.)
Urania	117	12. Sept. 1871	Borelli	Maricelle

Anmerkung. Die jetzt gebrauchlichen Zeichen für die kleinen Planeten sind kleine Kreise mit der Nummer darin, welche der Zeit der Entdeckung entspricht.

Bahnelemente der kleinen Planeten.

Name der Planeten.	Größe der Bahn.	Perihelion.	Entfernung der Bahn vom Sonnen.	Neigung der Bahn gegen die Ekliptik.	Halbe große Achse.	Größe der Bahn.	Umlaufzeit (Jahre).
Ceres	1487.	807.	106.	2.768	0.076	3.	4
Pallas	1217.	1728.	347.	3.770	0.239	4	5
Juno	150.	170.	13.0	2.667	0.255	5	13
Vesta	2500.	103.5	7.1	2.361	0.089	3	23
Astraea	1347.	141.4	5.3	2.579	0.187	4	41
Hygiea	153.	133.7	14.8	2.425	0.202	3	34
Joris	41.4	259.8	5.5	2.386	0.231	3	85
Venera	32.9	110.3	5.9	2.201	0.157	3	8
Hygiea	71.1	68.5	5.6	2.387	0.128	3	21
Hygiea	237.2	266.1	3.8	2.154	0.105	3	29
Parthenope	317.0	125.2	4.6	2.432	0.098	3	30
Victoria	301.7	235.6	8.4	2.334	0.219	3	20
Erato	120.2	43.2	16.5	2.577	0.087	4	34
Erone	179.8	86.7	9.1	2.589	0.164	3	41
Eunomia	27.9	293.9	11.7	2.644	0.187	4	10
Hygiea	15.8	150.6	3.1	2.921	0.186	4	37
Themis	261.0	125.4	5.6	2.475	0.127	3	32
Polymene	15.1	150.1	10.2	2.296	0.218	3	17
Fortuna	30.5	214.4	1.5	2.441	0.158	3	37
Mallatia	99.2	260.5	0.7	2.409	0.143	3	39
Amelia	327.1	80.5	3.1	2.435	0.163	3	22
Calpurnia	59.0	66.6	13.7	2.311	0.099	4	33
Themis	123.5	67.6	10.2	2.631	0.230	4	36
Themis	142.8	35.8	0.8	3.139	0.123	5	35
Vocacia	303.0	214.1	21.6	2.401	0.245	3	34
Proserpina	236.4	45.9	3.6	2.656	0.087	4	30
Euterpe	85.0	138.8	1.6	2.348	0.172	3	31
Helena	122.7	144.9	9.4	2.773	0.154	4	20
Ampelitrte	56.4	356.7	6.1	2.525	0.074	4	29
Urania	31.6	308.2	2.1	2.366	0.128	3	24
Euphrosyne	93.6	31.5	26.5	3.151	0.221	5	31
Remonia	193.4	220.7	5.5	2.587	0.083	4	31
Polyhymnia	342.8	9.1	1.9	2.863	0.340	6	31
Urania	140.1	195.9	5.4	2.696	0.108	4	117
Pencostea	202.2	355.7	8.2	2.939	0.222	5	30
Alauda	42.7	359.2	18.7	2.745	0.302	4	40
Hygiea	65.7	8.3	3.1	2.642	0.175	4	108
Vesta	100.7	296.4	7.0	2.741	0.152	4	161
Urania	2.4	157.4	10.4	2.770	0.113	4	119
Parthenope	220.2	179.1	16.0	2.769	0.271	4	211
Joris	318.0	84.5	8.6	2.440	0.226	3	20
Ariadne	277.8	264.3	3.5	2.303	0.168	3	37
Hygia	112.1	131.1	3.7	2.422	0.151	3	34
Eugenia	229.9	148.1	6.6	2.721	0.082	4	118
Helia	354.2	181.5	2.3	2.526	0.164	4	174
Urania	313.2	4.2	5.0	2.759	0.134	4	323
Doris	73.4	185.2	6.3	3.103	0.070	3	133
Pallas	31.7	290.3	3.1	3.082	0.237	5	110
Virginia	10.0	173.5	2.8	2.652	0.284	4	116
Remaula	175.5	175.7	10.0	2.366	0.065	3	133

Zu diesen Haupttringen wurde in neuester Zeit noch ein innerer fast dunkler Ring entdeckt, der etwas durchsichtig zu sein scheint. Dem Anscheine nach zerfällt jeder der Haupttringe noch in mehrere concentrische Ringe. Die Dide des Ringes wird nach verschiedenen Messungen zu 39 Meilen angegeben. Da die Ringe gegen die Ebene der Bahn geneigt sind und im Raum immer nahe dieselbe Lage behalten, sehen wir den Ring während eines Umlaufs in verschiedener elliptischer Gestalt; manchmal so breit, daß die Kugel vollständig in ihm liegt, dann schmaler und schmaler werden bis zu so geringer Dimension, daß man mit den besten Fernröhren nur noch eine ganz feine Lichtlinie erkennt. Man will wahrgenommen haben, daß die Ringe sich dem Saturn nähern und die Kugel nicht centrisch innerhalb der Ringe liegt.

Im Spectrum erkennt man das Sonnenspectrum wieder, jedoch noch eine Menge von Absorptionslinien, die als Anzeichen einer wasserdampfhaltigen Atmosphäre angesehen werden.

Saturn hat acht Satelliten, von welchen einige erst in diesem Jahrhundert entdeckt sind.

Taf. 7, Fig. 6, 7, 8, 9 stellen den Saturn dar im Maßstabe $\frac{1}{1,000,000,000}$, wie man ihn am 10. October 1850, am 27. November 1855, am 23. Jannuar 1849, am 8. Mai 1868 gesehen hat. Die Abplattung der Kugel und die Streifen sind leicht zu erkennen, die beiden Haupttringe und der dunkle Ring sind ebenfalls in Fig. 6, 7 und 9 zu sehen, und Fig. 7 zeigt auch die mehrfachen Theilungen der beiden Haupttringe. Fig. 8 stellt den Saturn dar in der Lage, in welcher der Ring am schmalsten und nur noch eben sichtbar erscheint.

8) Uranus

war den Alten nicht bekannt und wurde erst als Planet am 13. März 1781 von Wilhelm Herschel entdeckt. Seine mittlere Entfernung von der Sonne ist 384.3 Mill. Meilen, die größte 402.2 Mill., die kleinste 366.4 Mill. Meilen, da die Excentricität der Bahn $\frac{7}{10}$ ist.

Die tropische Umlaufszeit beträgt 83 J. 271 T. 11 St., die synodische 1 J. 4 T. 7 St.

Das bloße Auge kann den Uranus nur auffinden, wenn man den Ort ziemlich genau kennt, denn er gleicht einem Sterne sechster Größe, ist 160mal schwächer als Capella und $8\frac{1}{2}$ Billionen mal schwächer als die Sonne. Von dem empfangenen Sonnenlicht reflectirt er 64 Procent. Licht und Wärme ist für ihn 368 mal schwächer als auf der Erde.

Die mittlere Entfernung von der Erde schwankt zwischen 346 und 423 Mill. Meilen und der scheinbare Durchmesser zwischen $3''.9$ und $4''.7$. Der wahre Durchmesser ist nahe 8000 Meilen, der körperliche Inhalt 90mal so groß als der der Erde und, da die Masse zu $\frac{1}{21,000}$ angenommen wird, ist die mittlere Dichtigkeit 0.17. Ein Körper von 1 Pfund Schwere auf der Erde wiegt auf dem Uranus 0.7 Pfund.

Im Spectrum erkennt man mehrere schwarze Streifen im Grünblau, außerdem zeigt es eine Lücke im Gelb und Orange und nur im Roth erscheint wieder etwas Licht.

Man kennt bei Uranus mit Sicherheit vier Monde, deren Bewegungsrichtung fast senkrecht zu seiner Bahn ist; man hat daraus geschlossen, daß auch die Rotationsachse des Uranus nahe in der Ebene seiner Bahn liegt.

9) Neptun.

Die Störungen, welche die Planeten aufeinander ausübten, zeigten schon Bouvard, daß die Bewegung des

Uranus sich nicht durch die Einwirkung der damals bekannten Körper darstellen ließe, und die Vermuthung, daß noch ein transuranischer Planet vorhanden sei, wurde mehrfach, unter andern auch von Bessel ausgesprochen. Leverrier in Paris, sowie unabhängig von ihm Adams in Cambridge (England) berechneten die ersten einen transuranischen Planeten. Nachdem Leverrier zuerst das Neulat seiner Rechnungen im Jahre 1846 bekannt gemacht und mehrere beobachtende Astronomen zum Auffuchen dieses Planeten aufgefordert hatte, wurde derselbe am 23. September 1846 von Galle in Berlin entdeckt und erhielt später den Namen Neptun. Es fand sich sehr bald, daß der neue Planet in früherer Zeit schon einige mal als Fixstern beobachtet worden war, und dadurch ist die Bestimmung seiner Bahn schon jetzt mit ziemlicher Sicherheit möglich geworden.

Die mittlere Entfernung des Neptun von der Sonne ist 602.5 Mill. Meilen, die größte 607.6 Mill., die kleinste 597.4 Mill. Meilen, die Excentricität der Bahn $\frac{1}{110}$.

Die tropische Umlaufszeit beträgt 163 J. 270 T., die synodische 1 J. 2 T. 5 St.

Im Helligkeit gleicht der Neptun einem Sterne achten Größe, ist 1430 mal schwächer als Capella, nahe 80 Mill. mal schwächer als die Sonne, und empfängt von der Sonne 904 mal weniger Licht und Wärme als die Erde. Sein Spectrum ist dem des Uranus ähnlich.

Die mittlere Entfernung von der Erde schwankt zwischen 580 Mill. und 623 Mill. Meilen, der scheinbare Durchmesser zwischen $2''.4$ und $2''.7$, der wahre Durchmesser ist 7400 Meilen, sein körperlicher Inhalt 80 mal größer als der der Erde. Da die Masse zu $\frac{1}{14,000}$ angenommen wird, beträgt seine mittlere Dichtigkeit 0.28, und ein Körper, der auf der Erde 1 Pfund wiegt, ist auf dem Neptun 0.8 Pfund schwer.

Ueber die Rotation wissen wir noch nichts, die Existenz eines Ringes, den man gesehen haben wollte, ist noch nicht bestätigt, doch hat man bei ihm einen Satelliten mit Sicherheit erkannt und vermuthet noch einen zweiten.

Elemente der Hauptplaneten.

Auf Taf. 4 ist in Fig. 2 das Größenverhältniß der Planeten zueinander dargestellt. Bei 2 c oben in der Erde links erkennt man eine ganz kleine Scheibe, den Mercur γ darstellend, darüber eine, die Venus δ , in der Erde rechts oben bei 2 d ist eine kleine Scheibe, welche die Erde ϵ , darunter eine kleine den Mars ζ zeigt. In 2 b rechts unten erkennt man die größte Jupiterischeibe η , in 2 a links unten die des Saturn θ , endlich bei 2 c oben die des Uranus ι und bei 2 d oben die des Neptun κ . Ueberall ist ein und derselbe Maßstab angewandt: $\frac{1}{75,000,000,000}$. In Fig. 6 ist in demselben Maßstabe durch eine gerade Linie der Durchmesser der Sonne dargestellt, da für die Sonnen Scheibe der Platz mangelte.

Da in Fig. 1 in dem Sonnensystem die Planeten Uranus und Neptun nicht mit aufgenommen werden konnten, sind in Fig. 5 im Maßstabe $\frac{1}{100}$ Mill. die Entfernungen der großen Planeten von der Sonne auf einer geraden Linie angegeben. Der Sonne zunächst unten ist der Strich für Mercur, dann Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun.

Die Elemente der Hauptplaneten sind in folgender Tabelle zusammengestellt.

Namen.	Mittlere Länge für 1850 Januar 1. Par. d.	Länge des Perihel.	Länge des auf- steigenden Knotens.	Neigung der Bahn gegen die Elliptik.	Halbe große Achse.	Excen- tricität.	Eiderische Umlaufzeit in Tagen.	Masse.
Mercur	327° 15' 3	75° 7' 2	46° 33' 1	7° 0' 1	0.38710	0.20560	87.96926	$\frac{1}{215330}$
Venus	245 33.2	129 27.2	75 19.9	3 23.6	0.72333	0.00684	224.70079	$\frac{1}{21320}$
Erde	100 46.7	100 21.4	-	-	1.00000	0.01677	365.25636	$\frac{1}{17145}$
Mars	83 40.5	333 17.9	48 23.9	1 51.0	1.52369	0.09326	686.97979	$\frac{1}{3174000}$
Jupiter	160 1.3	11 54.9	98 54.3	1 18.7	5.20280	0.04824	4332.5548	$\frac{1}{104778}$
Saturn	14 50.7	90 6.2	112 21.7	2 29.5	9.53885	0.03600	10759.2198	$\frac{1}{35014}$
Uranus	28 26.7	168 16.8	73 14.2	0 46.5	19.18264	0.04628	30686.8208	$\frac{1}{11000}$
Neptun	325 5.7	48 17.5	130 7.5	1 47.0	30.07053	0.00850	60186.636	$\frac{1}{4468}$

c) Die Satelliten oder Monde.

Nicht alle Planeten haben Satelliten, unsere Erde t 1, Jupiter 4, Saturn wenigstens 8, Uranus wenigstens 4, Neptun wenigstens 1.

Für uns hat der Erdmond die größte Wichtigkeit, d von ihm kennen wir am meisten, weil er der uns chste Himmelskörper, während von den Jupitermonden r wenig und von den Monden der andern Planeten r die Bahnen bekannt sind.

1) Der Erdmond.

Seine mittlere Entfernung von der Erde ist nahe , der Entfernung der Erde von der Sonne und d zu 51805 Meilen angenommen. Die größte Ent- nung kann 54650 Meilen, die kleinste 48960 Meilen eichen und die Excentricität der Bahn ist nahe $\frac{1}{60}$. Die siderische Umlaufzeit des Mondes um die Erde ägt 27 T. 7 St. 43 M. 11.5 S., die tropische 27 T. St. 43 M. 4.7 S., die synodische (im Mittel die Zeit e Neumond zu Neumond oder von Vollmond zu lmond) 29 T. 12 St. 44 M. 2.9 S., die anomalie he (die Zeit, welche er gebraucht, um von einer pten Erdnähe zur andern zu kommen) 27 T. 13 St. M. 37.4 S. und endlich die Zeit, welche er ge- ucht, um von einem aufsteigenden Knoten zum ernen zu kommen, 27 T. 5 St. 5 M. 35.9 S. Die synodische Umlaufzeit der Knotenlinie beträgt T. 14 St. 52 M. 35 S.; sie wird gebraucht für Berechnung der Finsternisse.

Die Neigung der Mondbahn gegen die Elliptik ist enwärtig $5^{\circ} 8' 40''$ und ist kleinen säcularen Störungen erworfen.

Die größten periodischen Störungen der Länge des ndes in seiner Bahn führen den Namen der Evection, Variation und der jährlichen Gleichung (s. Physische ronomie).

Der scheinbare Durchmesser des Mondes in seiner tern Entfernung ist $31' 8.1''$; er wächst bis zu $51''$ und nimmt ab bis $29' 26''$; der wahre Durch- iger ist 469.2 Meilen, sein körperlicher Inhalt $\frac{1}{60}$ erer Erde, und da seine Masse $\frac{1}{81}$ der Erdmasse ägt, so ist die Dichtigkeit 0.62 im Vergleich zur e. Ein Körper, der auf der Erde 1 Pfund schwer, gt auf dem Monde nur $\frac{1}{6}$ Pfund.

Die Neigung des Mondäquators gegen die Elliptik ur $1^{\circ} 28'$, und die Umkreisungzeit des Mondes seine Achse ist genau der mittlern Umlaufzeit des Mondes um die Erde gleich. Diese Umkreisungs- jede um die Achse verursacht, daß er uns immer elbe Seite zuehrt, und die kleinen Ungleichheiten, e in dieser Beziehung stattfinden, sind in der ronomie bekannt unter dem Namen der Libration hysische Astronomie).

Die physische Beschaffenheit des Mondes kennen wir en seiner Nähe genauer als die anderer Himmels- er. Mit dem Fernrohr sehen wir auf der Ober-

fläche Berge und Thäler, erkennen die Schatten der Berge und berechnen aus der Länge derselben die Höhe über die umgebende Oberfläche. Die Mondberge zeigen einen eigenthümlichen Charakter: meistens bestehen sie aus Ringgebirgen, in deren Mitte ein großer Kessel sich befindet, aus dessen Mittelpunkt oft ein kegelförmiger Berg hervorsticht. Sie zeigen also einen rein vulkanischen Charakter, sodaß man sie für ausgebrannte Krater hält. Von Meeren (obwohl große ebene Strecken den Namen Meer [Mare] führen), hat man keine Spur gefunden, und da außerdem der Mond uns stets in gleicher Weise hell erscheint und nie eine Trübung zeigt, scheint es auch daselbst keine Wolken zu geben. Da man ferner von einer Dämmerung nichts bemerkt und auch sonstige Anzeichen einer Atmosphäre nicht vorhanden sind, kann dieselbe, falls wirklich eine solche existiren sollte, nur sehr niedrig und sehr dünn sein.

Die Helligkeit des Mondes nimmt vom Neumond bis zum Vollmond zu und nachher wieder ab, doch ist diese Zu- und Abnahme nicht gleichmäßig: Die Zunahme der Helligkeit ist anders als die Abnahme, welches von den Fleden herrührt, die wir auf der Mondoberfläche sehen. Kurz vor dem Vollmonde nimmt die Helligkeit sehr rasch zu und ebenso schnell nach dem Vollmonde wieder ab. Die beobachteten Lichtveränderungen erklären sich vollständig unter der Annahme, daß die ganze Oberfläche mit kegelförmigen Bergen überzogen ist.

Der mittlere Vollmond hat eine Helligkeit, die 620000 mal geringer ist als die mittlere Helligkeit der Sonne, sie ist 90000 mal größer als die eines Sterns erster Größe von der Helligkeit der Capella. Das Reflexionsvermögen des Mondes ist noch geringer als das des Mars, er gibt von dem erhaltenen Sonnenlichte nur 17 Procent zurück.

Das Spectrum des Mondes ist vollständig dem der Sonne gleich, und man schließt auch daraus, daß der Mond keine Atmosphäre habe.

Ueber physisches Leben wie auf unserer Erde wissen wir auf dem Monde nichts. Ob Veränderungen auf der Mondoberfläche vorgekommen sind, ist mit Sicherheit noch nicht erwiesen, obwohl einige Astronomen solche an einem Mondkrater, mit Namen Vinus, bemerkt haben wollen.

Wie von der Erde aus gesehen der Mond während seiner Umlaufzeit uns die verschiedenartigsten Lichtgestalten, die Phasen zeigt, erkennt man auf Taf. 5 in Fig. 3. Die Sonne ist in großer Entfernung nach der rechten Seite angenommen und ist die Beleuchtung des Mondes in dem äußern Kreise gegeben, die daraus entstehenden Mondphasen stehen in dem innern Kreise. Man erkennt, wie im Neumonde der Mond uns die dunkle Seite, im ersten und letzten Viertel die Hälfte der dunkeln und der beleuchteten Scheibe, im Vollmonde dagegen die ganze beleuchtete Seite zuehrt. Man sieht auch in dieser Figur, wie während des Neumondes vom Monde aus gesehen die ganze beleuchtete Seite der Erde sichtbar ist, und begreift leicht, wie von den etwaigen Mondbewohnern von der Erde ganz dieselben Phasen,

nur in umgekehrter Reihenfolge, gesehen werden, wie wir sie vom Monde sehen. Das Erdenlicht erkennen wir in der Nähe des Neumondes auf der Oberfläche des Mondes ganz deutlich, indem der von der Sonne nicht beleuchtete Theil des Mondes sich uns in mattem, aschfarbigem Lichte zeigt, welches so hell ist, daß in ihm einzelne Berge des Mondes deutlich erkannt werden können.

Auf Taf. 12 ist in Fig. 3 die wahre Mondbahn dargestellt. Sie ist, da der Mond bei seinem Umlauf um die Erde auch den Weg mit der Erde um die Sonne macht, eine Epicykel. Weil die Entfernung des Mondes von der Erde im Verhältniß zu der Sonnenentfernung jedoch so gering, ist die Curve, welche der Mond beschreibt, stets gegen die Sonne concav, und obwol in unserer Figur die Entfernung des Mondes von der Erde noch zehnmal zu groß angenommen werden mußte, erkennt man doch die Form der wahren Bahn. Die Vorstellung von Schleifen, welche der Mond um die Erde beschreibt, oder von sogenannten Schlangelinien, Finien, die bald convex, bald concav gegen die Sonne sind, ist falsch.

In Taf. 12, Fig. 4 stellt EE' die Elliptik (unsere Erdbahn) dar, während MEM die Mondbahn, welche gegen die Elliptik $5^{\circ} 8' 40''$ geneigt ist, zeigt.

Taf. 6 ist eine Abbildung des Mondes, wie man ihn in einem guten Fernrohr zur Zeit des Vollmondes sehen kann. Sie ist theils entstanden aus der bekannten Beer-Mäbler'schen Mondkarte, in Verbindung mit vorhandenen Mondphotographien, und aus eigener Anschauung. Es ist die Darstellung im astronomischen Fernrohr, also verkehrt, sodas unten Nord, oben Süd, rechts Ost und links West liegt.

Die hauptsächlichsten Mondberge erscheinen uns als helle Flecke, die meisten zeigen einen kreisrunden Wall, der einen bald größern, bald kleinern Raum einschließt. Die großen nennt man Wallebenen, die kleinen Krater. Die übrigen zahlreichen Ringgebirge schließen meistens im Innern einen Centralberg ein. Einzelnen Bergketten hat man den Namen von Gebirgen unserer Erde gegeben, z. B.: Kautasus, Apenninen, Alpen. Die großen grauen Flecke hat man Meere genannt, obwol sie wegen des Mangels an Luft keine solchen zu sein scheinen; die Bezeichnung Mare Serenitatis, Mare Imbrium, Mare Tranquillitatis sind meistens bald nach Einführung des Fernrohrs von den Astronomen, welche den Mond beobachteten und zeichneten, gewählt.

Sehr oft gehen von den Mondbergen Lichtstreifen, Strahlensysteme aus, ferner schmale Furchen oder Rillen, welche geradlinig durch Ebenen, zuweilen auch durch Gebirgsgegenden laufen.

Die Benennungen der Mondberge sind auf der Tafel für die einzelnen Quadranten gegeben und die Namen berühmter Gelehrten darin vereinigt; die danebenstehenden Zahlen bedeuten die Höhe der Berge über der Umgebung, in Metern ausgedrückt, und sind meistens aus der Länge der Schatten bestimmt. Der höchste Berg ist über 7000 Meter hoch und hat also fast dieselbe Höhe als die höchsten Berge unserer Erde. Er ist, da der Mond nur den vierten Theil des Durchmesser unserer Erde hat, im Verhältniß also fast viermal höher.

Auf Taf. 7 sind in Fig. 3 und 4 einige Mondlandschaften gezeichnet, wie sie mit einem lichtstarken Fernrohr mit nicht bedeutender Vergrößerung sichtbar sind. Die in Fig. 3 nach rechts, in Fig. 4 nach links liegenden schwarzen Stellen sind die Schatten, welche die Ringgebirge auf die Umgebung werfen. Besonders interessant ist die Abbildung in Fig. 4, welche die

Mondlandschaft Kopernicus darstellt und als eine der schönsten bekannt ist.

Die Finsternisse

werden vom Monde verursacht und nehmen unter den astronomischen Erscheinungen einen ausgezeichneten Platz ein. Die Mondglocke hat der Richtung nach der Sonne entgegengesetzt ihren Schatten, und zwar einen Kernschatten und einen Halbschatten, der Kernschatten vollständig dunkel, fast alles Sonnenlichts beraubt, der Halbschatten vom Kernschatten aus nach und nach heller werdend. Die Länge des Kernschattens schwankt je nach der Entfernung zwischen 49376 und 51083 Meilen, und wenn der Mond zwischen Sonne und Erde tritt, kann daher der Kernschatten die Erde berühren und diejenigen Gegenden, welche innerhalb desselben liegen und für welche die ganze Sonnenscheibe bedeckt ist, haben die Erscheinung einer totalen Sonnenfinsternis, während die Gegenden, welche vom Halbschatten getroffen werden, eine partielle Sonnenfinsternis sehen: berührt der Kernschatten die Erde nicht, so erscheint die Sonne nicht ganz verdeckt. In den Gegenden, welche den Schatten über sich haben, wird ein schmaler Rand der Sonnenscheibe sichtbar bleiben und die ringförmige Sonnenfinsternis sehen lassen. Die längste Dauer einer totalen Sonnenfinsternis ist circa 8 Minuten, die einer ringförmigen $12\frac{1}{2}$ Minuten.

Ebenso wie der Mond wirft auch die Erde ihren Schatten in den Weltraum, welcher je nach der Entfernung von der Sonne zwischen 182408 und 188640 Meilen lang ist. Der Mond kann bei seiner Bewegung um die Erde in diesen Schatten eintreten, und da der Durchmesser desselben dort, wo der Mond eintritt, nach 1230 Meilen, also fast dreimal größer als der Monddurchmesser ist, kann entweder der Mond ganz oder theilweise, nie aber ringförmig verdeckt werden. Im ersten Falle findet eine totale, im letztern eine partielle Mondfinsternis statt.

Wenn die Mondbahn in der Ebene der Elliptik läge, würde bei jedem Neumonde eine Sonnenfinsternis, bei jedem Vollmonde eine Mondfinsternis stattfinden. Wegen der Neigung der Mondbahn sind die Finsternisse seltener. Die Zahl der Finsternisse in einem Jahre kann aber nie weniger als zwei und nie mehr als sieben sein. Finden nur zwei statt, so sind es immer Sonnenfinsternisse. Da der Mondnoten in 18 $\frac{1}{2}$ T. einen ganzen Umlreis durchläuft, lehren innerhalb dieses Zeitraums von 223 Mondmonaten die Finsternisse sehr nahe in derselben Ordnung wieder, und in diesem Zeitraum finden 70 Finsternisse und zwar 29 Mond- und 41 Sonnenfinsternisse statt.

Die Mondfinsternisse werden von allen Bewohnern der Erde gleich gesehen, der Anfang und das Ende ist überall zu derselben absoluten Zeit, während die Sonnenfinsternisse (eigentlich Erdrverfinsterungen) nur begrenzte Gegenden der Erde betreffen und zu verschiedenen Zeiten wahrgenommen werden.

Obwol die Anzahl der Sonnenfinsternisse größer als die der Mondfinsternisse, finden doch für ein und denselben Ort besonders die totalen Sonnenfinsternisse nur äußerst selten statt. Da die Mondfinsternisse absolut zu derselben Zeit stattfinden, so würden sie ein sehr vorzügliches Mittel sein, die Zeit- oder Längendifferenz zwischen verschiedenen Orten zu finden, wenn nicht der Uebelstand wäre, daß wegen des Uebergangs von Kernschatten in Halbschatten der Schatten der Erde auf der Mondscheibe nie scharf ist und daher eine Mondfinsternis höchstens bis auf eine Zeitminute genau beobachtet werden kann. Die Ein- und Austritte der Sonnenfinsternisse sind sehr viel exacter zu beobachten und

werden dieselben auch vielfach zur Ermittlung von Längen- und Breitenunterschieden verwendet.

Die totalen Sonnenfinsternisse haben theils ihrer Seltenheit, theils aber auch der besondern Erscheinungen wegen, welche bei ihnen stattfinden, stets ein großes Interesse gehabt, und die bedeutendsten, welche in diesem Jahrhundert in Europa noch stattfinden, ereignen sich: 187 am 19. August total in Deutschland u. Rußland, 1890 am 17. Juni ringförmig im Mittelmeer, 1896 am 9. August total in Norwegen, Lappland und Rußland, 1900 am 28. Mai ringförmig in Spanien u. Portugal.

Taf. 12 stellt in Fig. 1 in S die Sonne, in E die Erde dar, hinter welcher der Kernschatten und der Halbschatten sichtbar ist. Der Vollmond ist durch den Kernschatten gehend in drei verschiedenen Stellungen verzeichnet und in M ist er total verfinstert.

In Fig. 6 und 8 sind die Sonnenfinsternisse dargestellt; in Fig. 6, in welcher der Kern- und Halbschatten die Erde berührt, findet durch den ersten die totale, durch den letztern die partielle Sonnenfinsternis statt. In Fig. 8 berührt nur der Halbschatten die Erde, in einem kleinen Raume unter dem Kernschatten at man auf der Erde die ringförmige, an den andern Stellen des Halbschattens die partielle Finsternis.

Fig. 2 stellt die Bewegung des Mondes um die Erde in vier verschiedenen Lagen dar, in A und C geht der Mond wegen der Neigung seiner Bahn nicht durch den Erdschatten, es finden daher keine Finsternisse statt, in B dagegen ist der Mond zur Zeit des Vollmondes auch in der Ekliptik und es tritt eine totale Mondfinsternis ein, und in D ist der Mond bei dem Neumonde in der Ekliptik und es ist eine totale (oder ringförmige) Sonnenfinsternis zu sehen.

Fig. 7 stellt den Verlauf der totalen Sonnenfinsternisse vom 22. December 1870 dar. Der mittlere schwärzere Streifen ist der Weg des Kernschattens; die Zone der centralen Verfinsternung, wo also die Sonne total verfinstert ist und in welchem Gürtel das südliche Spanien, Nordafrika, Griechenland und die Türkei liegen. Die verschiedenen Curven geben die Grenzen der Erde an, wo der Anfang der Finsternis bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, wo die Mitte der Finsternis bei Sonnenauf- resp. Sonnenuntergang und endlich, wo das Ende der Finsternis bei Sonnenauf- resp. Sonnenuntergang stattfindet. Auch die Linie auf der Erde, an welcher Sonnen- und Mondbrand sich berühren — die Grenze des Halbschattens auf der Erde — also die Grenze auf der Erde, wo die Finsternis überhaupt noch sichtbar, ist auf der Karte verzeichnet. Der Mond erscheint bei einer totalen Mondfinsternis nicht ganz dunkel, sondern hat eine braunrothe Färbung, welche davon herrührt, daß durch die Strahlenbrechung in unserer Atmosphäre doch Lichtstrahlen und besonders die rothen, weil die blauen in unserer Atmosphäre absorbiert werden, in den Kernschatten der Erde gelangen und den Mond während der totalen Mondfinsternis etwas beleuchten.

Wie bei einer totalen Sonnenfinsternis die Sonne erscheint, ist in Taf. 7, Fig. 1 dargestellt.

2) Die Satelliten des Jupiter.

Die siderischen Umlaufzeiten, die Entfernungen von Hauptplaneten, die Massen (ausgedrückt in Theilen der Jupitermasse) und die wahren Durchmesser sind in folgender Tabelle zusammengestellt:

Satellit.	Siderische Umlaufzeit.	Entfernung vom Jupiter. Wegst. M.	Excentricität.	Masse in Theilen der Jupitermasse.	Wahrer Durchmesser. Wegst. M.
I.	2. St. M. 17 18 27.5	56500	0.00000	0.000169	510
II.	3 13 13.7	89800	0.00000	232	460
III.	7 3 42.5	143300	0.00135	884	750
IV.	16 16 32.2	252100	0.00724	425	640

Der erste Satellit erscheint vom Jupiter aus ungefähr so groß als unser Mond, der zweite und dritte etwa halb so groß, der vierte ein Viertel so groß.

Die vier Satelliten bewegen sich alle nahe in der Ebene des Aequators des Jupiter. Die gegenseitige Anziehungskraft der Satelliten aufeinander hat folgende zwei Sätze gegeben: 1) Die mittlere Bewegung des ersten Satelliten und zweimal die mittlere Bewegung des dritten Satelliten ist genau gleich dreimal derjenigen des zweiten Satelliten; 2) die mittlere Länge des ersten Satelliten plus zweimal der mittlern Länge des dritten Satelliten minus dreimal der mittlern Länge des zweiten Satelliten ist genau gleich zwei rechten Winkeln.

Wegen der kleinen Neigungen und der Nähe am Jupiter werden die drei ersten Satelliten bei jedem Umlaufe verfinstert, nur der vierte Satellit kann zuweilen über oder unter dem Schatten weggehen. Ebenso verursachen die drei innern Satelliten auf dem Jupiter bei jedem Umlaufe Sonnenfinsternisse. Die drei ersten Satelliten können nie zugleich verfinstert werden. Ihre Umdrehungszeit um ihre Achse scheint der Umlaufzeit gleich zu sein, wie man aus dem beobachteten Lichtwechsel geschlossen hat.

3) Die Satelliten von Saturn, Uranus und Neptun.

Man kennt von denselben nur ihre Umlaufzeiten und mittlern Entfernungen. Von den Saturnsatelliten ist der sechste der hellste und zeigt einen Lichtwechsel, aus dem sich schließen läßt, daß er sich in derselben Zeit um seine Achse dreht, als er sich um Saturn bewegt; die meisten Bahnen liegen in der Bahn der Ringebene. Die Elemente der Bahnen sind die folgenden:

Satelliten des Saturn.

Namen.	Siderische Umlaufzeit.	Mittlere Entfernung vom Saturn in geographischen Meilen.	Excentricität.
I. Mimas	2. St. M. 0 22 37	24800	.
2. Encelabus	1 8 53	31900	.
3. Tethis	1 21 18	39500	0.01086
4. Dione	2 17 41	50900	0.00310
5. Rhea	4 12 25	70500	0.00080
6. Titan	15 22 41	163700	0.02922
7. Hyperion	21 6 49	198200	0.115
8. Iapetus	79 7 54	466900	0.02844

Satelliten des Uranus.

Namen.	Siderische Umlaufzeit.	Mittlere Entfernung vom Uranus in geographischen Meilen.
I. Ariel	2. St. M. 2 12 29	27700
2. Umbriel	4 3 28	38500
3. Titania	8 16 56	63100
4. Oberon	13 11 7	84100

Satellit des Neptun.

Siderische Umlaufzeit 5 T. 21 St. 4 M.

Mittlere Entfernung vom Neptun 47500 Meilen.

Auf Taf. 4 ist in Fig. 3 im Maßstab $\frac{1}{20000}$ Mill. der Jupiter mit seinen Monden, diese in den größten scheinbaren Entfernungen, in Fig. 4 in demselben Maßstabe der Saturn mit seinen Monden dargestellt.

In Taf. 12, Fig. 5 stellt die Linie EIE' die Ebene der Jupitersbahn dar, während die mit I, II, III, IV bezeichneten Linien mit dem EIE' Winkel bilden, die die Neigungen der Mondbahnen gegen die Ebene der Jupitersbahn angeben.

Ein Apparat, welcher eine Darstellung der Planeten und Satelliten gibt, heißt ein Planetarium, und ein solches ist auf Taf. 10, Fig. 16 abgebildet. C ist die Sonne, H der Mercur, G die Venus, F die Erde mit dem Monde c, I der Mars, L die vier kleinen, zuerst entdeckten Planeten, M der Jupiter mit 4, N der Saturn mit 8, K der Uranus mit 4 Monden. Im Innern des Apparates ist ein Näderwerk, welches, durch die Kurbel D in Bewegung gesetzt, die dargestellten Planeten sich um die Sonne bewegen läßt.

d) Die Kometen.

In jedem Jahrhundert erblicken aufmerksame Beobachter etwa zwanzig bis dreißig mal mit bloßem Auge am Firmament zwischen den zahlreichen Sternen leuchtende Körper von nebelhaftem Ansehen, die meistens mit einem Lichtstreifen, Schweif, versehen sind und deshalb von den Alten *Haarsirne*, *κωμης*, genannt sind.

Durch ihr wunderbares, prächtig-schönes Ansehen, durch ihre Form, welche öfter mit der einer Garbe oder der einer auflodernden Flamme Aehnlichkeit hat, außerdem durch ihre Seltenheit (denn sehr große Kometen kommen im Jahrhundert nur einmal vor) erregten sie von jeher Erstaunen und Verwunderung, welche bei dem früher herrschenden Aberglauben in Furcht und Angst überging.

Viele Städtechroniken, sowie unsere Geschichtsbücher berichten von dem Schreden, den zu gewissen Zeiten die Kometen hervorgerufen haben, und man könnte viel davon erzählen, wenn man alle Furcht und die Folgen derselben schildern wollte, welche in früheren Jahrhunderten die Erscheinungen von Kometen verbreitet haben.

Diese Zeiten sind vorüber, und wenn auch noch hin und wieder bei Erscheinungen von Kometen Unglücksnachrichten prophezeit werden, so ist doch im allgemeinen die Furcht vor denselben verschwunden. Seitdem man erkannt hat, daß die Kometen nicht in unserer nächsten Umgebung sich befinden, daß sie nicht der Atmosphäre unserer Erde angehören, sondern nach himmlischen Gesetzen als kosmische Körper die ihnen vorgeschriebenen Bahnen um die Sonne mit der größten Genauigkeit beschreiben — wo ist da noch Grund zur Furcht vorhanden?

Die Zahl der sehr großen Kometen ist, wie oben schon gesagt, gering: alle drei bis fünf Jahre kann mit bloßem Auge im Durchschnitt nur einer gesehen werden. Aber die Zahl der durch Fernrohre wahrnehmbaren, der teleskopischen Kometen, ist beträchtlich größer, sie beträgt durchschnittlich vier im Jahre und die Aufmerksamkeit der Astronomen ist fast mit den Jahren gewachsen. Während z. B. im 17. Jahrhundert nur 20 Kometen (sämtlich dem bloßen Auge) sichtbar waren, hat man im 18. Jahrhundert schon 62 (davon besonders in der zweiten Hälfte viele teleskopische) gesehen, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind 94 Kometenercheinungen beobachtet, von 1850 bis 1860 hat man 38, von 1861 bis 1870 dagegen 33 Kometen wahrgenommen.

Von etwa 250 Kometen sind die Bahnen genau

berechnet und die Mehrzahl derselben gehört der neuern Zeit an, weil in früheren Jahrhunderten die Beobachtungen so unvollkommen und so widersprechend sind, daß Bahnbestimmungen nicht gemacht werden können; doch aus allen Angaben ist mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen, daß, soweit unsere Geschichte reicht, bis jetzt nicht viel über 600 Kometen gesehen sind.

Wie groß aber die Zahl dieser Himmelskörper im allgemeinen ist, läßt sich nur unter Voraussetzung gewisser Hypothesen annähernd angeben. Bisher ist constatirt, daß nur eine ganz geringe Anzahl von Kometen in einer bestimmten Zahl von Jahren um die Sonne läuft und periodisch wiederkehrt. Bei den übrigen ist, wenn sie sich überhaupt in geschlossenen Curven bewegen und deshalb eine Umlaufzeit haben, solche Tausende von Jahren, und da man jetzt alle Jahre im Durchschnitt etwa drei bis vier neue Kometen findet, so folgt daraus, daß viele tausend Kometen vorhanden sein müssen. Wol ist nicht anzunehmen, daß die Kometen mit ihren Perihelien (Sonnennähen) im Weltraum gleichmäßig vertheilt sind, denn dann würde ihre Zahl, da innerhalb der Mercurbahn von den 250 berechneten Bahnen etwa 50 ihre Perihelien haben, innerhalb der Jupitersbahn schon Hunderttausende betragen und innerhalb der Neptunsbahn bis auf Millionen steigen. Auch die Hypothese, daß die Kometenperihelien wie die Quadrate der Entfernungen von der Sonne zunehmen, war zwischen der Mercur- und Venusbahn vor etwa 30 Jahren nahe richtig, jetzt ist das Verhältniß durch die neuern Entdeckungen ein anderes geworden. Innerhalb der uns gegenwärtig durch die Lichtstärke unserer Instrumente gesetzten Grenzen, bis zu welchen wir noch Kometen sehen und beobachten können, wird die Zahl derselben sicher mehrere Tausend übersteigen.

Die große Mehrzahl der Kometen wird jetzt von Astronomen durch besonders dazu construirte Fernrohre mit großem Gesichtsfeld und nicht zu starker Vergrößerung (Kometensucher) aufgefunden. Doch kommt es hin und wieder auch vor, daß plötzlich helle Kometen erscheinen und von jedermann, der den Himmel aufmerksam betrachtet, gesehen werden können. Diese Kometen sind dann ganz plötzlich aus ihrer Sonnennähe und aus den Sonnenstrahlen herausgetreten, während sie durch das Tageslicht selbst dem bewaffneten Auge des Sternkundigen unsichtbar blieben.

Die hellern Kometen haben meistens drei wesentliche Bestandtheile an sich: einen Kern, eine Nebelhülle und einen Schweif.

Eine als Hauptpunkt am hellsten strahlende, sternartige Verdichtung im Kometen nennt man den Kern, der oft nur geringen Durchmesser hat und eine solche Helligkeit entwickelt, daß man bei einigen Kometen ihn am hellen Tage mit bloßem Auge gesehen hat. Schröter und Harding machten z. B. den Kern des Kometen von 1798, als er am kleinsten war, nur zu 27 Meilen Durchmesser, während der Kern des großen Kometen von 1811 einen Durchmesser von 570 Meilen und der Kern des noch in frischem Ansehen stehenden prachtvollen Kometen von 1858 etwas über 100 Meilen Durchmesser hatte. Am hellen Tage waren in diesem Jahrhundert die Kerne der großen Kometen von 1843 und 1853 sichtbar.

Den Kern umgibt gewöhnlich eine Nebelhülle, die schon einen beträchtlichen Durchmesser hat und oft nach der der Sonne zugekehrten Seite fächerartig strahlt, ja es reihen sich oft mehrere Sectoren zu Hüllen aneinander und übereinander, die zuweilen sehr bemerkbare Oscillationen zeigen.

Es kommt häufig vor, daß die Nebelhülle, wenn der Komet in seine Sonnennähe gelangt, eine von der

Sonne abgewandte Verlängerung erhält, die sich zu einem Schweife entwickelt, der bei zunehmender Entfernung des Kometen von der Sonne kleiner wird und schließlich ganz verschwindet. Die Schweife erreichen oft eine beträchtliche Länge und erscheinen alsdann meistens nicht gerade, sondern gekrümmt und reichen oft über den dritten Theil, ja über die Hälfte und mehr des uns sichtbaren Himmels. So hatten z. B. die Schweife der Kometen von 1456 eine Länge von 60°, 1618 von 100°, 1769 von 90°, 1811 von 90°, 1843 von nahe 70°, 1858 von 60°, 1861 von 120°. Diese Längen entsprechen im Weltraume Millionen von Meilen und hier sei nur erwähnt, daß die Länge des Schweifs vom Kometen 1858 gegen 11 Mill. Meilen und die größte Breite 2 Mill. Meilen betrug. Hin und wieder haben die Kometen auch mehrere Schweife: der vom Jahre 1823 hatte zwei, die sich einander gegenüberstanden; der vom Jahre 1744 soll sechs von je 30 bis 40° Länge und 4° Breite gehabt haben; der vom Jahre 1858 hatte außer dem großen breiten Schweife noch zwei schmale, den großen tangierende, die dieselbe Länge von 11 Mill. Meilen, doch nur eine Breite von 200000 Meilen hatten. Oft ändert sich die Länge der Schweife und zwar sowohl in kurzen Zeiträumen — in dem Schweife des Kometen von 1811 wurden z. B. zukunfts Bewegungen wahrgenommen — als auch von einer Erscheinung zur andern ganz beträchtlich. So hatte der alle 75 Jahre wiederkehrende Halley'sche Komet im Jahre 1456 einen Schweif von 60° Länge, während in den Jahren 1759 und 1835 der Schweif kaum 15° Länge erreichte.

Die Schweife sind an den Rändern gewöhnlich viel heller wie in der Mitte, und durch die Mitte zieht sich ein dunkler Streifen, wodurch man zu der Ansicht gekommen ist, daß die Schweife hohl sind und man in der Mitte direct durch die dünnen Wände des hohlen Schweifs sieht, während man am Rande geneigt auf die Schweifwände schaut und daher mehr Materie erblickt.

Es fehlt den Kometen der Kern; wir sehen, besonders bei den teleskopischen Kometen, nur die Nebelhülle, in welcher hin und wieder, jedoch nicht immer im Centrum, eine oder mehrere Verdichtungen sich befinden. Der Kern bildet sich meist erst in der Nebelhülle, wenn der Komet der Sonne näher kommt, er verschwindet, wenn der Komet sich wieder von der Sonne entfernt, so daß schließlich nur die Nebelhülle übrigbleibt, welche bei zunehmender Entfernung matter wird und sich schließlich unsern Blicken ganz entzieht. Die Mehrzahl der teleskopischen Kometen besteht überhaupt nur aus solchen Nebelhüllen.

An einigen hellern Kometen hat man Lichtgestalten wie bei unsern Monde, sogenannte Phasen, wahrgenommen, und besonders soll der Komet von 1819 unter der Gestalt des Mondes in seinen Vierteln von aufmerksamsten Astronomen beobachtet sein. Höchstwahrscheinlich sind aber das, was man für Phasen gehalten hat, nur räthselhafte Gestaltungen des Kopfes gewesen, die in neuerer Zeit fast immer wahrgenommen sind.

Mit großer Sicherheit ist constatirt, daß die Kometen fast ganz durchsichtig sind, da das Licht von Fixsternen, die durch einen Kometen bedeckt worden, nicht merklich geschwächt wird. Die Helligkeit mancher Kometen ist gegen die der Fixsterne so gering, daß, wenn schwache Kometen in der Nähe von Sternen stehen, sie kaum wahrzunehmen sind, und nach einigen Kometen ist öfter vergeblich gesucht, wenn sie, wie die spätere Rechnung ergab, in der Richtung von Fixsternen gestanden haben.

Die geringe Helligkeit der Kometen läßt auch eine sehr geringe Masse vermuthen und von dem Kometen im Jahre 1770 ist nachgewiesen, daß er trotz seiner Größe eine geringere Masse gehabt haben muß, als den 5000. Theil der Erdmasse, weil er bei einer größern Masse auf die Bewegung der Erde Einfluß gehabt und letztere in ihrem Laufe hätte stören müssen.

Seit Newton allgemeine Gesetze aufstellte, nach welchen sich alle Himmelskörper bewegen, ist es möglich, die Bahnen der Kometen genau zu berechnen, und für die meisten derselben hat man gefunden, daß die kurze Strecke der Bahn, in welcher wir von der Erde aus die Kometen gesehen, von der Parabel fast gar nicht abweicht. Nur von einer geringen Zahl Kometen ist nachgewiesen, daß ihre Bahnen geschlossene Curven, langgestreckte Ellipsen sind, bei welchen die Excentricität aber nicht viel von der Einheit abweicht.

Der englische Astronom Halley war der erste, welcher nach Newton's Theorie die Bahnen von 25 Kometen berechnete. Als er die Kennzeichen der Bahnen, die Elemente miteinander verglich, fand er drei Bahnen (die der Kometen von 1531, 1607, 1682), bei welchen die Elemente so ähnlich waren, daß er daraus schloß, diese Bahnen müßten ein und denselben Kometen angehören, der eine Umlaufzeit von 75 bis 76 Jahren hätte. Seine Voraussetzung, daß der Komet im Jahre 1758 wiederkehren würde, bestätigte sich aufs glänzendste, doch erschien er nicht in seiner Sonnennähe 1758, sondern erst 1759, welche Verzögerung von der Einwirkung des Jupiter's und Saturn auf die Bewegung des Kometen herrührte. Solche in ganz bestimmten Zeiträumen wiederkehrenden Kometen nennt man periodische, und gegenwärtig zählt man deren schon eine ziemliche Anzahl, von welchen im Folgenden kurze Beschreibungen gegeben werden sollen.

Zuvor mögen aber erst einige Notizen über die bedeutendsten Kometen, welche bis jetzt erschienen, hier mitgetheilt werden.

Higinus und Ovid erwähnen, daß im Jahre 1200 vor Christi Geburt zur Zeit der Zerstörung Troja's eine der Plejaden Electra oder Merope aus Kummer über den Untergang der herrlichen Stadt die Gesellschaft ihrer Schweltern verlassen und dem nördlichen Polarkreis sich zugewandt habe, wo sie trauernd mit aufgestemtem Haar gesehen und Komet genannt sei. Diese Erzählung ist wol die erste glaubhafte Nachricht über einen Kometen, der durch die Plejaden nach Norden gegangen ist.

Aristoteles berichtet von einem Kometen, der 371 vor Christi Geburt erschien und einen hellen und breiten, über den dritten Theil des sichtbaren Himmels reichenden Schweif hatte.

Im Jahre 134 v. Chr., zur Zeit der Geburt des Mitridates, war ein glänzender Komet 70 Tage lang sichtbar, der an Glanz mit der Sonne verglichen wurde und dessen Schweif, sich über den vierten Theil des Himmels erstreckend, vier Stunden bedurfte, um aufzugehen.

Bald nach Cäsars Tode, 43 v. Chr., zeigte sich ein so heller Komet, daß man ihn selbst am Mittag noch sehen konnte. Von ihm glaubten die Römer, daß er gekommen sei, um den Geist des großen Dictators zu empfangen und denselben nach den Sitten der Götter zu geleiten.

Im Jahre 389 nach Christi erschien ein Komet welcher an Helligkeit der Venus gleichkam, dessen Kopf aus mehreren kleinen Sternen zusammengesetzt war, dessen Schweif die Form eines Schwertes hatte und dessen ganzes Ansehen mit einer brennenden Ampel verglichen wurde.

Im Jahre 1106 sah man ein Gestirn, welches nach Angabe des Chronisten nur $1\frac{1}{2}$ Fuß von der Sonne entfernt war und einen Schweif hatte, der von den Fischen bis zum Orion reichte.

Ein anderer, auch wie der vorgenannte am Tage gegebener Komet, erschien im Jahre 1402, dessen Schweif sogar am hellen Mittag gesehen worden sein soll. Andere Geschichtschreiber lassen in demselben Jahre zwei Kometen sichtbar sein.

Der Komet von 1532 soll ebenfalls am hellen Tage für jedermann sichtbar gewesen sein.

Von dem Kometen des Jahres 1556 ist schon erwähnt, daß er einen Schweif von 60° Länge hatte, und der Schweif des im Jahre 1618 erschienenen Kometen soll 100° gemessen haben, sodaß selbiger noch nicht ganz aufgegangen, wenn der Kopf bereits die Mitte des Himmels über dem Horizonte einnahm.

Der Komet vom Jahre 1680 hatte einen so langen Schweif, daß derselbe, obwohl der Kopf bald nach der Sonne unterging, theilweise die ganze Nacht hindurch sichtbar war; er maß 70° .

Der glänzendste Komet des 18. Jahrhunderts, der von 1744, war am 1. Februar schon heller als Sirius, am 8. so hell als Jupiter, Anfang März übertraf er die Venus an Glanz und ist mit freiem Auge selbst Mittags um 1 Uhr gut gesehen worden. Anfangs hatte er einen Schweif, der sich aber mit der Zeit in sechs theilte haben soll, die Cheseaux beobachtete; die französischen und englischen Astronomen erwähnen davon nichts.

Die bedeutendsten Kometen des 19. Jahrhunderts waren die von 1807, 1811, 1819, 1825, 1835 (der Halley'sche) 1843, 1853, 1858, 1860, 1861, 1862.

Der Komet von 1807 hatte einen Schweif von nur 3 bis 4° Länge.

Der Komet von 1811 wurde vom 26. März bis 17. August 1812, also über einen Zeitraum von 17 Monaten gesehen, jedoch mit Unterbrechung. Am schönsten war er im Herbst 1811, wo er mit seinem 25° langen und 6° breiten Schweife die ganze Nacht sichtbar blieb. Bouvard hat zwei Schweife gesehen, die einen Winkel von 90° miteinander bildeten. Seine Bahn hat sich nach der scharfen Berechnung von Argeander als Ellipse herausgestellt, jedoch mit einer Umlaufzeit von 3065 Jahren und eine genäherte Vorausberechnung seiner Wiedertekehr hat ergeben, daß vermöge der Anziehungskraft der Planeten sein Lauf um 177 Jahre beschleunigt wird, so daß seine nächste Erscheinung nahe um das Jahr 4700 zu erwarten ist.

Der Komet von 1819 hatte einen Schweif von 7° Länge.

Der Komet vom October 1825 zeigte einen aus drei Punkten bestehenden Kern und einen 15° langen Schweif.

Im Jahre 1835 erschien der Halley'sche Komet, über den, als zu den periodischen gehörig, noch Weiteres folgen wird.

Am 28. Februar 1843 erschien am hellen Tage plötzlich ein großer Komet sehr nahe bei der Sonne, den man in Amerika zuerst entdeckte. Dem bloßen Auge erschien er nachts mit einem 40 bis 70° langen Schweife, der sich im März in zwei theilte. Dieser Komet hat das Merkwürdige, daß er in seiner größten Sonnennähe nur 19000 Meilen von der Oberfläche der Sonne entfernt war, ja anfangs gaben die Rechnungen ihm eine kleinere Sonnennähe, als der Halbmesser der Sonne betrug.

Der im Jahre 1853 sichtbare Komet hatte Ende August kurze Zeit einen mehr als 5° langen Schweif und wurde im Fernrohr am hellen Mittag gesehen und beobachtet.

Der glänzendste und größte Komet dieses Jahr-

hunderts wird wol der im Herbst 1858 gewesen sein. Entdeckt von Herrn Donati in Florenz im Juni als ein sehr schwacher Nebelstern im Sternbild des Löwen, wurde er von Ende August bis Ende October dem bloßen Auge sichtbar. In Anfang dieser Zeit sah man seinen Schweif von Tag zu Tage heller und länger werden und hat man denselben, sowie der dem Schweife entgegengesetzt unmittelbar am Kopfe sich zeigenden sehr starken Lichtentwidelung oder Ausströmung, die in mehrere Lichtsäulen (bis zu sieben), welche den Kern umgaben und in den Schweif sich verlängerten, hineinfloß, ganz besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Während der Hauptschweif stark getrümt war und bis zu 60° Länge und 10° Breite verstreut werden konnte, nahm man an einigen Orten an der Tangente dieses großen Schweifes noch zwei schwach glänzende Streifen wahr, die fast dieselbe Länge, aber nur 1° Breite hatten.

Ende Juni 1860 erschien plötzlich aus den Sonnenstrahlen kommend ein Komet, der rasch an Licht zunahm, einen Schweif von 20° Länge und einen centrischen Kern hatte, sich durch schnelle Veränderungen auszeichnete und sehr rasch an Licht abnahm.

Der Komet vom Jahre 1861 erschien auf der nördlichen Halbkugel ganz plötzlich am 30. Juni aus den Sonnenstrahlen hervordringend — auf der südlichen Halbkugel hatte man ihn schon vom 13. Mai an gesehen — mit einem langen Schweife, der wegen der Nähe des Kometen zur Erde (am 30. Juni betrug die Entfernung nur 2 Mill. Meilen) eine Länge von 120° hatte. Auch dieser Komet zeigte mehrere Säulen, und über dem geraden großen Schweife lag noch ein schwächerer trummer.

Der letzte dem bloßen Auge sichtbare Komet erschien im August 1862, hatte einen Schweif von 10 bis 12° Länge und zeichnete sich durch pendelartige Bewegung der Ausströmung, sowie durch große Veränderlichkeit im Ansehen seines Kopfes aus.

Alle diese Kometen haben entweder eine so große Umlaufzeit, daß wir dieselbe nicht zu bestimmen im Stande sind, oder eine solche von vielen hundert, ja oft von mehreren tausend Jahren. Dagegen gibt es, wie schon oben gesagt, einzelne Kometen mit kürzerer Umlaufzeit, und man unterscheidet zwei Hauptgruppen, eine mit Umlaufzeiten zwischen drei bis sieben Jahren und eine andere Gruppe mit Umlaufzeiten zwischen 60 bis 80 Jahren.

Man nennt diese Kometen periodische, und die Umlaufzeit derjenigen, welche bereits mehr als einmal bei der Rückkehr zu ihrem Perihel von unserer Erde aus beobachtet sind, läßt sich bis auf einige Tage, ja bei einzelnen bis auf Stunden berechnen.

Zu diesen periodischen gehört zunächst der Halley'sche Komet, der seiner Umlaufzeit nach der letzten der erwähnten Gruppen angehört.

Wie schon oben erwähnt, war es Halley, der die ersten 25 Kometenbahnen berechnete und durch Vergleichung derselben die Periodicität des einen Kometen anzeigte. Nachdem er die Periode der Wiedertekehr erkannte, konnte man zurückrechnen und fand in verschiedenen Büchern von diesem Kometen Beobachtungen, aber leider so unvollkommen, daß sich aus diesen allen Daten keine genauere Bahn hat feststellen lassen.

Die erste verlässliche Erscheinung des Halley'schen Kometen fällt in das Jahr 1456, in welchem er auf seinem Wege von den Sternbildern Stier bis Löwe sich in großer Pracht zeigte. Sein Kern soll das intensive Licht eines Zirkterns gehabt haben, sein Schweif 60° lang gewesen sein und gegen das Ende in Gestalt eines Pfauenschweifs geleuchtet haben.

zweite Erscheinung fiel in das Jahr 1531 und anders von Peter Apianus (Wienwitz) zu Ingol verfolgt, welcher zuerst bei dieser Erscheinung aufmerksam machte, daß der Schweif von der e abgewandt sei.

3. dritte Erscheinung, im Jahre 1607, wurde von Longomontanus und andern Astronomen beobachtet; der Schweif war in seiner Länge beträchtlich, was seinen Grund möglicherweise in der großen Klarheit der Atmosphäre hat, da er in den Monaten des Jahres sichtbar war.

4. vierte Erscheinung, im Jahre 1682, zur Zeit Newton und Halley lebten, veranlaßte letztern zur Berechnung der Kometenbahnen nach der Theorie der Himmelskörper. Die Voraussetzung der Wiederkehr desselben im Jahre 1758, sowie die Erkenntniß der Periodicität war eine der größten Ereignisse in der Astronomie, und die Benennung des Kometen nach ihm ist eine wohlverdiente Anerkennung.

Mairaut, ein französischer Mathematiker, und Madame de Lamoignon rechneten sechs Monate ununterbrochen an dem Bahnen des Halley'schen Kometen, um seine Wiederkehr genau anzugeben und fanden, daß er durch die in seinem Laufe um 518 Tage, durch Saturn 100 Tage aufgehalten würde und setzten auf den 13. April 1759 die größte Sonnennähe des Kometen. Halley starb 1741 und erlebte daher die Wiederkehr des Kometen nicht. Als zu Ende des Jahres 1758 reiften Astronomen und unter ihnen der bekannte Astronom Messier lange vergebens nach ihm zu schauen hatten, fand ihn am 25. December 1758 ein Liebhaber der Astronomie, der Bauer Pabbisch aus Breda. Die weiteren Beobachtungen des Kometen zeigten, daß er in der Nacht vom 12.

3. März 1759, also nur einen Monat früher als Mairaut gefunden, sein Perihel erreicht. In der Schweife entwickelte er schon damals nicht die Größe, in der man ihn früher gesehen hatte, und noch er glänzend erschien er im Jahre 1835, wo er nicht nur um 1/4 von dem vorausberechneten Perihel entfernt wurde, sein Perihel bis auf 1 1/2 Tage zu der vorausberechneten Zeit erreichte, sondern seine physikalischen Erscheinungen ganz besonders von Hesse untersucht wurde.

Es blieb dieser Komet der einzige, von dem man die Umlaufzeit kannte. Im Jahre 1770 entdeckte der Astronom Messier einen Kometen, von dem er nach 5 1/2 Jahren wiederkehren sollte, fand er bei näherer Rechnung, daß der Komet eine bedeutende Masse wirkende Jupiter ihm 167 die Bahn gegeben hatte, diese aber auch im Jahre 1779 wieder nahm, welches Resultat durch andere Beobachtungen bestätigt worden ist. Vowell hatte dadurch nachgewiesen, daß es Kometen mit kurzer Umlaufzeit geben könne, aber noch war kein Fall bekannt, in welchem Kometen in mehreren Umläufen beobachtet worden, obwohl man besonders zu Anfang dieses Jahrhunderts sorgfältig alle Bahnen untersuchte, fanden sich nur zwei Kometen (entdeckt im Jahre 1812 von Olbers, 1815 von Olbers), welche Umlaufzeiten von 71 und 74 Jahren zeigten, also dem Halley'schen Kometen ähnlich sind.

Im Jahre 1818 entdeckte Pons in Marseille einen Kometen, der 47 Tage beobachtet wurde und dessen Bahn sich schon während der Beobachtungszeit mit einer Parabel in Einklang bringen ließ. Der Astronom auf dem Seeberge bei Gotha, durch seine Rechnung aus Beobachtungen, die er umfaßten, daß dieser Komet nach 3 1/2 Jahren wiederkehren müsse und bewies, daß derselbe schon

1786, 1795 und 1805 beobachtet sei. Als Ende nach der von ihm bestimmten Bahn den Lauf für das Jahr 1822 vorausberechnete, war der schönste Lohn der mühevollen Arbeit der, den Kometen genau an der Stelle aufgefunden und beobachtet zu sehen, welche er ihm im voraus angewiesen hatte. Seitdem ist dieser Komet regelmäßig wiederkehrt und seine Erscheinung desselben ist unbeachtet vorübergegangen. Seit der Entdeckung der Periodicität im Jahre 1818 hat man ihn 1822, 1825, 1829, 1832, 1835, 1838, 1842, 1845, 1848, 1852, 1855, 1858, 1862, 1865, 1868, 1871 beobachtet.

Ende's Komet von kurzer Umlaufzeit blieb nicht lange der einzige. Am 27. Februar 1826 entdeckte zu Josephstadt in Böhmen der Hauptmann Biela einen Kometen, dessen Umlaufzeit zu 6 1/2 Jahren berechnet wurde und der schon 1772 und 1805 gesehen und beobachtet war. Er ist seitdem 1832, 1839, 1845 und 1852 wieder gesehen; aber 1845 zeigte er die merkwürdige Erscheinung, daß er sich in zwei Theile theilte, die auch beide 1852 als gesonderte Kometen schon mehrere Grade voneinander entfernt beobachtet, seitdem aber nicht wieder gesehen wurden.

Siebzehn Jahre nach der Entdeckung des Biela'schen Kometen fand am 23. November 1843 der Astronom Faye in Paris einen Kometen, der seitdem alle 7 1/2 Jahre (1851, 1858, 1866) zur Sonnennähe wiederkehrt und beobachtet ist.

Der Brorsten'sche Komet, am 26. Februar 1846 von Brorsten in Kiel entdeckt, wurde, trotzdem eine 5 1/2-jährige Umlaufzeit erkannt war, doch im Jahre 1851 wegen ungünstiger Stellung zur Erde nicht wieder gesehen, jedoch 1857 von Bruhns neu entdeckt und 1868 wieder beobachtet.

Der d'Arrest'sche Komet, am 27. Juni 1851 von d'Arrest in Leipzig entdeckt, hat eine Umlaufzeit von 6 1/2 Jahren und ist in seiner Sonnennähe 1857 (am Cap der guten Hoffnung) und 1870 wieder gesehen und beobachtet.

Der Winnecke'sche Komet wurde am 8. März 1858 von Winnecke in Bonn entdeckt; die Rechnung zeigte sofort, daß er schon 1819 beobachtet sei und man fand sehr bald seine Umlaufzeit zu 5 1/2 Jahren. Im Jahre 1864 konnte er wegen ungünstiger Stellung zur Erde nicht gesehen werden, 1869 ist er wieder beobachtet.

Ein anderer periodischer Komet von kurzer Umlaufzeit, von de Vico in Rom am 22. August 1844 entdeckt, ist in seiner ersten Erscheinung über vier Monate beobachtet und scharf berechnet worden, hat aber seitdem nicht wieder aufgefunden werden können.

Ein am 3. April 1867 von Tempel in Marseille entdeckter Komet hat nach der besten Rechnung 5 1/2 Jahre Umlaufzeit und kann erst 1872 oder gar erst 1878 wieder gefunden werden.

Eine größere Umlaufzeit, 13 1/10 Jahre, hat ein Komet, der am 4. Januar 1858 von Lütke in Cambridge (V. St.) und am 12. Januar von Bruhns in Berlin entdeckt wurde und von dem sich zeigte, daß er schon 1790 beobachtet wurde, in den dazwischenliegenden Sonnennähen aber unbeachtet vorüberging; 1871 ist er wieder gesehen und beobachtet.

Kometen von größern Umlaufzeiten kennt man jetzt mehrere. Wir führen nur an, daß ein von Peters 1846 entdeckter Komet nahe 16 Jahre, ein 1852 von Westphal entdeckter 61 Jahre, ein 1866 von Tempel entdeckter 33 Jahre Umlaufzeit haben. Der letztgenannte Komet hat merkwürdigerweise nahe dieselbe Bahn wie der Sternschnuppenschwarm, auf dessen glänzende Erscheinung 1799 A. von Humboldt besonders

aufmerksam machte und der 1866 in der Nacht vom 13. zum 14. November in Europa, 1867 in Amerika und Australien in großem Glanze wieder gesehen wurde. — Sonst aus diesem als auch aus dem vorigen Jahrhundert lassen sich noch mehr Kometen mit kürzern oder längern Umlaufzeiten aufzählen, doch sind sie alle nur in einer Erscheinung beobachtet und ihre Wiederkehr ist daher noch zu constatiren.

Ueber die physische Beschaffenheit der Kometen weiß man noch wenig. Im Alterthum hielt man dieselben für Meteore in unserer Atmosphäre. Nach Aristoteles sollten es Ausdünstungen aus Klüften und Höhlen sein, die sich in unserer Atmosphäre zusammenballen und wieder verschwinden; Plutarch läßt sie keine wirkliche Existenz haben, sondern nur Reflexe des Sonnenlichts sein, die ebenso verschwinden, wie der Regenbogen und die Nebensonnen. Aristoteles nahm zwei Klassen von Kometen an: bährige und geschwänzte, während Plinius zwölf Gattungen zählte, von welchen die mähenförmigen am geschwindesten liefen, die Haarkometen am langsamsten blieben. Als das Fernrohr auf den Himmel angewandt wurde, hielt man sie für Ausdünstungen der Sonne, wogegen Hevel gewaltig eiferte und sie als bloße Ausdünstungen der Planeten betrachtet wissen wollte. Kepler behauptete noch, daß es Ungeheuer wären, die in den obern Regionen der Luft wie die Walfische im Meer herumzuwimmeln und sich von den bösen Dünsten nähren, und wenn sich die Kometen der Erde nähern, verursachen sie Mistwachs und pestartige Krankheiten. Damals hatte aber schon Tycho Brahe nachgewiesen, daß sie entfernter wie der Mond seien, und bald darauf (1681) zeigte der Pfarrer Dörfl in Blauen im Voigtlande, daß die Bahnen der Kometen Parabeln seien. Als Newton gefunden hatte, daß alle Himmelskörper sich in Kegelschnitten bewegen, wurde den Kometen von den Männern der Wissenschaft die wahre kosmische Existenz angewiesen.

Unsere jetzigen Ansichten über Kometen sind durchaus noch nicht bereit, daß sie alle Erscheinungen erklären. Da die Kometen als Himmelskörper den Gravitationsgesetzen folgen, ist sicher anzunehmen, daß sie materieller Natur sind, und da bei ihrer Annäherung an die Sonne sich Ausströmungen, Hüllen und Schweife entwickeln, ist wol vorauszusetzen, daß durch die Sonne Kräfte frei werden, welche bei großer Entfernung des Kometen von der Sonne gebunden sind und die wahrgenommenen starken Aenderungen im Ansehen des Kerns, der Hüllen und des Schweifs verursachen. Wessel nimmt dafür polare Kräfte an, die bei einigen Kometen pendelartige Schwingungen des Schweifs hervorbringen, und es ist berechnet worden, daß solche Kräfte auch die Ursache sein können für die nach jedem Umlaufe eintretende schnellere Wiederkehr eines Kometen zum Perihel, welche Ende bei dem nach ihm benannten Kometen von kurzer Umlaufzeit — die Beschleunigung ist bei jedem folgenden Umlaufe fast drei Stunden — gefunden hat und die er, einer Ansicht von Olbers folgend, einem widerstehenden materiellen Mittel im Weltraum zuschreibt.

Die Uebereinstimmung der Bahnen der Sternschnuppenschwärme mit ertischen Kometenbahnen haben die Veranlassung gegeben, diese Schwärme als werdende Kometen oder als die Trümmer sich auflösender Kometen anzunehmen. Da man aber von den Sternschnuppen nachgewiesen hat, daß sie, trotzdem ihre Anzahl viele Millionen erreicht, doch in großen Entfernungen (10 bis 20 Meilen) voneinander sich befinden, ist es nicht gut begreiflich, wie diese kleinen Massen miteinander noch im Zusammenhang stehen und sich gegenseitig anziehen können, denn nur dadurch

würde das Bilden und das Verschwinden des Schweifs u. s. w. erklärlich sein.

Die in neuester Zeit mit so gutem Erfolg auf die Himmelskörper angewandte Spectralanalyse zeigt in dem Spectrum, welches man von den Kometen erhält, drei breite helle Banden, wovon die mittlere sehr nahe mit einer Magnesiumlinie zusammenfällt. Das Spectrum der Kometen hat auch große Ähnlichkeit mit dem des Wasserstoffs, weshalb man glaubt, daß diese Substanz das Selbstleuchten einiger Kometen verursacht. Die hellen Banden sind durch vollkommen dunkle Zwischenräume getrennt, und da dies Spectrum nur von den Kern des Kometen herkommen kann, weil die Umhüllung zu schwach, ist die Substanz desselben vielleicht glühendes Kohlengas, welches gleichliegende Banden zeigt.

Der Annahme, daß die Hauptmasse der Kometen aus durch kleine Zwischenräume voneinander entfernten kleinen, festen Körpern bestehe, ähnlich wie eine Staub- oder Rauchwolke aus kleinen, festen Partikeln zusammengefaßt ist, und daß die flüchtigen Bestandtheile dieser kleinen Körper, wenn der Komet sich der Sonne genähert, sich ganz oder theilweise verflüchtigen, in Dampf aufgehen, weißglühend werden und so die übrigen festen Theile vorübergehend in eine selbstglühende Wolke glühenden Dampfes, den Kometenkern, einhüllen, steht nichts entgegen.

In dem folgenden Verzeichniß sind zunächst die sichersten Elemente aller berechneten Kometen zusammengestellt; die Elemente der periodischen sind darin enthalten, und aus der Vergleichung für verschiedene Zeiten erblickt man die Veränderung der Elemente durch die Störungen, auf die wir in dem Abschnitt „Die physische Astronomie“ zurückkommen.

Die wiedergekehrten periodischen Kometen sind:

Nr. 19, der Halley'sche,	Nr. 189, der d'Arrest'sche,
„ 96, der Ende'sche,	„ 131, der Winneke'sche,
„ 84, der Biela'sche,	„ 163, der Fagelle'sche,
„ 171, der Broese'sche,	„ 102, der Tuttle'sche.

Bei der großen Mehrzahl der Kometen ist es nicht möglich gewesen, eine Umlaufzeit zu ermitteln; erst durch ihr Wiedererscheinen und durch genauere Bahnbestimmungen kann nachgewiesen werden, daß dieselben schon von Erdbewohnern wahrgenommen worden sind.

In dem Verzeichniß enthält die erste Columne die laufende Nummer, entsprechend dem Olbers'schen Kometenverzeichniß. Um einmal angenommene Nummern nicht zu ändern, sind einzelne ältere Kometen, deren Bahnbestimmung in neuester Zeit noch möglich gewesen ist, mit der vorbegehenden Nummer und einem Buchstaben eingeschaltet. In Columne 2 ist die Zeit des Durchgangs durch das Perihel (nach welchem die Kometen auch mit der Jahreszahl und den römischen Ziffern I, II, III u. s. w. bezeichnet werden), in Columne 3 die Länge des Perihels, in Columne 4 die Länge des aufsteigenden Knotens, in Columne 5 die Neigung, alle drei Größen auf Bogenmaß abgerundet, gegeben. Columne 6 enthält die Periheldistanz auf drei Decimalen, Columne 7 bei elliptischen Bahnen die halbe große Achse, Columne 8 die entsprechende Umlaufzeit, Columne 9 die Excentricität. In der zehnten Columne ist die Richtung der Bewegung des Kometen, ob er rechtsläufig, wie die Planeten, oder rückläufig, d. h. im entgegengesetzten Sinne sich um die Sonne bewegt, und in der letzten Columne ist der Name des ersten Entdeckers (wenn er bekannt ist) angegeben, wenn beide den Kometen in derselben Nacht fanden) derjenigen Kometen, welche als neu, meist telescopisch, aufgefunden und nicht vorausberechnet waren, aufgeführt.

Jahr, Tag.	Ränge des Perihel.	Ränge des auf- steigenden Knoten.	Neigung.	Perihel- tiffang.	Halbe große Achse.	Umlaufzeit in Jahren.	Eccen- tricität.	Bewegung.	Name des Entdeckers.
8. Chr.									
371 Winter	150—210°	270—330°	über 30°	klein				☾	
137 April 29	230	220	20	1,010				☾	
69 Juli	315	165	70	0,79				☾	
12 October 8,8	290	28	10	0,583				☾	
9. Chr.									
66 Januar 14,2	325,0	32,7	40,5	0,445				☾	
141 März 29,1	251,9	12,8	17,0	0,720				☾	
240 November 10,0	271,0	189,0	44,0	0,372				☾	
539 October 20,6	313,5	58 ober 238°	10,0	0,341				☾	
565 Juli 14,5	80,0	159,5	59,0	0,832				☾	
568 August 29,3	318,6	294,2	4,1	0,907				☾	
574 April 7,3	143,6	128,3	46,5	0,963				☾	
770 Juni 6,6	2,1	88,9	59,5	0,603				☾	
837 März 1,0	289,0	206,5	10 ober 12°	0,580				☾	
961 December 30,2	268,0	350,6	79,5	0,552				☾	
989 September 12,0	264,0	84,0	17,0	0,568				☾	
1066 April 1,0	264,9	25,8	17,0	0,720				☾	
1092 Februar 15,0	156,3	125,7	28,9	0,928				☾	
1097 September 21,9	332,5	207,5	73,5	0,738				☾	
1231 Januar 30,3	134,8	13,5	6,1	0,948				☾	
1264 Juli 19,8	300,5	140,9	16,5	0,825				☾	
1299 März 31,3	3,3	107,1	68,9	0,318				☾	
1301 October 24,0	312,0	138,0	13,0	0,640				☾	
1337 Juni 15,1	2,3	93,0	40,5	0,828				☾	
1351 November 26,5	69,0	unbestimmt	unbestimmt	1,00				☾	
1362 März 2,3	227,0	237,0	32,0	0,470				☾	
1366 October 13,0	66,0	212,0	6,0	0,958				☾	
1378 November 8,8	299,5	47,3	17,9	0,583				☾	
1385 October 16,3	101,8	268,5	52,2	0,774				☾	
1433 November 4,4	281,0	133,8	79,0	0,339				☾	
1456 Juni 8,9	301,0	48,5	17,9	0,586				☾	
1457 September 3,7	92,8	256,1	20,3	2,103				☾	
1468 October 7,4	356,0	61,2	44,3	0,853				☾	
1472 Februar 28,2	48,0	207,5	1,9	0,565				☾	
1490 December 24,5	58,7	288,7	51,6	0,738				☾	Regiomontanus
1491 Januar 4,9	113,0	268,0	75,0	0,735				☾	
1506 September 3,7	250,6	132,8	45,0	0,386				☾	
1531 August 25,8	301,2	45,5	17,0	0,580	17,75	75,0	0,967	☾	Epianus Procatost
1532 October 18,3	111,8	87,4	32,6	0,519				☾	
1533 Juni 14,9	217,7	299,3	28,2	0,327				☾	
1556 April 22,9	276,1	175,2	32,4	0,491				☾	
1558 August 10,5	329,8	332,6	73,5	0,577				☾	
1577 October 27,0	129,7	25,3	75,3	0,177				☾	Lycho Regiom Lycho
1580 November 28,5	108,4	19,1	64,6	0,602				☾	
1582 Mai 6,4	256,3	229,3	60,3	0,168				☾	
Neuer Stil.									
1585 October 8,0	9,1	37,7	6,1	1,095				☾	Wilhelm IV. von Hessen
1590 Februar 8,0	218,0	165,6	29,5	0,568				☾	Lycho
1593 Juli 18,6	176,3	164,2	88,0	0,089				☾	Epianus
1596 Juli 25,9	270,9	330,3	52,0	0,567				☾	
1607 October 26,7	301,6	48,7	17,2	0,588				☾	Harriot Kepler Kirk Devel
1618 August 17,1	318,3	238,4	21,4	0,513				☾	
1618 November 8,4	3,1	75,7	37,2	0,390				☾	
1652 November 12,7	28,3	88,2	79,5	0,847				☾	
1661 Januar 26,9	115,3	81,9	33,0	0,443				☾	
1664 December 4,5	130,7	81,3	21,3	1,026				☾	
1665 April 24,2	71,9	228,0	76,1	0,106				☾	Devel Regidius
1668 Februar 28,8	277,0	357,3	36,0	0,005				☾	
1672 März 1,4	47,0	297,5	85,4	0,697				☾	
1677 Mai 6,0	137,6	236,8	79,1	0,281				☾	Devel Fabire Kirk
1678 August 18,7	322,8	163,3	2,9	1,145	3,070	5,38	0,627	☾	
1680 December 18,0	262,8	272,2	60,7	0,006	426,7	88,1	1,000	☾	
1682 September 14,8	301,9	51,2	17,7	0,583	18,17	77,5	0,968	☾	
1683 Juli 12,7	86,5	173,3	83,8	0,553	33,03	190	0,983	☾	Hamkeeb Bianchini
1684 Juni 8,4	258,9	288,2	65,8	0,960				☾	
1686 September 16,6	77,0	350,6	21,4	0,325				☾	
1689 November 29,2	269,7	90,4	59,1	0,019				☾	
1695 November 9,7	60,0	216,0	22,0	0,844				☾	Bianchi Jacob Fabire de Fontenay Ballu Bianchini Caslini Planitesti Kirk
1698 October 18,7	270,9	267,7	11,8	0,691				☾	
1699 Januar 13,4	212,5	321,8	69,3	0,744				☾	
1701 October 17,4	133,7	298,7	41,6	0,593				☾	
1702 März 13,6	138,8	189,0	4,4	0,647				☾	
1706 Januar 30,2	72,6	13,2	55,2	0,427				☾	
1707 December 12,0	79,9	52,8	88,6	0,860				☾	
1718 Januar 14,9	121,7	127,9	31,1	1,025				☾	
1723 September 27,6	42,9	14,2	50,0	0,999				☾	
1729 Juni 12,8	320,5	310,6	77,1	4,043				☾	
1737 Januar 30,4	323,9	226,4	18,3	0,223				☾	
1737 Juni 8,3	262,6	163,9	39,2	0,867				☾	
1739 Juni 17,4	102,6	207,4	55,7	0,674				☾	
1742 Februar 8,6	216,7	135,2	67,5	0,770				☾	
1743 Januar 10,9	93,0	67,5	2,3	0,838				☾	
1743 September 20,9	246,6	5,3	45,8	0,522				☾	
1744 März 1,3	197,2	45,8	47,3	0,222				☾	
1747 März 3,3	277,0	147,3	79,1	2,199				☾	
1748 April 28,8	215,4	232,9	85,5	0,840				☾	
1748 Juni 18,9	278,8	33,1	67,1	0,635				☾	
1757 October 21,4	122,8	214,1	12,7	0,339				☾	
1758 Juni 11,1	267,6	230,8	68,3	0,215				☾	
1759 März 12,6	303,2	53,8	17,6	0,585	18,09	76,9	0,968	☾	
1759 November 27,1	53,4	130,7	79,0	0,799				☾	
1759 December 16,5	139,1	79,3	4,7	0,962				☾	
1762 Mai 28,3	104,0	348,6	85,6	1,009				☾	Slingsenberg

Nummer.	Jahr, Tag.	Länge des Perihels.	Länge des steigenden Knotens.	Neigung.	Perihel- distanz.	Halbe große Achse.	Umlaufzeit in Jahren.	Eccen- tricität.	Störung.	Name des Entdeckers.
76	1763 November 1.9	83° 0	356° 3	72° 6	0.498	109.0	1137	0.995	D	Meßner
77	1764 Februar 12.6	15.2	120.1	52.9	0.555				R	Meßner
78	1766 Februar 17.4	143.3	244.2	40.8	0.505				R	Meßner
79	1766 April 27.0	251.2	74.2	8.0	0.399	2.934	5.025	0.864	D	Hellenrieder
80	1769 October 7.6	144.2	175.1	40.8	0.123	63.46	2090	0.999	D	Meßner
81	1770 August 13.5	356.3	132.0	1.6	0.674	3.163	6.626	0.786	D	Meßner
82	1770 November 22.2	208.4	105.7	31.4	0.528				R	
83	1771 April 19.5	104.1	37.9	11.3	0.903			1.009	D	Meßner
84	1772 Februar 8.0	97.4	263.4	17.6	0.912	2.822	4.741	0.677	D	Montagne
85	1773 September 5.6	75.2	121.1	61.2	1.127				D	Meßner
86	1774 August 15.8	317.5	180.7	83.3	1.433			1.078	D	Montagne
87	1779 Januar 4.1	87.2	25.1	32.5	0.713				D	Meßner
88	1780 September 30.8	246.0	126.2	53.8	0.069				R	Meßner
89	1780 November 23.9	246.9	141.0	72.1	0.515				R	Montagne und Olber
90	1781 Juli 7.2	239.2	83.0	81.7	0.776				D	Wichain
91	1781 November 29.5	16.1	77.4	27.2	0.961				D	Wichain
92	1783 November 19.0	50.3	55.7	45.1	1.459	3.260	5.888	0.552	D	Wagat
93	1784 Januar 21.2	80.7	36.8	51.2	0.708				R	de la Rue
94	1785 Januar 27.3	109.9	70.2	1.143	0.717				D	Meßner und Wichain
95	1785 April 8.4	297.5	64.6	57.5	0.427				R	Meßner
96	1786 Januar 30.9	156.6	334.1	13.6	0.335	2.208	3.281	0.818	D	Wichain
97	1786 Juli 8.6	158.6	195.4	51.0	0.394				D	Karoline Herschel
98	1787 Mai 10.8	7.7	106.9	48.3	0.349				R	Wichain
99	1788 November 10.3	99.1	156.9	12.3	1.063				D	Meßner
100	1788 November 30.3	228.7	332.4	64.5	0.757				R	Karoline Herschel
101	1790 Januar 16.8	58.4	172.8	29.7	0.747				D	Karoline Herschel
102	1790 Januar 28.3	111.7	267.1	57.0	1.063				D	Wichain
103	1790 Mai 20.5	275.0	35.2	63.6	0.791				R	Karoline Herschel
104	1792 Januar 13.5	36.3	190.7	39.8	1.293				R	Karoline Herschel
105	1792 December 27.3	135.9	283.2	49.1	0.967				R	Gregory
106	1793 November 4.8	228.7	108.5	60.3	0.403				R	Meßner
107	1793 November 19.5	71.6	2.3	51.9	1.504				D	Barnard
(96)	1795 December 21.4	156.7	334.7	13.7	0.334	2.213	3.292	0.849	D	Karoline Herschel
108	1796 April 2.8	192.7	17.0	64.9	1.578				R	Olbers
109	1797 Juli 9.1	49.6	329.3	50.6	0.525				R	Bouvard, K. Herschel u. d. R.
110	1798 April 4.5	105.1	122.2	43.7	0.485				D	Meßner
111	1798 December 31.6	34.5	249.5	42.4	0.790				R	Bouvard
112	1799 September 7.2	3.7	99.5	51.0	0.840				R	Wichain
113	1799 December 25.9	190.3	326.8	77.0	0.626				R	Wichain
114	1801 August 8.6	183.8	44.5	21.3	0.262				D	Bons und Meßner
115	1802 September 9.9	332.2	310.3	57.0	1.094				D	Bons
116	1804 Februar 13.6	149.1	176.9	56.9	1.075				D	Bons
(96)	1805 November 21.5	156.8	334.3	13.6	0.340	2.213	3.292	0.846	D	Bouvard, Bons und d. R.
(84)	1806 Januar 2.0	109.5	251.3	13.6	0.907	3.567	6.737	0.746	D	Bons
117	1806 December 28.9	97.1	322.4	35.0	1.082			1.010	R	Bons
118	1807 September 18.7	270.9	266.8	63.2	0.646	143.2	1714	0.995	D	Barf
119	1808 Mai 13.0	69.2	323.0	45.7	0.390				R	Bons
120	1808 Juli 12.2	252.6	24.2	39.3	0.608				R	Bons
121	1810 September 29.1	52.7	310.4	61.2	0.976				D	Bons
122	1810 September 12.3	75.0	140.4	13.0	1.730	211.0	3069	0.995	D	Haugerues
123	1811 November 11.0	47.5	93.0	31.3	1.582	91.51	875	0.983	D	Bons
124	1812 September 15.3	92.3	253.0	74.0	0.777	17.09	71	0.955	D	Bons
125	1813 März 4.5	69.9	60.8	21.2	0.699				R	Bons
126	1813 Mai 19.5	197.6	42.7	81.1	1.215				R	Bons
(27)	1815 April 26.0	149.0	83.5	44.5	1.313	17.63	74	0.931	D	Olbers
127a	1816 März 1.4	267.6	323.2	43.5	0.049				R	Bons
127b	1818 Februar 7.4	95.1	250.1	20.0	0.733				D	Bons
128	1818 Februar 26.0	182.8	70.4	89.7	1.198				D	Bons
129	1818 December 5.0	101.8	90.0	63.0	0.855			1.012	R	Bons
(96)	1819 Januar 27.3	157.0	334.6	13.6	0.335	2.214	3.295	0.849	D	Bons
130	1819 Juni 27.7	287.1	273.7	80.8	0.941				D	Tralles
131	1819 Juli 18.9	274.7	115.2	10.7	0.774	3.160	5.618	0.755	D	Bons
132	1819 November 30.3	67.3	77.2	9.0	0.893	2.649	4.810	0.687	D	Planipin und Bons
133	1821 März 21.5	239.5	48.7	73.6	0.092				R	Nicolet und Bons
134	1822 Mai 5.6	192.7	177.4	53.6	0.504				R	Gambart
(96)	1822 Mai 24.0	157.2	334.4	13.3	0.346	2.224	3.318	0.844	D	Bons
135	1822 Juli 16.0	219.9	97.9	37.7	0.846				R	Bons
136	1822 October 23.8	271.7	92.7	52.7	1.145	309.7	5449	0.996	R	Bons
137	1823 December 9.5	274.6	303.0	76.2	0.426				R	Hämmer
138	1824 Juli 11.5	260.3	234.3	54.6	0.591				D	Bons
139	1824 September 29.1	4.5	279.3	54.6	1.050				R	Schiffbauer
140	1825 Mai 30.6	273.9	20.1	56.7	0.890				R	Gambart
141	1825 August 18.4	9.8	199.1	88.5	0.883				D	Bons
(96)	1825 September 16.3	157.2	334.5	13.4	0.345	2.223	3.315	0.845	D	Bons
142	1825 December 10.7	318.8	215.7	33.5	0.941	267.9	4386	0.995	D	Bons
(84)	1826 März 18.4	109.8	251.5	13.6	0.903	3.561	6.720	0.747	D	Piela
143	1826 April 21.9	117.0	197.6	40.0	2.008				D	Bons
144	1826 April 29.0	35.8	40.5	5.3	0.188				R	Haugerues
145	1826 October 9.0	57.8	44.1	26.0	0.853				D	Bons
146	1826 November 18.8	315.5	235.1	89.4	0.027				R	Bons
147	1827 Februar 4.9	33.5	184.5	77.6	0.507				R	Bons
148	1827 Juni 7.5	297.5	318.2	43.6	0.808				R	Bons und Gambart
149	1827 September 11.7	251.0	149.7	54.1	0.138	189.6	2611	0.999	D	Bons
(96)	1829 Januar 9.8	157.3	334.5	13.3	0.346	2.224	3.316	0.845	D	Bons
150	1830 April 9.3	212.2	206.4	21.3	0.921				D	b'Nabatie
151	1830 December 27.7	311.0	337.9	44.8	0.126				R	Perapath
(96)	1832 Mai 4.0	157.4	334.5	13.4	0.343	2.222	3.313	0.845	D	Bons
152	1832 September 25.5	272.9	72.4	43.3	1.184				D	Gambart
(84)	1832 November 26.1	109.9	248.2	13.2	0.879				R	Bons
153	1833 September 10.2	222.9	323.2	7.3	0.459	3.537	6.652	0.751	D	Dunlop
154	1834 April 2.7	276.6	226.8	5.9	0.515				D	Gambart
155	1835 März 26.6	207.7	58.3	9.1	2.041				D	Bogueland
(96)	1835 August 26.4	157.4	334.8	13.4	0.344	2.223	3.314	0.845	D	Bons
156	1835 November 15.9	35.2	304.8	17.8	0.587	17.99	76.29	0.967	D	Bons
(96)	1838 December 19.0	157.5	334.6	13.4	0.344	2.222	3.313	0.845	D	Bons
156	1840 Januar 4.4	192.2	120.0	53.1	0.618			1.000	D	Galle

Jahr, Tag.	Länge des Perihels.	Länge des auf- steigenden Knotens.	Neigung.	Perihel- distanz.	Halbe große Achse.	Umlaufzeit in Jahren.	Grav. mittl.	Bewegung.	Name des Entdeckers.	
1840 März 13.0	809.3	236.8	59.2	1.221	577.1	13864	0.998	W	Halle	
1840 April 2.5	324.2	186.0	79.9	0.748				D	Halle	
1840 November 13.7	22.5	248.9	58.0	1.481	49.12	344	0.970	D	Bremiker	
1842 April 12.9	157.5	334.7	13.3	0.345	2.223	3.314	0.845	D		
1842 December 16.0	227.8	207.8	73.6	0.504				W	Laugier	
1843 Februar 27.4	278.7	1.2	35.7	0.006	65.71	533	1.000	W		
1843 Mai 6.0	281.5	157.2	52.7	1.616				D	Mauvais	
1843 October 17.2	49.6	209.5	11.4	1.693	3.812	7.442	0.556	D	Yane	
1844 September 2.5	342.5	63.8	2.9	1.186	3.100	5.459	0.617	D	de Vico	
1844 October 17.4	180.4	31.7	49.6	0.855				D	Mauvais	
1844 December 13.7	296.0	118.3	45.6	0.252			1.000	D		
1845 Januar 8.2	91.3	336.7	46.8	0.905				D	b'Arrest	
1845 April 21.0	192.6	347.1	56.4	1.255				D	de Vico	
1845 Juni 5.7	262.0	337.8	48.7	0.402	39.66	249.8	0.990	W	Golla	
1845 August 9.6	157.7	334.3	13.1	0.338	2.216	3.300	0.847	D		
1846 Januar 22.1	89.1	111.1	47.4	1.481	194.9	2721	0.992	D	de Vico	
1846 Februar 11.0	109.0	245.9	12.6	0.856	3.520	6.603	0.757	D		
1846 Februar 11.1	109.0	245.9	12.6	0.856	3.519	6.601	0.757	D		
1846 Februar 25.4	116.5	102.7	30.9	0.650	3.146	5.581	0.793	D	Broijen	
1846 März 5.6	90.5	77.6	85.1	0.664	17.38	73.7	0.962	D	de Vico	
1846 Mai 27.9	83.5	161.3	57.6	1.376				W	de Vico und Sind	
1846 Juni 1.1	229.8	200.2	31.0	1.538	6.321	15.89	0.757	D	G. S. F. Peters	
1846 Juni 5.5	162.1	261.9	29.3	0.634	62.99	500	0.990	W	Broijen	
1846 October 29.9	98.8	4.6	49.7	0.829	123	1994	0.992	D	de Vico	
1847 März 30.5	276.0	21.7	48.6	0.043	489	10918	1.000	D	Sind	
1847 Juni 4.7	141.6	174.0	79.6	2.115				W	Golla	
1847 August 9.4	246.7	338.3	83.5	1.767			0.999	W	Mauvais	
1847 August 9.4	21.3	76.7	32.6	1.485				W	Schweizer	
1847 September 9.5	79.2	309.8	19.1	0.488	17.8	75	0.973	D	Broijen	
1847 November 14.4	274.2	196.8	71.8	0.379			1.000	W	W. J. Mitchell	
1848 September 8.1	310.6	211.5	4.4	0.350				W	Peterlin	
1848 November 26.1	157.8	334.4	13.1	0.337	2.215	3.296	0.845	D		
1849 Januar 19.4	63.2	215.2	85.0	0.960				D	Peterlin	
1849 Mai 26.5	235.7	202.5	67.2	1.159				D	Goujon	
1849 Juni 8.2	267.1	30.5	66.9	0.894	412	8375	0.998	D	Schweizer	
1850 Juli 23.5	273.4	92.9	68.2	1.081	940	28800	0.999	D	Peterlin	
1850 October 19.2	89.2	206.9	40.1	0.565				D	Hond	
1851 April 1.8	49.7	309.5	11.4	1.700		3.849	1.462	0.555	D	
1851 Juli 8.7	322.9	148.4	13.9	1.173	3.444	6.390	0.659	D	b'Arrest	
1851 August 26.2	311.0	223.7	38.3	0.984	313	5550	0.997	D	Broijen	
1851 September 30.8	338.8	44.4	74.0	0.141				D	Broijen	
1852 März 14.7	157.9	334.4	13.1	0.337	2.215	3.297	0.848	D		
1852 April 20.6	278.7	317.5	49.2	0.913			1.053	W	Spacornac	
1852 September 23.7	109.1	245.9	12.6	0.861	3.526	6.621	0.756	D		
1852 September 23.1	109.1	245.9	12.6	0.861	3.525	6.619	0.756	D		
1852 October 12.8	43.2	346.2	40.9	1.250	15.44	60.7	0.919	D	Wethphal	
1853 Februar 24.0	153.7	69.6	20.3	1.092				W	Sechi	
1853 Mai 9.8	201.7	41.0	57.8	0.909	65.1	785	0.989	W	Schweizer	
1853 September 1.7	310.9	140.5	61.5	0.307				D	Kinterlinus	
1853 October 16.6	302.2	220.1	61.0	0.173			1.001	W	Wubns	
1854 Januar 3.9	55.1	227.0	66.1	2.045				W	van Wredale	
1854 März 24.0	213.8	315.3	59.5	0.277				W		
1854 Juni 22.0	273.1	347.7	71.3	0.648				W	Kinterlinus	
1854 October 27.5	94.4	324.5	40.9	0.799	119.6	1309	0.993	D	Kinterlinus	
1854 December 15.7	165.2	228.1	14.1	1.358	99.8	997	0.986	D	Winnede und Dien	
1855 Februar 5.1	226.6	189.7	51.4	2.194	63	500	0.965	W	Schweizer	
1855 Mai 30.2	237.7	260.3	23.1	0.267				D	Donati	
1855 Juli 1.2	157.9	334.4	13.1	0.337	2.215	3.295	0.848	D		
1855 November 25.4	86.0	51.6	10.2	1.231				W	Wubns	
1857 März 21.4	74.7	313.2	87.9	0.772				D	b'Arrest	
1857 März 29.2	115.7	101.8	29.8	0.621	3.139	5.562	0.802	D	Wubns	
1857 Juli 18.0	249.6	23.7	59.0	0.367	367	7040	0.999	W	Kinterlinus	
1857 August 24.0	21.8	200.8	32.8	0.747	38.05	235	0.930	D	G. S. F. Peters	
1857 September 30.9	290.1	15.0	56.1	0.563	192	2463	0.997	W	Kinterlinus	
1857 November 19.1	44.2	139.3	57.8	1.009	335	6143	0.997	W	Donati und van Wredale	
1857 November 28.2	233.1	146.5	13.9	1.170	3.440	6.350	0.660	D		
1858 Februar 23.5	115.9	269.1	54.4	1.025	8.726	13.70	0.821	D	Tuttle	
1858 Mai 2.0	275.7	113.6	10.8	0.769	3.139	5.560	0.755	D	Winnede	
1858 Mai 2.3	196.0	170.7	23.0	1.210				D	Tuttle	
1858 Juni 5.3	226.1	325.0	80.0	0.554				W	Wubns	
1858 September 12.9	49.8	209.7	11.4	1.694	3.813	7.443	0.556	D		
1858 September 30.0	36.2	103.3	63.0	0.518	152.3	1880	0.996	W	Donati	
1858 October 12.8	4.2	259.8	7.3	1.457	339	6000	0.996	D	Tuttle	
1858 October 18.4	158.0	334.5	13.1	0.341	2.218	3.304	0.846	D		
1859 Mai 29.2	75.3	357.3	84.5	0.201				W	Tempef	
1860 Februar 16.7	173.8	324.1	79.6	1.137				D	Fiale	
1860 März 6.6	50.1	8.9	48.2	1.307				D	Wämter	
1860 Juni 16.1	161.5	84.7	79.3	0.293				D		
1860 September 28.3	112.0	104.2	28.2	0.954				W	Tempef	
1861 Juni 3.4	229.4	22.9	79.3	0.921	55.68	415	0.983	D	Tempef	
1861 Juni 11.5	249.1	279.0	85.4	0.822	56.1	420	0.985	D	Tekuit	
1861 December 7.2	173.5	145.1	42.0	0.839				W	Tuttle	
1862 Februar 6.2	158.0	334.5	13.1	0.340	2.217	3.302	0.847	D		
1862 Juni 22.0	299.3	326.5	7.9	0.981				W	Schmidt und Tempef	
1862 August 22.9	344.7	137.4	66.4	0.963	24.85	124	0.961	W	Tuttle	
1862 December 28.2	125.2	355.7	42.4	0.803				W	Weybigg	
1863 Februar 3.5	191.4	116.9	41.8	0.795				D	Wubns	
1863 April 4.9	247.3	251.3	67.4	1.068				W	Kinterlinus	
1863 April 20.9	305.8	250.2	85.5	0.629				D	Weybigg	
1863 November 9.5	94.7	97.5	78.1	0.707				D	Tempef	
1863 December 27.8	60.4	304.7	64.5	0.772				D	Weybigg	
1863 December 29.2	183.1	105.0	83.3	1.313				D	Wäfer	
1864 Juli 27.7	185.5	174.9	45.0	0.664				W	Donati	
1864 August 18.6	204.2	95.2	1.9	0.909				W	Tempef	
1864 October 11.3	159.5	31.7	70.2	0.934				W	Donati und Foujais	
1864 December 22.5	231.7	202.2	48.9	0.771				D	Wäfer	

Nummer.	Jahr, Tag.	Länge des Perihels.	Länge des aph. Steigens. Rektens.	Neigung.	Perihel- distanz.	Halbe große Achse.	Umlaufzeit in Jahren.	Eccen- tricität.	Störungs- gleichung.	Name des Entdeckers.
76	1763 November 1.9	83° 0	356° 3	72° 6	0.498	109.0	1137	0.995	D	Meßler
77	1764 Februar 12.6	15.2	120.1	52.9	0.555				R	Meßler
78	1766 Februar 17.4	143.3	244.2	40.8	0.505				R	Meßler
79	1766 April 27.0	251.2	74.2	8.0	0.399	2.934	5.025	0.864	D	Hellengrieter
80	1769 October 7.6	144.2	175.1	40.8	0.123	63.46	2090	0.999	D	Meßler
81	1770 August 13.5	356.3	132.0	1.6	0.674	3.163	6.626	0.786	D	Meßler
82	1770 November 22.2	208.4	108.7	31.4	0.528				R	Meßler
83	1771 April 19.2	101.1	27.9	11.3	0.903			1.009	D	Meßler
84	1772 Februar 8.0	97.4	263.4	17.6	0.912	2.822	4.741	0.677	D	Montagne
85	1773 September 5.6	75.2	121.1	61.2	1.127				D	Meßler
86	1774 August 15.8	317.5	180.7	83.3	1.433			1.028	D	Montagne
87	1779 Januar 4.1	87.2	25.1	32.5	0.713				D	Meßler
88	1780 September 30.8	246.4	124.2	53.8	0.009				R	Meßler
89	1780 November 28.9	246.9	141.0	72.1	0.515				R	Montagne und Ober
90	1781 Juli 7.2	239.2	83.0	81.7	0.776				D	Meßler
91	1781 November 29.5	16.1	77.4	27.2	0.961				R	Meßler
92	1783 November 19.9	50.3	55.7	45.1	1.459	3.260	5.888	0.552	D	Bigott
93	1784 Januar 21.2	60.7	36.8	51.2	0.708				R	de la Rue
94	1785 Januar 27.3	109.9	284.2	70.2	1.143				D	Meßler und Meßler
95	1785 April 8.4	297.5	64.6	87.5	0.427				D	Meßler
96	1786 Januar 30.9	156.6	334.1	13.6	0.335	2.208	3.261	0.848	D	Meßler
97	1786 Juli 8.6	158.6	195.4	51.0	0.394				D	Caroline Herschel
98	1787 Mai 10.8	7.7	106.9	48.3	0.349				R	Meßler
99	1788 November 10.3	99.1	156.9	12.5	1.063				R	Meßler
100	1788 November 20.3	22.8	352.4	64.5	0.737				D	Caroline Herschel
101	1790 Januar 16.8	58.4	172.8	29.7	0.747				D	Caroline Herschel
102	1790 Januar 28.3	111.7	267.1	57.0	1.063				D	Meßler
103	1790 Mai 20.5	275.0	35.2	63.6	0.791				R	Caroline Herschel
104	1792 Januar 13.5	36.3	190.7	39.8	1.293				R	Caroline Herschel
105	1792 December 27.3	135.9	283.2	49.1	0.967				R	Gregory
106	1793 November 4.8	228.7	108.5	60.3	0.403				R	Meßler
107	1793 November 19.5	5.7	214.9	2.3	1.504				D	Gregory
(96)	1795 December 21.4	157.7	334.7	13.7	0.334	2.213	3.292	0.849	D	Caroline Herschel
108	1796 April 2.8	192.7	17.0	64.9	1.578				R	Ober
109	1797 Juli 9.1	49.6	329.3	50.6	0.525				R	Bouvard, R. Herschel u. A.
110	1798 April 4.5	105.1	122.2	43.7	0.485				D	Meßler
111	1798 December 31.6	34.5	249.5	42.4	0.780				R	Bouvard
112	1799 September 7.2	5.7	99.5	51.0	0.840				R	Meßler
113	1799 December 25.9	190.3	326.8	77.0	0.626				R	Meßler
114	1801 August 8.6	183.8	44.5	21.3	0.262				R	Bond und Meßler
115	1802 September 9.9	332.2	310.3	57.0	1.094				D	Bond
116	1804 Februar 13.6	149.1	176.9	56.9	1.075				D	Bond
(96)	1805 November 21.5	156.8	334.3	13.6	0.340	2.213	3.292	0.846	D	Bouvard, Bond und Bond
(84)	1806 Januar 2.0	109.5	251.3	13.6	0.907	3.567	6.737	0.746	D	Bond
117	1806 December 28.9	97.1	322.4	35.0	1.082			1.010	R	Bond
118	1807 September 18.7	270.9	266.8	63.2	0.646	143.2	1714	0.995	D	Barfi
119	1808 Mai 13.0	69.2	323.0	45.7	0.390				R	Bond
120	1808 Juli 12.2	252.6	24.2	39.3	0.604				R	Bond
121	1810 September 29.1	52.7	310.4	61.3	0.576				D	Bond
122	1810 November 7.0	75.0	140.4	73.0	0.035	211.0	3069	0.995	D	Haugerug
123	1811 November 11.0	47.5	93.0	31.3	1.582	91.51	875	0.983	D	Bond
124	1812 September 15.3	92.3	253.0	74.0	0.777	17.09	71	0.955	D	Bond
125	1813 März 4.5	69.9	60.8	21.2	0.699				R	Bond
126	1813 Mai 19.5	197.6	42.7	81.1	1.215				R	Bond
127	1815 April 26.0	149.0	83.5	44.5	1.213	17.63	74	0.931	D	Ober
127a	1816 März 1.4	267.6	323.2	43.1	0.049				D	Bond
127b	1818 Februar 7.4	95.1	250.1	20.0	0.733				D	Bond
128	1818 Februar 26.0	182.8	70.4	89.7	1.198				D	Bond
129	1818 December 5.0	101.8	90.0	63.0	0.855			1.012	D	Bond
(96)	1819 Januar 27.3	157.0	334.6	13.6	0.335	2.214	3.295	0.849	D	Bond
130	1819 Juni 27.7	287.1	273.7	80.8	0.341				D	Tralles
131	1819 Juli 18.9	274.7	113.2	10.7	0.774	3.160	5.618	0.755	D	Bond
132	1819 November 20.3	67.3	77.2	9.0	0.893	2.849	4.810	0.687	D	Riess und Bond
133	1821 März 21.5	239.5	48.7	73.6	0.092				R	Hambart
134	1822 Mai 5.6	192.7	177.4	53.6	0.504				D	Bond
(96)	1822 Mai 24.0	157.2	334.4	13.3	0.346	2.224	3.318	0.844	D	Bond
135	1822 Juli 16.0	219.9	97.9	37.7	0.846				R	Bond
136	1822 October 23.8	371.7	92.7	52.7	1.145	309.7	5449	0.996	R	Bond
137	1823 December 9.5	274.6	303.0	76.2	0.226				R	Robt
138	1824 Juli 11.5	260.3	234.3	54.6	0.591				R	Häufiger
139	1824 September 29.1	4.5	279.3	54.6	1.050				D	Schäffer
140	1825 Mai 30.6	273.9	20.1	56.7	0.890				R	Hambart
141	1825 August 18.4	9.8	193.1	88.5	0.883				D	Bond
(96)	1825 September 16.3	157.2	334.5	13.4	0.345	2.223	3.315	0.845	D	Bond
142	1825 December 10.7	318.8	215.7	33.5	1.241	267.9	4386	0.995	R	Bond
(84)	1826 März 18.4	109.8	234.5	13.6	0.503	3.561	6.720	0.747	D	Bond
143	1826 April 11.9	117.0	197.6	40.0	2.008				R	Bond
144	1826 April 29.0	35.8	40.5	5.3	0.188				D	Bond
145	1826 October 9.0	57.8	44.1	26.0	0.833				D	Haugerug
146	1826 November 18.3	315.5	235.1	89.4	0.027				R	Bond
147	1827 Februar 4.9	35.5	184.5	77.6	0.507				R	Bond
148	1827 Juni 7.8	297.5	318.2	54.1	0.808				R	Bond
149	1827 September 11.7	251.0	149.7	54.1	1.138	189.6	2611	0.999	D	Bond und Hambart
150	1829 Januar 9.8	157.3	334.5	13.3	0.346	2.224	3.316	0.845	D	Bond
151	1830 April 9.3	212.2	206.4	21.3	0.921				D	Abbatic
(96)	1830 December 27.7	311.0	337.9	44.8	0.126				D	Deccapal
152	1832 September 25.5	157.4	334.5	13.4	0.343	2.222	3.312	0.845	D	Bond
(84)	1832 November 26.1	227.9	72.4	43.3	1.184				D	Bond
153	1833 September 10.2	229.9	232.2	7.5	0.459	3.537	6.652	0.751	D	Bond
154	1834 April 2.7	276.6	226.8	5.9	0.515				D	Dunlop
(96)	1835 März 27.6	207.7	38.3	9.1	2.041				D	Hambart
(96)	1835 August 26.4	157.4	334.6	13.4	0.344	2.223	3.314	0.845	D	Boguslaw
(19)	1835 November 15.9	35.5	33.2	17.8	0.387	17.99	76.29	0.967	D	Bond
(96)	1838 December 18.8	334.6	13.4	33.1	0.618	2.222	3.313	0.845	D	Bond
156	1840 Januar 4.4	120.0						1.000	D	Galle

Nummer.	Jahr, Tag.	Länge des Perihels.	Länge des aufsteigenden Knoten.	Neigung.	Perihel- distanz.	Halbe große Achse.	Umlaufzeit in Jahren.	Eccen- tricität.	Bezeichnung.	Name des Entdeckers.	
157	1840 März 13.0	80° 3	236° 8	59° 2	1.221	577.1	13864	0.998	R	Galle	
158	1840 April 2.5	324.2	186.0	79.9	0.748				D	Galle	
159	1840 November 13.7	22.5	248.9	58.0	1.481	49.12	344	0.970	D	Brenniser	
(96)	1842 April 12.0	157.5	334.7	13.3	0.345	2.223	3.314	0.945	D		
160	1842 December 16.0	327.3	207.8	73.6	0.504				R	Raugier	
161	1843 Februar 27.4	278.7	1.2	35.7	0.006	65.71	533	1.000	R		
162	1843 Mai 6.0	261.5	157.2	52.7	1.616				D	Mauvais	
163	1843 October 17.2	49.6	209.5	11.4	1.693	3.812	7.442	0.556	D	Habe	
164	1844 September 2.5	312.5	63.8	2.9	1.186	3.100	5.459	0.617	D	de Bico	
165	1844 October 17.4	180.4	31.7	48.6	0.855				D	Mauvais	
166	1844 December 13.7	296.0	118.3	45.6	0.252				D		
167	1845 Januar 8.2	91.3	336.7	46.8	0.905				D	b'Arrest	
168	1845 April 21.0	192.6	347.1	56.4	1.255				D	de Bico	
169	1845 Juni 5.7	262.0	337.8	48.7	0.402	89.68	249.8	0.990	R	Golla	
(96)	1845 August 9.6	157.7	334.3	13.1	0.338	2.216	3.300	0.947	D		
170	1846 Januar 22.1	89.1	111.1	47.4	1.481	194.9	2721	0.992	D	de Bico	
(94) A	1846 Februar 11.0	109.0	245.9	12.6	0.856	3.520	6.603	0.757	D		
(94) B	1846 Februar 11.1	109.0	245.9	12.6	0.856	3.519	6.601	0.757	D		
171	1846 Februar 25.4	116.5	102.7	30.9	0.650	3.146	5.581	0.793	D	Drorfen	
172	1846 März 5.6	90.5	77.6	85.1	0.664	17.58	73.7	0.962	D	de Bico	
173	1846 Mai 27.9	82.5	161.3	57.6	1.376				R	de Bico und Sind	
174	1846 Juni 1.1	239.8	260.9	31.0	1.538	6.321	15.89	0.757	D	G. H. H. Peters	
175	1846 Juni 5.5	162.1	261.9	29.3	0.634	62.99	500	0.990	R	Drorfen	
176	1846 October 29.9	98.8	4.6	49.7	0.829	123	1390	0.993	D	de Bico	
177	1847 März 30.3	276.0	21.7	48.6	0.043	489	10918	1.000	D	Sind	
178	1847 Juni 4.7	141.6	174.0	79.6	2.115				R	Golla	
179	1847 August 9.4	246.7	338.2	1.767					0.999	R	Mauvais
180	1847 August 9.4	21.3	76.7	32.6	1.485				R	Schweizer	
181	1847 September 9.5	79.2	309.8	19.1	0.488	17.8	75	0.973	D	Drorfen	
182	1847 November 14.4	274.2	190.8	71.8	0.329				1.000	R	Wig Wiltzell
183	1848 September 8.1	310.6	211.5	84.4	0.320				R	Petersen	
(96)	1848 November 26.1	157.8	334.4	13.1	0.337	2.215	3.296	0.848	D		
184	1849 Januar 19.4	63.2	215.2	85.0	0.960				D	Petersen	
185	1849 Mai 26.5	225.7	202.5	67.2	1.159				R	Gougen	
186	1849 Juni 8.2	267.1	30.5	66.9	0.894	412	8375	0.998	D	Schweizer	
187	1850 Juli 23.5	273.4	92.9	68.2	1.081	940	28800	0.999	D	Petersen	
188	1850 October 19.3	89.2	206.0	40.1	0.565				D	Donb	
(163)	1851 April 1.8	49.7	209.5	11.4	1.700	3.819	7.462	0.555	D		
189	1851 Juli 8.7	322.9	148.4	13.9	1.173	3.444	6.390	0.659	D	b'Arrest	
190	1851 August 26.2	211.0	225.7	39.2	0.994	313	5550	0.997	D	Drorfen	
191	1851 September 30.8	338.8	44.4	74.0	0.141				D	Drorfen	
(96)	1852 März 14.7	157.9	334.4	13.1	0.337	2.215	3.297	0.848	D		
192	1852 April 30.6	278.7	317.5	49.2	0.913				D	Chacernac	
(94) A	1852 September 23.7	109.1	245.9	12.6	0.861	3.526	6.621	0.756	D		
(94) B	1852 September 23.1	109.1	245.9	12.6	0.861	3.525	6.619	0.756	D		
193	1852 October 12.8	43.2	346.2	40.9	1.250	15.44	60.7	0.919	D		
194	1853 Februar 24.0	153.7	69.6	20.3	1.092				R	Westphal	
195	1853 Mai 9.8	201.7	41.0	57.8	0.909	85.1	785	0.959	R	Seckl	
196	1853 September 1.7	310.9	140.5	61.5	0.307				D	Rinterfues	
197	1853 October 16.6	302.2	220.1	61.0	0.173				1.001	R	Brühns
198	1854 Januar 3.9	56.1	227.0	66.1	2.045				R	van Krebale	
199	1854 März 24.0	218.8	315.5	82.5	0.277				R		
200	1854 Juni 22.0	278.1	347.7	71.3	0.799				R	Rinterfues	
201	1854 October 27.5	94.4	324.5	40.9	0.799	119.6	1309	0.993	D	Rinterfues	
202	1854 December 15.7	165.2	238.1	14.1	1.358	99.8	997	0.986	D	Winnende und Dien	
203	1855 Februar 5.1	226.6	189.7	51.4	2.194	63	500	0.965	R	Schweizer	
204	1855 Mai 30.2	237.7	260.3	23.1	0.567	2.215	3.295	0.848	D	Donati	
(96)	1855 Juli 1.2	157.9	334.4	13.1	0.337				R		
206	1855 November 25.4	86.0	51.6	10.2	1.231				D	Brühns	
207	1857 März 29.2	74.7	83.2	27.9	0.772	3.139	5.562	0.802	D	b'Arrest	
(111)	1857 April 22.0	115.7	101.8	29.8	0.621				R	Brühns	
208	1857 Juli 18.0	249.6	23.7	59.0	0.367	367	7040	0.999	R	Brühns	
209	1857 September 30.9	21.8	200.8	32.8	0.747	38.05	235	0.990	D	G. H. H. Peters	
210	1857 November 19.1	290.1	15.0	36.1	0.563	1°2	2463	0.997	R	Rinterfues	
(189)	1857 November 28.2	328.1	148.5	13.9	1.114	335	6143	0.997	R	Donati und van Krebale	
(102)	1858 Februar 23.5	115.9	269.1	54.4	1.025	5.726	13.70	0.821	D	Donati	
(111)	1858 Mai 2.0	275.7	113.6	10.8	0.769	3.139	5.560	0.755	D	Tuttle	
211	1858 Mai 2.3	196.0	170.7	23.0	1.210				D	Winnende	
212	1858 Juni 5.3	226.1	325.0	80.0	0.554				D	Tuttle	
(163)	1858 September 12.9	49.8	209.7	11.4	1.694	3.813	7.445	0.556	D	Brühns	
213	1858 September 30.0	86.2	165.3	58.0	0.578	152.3	1880	0.996	R	Donati	
214	1858 October 12.8	4.2	159.8	21.3	1.427	330	6000	0.996	R	Tuttle	
(96)	1858 October 18.4	158.0	334.5	13.1	0.341	2.218	3.304	0.846	D		
215	1859 Mai 29.2	75.3	357.3	84.5	0.201				R	Tempel	
216	1860 Februar 16.7	173.8	324.1	79.6	1.197				D	Flais	
217	1860 März 5.6	50.1	8.9	48.2	1.307				D	Rümker	
218	1860 Juni 16.1	161.5	84.7	79.3	0.293				D		
219	1860 September 28.8	112.0	104.2	28.2	0.954				R	Tempel	
220	1861 Juni 3.4	243.4	29.9	79.8	0.921	55.68	415	0.983	D	Edolcher	
221	1861 Juni 11.5	249.1	279.0	85.4	0.822	56.1	420	0.985	D	Lebbutt	
222	1861 December 7.3	173.5	145.1	42.0	0.839				R	Tuttle	
(96)	1862 Februar 6.2	158.0	334.5	13.1	0.340	2.217	3.302	0.847	D		
224	1862 Juni 22.0	299.3	326.5	7.9	0.981				D	Schmidt und Tempel	
225	1862 August 29.9	124.7	137.4	66.4	0.963	24.85	124	0.961	R	Tuttle	
226	1862 December 28.2	125.2	355.7	42.4	0.803				R	Winnende	
227	1863 Februar 5.5	191.4	116.9	85.4	0.795				D	Brühns	
228	1863 April 4.9	247.3	251.3	67.4	1.068				R	Rinterfues	
229	1863 April 20.9	305.8	250.2	85.5	0.629				D	Winnende	
230	1863 November 9.5	94.7	97.5	78.1	0.707				D	Tempel	
231	1863 December 27.8	60.4	304.7	64.5	0.772				D	Winnende	
232	1863 December 29.2	183.1	105.0	83.3	1.313				R	Bäler	
233	1864 Juli 27.7	185.5	174.9	45.0	0.664				R	Donati	
234	1864 August 15.6	304.2	95.2	1.9	0.909				R	Tempel	
235	1864 October 11.3	159.5	31.7	70.3	0.934				R	Donati und Toussaint	
236	1864 December 22.5	231.7	203.2	43.9	0.771				D	Bäler	

Nummer.	Jahr, Tag.	Länge des Perihels.	Länge des aufsteigenden Knotens.	Neigung.	Perihel.-distanz.	Halbe große Achse.	Umlaufzeit in Jahren.	Größe der ellipt. Orbit.	Bezeichnung.	Name des Entdeckers.
236	1864 December 27.7	162°.4	340°.9	17°.1	1.115				R	Brühns
237	1865 Januar 14.3	141.3	253.1	87.5	0.026				R	
238	1866 Januar 11.2	60.5	231.4	17.3	0.977	10.32	33.18	0.905	R	Tempel
239	1867 Januar 19.9	75.9	78.6	18.2	1.574	10.42	33.62	0.849	D	Goggia
240	1867 Mai 22.5	226.0	101.2	6.4	1.174	3.173	5.652	0.862	D	Tempel
241	1867 November 7.0	276.4	65.0	83.4	0.330				R	Bäcker
(171)	1868 April 17.4	116.0	101.2	29.4	0.625	3.110	5.484	0.808	D	
242	1868 Juni 26.0	287.1	53.7	48.2	0.582				R	Winnecke
(96)	1868 September 15.0	158.2	334.6	13.1	0.334	2.212	3.289	0.849	D	
(131)	1869 Juni 30.0	275.9	113.6	10.8	0.788	3.151	5.599	0.750	D	
243	1869 October 10.0	123.2	311.5	68.3	1.231				R	Tempel
244	1869 November 20.9	41.3	292.7	6.9	1.103				R	Winnecke
245	1870 Juli 13.9	303.4	141.5	58.1	1.007				R	Goggia
246	1870 September 2.2	18.0	12.9	80.7	1.817				R	
(189)	1870 September 23.6	318.7	146.4	15.7	1.280				R	Winnecke
247	1870 December 19.9	4.1	94.7	32.7	0.359	3.507	6.57	0.635	R	

Auf Taf. 7 sind einige Kometen dargestellt, Fig. 11 zeigt den schönen Donat'schen Kometen von 1858, wie er dem bloßen Auge am 5. October erschien, der Stern neben dem Kern ist Merkur oder α Bootis, der getrümmte Hauptschwefel wird um so breiter, je entfernter man vom Kern geht, aber auch um so schwächer; die beiden schwachen oben erwähnten Nebenschwefel waren nur bei aufmerksamer Betrachtung zu erkennen.

Fig. 12 zeigt denselben Kometen im Fernrohr am 2. October; von dem kleinen glänzenden Kern ist die Ausstrahlung und um diese mehrere Lichtsectoren zu erkennen, durch den Schwefel geht in der Mitte eine dunkle schwarze Linie, die den Schwefel spaltet. Selbiger ist in der Nähe des Kerns noch an beiden Rändern nahe gleich hell und die Ungleichheit in der Helligkeit tritt erst entfernter vom Kern auf.

Fig. 13 stellt den Halley'schen Kometen, wie er am 28. October 1835 mit bloßem Auge gesehen wurde, dar; der Kern ist umgeben von einer Nebelhülle, der Schwefel nahe überall gleich breit und schnell schwächer werdend, je mehr man sich vom Kern entfernt.

Fig. 14 zeigt den brillanten Kometen vom Jahre 1811, wie er am 10. September gezeichnet wurde, der Kern ist sehr hell und ziemlich groß, der Schwefel hat glänzende Ränder und in der Mitte eine dunkle Linie, und breitet sich je entfernter vom Kern immer mehr und nach beiden Seiten gleichförmig aus, während er bei dem Kometen von 1858 an einer Seite convex, an der andern concav war.

e) Die Sternschnuppen, Meteorströme, Feuerkugeln.

Die Erscheinungen dieser Körper sind bekannt, und wer den Himmel nur einigermaßen aufmerksam beobachtet hat, wird oft auch das plötzliche an einer Stelle des Himmels erscheinende Aufblitzen eines Lichtsimmerns, welcher mit großer Geschwindigkeit vertical oder in schräger Richtung vom Himmel zur Erde herabfällt, selten in umgekehrter Richtung, und nach wenigen Secunden in geringerer oder größerer Höhe verschwindet, wahrgenommen haben. In der Regel sieht man diese Erscheinungen abends oder nachts, und nur in einigen Fällen hat man bei bedecktem Himmel oder bei ganz heiterer Luft am Tage Meteore gesehen.

Sternschnuppen, Feuerkugeln, Aerolithen sind dem Anscheine nach ähnliche Körper, die sich nur durch ihre Größe, vielleicht auch etwas durch ihre chemische Zusammensetzung unterscheiden. Am zahlreichsten sind die Sternschnuppen, und die mittlere Höhe derselben wird zu etwa 15 Meilen angenommen, ihre Geschwindigkeit beträgt im Durchschnitt 6 Meilen in der Secunde, und schwankt zwischen 3 und 24 Meilen.

Aus der Häufigkeit, mit der man sie sieht, hat man geschlossen, daß innerhalb 24 Stunden sich auf unserer ganzen Erde für gewöhnlich nicht weniger als 7 $\frac{1}{2}$ Millionen zeigen, und ausnahmsweise ist die Zahl so groß gewesen, daß die Meteore wie Schneeflocken den ganzen Himmel durchzogen haben. Berühmt ist der Sternschnuppenfall, welchen am 12. November 1799 in Amerika Humboldt und Bonpland sahen und von dem ersterer constatirt hat, daß er gleichzeitig auf einem Flächenraum von 921000 Quadratmeilen wahrgenommen ist. Am 12. November 1833 fielen die Sternschnuppen wieder so dicht, daß nach einer Schätzung Arago's während drei Stunden an einem Beobachtungsorte wenigstens $\frac{1}{4}$ Million gesehen wurde. In der Nacht vom 13. auf den 14. November 1866 und 1867 wiederholten sich solche Sternschnuppenfälle, und die geahnte Periode von 33 $\frac{1}{3}$ Jahren der Wiederkehr des Sternschnuppensturms wurde dadurch vollständig sicher.

Aus der Wiederkehr der Erscheinung in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren hat man geschlossen, daß der Schwarm viele Millionen Meilen lang und eine Bahn haben muß, deren Perihel in die Nähe unserer Erde fällt und deren Aphel an die Uranusbahn hingedrückt; die Bahn dieses Schwarms ist also eine langgestreckte Ellipse. Da der Punkt am Himmel, aus welchem die einzelnen Sternschnuppen herzukommen schienen, im Sternbilde des Löwen liegt, hat man diesen Schwarm die Leoniden genannt. Ein anderer Schwarm, den wir im August, am 10., sehen und der aus dem Sternbilde des Perseus kommt, heißt die Perseiden, und nach der Rechnung muß dieser Schwarm 2300 Mill. Meilen Länge und 1 Mill. Meilen Breite haben. Andere Schwärme treten im April und andern Monaten sichtbar und häufig wahrscheinlich sind eine große Menge solcher Schwärme in unserm Sonnensystem vorhanden.

Da die Bahnen, welche man berechnet, mit den Bahnen einzelner Kometen, z. B. die des Novembersturms mit dem Kometen I 1866, die des Auguststurms mit dem Kometen III 1862, nahe übereinstimmen, hat man auch die Ansicht aufgestellt, daß die Sternschnuppenströme nichts anderes als der noch vorhandene Rest von Kometen sind, aus denen sich die Sternschnuppenströme gebildet haben.

Die Spectra der Meteorströme — man unterscheidet Kern und Schwefel — sind meistens continuirliche, in denen man mit Ausnahme des Violetts alle Farben des Sonnenspectrums sieht, in einzelnen Fällen herrscht jedoch in dem Spectrum das Gelb vor, und unter andern ist bei den Augustmeteooren die gelbe Linie im intensiven Glanze, während bei den Novembermeteooren der vio-

erschende Charakter des Spectrums im Blau, Grün und Stahlgrau liegt und homogen zu sein scheint. Auch eine gelbe Linie, welche die Schweife der Augustmeteore zogen, fehlt in denen der Novembermeteore, und daher ist wohl in der chemischen Zusammensetzung der Leodiden und Perseiden ein Unterschied, während die Kerne in beiden den glühenden festen Körper gemeinsam zu haben scheinen. Aus dem Wenigen aber, was wir wissen, geht hervor, daß die Sternschnuppenschwärme kosmischen Ursprungs sind und entweder aus dem inneren Weltraum als sporadische Erscheinungen in hyperbolischen oder parabolischen Bahnen zu uns kommen oder sich in geschlossenen Bahnen bewegen, wie, durch die Anziehungskraft der Sonne und der röthern Planeten entstanden und ähnlich den Bahnen der periodischen Kometen, langgestreckte Ellipsen sind, deren einem Brennpunkte die Sonne steht.

III. Die physische Astronomie.

Unter die allgemeinen Eigenschaften, welche wir allen Körpern zuschreiben, z. B. Größe, Gestalt, Undurchdringlichkeit, gehört auch die Veränderung ihres Ortes im Raume, welche wir die Bewegung nennen und verordnen, welche die Körper sich näher kommen oder sich voneinander entfernen. Die Ursache der Bewegung ist die Wirkung, welche die Körper gegenseitig auf einander ausüben, nennen wir Kraft, ohne bis jetzt zu wissen, was die Kraft eigentlich ist.

Die zwischen den kleinsten Atomen eines und desselben Körpers wirkende Kraft, deren Wirkungskreis sehr beschränkt ist und die den Zusammenhang, die Festigkeit und die Dichte dieser Körper erzeugt, nennen wir Molecularkraft oder Molecularanziehung, dagegen diejenige Kraft, welche hervorbringt, daß ein Körper nur den andern in großer Entfernung wirkt und die Bewegung der Körper um- und gegeneinander hervorbringt, heißt die allgemeine Attraction, die allgem. gemeine Schwere oder die Gravitation.

Eine Folge der Gravitation unserer Erde ist unter andern auch der freie Fall der Körper, und dieser freie Fall soll Newton auf den Gedanken gebracht haben, u. untersuchen, ob nicht dieselbe Kraft, welche die Körper zur Erde zieht, auch den Mond anzieht und die Bewegung des Mondes um die Erde mit hervorbringt. Der Mond müßte nämlich, wenn er nicht von der Erde angezogen würde, in der letzten Richtung einer Bewegung fortgehen und sich infolge dessen immer weiter von der Erde entfernen, vermöge der Anziehungskraft aber nähert er sich wie jeder freifallende Körper der Erde, und aus den beiden gleichzeitigen Bewegungen der Tangential- und Radialbewegung entsteht die zusammengesetzte, vermöge welcher er eine geschlossene Bahn um die Erde beschreibt.

Durch Vergleichung der Fallgeschwindigkeit der Körper auf der Erde und der des Mondes zur Erde fand Newton die erstere etwa 3600mal größer als die letztere und da der Mond 60mal so weit entfernt ist als der Erdbahnmesser beträgt und 3600 das Quadrat von 60 ist, schloß er daraus, daß die Anziehungskraft mit dem Quadrat der Entfernung abnimmt.

Schon 1666 war Newton diesem wichtigen Resultat sehr nahe gewesen, er hatte aber für den Durchmesser der Erde einen falschen Werth zu Grunde gelegt und die Abweichung der berechneten Fallgeschwindigkeit des Mondes von der beobachteten betrug den siebenten Theil des Werthes, welche Abweichung ihn veranlaßte, die Untersuchung aufzugeben. Erst als er im Jahre 1682 die aus der Gradmessung von Picard gefundenen Dimensionen der Erde richtig erhielt, rechnete er von

neuem, fand die vollständige Uebereinstimmung zwischen Rechnung und Beobachtung und gelangte zu der Entdeckung dieses wichtigen Gesetzes. Weitere Nachforschungen führten Newton auf die Erweiterung des Gesetzes dahin, daß sich die Himmelskörper auch gegenseitig im Verhältniß ihrer Massen anziehen, und der Satz:

Die Anziehung eines jeden Körpers ist gleich seiner Masse, dividirt durch das Quadrat seiner Entfernung, ist der Fundamentalsatz der physischen Astronomie.

Seine Entdeckungen legte Newton in einem Buche: „Principia philosophia naturalis mathematica“, 1686 nieder und aus dem Attractionsgeetze lassen sich, zuerst wenn man zwei Körper annimmt, die Bahnen beider Körper umeinander bestimmen und es ergibt sich, daß diese Bahnen stets Kegelschnitte sind.

Wenn nun auch die Bewegung zweier Körper zu einander eine sehr einfache ist, so wird die Bewegung um so complicirter, wenn ein dritter Körper hinzukommt, die alle drei mit ihren Massen aufeinander wirken, und die Bestimmung der Bewegung der drei Körper heißt das Problem der drei Körper, welches zu den schwierigsten der Astronomie gehört und selbst mit Hilfe unserer höhern Mathematik noch nicht vollständig gelöst ist.

Die Vertheilung der Himmelskörper in unserm Sonnensystem ist jedoch so, daß bei der Ausführung der Rechnungen über die Bewegung der Himmelskörper wesentliche Erleichterungen eintreten. Die Masse des Centralkörpers, der Sonne, übertrifft die des größten Planeten Jupiter, wie wir gesehen haben, um das 1048fache, und die aller Planeten zusammen um das 700fache. Ferner sind die Planeten voneinander sehr weit entfernt und wirken daher wenig aufeinander ein und infolge dessen sind die Abweichungen, welche die Planeten durch ihre gegenseitigen Anziehungen von der regelmäßigen Bahn des Kegelschnitts erfahren, nur klein und werden mit dem Namen der Störungen oder Perturbationen bezeichnet.

Da also im allgemeinen durch viele günstige Umstände die Störungen sehr gering sind, kann man sich bei Berechnung derselben erlauben, sie für die einzelnen Planeten zu trennen und nacheinander gesondert zu berechnen, sobald dadurch zu gleicher Zeit immer nur drei Körper: die Sonne, der gestörte und der störende Planet in Betracht kommen, und deshalb ist gerade der oben schon erwähnte Name, das Problem der drei Körper, für die Berechnungen der Störungen entstanden.

Unter die verschiedenen Umstände, durch welche die Berechnung der Störungen erleichtert werden, gehört auch, daß die Planetenbahnen alle ziemlich kleine Neigungen gegen die Elliptik haben und daher die Störungen die Lage der Bahn sehr wenig verändern. Würden sämtliche Planetenbahnen in einer Ebene liegen, so fände eine Veränderung der Bahnen gar nicht statt. Bei den kleinen Planeten, deren Bahnen gegen die Elliptik bis zu 35° geneigt sind, kommen besonders durch den Jupiter stärkere Störungen, hauptsächlich im Knoten vor. Ein anderer günstiger Umstand ist auch bei den größern Planeten die ziemlich kleine Excentricität, und wenn sämtliche Bahnen Kreise wären, würden die halben großen Achsen immer ganz unveränderlich bleiben. Auch hier machen die kleinen Planeten wieder eine Ausnahme, da bei etlichen derselben die Excentricität bis $\frac{1}{2}$ geht, während die der Mercurbahn nur $\frac{1}{10}$, die des Jupiter noch nicht $\frac{1}{20}$ ist.

Die Störungen der kleinen Planeten, welche durch die größere Nähe derselben an den Jupiter oft sehr beträchtlich sind, machen daher ganz besondere Schwierig-

seit, und erst in neuester Zeit ist es besonders den Bemühungen Hansen's gelungen, für selbige die absoluten Störungen berechnen zu können. Man nennt die Störungen absolut berechnet, wenn man sie für jede beliebige Zeit aus der Rechnung entnehmen kann. Oft aber genügt es, nur für einen kürzern Zeitraum die Störungen zu kennen, man rechnet alsdann successive in kurzen Intervallen den Betrag der Störungen, nennt selbige die speciellen Störungen und bringt ihren Betrag entweder an die für die Anfangsperiode geltenden, dafür osculirenden Elemente an, oder verbessert den elliptischen Ort um den Betrag der speciellen Störungen.

Die absoluten Störungen werden eingetheilt in zwei Klassen in periodische und säculäre. Da die Anziehung, welche zwei Planeten aufeinander ausüben, von dem Orte abhängig ist, an welchem sie sich befinden, und beide Himmelskörper nach einer bestimmten Anzahl von Jahren dieselben Stellungen zueinander wieder einnehmen, so kehren die Störungen nach einer Reihe von Jahren, also in bestimmten Perioden wieder, und diese Störungen heißen periodische.

Nach alle Planeten wirken aufeinander ein und stören sich gegenseitig, und da nach einer langen Reihe von Jahren die Planeten zueinander wieder dieselben Stellungen einnehmen und sich die Störungen, welche sich besonders auf die Bahnebenen beziehen, wiederholen, wobei jedoch die Perioden im Gegenßatz zu den obigen meist Jahrtausende umfassen, so hat man diese Art der Störungen mit dem Namen der säculären bezeichnet. Beide Klassen von Störungen können für sich betrachtet und durch Rechnungen ermittelt werden, und um eine allgemeine Uebersicht zu gewinnen, wollen wir einige der hauptsächlichsten Störungen betrachten.

Die Störungen des Mondes sind, weil der Mond verhältnißmäßig zur Erde ziemlich groß und seine Entfernung gering ist und auf den Mond die so massen-große Sonne als hauptsächlichster störender Körper einwirkt, von der Erde aus gesehen beträchtlicher als die Störungen aller andern Himmelskörper.

Durch die Anziehungskraft der Sonne auf den sich in einer Ellipse um die Erde bewegenden Mond ist die Länge desselben zur Zeit des Neumondes und Vollmondes, also in den Syzygien immer größer, als sie nach der rein elliptischen Bewegung sein sollte, während sie zur Zeit der Quadraturen um dieselbe Größe (nahe $1\frac{1}{2}''$) so klein ist. Diese Störung, zuerst von Hipparch entdeckt, heißt die Evection und ist eine periodische Störung, da sie sich bei jedem Umlauf wiederholt.

Ebenso ist die Länge des Mondes in den vier Punkten, die zwischen den Syzygien und Quadraturen in der Mitte liegen, in den Octanten, um etwa $\frac{1}{10}''$ größer als sie nach der Länge zur Zeit der Syzygien und Quadraturen sein sollte; diese Störung, im 10. Jahrhundert von dem arabischen Astronomen Abulwefa entdeckt, heißt die Variation.

Eine dritte periodische Störung des Mondes ist von der Dauer eines Jahres und hängt von der größeren oder kleineren Entfernung der Erde von der Sonne ab, sie steigt bis zu $\frac{1}{10}''$, wurde von Tycho Brahe entdeckt, und heißt die jährliche Gleichung.

Aus der Theorie entwickelte Laplace zuerst Störungen von längern Perioden. Eine davon beträgt nur $14''$ und hat die Dauer von 184 Jahren. Noch eine andere Störung hängt ab von der Abplattung unserer Erde, wieder eine andere von der Größe der Sonnenparallaxe, und aus den Mondstörungen hat man zuerst gefunden, daß der Werth der Sonnenparallaxe, welcher aus den beiden Venusdurchgängen im vorigen Jahrhundert zu $8''.57$ abgeleitet war, ein größerer sein mußte.

Unter den Planetenstörungen ist eine merkwürdige zwischen Jupiter und Saturn, die schon Halley wahrgenommen hatte und die darin besteht, daß die Umlaufzeit des Saturn zur Zeit des Hipparch größer und die des Jupiter kleiner war als jetzt. Euler und Lagrange bemühten sich vergebens, durch die Analogie diese Störung zu erklären. Laplace fand endlich die Ursache darin, daß, weil nahe fünf Umläufe des Jupiter gleich zwei Umläufen des Saturn sind, unter den Störungen des Saturn durch Jupiter ein Glied entsteht, welches bis auf $2950''$ steigt und unter den Störungen des Jupiter durch Saturn ein anderes, dessen größter Werth $1200''$ ist. Da nun die Periode dieser Störungen für beide Planeten nahe 930 Jahre beträgt, nimmt innerhalb dieses Zeitraums die mittlere Bewegung des einen Planeten zu, die des andern ab und umgekehrt.

Unter den säculären sich auf die Lage der Bahn beziehenden Störungen des Mondes ist die Bewegung der Mondknoten, die jährlich über $19''$ beträgt, die bedeutendste. Eine andere Störung ändert die Apisidenlinie der Mondbahn jährlich um über $40''$. Aus der ersten entsteht der draconische Monat von 27.212 Tagen, aus der zweiten der anomalistische Monat von 27.555 Tagen.

Auch die mittlere Bewegung des Mondes ist einer langsamen Aenderung unterworfen. Die Umlaufzeit des Mondes ist seit 2000 Jahren immer kürzer geworden. Die Ursache liegt in der veränderlichen Excentricität der Erdbahn, und aus demselben Grunde nimmt auch die Bewegung der Apisiden- und der Knotenlinie der Mondbahn immer ab. Erstere ändert sich in 100 Jahren um $50''$, letztere in 100 Jahren um $7''$. Die Analogie hat aber gezeigt, daß die Excentricität der Erdbahn bis zu einem gewissen Grade abnehmen und dann wieder wachsen wird, und damit werden auch die säculären Störungen des Mondes ihre Zeichen wechseln.

Einen der größten Triumphs feierte die physische Astronomie vor drei Decennien. Nachdem die Rechnung die Unmöglichkeit ergeben, die Bewegung des Planeten Uranus aus der elliptischen Bewegung und den Störungen durch die damals bekannten Planeten befriedigend darzustellen, wurde von mehreren Seiten der Gedanke ausgesprochen, daß möglicherweise noch ein unbekannter entfernterer Planet vorhanden sei, der die sichtbar gewordenen Störungen erkläre. Als Leverrier und Adams sich zu Anfang der vierziger Jahre an die Rechnung machten und einen solchen Planeten voraussetzten, war die Entdeckung des Neptun der glänzendste Erfolg und die schönste Frucht, welche die mühevollen Arbeit der Wissenschaft eintragen konnte.

Alle unsere größten Planeten zeigen eine abgeplattete Gestalt, und durch Rechnung läßt sich streng beweisen, daß eine gasförmige oder flüssige Masse von gleicher oder in bestimmten Gesetzen sich ändernder Dichte die Gestalt eines Sphäroids erhalten müsse, d. h. eines Körpers, der durch die Umdrehung einer Ellipse um die kleine Achse entstanden ist. Aus der Größe der Abplattung läßt sich sogar ableiten, ob der Körper überall gleich dicht oder von ungleicher Dichte ist. Seht man aber die Abplattung und eine Rotation voraus, und untersucht den Einfluß der Anziehung eines andern Körpers auf den sphäroidischen, so kommt man zu dem Resultate, daß die Durchschnittspunkte zwischen der Bahnebene und der Rotationssebene sich ändern müssen, und das Zurückweichen der Aequinoctien, die Präcession, ist also eine notwendige Folge der Anziehungskraft des Mondes auf unsere sphäroidische Erde. Der Theil der Präcession, welcher von dem Monde allein herrührt, heißt die Luniolarpräcession, ein anderer weit kleinerer

theil muß aber auch durch die Anziehung der Planeten entstehen und die Planetenpräcession, welche jährlich noch nicht ganz $0''.4$ beträgt, kommt zu den $50''.2$ der Lunisolarpräcession hinzu. Die Erklärung der schon von Hipparch entdeckten Präcession und ihre scharfe Berechnung ist aber erst möglich geworden, seitdem die Anziehungskräfte dem Calcul unterworfen werden konnten.

Auch die Schwankung der Erdoberfläche, die Nutation, ist eine Folge der Attraction des Mondes auf die Erde und hängt mit der oben erwähnten Veränderung des Mondnolens zusammen und auf Tafel 11 in Figur 3 ist die Bewegung, welche der Pol des Aequators p um den Pol der Ellipse P durch die Präcession und Nutation macht, dargestellt, jedoch ist die Nutation, um sie sichtbar zu machen, in der wellenförmigen Linie pp' sehr vergrößert.

Daß Ebbe und Flut die Folge der Attraction des Mondes auf die flüssigen Theile der Erde sind, ist schon früher gesagt. Eine Ebbe und Flut muß auch in unserer Atmosphäre stattfinden, und durch die täglichen Veränderungen des Barometers und die Winde, deren Richtung und Stärke von den Tageszeiten abhängt, erkennen wir sie. Sie richtet sich aber mehr nach dem Lauf der Sonne als nach dem des Mondes, und die Theorie zeigt, daß die Anziehung beider Gestirne auf unserer Erde nur ganz kleine Veränderungen im Barometerstande von kaum $\frac{1}{50}$ Millimeter hervorbringen kann, während der übrige beobachtete Theil der Schwankung im Barometer der täglichen Temperaturänderung angehört.

Die Anziehungskraft ist nicht nur die Ursache der Bewegung der Himmelskörper in den bestimmten Bahnen und der Störungen, sondern auch die Ursache einer besondern Erscheinung am Monde, die wir nicht unwahrscheinlich lassen dürfen.

Bei dem Monde ist, da er uns immer dieselbe Seite zulehrt, die Rotation mit der Revolution gleich, und ebenso ist dieses bei allen Jupiterstrabanten und wahrscheinlich bei allen Trabanten in unserm Sonnensystem der Fall. Da die Rotation des Mondes ganz ebenso wie bei der Erde eine vollständig regelmässige ist, dagegen die Bewegung in der Ellipse je nach der Entfernung von der Erde bald schneller bald langsamer vor sich geht, also eine unregelmässige ist, sehen wir von der Mondoberfläche bald etwas mehr von der Ostseite, bald etwas mehr von der Westseite als bei einer regelmässigen Bewegung der Fall sein würde; man nennt diese Erscheinung die Libration, und da außerdem die Rotationsachse des Mondes auf der Ebene seiner Bahn nicht senkrecht steht, sondern um 83° geneigt ist, so sehen wir bald über den Nordpol, bald über den Südpol des Mondes hinaus und nennen die erste Erscheinung die Libration in Länge, die zweite die Libration in Breite.

Trotz aller Störungen bleiben einzelne Größen in unserm System ganz unveränderlich, sie sind nur periodischen Störungen unterworfen, die sich also in kurzer Zeit wieder ausheben. Die unveränderlichen Größen sind die Richtung der Erdoberfläche; die Abplattung der Erde trägt das übrige bei, damit sie erhalten bleibt. Ferner ist die Unveränderlichkeit der Tageslänge aus den Umlaufzeiten unserer Erde erwiesen. Durch die Beobachtungen der Umlaufzeit hat sich ergeben, daß solange wir Beobachtungen besitzen, keine Veränderung bis zu $\frac{1}{100}$ Secunde in der Länge des Tags stattgefunden hat.

Die großen Achsen der Planeten sind wol kleinen periodischen Störungen unterworfen, dagegen ist in den Störungen kein Glied, wodurch die Achsen der Zeit

proportional ab- oder zunehmen, und nicht nur für die größten Störungsglieder (Glieder erster Ordnung), sondern auch für kleinere Störungen zweiter Ordnung ist dies mathematisch streng nachgewiesen.

Ueber die Entstehung des Weltsystems sind nur Hypothesen da und die Kant'sche, unabhängig ebenfalls von Laplace angegebene, ist diejenige, welche am meisten Anhang gefunden hat. Danach wäre im Raume zu Anfang eine leichte dünne Masse (Nebelmasse) verbreitet gewesen, die durch irgendeine Ursache in Rotation gekommen ist. Durch die Rotation haben sich zuerst Ringe gebildet, und ein solches Ringssystem haben wir noch bei Saturn. Die Mehrzahl der Ringe ist aber zerrissen und aus denen haben sich runde Körper, die Planeten, durch Verdichtungsprozesse entwickelt; die Monde kann man sich auf gleiche Art entstanden denken. Die Nebelmasse sehen wir höchst wahrscheinlich noch in den Kometen, die möglicherweise sich noch verdichten oder auch auflösen können. Die Zerreißung eines Ringes in viele Stücke würde alsdann bei Bildung der Gruppe der kleinen Planeten vorgelegen haben.

IV. Die praktische Astronomie.

(Tafel 8, 9, 10.)

a) Instrumente in alten Zeiten.

Die astronomischen Instrumente sind den drei Fundamentalebene, welche wir in der Astronomie kennen, entsprechend hergestellt. Der Horizont wird durch einen Kreis repräsentirt, welcher sich um eine verticale, nach dem Zenith zeigende Achse drehen läßt und zu welchem ein senkrecht stehender ganzer Kreis oder ein Stück desselben die Höhen messen läßt.

In Bezug auf den Aequator hat man Instrumente mit dem Aequator parallel liegenden Kreisen, die die Stundenwinkel angeben; senkrecht auf diesem Kreis steht eine Achse parallel der Weltachse, zu welcher wieder senkrecht eine andere Achse einen Kreis trägt, der die Declinationen resp. Poldistanzen der Gestirne anzeigt.

Endlich gibt es in Bezug auf die Elliptik Instrumente mit Kreisen, die der Ellipse parallel gestellt werden können und die Längen der Gestirne anzeigen, während senkrecht darauf gerichtete Kreise die Breiten angeben.

Die beiden ersten Arten von Instrumenten sind jetzt ausschließlich im Gebrauch, während die letztere Art jetzt wenig mehr angewandt wird. Die Horizontal- und Höheninstrumente waren aber auch schon im Alterthum bekannt, wenn auch bei weitem nicht in der Vollkommenheit, wie wir sie jetzt haben. Das einfachste Höheninstrument, mit welchem die Höhe der Sonne gemessen werden kann, ist der verticale Stab, dessen Schatten auf einer horizontalen Fläche nur gemessen werden braucht, um in Verbindung mit der Länge des Stabes die jedesmalige Höhe der Sonne leicht berechnen zu können. Dieses Instrument ist der Gnomon und wol das älteste astronomische Instrument, welches existirt.

Einige Gnomone haben besondere Berühmtheit erlangt; so ließ Augustus den Obelisken des Sesostris von 34 Meter Länge in Rom auf dem Marsfelde aufstellen, um, wie Plinius sagt, die Länge der Tage und Nächte zu erkennen, 1278 ließ Coschuting in Peking einen Gnomon von 13 Meter Höhe errichten, 1467 konstruirte Paul Toscanelli in der Kuppel der Kathedrale zu Florenz einen Gnomon 90 Meter über dem Erdboden, 1653 Cassini zu Bologna einen 27 Meter über dem Boden u. s. w.

Wird der Stab parallel der Weltachse aufgestellt und eine horizontale, verticale oder überhaupt irgend-

eine Ebene angebracht, auf welche der Schatten des Stabes fallen kann, so hat man die Sonnenuhr, welche auch im Alterthum viel angewandt wurde.

Die Astronomen der Alexandrinischen Schule hatten ein Instrument aus drei Linealen zusammengeleitet, wovon das eine vertical gestellt wurde, die andern dagegen verschiebbar waren; sie nannten das Instrument *Triquetrum*, und ein solches ist von Ptolemäus im „*Almagest*“ beschrieben.

Derselben Zeit gehören auch schon die Kreise an, welche sowohl vertical als horizontal, parallel dem Aequator und der Ekliptik zusammengefügt wurden und Ringförmig oder Armillarsphäre hießen. Sie sind bereits von Hipparch und Ptolemäus angewandt worden und dienten im Alterthum zur Bestimmung der Längen und Breiten.

Unsere Taf. 10, Fig. 6 stellt eine solche Armillarsphäre dar, wie sie vervollkommenet gleich nach dem Mittelalter noch gebraucht wurde.

Ein späteres Instrument ist ein getheilter Kreis (Taf. 10, Fig. 4), versehen mit festen Dioptern *bb* und mit drehbaren *cc*, das *Astrolabium* genannt, das, um Höhenwinkel zu messen, an dem Ringe *d* aufgehängt wurde, während es zur Messung von Horizontalwinkeln der Ebene des Horizonts parallel gestellt wurde.

Höhenkreise und Theile eines ganzen Kreises, Quadranten, gehören theils auch schon der frühern, aber mehr der neuern Zeit an, und ebenso ist die Combination von Horizontal- und Höhenkreisen vereinigt in einem Instrument, welches gegenwärtig Universalinstrument heißt und in neuester Zeit zu großer Vollkommenheit gebracht worden ist. An einem Quadranten hat z. B. schon *Alug Beigh* in Samarkand seine Sternpositionen beobachtet. Nach der Erzählung der türkischen Geschichtschreiber hatte dieser Quadrant einen Radius von etwa 60 Meter. Zu den besondern Erscheinungen, welche die Alten beobachteten, z. B. den Finsternissen, bestimmten sie fast gleichzeitig mit einem der obengenannten Instrumente die dazu gehörige Zeit, während sie die Längen und Breiten der Sterne theils auch aus dem Sichtbarwerden und Verschwinden der Sterne berechneten. Die spätern Beobachtungen, welche *Regiomontanus*, *Waltner* in Nürnberg, der Landgraf von Hessen, *Tycho Brahe* machten, bestanden hauptsächlich darin, daß sie von denjenigen Himmelskörpern, deren Positionen sie bestimmen wollten, Distanzen von bekannten Fixsternen maßen und daraus wieder die Positionen berechneten.

b) Erfindungen zur Verbesserung der Instrumente, Uhren.

Ganz anders gestaltete sich die Aufgabe der praktischen Astronomie, als zur Verschärfung der Theilungen auf den Instrumenten der Portugiese *Nonius* (Nonius) 1542 mehrere, aber verschiedene Theilungen anzubringen vorschlug und der Belgier *Peter Werner* (Bernier) 1631 einen kleinen Hülfsbogen, den *Bernier* oder *Nonius*, erfand, dessen Theilung etwas größere oder kleinere Zwischenräume hatte als die Theilung auf dem Instrumente, wodurch es möglich wurde, Unterabtheilungen mit Sicherheit zu bestimmen. Erst später, seit dem vorigen Jahrhundert, werden die Theilungen mit Mikroskop abgelesen, an welchen Mikrometerschrauben die Unterabtheilungen angeben. Nach der Erfindung des Fernrohrs im Jahre 1608 durch holländische Optiker, wahrscheinlich zuerst durch den Willenmacher *Lippershey*, brachte für Anwendung derselben auf Meßinstrumente der Engländer *Gascoigne* im Jahre 1640 das *Fadenney* im Fokus des Fernrohrs an, nachdem

Morin, ein französischer Astronom, sich 1638 das Bedient erworben hatte, das Fernrohr mit dem Meßinstrument verbunden zu haben. Der englische Astronom *Hamsted* war der erste, welcher einen mit einem Fernrohr versehenen Mauerquadranten in Verbindung mit einer Uhr zur Bestimmung von Sternörter anwandte und dadurch eine Genauigkeit der Beobachtungen bis auf 10 Sekunden erreichte, während seine Vorgänger selbst *Tycho Brahe*, die Winkel nur bis auf Minuten genau bestimmen konnten und früher Fehler bis zu 10 Minuten, bei Ptolemäus und Hipparch bis zu Bruchtheilen von Graden und mehr nicht selten vorkommen, obwohl sie glaubten, bis auf 4 Minuten genau messen zu können.

Dem Quadranten versuchte man darauf die größte Genauigkeit zu geben. Man baute ihn von ziemlicher Größe, versah ihn mit einem Fernrohr, dessen Drehpunkt im Centrum der Theilung lag, brachte am andern Ende des Fernrohrs *Berniere* oder *Nonien* an und stellte das Instrument, um ihm die größte Genauigkeit zu geben, an einer von Nord nach Süd gehenden Mauer im Meridian auf. Mit solchen Mauerquadranten konnte man nun mit großer Genauigkeit die Höhen der Sterne im Meridian bestimmen, und konnte man dazu die Höhe des Aequators, so ergaben sich unmittelbar die Declinationen der Sterne.

Auf Taf. 10, Fig. 15 ist ein Mauerquadrant in der Form, wie *Tycho* ihn besaß, abgebildet; der Radius *DC* maß 3 Meter, *DD* ist ein Diopter, an dem ein Gegengewicht in *F* angebracht war und zur Rectification diente das Loth *DA*.

Einen andern beweglichen Quadranten nach *Dollond* und *Troughton* mit Fernrohr stellt auf derselben Tafel Fig. 13 dar. Er besteht aus dem Viertelkreise *EF* und zwei mit ihm verbundenen, aufeinander senkrecht stehenden Halbmessern *IF* und *IE* von Metall. Durch den Schwerpunkt geht eine am Quadranten befestigte Cylinderröhre herab und bildet eine senkrechte Achse, die auf einem soliden Fuße *AA*, der mit den Stellschrauben *BBB*, wozu der Bequemlichkeit wegen Schälchen führen, horizontal gestellt werden kann, ruht. Auf dem Fuße ist in *D* ein Horizontalkreis angebracht, um die Drehung des Quadranten im Azimuth bestimmen zu können. Am Quadranten ist in *G* ein Mikrometerwerk, in *H* eine Lupe und das Fernrohr *KI* ist durch das Gegengewicht *L* balancirt.

Wandte man dazu noch eine genau gehende Uhr an, die entweder die Sonnenzeit oder auch die Sternzeit anzeigte, so findet sich, wenn man den Durchgang des zu bestimmenden Gestirns nach der Uhr beobachtet, auch die Rectascension, und die ganze Aufgabe der praktischen Astronomie oder der Ortsbestimmungen am Himmel ist zurüdgeführt auf genaue Höhenbestimmungen und auf Zeitbestimmungen.

Um die Mitte des 17. Jahrhunderts erfand der dänische Astronom *Dlaus Römer* ein einfaches Instrument zu Zeitbestimmungen. Eine horizontale Achse wurde genau von Ost nach West aufgestellt, senkrecht darauf ein Fernrohr angebracht, das sich also bei der Drehung der Achse im Meridian bewegte und durch welches man, wenn in dem Fernrohr Fäden angebracht sind, die Durchgänge oder Passagen der Sterne beobachten kann und das deshalb *Passageninstrument* genannt wird. Die Uhr und das Passageninstrument sind noch gegenwärtig die ersten Instrumente jeder Sternwarte, nur daß diese Instrumente nach und nach verbessert und zu einer großen Vollkommenheit gebracht sind.

Uhren hatten freilich die Alten auch schon und Sonnenuhren kommen im hohen Alterthum vor, die Ägypter,

Griechen und Römer besaßen auch Wassernhren (Klepsydra), jedoch scheinen die Uhren mit Räderwerk erst im 13. Jahrhundert erfunden zu sein, obwohl gegähnte Uhren schon vor Christi bekannt gewesen zu sein scheinen. Es dauerte aber lange Zeit, bevor diese Uhren zu einem für die Astronomie genügend regelmäßigen Gange gebracht werden konnten. Der Hauptübelstand bestand darin, daß es schwer war, die Zähne der Räder genau zu arbeiten und daß jede kleine Reibung den Gang änderte. Erst als Galilei im Dom zu Florenz gesehen hatte, daß zwischen den Schwingungen der aufgehängten Lampen ein regelmäßiges Gesetz existirte und dadurch die Theorie des Pendels entdeckte, kam Huyghens vor 1658 oder vielleicht schon Harris 1641 auf den glücklichen Gedanken, die Unregelmäßigkeit im Räderwerk der Uhren zu vermindern durch Anbringung eines Pendels, und die Pendeluhren genügten den an sie gestellten Anforderungen schon sehr nahe. Nur ein großer Uebelstand zeigte sich, der darin bestand, daß die Pendeluhren im Winter rascher, im Sommer langsamer gingen, wovon man die Ursache bald entdeckte, indem die Länge der aus Metall angefertigten Pendeltäuge mit der Temperatur variierte. Als man gefunden, daß Uhren mit genau gleichlangen Pendeln genau gleichförmig gingen, war man bestrebt, die Pendel o herzustellen, daß sie in den verschiedenen Temperaturen des Tags und der Jahreszeiten immer gleichlang blieben. Der Engländer Graham hatte zuerst die glückliche Idee, nicht etwa einen Körper von geringer oder gar keiner Ausdehnung zu suchen, sondern vielmehr die Ausdehnung des Eisens durch die stärkere eines andern Metalls unwirksam zu machen. Er erfand als meist aus fünf Stangen, zwei Stahl- und drei Messing- oder Zinkstangen, rostförmig zusammengefügtes Pendel, das Rostpendel, welches zuerst Harrison ausföhrte. Eine andere Art Compensation besteht darin, daß man statt der Linse am Pendel ein Gefäß mit Quecksilber anbringt, und während die Pendellänge sich z. B. durch die Wärme verlängert, steigt gleichzeitig durch die Wärme das Quecksilber in dem Gefäße etwas höher, so daß dadurch die Entfernung des Aufhängepunktes des Pendels bis zu dem Schwerpunkt des Quecksilbers immer dieselbe bleibt; man nennt ein solches Pendel, welches von Harrison erfunden ist, ein compensirtes Quecksilberpendel.

Eine astronomische Pendeluhr zeigt unsere Taf. 9 in Fig. 11, an welcher das Pendel ein Rostpendel ist und das große Zifferblatt die Minuten durch den langen Zeiger angibt, während das kleinere Blatt oben die Sekunden und das untere die Stunden angibt.

Fig. 10 zeigt ein Quecksilberpendel und die Pendellänge ist oben versehen mit einer kleinen Feder.

Die Länge des Sekundenpendels ist schon bei der Erde erwähnt und beträgt für ein mathematisches Pendel ohne Masse für den Aequator 991,0, für den Pol 996,1 Millimeter, welche Variation von der sphäroidischen Gestalt der Erde herrührt. Strenggenommen sollen die Schwingungen des Pendels, damit sie bei verschiedener Schwingungsweite immer gleiche Zeitdauer haben, aus einer Curve geschehen, welche in der Mathematik Cycloide genannt wird, und ein Pendel, das bei jedem Schwingungsbogen gleichlange Schwingungen macht, heißt isochron. Da die Bewegung in der Cycloide aber Schwierigkeiten hat, läßt man das Pendel sich in möglichst kleinen Schwingungsbögen bewegen und eine jeder am Aufhängepunkte des Pendels hat sich zu diesem Zwecke am besten bewährt.

Die Pendeluhren sind für Sternwarten ganz vorzüglich, weil sie dort fest aufgestellt und keinem Transport unterworfen sind. Wollte man dagegen anderswo

Beobachtungen machen, bedurfte man tragbarer Uhren, die auch schon zu Ende des 15. Jahrhunderts erfunden waren und deren Verbesserung für astronomische Zwecke bald als ein dringendes Bedürfnis anerkannt wurde, weil durch genaue Zeitübertragung auf unserer Erde die Längendifferenz mehrerer Orte am leichtesten bestimmt werden konnte, was besonders für die Schiffsahrt von der größten Wichtigkeit ist. Für solche transportable Uhren, einfach Chronometer genannt, erfanden Huyghens und Hooft die Unruhe und Spiralfeder und 1665 wurde zum ersten mal mit einer Huyghens'schen Uhr die Fahrt nach Guinea gemacht und durch eine Zeitübertragung die überseeische Länge bestimmt. Im Jahre 1714 setzte die englische Regierung 20000 Pfd. St. für die Erfindung einer Uhr aus, die in sechs Wochen nicht mehr als 1 bis 2 Minuten falsch gehen durfte, und der schon genannte Uhrmacher James Harrison, der von 1726 an sich mit der Verbesserung unaufhörlich beschäftigte und die Unruhe, um sie zu compensiren, aus zwei Metallen verfertigte, erhielt 1765 die erste Hälfte, 1774 die zweite Hälfte des oben angegebenen ausgelegten Preises. Seitdem sind unaufhörlich Verbesserungen an den Uhren ausgeführt und die für die Schiffsahrt und auch auf Sternwarten gebräuchlichen Chronometer sind entweder große Taschenuhren, nach dem Princip der Spinelluhren eingerichtet, $\frac{1}{4}$ Sekunden schlagend, oder Borchronometer, in welchen die Unruhe von $\frac{1}{2}$ zu $\frac{1}{2}$ Secunde eine Schwingung macht.

Auf Taf. 9 in Fig. 9 ist ein solches Borchronometer abgebildet. Das Chronometer selbst hängt in zwei Ringen, einer Cardanischen Aufhängung, um immer die horizontale Lage zu behalten, weil sich ergeben hat, daß die Lage des Uhrwerks oft einen auf den Gang wirkenden Einfluß ausübt.

c) Passageninstrument, Meridiankreis, Azimuthal- und Höheninstrumente.

Das Passageninstrument ist seit Claus Römer's Zeiten beträchtlich verbessert. Das Fernrohr wird meistens aus Messing gefertigt und so eingerichtet, daß Objectiv und Ocular vertauscht werden können. Es wird in oder an einem Würfel befestigt, an dem senkrecht zum Fernrohr die Achse sitzt, welche durchbrochen ist, um zur Beleuchtung der Zaden Licht einfallen zu lassen. Um das Fernrohr genau senkrecht zur Achse zu haben, sind jetzt gewöhnlich Correctionschrauben an dem Zadenmikrometer angebracht und kann der übrigbleibende Fehler der nicht senkrechten Stellung, welchen man die Collimation nennt, entweder durch Umlegung des Instruments, oder auch durch besondere Fernrohre, Collimatoren genannt, welche zu dem Zwecke so aufgestellt sind, daß man mit ihnen in das Fernrohr des Passageninstrument's hineinschauen kann, ermittelt werden. Damit die Achse nicht zu schwer in den Lagern liegt, sind Gegengewichte so angebracht, daß die Reibung sehr verringert und dadurch das Abschieben der Lagerflächen und der Achsen möglichst verhindert wird.

Am Passageninstrument ist gewöhnlich nur ein kleiner Höhenkreis angebracht, welcher zur Einstellung des Instruments auf das zu beobachtende Gestirn dient; befinden sich dagegen genau eingetheilte mit Nonien oder Mikrostopen abzulesende Kreise am Instrument, so heißt es, wenn es im Meridian aufgestellt ist, ein Meridiankreis. Der Meridiankreis der leipziger Sternwarte ist auf Taf. 9 in Fig. 5 abgebildet. Damit die Aufstellung eine recht feste ist, ruht das Instrument zwischen den Pfeilern a a, die aus Sandstein bestehen, aber auch aus Marmor,

Granit oder Backsteinen hergestellt werden können. Das Fernrohr *bb* hat eine Brennweite von 2, Meter und das Objectiv eine Oeffnung von 160 Millimeter. Zur Bewegung des Fernrohrs dienen die Handhaben *ii*, um die Achse gehen die Bügel *ee*, an welchen die Hebel *ff* mit den Gegengewichten den größten Theil des Gewichts des Instruments ausbalanciren, *cc* sind die von zwei zu zwei Bogenminuten getheilten, einen Meter Durchmesser haltenden Kreise, welche jeder durch 4 Mikroskope *dd* ablesbar sind, die an ihren Mikrometerschrauben noch Zehntel-Bogensecunden abschätzen lassen. *gg* sind die Beleuchtungslampen, durch welche sowohl die Fäden im Fernrohr als auch die Theilung der Kreise des Nachts sichtbar gemacht werden, *kk* sind Holztritte, welche der Beobachter zum Ablesen der Mikroskope u. s. w. bestiegt.

Während man früher zur verticalen Stellung eines Instruments das Loth anwandte, benutzte man dazu jetzt die Wasserwaage, und diejenige, welche zu dem oben beschriebenen Instrumente gehört, ist auf Taf. 10 in Fig. 2 dargestellt. Die Libelle ist eine ganz wenig gekrümmt ausgeschliffene mit Schwefelsäure gefüllte Glasröhre *a*, welche in einer Metallröhre steckt und durch die Schrauben *cc* in ihrer Lage verfertigt werden kann. An der Röhre sind die Haken *bb* befestigt, welche über die Achse des Fernrohrs gehängt werden, und um durch die Wärme der Hand die Libelle nicht zu beeinflussen, sind in *dd* Handhaben, mittels welcher das Niveau aufgehängt wird. Das soeben beschriebene Niveau heißt ein Hängenniveau, während das auf derselben Tafel in Fig. 3 dargestellte Niveau die Stützen nach unten hat, auf die Achsen aufgesetzt und daher Aufstagniveau genannt wird. Libelle, Correctionschrauben und Handhaben sind bei demselben mit denselben Buchstaben wie vorher bezeichnet.

Die Passageninstrumente werden aber auch sehr oft transportabel gebraucht, denn die zwischen Pfeilern aufgestellten sowie der Meridiankreis sind Instrumente fester Sternwarten. Ein transportables Passageninstrument, wie es gegenwärtig zu Zeitbestimmungen für die astronomischen Längenbestimmungen bei den Arbeiten der europäischen Gradmessung angewandt wird, ist auf Taf. 9 in Fig. 3 dargestellt. Es ist in dem Würfel, an welchem das Objectivende *a* des Fernrohrs sitzt, ein Prisma angebracht, durch welches das Licht um 90° reflectirt wird, und das Ocular befindet sich daher nicht in der Verlängerung der Röhre *a*, sondern in *b*. Man hat dadurch den Vortheil, daß das Auge am Ocular bei jeder Stellung des Fernrohrs sich in derselben Höhe befindet und das Niveau *cc* kann beständig auf der Fernrohrachse hängen bleiben. Das Fernrohr mit seinen Achsen ruht auf dem eisernen Stativ *fff*, an welchem Correctionschrauben zur Berichtigung der Neigung und des Azimuths angebracht sind. An dem Ocularende des Fernrohrs ist ein Einstellungskreis *e* angebracht, welcher zum Auffuchen der Sterne dient. Endlich ist noch in *dd* an dem Stativ eine besondere Vorrichtung, durch welche das Fernrohr in sehr kurzer Zeit in die Höhe gehoben und dann um 180° gedreht werden kann, wodurch, wenn man in beiden Lagen beobachtet, der Collimationsfehler eliminiert wird.

Dienen also gegenwärtig die Passageninstrumente hauptsächlich zu Zeitbestimmungen, so hat man auch zu directen Messungen der Höhen und Azimuthe der Sterne Instrumente mit Höhen- und Azimutalkreisen, und diese werden Universalinstrumente genannt. Auf einem dreiarminigen Fußgestelle, welches Correctionschrauben zur Horizontalstellung hat, befindet

sich in der Mitte eine verticale Achse, an welcher der Horizontalkreis befestigt ist. Von der Achse aus gehen nach oben hin Stützen, auf welchen eine horizontale Achse mit dem Fernrohr und einem Höhenkreise ruht. Ist der Horizontalkreis nur ein kleiner Kreis *p* Einstellungen oder zum Auffuchen der Sterne und der Höhenkreis der Hauptkreis, alsdann nennt man auch ein solches Instrument schlechtweg Höhenkreis. Ist dagegen der Höhenkreis Nebenachse und will man hauptsächlich Horizontalwinkel messen, und ist daher der Azimutalkreis der Hauptkreis, so wird das Instrument auch Theodolit genannt, in England auch Altazimuthinstrument.

Ofters und besonders zu Anfang dieses Jahrhunderts bediente man sich auch statt der Universalinstrumente der Multiplicationskreise, an welchen statt eines Fernrohrs zwei angebracht sind, wodurch die zu messenden Winkel zweimal oder mehrere mal aneinandergesetzt werden können, der Winkel also multiplicirt wird. Doch hat sich gezeigt, daß diese Multiplication der Winkel keine größere Genauigkeit als die Wiederholungen des einfachen Winkels gibt.

Auf Taf. 10 ist in Fig. 17 ein Multiplicationskreis von Troughton abgebildet. Die drei Füße des Stativs haben die Buchstaben *AAA*, eine Libelle *B* läßt den horizontalen Stand herstellen, *B* ist der Horizontalkreis; die Alhidade *H*, auf der auch ein Niveau sitzt, hat in *D* seine Klemme und trägt vier Nonien mit Lupen, wovon zwei in *C* und *E* sichtbar sind. Die Alhidade *H* trägt ferner vier Stützen *IIII*, an welchen die Achse mit den Fernrohren *M* und *T* (die Oculare sind in *N* und *T*) und den Höhenkreisen *O* und *L* ruht. An dem Fernrohr *T* ist ein horizontaler Arm mit einem Niveau angebracht, das bei jeder Multiplication des Winkels durch Drehung des Fernrohrs auf gleiche Theilstiche gebracht wird; in *P* und *Q* sind die Nonien des Alhidadenarmes *PQ*, in *U* eine Stütze mit einer Lupe *R* zur Ablesung des Höhenkreises, in *KK* noch Schienen zur Aufhängung einer Libelle; zur Beleuchtung in der Nacht dient eine in der Zeichnung sichtbare Lampe.

Ein Universalinstrument nach neuester Construction, wie die berühmte Anstalt von Repsold und Söhne in Hamburg sie anfertigt, ist auf Taf. 9 in Fig. 1 dargestellt. Von den drei Füßen des Stativs sind zwei sichtbar, in der Mitte *a* ist die verticale Achse, *b* der Horizontalkreis, welcher durch zwei etwas schräggestellte Mikroskope *ee* abgelesen wird. Das Fernrohr *b* sitzt an einem Würfel, in welchem wieder ein Prisma das Licht um 90° reflectirt, sodaß das Ocular in *d* angebracht ist. Zwei symmetrisch am Fernrohr angebrachte Höhenkreise werden der eine zur Einstellung benutzt, der andere *g* durch zwei Mikroskope, wovon das eine in *e* sichtbar ist, abgelesen. Durch ein Aufstagniveau *f* kann man zu jeder Zeit die Neigung der Fernrohrachse bestimmen.

Diese Instrumente existiren natürlich in verschiedener Größe, je nach den Anforderungen, welche damit erreicht werden sollen. Ganz kleine mit dreißiglichen Kreisen und sehr bequem für Reisende werden schon zu geographischen Ortsbestimmungen benutzt, wenn für selbige Bruchtheile von Minuten genügen, und eine einfache Art wurde von dem Engländer Kater angegeben und heißt Kater'scher Kreis. Mit Instrumenten, deren Kreise 5—6 Zoll Durchmesser haben, bestimmt man schon Winkel bis auf Bogensecunden, während Instrumente mit 10—123ölligen Kreisen angewandt werden zu den genauesten Messungen, bei welchen man Zehntel-Bogensecunden bestimmen will. Besonders werden diese Instrumente auch zu geodätischen Arbeiten

benutzt und bei Triangulationen erster Ordnung werden die größten Instrumente, bei Triangulationen zweiter und dritter Ordnung die kleinern und bei Katastervermessungen die kleinsten Instrumente verwandt.

Auf Reisen, zumal in unbekannten Gegenden, bedient man sich leicht transportabler Instrumente und sucht besonders diejenigen Werthe, welche man ermitteln will, z. B. Zeit und Breiten, durch solche Instrumente zu bestimmen, bei welchen nur ein Kreis oder ein Theil eines Kreises angewandt wird. Zu Höhen- und zu Distanzmessungen erfand bereits Newton ein Instrument mit zwei Spiegeln, an welchem durch Drehung des einen größern Spiegels das Bild des einen zu beobachtenden Gegenstandes auf einen andern kleinern Spiegel reflectirt wird, sodas mittelst des Fernrohrs, welches mit seinem halben Objectiv auf diesen Spiegel gerichtet ist, das reflectirte Bild mit dem eines andern Objectes zu gleicher Zeit gesehen und zur Dedung gebracht werden kann. Nachdem die beiden Bilder zur Dedung gebracht, liest man an Gradbogen den Drehungswinkel des großen Spiegels, der deshalb auf einer Alhidade sitzt, ab. Es läßt sich leicht zeigen, daß der Drehungswinkel nur die Hälfte der Winkel-distanz der beiden beobachteten Objecte ist und der Gradbogen ist daher gleich so eingetheilt, daß er die doppelten Winkel des Drehungsbogens angibt. Hadley wandte zu einem solchen Spiegelinstrument, um es transportabel zu machen, nur den sechsten Theil des Kreises, einen Gradbogen von 60 Graden an, der wegen der Verdoppelung der Winkel gleich in 120 Grade eingetheilt ist. Ein solches Instrument heißt der Hadley'sche Spiegelsextant und ist besonders für die Schifffahrt von Wichtigkeit. Auf Taf. 9, Fig. 7 ist es abgebildet; der Gradbogen a zeigt die Theilung, b ist die Alhidade, welche in d den großen Spiegel trägt, in e ist der kleine feststehende Spiegel, in c das auf diesen Spiegel gerichtete Fernrohr, und um die Sonne beobachten zu können, befinden sich in f Blendgläser, durch welche man das von dem großen Spiegel kommende Licht abblenden kann; in g ist die Handhabe, an welcher man das Instrument hält und in die Richtung der zu messenden Höhe resp. Distanz bringt und bei h ist die Lupe zum Ablesen des Nonius und der Kreistheilung.

Statt der Sextanten hat man in neuerer Zeit, da bei diesen Instrumenten ein Fehler, die Excentricität, der davon herrührt, daß der Mittelpunkt der Drehungsachse der Alhidade nicht mit dem Mittelpunkt der Kreistheilung zusammenfällt, aufgehoben wird, ganze Kreise eingeführt, bei welchen die Alhidade ein Durchmeßer ist, der an beiden Enden Nonien trägt und durch deren Ablesung der Excentricitätsfehler eliminiert werden kann, indem er an den beiden Nonien vorkommt, an dem einen aber positiv, an dem andern negativ ist. Da statt des kleinen Spiegels ein total reflectirendes Prisma angebracht ist, wird dadurch auch ein anderer Uebelstand beseitigt, der bei dem Sextanten vorhanden ist. Die Construction des letztern erlaubt nämlich nur Winkel bis etwas über 120° zu messen und die Winkel bis zu 180° waren ausgeschlossen. Bei der Ersetzung des kleinen Spiegels durch ein Prisma kann man jeden Winkel von 0° bis 180° messen. In neuester Zeit sind diese Instrumente, welche Reflexionskreise, gewöhnlich aber Prismenkreise genannt werden, sehr viel an die Stelle der Sextanten getreten.

Taf. 9, Fig. 8 zeigt einen solchen Prismenkreis, a ist der die Theilung tragende Kreis, bb die Alhidade, auf welcher in d der große Spiegel sitzt, e ist das den kleinen Spiegel ersetzende Prisma, c das Fernrohr, zwischen welchem und dem Prisma wieder Blendgläser

angebracht sind, f ist die Lupe zum Ablesen der Theilungen.

Zu erwähnen ist noch, daß man auf See die Höhe eines Gestirns direct über dem Meereshorizont mißt. Wegen der terrestrischen Refraction und auch wegen der Höhe des Auges über dem Meerespiegel bedarf die gemessene Höhe einer kleinen Correction, welche die Depression des Horizonts oder die Kimmtiefe genannt wird. Bei Beobachtungen auf dem Lande dagegen bedient man sich eines künstlichen Horizonts, der entweder durch eine Flüssigkeit (meistens Quecksilber) gebildet wird, oder auch aus einer spiegelnden Glas- oder Metallplatte, welche vorher durch eine Wasserlage genau nivellirt wird, besteht.

Die ioeben beschriebenen Instrumente werden meistens nur mit kleinen Fernrohren versehen, da das Messen bei ihnen die Hauptsache ist und nur bei Meridiankreisen verwendet man größere Fernrohre. Auf Sternwarten hat man aber viele lichtschwache Gestirne zu beobachten, zu welchen große Fernrohre von starker optischer Kraft erforderlich sind; diese erhalten eine andere Aufstellung, zu welcher der Aequator als Fundamentalebene angenommen wird und die wir im nächsten Abschnitt noch zu betrachten haben.

d) Teleskope, Refractoren, Aequatoreale

Als im Jahre 1608 in Holland das Fernrohr zuerst von Hans Lippershey, einem Brillenmacher zu Middelburg, und fast gleichzeitig auch von Jakob Metius erfunden war, während Jansen, Galilei, Fontana u. a. erst später Fernrohre bauten, war es Kepler vorbehalten, das Fernrohr theoretisch so zu construiren, wie die Astronomen es gegenwärtig noch gebrauchen. Das holländische und Galilei'sche Fernrohr bestand aus einem biconvergen Objectiv und einem biconcaven Ocular, wie wir es gegenwärtig noch bei Theaterperspectiven haben und man sieht dadurch die Gegenstände ganz so wie mit bloßem Auge in aufrechter Stellung; aber man übersieht nur einen kleinen Raum oder hat ein kleines Gesichtsfeld. Als Galilei auf die Objecte des Himmels starke Vergrößerungen anwandte (die stärkste, welche er hatte, war eine 30fache), konnte er nur einen ganz kleinen Theil des Himmels übersehen. Kepler nahm statt des biconcaven Oculars ein biconvexes, erreichte dadurch ein viel größeres Gesichtsfeld, sah aber die Gegenstände verkehrt, welches bei astronomischen Objecten, wenn man es weiß, durchaus von keinem Nachtheil ist. Kepler konnte aber auch, indem er dem einfachen biconcaven Ocular noch eine andere Linse zusetzte, den Gegenstand wieder umkehren und construirte dadurch ein terrestrisches Fernrohr, in ähnlicher Construction, wie es noch jetzt gebräuchlich, dessen Erfinder Alhita ist. Das Licht wird, durch je mehr Linsen es geht, um so schwächer und die Astronomen blieben daher bei dem ursprünglich Kepler'schen oder astronomischen Fernrohr, welches die geringste Anzahl von Linsen hat, stehen.

Descartes, Christ. Huyghens und andere beschäftigten sich, die Theorie des Fernrohrs zu verbessern, und letztem gelang es, Fernrohre bis zu 10 Meter Brennweite mit 80 Millimeter Oeffnung herzustellen, wozu er auch schon eine 92fache Vergrößerung anwenden konnte. Der Ursachen, warum bei stärkerer Vergrößerung die Bilder zu unendlich werden, sind zwei. Die eine hat ihren Grund darin, daß man die Linsen nach der Kugelform schleifen muß, wodurch die Strahlen, welche in der Mitte der Linse und die, welche in der Nähe des Randes durchgehen, sich nicht

in demselben Brennpunkt vereinigen; der dadurch entstehende Fehler heißt die sphärische Abweichung. Die andere Ursache ist, daß die Lichtstrahlen, welche durch das Objectiv gehen, gekrümmt werden und die Bilder im Brennpunkt prismatische Farben zeigen; der entstehende Fehler wird die Farbenzerstreuung genannt. Wenn auch Konstantin Guggenb., Lützow und andere Optiker und Astronomen diesen Fehler dadurch verringerten, daß sie den Objectivgläsern eine große Brennweite bis zu fast 200 Meter gaben, so glaubte man doch nach Newton's Untersuchungen nie im Fernrohr farbenfreie Bilder herstellen zu können.

Als Euler 1747 daran erinnerte, daß doch unser Auge die Gegenstände farblos sehe, schlug er vor, das Objectiv aus verschiedenen brechenden Flüssigkeiten, ähnlich unserm Auge, herzustellen; der schwedische Gelehrte Klingshierna wies nach, daß Newton sich geirrt habe und empfahl verschiedene Glasarten zu nehmen, und es gelang im Jahre 1758 dem englischen Optiker Dollond durch Zusammenfügung der beiden Glasarten, welche unter dem Namen Crown- und Flintglas bekannt sind, ein Objectiv zu fertigen, welches fast farblos war und ein achromatisches Objectiv genannt wird.

Später haben die achromatischen Objective insofern genauer Rechnungen, besonders durch Fraunhofer noch eine große Verbesserung erhalten und gegenwärtig liefern die Werkstätten von Werz & Sohn (Fraunhofer's Nachfolger), Steinheil in München, Bösch in Wien, Bissler & Martins in Berlin, Schröder in Hamburg, Eichens in Paris, Simms und Cool in England, Jig und Clarke in Amerika und andere achromatische Objective von beträchtlichen Dimensionen, auf die wir später bei den Sternwarten zurückkommen werden.

Bald nach Erfindung des Fernrohrs kam Merenne, zuerst im Jahre 1639, auf den Gedanken — er publicirte ihn 1644 — statt der Glaslinsen Spiegel anzuwenden, aber erst Gregory gab im Jahre 1663 die Idee an, wie ein solches Spiegelinstrument zusammenge-
 setzt werden könnte und Hooke verfertigte 1674 das erste Instrument dieser Art, während eine andere Construction der Spiegelteleskope von Newton im Jahre 1672 erfunden war. Da bei den Spiegelteleskopen wegen der Reflexion nicht der Fehler der Farbenzerstreuung existirte, wurden im 18. Jahrhundert diese Instrumente den großen Fernrohren vielfach vorgezogen. Nach der Erfindung der Achromasie und besonders seit Fraunhofer's großen Verbesserungen sind wieder die Fernrohre oder Refractoren in große Aufnahme gekommen, besonders weil sie sich länger halten und weniger Sorgfalt in der Conservirung bedürfen als die Reflectoren, deren Spiegel öfter nachpolirt werden müssen. Unsere lichtstärksten Instrumente sind noch gegenwärtig die Reflectoren.

Im vorigen Jahrhundert war es besonders William Herschel, der Spiegelteleskope von vorzüglicher Güte verfertigte; erst baute er sich eins von 1½ Meter Länge, später Hunderte von 2 und 6 Meter, mehrere von 8 Meter Brennweite. Sein größtes Spiegelteleskop hatte einen Spiegel von 1½ Meter Oeffnung, über 12 Meter Brennweite und die stärkste Vergrößerung war eine 7000fache. Mit ebenso großen Reflectoren hat John Herschel seine Beobachtungen in England und am Cap angestellt, Lassel hat sich ein ebenso großes gebaut, Lord Rosse in Irland aber das größte, dessen Brennweite 17 Meter beträgt und dessen Spiegel über 1,8 Meter Durchmesser hat. Der Spiegel des Rosse'schen Instruments ist 7600 Pfund schwer, das dazu gehörige Rohr wiegt 13,200 Pfund.

Zu diesen Teleskopen von so bedeutenden Dimensionen sind nun ganz besondere Vorrichtungen gemacht, um sie bewegen zu können. Das große Herschel'sche Spiegelteleskop ist auf Taf. 10 in Fig. 7 dargestellt. Das 12 Meter lange Rohr DD hat in A seinen Drehpunkt und ist durch eine Menge von Stützen, die an einem Balken AFFA über Rollen gehen und bei EE mittels Kurbeln verkürzt und verlängert werden können, beweglich. Auf das vordere Gerüst GG muß der Beobachter hinaufsteigen, um zu einer Tribüne in H zu gelangen. Er hat dort seinen Standpunkt und sieht durch ein Ocular direct auf den im großen Rohr am unteren Ende befindlichen Spiegel hinein, und wenn auch der Kopf des Beobachters etwas von dem in das Rohr fallenden Lichte fortnimmt, so ist dieser Lichtverlust wegen der Größe des Spiegels doch nur ein sehr geringer. Diese directe Einsicht, von Herschel selbst erfunden, ist für ein so großes Teleskop diejenige, bei welcher noch am wenigsten Licht verloren geht, da bei der Gregory'schen Construction des Spiegelteleskops das Licht, bevor es in das Ocular gelangt, noch erst auf einen kleinen Hohlspiegel fällt und zurück in eine Oeffnung im großen Spiegel reflectirt wird, bei welcher Reflexion viel Licht verloren geht. Bei dem Newton'schen Spiegelteleskope findet ein Gleiches statt, das Licht fällt von dem großen Spiegel auf einen kleinen, unter 45° gegen die optische Achse geneigten Spiegel und in ein an der Seite der Röhre befindliches Ocular (siehe die Construction des Gregory'schen und Newton'schen Teleskops im „Atlas der Physik“, Taf. 5, Fig. 38 und 39).

Das Lassel'sche Spiegelteleskop befindet sich auf Taf. 9 in Fig. 6 abgebildet. Die Aufstellung in eine festere als die oben beschriebene des Herschel'schen Teleskops; das aus Eisenstäben bestehende Rohr e ruht zwischen Lagern b, welche auf einem der Polarachse parallelen Conus, der in l einen Stundenkreis hat, befestigt sind. Der Durchmesser des Spiegels beträgt über 1½ Meter. Der horizontale Unterring a trägt das auf Rollen verschiebbare Beobachtungsthorium dddd, aus welchem oben der Beobachter heraustritt, um direct mit dem Ocular in das Rohr zu sehen.

Die großen Reflectoren werden gewöhnlich mit einem Stativ versehen, dessen Hauptachse parallel der Weltachse ist, so daß die an den Achsen angebrachten Kreise parallel dem Aequator und senkrecht darauf gerichtet sind. Eine solche Aufstellung heißt die parallactische, und ein solches Instrument, besonders wenn die Kreise zu genauen Ablesungen eingerichtet sind und man daher genaue Bestimmungen des Stundenwinkels und der Declination ausführen kann, heißt Aequatoreal.

Das Aequatoreal der Leipziger Sternwarte ist auf Taf. 9 in Fig. 4 abgebildet. Das Stativ besteht aus einer gußeisernen Säule a, auf welcher ein eiserner Kasten b in der Richtung nach dem Nordpol steht, in welchem die Polarachse des Instruments angebracht ist. Senkrecht auf der Polarachse steht der Kasten c, in welchem die Declinationsachse liegt, die an dem einen Ende das 4 Meter lange Fernrohr dd trägt, während am andern Ende in m das Gegengewicht sitzt. Die Achsen selbst sind höhl und die Gegengewichte in m und das untere Gegengewicht am Ende der Stundenachse sind befestigt an besondere im Innern der Achse frei schwebende Stangen, damit jede Durchbiegung der Achsen vermieden wird. Das Gegengewicht in m an dem Kasten b sitzend, hält zwei Frictionrollen, die gegen die Stundenachse drücken, das Gleichgewicht,

um dadurch die Reibung möglichst zu verringern. In *f* sind zwei Kreise angebracht, wovon der untere mit einem Nonius versehene als Einstellungskreis dient und durch einen kleinen Planpiegel des Nachts beleuchtet wird; der obere mit Mikrostopen ablesbare Kreis läßt die Stundenwinkel bis auf $\frac{1}{100}$ Zeitsecunden ermitteln. In *g* und *g* sind die Declinationskreise, wovon wieder der untere mit Nonius versehene als Einstellungskreis dient, während der obere mikroskopische Ableitung hat und bis auf $\frac{1}{10}$ Bogensecunden die Declination finden läßt. An dem Fernrohr *cd* befindet sich in *e* ein kleineres Fernrohr, welches parallel dem großen und mit schwacher Vergrößerung versehen ein möglichst großes Gesichtsfeld hat und zum leichten Auffuchen von Sternen verwandt wird und der Ender beist. In *oo* sind die Handhaben des ganz aus Messing bestehenden Fernrohrs, in *n* ist eine Klemme, mit welcher das Fernrohr festgeklemmt wird. Unten am Fernrohr in *e* ist ein besonderes Mikrometer, Fadenmikrometer genannt, in welchem Spinnfäden aufgespannt sind und das um seine Achse drehbar und mit einem Kreise versehen ist, um Positionswinkel bestimmen zu können. In *l* erblickt man eine Gaslampe, deren Licht durch Prismen in das Fernrohr geworfen wird und zwar, je nachdem es der Beobachter wünscht, das Feld beleuchtet und die Fäden schwarz auf hellem Hintergrunde oder umgekehrt, die Fäden beleuchtet und sie in dunkeln Hintergrunde weiß erscheinen läßt. Die erste Art der Beleuchtung (Feldbeleuchtung) wird angewandt bei der Beobachtung hellerer Objecte, die letztere (Fadenbeleuchtung) bei schwachen Objecten.

Da vermöge der Umdrehung der Erde ein Stern, wenn er im Felde des Fernrohrs steht, rasch sich aus demselben fortbewegt, ist, um diese Fortbewegung zu verhüten, eine Einrichtung getroffen, durch welche das Fernrohr dem Sterne folgt und in 24 Stunden einen Umlauf um seine Achse macht. Diese Vorrichtung besteht in einem Uhrwerk, das in der Säule *a* sitzt und in *er* Uebertragung den oberen Stundenkreis in Bewegung setzt. Von dem Uhrwerk sieht man in unserer Zeichnung nur die Schärre mit dem das Instrument treibenden Gewichte. Endlich stellen *pp* Tritte vor, auf welche man steigt, um das obere Mikroskop ablesen zu können.

An dem Instrumente erblickt man das Fadenmikrometer nur von außen, und daher ist selbiges auf derselben Tafel in Fig. 12 im Querschnitt noch besonders abgebildet. Man sieht dort einen horizontalen und fünf verticale feststehende Fäden, der eine verticale Faden in der Mitte ist ein beweglicher, dessen Stellung gegen die festen Fäden die Mikrometerschraube *a* anzeigt. Der Positionskreis hat in *c* und 180° davon entfernt zwei Nonien, durch welche Minuten ablesbar sind; in *d* ist eine Mikrometerschraube, um kleine Bewegungen des Fadenmikrometers gegen den Positionskreis hervorbringen zu können; in *b* ist noch der Kopf eines Triebrades, durch welches das ganze Mikrometer gegen die feststehenden Fäden bewegt werden kann, so daß man jeden der Fäden nach Belieben in die Mitte des Gesichtsfeldes stellen kann.

Andere Mikrometer, die man in Refractoren oder Reflectoren anwendet, sind noch auf Taf. 10 in Fig. 8, 9, 10, 11 und 14 sichtbar. Fig. 8 stellt ein aus concentrischen Ringen bestehendes Mikrometer vor, welches man gewöhnlich in Glas ausführt. Fig. 9 ist ein Nautenmikrometer, im vorigen Jahrhundert viel angewandt, jetzt fast außer Gebrauch gekommen. Fig. 10 zeigt uns ein Ringmikrometer, bei welchem der Ring gewöhnlich aus Stahl besteht, daher in der Nacht

ganz schwarz erscheint und bei dem spärlichen Sternlichte immer sichtbar ist. Da der Ring von dem Künstler gut rund, fast vollkommen fehlerfrei hergestellt werden kann und bei jeder Montirung, auch der nicht parallactischen, dieselben Dienste leistet, ist es meistens dasjenige Mikrometer, welches außer dem Fadenmikrometer angewandt wird.

Fig. 11 bildet ein Fadenneb, wie es vielfach auch in Passageninstrumenten und Meridiankreisen vorkommt. Gewöhnlich sind die Fäden Spinnfäden, verwendet werden auch Platina-, Gold- und Silberfäden; oft sind die Linien des Mikrometers auch auf Glas gezogen. Fig. 14 zeigt ein Mikrometer mit drei Spitzen, die durch eine Schraube beweglich sind und dies Spitzenmikrometer ist in neuester Zeit mehrfach bei spectralanalytischen Untersuchungen angewandt, um damit die Lage der schwarzen Linien oder der Banden im Stern-, Nebel- oder Kometenspectrum zu messen.

Mittels der Mikrometer bestimmt man bei den Refractoren oder Reflectoren gewöhnlich die Differenzen in Rectascension und Declination zwischen einem bekannten Stern und dem neu zu bestimmenden himmlischen Object. Das Fadenmikrometer am Aequatorale gibt diese Differenz direct, und zwar sind die Zeitdifferenzen bei den Durchgängen der Gestirne direct die Differenzen in gerader Aufsteigung, während die Unterschiede zwischen dem festen und beweglichen Faden, indem man auf den ersten das zuerst das Fernrohr passirende Gestirn, auf den letzten das andere Gestirn bringt, den Declinationsdifferenzen entsprechen, wozu aber die Kenntniß des Werthes einer Umdrehung der Mikrometerschraube nöthig ist.

Bei dem Ringmikrometer beobachtet man die Ein- und Austritte der Gestirne und kann aus dem Mittel und der Differenz derselben, wenn der Durchmesser des Ringes bekannt ist, die Rectascensions- und Declinationsdifferenzen berechnen.

e) Heliometer. Sonstige Apparate und Instrumente auf Sternwarten.

Positions- und Distanzmessungen geschehen am Aequatorale nur mit dem Fadenmikrometer und ergeben sich diese Daten durch den Positionskreis und die Mikrometerschraube, indem das eine Gestirn auf einen festen, das andere auf den beweglichen Faden gebracht wird. Da das Gesichtsfeld gewöhnlich nicht sehr groß, und beide zu messenden Sterne im Felde sichtbar, womöglich nahe in der Mitte stehen müssen, kann man nur kleine Distanzen messen.

Schon im vorigen Jahrhundert erfannt Bouguer ein anderes Instrument, um Distanzen messen zu können, er brachte zwei gleiche Objective nebeneinander in ein Fernrohr und machte durch Verstellung der Objective gegeneinander den Durchmesser der Sonne.

Dollond kam auf den Gedanken, die beiden Objective durch zwei Hälften eines Objectivs, welches längs eines Durchmessers zerschnitten war, zu ersetzen. Instrumente mit solchen durchschnittenen Objectiven werden, weil Bouguer zuerst mit einem ähnlichen den Durchmesser der Sonne gemessen, Heliometer genannt. Fraunhofer und Uffmeider und deren Nachfolger Merz und Mahler und Merz und Sohn haben diese Instrumente in größern Dimensionen für die Sternwarten in Königsberg, Bonn, Bullowa und Orford hergestellt. Beide Hälften des Objectivs werden vermittels Mikrometerschrauben gegeneinander bewegt und erlauben von nahestehenden Sternen bis zu etwa ein Grad Entfernung die genauesten Distanzmessungen, wobei aber nicht vergessen werden darf, auf die Fehler

der Schrauben, ihre Veränderungen durch Temperatur, auf Durchbiegung Rücksicht zu nehmen.

Das Heliometer, welches die pulkswaer Sternwarten besitzt, ist auf Taf. 9 in Fig. 2 dargestellt. Es ist parallaxisch auf dem Steinstativ a montirt, in b ist die Polarachse, in c die Declinationsachse, in m der Stundenkreis, welcher durch ein Uhrwerk mit der Achse in 24 Stunden einmal herumgetrieben werden kann. In l ist der Declinationskreis, dd ist das Fernrohr mit dem durchschnittenen Objectiv; in e ist ein Sucher parallel dem großen Fernrohr, in g die Mikrometerschrauben zur Bewegung der Objectivhälften, welche durch die Schlüssel h vom Ocular i ausgeführt werden können. f ist ein Hülfssfernrohr zur Ableitung der Scala an der Mikrometerschraube g, in kkkk sind Gegengewichte sowohl für das Fernrohr als auch für den Sucher, für die Mikrometerschraube und zu den Frictionsrollen.

Außer einem oder mehreren größern Instrumenten besitzt jede Sternwarte noch eine Menge von Hülfssapparaten. So ist z. B. auf Taf. 10 in Fig. 12 ein Hülfssapparat zur Bestimmung der Libellentheile auf den Niveau dargestellt. Die Libelle oder auch das ganze Niveau wird in die Lager aa gelegt und eine Mikrometerschraube mit einer Scheibe b so lange gedreht, bis die Libelle auf bestimmte Theilstriche steht. Dreht man die Mikrometerschraube etwas weiter, so zeigt die Libelle andere Theile an und die Differenz dieser Libellentheile entspricht der Differenz der Theile, die die Scheibe auf der Mikrometerschraube anzeigt. Hat man nun ermittelt, wie viel Secunden ein Theil der Scheibe b ist, so läßt sich sofort berechnen, wie viel Secunden ein Niveaufeile hat. Erwähnt mag noch werden, daß die Niveaufeile, welche einem Intervall von etwa 2 bis 3 Millimeter entsprechen, bei den kleinen Universalinstrumenten etwa 1" sind, bei den größern 2 bis 3" und bei den genauesten Libellen zu den Meridiankreisen etwa 1" in Bogen. Der Krümmungshalbmesser der Libelle läßt sich daraus berechnen und beträgt z. B. für das Intervall von 2 Millimeter zu 10 Secunden 41.3 Meter, zu einer Secunde 41.3 Meter.

Ein anderer Hülfssapparat ist auf Taf. 10 in Fig. 5 enthalten und heißt Chronograph oder Registrirapparat. Er ist ähnlich eingerichtet wie die elektrischen Telegraphen nach Morse's System. Durch ein Uhrwerk, dessen regelmäßige Bewegung das Pendel b vermittelt, bewegt sich ein Arm a, durch welchen ein Papierstreifen f, der um die Rolle d gewunden ist, fortbewegt wird. Eine Secundenuhr steht mit einem Elektromagneten an diesem Apparate in Verbindung und die Spitze eines Hebelarms, an welchem der Unter des Elektromagneten ist, gibt von Secunde zu Secunde auf dem sich abrollenden Papierstreifen Punkte in gleichen Intervallen an. Sobald man beobachtet und ein Gestirn durch den Faden des Fernrohrs geht, drückt man auf einen Taft und der Hebelarm am Unter eines zweiten Elektromagneten verursacht auf dem Papierstreifen einen andern Punkt, dessen Lage zu den Secundenpunkten genau bestimmt werden kann, wodurch die Durchgangszeit des Sterns durch den Faden ermittelt ist. An dem Registrirapparat ist in c ein Galvanoskop zur Prüfung der Stärke des elektrischen Stroms und noch verschiedene kleine Hülfssapparate angebracht.

Die Chronographen oder Registrirapparate wurden in die Astronomie bald nach Erfindung der Telegraphie eingeführt, zuerst in America, und sind in verschiedener Form herge stellt. An einigen Sternwarten ist statt des Streifens ein Blatt Papier um eine Walze

gespant, auf welchem die Uhr- und Signalepunkte für den Durchgang des Sterns markirt werden. Der hier abgebildete auf der leipziger Sternwarte befindliche Chronograph ist in der angegebenen Form zuerst von Hansen in Gotha beschrieben.

In Fig. 1 auf derselben Tafel ist ein anderes, auf vielen Sternwarten vorhandenes Instrument, ein Photometer, dargestellt, mit welchem die Helligkeiten der Sterne gemessen werden. Auf einem Stativ ist eine drehbare Achse i, auf der eine horizontale Achse steht, die in a ein Gefäß für Petroleum trägt, welches durch eine communicirende Röhre mit einer Lampe in Verbindung steht, zu der durch die Röhren g die Luft zugeführt wird. b ist ein durch das Gegengewicht h balancirtes Fernrohr, welches auf jeden beliebigen Stern am Himmel gerichtet werden kann. Durch eine senkrecht zum Fernrohr stehende Röhre, in welcher eine Linse sitzt, und durch einen unbedienten Glaspiegel im Fernrohr, erzeugt man von der Flamme im Fernrohr einen künstlichen Stern. In der Röhre befinden sich zwei Nicol'sche Prismen, welche das Licht von der Flamme polarisiren, und durch die Drehung der Nicols gegen einander, welches durch den Hebelarm d geschieht, kann das polarisirte Licht des künstlichen Sterns abgeschwächt werden. Wenn man den künstlichen Stern mit einem im Fernrohr direct gesehenen zu gleicher Helligkeit bringt und dasselbe Verfahren mit einem andern Stern am Himmel anstellt, läßt sich aus der Größe der Drehung der Nicols, welche Drehung an dem Theilkreise c abgelesen wird, die Lichtmenge der beiden Sterne am Himmel zueinander berechnen, da die Physik lehrt, daß die Lichtmengen, welche durch die Nicol'schen Prismen gehen, sich wie die Quadrate der Cosinusse der von einem bestimmten Nullpunkte an gemessenen Drehungswinkel verhalten.

Die Sterne am Himmel sind aber oft verschiedenfarbig und deshalb ist in der Röhre noch ein senkrecht auf die Achse geschliffener Bergkry stall angebracht, durch dessen Drehung es möglich ist, das Licht des künstlichen Sterns von gleicher Farbe mit der des natürlichen Sterns zu machen. Das Maß der Drehung wird an dem Kreis e abgelesen. Das Instrument mit den Nicol'schen Prismen und dem aus Bergkry stall bestehenden Colorimeter hat zuerst Jöllner construirt und heißt daher ein Jöllner'sches Photometer.

Andere kleinere Instrumente, die sich noch auf Sternwarten befinden, kommen auch oft in physikalischen Cabineten vor und sind theils schon in dem Abschnitt Physik erwähnt.

f) Sternwarten.

Wo und wie die alten Chaldäer, Aegypter und Chinesen beobachtet haben, ist uns nicht genau bekannt, höchstwahrscheinlich gingen sie einfach ins Freie und bedienten sich sehr bald, um ganz freie Aussicht zu haben, der Thürme.

Die Sternwarte in Alexandria, an welcher Hipparch und Ptolemäus beobachteten, war an der Bibliothek der alexandrinischen Akademie und höchst wahrscheinlich auf der Plattform eines Thurms. Auf Beib in Samaratland beobachtete ebenfalls auf einem Thurme und werden alle Astronomen des Mittelalters, um den Horizont frei zu haben, die Thürme allen andern Beobachtungsorten vorgezogen haben. Der Landgraf Wilhelm IV von Hessen ließ auf seinem Schloße in Kassel im Jahre 1561 ein Observatorium errichten; die Sternwarte in Kopenhagen wurde auf dem neuen Thurme in den Jahren 1632—56 erbaut; Jöved beobachtete auf seinem eigenen Hause in Danzig, wo

er 1641 eine Sternwarte errichtete; in Prag, in Wien, an vielen Orten in Italien verwandte man Thürme zu Sternwarten. Man kann gewöhnlich von den Thürmen den ganzen Himmel bis zum Horizont übersehen, und solange als die Instrumente nur zum Beschauen der Gestirne angewandt wurden, resp. zur rohen Messung, genügten solche Thürme vollständig. Um genaue Messungen anzustellen, bedürfen aber die Instrumente der festen Aufstellung und einer gegen den Wind und sonstige Witterungsverhältnisse besonders geschützten Lage; außerdem ist der Vortheil, die Sterne bis zum Horizonte zu sehen, nur ein illusorischer, da die Verzerrungen der Bilder, das starke Funkeln der Sterne, die von wechselnden Temperaturen, von auf- und niedersteigenden Luftströmungen herrührende veränderliche Strahlenbrechung, genaue Beobachtungen der Gestirne in der Nähe des Horizonts schwer erlaubt. Den Instrumenten kann man, wenn sie nicht in der Höhe aufgestellt werden, eine viel größere Festigkeit geben als auf Thürmen, und schon Tycho de Brahe suchte sich zu einer Sternwarte die Insel Hven im Sund aus, um fast zur ebenen Erde, frei von Erschütterungen und in der Stille der Zurückgezogenheit die Beobachtungen anstellen zu können. Die hohen Sternwarten sind daher gegenwärtig fast ganz verlassen; eine freie doch etwas geschützte Lage, ein solider fester Bau mit Isoliren von den Ringmauern getrennten Fundamenten, sind jetzt die Hauptbedingungen bei der Anlage einer Sternwarte. Die Beobachtungsräume, welche als nothwendig erforderlich in einer neuen Sternwarte bezeichnet werden können, sind ein Meridianaal, wo entweder ein Passageninstrument im Meridian (Mittagsrohr) oder ein Meridiankreis aufgestellt werden, und ein Raum mit einer drehbaren Kuppel, in der ein größeres Instrument, ein Aequatoraal, seinen Platz finden kann. Wünschenswerth ist auch noch ein Beobachtungsraum mit einem Durchschnitt von Ost nach West, sowie einige Beobachtungsräume für kleinere Instrumente und eine Plattform oder Terrasse, um einzelne Beobachtungen ganz unter freiem Himmel anstellen zu können. Da der Astronom zu seinen Beobachtungen ruhige Luft braucht, die nur bei möglichst gleichen Temperaturen vorhanden ist, werden gewöhnlich die Mauern der Beobachtungsräume leicht gebaut, damit sie rasch die Temperatur der äußern Luft annehmen können, und für gute Ventilation, um schnell die Temperatur der innern Luft mit der der äußern auszugleichen, wird gesorgt. Da ferner in unsern Gegenden der Himmel selten klar, im Jahre nur an 100 bis 120 Abenden, ist der Astronom gezwungen, jeden heitern Moment zu benutzen, welches nur gesehen kann, wenn die Wohnräume sich unmittelbar an der Sternwarte befinden.

Betrachten wir die gegenwärtig thätigen Sternwarten, so ist ihre Zahl auf der ganzen Erde nicht sehr groß, etwa 100. Eine große Anzahl derselben sind in Universitätsstädten, damit der Director der Sternwarte gleich die Lehren der Sternkunde an der Universität vortragen kann, und nur in einigen Ländern gibt es von Lehranstalten getrennte Institute, in welchen der Astronom ganz und gar dem Dienste der Urania sich widmen kann.

Die Astronomie ist eine Wissenschaft, welche durch ihre Beschäftigung und ihre interessanten Resultate sich stets Freunde und Liebhaber gewonnen hat, die nicht unwesentlich zur Bereicherung der Wissenschaft haben beitragen können; es existiren daher auch einige Privatsternwarten und besonders in solchen Ländern, in welchen die Wichtigkeit der Astronomie als Förderung der Schiffahrt gewürdigt wird.

Nehmen wir die Sternwarten in alphabetischer Ordnung durch, so hat Deutschland Observatorien in folgenden Orten.

Altona, Director gegenwärtig Peters, hat eine kleine von Schumacher 1823 errichtete Sternwarte, welche lange Zeit als Mustersternwarte galt; ein Reichenbach'scher Meridiankreis und ein Aequatoraal mit Objectiv von 160 Millimeter Oeffnung sind die Hauptinstrumente.

Berlin hatte eine erste Sternwarte 1711 auf einem Thurme hinter der Akademie errichtet, welche 1832—35 durch eine neue Sternwarte, unter Ende erbaut, ersetzt wurde. Von zwei Meridiankreisen mit Kreisen von 1 Meter Durchmesser von Bissor und Martins hat der eine 190, der andere 110 Millimeter Oeffnung, das Aequatoraal (Refractor) von Upshneider und Fraunhofer hat 240 Millimeter Oeffnung. Director ist Förster.

Bist hat eine kleine Privatsternwarte, aus einer Stiftung Vengenbergs, seit dem Jahre 1846 der Stadt Düsseldorf gehörig. Director Luther hat dort eine große Anzahl kleiner Planeten entdeckt.

Bonn besitzt eine schöne Universitätssternwarte, unter dem gegenwärtigen Director Argelander erbaut. Ein Heliometer mit Objectiv von 160 Millimeter, ein Meridiankreis von Bissor und Martins mit 110 Millimeter Oeffnung sind die Hauptinstrumente.

Bothkamp bei Kiel in Holstein besitzt eine Privatsternwarte von Herrn von Balow 1870 vollendet, versehen mit einem vorzüglichen Aequatoraal von 290 Millimeter Oeffnung. Dr. Vogel, der Leiter dieser Sternwarte, beschäftigt sich hauptsächlich mit spectral-analytischen Untersuchungen der Gestirne.

Breslau (Galle ist Director) hat eine kleine Sternwarte auf dem Universitätsgebäude, den jetzigen Anforderungen nicht mehr entprechend.

Gotha, wo die erste Sternwarte von Zach 1791 auf dem Seeberge erbaut wurde, hat jetzt eine neue Sternwarte in der Stadt unter Hansen's Leitung. Das Hauptinstrument ist ein Aequatoraal von 110 Millimeter Oeffnung, mit einer von Hansen erfundenen eigenthümlichen Montirung, in der auf Aufhebung der Durchbiegung der Achsen besonders Rücksicht genommen ist.

Göttingen besitzt eine Universitätssternwarte, unter Gauß 1813—15 erbaut, mit einem Reichenbach'schen und einem Repsold'schen Meridiankreise. Director ist gegenwärtig Klinkerfues.

Hamburg (Director G. Rümker), hat eine Sternwarte, theils auch nautischen Zwecken gewidmet, unter E. Rümker 1830 vollendet, mit einem Repsold'schen Meridiankreise von 110 Millimeter Oeffnung und einem Aequatoraal von 260 Millimeter Oeffnung.

Königsberg (Director E. Luther), hat eine Universitätssternwarte, welche unter Bessel von 1811—13 erbaut wurde, mit einem Repsold'schen Meridiankreis und einem vorzüglichen Heliometer von Fraunhofer von 160 Millimeter Oeffnung.

Leipzig hatte seine Universitätssternwarte von 1794—1861 auf der Weissenburg und besitzt seit 1861 eine neue unter dem gegenwärtigen Director Bruns erbaute mit einem Meridiankreis von Bissor und Martins von 160 Millimeter Oeffnung und einem Aequatoraal von 220 Millimeter Oeffnung.

Lübeck hat eine kleine nautische Sternwarte unter Director Thiel's Leitung.

Manheim (Director Schönbels), besitzt seit 1772 eine Sternwarte auf einem hohen Thurme.

München (Director Lamont) hat seit 1817 eine gute Sternwarte in Bogenhausen unter Soldner erbaut, das Hauptinstrument ist ein Fraunhofer'scher

Refractor von 270 Millimeter Oeffnung und ein Meridiankreis (1 Meter Durchmesser) von Reichenbach von 110 Millimeter Oeffnung.

Kleinere Sternwarten waren früher thätig in Danzig, Marburg, Speier, Tübingen, auch existiren solche in Halle, Jena u. s. w.

Oesterreich hat zwei Sternwarten in Wien, die eine unter C. von Littrow's Direction auf dem alten Universitätsgebäude, die andere ist eine Privatsternwarte von dem Astronom Th. von Oppolzer erbaut; ferner eine Sternwarte in Prag (Director Hornstein), eine in Kralau (Director Karliniski), eine in Kremsmünster (Director Abt Reshuber); vier davon befinden sich auf hohen Gebäuden, nur Kralau entspricht den jetzigen Anforderungen an Sternwarten theilweise. Die Instrumente sind in Wien und Kralau Meridiankreise von 1 Meter und Aequatoreale mit etwa 160 Millimeter Oeffnung.

Die Sternwarten in Ofen, Olmütz und Senftenberg (die beiden letzten Privatsternwarten) sind eingegangen.

Die Schweiz hat eine kleine Sternwarte in Genf (Director Plantamour), eine neue 1859 unter Girsh erbaute in Neuenburg, mit einem Meridiankreis von 1 Meter Durchmesser und 130 Millimeter Oeffnung von Ertel in München, und eine neue eidgenössische Sternwarte in Jürich (Director Wolf).

Italien besitzt Sternwarten in Bologna; in Florenz (Director Donati) wird eine neue mit einem großen Refractor von 240 Millimeter Oeffnung gebaut; in Mailand (Director Schiaparelli) ist eine Universitätssternwarte auf dem Gebäude Brera; in Modena ist Ragona Director; in Neapel ist Gasparis Director und hat eine neue Sternwarte mit einem Repsold'schen Meridiankreis erhalten; in Padua ist Director Santini; in Palermo ist Director Cacciatores, unter Piazzini hatte die Sternwarte eine große Berühmtheit; in Rom gibt es zwei Sternwarten: eine auf dem Capitol unter Respighi und eine im Collegio Romano unter Sechi, diese mit einem Aequatoreal von 240 Millimeter Oeffnung; ferner ist noch eine kleine Sternwarte in Turin auf einem Thurme.

Griechenland besitzt eine Sternwarte in Athen, 1847 vom Baron von Sina errichtet, wo mit noch kleinen Instrumenten Zul. Schmidt thätig ist.

Rußland besitzt eine Menge sehr schöner neuer Sternwarten. In Dorpat (1804 erbaut) wurde unter W. Struve ein Refractor von 240 Millimeter Oeffnung und ein Reichenbach'scher Meridiankreis erworben. Struve's Nachfolger wurde Mädler und gegenwärtig ist Clausen Director. In Helsingfors, 1831—33 unter Argelander errichtet, befindet sich ein Reichenbach'scher Meridiankreis und ein Refractor von 170 Millimeter Oeffnung, Director ist jetzt Krüger. In Kasan (Director Kowalski) ist die Sternwarte 1814 erbaut, sie besitzt einen Fraunhofer'schen Refractor von 240 Millimeter Oeffnung. In Moskau (Director Schweizer) ist ein Repsold'scher Meridiankreis und ein Refractor von 270 Millimeter Oeffnung. Nicolajeff, Director Hübner, hat eine Navigationssternwarte; eine Universitätssternwarte ist in Odessa (Director Verfiewicz). In Kiew (Director Chandritow) hat die Sternwarte einen Refractor von 240 Millimeter Oeffnung, in Wilna (Director Smislow) einen heliographischen Apparat, um Sonnenphotographien anzufertigen; in Warschau ist 1824 eine Sternwarte vollendet, in der sich ein Reichenbach'scher Meridiankreis befindet. Director ist gegenwärtig Wostokoff. In Petersburg ist eine Universitätssternwarte unter Samojisch's Direction auf einem Thurme. In Pultowa ist die größte Sternwarte, 1839

unter W. Struve vollendet, dem als Director sein Sohn D. Struve folgte, ausgerüstet mit den vorzüglichsten Instrumenten, mit einem Repsold'schen Meridiankreis von 1 Meter und 140 Millimeter Oeffnung, einem Refractor von 380 Millimeter Oeffnung, einem Heliometer von 190 Millimeter Oeffnung und einer großen Menge neuer Instrumente, z. B. einem Verticalkreise u. s. w.

Schweden und Norwegen besitzen Sternwarten in Lund, 1866 erbaut, Director ist Møller, mit einem Refractor von 240 Millimeter Objectivöffnung; in Uppsala, Director Ewanberg, erbaut 1854, mit einem ebenso großen Instrumente als in Lund. Eine akademische Sternwarte ist in Stockholm, Director Goldén, eine Universitätssternwarte hat ferner Christiania, Director Jeannet, mit einem Repsold'schen Meridianinstrument und einem Refractor von 190 Millimeter Oeffnung. Eine kleine Sternwarte ist noch in Bergen.

Dänemark hat eine neue Sternwarte, im Jahr 1858 erbaut, in Kopenhagen unter d'Arrest's Leitung mit einem Meridiankreis von Bistur und Martins von 130 Millimeter Oeffnung und einem Refractor, dessen Objectiv 270 Millimeter Oeffnung hat.

Großbritannien und Irland besitzt eine sehr große Anzahl von Sternwarten, sowohl Staats-, als Privatsternwarten. Die Sternwarte in Greenwich wurde 1674 vollendet, und Flamsteed war ihr erster Director, dem Halley, Bradley, Bliss, Maskelyne, Pond und Airy folgten; sowohl unter Bradley wie unter Airy wurden die Instrumente erneuert und gegenwärtig sind die Hauptinstrumente ein Meridiankreis mit 200 Millimeter Oeffnung, ein Aequatoreal von 325 Millimeter Oeffnung und ein Altazimuthinstrument. Oxford hat eine Sternwarte, zur Zeit unter A. Wain's Leitung, zu der der Herzog von Marlborough das Terrain, Dr. Radcliffe die Mittel schenkte, und die 1772 gegründet wurde. Die Sternwarte besitzt jetzt einen Meridiankreis, sowie ein Repsold'sches Heliometer von 190 Millimeter Oeffnung. Eine Sternwarte in Cambridge (Director Adams) ist 1820 errichtet, der Meridiankreis hat 130 Millimeter Oeffnung, ein vom Herzog von Northumberland geschenktes Aequatoreal mißt 325 Millimeter Oeffnung. Dublin ist zu neuester Zeit unter Brännow's Direction mit einem Aequatoreal von 300 Millimeter Oeffnung versehen und erhält einen großen Meridiankreis von Bistur und Martins. Die Sternwarte in Durham steht unter Chevallier's Direction; die 1818 erbaute in Edinburgh, zur Zeit unter Smyth, besitzt einen Repsold'schen Meridiankreis von 160 Millimeter Oeffnung; die in Glasgow unter Grant hat einen ähnlichen Meridiankreis von Ertel; auf der Sternwarte in Kew beschäftigen sich Stuart und Edwy besonders mit Beobachtungen der Sonne, meteorologischen und magnetischen Beobachtungen. Liverpool hat eine neue Sternwarte erhalten, das Aequatoreal hat 200 Millimeter Oeffnung; die Sternwarte am Stonyhurst College erhielt 1861 eine neue Kuppel und ein gleich großes Aequatoreal wie Liverpool es hat; die Sternwarte in Armagh ist 1793 errichtet und Robinson hat einen guten Sternkatalog angefertigt. In Portsmouth ist eine Marinesternwarte.

Von den Privatsternwarten besitzt die von Lord Rosse in Birr-Castle das schon erwähnte große Spiegelteleskop mit Spiegel von fast zwei Meter Oeffnung. In Cardington bei Bedford hat Mr. Whitbread eine Sternwarte; in Churt (Surrey) ist Carrington beschäftigt; in Cranford bei London arbeitet Warren de la Rue mit einem Spiegelteleskope von 300 Millimeter Oeffnung an photographischen Aufnahmen des Mondes

und anderer Himmelskörper; in Crumppall bei Manchester hat Worthington sein Observatorium. In London hat Mr. Bishop die Sternwarte seines Vaters, jetzt in Twickenham, an der Hind mit dem Aequatoreal von 180 Millimeter Oeffnung beobachten läßt. Eine andere Sternwarte in London (in Lepton) errichtete Mr. Barclay. Auf einer Privatsternwarte in Larn Barn mißt Mr. Fletcher besonders Doppelsterne, in Zulsehill bei London untersucht Mr. Huggins mit einem ihm von der englischen astronomischen Gesellschaft verschafften Aequatoreal von 380 Millimeter Oeffnung die Spectra der Himmelskörper.

Holland besitzt zwei Sternwarten: eine neue in Leyden, 1860 unter Kaiser erbaut, das Hauptinstrument ist ein Meridiankreis von Bistor und Martins mit 160 Millimeter Oeffnung, der Refractor hat 190 Millimeter Oeffnung; die in Utrecht 1853 neu errichtete Sternwarte hat ein Aequatoreal von 270 Millimeter Oeffnung.

Belgien hat seine Sternwarte unter Duetelet's Direction in Brüssel theils noch mit Instrumenten älterer Construction versehen.

Frankreich besitzt eine große Sternwarte in Paris, welche unter Ludwig XIV. von 1668—71 erbaut wurde, und deren erste Directoren die Cassinis waren. Unter Leverrier's Directorat wurde ein großes Aequatoreal von 300 Millimeter Oeffnung und ein Meridiankreis mit Fernrohr von 240 Millimeter Oeffnung aufgestellt. Director ist gegenwärtig Delanay. Eine Filialsternwarte von Paris ist unter Stephan's Leitung in Marseille, welche ein Spiegelteleskop mit Foucault'schem Silber Spiegel besitzt.

In Spanien sind zwei Sternwarten, die erste in Madrid mit einem Meridiankreis von Resford von 135 Millimeter Oeffnung und einem Merz'schen Aequatoreal von 270 Millimeter Oeffnung, die andere in San-Fernando bei Cadix ist nur eine Marinesternwarte.

Portugal hat zwei Sternwarten, eine ältere in Coimbra, eine neue in Lissabon, zu welcher ein großes, dem pulkwaer ganz gleicher Meridiankreis und ein gleiches Aequatoreal in Hamburg bei Resford angefertigt sind.

In Amerika ist in den Vereinigten Staaten sehr viel für die Astronomie gethan worden; die meisten Sternwarten daselbst sind aus Privatmitteln errichtet und durch Dotationen verbessert. In der Stadt Albany ist durch Gould eine Sternwarte ins Leben gerufen, zu der eine Miss Dudley allein 105000 Dollars geschenkt hat. Die Instrumente sind ein großer Meridiankreis von Bistor und Martins von 160 Millimeter Oeffnung und ein Aequatoreal mit 240 Millimeter Oeffnung. Ann Arbor, im Staate Michigan, wo Watson Director, hat ebenso vorzügliche Instrumente. Cambridge bei Boston, Director ist jetzt Winlock, besitzt ein Aequatoreal von 380 Millimeter Oeffnung und einen Meridiankreis von 210 Millimeter Oeffnung. Chicago, erst neu errichtet, Director ist Safford, hat ein Aequatoreal mit Objectivglas von 425 Millimeter Oeffnung, mit welchem Clarke den Begleiter des Sirius entdeckte und außerdem einen Meridiankreis. In Clinton am Hamilton-College im Staate Newyork hat die Sternwarte ein Aequatoreal von 270 Millimeter Oeffnung, mit welchem der Director Peters eine Anzahl kleiner Planeten entdeckt hat. Cincinnati, Director Cleveland Abbe, und Georgetown besitzen auch neuere Sternwarten, ebenso Philadelphia und Quebec. Die Nationalsternwarte der Vereinigten Staaten dagegen ist in Washington, 1842—45 erbaut, stand unter der Direction von

Maury, Davis, Gillis und jetzt unter Sands, besitzt ein großes Aequatoreal von 270 Millimeter Oeffnung, einen Meridiankreis von Bistor und Martins mit 240 Millimeter Oeffnung und andere große Instrumente.

In Südamerika sind bis jetzt wenig Sternwarten. Santiago de Chile besitzt einen Meridiankreis von Bistor und Martins und wird ein Aequatoreal von 240 Millimeter Oeffnung erhalten. In Rio de Janeiro befindet sich seit kurzer Zeit auch ein Observatorium; eine neue Sternwarte in Cordoba (Argentinische Republik) unter Gould ist im Bau und eine andere soll unter P. Menten in Quito errichtet werden.

Afrika hat am Vorgebirge der Guten Hoffnung seine Sternwarte, wo Maclear lange Zeit thätig gewesen und Stone gegenwärtig Director ist. Sie ist versehen mit guten Instrumenten, einem Meridiankreis und einem Aequatoreal mit Fernrohr von 2, Meter Brennweite.

Asien hat thätige Sternwarten in Madras, wo ein englischer Astronom Pogson Director ist, und in Batavia (mehr zu geographischen Zwecken) unter Leitung des Holländers Dubemans. In Peking ist ein kleineres russisches Observatorium und sollte ein größeres von dem Himmlischen Reiche eingerichtet werden.

Australien hat eine Sternwarte in Melbourne, Williamstown, Director ist Ellery, mit einem Meridiankreis von 125 Millimeter Oeffnung, einem Aequatoreal von 115 Millimeter Oeffnung und einem neuen großen Spiegelteleskop; eine andere Sternwarte ist in Sydney. Eine Privatsternwarte in Wimbjor (in New-South-Wales) steht unter Lebbutt's Leitung; die Sternwarte in Parramatta, vor 50 Jahren von Brisbane errichtet, scheint nicht mehr in Thätigkeit zu sein.

Unsere Taf. 8 enthält die Darstellungen mehrerer Sternwarten. In Fig. 1 die Ansicht der Sternwarte in Greenwich, in Fig. 2 die Ansicht der schönen Sternwarte in Pulkowa und zwar von der Nordseite, in Fig. 3 die Ansicht von der Südseite; in Fig. 4 ein horizontaler Durchschnitt derselben; Fig. 5 und 6 sind von Leipziger Sternwarte Darstellungen von der Nord- und Südseite, in Fig. 7 der Durchschnitt derselben.

In allen diesen Sternwarten erkennt man mit Leichtigkeit die Kuppeln für die Aequatoreale und Refractoren, die Beobachtungszimmer für Meridiankreise, Mittagshöhre und Passageninstrumente von Ost nach West. Die Sternwarte in Pulkowa hat eine Hauptkuppel und zwei Nebenkuppeln und besitzt auf ihrem Terrain noch sieben kleinere Kuppeln, die theils zur Aufstellung kleinerer Instrumente, zum Unterricht in geographischen Ortsbestimmungen oder zur Aufstellung kleinerer Refractoren, Photometer u. s. w. dienen. Die pulkwaer Hauptsternwarte hat zwei große Meridianfale und einen Saal für einen Verticalkreis von Ost nach West (Fig. 4). Die Wohnungen der Astronomen schließen sich in zwei besonders hügeligen an die Sternwarte an. Die Leipziger Sternwarte hat zwei Kuppeln und noch eine alleinstehende Kuppel zu spectral-analytischen Untersuchungen. Sie besitzt ein größeres und ein kleineres Meridianzimmer und ein Beobachtungszimmer mit Durchschnitt von Ost nach West (Fig. 7). Als Wohnungsraum des Directors dient bei derselben der westliche Anbau, als Wohnungen für die Assistenten ein Theil des östlichen Anbaues.

Fig. 8, 9, 10 enthalten das Innere der Leipziger Sternwarte; in Fig. 8 ist der Kuppelraum mit dem Aequatoreal, Uhr, transportablem Fernrohr, einem Kometenjucher. Fig. 9 zeigt das Innere des Meridianzimmers mit dem Meridiankreis und den nöthigen

Hülfsapparaten; Fig. 10 das Innere der kleinen östlichen Kuppel mit einem kleinen Refractor, einem Photometer u. s. w.

Zum Schlusse geben wir eine Uebersicht der geo-

graphischen Lage der hauptsächlichsten öffentlichen und Privatsternwarten in alphabetischer Ordnung, wobei die Privatsternwarten durch ein vorgezeichnetes Sternchen ausgezeichnet sind.

Lage der hauptsächlichsten Sternwarten.

Name des Ortes.	Geo- graphische Breite.	Länge von Berlin in Zeit		Name des Ortes.	Geo- graphische Breite.	Länge von Berlin in Zeit	
		+ westlich — östlich	h m s			+ westlich — östlich	h m s
Alban	+ 42 39' 8"	+ 5 48 33		* London (Mr. Bishop's Obs.)	+ 51 27' 2"	+ 0 51 48	
Altona	+ 53 32' 8"	+ 0 13 49		* London (Mr. Barclay's Obs.)	+ 51 34' 6"	+ 0 53 36	
Am Harbör	+ 42 16' 8"	+ 0 28 30		Lübeck	+ 53 54' 5"	+ 0 10 48	
Birmagb	+ 54 21' 2"	+ 1 20 10		Lund	+ 55 41' 9"	+ 0 30 30	
Atten	+ 37 58' 3"	- 0 41 21		Nabras	+ 13 4' 1"	- 4 27 32	
Batabia	- 6 7' 6"	- 6 13 38		Nabris	+ 40 24' 5"	+ 1 5 20	
Berlin	+ 52 30' 3"	0 0 0		Nailand	+ 45 28' 0"	+ 0 15 48	
Biff	+ 51 12' 4"	+ 0 26 50		Manheim	+ 49 22' 2"	+ 0 19 44	
* Birn-Castle (Lord Rosse)	+ 53 5' 8"	+ 0 25 16		Maricelle	+ 43 17' 8"	+ 0 32 6	
Bologna	+ 44 29' 8"	+ 0 8 10		Melbourne	+ 37 49' 9"	+ 8 46 13	
Bonn	+ 50 43' 7"	+ 0 25 11		Mobena	+ 44 38' 9"	+ 0 9 32	
* Boishamp (bei Kiel)	+ 54 12' 2"	+ 0 13 4		Moskau	+ 55 45' 3"	- 1 36 45	
Breslau	+ 51 6' 9"	- 0 14 34		Wilmshen	+ 48 8' 7"	+ 0 7 9	
Brüssel	+ 50 51' 2"	+ 0 36 6		Neapel	+ 40 51' 8"	+ 0 3 24	
Cambridge (England)	+ 52 12' 9"	+ 0 53 12		Neuchâtel	+ 47 0' 0"	+ 0 25 45	
Cambridge (Mass.)	+ 42 22' 8"	+ 5 38 6		Neuport	+ 40 52' 7"	+ 5 49 31	
* Cardington (bei Bedford)	+ 52 6' 4"	+ 0 55 14		Nicolajeff	+ 46 58' 3"	- 1 14 19	
Chicago	+ 41 50' 0"	+ 6 44 1		Orford	+ 51 45' 6"	+ 0 58 37	
Christiania	+ 59 54' 7"	+ 0 10 41		Padua	+ 45 24' 0"	+ 0 6 6	
* Churt (Currey)	+ 51 8' 8"	+ 0 56 37		Palermo	+ 38 6' 0"	+ 0 11 1	
Clinton (Newport)	+ 43 3' 3"	+ 5 55 12		Paris	+ 48 50' 2"	+ 0 44 18	
Coinbra	+ 40 12' 4"	+ 1 27 9		Petersburg	+ 59 56' 5"	- 1 7 39	
* Cranford	+ 51 29' 0"	+ 0 55 13		Philadelphie	+ 39 57' 1"	+ 54 13	
* Crumphaill (bei Manchester)	+ 53 30' 8"	+ 1 9 31		Portsmouth	+ 50 48' 0"	+ 0 57 30	
Dorpat	+ 58 22' 8"	- 0 53 19		Prag	+ 50 5' 3"	- 0 4 6	
Dublin	+ 53 23' 2"	+ 1 18 57		Pulkowa	+ 59 46' 3"	+ 1 7 44	
Durham	+ 54 46' 1"	+ 0 59 55		Quebec	+ 46 45' 5"	+ 5 33 24	
Edinburgh	+ 55 57' 4"	+ 1 6 18		Rio de Janeiro	- 22 58' 8"	+ 3 46 11	
Flotenz	+ 43 46' 1"	+ 0 8 33		Rom	+ 41 53' 9"	+ 0 23 30	
Genf	+ 46 12' 0"	+ 0 28 58		San Fernando (bei Cadix)	+ 36 27' 7"	+ 1 18 25	
Georgetown-College, D. C. (B. St.)	+ 38 54' 4"	+ 6 1 53		Santiago de Chile	- 33 26' 4"	+ 5 36 8	
Glasgow	+ 55 52' 7"	+ 1 10 47		Stodholm	+ 59 20' 6"	+ 0 18 39	
Göttha (neue Sternwarte)	+ 50 56' 6"	+ 0 10 44		Stonvurst College	+ 53 50' 7"	+ 1 3 27	
Göttingen	+ 51 31' 8"	+ 0 13 49		Sydney	- 33 51' 7"	- 9 11 35	
Greenwich	+ 51 28' 6"	+ 0 53 35		* Tarn Bank	+ 54 39' 2"	+ 1 8 30	
Hamburg	+ 53 33' 1"	+ 0 13 41		* Tulle Hill (bei London)	+ 51 26' 8"	+ 0 54 3	
Helsingfors	+ 60 9' 7"	- 0 46 16		Turin	+ 45 4' 1"	+ 0 22 46	
Kew	+ 55 47' 4"	- 2 22 54		Uppsala (neue Sternwarte)	+ 59 51' 5"	- 0 15 53	
Königsberg	+ 51 28' 1"	+ 0 54 50		Utrecht	+ 52 3' 3"	+ 0 3 3	
Kopenhagen	+ 54 42' 8"	- 0 28 24		Vorberge der Guten Hoffnung	- 33 56' 0"	- 0 30 30	
Kranau	+ 55 41' 2"	+ 0 3 16		Warschau	+ 52 13' 1"	- 0 30 32	
Kremsmünster	+ 50 3' 8"	- 0 26 16		Washington	+ 38 53' 6"	+ 6 1 47	
Leiden	+ 48 3' 4"	- 0 2 57		Wien	+ 48 12' 6"	- 0 11 56	
Leipzig	+ 52 9' 3"	+ 0 35 39		* Wien (Oppolzer's Obs.)	+ 48 12' 9"	- 0 11 50	
Lissabon	+ 51 20' 1"	+ 0 4 1		Wilna	+ 54 41' 0"	- 0 47 37	
Liverpool	+ 53 24' 8"	+ 1 5 35		* Windsor (Neufchâtel)	- 33 36' 5"	- 9 9 41	
				Zürich	+ 47 52' 5"	- 0 19 38	

Erdkunde.

Bearbeitet

VON

Dr. Bernhard von Cotta,

und

Dr. Johann Müller,

Professor der Geognosie an der Bergakademie zu Freiberg
und königlich sächsischer Bergrath.

Professor der Physik an der Universität zu Freiburg im
Breisgau und großherzoglich badischer Hofrath.

I n h a l t.

	Seite		
Einleitung	3	Innerer Bau der festen Erdruste und der Gebirge (Tafel 11)	11
Geologie. Bearbeitet von Prof. Dr. B. von Cotta.		Geologische Karte von Deutschland (Tafel 12)	12
Textur, Absonderung, Schichtung und Lagerung der Gesteine. (Tafel 1.)			
Textur	3	Meteorologie. Bearbeitet von Professor Dr. J. Müller. (Tafel 13 bis 16.)	
Absonderung und Schichtung	4	Vertheilung der Wärme auf der Erdoberfläche.	
Lagerung	6	Temperatur der untern Luftschichten	13
Kohlen und Steinsalz (Tafel 2)	7	Temperatur der höhern Luftschichten	14
Erzlagerstätten (Tafel 3)	9	Temperatur des Bodens und der Quellen	15
Organismen der geologischen Perioden. (Tafel 4 bis 7.)		Temperatur der Meere	16
Triasperiode	12	Das Luftmeer, sein Druck und seine Strömungen.	
Jura- und Kreideperiode	12	Größe und Variationen des Luftdrucks	17
Tertiärperiode	13	Winde und Stürme.	18
Grauwackenperiode	14	Hydrometeore	19
Vulkane (Tafel 8)	15	Die atmosphärischen Lichterscheinungen	20
Höhlen und Quellen. (Tafel 9.)		Die elektrischen Erscheinungen der Atmosphäre	21
Höhlen	16		
Quellen	17		
Erdoberflächengestaltung. (Tafel 10.)			
Berg- und Felsformen	17		

Einleitung.

Die Erdkunde im weitesten Sinne des Wortes umfaßt die Gesamtheit aller wissenschaftlichen Disciplinen, deren Aufgabe es ist, die Kenntniß unsers Erdkörpers nach verschiedenen Richtungen hin zu erweitern. In diesem Sinne ist aber das Gebiet der Erdkunde ein so ausgedehntes, daß es nothwendig in mehrere selbständige Gebiete abgetheilt werden muß, und es wurden ihm deshalb auch im „Wilder-Atlas“ drei verschiedene Abtheilungen zugewiesen: die Geographie, die Astronomie und die vorliegende Abtheilung Erdkunde, welche die Geologie und Meteorologie umfaßt.

Die Geographie oder Erdbeschreibung hat die Vertheilung des Festen und Flüssigen, die Gestaltung der Festländer, den Zug der Gebirge und den Lauf der Flüsse, und namentlich auch die Erdoberfläche als Wohnsitz des Menschengeschlechts zu betrachten.

Die Astronomie beschäftigt sich mit der Stellung der Erdoberfläche in unserm Planetensystem, besonders mit den Beziehungen der Erde zur Sonne und den mit ihrer jährlichen Wandering um die letztere zusammenhängenden Veränderungen der Insolation verschiedener Erdgürtel.

Dem aus der Erdoberfläche sich entwickelnden Thier- und Pflanzenleben und der systematischen Beschreibung der Mineralien sind die besondern Disciplinen der Zoologie, der Botanik und der Mineralogie gewidmet.

Die Geologie untersucht den Bau der festen Erdrinde sowie die Natur der Gesteine und Felsmassen, aus denen dieselbe zusammengesetzt ist, um an der Hand der so ermittelten Thatfachen über die Entstehungsgeschichte der Erde Licht zu verbreiten.

Die Meteorologie endlich ist derjenige Theil der Erdkunde, welcher sich mit den Erscheinungen in der Atmosphäre, vorzugsweise auch mit den sogenannten Meteoren beschäftigt. Ihr fällt also die Aufgabe zu, das Wollen der Naturkräfte, welche uns die Physik im Laboratorium lehren lehrt, im Großen, in der Gestaltung der Witterungsverhältnisse nachzuweisen.

Geologie.

Bearbeitet von Professor Dr. B. von Cotta.

Textur, Absonderung, Schichtung und Lagerung der Gesteine.

(Tafel I.)

Textur.

Unter der Textur der Gesteine verstehen wir die Art und Weise, in welcher die einzelnen Mineraltheile, aus denen sie bestehen, gestaltet und untereinander verbunden sind. Am auffallendsten treten dabei die Unterschiede der Größe der einzelnen Gemengtheile hervor; hiernach unterscheidet man deutlich und un-

deutlich zusammengeordnete, oder gemengte Gesteine, je nachdem man ihre einzelnen Bestandtheile mit unbewaffnetem Auge unterscheiden kann oder nicht. Im letztern Falle nennt man die Gesteine auch wol dicht, im erstern lödriß. Schließt dagegen eine dichte Hauptmasse einzelne krystallinische Gemengtheile oder Krystalle ein, so nennt man diese Textur porphyrartig. Ein anderer Hauptunterschied der Textur ist dadurch bedingt, daß die Gemengtheile entweder krystallinisch miteinander verwachsen sind, wie bei dem deutlich gemengten Granit, oder durch irgendein Bindemittel (etwa Thon) zusammengehalten werden, wie in den Sandsteinen und Conglomeraten. Bei deutlich gemengten Gesteinen kann man diesen Unterschied mit unbewaffnetem Auge erkennen, bei undeutlich gemengten oder dichten aber nur unter dem Mikroskop an ganz feinen Splitteln oder Dümschliffen.

Das sind die Hauptunterschiede der Textur, die sich nicht sogleich durch Abbildungen darstellen lassen. Daran reihen sich aber einige Erklärungen, die zwar nicht alle der Textur im engeren Wortsinne entsprechen, aber doch dazu gerechnet zu werden pflegen. Diese lassen sich zum Theil durch Abbildungen veranschaulichen, so z. B.:

1) Die porphyrische Textur, welche am deutlichsten an dem sogenannten Erbsenstein von Karlsbad erkennbar ist. Derselbe besteht aus lauter kugelförmigen Körnern, gewöhnlich ungefähr von der Größe einer Erbse, welche durch tobensteinfarbenen Kalk zusammengehalten werden, während sie selbst aus radial-faserigen Kalkspat oder Aragonit bestehen, der in concentrischen Lagen einen fremdartigen Kern, z. B. ein Sandkorn, umgibt, wie das der Querschnitt einer solchen Erbse auf Taf. 1, Fig. 2 zeigt, während Fig. 1 ein ganzes Stück solchen Erbsensteins darstellt. Die Entstehung dieser sonderbaren Textur ist bei Karlsbad leicht nachweisbar. Die sehr kalkhaltigen Quellen spülen kleine Körner von dem Granit ab, aus dem sie entspringen, bewegen diese durch ihre Strömung und lagern dabei dünne concentrische Schichten um jedes Sandkorn ab, bis die so gebildete Erbse so schwer ist, um noch vom Wasser bewegt werden zu können, worauf sie auf dem Boden liegen bleibt und mit andern Erbsen durch Kalkablagerung zusammengeleitet wird. Auf eine etwas andere Weise muß allerdings der in sehr ausgedehnten Schichten oder Ablagerungen auftretende, in seiner Textur dem Erbsenstein analoge, sogenannte Nogenstein gebildet worden sein.

2) Die schieferige Textur, welche darin besteht, daß ein Gestein nach einer Ebene am leichtesten spaltet oder sogar nach dieser Richtung deutlich zerklüftet ist, tritt am deutlichsten beim Thonschiefer, Dachschiefer und Tafelschiefer auf, etwas weniger vollkommen aber auch beim Glimmerschiefer, Gneis, Chloritschiefer, an manchen Kalksteinen, Sandsteinen, Kohlen u. s. w. Sie ist entweder veranlaßt durch die parallele Lage dünner Mineralblättchen, z. B. Glimmerblättchen, welche sogleich bei der Entstehung des Gesteins eine höchst dünne und zarte Schichtung veranlaßt haben, oder durch die Einwirkung eines spätern einseitigen Drucks, wodurch man auch künstlich schieferige Textur

in manchen vorher nicht schieferigen Massen hervorbringen kann. In diesem letztern Falle ist die Schieferung sehr oft nicht der Schichtung parallel, während sie im erstern stets dieser parallel läuft. Ein später zu besprechendes Beispiel der Art ist Fig. 16 abgebildet.

3) Die blasige Textur vieler, besonders eruptiver oder vulkanischer Gesteine, ist dadurch entstanden, daß irgendwelche Gaskarten, am häufigsten wol Wasserdämpfe, sich während des Erstverdens im Innern des Gesteins entwickelten und, da sie nicht mehr entweichen konnten, ihre Blasenform behielten. Es ist derselbe Vorgang, wie er beim Brotbacken stattfindet. Die Blasenräume der Gesteine zeigen theils regelmäßige, theils unregelmäßige, stets aber abgerundete — nie eckige — Formen. Die Verschiedenartigkeit dieser Formen läßt sich leicht durch ein Experiment erklären. Wenn man ein Glas (Fig. 3) mit einem zähen aber durchsichtigen Sirup füllt und durch ein Haarröhrchen schwach hineinbläst, so entwickelt sich an der Spitze des Röhrchens eine birn- oder balonförmige Blase, welche so lange mit ihrem untern dünnen Ende am Röhrchen haften bleibt, bis sie eine gewisse Größe erreicht, sich ablöst und aufsteigt. Während des Aufsteigens zieht die Blase ihre untere Verlängerung sogleich ein, und bildet eine Kugel. Wird aber nun die Flüssigkeit nach einer Richtung bewegt, wie etwa in einem fließenden Lavaström, so strecken sich die ursprünglich kugelförmigen Blasen alle nach der Bewegungsrichtung in die Länge, wie in Fig. 4. Bei unregelmäßiger Bewegung entstehen dagegen auch unregelmäßige Blasenräume, wie Fig. 5.

4) Mandelsteinartig nennt man die Textur der Gesteine, wenn ursprünglich vorhanden gewesene Blasenräume durch neue Mineralbildungen, am häufigsten Kalkspat, Kieselsubstanz oder Zeolith, ausgefüllt sind. Natürlich müssen auch diese Ausfüllungen oder Mandeln die regelmäßige und unregelmäßige Gestalt der Blasenräume annehmen. Die Art der Ausfüllung zeigt aber dabei noch eine sehr große Mannichfaltigkeit der Erscheinungen. Es ist nämlich diese Ausfüllung zuweilen durch Herabtropfen einer Solution von der Decke des Hohlraums stalaktitisch erfolgt, wie Fig. 8, oder dadurch, daß die Flüssigkeit an den Wänden hinabfließt und diese mit concentrischen Lagen bedeckt, wie Fig. 6, oder endlich in der Weise, daß die Flüssigkeit am Boden horizontale Schichten abgelagerte, die dann auch mit concentrischer Bildung zusammen auftreten können, wie Fig. 7.

Absonderung und Schichtung.

Jeder Fels, mag er auch noch so sprossig und lüthig, oder massig und compact erscheinen, ist dennoch von unzähligen Spalten oder Klüften durchzogen, in welchen der unmittelbare Zusammenhang der Gesteinsmasse unterbrochen ist. Die Klüfte können durch später eingebrungene Substanzen wieder verlitet sein, sodas die ursprünglich durch Klüfte getrennten Theile nicht ohne weiteres auseinanderfallen, aber der Zusammenhang durch solche Kittsubstanzen ist doch gewöhnlich nicht so fest, daß man sich bei der Benutzung für Bauten oder größere Kunstwerke sicher darauf verlassen könnte. Daher kommt es, daß man verhältnismäßig nur selten Felsmassen findet, aus denen sich sehr große Säulen, Platten, Gesteine oder dergleichen aus einem Stück, als sogenannte Monolithen, herstellen lassen. Einer der längsten dieser Monolithen dürfte die Alexanderssäule in Petersburg sein, welche sich, aus einem Granitstück bestehend, 84 Fuß über ihren Sockel erhebt,

Diese Klüfte, welche jede Felsmasse durchziehen und in mehr oder weniger kleine oder große Stücke zerlegen, nennt man theils Absonderungs-, theils Schichtungs-Klüfte, je nachdem sie erst nach der Bildung des Gesteins oder während desselben durch Uebereinlagerung einzelner Schichten entstanden sind.

Absonderung ist die allgemeinste dieser Erscheinungen; sie hat ausnahmslos alle Gesteine betroffen, mögen sie nun wie immer entstanden sein. Schichtung findet sich dagegen vorzugsweise nur bei den Gesteinen, welche durch Wasser abgelagert wurden, und dann aber stets auch noch das Phänomen der Absonderung nebenbei zeigen.

Betrachten wir deshalb zunächst die Verhältnisse der Absonderung etwas näher. Man pflegt allgemein zu unterscheiden unregelmäßige und regelmäßige Absonderung. Die unregelmäßige Absonderung besteht aus einer Zerklüftung nach unbestimmten Richtungen, sodas dadurch die einzelnen, durch Klüfte getrennten Theile unregelmäßige Formen zeigen. Dabei kann die Zerklüftung eine starke oder schwache sein, d. h. die einzelnen dadurch isolirten Theile sind klein oder groß. Im erstern Falle nennt man ein solches Gestein stark zerklüftet, wie das sehr häufig besonders bei Porphyr, Granit, Gneis, Hornstein u. s. w. vorkommt. Die größten Durchmesser der einzelnen Stücke betragen nur einige Zoll bis etwas über 1 Fuß; sind sie beträchtlich größer, ohne das sich eine bestimmte Grenze feststellen läßt, so nennt man die Absonderung eine massige oder großmassige, wie sie sehr häufig z. B. beim Granit, Syenit, Trachyt, auch bei manchen Kalksteinen, Sandsteinen u. s. w. gefunden wird.

Es versteht sich wol von selbst, daß massig oder großmassig abgeordnete Gesteine sich weit mehr zu Bausteinen oder Kunstwerken eignen, als stark zerklüftete, die man höchstens zu Straßenschotter verwenden kann, wenn sich ihre übrigen Beschaffenheiten dazu eignen.

Weit auffallender und interessanter als die unregelmäßige Absonderung ist die regelmäßige, durch Klüfte, welche local nach bestimmten Richtungen orientirt sind und sich überdies noch unter gleichen oder ähnlichen Winkeln schneiden. Dadurch entsteht dann: plattenförmige, schalige, parallelipipedische, kubische, rhomboedrische, säulene oder Pfeilerförmige Absonderung, d. h. die einzelnen durch Klüfte getrennten, in sich aber compacten Gesteinstheile gleichen mehr oder weniger diesen regelmäßigen Körpern. Man unterscheidet oft auch noch kugelförmige, concentrisch-schalige und cylindrische Absonderung; wir werden aber später sehen, daß diese trummflächigen Formen in der Regel nicht durch ursprüngliche Absonderung, sondern erst durch nachfolgende Verwitterung entstanden sind.

Wir werden zunächst versuchen, einzelne dieser regelmäßigen Absonderungsformen specieller zu schildern und durch Beispiele zu erläutern.

Plattenförmig ist sehr häufig der Granit abgeordnet, so z. B. Taf. 1, Fig. 9, zuweilen auch Porphy und Basalt. Diese Platten sehen oft ganz aus wie übereinanderliegende Schichten, bestehen aber, wenn sie nicht von Schichtung herrühren, alle ganz aus demselben Material und sind auch nicht durch fremdartige Zwischlagen voneinander getrennt, wie das bei wirklicher Schichtung sehr oft der Fall ist. Es kommt sogar vor, daß einzelne mineralische Gemengtheile, z. B. große Feldspathyristalle, aus einer Platte in die andere hineinreichen und nur durch eine Absonderungskluft getheilt sind, woraus sich dann ganz sicher ergibt, daß diese Kluft erst nach der Bildung des Gesteins entstanden sein kann.

Die Granitplatten haben gewöhnlich eine Dide von 1—5 Fuß, und wenn sie in ungleichen Abständen von andern, ziemlich rechtwinkligen Klüften durchschnitten sind, so zerfallen sie in große Paralleloipede oder Quadern. Bei Granitfelsen, welche über die Oberfläche hervorragen, sind dann die Eden und Kanten dieser Paralleloipede oft sehr stark durch Verwitterung abgerundet, und so entsteht das, was man polsterförmige Absonderung zu nennen pflegt. Ganze Felsen scheinen zuweilen mauerartig aus lauter solchen übereinandergelegten Platten, Postern oder Wollfäden zu bestehen. Sind die Querklüfte der Platten nicht weiter voneinander entfernt als die Plattendide, so nehmen die getrennten Theile eine kubische Gestalt an, und durch starke Verwitterung der Eden und Kanten bleiben zuweilen fast kugelförmige Kerngestalten übrig. Die Platten liegen beim Granit sehr oft ziemlich horizontal, finden sich aber auch unter verschiedenen Neigungswinkeln bis zur senkrechten Stellung. Bei den Porphyrn sind die Platten meist dünner, und noch dünner beim Phonolith und Basalt, wo man sie dann manchmal Tafeln oder, wenn etwas gekrümmt, Schalen genannt hat. Bei Tschilowig oberhalb Tetschen an der Elbe findet sich ein Basalt so dünn plattenförmig abgeflacht, daß die Bewohner der Umgegend diese Platten wie Blechtäfel zum Baden von Ruden verwenden.

Werden die Platten nicht rechtwinklig, sondern schräg, aber von untereinander ziemlich parallelen Klüften in zwei Richtungen durchschnitten, so entstehen dadurch rhomboedrische Absonderungen, wie sie zuweilen bei dem Gneis genannten Gestein vorkommen, bei welchem dann aber die eine der Klüftrichtungen eigentlich der Schichtung entspricht.

Säulenförmig ist besonders häufig und schön der Basalt abgesondert, wie z. B. der der Fingalshöhle auf der Insel Staffa (Fig. 10), doch kommt ganz dieselbe Bildung oft auch bei Porphyrn, Granitsteinen und Phonolithen vor. Wo diese Absonderungsform besonders regelmäßig auftritt, da haben die Säulen alle ungefähr die gleiche Dide und auch eine fast constante Flächenzahl. Die Dide schwankt aber überhaupt zwischen den ziemlich weiten Grenzen von etwa 1 Zoll bis 5 Fuß. Die ganz dünnen Säulen nennt man auch wol Stengel oder Stifte, die sehr dicken, weit weniger regelmäßigen, Pfeiler. Die Zahl der Flächen, welche die Säule begrenzen schwankt erfahrungsmäßig zwischen drei und neun. Unter drei Flächen (ohne die beiden Endflächen) kann natürlich keine Säule haben; bei weitem die meisten an Gesteinen vorkommenden sind fünf- oder sechsseitig, eine größere Zahl gehört schon zu den Seltenheiten. Wenn aber auch local die Zahl der Flächen oft gleich zu sein pflegt, so sind dennoch die Winkel, unter denen sich dieselben schneiden, nicht gleich, wodurch sich alle Absonderungssäulen sehr wesentlich von den durch Krystallisation entstandenen unterscheiden, bei denen die entsprechenden Winkel stets ganz gleich sind. Auch die Länge der einzelnen Säulen ist sehr verschieden; aus einem Stück bestehend erreichen sie sehr selten mehr als 20 Fuß Länge, aber verglichen Stücke (Säulenglieder) stehen zuweilen an demselben Basaltfelsen viele als Fortsetzungen übereinander, so daß, wenn man sie alle zu einer Säule rechnet, diese zuweilen eine Länge von mehr als 200 Fuß erreicht, wie z. B. bei Unkel am Rhein und an der Detonata bei Bräspatal in Siebenbürgen. Die Gliederung dieser scheinbar sehr langen Säulen ist in der Regel durch rechtwinklig hindurchgehende Absonderungsklüfte bewirkt; folgen diese sehr nahe aufeinander, so entstehen dadurch tafelförmig zerfallene

Säulen, z. B. beim Phonolith, wo diese Querklüfte die Säulenhäute auch wol schräg schneiden. Bei manchen Porphyrn zeigen sich sogar die Säulen aus mannichfach gebogenen Platten zusammengefeßt, wodurch sie dann an der Oberfläche ein damascirtes Ansehen erhalten, wie Fig. 11. Folgen die Querklüfte in Abständen aufeinander, welche ungefähr der Säulendide entsprechen, so entstehen natürlich sehr kurze Säulenstücke, welche dann zuweilen durch Verwitterung der Eden und Kanten in säulenförmig übereinandergehäufte Kugeln umgewandelt werden, wie an dem schönen basaltischen Lavafelsen der sogenannten Käsegrotte bei Petrich in der Eifel (Fig. 13). Der Beginn dieser Veränderung zeigt sich zuweilen erst beim Zerbrechen der Säulen, wodurch diese nach dem Abbröckeln der Eden in ziemlich concentrisch-schalige Kugeln mit noch ganz frischem Kern zerfallen.

Manchmal äußert sich diese Erscheinung auch wol in sehr eigenthümlicher Weise, indem die Kugeln in den Säulen gleichsam als festere Concretionen vor- gebildet erscheinen und an den Abgliederungen als Kugelsegmente ineinander eingreifen wie Gelenkknochen (Fig. 12), wobei dann auch wol die durch die Säulentanten gebildeten Eden wie die Zaden einer Krone hervorragen.

Nachdem wir jetzt die einzelnen Absonderungsformen kennen gelernt haben, möge es gestattet sein, noch einige Bemerkungen über deren Ursache und die Ursache der Absonderung überhaupt daran anzureihen.

Alle Absonderung ist eine notwendige Folge der Massenzusammenziehung nach ihrer Erstarrung, sei es nun durch Austrocknung oder durch Abkühlung. Wenn der Bodenschlamm eines entleerten Teichs austrocknet, so bilden sich darin mehr oder weniger weite Risse, die zuweilen sogar ziemlich regelmäßig gruppirt sind und eine Art säulenförmiger Absonderung veranlassen, und wenn der Schlamm ausfluß eines Hobofens, oder ein Lavastrom, nachdem er erstarrt ist, weiter abkühlt, so zerpringt er durch wenn auch nur schmale Klüfte in einzelne Theile; das sind dieselben Vorgänge, welche auch die Absonderung der aus Wasser abgelagerten oder aus einem heißflüssigen Zustande hervorgegangenen Gesteine bewirkt. Sowol durch Verflüchtigung des Wassers (Austrocknung) als durch Ausstrahlung der Wärme (Abkühlung) wird das Volumen der Körper vermindert; wenn aber diese Körper so groß sind oder die Volumenverminderung so schnell erfolgt, daß die Theile sich nicht füglich gegen das gemeinschaftliche Centrum zusammenziehen können, so erfolgt Zerpaltung und Contraction der dadurch isolirten einzelnen Theile. Daher kommt es, daß ein Körper z. B. nie ein Gefäß von 100 Fuß Durchmesser würde herstellen können, ohne daß es zerpringt, und daß man auch niemals einen erstarrten Lavastrom finden wird, in welchem einzelne unzerfallene Stücke einen Durchmesser von mehr als 100 Fuß haben. Je schneller die Austrocknung oder Abkühlung erfolgt, um so kleiner werden bei gleicher Masse die Theile sein, in welche sie zerpringt, weil die Partikelchen um so weniger Zeit haben, sich zu größeren Massen zu concentriren, je schneller ihre Zusammenziehung stattfindet.

Dadurch erklärt es sich denn auch sehr leicht, weshalb die offenbar weniger schnell abgekühlten, sehr krystallinischen, plutonisch entstandenen Eruptivgesteine, wie Granit und Gneis, stets weniger stark zerklüftet sind als die schneller erstarrten, dichten und vulkanisch entstandenen, wie Basalt, während gewisse feinkörnige oder porphyrtartige Eruptivgesteine mit dichter Grundmasse, wie Porphyr und Granitstein, in dieser Beziehung ein mittleres Verhalten zeigen. Nicht so sicher

läßt sich diese Ursache der ungleichen Größe für die aus Wasser abgelagerten, durch Austrocknung abgeforderten Gesteine nachweisen.

Wenn man aber auch den Grund der Absonderung überhaupt und hinreichend erklären kann, so ist doch die Ursache der besondern regelmäßigen Absonderungsformen noch vollständig unbekannt. Wir wissen nur durch Erfahrung, daß Platten und Säulen stets eine bestimmte normale Stellung zu den wirksamen Austrocknungs- oder Erstarrungsflächen einnehmen, und zwar liegen die Platten stets parallel diesen Flächen, während die Säulen rechtwinklig daraufstehen, so daß z. B. ein säulen- oder plattenförmig abgeforderter senkrechter Basaltgang im Querschnitt stets horizontal liegende Säulen oder senkrecht stehende Platten zeigt, während in ziemlich horizontal übergehossenen Lavaströmen die Säulen senkrecht stehen. Durch Bewegungen während der Erstarrung und Abkühlung, oder durch nachher eingetretene Störungen sind diese normalen Stellungen freilich oft unregelmäßig geworden, lassen sich aber in einzelnen Fällen dennoch sehr gut auf die ursprüngliche Regel zurückführen, wie z. B. bei dem prachtvoll säulenförmig abgeforderten Basaltfelsen Weggogich am linken Elbufer oberhalb Auffig (Fig. 14.). Hier stehen die Säulen sächerförmig gegen oben gebogen. Dieser Basaltfels füllt eine mächtige Spalte im Sandstein aus; offenbar bildeten sich die Säulen auch hier zunächst rechtwinklig auf die Spaltenwände, in der Mitte der Spalte erfolgte aber die Abkühlung etwas langsamer als an den Seitenwänden, deshalb blieb die Basaltmasse hier etwas länger weich, in gewissem Grade plastisch, und wurde, als sich die Säulen schon gebildet hatten, noch etwas nach oben gedrängt, so daß dadurch die Säulen eine so auffällige Stellung annahmen.

Schichtung nennt man die plattenförmige Uebereinanderlagerung der Gesteine, welche in ihrer Entstehung nacheinander begründet ist. Jede Schicht ist das Resultat eines bestimmten Zeitabschnitts. Schichtung ist deshalb vorzugsweise den aus Wasser abgelagerten Gesteinen eigenthümlich, sie kann aber auch bei ihnen nur dann deutlich hervortreten, wenn während ihrer Ablagerung gewisse, wenn auch nur kleine Unterbrechungen oder Aenderungen des Ablagerungsmaterials eingetreten sind. Diese können z. B. veranlaßt sein durch den Wechsel von Ebbe und Flut, durch hohen oder niedrigen Stand der Flüsse, welche Material zuführen, ja sogar durch den Wechsel der Temperatur u. s. w. Etwas der Schichtung ganz Analoges kann aber auch bei vulkanischen Gesteinen vorkommen, wenn z. B. mehrere Lavaströme übereinander hinweggefloßen sind, oder wenn in den Zwischenräumen der Lavaüberströmung vulkanische Auswurfsproducte von etwas ungleicher Beschaffenheit, oder mit Unterbrechungen, die Oberfläche bedeckt haben.

Manchmal ist es schwer, Schichtung von plattenförmiger Absonderung bestimmt zu unterscheiden; es wird aber dann allemal sehr leicht, wenn die einzelnen Schichten aus etwas ungleichem Material bestehen, wenn sie abgerundete Gesteine oder Versteinerungen enthalten, die untereinander und der Schichtung parallel gelagert sind.

Fig. 15 stellt einen in dieser Beziehung sehr interessanten Fall aus der Steinfohlenformation von St.-Etienne dar. Hier besteht die unterste schwarze Schicht aus Steincohlen, darüber folgt e Schieferthon, aus mehreren dünnen Schichten zusammengesetzt, dann b zwei Schichten Eisenstein, und zu oberst endlich a eine ganze Reihe von Sandsteinschichten, die durch

dünne Schieferthonlagen voneinander getrennt sind. Diese Sandsteinschichten umschließen die Ueberreste in aufrechter Stellung umhüllter Baumstämme, auf die wir bei einer spätern Gelegenheit zurückkommen werden.

Ursprünglich sind natürlich alle Schichten ziemlich horizontal abgelagert worden, nur an den Rändern der Ablagerungsbeden mögen sie zuweilen schon ursprünglich unter Neigungswinkeln bis 30 Grad abgelagert worden sein, wo man aber stärkere Neigungen, oder starke Faltungen und Zerknünungen derselben vorfindet, da hat man stets eine spätere Störung der ursprünglichen Lagerung vorauszusetzen, und das wird auch da der Fall sein, wo über sehr große Flächenräume hinweg alle Schichten eine gemeinsame Neigung, wenn auch nur bis zu 20 Grad zeigen.

Verglichen Störungen der ursprünglichen Lagerungsverhältnisse können sowohl durch locale Hebungen oder Senkungen der Erdruste, durch emporsteigende Eruptivgesteine oder durch den Einsturz großer unterirdischer Höhlräume veranlaßt worden sein. Sie zeigen sich, wie schon erwähnt, in verschiedener Weise: 1) als Aufrichtung der Schichten, wie Fig. 22; 2) als mehr oder weniger starke Biegung oder Faltung, wie Fig. 17; 3) als Verwerfungen, wie Fig. 18 und 19. Fig. 18 stellt eine solche Verwerfung dar, welche durch Aufhebung des Bodens und einseitige Hebung oder Senkung während eines Erdbebens veranlaßt wurde. Fig. 19 dagegen ein vielfach gespaltenes und dabei verworrenes Steincohlenlager, wie dergleichen es sehr unbehaglich für den Bergbau werden.

Die Schieferung der Gesteine ist, wie wir oben gesehen haben, zuweilen nichts anderes als das Resultat einer sehr dünnen Uebereinanderdeckung des Materials; in diesem Falle muß sie aber stets der Schichtung im großen oder der Wechsellagerung der Gesteine parallel laufen. Das ist jedoch oft nicht der Fall, und sie geht sogar manchmal unter sich parallel durch alle Biegungen der Schichten hindurch, wie Fig. 16.

Lagerung.

Darunter versteht man das gegenseitige räumliche Verhalten der Gesteine, welches sich gewöhnlich am leichtesten erkennen läßt, wenn sie geschichtet sind.

Von den einfachsten Fällen ausgehend, haben wir zunächst Uebereinanderlagerung oder Auflagerung zu unterscheiden. Diese ist eine gleichförmige, wenn zwei geschichtete Gesteine so übereinanderliegen, daß ihre Schichten parallel sind, wie Taf. 1, Fig. 15, wobei der Neigungswinkel der Schichten zunächst nicht in Betracht kommt. Wiederholen sich dabei dieselben Schichten mehrfach, so nennt man das Wechsellagerung. U. gleichmäßig, oder im einzelnen Falle a bergreisend, nennt man dagegen die Lagerung, wenn ein Gestein die Schichten eines andern durchschneidet, oder die Grenzen eines oder mehrerer anderer Gesteine überdeckt, wie Fig. 20 und 21. Aus diesem Verhalten läßt sich zugleich schließen, daß die übergreifend bedeckten Gesteine alle um ein Bedeutendes älter sind als das Bedeckende, weil man voraussetzen muß, daß das bedeckende Gestein sonst sich gleichförmig aufgelagert haben würde. Die ungleichförmige Lagerung setzt eine in der Zwischenzeit eingetretene theilweise Zerknünzung und Abwühlung der ungleichen überlagerten Gesteine voraus.

Außer diesen verschiedenen Formen der Uebereinanderlagerung kommen nun aber besonders bei eruptiven Gesteinen sehr oft auch Lagerungsverhältnisse vor, welche man Durchsetzungen zu nennen pflegt.

Wenn nämlich irgendwo in der aus Gesteinen be-

ehenden Erdkruste Spalten aufgerissen sind, und diese Spalten, sei es nun von unten herauf oder von oben nach, ausgefüllt wurden, so nennt man diese Spaltenausfüllungen Gänge, und jeder solche Gang durchsetzt die Gesteine, zwischen denen er liegt — bildet eine Durchgang, wie das in den Abschnitten über Eruptivgesteine und Erzgänge durch Abbildungen erläutert werden wird. Es versteht sich von selbst, daß die durchsetzende Masse allemal jüngerer (neuerer) Entstehung sein muß als die durchsetzte. Ueberhaupt aber sind die gegenseitigen Lagerungsverhältnisse der Gesteine das erste und wesentlichste Hülfsmittel zur Bestimmung des relativen Alters derselben. Die organischen Reste (Versteinerungen), welche viele der aus Wasser abgelagerten (sedimentären) Gesteine enthalten, hat man erst nachträglich zur Altersbestimmung verwenden können, nachdem durch sehr zahlreiche Beobachtungen der Uebereinanderlagerung die Altersreihe der einzelnen versteinerten Thiere- und Pflanzenformen festgestellt war.

Kohlen und Steinsalz.

(Tafel 2.)

Diese für uns Menschen so überaus wichtigen Bestandtheile der selten Erdkruste finden sich beide nur zwischen den sedimentären Ablagerungen, nicht in den eruptiven oder metamorphischen Gesteinen. Innerhalb der Reihe der sedimentären Ablagerungen sind sie local in bestimmte Formationen vertheilt; wenn man aber nicht bloß eine einzelne Ergegend, sondern die gesammte Erde berücksichtigt, so zeigt sich bald, daß nicht etwa bloß in wenigen bestimmten geologischen Perioden, sondern in den verschiedensten geologischen Zeiträumen der Sedimentärperiode, unter den dazu geeigneten Umständen, bald hier bald da Kohlen oder Steinsalz abgelagert worden sind, nur niemals an demselben Orte beide zu gleicher Zeit, da die Ablagerungsbedingungen für sie sehr verschiedene sind.

Die Kohlenlager entstanden zu allen Zeiten aus localen Pflanzenanhäufungen, mögen diese nun in Sümpfen und Torflagen sich an derselben Stelle angehäuft haben, wo sie wachsen, oder mögen sie erst von der Landoberfläche aus in Salz- oder Süßwasser-Seen zusammen geschwemmt worden sein; ja sogar durch Aufhäufung von Meerespflanzen können möglicherweise Kohlen entstanden sein, obwohl man solche noch nicht sicher kennt. Die Kohlenlager wurden aber zu keiner Zeit ursprünglich als solche abgelagert, sondern stets als Pflanzentheile. Aus diesen entstanden erst durch allmähliche Umwandlung: Torf, Braunkohle, Stein- oder Schwarzkohle, Anthracit, und zuletzt, aber nur zwischen halb oder ganz krySTALLINISCHEN Schiefen, der nicht mehr brennbare Graphit. Dieses ist deshalb auch die gewöhnliche Altersreihe der Kohlenvorkommnisse; d. h. Torf und Braunkohlen finden sich in der Regel in den jüngsten oder höchstens tertiären Ablagerungen, Steinkohlen und Anthracit dagegen in den ältern und ältesten. Doch ist diese Altersreihe nicht überall streng eingehalten, da der Umwandlungsproceß unter ungleichen Bedingungen schneller oder langsamer erfolgt ist.

Das Steinsalz ist dagegen, wie die für die Industrie so wichtigen Kalisalze, ein unmittelbares Ablagerungsproduct des Meeres, in welchem seit den ältesten geologischen Zeiten Auflösungen von Chlornatrium (Kochsalz) und verschiedenen andern Salzen vorhanden waren. Es findet sich deshalb in der Regel zusammen mit Gips oder Anhydrit und einigen Kali-

salzen, deren Bestandtheile ebenfalls im Meerwasser aufgelöst sind und welche unter den nämlichen Bedingungen wie das Steinsalz auskrySTALLISIREN.

Die wichtigste dieser Bedingungen scheint starke Verdunstung in mehr oder weniger abgeschlossenen Meeresbecken oder Buchten gewesen zu sein, welche während der Verdunstung immer wieder neue Zuflüsse von Meerwasser erhielten, so daß sie deshalb gleichsam wie große Eindampfungsflächen wirkten. Steinsalz und Gips sind deshalb sogleich als solche im krySTALLINISCHEN Zustande abgelagert worden, während der Anhydrit wahrscheinlich erst durch Austreibung des Wassers, unter etwas erhöhter Temperatur aus Gips entstand. Später an die Erdoberfläche erhoben, ist aber auch der Anhydrit durch Aufnahme von Wasser zum Theil wieder in Gips umgewandelt. Die für chemische Fabriken so wichtigen Kalisalze sind in Wasser noch leichter löslich als das Kochsalz, darum findet man sie oft über demselben. Es krySTALLISIREN nämlich die einzelnen Bestandtheile des Meerwassers bei dessen Eindampfung stets nach der Reihenfolge ihrer Löslichkeit aus, zuerst der unter allen am schwersten lösliche schwefelsaure Kalk (Gips), dann das Chlornatrium (Kochsalz), zuletzt die Kalisalze.

Taf. 2, Fig. 20 versucht bildlich die Stellung (das geologische Niveau) darzustellen, welches die in Deutschland bekannten Kohlen- und Steinsalzaflagerungen in der Reihenfolge der sedimentären Formationen einnehmen. Daraus ergibt sich, daß innerhalb dieses beschränkten Erdbraums beide nur in den Ablagerungen weniger Zeitperioden, oder mit andern Worten nur in bestimmten Formationen auftreten.

Nutzbare Kohlenlager kennt man in Deutschland unterhalb des noch fortwährend entthenden Torfs nur in den Ablagerungen der Tertiär-, Kreide- und Steinkohlenperiode. Denn das dünne und untreue Lettentohlenflöz zwischen Keuper und Muschelkalk kann nur ganz local und ausnahmsweise benutzt werden, in den Ablagerungen der genannten Perioden nehmen aber die Kohlenlager zum Theil ungleiche Niveaus ein. Die Tertiäraufbildungen z. B. enthalten in ihrer obern (pliocänen), mittlern (miocänen) und untern (eocänen) Abtheilung zuweilen Braunkohlenlager, und die der Kohlenperiode enthalten zwar die meisten Kohlen in der eigentlichen Steinkohlenformation, zuweilen aber auch solche im Niveau der Kalkformation, wie z. B. bei Hainichen in Sachsen. Gehen wir aber über die Grenzen Deutschlands hinaus, so finden wir abbauwürdige Kohlenflöze: in Ungarn und im Banat zwischen den Schichten der Juraperiode, in China zwischen den Ablagerungen der Triasperiode, und im europäischen Rußland zwischen und unter den Schichten des Kohlenalters. Die Zeitschichten, welche da noch bleiben, sind offenbar nur zufällige und dürfen durch neue Entdeckungen in andern Welttheilen bald ausgefüllt werden. Auffällig ist es allerdings, daß in ganz Westeuropa die Ablagerungen der Tertiär- und Kohlenperiode (die danach benannt ist) sich ganz vorzugsweise durch ihren Reichthum an Kohlenlagern auszeichnen, und daß selbst die nordamerikanischen und sibirischen Steinkohlen und Anthracite größtentheils demselben großen Ablagerungszeitraume angehören, wie unsere Steinkohlen. Dabei ist aber die Zahl und Mächtigkeit der Kohlenlager, sowie ihre Qualität, an den einzelnen Orten und in den einzelnen Flözen sehr verschieden. In Deutschland kennt man die größte Zahl von übereinanderfolgenden Kohlenflözen im Becken von Saarbrücken, nämlich 160; diese sind aber bei weitem nicht alle abbauwürdig. Die größte bekannte

Mächtigkeit erreicht ein ober-schlesisches Steintoblenkloß, aber erst einige Meilen jenseit der Grenze bei Dombrava in Polen, nämlich 48 Fuß.

Steinsalz kennt man in Deutschland nur zwischen den Ablagerungen der Trias- und Dyasperiode. Wir brauchen aber gar nicht weit zu gehen, so finden wir die enorm mächtigen und ausgebehnnten Steinsalzlagerungen Galiziens, der Marmaros und Siebenbürgens in tertiären Ablagerungen. In Algier, und wahrscheinlich auch bei Cordoba in Spanien, kommt Steinsalz zwischen den Schichten der Kreideperiode vor, im Gouvernement Verm (Rußland) in dem geologischen Niveau unzers Kothliegenden, und in Nordamerika zwischen silurischen Schichten. Auch da bleiben noch einige, aber nur wenige Zeiläden, die durch neue Entdeckungen bald ausgefüllt werden dürften. Die Ablagerungen der Triasperiode sind in Deutschland sogar in mehreren verschiedenen Niveaux steinsalzhaltig. Nicht weit von Braunschweig eroberte man eine schwache Ablagerung desselben im Keuper, die Salinen der Gegenden von Esfurt und Gotha und Kreuzburg bei Eisenach, sowie alle schwäbischen Salinen beziehen ihr Salz aus dem Muschelalt; das über 1000 Fuß mächtige Steinsalzlager von Staßfurt liegt zwischen Buntsandstein und Zechstein, aber auch die oberste Abtheilung des Buntsandsteins scheint in ihrem Gips Steinsalz zu enthalten (vielleicht gehören hierher die Salinen der nördlichen Alpen). Auf Zechsteinsalz sind dagegen die Salinen von Salzungen, Köstlich, Kösen, Artern, Dürrenberg und Halle begründet.

Kohlen und Steinsalz sind so wichtige Materialien, daß sie überall mit großem Eifer gesucht werden. Für vergleichende Nachforschungen lassen sich nun zwar keinerlei bestimmte Recepte vorschreiben, vielmehr ist dabei eine reiche Erfahrung in diesem Fache das Wichtigste. Immerhin lassen sich aber doch einige kurze Andeutungen geben, die allerdings zum Theil nur den Zweck haben, veraltete Vorurtheile unschädlich zu machen.

Sucht man Kohlen in Deutschland, welches geologisch schon sehr gut bekannt ist, so wird man sie natürlich nur in den Formationen zu erwarten haben, die bei uns bereits als kohlenführend bekannt sind, und hierüber wird sich in den meisten Fällen schon durch gute geologische Karten urtheilen lassen. Sucht man aber Kohlen in irgendeinem entfernten und geologisch noch wenig oder gar nicht bekannten Lande, dann ist das Alter der Ablagerungen gar nicht mehr entscheidend, wohl aber deren petrographische Zusammensetzung. Kohlenlager kommen am häufigsten zwischen Wechsellagerungen von grauem Sandstein und Schieferthon, nur äußerst selten mit Kalkstein, Mergel oder gar mit Gips verbunden vor. Enthalten aber dergleichen Sandsteine oder Schieferthone erkennbare Abdrücke von Pflanzentheilen, so wird dadurch die Hoffnung, Kohlen zu finden, schon etwas größer als durch die bloße Anwesenheit jener Gesteine. Doch kommen zuweilen auch Schieferthone und Sandsteine mit Pflanzenresten vor, ohne brauchbare Kohlenlager zu enthalten.

Sehr oft wird die bedensförmige Gestaltung der Oberfläche oder der Schichtenstellung für ein besonders günstiges Merkmal in Beziehung auf die Anwesenheit von Kohlenlagern ausgegeben. Es ist richtig, daß das theilweise bei vielen Kohlenablagerungen zutrifft, aber keineswegs alle Kohlenformationen sind in deutlich erkennbare Beden eingelagert, und Schichten ohne jede Spur von Kohlen zeigen ebenfalls nicht selten sehr regelmäßige bedensförmige Lagerung. Weder die Anwesenheit, noch die Abwesenheit der bedensförmigen

Lagerung ist daher entscheidend. Die Oberfläche kann sich aber über einem wirklichen Kohlenbeden Berg- und Hügelgruppen erheben, wie das der Querschnitt des Kohlenbedens von Pöschappel bei Treßdorf Taf. 2, Fig. 1, zeigt. Manchmal ist auch wol ein solches Beden nur zur Hälfte vorhanden und fehlend, also eigentlich gar nicht ein wirkliches Beden, wie die ideale Zeichnung Fig. 2 zeigt. Wirklich bedensförmig eingelagert ist die Steintoblenformation des Plauensgrundes bei Dresden allerdings; dieses Beden ist aber durch spätere Erhebung in zwei Abtheilungen getrennt, von denen Fig. 1 nur die nordöstliche Querschnitt darstellt, und von denen jede jetzt ein Beden für sich bildet, beiderseits von Ablagerungen jüngerer Formation überdeckt, die vom Plauensgrund quer durchschnitten sind. Hier ist also mindestens die gegenwärtige Doppelbedenform keine ursprünglich sondern erst durch eine spätere Hebung in der Vergangenheit, welche zugleich von sehr bedeutenden Verwerfungen begleitet war, die zum Theil in Fig. 2 rechts dargestellt sind.

Dergleichen Verwerfungen haben überhaupt zumal sehr unangenehme Unterbrechungen in dem Zusammenhang und Niveau der Kohlenlager hervorgebracht, wie Fig. 19 auf Taf. 1 ein sehr schlagendes Beispiel zeigt.

In Deutschland liegt sehr gewöhnlich, wie Taf. 2, Fig. 1 und 2, unmittelbar über der Steintoblenformation die sogenannte Kothliegende, dessen Anwesenheit dabei oft, aber nicht immer, als ein günstiges Zeichen für darunter vorhandene Steintoblen betrachtet werden kann — nicht immer, da auch in Deutschland die Kothformation zuweilen unter dem Kothliegenden fehlt, oder anderwärts vorhanden ist, ohne von letztem überlagert zu sein, wie z. B. in Westfalen, wo die Steintoblenformation, wo sie nicht frei hervortritt, unmittelbar von Ablagerungen der Kreideperiode, oder sogar von Diluvialschichten bedeckt ist.

Die eigentliche Steintoblenformation, welche in Europa und in Nordamerika bei weitem die ergiebigsten Kohlenlager in sich birgt, enthält in ihren Sandstein- und Schieferthon-schichten, zuweilen auch in dazwischen eingelagerten sogenannten Thoneisensteinen oder Sphärosideriten oft sehr viele Pflanzengreste, die von Schachteln und Species herrühren, welche größtentheils von den jetzt lebend auf der Erde vorhandenen ganz außerordentlich verschieden sind. Aus den einzelnen Abdrücken von Blättern, Früchten und Stämmen dieser Pflanzen hat man versucht, den Gesamtbaum derselben abzuleiten und dann aus den vorherrschendsten Arten sogar ideale Wald- und Sumpflandschaften konstruirt, wovon Fig. 16 ein recht anschauliches Beispiel liefert. Aus dem sumpfigen Boden beider Ufer des langsam dahinschiebenden Meeres sprossen hier vielerlei Farnkräuter und kleine Schachtelhalme hervor, und aus diesem niedrigen Gebüsch erheben sich schlanke Baumstämme meist mit tierischen Rindenszeichnungen. In dieser ganzen Waldlandschaft erblicken wir aber nicht eine einzige blüthentragende phanerogame Pflanze; baumförmige Kryptogamen herrschen durchaus vor; nur vereinzelt erblicken wir dazwischen die Palmenart *Noggeria*. Selbst der äppigste Tropenwald der Gegenwart besteht nicht so vorherrschend aus Kryptogamen (blüthenlose Pflanzen); noch mehr verschieden sind aber die Einzelformen. Da erblicken wir in der Mitte des Bildes einen starken längsgelstreiften, und von Zeit zu Zeit abgegliederten Baumstamm, das ist entweder ein *Sigillaria* oder vielleicht ein mächtiger Schachtelbaum (*Calamites*). Zu beiden Seiten desselben stehen schuppenbäume (*Lepidodendron*, *Lycopodiaceae*).

or, deren Rinde mit tierlichen rhombenförmigen Narben bedeckt ist. Wir wollen nun einige dieser Pflanzen etwas näher untersuchen, wobei uns die Fig. 4 bis 19 behelflich sein werden.

Fig. 13 stellt ein Stück Calamitenstamm dar, und zwar den Steinlern (Ausguß) seines Hohlraums; die schmalen Längsleisten greifen an den etwas eingeschnürten Abgliederungen zickzackförmig ineinander, ganz wie bei unsern jetzigen Schachtelbäumen (Equiseten), die aber nirgends mehr als große Bäume gefunden werden. Zu den Calamitenbäumen der Kohlenperiode gehörte wahrscheinlich ein Theil der über Fig. 13 und 14 abgebildeten Zweige mit wirtelständigen Blättchen, doch läßt sich das nur für *Asterophyllum*, Fig. 5, bestimmt nachweisen. Die Fig. 4 abgebildete Pflanze hat man *Annularia* genannt, weil bei ihr sich die Blättchen an der Basis zu einem geschlossenen Ringe verbinden, Fig. 6 dagegen *Sphenophyllum*, weil die Blättchen eine keilförmige Gestalt zeigen. Alle drei kommen ungemein häufig mit Calamiten zusammen in der Steinkohlenformation vor.

Fig. 15 stellt ein Stück Rinde der sehr vielen Arten von *Lepidodendron*, welche in der Kohlenformation gefunden werden, in natürlicher Größe dar, während darüber, Fig. 14, sich ein verkleinerter Zweig (derselben Gattung angehörig) mit einem endständigen Fruchtstängel befindet. Einen ganz analogen Bau wie dieser Zweig zeigen die jetzt existirenden *Ecopodien*, welche aber selbst in tropischen Ländern nie baumförmig gefunden werden.

Fig. 7 bis 12 stellt eine Auswahl von Farnwedeln dar, die in der Steinkohlenformation ebenfalls sehr häufig sind. Die sehr zahlreichen Farnspecies dieser geologischen Periode hat man in eine Anzahl von Familien eingetheilt, von denen die hier repräsentirten besonders häufig und durch viele Species vertreten sind. Fig. 7 und 8 zeigt den Blatttypus der *Neuropteriden*, Fig. 9 und 10 den der *Pecopteriden* und Fig. 11 und 12 den der *Sphenopteriden*. Ueberreste von baumförmigen Farnn werden dagegen in der Steinkohlenformation verhältnißmäßig selten gefunden, Fig. 3 zeigt aber den äußeren Abdruck eines solchen *Protopteris* genannten Farnstammes.

Die am meisten charakteristischen Pflanzen der Steinkohlenzeit sind unstreitig die *Sigillarien* und *Stigmarien*. Zuerst hielt man diese für voneinander verschiedene Pflanzen; später erkannte man aber, daß die *Stigmarien* nur die Wurzeln der *Sigillarien*ebäume sind, wie das Fig. 19 zeigt, während Fig. 18 einen obren Stammtheil, und Fig. 17 ein Wurzelstück mit anhängenden Fasern für sich darstellt. Auch hiervon kennt man sehr viele Species und hat aus einigen derselben auch noch besondere Geschlechter gebildet, so z. B. aus Fig. 18 das Genus *Favularia*. Eine nahe Verwandtschaft dieser offenbar in Sumpfboden gewachsenen Kohlenpflanzen zu lebenden Familien ist noch nicht erkannt.

Es ist zuweilen die Ansicht ausgesprochen worden, während der Steinkohlenperiode müsse eine sehr üppige Pflanzenvegetation auf der Erde bestanden haben. Das ist aber nach den Ergebnissen genauer Untersuchung und Vergleichung durchaus unrichtig. Allerdings kennen wir gegenwärtig auf der Erde keine baumförmigen Schachtelbäume und *Lycopodiaceen* mehr; diese cryptogamischen Pflanzen wurden also damals zum Theil größer als jetzt, aber dafür fehlten den Wäldern der Kohlenperiode unsere riesenhaften Tannen, Eichen, Ahorne u. s. w. gänzlich, ja man hat überhaupt niemals in der Steinkohlenformation einen Stamm gefunden, der nach Dicke oder Länge diese unsere Wald-

bäume auch nur annähernd erreichte. 3 Fuß ist wol der größte Durchmesser, den irgenbein Baumstamm der Kohlenperiode erreichte.

Auch besonders anmuthig können jene Wälder nicht gewesen sein, deren Ueberreste wir in der Steinkohlenformation finden; denn abgesehen von dem wahrscheinlich sumpfigen Boden, fehlten ihnen beinahe vollständig bunte Blüten und Früchte; kein Vogel belebte ihre Zweige, kein Säugethier durchbrach ihre Dichte, und selbst das helle Sonnenlicht scheint ihnen durch eine stets trübe Atmosphäre entzogen worden zu sein, wie sich aus den aufgefundenen Insektenresten ergibt, die ausnahmslos solchen Arten verwandt sind, die gegenwärtig das Sonnenlicht meiden, theils nur in der Dämmerung oder bei Nacht aus ihren Schlupfwinkeln hervorkommen. Auch von größern Reptilien sind in den Schichten der Kohlenformation nur selten Ueberreste gefunden worden; die Köpfe eines *Sauriers* (*Archaeosaurus*) sind die einzigen Spuren davon. An einigen Orten findet man ziemlich viele Schalen von *Schwammcorallen*, welche, wie die Landnatur der Pflanzen, beweisen, daß das Material zu den Kohlen auf der Landoberfläche gewachsen, in den meisten Fällen auch wol auf dem Lande in Sümpfen und Landseen abgelagert worden ist; doch finden sich an einigen Orten zwischen den Steinkohlenschichten auch Abdrücke von echten Meeresfischen und Muscheln, besonders aus dem gänzlich ausgestorbenen Geschlechte *Palaeoniscus*, woraus sich denn ergibt, daß in diesen Fällen das ebenfalls aus Landpflanzen bestehende Material der Kohlenlager in benachbarte Meeresbuchten eingeschwemmt und da erst zur Ablagerung gelangt ist.

Erzlagerstätten.

(Tafel 3.)

Erze nennt man alle Mineralien oder Mineralverbindungen, aus denen sich mit Vortheil Metalle gewinnen lassen; es gehören dazu gediegene Metalle, Schwefelmetalle, Metalloxyde, Metallsalze und einige andere metallhaltige Verbindungen, unabhängig davon, welcher Klasse oder Ordnung des Mineralsystems sie angehören. Erzlagerstätten aber nennt man alle zur Gewinnung geeignete locale Anhäufungen solcher Mineralien, auch in dem Falle, wenn dieselben untergeordnet, außer den Erzen, einige nicht metallhaltige Mineralsubstanzen enthalten.

Dieser mehr praktische als wissenschaftliche Begriff ist daher nothwendig nicht lediglich von der Größe des Metallgehaltes an sich, sondern auch zugleich von einigen andern Umständen abhängig, so z. B. von dem Handelswerth der einzelnen Metalle, von der größeren oder geringern Leichtigkeit ihrer Trennung, von den nichtmetallischen Nebenbestandtheilen, von den Preisen der Arbeitslöhne, der Brennmaterialien, des Transports u. s. w. Um das durch ein Beispiel zu erläutern, dürfte es genügen hervorzuheben, daß z. B. eine Quarzmasse welche 1—10 Procent Eisen in irgenbeinem Zustande enthält, niemals ein Erz genannt werden kann, während dagegen eine Quarzmasse mit 1 Procent Goldgehalt jedenfalls ein sehr reiches Erz ist.

Gehen wir nach dieser allgemeinen Vorbemerkung zur Erläuterung der Abbildungen über.

Taf. 3, Fig. 1 stellt zunächst übersichtlich die verschiedenen Formen und Arten des Vorkommens von Erzlagerstätten dar, deren jede allerdings sehr variiren kann. Allgemein unterscheidet man Erzlager, Erzgänge, Erzstöcke und Erzimpregnationen.

Erzlager (Fig. 1 a) nennt man plattenförmige

Erzanhäufungen, welche parallel zwischen Gesteinsschichten irgendeiner Art liegen und welche ihrer ganzen Natur nach selbst als erzhaltige Schichten anzusehen sind, die ungefähr gleichzeitig, d. h. in derselben Periode mit den sie einschließenden Schichten abgelagert zu sein scheinen. Selbstverständlich muß die zunächst darunter befindliche Schicht — wie alle noch tiefer liegenden, die man gemeinsam das Liegende des Lagers zu nennen pflegt — bereits vorhanden gewesen, also etwas früher abgelagert worden sein als das sie bedeckende Erzlager; alle darüberliegenden Schichten, die man gemeinsam das Hangende nennt, dagegen etwas später.

In Form von Lagern treten vorzugsweise häufig die verschiedenen Arten von Eisenerzen auf, so namentlich Brauneisenstein, Rotheisenstein, Magneteisenstein, Spateisenstein, Sphärosiderit und Thoneisenstein; weit seltener auch die Erze anderer Metalle. Für die bergmännische Gewinnung ist die Lagerform bei hinreichender Mächtigkeit und Qualität besonders günstig wegen ihrer Regelmäßigkeit und Verbreitungsart, so wie wegen der verhältnismäßig großen Gleichförmigkeit ihres Gehalts.

Erzgänge nennt man diejenigen Erzanhäufungen, welche Spalten in irgendeinem Gesteine ausfüllen und daher ebenfalls vorherrschend plattenförmig gestaltet sind, aber ohne daß diese Platten den Schichten des einschließenden Gesteins parallel laufen müssen, wie das bei den Lagern der Fall ist; die Richtung der Gangspalten ist vielmehr meist ganz unabhängig von der Schichtung, Schieferung oder Zerklüftung des Gesteins (sogenannten Nebengesteins) in welchem sie auftreten, wie z. B. Fig. 1 bei b, c, d, e, i und k. Doch gibt es auch Gänge (also Spaltenausfüllungen), welche der Schichtung oder Schieferung eines Gesteins parallel laufen, wie z. B. Fig. 1 f. Diese nennt man zur Unterscheidung von den gewöhnlichen Querspaltingängen auch wol Lagergänge, weil sie echten Lagern ähnlich sehen und leicht mit solchen verwechselt werden können. Tritt jedoch der Fall ein, daß ein der Schichtung oder Schieferung des Nebengesteins paralleler Gang einen andern Gang oder mehrere durchschneidet („durchstößt“), wie z. B. f die Gänge c durchschneidet, so ist damit seine Gangnatur (d. h. Entstehung durch Spaltenausfüllung) sicher entschieden, und man muß ihn zu den Lagergängen rechnen, während echte Lager niemals vorhandene Gänge durchschneiden, sondern nur von ihnen durchsetzt werden können, wie z. B. a von b in Fig. 1.

Contactgänge nennt man diejenigen Spaltenausfüllungen, welche sich auf der Grenze zwischen zwei verschiedenartigen Gesteinen befinden, wie z. B. Fig. 1 i, ein Fall der gar nicht selten vorkommt, wahrscheinlich weil auf solchen Grenzflächen besonders leicht Spalten aufsteigen, die nachher ausgefüllt werden konnten.

Wenn mehrere oder viele Gänge in einer Gegend sich nach verschiedenen Richtungen durchschneiden, wie bei k, so nennt man das Nebgänge, oder auch wol gemeinsam einen Gangtod; weit häufiger kommt es jedoch vor, daß mehrere oder viele Gänge ziemlich parallel nebeneinander verlaufen (fallen und streichen), und diese bezeichnet man dann gemeinsam als einen Gangzug.

Wo irgend zwei Gänge sich in ihrem Verlaufe durchschneiden, da bilden sie ein sogenanntes Gangkreuz, so z. B. mehrfach auf Fig. 6 und bei k auf Fig. 1. Vergleichen Gangkreuze pflegen oft mehr oder bessere Erze zu enthalten als die Gänge in ihrem getrennten Verlaufe, namentlich dann, wenn jüngere Gänge ältere durchschnitten haben, was dann häufig mit sogenannt

nannten Berwerfungen (theilweisen Verschiebungen) der ältern Gänge verbunden war, wie mehrfach in Fig. 6.

Wenn dagegen ein Gang sich in zwei zerpalte, „gabelt“, wie c, Fig. 1, und b, Fig. 9, so nennt man die kleinere Abzweigung ein Seitentrum.

In Gängen pflegen weit mannichfaltigere Erze und andere Mineralien (sogenannte Gangarten) vorkommen als in Lagern, worauf wir demnächst noch zurückkommen werden.

Erzküde oder stockförmige Erzlagerstätten nennt man massige, unregelmäßig gestaltete Erzanhäufungen in irgendeinem Gestein oder auf der Grenze zwischen zwei verschiedenartigen Gesteinen, wie z. B. 1, m und r, Fig. 1. Dabei pflegt man aber noch zu unterscheiden zwischen Lagerstöcken oder liegenden Stöcken und Gangstöcken oder stehenden Stöcken. Unter erstem versteht man solche, deren Hauptausdehnung ungefähr der Schieferung oder Schichtung des einschließenden Gesteins folgt, wie bei l, Fig. 1; unter letztem dagegen solche, welche mit ihrer Hauptausdehnung die Schieferung oder Schichtung des einschließenden Gesteins unter ziemlich starkem Winkel durchschneiden, wie bei m. Wenn dagegen eine stockförmige Masse nur eine unregelmäßige Vertiefung der Oberfläche eines Gesteins ausfüllt, wie bei r, so nennt man das auch wol ein Erzbeuge oder Nachel.

Stockförmig tritt besonders häufig Magneteisenstein auf, aber auch andere Erze kommen zuweilen stockförmig, besonders in Kalkstein, vor; so namentlich Bleiglanz, Blende und Galmei. Die Lagerküde gleichen ihrer Gestalt nach ungefähr großen unregelmäßigen Einsen, und diese können durch Flächenausdehnung bei geringer Mächtigkeit (Mächtigkeit) in Lager übergehen, ja manche, namentlich Sphärosideritlager, sind geradezu aus vielen einzelnen linsenförmigen Massen zusammengeleget.

Erzimpregnationen nennt man solche Lagerstätten, deren Erztheilchen durch die Masse eines gewöhnlichen Gesteins vertheilt sind, ohne scharfe äußere Umgrenzung ihres Vertheilungsraums, während Lager, Gänge und Stöcke in der Regel ziemlich bestimmte äußere Grenzen zeigen.

Dabei können Impregnationen durch die allgemeine Gestalt des Raums, den sie einnehmen, sich der Form nach sowohl den Lagern als den Gängen und Stöcken nähern, weshalb man denn auch lagerförmige (wie bei n Fig. 1), gangförmige (bei o) und stockförmige Impregnationen unterscheidet. Nur selten kommen Erzimpregnationen ganz selbständig, d. h. ohne Verbindung mit bestimmter abgegrenzter Lagerstätte vor, d. h. sie begleiten in den meisten Fällen Lager oder Gänge in ihrem Hangenden und Liegenden, wie bei o, Fig. 1, oder sie umhüllen allseitig stockförmige Massen.

Da die Erzgänge die wichtigste und interessanteste Gruppe von Erzlagerstätten bilden, so sind einige ihrer Eigenthümlichkeiten durch folgende Figuren: 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8, specieller erläutert worden. Hierzu noch Folgendes: In den Gängen treten mit den Erzen oft innig verbunden gewöhnlich einige nicht metallhaltige Mineralien, zuweilen auch Bruchstücke oder zerriebene Theile des Nebengesteins auf, die man zum Unterschied von den eigentlichen Erzen Gangarten zu nennen pflegt. Die häufigsten sind Quarz, Kalkspat, Braunsparat, Manganspat, Eisenspat, Schwefelspat und Zinkspat; außer diesen kommen aber noch zahlreiche andere Mineralien zuweilen als Gangarten vor. Die Erze und Gangarten sind nun in den Erzgängen auf verschiedene Weise verbunden, und bringen dadurch

Texturercheinungen hervor, die zum Theil allerdings mit denen der Gesteine übereinstimmen, zum Theil aber auch davon verschieden sind. Die Figuren 3, 4 und 8 stellen neben andern Gangerscheinungen einige besonders charakteristische Texturverhältnisse dar.

Gang besonders interessant und lehrreich ist die sogenannte Lagerstruktur vieler Erzgänge, wovon Fig. 3 ein ausgezeichnetes Beispiel liefert. In diesem Falle ist die von a bis l geöffnete Spalte nach und nach durch je ein untereinander etwas verschiedene Minerallagen ausgefüllt worden, die aus der Abbildung durch die Buchstaben a bis l in ihrer chronologischen Aufeinanderfolge bezeichnet sind. Zuerst bildete sich an beiden Spaltenwänden die aus Blende bestehende Lage a aus, darüber die Quarzlage b, dann eine Fluspathlage c, und so fort bis l, welches die mittlere aus Kalzspat bestehende Doppellage ist. Da diese beiderseitig angelegene Doppelschicht den noch übrigen Spaltenraum nicht allenthalben vollständig erfüllte, so blieben theilweise flache Hohlräume übrig, in welche der Kalzspat auskristallisirte und so mittlere Drusenräume bildete.

In diesem Falle ist die Anordnung der einzelnen Minerallagen eine durchaus symmetrische von den Spaltenwänden oder sogenannten Saalbändern des Ganges nach der Mitte zu, und die einzelnen Lagen bestehen meist aus gänzlich voneinander verschiedenen Mineralsubstanzen; das ist aber keineswegs immer der Fall; nicht selten bestehen die meisten einzelnen Lagen aus derselben Mineralsubstanz, und unterscheiden sich nur durch etwas verschiedene Färbung oder Krystallisation voneinander, wie das namentlich bei den sogenannten Wandbathotaxen der Fall ist, in denen man gewöhnlich mehr als hundert regelmäßig aufeinanderfolgende, nur etwas ungleich gefärbte Lagen von Kieselsubstanz unterscheiden kann.

Auch die symmetrische Anordnung der Lagen ist zuweilen unterbrochen oder gestört, indem einzelne Minerallagen nur einseitig auftreten oder in einer falschen Stellung eingeschoben erscheinen, welche letztere Abweichung von der normalen Symmetrie meist dadurch erklärt werden kann, daß nach der ersten Ausfüllung der Spalte in dem so weit fertigen Gange aus neue Spalten aufgerissen sind, die der ersten Spalte mehr oder weniger parallel verlaufen, und nun nachträglich von Mineralsubstanzen erfüllt wurden. Auf diese Weise scheint z. B. der Fig. 2 dargestellte Fall am einfachsten erklärt werden zu können.

Fig. 4 stellt eine etwas unregelmäßig zerfallene, und von Erzgängen durchzogene Felswand des Montecalei in Oberitalien dar, in welcher sich die Erze und Gangarten derart concentrisch-schalenförmig gruppirt haben, daß dadurch sogenannte Ringerze oder Concenterze entstanden sind, welche im Querbruch concentrische Lagen von ungleicher Beschaffenheit und Farbe zeigen.

Fig. 8 zeigt den Querschnitt eines sogenannten Doppellanges, welcher durch Ausfüllung zweier parallel neben- und nacheinander aufgerissener Spalten zu entstehen ist. In der durch a und b bezeichneten Spalte ist zuerst eine krystallinische Quarzlage (a) an beiden Spaltenwänden abgelagert worden, und dann wurde der mittlere Raum (h) durch eine Breccie ausgefüllt, deren aus Blende und Bleiglanz bestehende Bruchstücke durch krystallinischen Quarz verbunden sind, welcher die einzelnen Stücke radial umstrahlt. Die Spalte zwischen a und c scheint dann später aufgerissen und durch ganz andere Materialien ausgefüllt worden zu sein.

Fig. 9 zeigt uns in schieferigem Gneis einen ältern,

aus Blende und Bleiglanz massig zusammengefügten Gang, welcher von einem jüngern Schwefelpatgang durchsetzt ist, der im obern Theil der Figur sich verzweigt.

Fig. 6 liefert einen idealisirten Querschnitt der sehr verdickelten Gesteins- und Gangverhältnisse eines Zinnerzgebirgs in Cornwall. Hier besteht die Gegend vornehmlich aus dem von den dortigen Vergleuten Killas genannten Theuschiefer (K). Dieser ist zunächst local unterbrochen und durchsetzt von mächtigen Granitmassen (G), welche hier und da auch kleine gangförmige Ausläufer in den Theuschiefer bilden. Diese beiden Gesteine sind nun aber wieder mehrfach gangförmig durchsetzt von einer Art Quarzporphyr (P), welchen in Cornwall die Vergleuten Elvans zu nennen pflegen. Noch später sind dann zahlreiche Spalten aufgerissen, in welchen sich Zinnerze und zum Theil auch Kupfererze, zugleich mit verschiedenen andern Mineralsubstanzen, abgelagerten. Diese Erzgänge sind auf der Abbildung durch schwarze Linien dargestellt, und es ist aus den Beziehungen dieser Linien zueinander zugleich erkennbar, daß diese Spalten in verschiedenen Zeiten nacheinander aufgerissen und ausgefüllt worden sein müssen, denn sie kreuzen sich nicht nur vielfach, sondern durchsetzen und verwerfen sich auch ziemlich häufig, so namentlich unter v und e. Die kleine Partie bei s deutet ein sogenanntes Zinnerzeisenlager an, welches hier offenbar durch theilweise mechanische Zerstörung, Ab- und Anschwemmung von Zinnerzgängen entstanden ist, und aus welchen sich das Zinnerz nun um so leichter gewinnen läßt.

Fig. 7 stellt den Querschnitt eines solchen sogenannten Seifenlagers am Ural dar, aus welchem aber nicht Zinnerz, sondern kleine Goldkörner aus den Sand-, Lehm- und Geröllschichten b und c gewonnen werden, die hier die unebene Oberfläche von krystallinischen Schiefergesteinen (a) überdecken, und selbst wieder von einer unhaltigen Bodenschicht theilweise überdeckt werden. Alle Seifenlager — deren Veneuerung von der Methode ihrer Gewinnung, dem Auswaschen oder Ausseifen herrührt — haben das Gemeinsame, daß man in ihnen keine selbststehenden Erze, sondern nur lose eingestreute Körner oder Blättchen eines specifisch schweren und zugleich schwer zerstörbaren Metalls, wie Gold und Platin, oder Zinnerz, weit seltener auch Edelsteinkörner (wie Diamanten) findet, die den mechanischen und chemischen Einwirkungen des Wassers großen Widerstand leisten.

Fig. 5 stellt nun schließlich noch einen sehr sonderbaren Fall von Verwerfung dar, bei dem es zunächst den Anschein gewinnen kann, als wenn gegen alle Wahrscheinlichkeit der jüngere Gang b, welcher einen ältern a sehr deutlich durchschnitten (durchsetzt hat), dennoch von dem ältern a sogar zweimal verworfen sei, was nach der streng mathematischen Theorie der Verwerfungen eine absolute Unmöglichkeit ist. Dieses Räthsel löst sich indessen sehr einfach durch die Voraussetzung, daß an den Saalbändern (Spaltenwänden) des ältern Doppellanges a, nachdem er bereits von b durchsetzt war, nochmals Spalten aufgerissen sind, welche mit Verschiebung der Massen verbunden waren, ohne ausgefüllt zu werden — d. h. ohne wirkliche Gänge zu bilden —, wie das sehr häufig geschehen zu sein scheint. Vergleichen Spalten nennt man Verwerfungsflüsse.

Organismen der geologischen Perioden.

(Tafel 4 bis 7.)

Die Tafeln 4 bis 7 stellen charakteristische Beispiele von Organismen verschiedener geologischer Perioden

dar, deren Ueberreste man im fossilen (versteinerten) Zustande aufgefunden und danach zum Theil möglichst ergänzt hat. Da aber diese vier Tafeln nicht chronologisch geordnet sind, so dürfte es zweckmäßig sein, der Beschreibung der einzelnen hier eine dem Alter der durch sie dargestellten geologischen Zeiträume entsprechende Reihenfolge voranzuschicken.

Grauwackenperiode, umfassend die cambrische, silurische und devonische Zeit, Taf. 7, welche jedoch am untern Rande auch noch einige Pflanzenreste der Kohlen- und Triasperiode enthält, deren wichtigste bereits auf Taf. 2 dargestellt wurden. — Kohlenperiode, Taf. 2. — Triasperiode, Taf. 4. — Jura- und Kreideperiode, Taf. 5. — Tertiärperiode, Taf. 6.

Triasperiode

Nach den in Deutschland bekannten Ablagerungen pflegt man die Triasperiode in eine Buntsandstein-, Muschelkalk- und Keuperzeit einzuteilen. Aus allen diesen Zeitabschnitten sind auf Taf. 4 einige Organismen, zum Theil in etwas idealisirter Ergänzung dargestellt. Während der ganzen Triasperiode scheint Deutschland local wechselnd Land- und Meeresboden gewesen zu sein, denn man findet Reste von Land- und Meeresorganismen theils in verschiedenen, miteinander wechselnden Schichten, theils sogar in denselben Schichten beisammen, in welchem letztern Falle die Landpflanzenreste als in eine flache Meeresbucht eingeschwenkt anzusehen sind. Die Pflanzen und Thiere dieser Periode waren jedenfalls sehr verschieden von allen denen, welche heute auf der Erde leben; auch zeigt sich in der Vertheilung ihrer fossilen Reste noch keine Spur deutlicher Klimazonen.

Fig. 5 auf Taf. 4 stellt eine ideal componirte Gruppe von Bewohnern jenes Meeres und seiner Ufer dar, aus welchem die Muschelkalkformation abgelagert worden ist, während Fig. 1 bis 4 und 6 bis 14 einzelne für diesen geologischen Zeitraum besonders charakteristische Reste von Meeresbewohnern bringen, deren Namen am untern Rande der Tafel angegeben sind. In dem stark bewegten Meer auf Fig. 5 schwimmen zwei vom benachbarten Lande eingeschwenkte Baumstränke, auf deren einem ein riesiger Notosaurus hinaufzuklettern bemüht ist, wahrscheinlich weil seine vier Füße weit besser zum Fortbewegen auf dem Lande als zum Schwimmen in stürmischen Fluten eingerichtet waren. Ein ganz ähnliches Reptil hat wol aus gleichem Grunde sich auf eine benachbarte Felsklippe gerettet, auf deren flacher Ausbreitung zahlreiche Seethiere verschiedenster Art ausgepflückt wurden, deren fossile Reste zum Theil auf unserer Tafel speciell abgebildet sind.

Fig. 1: Nautilus bidorsatus, eine längst ausgestorbene Species der Nautilen, welche noch jetzt das Meer bewohnen, während Fig. 4, Ceratites nodosus, einem Geschlechte der Ammonoiten angehört, die seit dem Schluß der Kreideperiode überhaupt vollständig ausgestorben zu sein scheinen, während sie in der Juraperiode ihre größte Blüte erreichten.

Fig. 2: Encrinurus liliiformis, muß in der Muschelkalkzeit ungemein zahlreich den Meeresboden bewohnt haben, denn es finden sich in dieser Formation weit ausgedehnte Schichten, die fast nur aus den unter 2 besonders abgebildeten Stielgliedern dieses längst erloschenen Crinoiden bestehen.

Fig. 6, 8, 9, 12 und 13 stellen einige besonders charakteristische Conchylien desselben Zeitraums dar, 10 einen Krebs, 11 einen Seefern und 14 eigenthümliche innere Organe gewisser Cephalopoden; Fig. 17 eine ideal zusammengestellte Landschaft der Keuperzeit;

zwischen Hügeln, die nur sparsam von Spätes Jarn bewachsen sind, dehnt sich ein sumpfartiger, von dessen Boden sich riesige Schilfpflanzen und andere Sumpfpflanzen erheben. Von den auf Fig. 7 eine speciellere Zeichnung. Das Reptil auf Fig. 17 ist ein Mastodonsaurus, Kopfreste ziemlich häufig im Keuper gefunden. In derselben Formation sind auch bis jetzt die Säugethierreste gefunden worden, wovon Fig. 18 eine Kinnlade darstellt.

Die Buntsandsteinformation enthält in der verhältnißmäßig nur wenig organische Reste, einige Pflanzenabdrücke, Fig. 18, welche von carien ähnlichen Bäumen herabgerührt scheinen höchst merkwürdige Fußabdrücke (Fährten) eines großen Chiropterus genannten Reptils, die in der Gegend von Hildburghausen ziemlich häufig Schichtflächen eines Sandsteins finden.

Jura- und Kreideperiode.

Taf. 5 enthält Abbildungen einiger besonders charakteristischer Lebensformen der Jura- und Kreidezeit. Fig. 4 zunächst eine nach Oswald Heer zusammengestellte Küstengegend der Jurazeit. Vom Meeresgrunde wachsen mancherlei Korallen, Sch und Crinoiden empor, zwischen denen die verschiedensten Conchylien umherliegen, die zum am Rande der Tafel speciell abgebildet sind; nur flach über den Meerespiegel erheben sich Inseln — zum Theil Koralleninseln — die einer üppigen Vegetation bedeckt, die vorherrschend Jarn, Cycaden und Palmen besteht.

Fig. 19 bringt dagegen eine ideal ergänzte Gruppe aus dem Zeitraum zwischen Jura- und Kreideperiode, in welchem die Wälder und Weisterfer abgelagert worden sind.

Nach diesen beiden belebten Landschaftsbildern wir die auf unserer Tafel dargestellten, besonders charakteristischen fossilen Thierformationen beider Zeitalter näher betrachten, und zwar zunächst die der Jurazeit. Fig. 5, 6 und 7 stellen drei höchst merkwürdige Reptilien dieses Zeitraums dar; Fig. 5 eine segelflügelige (Pterodactylus); das war, nach mehreren lithographischen Kalkstein von Solenhofen gefunden Skeleten, ein mit scharfen Zähnen bewaffneter ekelartiges Thier, welches vermittelst fledermausartiger Flughäute sich durch die Luft bewegen konnte, mit lange Krallen an den Extremitäten vielleicht dienten, seine Beute zu erfassen oder sich selbst auf Baumstämmen anzuklammern. Fast ebenso abenteuerlich von allen jetzt lebenden Thierformen waren die Psittacosaurier, Fig. 6 und 7. Beide mit stoffenartigen Schwimmschalen, wie sie kein lebendes Reptil je vorberrschend auf das Leben im Meere angewandt hat, befähigt sich auf trockenem Lande fortzubewegen, beide nach ihrem Zahn- und Körperbau höchst eigige Raubthiere, wie sich sogar aus den von ihnen herrührenden versteinerten Excrementen (Koprolithen, Fig. 8) ergibt, welche zahlreiche Reste thierischer Nahrung enthalten. Den Psittacosaurius scheint kein schwächerer langer Hals dazu befähigt zu haben, den hoch über den Wasserpiegel zu erheben, um nach Beute auszuspähen, während dagegen der mächtige und plumpe Ichthyosaurus durch wahrhaft tellerartige Augen besonders befähigt gewesen zu sein scheint, tief unter dem Meerespiegel noch deutlich zu sehen. Diese monströsen Reptilien haben, wie sich aus den Skeleten ergibt, zuweilen eine Länge von mehr als 30 Fuß erreicht, und müssen während der Ablagerung der sogenannten Juraformation in Süddeutschland

haben ungemein häufig gewesen sein, wie sich aus der großen Zahl von ihnen herrührender Knochen und Schalen ergibt, die man aufgefunden hat.

Unter den wirbellosen Thieren dieser Periode spielen Cephalopoden eine ganz besonders interessante Rolle. Es lebten damals noch zahlreiche Genera und es dieser Ordnung, die jetzt gänzlich ausgestorben ist, so namentlich Belemniten und Ammoniten, Fig. 16, 24 und 27. Von zweifelhafteigen Meeresmuscheln Stratiopoden dieser Periode sind unter Fig. 9, 10 und 27 drei Beispiele abgebildet, von Strahlthieren zwei unter Fig. 3 und 23.

In der Kreideperiode lebten ebenfalls noch viele Ammoniten und ammonitenartige Cephalopoden, die jetzt gänzlich ausgestorben sind. Fig. 16, 24 und 27 stellen sogenannte Krüppelformen der Kreideammoniten dar, in welchen sich die bei den echten Ammoniten spiralförmig fest aufgerollte Schale theils getrennt und theilweise aufgewickelt, theils thurmformig aufbaut zeigt. Fig. 12 gehört ebenfalls zu den Cephalopoden dieser Periode, ist aber kein Ammonit, sondern ein echter Nautilus, dessen Nachkommen noch lebend im Meere gefunden werden. Unter den thierischen Muscheln der Kreideperiode sind besonders die Abtheilung der Rudisten gehörigen Hippuriten, Fig. 17, höchst charakteristisch; aus ihren dicken Schalen bestehen beinahe ausschließlich gewisse ziemlich grobe und weitverbreitete kassige Ablagerungen in Alpen und an den Küsten des Mittelländischen Meeres, die man deshalb Hippuritenkalksteine genannt hat. Vielleicht nicht ganz so häufig, aber ebenso charakteristisch sind die Fig. 13, 15, 18 und 27 abgetheilt zweifelhafteigen Muscheln (zum Theil Terebratuliten). Aus der Klasse der Strahlthiere kommen in Ablagerungen der Kreideperiode sehr viele, zum Theil in Feuerstein umgewandelte Schiniten oder Spongel vor, zu denen z. B. auch der Fig. 22 abgebildete Spatangus gehört. Aus der Abtheilung der Nesseltiere finden sich zuweilen massenhafte Ablagerungen von Serpula, Fig. 21, während dagegen Gesteine der weißen Kreide, wie sich unter dem Namen Spatangus ergibt, fast gänzlich aus den mit bloßem Auge unsichtbar kleinen Kalkschalen von Foraminiferen Polythalamien zusammengesetzt ist, wovon Fig. 23 vergrößerte Abbildungen bringt.

Tertiärperiode.

Man pflegt die Tertiärperiode in drei Hauptabtheilungen zu theilen, nämlich in die älteste oder eocäne Periode, die mittlere oder miocäne und die neueste oder pliocäne; doch sind die Ablagerungen dieser einzelnen Zeiträume nicht immer scharf und leicht erkennbar voneinander verschieden, während dagegen auch die ältesten Tertiärabtheilungen sowohl durch ihre Lagerungsart als durch ihre Versteinerungen scharf und leicht erkennbar von den jüngsten Ablagerungen der Kreideperiode getrennt zu sein scheinen. Alle tertiären Ablagerungen unterscheiden sich von den Kreideablagerungen von allen andern, daß sie unter Versteinerungen die Ueberreste einiger noch lebender Species enthalten, während in den ältesten Ablagerungen von der Kreide an abwärts noch niemals lebende Reste einer noch jetzt lebenden Art gefunden sind. Das Verhältniß der lebenden Arten zu ausgestorbenen nimmt aber in den tertiären Ablagerungen derart stetig zu, daß, während die ältesten Tertiärabtheilungen nur wenige Procent lebende Species enthalten, in den mittlern beinahe schon ein Drittel lebender Species zusammen mit zwei Dritteln ausgestorbener gefunden werden, in den neuesten plio-

cänen die lebenden Arten sogar die ausgestorbenen überwiegen. Auf dieses Verhältniß begründete Oppell seine Eintheilung in eocän, miocän und pliocän. Auf unserm Bilde sind einige charakteristische Lebensformen aller drei Zeitabschnitte dargestellt.

Beginnen wir mit der nähern Betrachtung der ideal zusammengestellten tertiären Landschaft, Taf. 6, Fig. 3. Da in derselben nur solche Pflanzen dargestellt sind, deren fossile Reste im südlichen Deutschland und der Schweiz aufgefunden wurden, so geht daraus hervor, daß dieser Erdraum damals ein fast tropisches (subtropisches) Klima besessen haben muß, denn Palmen, Cycadeen u. dgl. herrschen durchaus vor; von den andern Bäumen, Sträuchern und Krautarten ist nur eine mächtige Araucarie auf der linken Seite deutlich erkennbar; es sind aber ebenfalls schon zahlreiche Dicotyledonen und andere üppig blühende Pflanzen darunter; während diese in den vorhergehenden geologischen Perioden noch äußerst selten gewesen sind und der Kohlenperiode wahrscheinlich ganz fehlten. Damit stimmt auch die reiche Fauna der tertiären Periode überein; man hat Reste und Spuren von zahlreichen Insekten gefunden, und auch sehr viele Knochen verschiedenartiger Säugethiere, die jedoch auf unserm Bilde nur durch zwei Riesenelefanten (Mammuth) und einige Flußpferde vertreten sind. Ein großer Salamander, Andrias Scheuchzeri (Fig. 5), ist uns als Skelet unter unserer tertiären Sumpflandschaft dargestellt. Dieses Skelet wurde schon im vorigen Jahrhundert bei Denningen in neutertiärem Kalkstein aufgefunden und damals von Scheuchzer als homo diluvii testis bestimmt. In derselben Kalksteinlagerung finden sich sehr zahlreiche Abdrücke von Landpflanzen, Süßwasserkriechen, Muscheln und Insekten.

Fig. 2 ist das in Alabama aufgefundenene Skelet eines riesigen Seefäugelhais (einer Cetacee), welches anfangs für ein großes, 80 Fuß langes Reptil gehalten und in Europa unter dem Namen Hydrarchos vorgezeigt wurde.

Ungemein reich an Fischabdrücken sind besonders die eocänen Kalkschichten am Monte Volca in Oberitalien, und die ungefähr gleichalten Thonschiefer im Canton Glarus. Vom ersten Orte stammt der Fisch Fig. 1, vom letztern dagegen der Fig. 14. Diese letztere Localität ist namentlich deshalb von ganz besonderem geologischen Interesse, weil man daselbst in einem verhältnißmäßig kleinen Gebiet 53 Species von ausgestorbenen Fischen entdeckte, die in keiner andern gleichalten Lagerung bekannt sind. Fig. 9 ist der Zahn eines tertiären Haihais, wovon ebenfalls sehr viele Species in den neutertiären Ablagerungen gefunden wurden. Unter Fig. 8 sind drei tertiäre Krebsformen abgebildet, a Telphusa speciosa, eine Seefrösche, b Eier einer Daphnia und c Cyprislarve, ein sehr kleiner Süßwasserkrebs, welcher in eine bohnenförmige Schale eingeschlossen und deshalb schwer als Krebsthier zu erkennen ist.

Fig. 11 ist die Schale eines tertiären Cephalopoden, welche sich der lebenden Gattung Argonauta anschließt.

Fig. 13 stellt 26 Arten von Meeresconchylien dar, welche in den eocänen Ablagerungen des pariser Beckens, besonders im sogenannten Gröbthal gefunden wurden, aus dem man weit über 1000 Species kennt. Da dieselben auf der Tafel nicht einzeln benannt sind, so folgt hier ein nach den beigefügten Buchstaben geordnetes Verzeichniß:

- a Cassidaria carinata,
- b Strombus ornatus,
- c Conus diversiformis,
- d Rostellaria columbella,

- e Ampullaria accumulata,
- f Buccinum stromboides,
- g Pyrala nexilis,
- h Pleurotoma transversaria,
- i Marginella ovulata,
- k Harpa mutica,
- l Cerithium tricarinatum,
- m Oliva nitidula,
- n Fusus bulbiformis,
- o Bifronta laudincensis,
- p Cyrena depressa,
- q Natica cepacea,
- r Neritina conoides,
- s Pileopsis cornucopiae,
- t Lucina concentrica,
- u Cardium aviculare,
- v Corbis tumida,
- w Venericordia coravium,
- x Chama lamellosa,
- y Cyrena depressa,
- z Cyclostoma mumia,
- tz Venus turgidula.

Das sind eben nur wenige Beispiele einer ungemein reichhaltigen localen Meeresfauna der ersten Tertiärzeit, welcher auch das besonders schöne und große, unter Fig. 4 abgebildete Cerithium giganteum angehört.

Noch einige höchst merkwürdige eocäne Schalthierformen sind unter Fig. 6, 7 und 12 abgebildet, nämlich sogenannte Nummuliten, aus deren fossilen Resten weitverbreitete mächtige Ablagerungen der ältern Tertiärzeit ganz vorherrschend zusammengesetzt sind, weshalb man dieselben auch wol Nummulitengesteine (Nummulitenkalksteine und Nummuliten Sandsteine) zu nennen pflegt. Diese Nummulitengesteine wurden zuerst sehr mächtig an den Alpenrändern erkannt, breiteten sich aber von da aus durch das gesammte große Karpatengebiet über sämtliche Küstenländer des Mittelländischen und des Nothen Meeres aus, und selbst auf Borneo und Sumatra scheinen sie noch ziemlich ausgedehnt vorhanden zu sein, während dagegen die deutschen, französischen und englischen Tertiärbildungen gleichen Alters nördlich von den Alpen nur höchst selten und ganz vereinzelt Nummulitenreste enthalten. Diese meist flach-linsenförmigen Gehäuse, welche wegen ihrer Ähnlichkeit mit Münzen „Nummuliten“ genannt wurden, gehören der in der Reihe der thierischen Organismen sehr tief stehenden Ordnung der Foraminiferen an, und zeigen, wenn man sie passend durchbricht oder durchschneidet, einen spiralförmigen Bau und eine Zusammensetzung aus lauter kleinen Zellen, deren jede von einem besondern Thierchen bewohnt gewesen zu sein scheint, ähnlich wie die kleinen Zellen der Korallen. Echte Nummuliten existiren gegenwärtig nicht mehr lebend im Meere, und scheinen auch vor der Tertiärperiode, in der sie eine so außerordentliche Rolle spielten, nicht existirt zu haben.

Endlich ist unter Fig. 10 noch der Zapfen einer tertiären Sequoia (Wellingtonia) abgebildet, also demselben Genus zugehörig, dem die californischen Baumriesen angehören; sonderbarerweise scheinen aber die tertiären Sequoien bei weitem nicht die Größe der californischen erreicht zu haben, während dagegen ihre fossil aufgefundenen Zapfen zum Theil sogar noch etwas größer sind als die der californischen Riesenhölzer.

Grauwackenperiode.

Grauwackenperiode oder auch Uebergangsperiode pflegt man den ältesten geologischen Zeitraum

zu nennen, aus welchem deutliche organische Rest-Versteinerungen bekannt sind. Was ihm vorher wird etwas ungenau als Erstarrungsperiode oder wol als azoische Zeit bezeichnet. Die Grauwackenperiode theilt man aber neuerlich gewöhnlich in cambrische, silurische und devonische Zeit ein; an schließen sich dann als noch neuer die Kohlenperiode, die Dvapériode an, welche mit der Grauwackenperiode auch wol gemeinsam zu dem primären Zeitraum rechnet werden, im Gegensatz zu dem secundären, welcher Trias-, Jura- und Kreideperiode umfasst, welche dann der tertiäre und quartäre Zeitraum ist. Taf. 7 enthält Abbildungen von Versteinerungen aus allen drei Zeiträumen der Grauwackenperiode, außerdem noch zwei aus der Dvapériode.

Aus der cambrischen Zeit, in den ältesten der sedimentären Gesteine, sind nur sehr wenige bestimmbar organische Reste bekannt, und da noch gar keine von Wirbelthieren. Es sind dari wenige niedere Meeresmuschelarten, undeutliche Pflanzen und eine noch etwas unsichere Pflanze, Hamia, Fig. 6, gefunden worden; selbst von der scheinlichen Foraminiferengattung Ekzoon, deren man in Kalksteineinlagerungen noch älterer triascher Schiefer entdekt zu haben glaubt, sind in cambrischen Thonschiefern und Kalksteinen noch Exemplare aufgefunden worden.

Weit reichhaltiger ist nun schon die Flora, und ders die Meeresfauna der Silurzeit. Dahin reu z. B. die Fig. 1 abgebildeten sehr charakteristischen Graptolithen, von denen es eine Zeit lang zweifelhaft blieb, ob sie zu den Zuccoideen oder nur zu den Lepidodendren gehörten, während sie gegenwärtig mit Sicherheit zu den Foraminiferen gerechnet werden. Silurischen Ablagerungen kommen schon ziemlich Orthoceratiten, Korallen, Meeresmuscheln und biten vor, von denen unsere Tafel jedoch vorher einige Repräsentanten aus der etwas neuern Zeit enthält. In den russischen Ostseeprovinzen man in silurischen Thonablagerungen auch deren deutliche Fischzähne gefunden, noch nirgends aber die Reste höher stehender Wirbelthiere.

Die Devonzeit hat nicht nur mehr, sondern unter auch höher organisirte fossile Thierreste, welche den Hauptinhalt von Taf. 7 bilden. gehören die folgenden als ziemlich charakteristische Formen:

A. Einige sehr eigenthümliche, und von le stark abweichende Fische, die zum Theil von festen Panzer umhüllt waren, wie Fig. 20, 21 und 36. Von Fig. 11 und 32 wird später be sein, da diese Fische der weit jüngern Dvapériode angehören, und hier nur aus räumlichen Gründen abgebildet wurden.

B. Trilobiten, Fig. 4, 22, 33 und 34; die Crustaceen, welche jedoch von allen jetzt lebenden artigen Thieren sehr verschieden waren. Sie die Meere der Grauwackenperiode in großer Mannichfaltigkeit bewohnt zu haben, dann al bald ausgestorben zu sein. Aus der Silurzeit man gegen 500 Species, aus der Devonzeit weniger, und in den Ablagerungen der Kohlen werden nur noch vereinzelte gefunden.

C. Die Ordnung der Cephalopoden war Grauwackenperiode namentlich durch die Orthoceratiten, Fig. 21, Phragmoceras, Goniatites, Fig. 2, und Clymenia, Fig. 25, ten, während es damals noch gar keine echten niten und noch weniger Belemniten gegeben scheint.

D. Brachiopoden, zu denen auch die bis in die lebende Schöpfung hineinreichenden Terebrateln gehören, waren ungemein häufig und mannichfaltig, und darunter viele später ganz ausgestorbene Geschlechter, wie *Pentamerus*, Fig. 10, *Calceola*, Fig. 12, *Spirifer*, Fig. 15 und 17; während die Gattungen *Leptaena*, Fig. 3, *Productus*, Fig. 8, und *Chonetes*, Fig. 19, häufiger in den Ablagerungen der Kohlen- und Dyasperiode als in denen der Grauwackenperiode gefunden wurden.

E. Von zweischaligen Muscheln enthält Taf. 7 nur ein Beispiel, Fig. 29, obwohl dieselben keineswegs zu den Seltenheiten gehören.

F. Einschalige Weichthiere (Meeres Schnecken), sind in den Ablagerungen der Grauwackenperiode ziemlich häufig; darunter z. B. die Genera *Murchisonia*, Fig. 5, *Eumphalus*, Fig. 9, und *Bellerophon*, Fig. 18.

G. Die Ordnung der Strahlthiere war besonders durch Crinoideen wie *Pentatremites*, Fig. 16, *Melocrinus*, Fig. 30, *Cupressocrinus*, Fig. 7, und *Hypanthocrinus*, Fig. 26, stark vertreten.

H. Ganz außerordentlich zahl- und formentreich war die Klasse der Zoophyten (Schwämme und Korallen). Dazu gehören aus unsrer Tafel: Fig. 23, *Catenipora labyrinthica*, welche nur aus silurischen Ablagerungen bekannt ist; Fig. 24, *Cyathophyllum flexuosum*, sehr charakteristisch für devonische Schichten; Fig. 27, *Receptaculites Neptuni*, und Fig. 28, *Calamopora polymorpha*.

Schließlich sind nur noch einige auf Taf. 7 abgebildete Verfeinerungen der Dyasperiode zu besprechen, die nur des Raums wegen hier aufgenommen wurden. Es sind die folgenden:

Fig. 8, *Productus aculeatus*, eine für die Dyasformation als obere Abtheilung der Dyas sehr charakteristische Brachiopoden-Species. Fig. 11 und 32, zwei Meeresfische, deren Abdrücke man ungemein häufig in dem sogenannten Kupferschiefer findet, und welche durch ihren unsymmetrischen (heteroceren) Schwanzflossenbau von allen jetzt lebenden Fischen besonders stark abweichen. Ferner Fig. 37 und 38, die Querschnitte zweier verflochtener Farnstämme aus dem Rothliegenden, welches die untere Abtheilung des Dyas bildet.

Vulkane.

(Tafel 8.)

Die Vulkane werden häufig, aber mit Unrecht, feuerpeinende Berge genannt, denn in Wirklichkeit treten bei ihrer normalen Thätigkeit aus ihnen keine Flammen, überhaupt kein Feuer im gewöhnlichen Wortsinne hervor, wie denn überhaupt Feuer — Verbrennung mit Flammen — im Erdinnern, aus dem ihre Wirkungen hervorgehen, etwas Unabbares, eine naturhistorische Unmöglichkeit ist. Alexander von Humboldt hat die vulkanische Thätigkeit überhaupt zuerst sehr passend definiert als eine Reaction des heißflüssigen Erdinnern — nicht etwa Centralfeuers — auf die feste Erdkruste und deren Oberfläche. Nur als Nebenerscheinung kommt es zuweilen vor, daß unter andern auch brennbare Gasarten aus vulkanischen Spalten ausströmen, und nach ihrer zufälligen Entzündung wirkliche Flammen bilden, die aber durchaus nicht als nothwendig mit vulkanischen Eruptionen überhaupt verbunden sind.

Wenn auch die lokalen und zeitlichen Veranlassungen der Entstehung von neuen Vulkanen wie der Eruptionen vorhandener, noch in großes Dunkel gehüllt sind, so steht doch so viel fest, daß alle vulkanischen

Berge, welche in der Regel eine ziemlich kegelförmige Gestalt zeigen, fast ausschließlich durch das Material solcher Eruptionen aufgebaut sind, indem um eine, mit dem Erdinnern in Verbindung stehende Oeffnung — um einen Krater — herum sich nach und nach allseitig ausgeworfene Schladen und übergeflossene Lavaströme aufhäufen und in dieser Weise immer höhere sogenannte Eruptionskegel bilden.

Nun zeigen aber manche Vulkane einen, den eigentlichen Eruptionskegel und Krater concentrisch umgebenden, mehr oder weniger vollständigen und hohen, ringförmigen Bergwall, wie z. B. der Vesuv die Somma, und diese äußern Ringwälle hat man infolge einer besondern Erklärungshypothese Erhebungskegel und Krater genannt, in der Voraussetzung, dieselben seien nicht wie die echten Eruptionskegel durch Ueberfließen von Lava und Aufschüttung ausgeschleuderten Materials, sondern vielmehr durch der Eruption vorhergehende, gleichsam blasenförmige Erhebung oder Aufschwellung und centrale Versenkung des Bodens entstanden. Solche sogenannte Erhebungskegel sind Taf. 8, Fig. 2a im idealen Querschnitt, und Fig. 3 und 5 in äußerer Ansicht dargestellt.

Durch die sorgfältigen Untersuchungen von Wyell, Jungshuhn, Hartung u. s. w. ist erwiesen worden, daß diese sogenannten Erhebungskegel (die äußern Ringwälle vieler Vulkane) in Wirklichkeit nur die Ueberreste der Einstürzung früher größerer und höherer Eruptionskegel sind, nicht aber die Folgen einer besondern, den Eruptionen vorhergehenden localen Bodenerhebung und Aufblähung.

Der ideale Querschnitt eines Vulkans, Fig. 2, zeigt uns unter aa den Keil eines früher viel höhern, dann aber in unterirdische Ausböhungen eingestürzten Eruptionskegels, in dessen Centrum sich um den zu neuer Eruption gelangten Kraterschlund d herum ein neuer Eruptionskegel b aus Schladen und Lavaschichten aufgebaut hat, der nun von den Resten eines früher sogenannten Erhebungskegels, eigentlich aber zum Theil eingestürzten alten Eruptionskegels concentrisch umgeben ist, wie der Vesuv, Fig. 5, von der Somma. Dieser innere neuere Eruptionskegel besitzt natürlich auch seinen besondern neuen Krater c, welcher durch den Schlund d mit dem Erdinnern in Verbindung steht. Die schwarzen Streifen im Querschnitt des neuen Eruptionskegels stellen Lavaergießungen zwischen den aufgeschichteten Anhäufungen von ausgeschleudertem lodern Material l dar, während mit dem Schlund d auch einige Seitenipalten in Verbindung stehen, die ebenfalls mit heißflüssiger Lava erfüllt wurden.

Fig. 4 in der untern rechten Ecke der Tafel stellt einen Einblick in den Krater eines 1831 bei Sicilien aus dem Meere hervorgetretenen, später aber wieder verschwundenen neuen Inselvulkans dar. In einem Theile der zuerst ausgegebenen Exemplare sind in der Unterschrift Fig. 3 und 4 verwechselt worden; Fig. 3 ist die Ansicht der vulkanischen Warreninsel mit einem ausgezeichnet schönen sogenannten Erhebungskegel.

Fig. 1 gibt eine Uebersicht von der räumlichen Vertheilung der auf der Erde bis jetzt bekannten thätigen Vulkane; da deren Zahl mehrere Tausende beträgt, so war es natürlich ganz unmöglich, alle einzelnen auf einer so kleinen Karte anzugeben. Es wurden deshalb nur die wichtigsten und bestbekannten Eruptionsstellen durch schwarze Punkte bezeichnet, diese aber durch rothe Färbung derart untereinander verbunden, daß durch diese rothen Farbenfelder und Streifen die vulkanischen Gegenden der Erdoberfläche bezeichnet werden. Schon der erste prüfende Blick auf

diese Karte belehrt uns darüber, daß die thätigen Vulkane in ihrer räumlichen Vertheilung keinem allgemeinen geographischen Gesetz folgen. Sie sind weder ausschließlich, noch vorzugsweise häufig in den Äquatorial- oder Polargegenden zu finden; sie liegen nicht vorzugsweise zwischen bestimmten Breiten- oder Längengraden, überhaupt nicht vorzugsweise in bestimmten Erdgegenden, sondern sie zeigen sich vielmehr im allgemeinen regellos vertheilt. Wenn wir dagegen die Beziehungen ihrer Lage gegeneinander sowie zu den Wasser- und Landgrenzen untersuchen, so ergeben sich allerdings einige interessante Thatsachen, und zwar namentlich die folgenden:

1) Thätige Vulkane finden sich häufiger in der Nähe der Küsten großer Continente, als in ihrem Innern, weit von den Küsten entfernt; über 50 Meilen von den Meeresküsten entfernt kennt man überhaupt nur ganz ausnahmsweise thätige Vulkane, und es sind die im Innern Afriens aufgefundenen rüchlich ihrer gegenwärtigen Thätigkeit sogar noch einigermaßen zweifelhaft. Jedenfalls sind sie in den Küstengegenden viel häufiger, als weit davon entfernt. Dagegen treten einzelne, echt vulkanische Inseln ziemlich weit vom Lande entfernt, inmitten des Großen Oceans hervor.

2) Wo einmal ein thätiger Vulkan vorhanden ist, da finden sich in der Regel mehrere in der Nähe, welche gemeinsam eine vulkanische Gegend bilden, und diese vulkanischen Gegenden nehmen gewöhnlich entweder a) unregelmäßig abgerundete Flächenräume ein, bilden vulkanische Centralgebiete, wie z. B. in Süditalien und auf Island, oder b) die einzelnen Vulkane liegen als Reihenvulkane fast linear hintereinander, in mehr oder weniger ausgedehnten, geraden oder gekrümmten Vulkangürteln. Die letztere Gruppierungsweise ist sogar die häufigere, und findet sich z. B. sehr deutlich bei den Vulkanen, welche den Stillen Ocean umgeben und zum Theil durchziehen.

Rechnet man zu den thätigen Vulkanen auch die erst in den letzten geologischen Perioden erloschenen, aber noch deutlich als solche erkennbaren Vulkane hinzu, dann ergibt sich die vulkanische Thätigkeit noch bestimmter als eine ganz allgemeine, nicht local beschränkte Eigenschaft unsers Erdröppers.

Etwas Aehnliches gilt aber offenbar auch für die Vertheilung der vulkanischen Eruptionen nach der Zeit.

Auch den sorgfältigsten Beobachtungen und Nachforschungen ist es nicht gelungen, für einzelne Vulkane oder für die Gesamtheit derselben eine bestimmte Periodicität ihrer Eruptionen zu erkennen. Ganz unerwartet treten sie zuweilen nach langen Unterbrechungen in Thätigkeit, ebenso erlischt ihre Thätigkeit ohne erkennbare Vorzeichen, um erst nach Jahren, nach Jahrzehnten oder Jahrhunderten aufs neue zu beginnen, mit einem Ausbruch abzuschließen oder jahrelang in unausgesetzter Thätigkeit zu bleiben. Und wenn das nur für den historisch überschaubaren Zeitraum unzweifelhaft feststeht, so scheint es doch auch in allen vorhistorischen geologischen Perioden ganz ähnlich geschehen zu sein, während dabei auch die Räume der vulkanischen Thätigkeit vielfach verschoben wurden.

Mit der vulkanischen Thätigkeit stehen offenbar auch die zuweilen für die Menschen so nachtheiligen Erdererschütterungen, welche man Erdbeben zu nennen pflegt, in sehr naher Beziehung, wenn dieselbe auch noch keineswegs vollständig erkannt ist.

Jeder Eruption eines Vulkans pflegt ein locales, sogenanntes vulkanisches Erdbeben vorherzugehen, worauf dann die eigentliche Eruption mit gewaltiger Ausdehnung des im Ruhezustand den Kraterschlund erfüllenden Materials zu folgen pflegt, und

zuletzt erst das Ausfließen von heißflüssigen Laven über den Kraterrand oder aus Spalten, die seitlich im Eruptionstege sich geöffnet haben.

Höhlen und Quellen.

(Tafel 9.)

Höhlen.

Hohlräume im Erdbinnen — Höhlen — entstehen noch jetzt auf verschiedene Weise, und dürfen von jeher in ähnlich verschiedener Art entstanden sein. Die Hauptursachen der Entstehung von Höhlen dürften die folgenden sein: 1) Mechanische Zerspaltung der festen Erdruste, etwa infolge von Erdbeben, 2) Einkürzung von steilen Felswänden, deren Trümmermassen beim Aufeinanderfallen große und kleine unregelmäßige Zwischenräume zurücklassen, 3) Entwidlung von Gasarten während der Erstarrung heißflüssiger Gesteinsmassen, wie Laven, wodurch aber nur verhältnismäßig kleine und stets gerundete Hohlräume (Blasen) entstehen, die aber in einigen Lavaströmen doch groß genug sind, um von Thieren und Menschen selbst bewohnt werden zu können; 4) durch Auflösung oder mechanische Auspülung gewisser Gesteinstheile oder ganzer Gesteine. Dies letztere ist entschieden der gewöhnlichste Vorgang der Höhlenbildung, und es finden sich die selben deshalb am häufigsten in Gesteinen, welche diesen mechanischen oder chemischen Vorgängen zugänglich sind, wie z. B. Sandstein mit thonigem oder mergeligem Bindemittel, Kalkstein, Dolomit und Gips, oder an Stellen, die vorher von Steinsalz eingenommen wurden. In einigen Gegenden, wie z. B. im Karst zwischen Laibach und Triest, ist der Kalksteinboden sogar so sehr von Höhlenräumen durchzogen, daß selbst alle Flüsse und Flüsse sich nach und nach unterirdische Rinnale ausgearbeitet haben, so daß man an der Oberfläche weit und breit vergehlich nach irgend einem fließenden Gewässer sucht; dadurch ist dann auch gewöhnlich der Felsboden so stark durchhöhlet, daß sich durch steten Einsturz der zu groß gewordenen unterirdischen Höhlenräume allmählich an der Oberfläche Tausende von trichterförmigen Vertiefungen, Erdfällen, Dolinen u. dgl. gebildet haben.

In Kalkstein oder Dolomit ausgehauene Höhlen haben sehr häufig Veranlassung zu sogenannten Tropfsteinbildungen gegeben, wie Taf. 9, Fig. 1 zeigt, indem das das Gestein durchdringende Sickerwasser kohlensauren Kalk auflöst und, beim Herabtropfen von der Höhlendecke allmählich verdunstend, eisapientähnliche Stalaktiten bildet, während die auf den Höhlenboden fallenden Tropfen durch ihre Verdunstung aufsteigende Zapfen als Stalagmiten veranlassen, die zuweilen, sich vereinigend, zusammenhängende Tropfsteinssäulen erzeugt haben. Alle diese Zapfen zeigen im Querschnitt oder Querschnitt einen concentrischen Bau, da sie aus lauter übereinander hinweg gebildeten Kalkhinterföhlen entstanden und so nach und nach immer dicker und länger geworden sind.

Fig. 2 stellt den Querschnitt einer Höhle im Kalkstein bei Widzworth dar, welche nach ihrer Bildung theilweise durch mechanische Einsenkungen von Schlamm, Geröll und Knochen ausgestorbener Thiere erfüllt worden ist. Nicht immer sind die in Höhlen aufgefundenen thierischen Reste als durch Wasser mechanisch eingeschwennt anzusehen; zuweilen läßt sich vielmehr nachweisen, daß diese Höhlen lange Zeit von aufeinanderfolgenden Generationen gewisser Thierarten, wie Höhlenbären, bewohnt worden sein müssen, und in diesem Falle findet man außer vollständigen Skeleten der die Höhle bewohnt habenden Thierarten

angewagte Knochen der von ihnen eingeschleppten Thiere, sowie selbst massenhafte Anhäufungen ihrer Excremente (Koprolithen) vor, welche zum Theil sogar Dünge benutzt werden können.

Fig. 3 stellt eine ziemlich gewöhnliche Höhlenbildung im Quarzandstein der Sächsischen Schweiz dar, die dort an Felswänden theils durch vom Wind angewehten Regen, theils auch durch vorüberziehende Gewässer ausgehöhlet werden.

Quellen.

Alle Quellen erhalten ihre Zuflüsse ursprünglich aus atmosphärischen Niederschläge, welche bis zu einem gewissen Grade in die feste Erdruste eindringen, sich unter verschiedenen Umständen in verschiedenen Tiefen sammeln und dann irgendeinen geeigneten Ausweg zur Oberfläche finden. Bei der überwiegenden Mehrzahl der gewöhnlichen Quellen fließt das eingedrungene Wasser der atmosphärischen Niederschläge nur in der Form von Regen, wenigstens in Form von Tropfen und lodern von oben und nicht durch die Oberfläche ihrer festeren Unterlage zusammen zu treten. Es tritt dann an dazu geeigneten Stellen in Form von Quellen hervor. Solche Quellen zeigen in der Regel ziemlich genau die mittlere Temperatur der Gegend und enthalten nur wenig, für den Geschmack nur bemerkbare mineralische Bestandtheile. Ihr Wasserreichthum pflegt mit der Tiefe der atmosphärischen Niederschläge zu steigen und zu fallen. Bei anderen Quellen aber sammelt sich das Wasser erst in tieferen Tiefen auf der oberen Grenze irgendeines weniger durchlässigen Gesteins, und dringt an irgendeiner Stelle hervor, wo diese Grenze die Oberfläche erreicht. Solche Quellen sind in der Regel etwas weniger abhängig von den temporären Schwankungen der atmosphärischen Niederschläge; sie zeigen der Tiefe ihres Ursprungs entsprechend eine etwas höhere als die mittlere Oberflächentemperatur der Gegend, und enthalten zuweilen auch etwas mehr mineralische Bestandtheile als gewöhnliche Quellen. Unter diesen Umständen läßt sich aber natürlich keine ganz scharfe Grenze zwischen gewöhnlichen, warmen oder heißen und mineralischen Quellen ziehen; man rechnet vielmehr zu diesen letzteren alle diejenigen, welche sich durch ihre Temperatur oder durch ihren Geschmack oder ihre Wirkungen auf den menschlichen Organismus von den gewöhnlichen Quellen unterscheiden. Außer den bisher besprochenen Quellen gibt es nun aber auch noch solche, welche sich durch die abnorme Art ihres Hervortretens oder durch eine von äußeren Verhältnissen ganz unabhängige Periodicität ihres Ausfließens auszeichnen. Dabin gehören z. B. die natürlichen oder künstlich erbohrten Springquellen, welche letzteren man auch wol artesischen Brunnen zu nennen pflegt, sowie die sogenannten Geysire, welche auf Taf. 9 durch Fig. 4 bis 7 zu erläutern versucht werden sind.

Die Benennung Geysir (Geisir) ist isländischen Ursprungs, und bezieht sich ursprünglich nur auf die in der Nachbarschaft des Hellsa entspringenden heißen periodischen Quellen, welche durch ihren starken Kieselgehalt regelmäßige, aus Kieselstuf und Sinter bestehende Kegel aufbauen, aus deren trichterförmigem Beden sie in Perioden von 24—48 Stunden mit großer Energie hervorspringen und bei einzelnen ihrer Eruptionen den siedend heißen mächtigen Wasserstrahl 60 bis 80 Fuß hoch aufsteuern, während sie in der ruhigen Zwischenzeit weit unter das Niveau ihres Bedens zurückfallen. Eine genauere Beschreibung der Vorgänge bei diesen Eruptionen findet sich weiter unten

in dem Abschnitt „Meteorologie“ von Prof. Müller in Freiburg, welchem es sogar gelungen ist, einen recht einfachen Apparat herzustellen, in welchem man den Hauptvorgang leicht künstlich nachahmen kann.

Auch in zwei andern von Island weit entfernten Gegenden, auf Neuseeland und im nördlichen Amerika, hat man analoge heiße periodische Quellen aufgefunden. Die Geysir Neuseelands beschrieb zuerst von Hochstetter in dem Prachtwerk über die Reise der Novara, welchem auch die Abbildungen Fig. 4 und 7 entlehnt sind. Das große Geysirgebiet am Yellowstone und Madisonriver in Nordamerika wurde dagegen von Hayden 1872 in Petermann's geographischen „Mittheilungen“ zuerst ausführlich geschildert.

Taf. 9, Fig. 5 und 6 erläutern durch zwei ideale Darstellungen das Wesen und die Entstehung der sogenannten artesischen Springquellen, deren Wasser mit einem gewissen hydrostatischen Druck zu Tage tritt. Alle diese Bohrbrunnen, welche ihren Namen nach der Provinz Artois in Frankreich erhalten haben, beruhen darauf, daß das von der Oberfläche in das Erdinnere eindringende Wasser einen abgeschlossenen Weg in große Tiefen findet, in diesen aber durch ein Bohrloch erreicht wird, aus dem es mit der entsprechenden Gewalt hervorspringt. Dieser abgeschlossene unterirdische Weg kann durch sehr verschiedene Umstände bedingt sein. Bei Fig. 5 ist angenommen, daß ein für Wasser schwerer oder gar nicht durchdringbares Gestein a von den Schichten eines an sich für Wasser ebenfalls unzugänglichen Gesteins b überlagert sei, zwischen denen sich jedoch eine besondere Schicht c befindet, die entweder von zusammenhängenden Hohlräumen durchzogen oder aus irgendeiner andern Weise für Wasser leicht durchdringbar sei. In diese Schicht dringt nun das Wasser von oben ein, staut sich aber an der Grenze von d, und könnte nicht heraus, wenn nicht ein Bohrloch von q aus diese Schicht erreicht und so die Springquelle q veranlaßt hätte, welche unter Umständen beinahe so hoch aufspringen kann, als die Region liegt, in welcher c die Oberfläche erreicht.

Bei Fig. 6 ist dagegen der Querschnitt eines rings abgeschlossenen Bedens dargestellt, von muldenförmig gelagerten Schichten erfüllt, welche zum Theil wie b für Wasser undurchdringlich sind, während dagegen die dazwischenliegenden Schichten c, sowie die obere Grenze des undurchdringlichen Gesteinsbodens a für Wasser leicht durchdringbar sind. Auf die Beschaffenheit der obersten Schicht a kommt dabei nichts an. Zu diesem Falle staut sich das von den Bedenrändern eindringende Siderwasser in der Tiefe des Bedens an und kann durch Bohrlöcher an verschiedenen Stellen und verschiedenen Tiefen erreicht werden, sobald es dann die Springquellen q, q, q bildet.

Erdoberflächengestaltung.

(Tafel 10.)

Berg- und Felsformen.

Die Formen der Erdoberflächengestaltung sind Folgen der Entstehung wie der Zerstörung der verschiedenen Gesteinsarten. Die Entstehungsart hat einen ganz überwiegenden Einfluß auf die Gestalt der vulkanischen Berge, welche infolge davon sich sehr häufig kegelförmig aufgebaut zeigen, weil das Material, aus dem sie bestehen, sich von einer bestimmten Eruptionsoffnung aus mehr oder weniger gleichmäßig

um dieselbe herum aufgehäuft hat. Nur selten aber ist die ursprüngliche Bildungsgehalt der Vulkanen vollständig erhalten; in der Regel haben vielmehr spätere Einstürzungen und Abspülungen allerlei Modificationen daran hervorgebracht, wie wir bereits in dem Abschnitt über Vulkane gesehen haben. Auch die Lage, Richtung und Erhebung der Gebirge ist vorherrschend ein Resultat ihrer Erhebung durch vulkanische Thätigkeit, aber ihre gegenwärtige äußere Form ist doch in der Regel noch mehr das Resultat späterer Wasserwirkung, als ihrer ersten Erhebung, und dasselbe gilt für jeden einzelnen Berg, wie für jedes einzelne Thal, obwohl auch sie nicht selten ursprünglich durch locale Erhebung oder Aufhebung veranlaßt worden sind.

Die Figuren auf Taf. 10 zeigen ganz wesentlich nur Resultate der Wasserwirkung, welche durch die besondere Beschaffenheit der Gesteine, durch die Art ihrer Lage, Zusammenfügung, Zerküftung und Verwitterung vielfach modificirt wurden.

Fig. 1 stellt eine an der Küste Schottlands bei Hemyriggs durch das Meer ausgefüllte natürliche Felsbrücke dar.

Fig. 2 zeigt uns eine prachtvolle Meeresbucht auf Neuseeland. Die beiden aus säulenförmig abgesondertem Basalt bestehenden Felsinseln, welche sich im Eingange der Bucht erheben, standen offenbar einst unter sich und mit der benachbarten, ganz gleich zusammengefügten Felsküste in ununterbrochener Verbindung, und erst die seit Jahrtausenden unausgesetzt darauf einströmenden Wogen des Oceans haben diesen Zusammenhang unterbrochen und diese schöne Bucht in das Felsenmeer eingengagt, wobei sie offenbar durch die senkrecht säulenförmige Zerküftung des Basalt unterlüftet wurden.

Fig. 3 zeigt uns eine der sonderbaren schroffen Felsformen, welche sich in der sogenannten Sächsischen Schweiz mit unzähligen kleinen Modificationen zu Tausenden wiederholen. Dieses Felsgebiet besteht aus beiden Seiten der Elbe aus horizontalen Sandsteinschichten, die vielfach von verticalen Klüften durchzogen sind; diese beiderlei Zerküftungen befeuern infolge davon auch alle Auspflungen des Wassers, und so ist es geschehen, daß alle Felsen sich mehr oder weniger der senkrechten Form mit horizontalen Abfällen, Terrassen und Schichtmarken nähern, während man kaum irgendwo Spuren einer vorhergegangenen Aufrichtung der horizontalen Sandsteinschichten findet, die zu beiden Seiten der senkrecht eingeschnittenen Thäler ganz gleichmäßig fortsetzen.

Bei Fig. 5 hat derselbe Sandstein allerdings einige Abweichungen der Formen veranlaßt, dadurch daß der Regen, vom Winde auf die nackte Fels Oberfläche angepeitscht, diese je nach der größeren oder geringeren Festigkeit oder selbst Auflöslichkeit des Sandsteinbinde mittels mehr oder weniger stark angriff und abmagte, wodurch zuweilen sehr eigenthümliche Felsformen veranlaßt wurden.

Die Fig. 4 und 6 zeigen nun noch sehr eigenthümliche Oberflächengestaltungen, welche theils durch niederfallendes und ablaufendes Regenwasser, theils durch fließende Gewässer hervorgebracht werden und welche sich in ähnlicher Form auch bei den sogenannten Gletschertischen durch Wirkung der Sonnenstrahlen ergeben.

Bei Fig. 4 bestand vor der Erosion der Boden aus einer unteren, ziemlich mürben, und aus einer oberen, dünnern, aber weit festeren Sandsteinschicht. Das Wasser spülte nun vorzugsweise die mürbe

Schicht fort und rundete ihre stehen bleibenden Reste in eigenthümlicher Weise ab, während die obere festere Deckenschicht bessern Widerstand leistete und sich deshalb in Form von etwas vorspringenden Platten oder Dedeln erhielt.

Bei Fig. 6 hat dagegen ein Fluß mit zahlreichen, in fast gleichen Abständen einmündenden Seitenbächen das Thal mit seinen Seitenschluchten in eine feste Gesteinsmasse fast senkrecht eingeschnitten, während die obere Gesteinsplatte von mürberer Beschaffenheit kegelförmige Aufsätze auf den senkrechten Felspfählen bildete.

Innerer Bau der festen Erdkruste und der Gebirge.

(Tafel 11.)

Wenn auch der innere Bau der festen Erdkruste nur an einzelnen Stellen deutlich beobachtet werden kann, während sogar über drei Viertel der gesammten Oberfläche unsers Planeten durch Meeresbedeckung und andere Hemmnisse jeder geologischen Beobachtung unzugänglich sind, so liegen doch die deutlich beobachtbaren Theile so glücklich vertheilt und zeigen so vielfache Analogie und Verbindung durch Zwischenglieder, daß man sehr wohl berechtigt ist, sich daraus ein ideales Bild von der allgemeinen Zusammenfügung der festen Erdkruste aus Gesteinen zu entwerfen, wie Tafel 11, Fig. 1 zeigt. In dieser Figur, wie überhaupt auf dieser Tafel, sind sämmtliche Gesteine, welche einen wesentlichen Antheil an der Zusammenfügung der Erdkruste nehmen, durch vier Farben nach ihrer wahrscheinlichen oder sichern Entstehungsweise in ebenso viele Hauptabtheilungen getrennt, nämlich:

1) Roth: plutonische Erstarrungsgesteine, welche durch Erstarrung aus einem ursprünglich heißflüssigen Zustande unter mehr oder weniger starker Bedeckung im Erdinnern hervorgegangen sind.

2) Gelb: vulkanische Erstarrungsgesteine, welche, wie noch jetzt die Lavas, durch Abkühlung und Erstarrung aus gleichem heißflüssigen Zustande, aber nicht in der Tiefe, sondern an der Erdoberfläche, oder doch jedenfalls nahe derselben, unter verhältnißmäßig nur geringer Bedeckung entstanden.

3) Violet: kristallinische Schiefer, welche nur theilweise, vielleicht als erste Erstarrungsproducte der einst in ihrer Gesamtheit heißflüssigen Erdmasse, größtentheils vielmehr sicher als durch Umwandlung aus sedimentären Ablagerungen entstanden anzusehen sind, und deshalb oft metamorphische Schiefergesteine genannt werden.

4) Blau: alle deutlich als solche erkennbaren sedimentären Ablagerungen.

Es dürfte zweckmäßig sein, diese vier Abtheilungen etwas specieller ins Auge zu fassen.

Die kristallinischen Schiefer, bestehend aus Gneis, Glimmerschiefer, Thonglimmerschiefer, Chloritschiefer, Talkschiefer, Hornblendschiefer u. s. w. mit untergeordneten Einlagerungen von Quarz, Kalkstein, Eisenstein u. s. w., nehmen ihre normale Stellung in der festen Erdkruste unter den deutlich sedimentären und über den Erstarrungsgesteinen ein, zu welchen letztern sie theilweise sogar selbst gehören mögen, während sie häufig von eruptiven Erstarrungsgesteinen durchsetzt, theilweise sogar in Form großer Schollen umhüllt sind.

Die plutonischen Eruptivgesteine zeigen etwas ungleiche mineralogische und chemische Zusammen-

zung als Granite, Syenite, Grünsteine und Porphyre, welche jedoch unabhängig von dem geologischen Zeitpunkt ihrer Entstehung zu sein scheint.

Alle beobachtbaren plutonischen Eruptivgesteine geraden nothwendig irgendeiner frühern geologischen Periode an, denn wenn auch solche, wie es wahrscheinlich ist, noch gegenwärtig entstehen sollten, so stüßten sie infolge ihrer tief unterirdischen Erstarrung nothwendig so lange unbeobachtbar sein, bis sie durch lange dauernde Hebung und Abspülung irgendwo directen Beobachtung zugänglich würden; daß aber unter sich von sehr ungleichem Alter sind, ergibt sich aus ihren gegenseitigen Durchsetzungen, sowie auch ihr ungleiches Ausbringen in Zerspalnungen der sedimentären Ablagerungen, zuweilen bis zu denen der Kreideperiode aufwärts, aber niemals bis in die frühesten Ablagerungen hinein.

Die vulkanischen Eruptivgesteine dagegen, welche als eben thätiger Vulkan, an der Erdoberfläche, oder nahe derselben zur Erstarrung gelangten, haben vielfach nicht nur alle plutonischen Eruptivgesteine und vulkanischen Schiefer, sondern auch alle sedimentären Ablagerungen bis zu den neuesten durchsetzt. Man kann sie zuweilen unmittelbar nach ihrer Entstehung als basaltische oder trachytische Laven beobachten, während die etwas ältern als echte Basalte, Trachyte oder Phonolithe sich ihrer Natur nach schon mehr den vulkanischen Gesteinen anschließen.

Die sedimentären Gesteine, welche man je nach ihrem ungleichen Alter verschiedenen geologischen Formationen oder Bildungsperioden zuzurechnen pflegt, sind petrographisch sehr ungleich zusammengesetzt; sie bestehen aus zuweilen miteinander wechseltalagerten Schichten von Thon, Schieferthon, Thonschiefer, Kalkstein, Dolomit, Mergel, Sandstein, Conglomerat, Kohlen, Eisenstein, Quarz u. dgl. Die meisten derselben enthalten erkennbare organische Reste, sogenannte Versteinerungen, welche den geologischen Zeiträumen entsprechen, in welchen sie zur Ablagerung gelangten.

Es ist üblich, die aufeinanderfolgenden Ablagerungen nach ihrer zeitlichen, räumlichen oder fächlichen Uebereinstimmung in gewisse Formationen zu vereinigen, und diese wiederum der Zeit nach gewissen geologischen Perioden zuzurechnen. Taf. 11, Fig. 1 ist ein großer Theil dieser Formationen nach ihrer normalen Lagerung übereinander gezeichnet, doch muß hierzu bemerkt werden, daß man an keinem Orte der Erde eine ganz vollständige Reihenfolge aller bis jetzt bekannt gewordenen Formationen wirklich übereinanderliegend findet, und daß daher auch Fig. 1 nur ein ideales Bild ist, welches aus der schematischen Vereinigung zahlreicher, zum Theil an sehr weit voneinander entfernten Orten gemachten einzelnen Beobachtungen zusammengestellt worden ist. Auf der linken Seite unserer Figur ist nur eine sehr lückenhafte Formationenreihe dargestellt, auf der rechten dagegen eine ziemlich vollständige, wie man sie kaum irgendwo wirklich vorfinden dürfte; aber auch diese Reihe ist jedenfalls keine ganz vollständige, da man mit der Zeit immer mehr in geringem Grade selbständige Formationen aufsuchen wird, welche dann die bis jetzt bekannte Reihe ergänzen.

Die Reihenfolge der sedimentären Formationen ist, von oben nach unten, also von den neuesten zu den immer ältern, und folglich zu den normal tiefer liegenden vorrückend, die folgende:

1) Recent Ablagerungen, wie sie noch jetzt auf dem Meeresboden, in Landseen, in Sümpfen, an Quellen, Flüssen u. s. w. stattfinden; bestehend aus Sand, Geröllen, Thon-, Mergel- oder Kalksamm, Korallenfels, Kalktuff, Kieselstuf, Raseisenstein, Torf u. s. w.

2) Diluviale oder quartäre Ablagerung, aus einer der Gegenwart nicht lange vorhergehenden Zeit herrührend, in welcher viele Tiefländer, wie z. B. die norddeutsche Niederung, noch vom Meere bedeckt waren; bestehend aus Sand und Geröllen, sogenannten erratischen Blöcken, Kös u. dgl., mit organischen Resten, welche schon etwas von den Organismen der Jetztwelt abweichen.

3) Tertiäre Ablagerungen, die man nach ihrem ungleichen Alter wieder einteilt in pliocäne, miocäne und eocäne (die beiden erstern werden zuweilen auch als neogen zusammengefaßt); bestehend aus wechselnden Schichten von Sandstein, Conglomerat, Mergel, Kalkstein, Thon und Schieferthon, zuweilen mit Einlagerungen von Braunkohlen, Eisenstein, Gips und Steinsalz. Die Organismen dieser Periode, deren Reste man versteinert findet, gehörten zum Theil schon ganz andern Species an, als die jetzt lebenden.

4) Ablagerungen der Kreideperiode, welche man in Deutschland von oben nach unten zu unterscheiden pflegt in: Weiße Kreide, Quader sandstein und Bläner, Hilsformation oder Neocom, Deisterformation, dem englischen Wealden. Die Versteinerungen, welche darin gefunden werden, weichen sämmtlich von den jetzt lebenden Species ab, und gehören zum Theil schon ganz ausgestorbenen Geschlechtern an.

5) Ablagerungen der Juraperiode. Man theilt sie in Deutschland in oben weißen, mittlern oder braunen und untern oder schwarzen Jura, welcher letztere in England Lias genannt wird; die Gesteine, aus denen diese Schichten bestehen, sind namentlich Kalkstein und Dolomit, Mergel, bituminöser Mergelschiefer und Sandstein, zuweilen mit Einlagerung von Eisenstein und Kohle. Unter den Versteinerungen herrschen die ganz ausgestorbenen Geschlechter der Ammoniten, Belemniten und Fischsaurier sehr vor.

6) Ablagerungen der Triasperiode. In Deutschland theilt man sie in die drei Formationen: Keuper, Muschelkalk und Buntsandstein. Vorherrschend aus Mergel, Kalkstein, Dolomit, Thon, Schieferthon und Sandstein bestehend, enthalten dieselben auch Einlagerungen von Gips und Steinsalz, Eisenstein und Kohle; im Alpengebiet ist ihre petrographische Zusammensetzung und Gliederung eine ganz andere. Als charakteristische Versteinerungen treten darin namentlich Ceratiten, Encrinuren und große Sumpfspreitilien auf.

7) Ablagerungen der Permperiode (in Rußland Permformation), in Deutschland bestehend aus Zechsteinformation und Rothliegendem; die erstere, vorherrschend aus Kalkstein, Dolomit und bituminösem Mergelschiefer zusammengesetzt, enthält als wichtige Einlagerungen Steinsalz, Gips und Kupferschiefer. Unter den Versteinerungen dieser Periode sind namentlich einige fischschuppige und unsymmetrisch geschwängte Seeische und das Brachiopoden Geschlecht Productus sehr charakteristisch. Das Rothliegende dagegen besteht vorherrschend aus rothen Conglomeraten und Sandsteinen mit eisenreichem, thonigem Bindemittel; darin treten local viele Pflanzenreste auf, welche gänzlich ausgestorbenen Geschlechtern angehören.

8) Ablagerungen der Kohlenperiode; man unterscheidet dieselben in Steinkohlenformation und Rußformation oder Kohlenallkstein. Die erstere besteht vorherrschend aus einer vielfachen Wechsellagerung von grauem Sandstein und Schieferthon mit untergeordneten Zwischenlagen von Steinkohlen und Thoneisenstein, die letztere dagegen aus Thonschiefer, Kiefschiefer, Sandstein und Kalkstein oder Dolomit, mit seltenern Einlagerungen von Steinkohle. Die charak-

teristischen Pflanzenreste dieser Periode wurden Taf. 2 zum Theil abgebildet. Der Kohlenkalkstein enthält aber auch viele Reste von Seethieren.

9) Ablagerungen der Grauwackenperiode, welche man einzutheilen pflegt in devonische, silurische und cambriische. Die vorherrschenden Gesteine sind Thonschiefer, Sandstein, Kalkstein und Dolomit, mit Zwischenschichten von Kiefelschiefer, Quarzit, Alaunschiefer, Eisenstein u. s. w. Unter den Versteinerungen dieser Periode sind als besonders charakteristisch zu nennen die längst ausgestorbenen Trilobiten, Orthoceratiten, Goniatiten und Graptolithen, wovon auf Taf. 7 einige Beispiele abgebildet sind.

Unter den ältesten Ablagerungen der Grauwackenperiode folgen dann gewöhnlich, aber keineswegs überall, krystallinische Schiefer, welche entweder durch plutonische Umwandlung aus noch älteren Ablagerungen entstanden sind, oder zum Theil vielleicht als Reste der ersten Erdkrustenbildung durch Erstarrung angesehen werden können. Wo dieselben parallele Einlagerungen von krystallinisch körnigem Kalkstein, Dolomit oder Graphit enthalten, da muß man sie jedenfalls als metamorphische Gesteinsbildungen bezeichnen.

Die schwarzen Linien, welche in der oberen Region unserer Darstellung einen Theil der Gesteine und Formationen durchschneiden, repräsentiren Erzgänge, d. h. Spaltenausfüllungen, welche allerlei Erze und andere Mineralien enthalten und zuweilen mit Verschiebungen — sogenannten Verwerfungen — verbunden sind, die aber auf dem Bilde nicht wohl angebracht werden konnten.

Die Fig. 2 bis 11 dieser Tafel versuchen den inneren Bau der Gebirge und einigermassen auch dessen Beziehungen zur Oberflächengestaltung derselben darzustellen.

Alle Gebirge sind mehr oder weniger Folgen localer Erhebung der festen Erdkruste oder der Aufschüttung oder Ueberströmung durch vulkanische Thätigkeit; doch sind dadurch meist nur die Hauptformen bedingt, während spätere Verwitterung und Abspülung sehr wesentliche Veränderungen des ersten Zustandes hervorgebracht haben. Es dürfte zweckmäßig sein, diese der Wirklichkeit entnommenen, und nur mehr oder weniger idealisirten Beispiele einzeln zu besprechen.

Fig. 2 stellt den idealen Querschnitt eines Basaltgebirges dar, welches, wie die Rhön oder das böhmische Mittelgebirge, aus einzelnen Basaltbergen besteht, die nicht eine geschlossene Gebirgsmasse bilden, deren jeder vielmehr das Resultat einer selbständigen Eruption und Ueberströmung ist, ohne daß dabei die durchbrochenen krystallinischen Schiefer und sedimentären Schichten wesentlich erhaben oder aufgerichtet wurden. Ganz ähnlich verhält es sich bei den meisten thätigen Vulkanen.

Fig. 3 stellt ein durch einseitige Erhebung eines Erdkrustentheils entstandenes Gebirge, wie z. B. das sächsisch-böhmische Erzgebirge, im Querschnitt dar. Die krystallinischen Schiefer und einige sie bedeckende sedimentäre Formationen wurden in diesem Falle durch plutonische Eruptivgesteine (Granite und Porphyre) einseitig gehoben, vergestalt, daß die erhobene Masse einen nach abgedachten und einen steilen Abhang zeigt. Irrthümlich haben die ersten Abdrücke dieser Figur für die weit später als die Granite emporgerungenen Basalte rothen statt gelben Farbenbrun erhalten.

Fig. 4. Ein durchaus idealer Querschnitt des Harzes, welcher nach Ablagerung der sedimentären

Formationen bis inclusive Quader sandstein durch plutonische Eruptivgesteine, besonders Granite, als Centralmassengebirge um ein Hauptcentrum erhaben wurde. Doch ist dabei nicht nöthig, daß der Granit durch sein heißflüssiges Emporströmen die letzte Erhebung veranlaßt habe, vielmehr scheinen die granitischen Gesteine des Harzes alle älter zu sein als das mit erhebener Nothliegende, und folglich viel älter als der Quader sandstein. Man muß vielmehr annehmen, sie haben bei ihrer Entstehung zwar auch schon eine locale Erhebung veranlaßt, dieser sind aber später mehrere andere Erhebungen desselben Gebiets ohne Durchbruch irgendeines beobachtbaren Eruptivgesteins gefolgt, wodurch die bereits vorhandenen Granite und alle Schichten bis zum Quader sandstein aufwärts mit erhoben wurden.

Fig. 5 stellt einen sehr besondern Fall des inneren Erdbaus in einer Gebirgsgegend dar, nämlich eine theilweise Ueberstürzung und dadurch Umkehrung der ursprünglichen Lagerungsverhältnisse bei Hohnstein in der sächsischen Schweiz. Hier findet man ganz gegen alle gewöhnliche Erfahrung und daraus abgeleitete Regel unter dem Granit Jurakalt mit deutlichen Versteinerungen in schräger Stellung, unter diesem aber Quader sandstein horizontal geschichtet, der jedenfalls neuerer Entstehung ist als der Jurakalt und Granit. Die genauere Untersuchung hat ergeben, daß hier höchst wahrscheinlich nach Ablagerung des Quader sandsteins ohne nachweisbare Veranlassung durch ein emporbrechendes Eruptivgestein die ursprünglichen Lagerungsverhältnisse in der Weise umgestürzt und dabei die Juraschichten umgebogen worden sind, wie es die Abbildung darstellt, wobei nur zu verwundern ist, daß die benachbarten Sandsteinschichten horizontal blieben. Es sind aber derartige Fälle schon mehrfach beobachtet worden, wenn man sie auch noch nicht recht befriedigend zu erklären vermag.

Fig. 6 zeigt einen Fall merkwürdig aufgerichteter und gebogener Schichten aus dem Alpengebiete, wo derartige Störungen der ursprünglichen Lagerungsverhältnisse zu den ganz gewöhnlichen Thäbächen gehören und offenbar wesentlich zu den pittoresken Erscheinungen der ganzen Bergkette beigetragen haben.

Fig. 7. Ebenfalls ein Beispiel aus dem Alpenlande, und zwar aus dem Centralgebiet derselben. Hier findet sich eine großartige Faltung und sächerförmige Stellung der krystallinischen Schiefer und der zunächst mit ihnen verbundenen, ursprünglich darüber gelagerten sedimentären Schichten, während in der Mitte des Sächers Granite aus den krystallinischen Schichten hervortreten. Diesen sächerförmigen Bau hat man durch eine, mittels punktirter Linien angedeutete, ein vorhanden gewesene großartige Schichtensalte zu erklären versucht, deren oberer punktirter Theil später durch Verwitterung und Abspülung zerstört worden ist.

Fig. 8. Ein idealer Querschnitt des Riesengebirges, zeigt eine gewisse Ähnlichkeit mit dem des Harzes, um so wichtiger ist es deshalb, auf die wesentlichen Unterschiede aufmerksam zu machen. Es sind das besonders folgende: Der Harz ist ein feiner Grundfläche nach fast elliptisches Massengebirge, das Riesengebirge dagegen ein in der Richtung von Nordwest nach Südost ausgezogenes Kettengebirge. Im Harz hat sich der centrale Granit zwischen die deutlich sedimentären Thonschiefer der Grauwackenperiode eingedrängt, die er nur in unmittelbarer Nähe etwas verändert, zum Theil in Hornfels umgewandelt hat; im Riesengebirge ist derselbe dagegen durch einen breiten Mantel krystallinischer Schiefer von den Schiefen

der Grauwadenperiode getrennt, und die sedimentären Formationen sind hier nur bis zum Zechstein aufwärts deutlich aufgerichtet, während z. B. der Quadersandstein deutlich horizontal auf- und angelagert ist, woraus hervorgeht, daß hier aus Ablagerung des Quadersandsteins keine Hebung der ganzen Gebirgsmasse mehr stattgefunden hat.

Fig. 9 zeigt ein ganz ausgezeichnetes Beispiel einer durch Faltung der früher horizontal gelagerten Formationen entstandenen Gebirgskette mit Längenthalern zwischen parallelen Rücken. Die ursprünglichen Schieferfallen sind hier theilweise später wieder abgeschwemmt, in der Zeichnung aber durch Punktirung restaurirt. Plutonische Eruptivgesteine treten nur einseitig hervor, aber ohne eine einseitige Aufrichtung bedingt zu haben. Die Schichten der Kreideperiode überdecken ungestört und ungefaltet diese einseitigen Eruptivgesteine.

Fig. 10, der Schwarzwald, und Fig. 11, der Odenwald, liegen in der geradlinigen Verlängerung einer gemeinsamen und durchaus analogen Erhebung, die nur im Schwarzwald in jeder Beziehung beträchtlicher war als im Odenwald. In beiden Gebirgen treten plutonische Eruptivgesteine, besonders Granite und krystallinische Schiefer, namentlich Gneis, als Kernmassen auf, theilweise um- und überlagert von sedimentären Formationen, deren Schichten gegen Osten nur ganz allmählich von dem plutonischen Kern abfallen, am westlichen Fuß dagegen zum Theil steil aufgerichtet sind. In beiden Gebirgen war die Erhebungsweise offenbar eine vorherrschend einseitige, sodas Osten das Vorhandene mit geringer Störung der horizontalen Schichtenstellung nur in ein etwas höheres Niveau erhoben wurde, während auf der Westseite, wo der Hauptbruch erfolgte, alle Schichten bis in denen der Juraperiode steil aufgerichtet wurden. Diese Erhebung hat offenbar nach Ablagerung der Zurschichten, aber vor jener der Tertiärgesteine stattgefunden, welche in horizontaler Stellung verblieben. Ursache dieser Erhebung können unmöglich die in dieser Gegend beobachtbaren plutonischen Eruptivgesteine gewesen sein, denn sie sind sämtlich älter als das Rothliegende, dessen Conglomerate zahlreiche Geschiebe dieser Gesteine erhalten; auch sind sie nirgends erkennbar in Zersplitterungen der gehobenen Schichten eingedrungen.

Geologische Karte von Deutschland.

(Tafel 12.)

Geologische Karten haben den Zweck, die Verbreitung der Gesteine und Formationen, aus denen die feste Erdruste besteht, insofern sich dieselbe an der Erdoberfläche erkennen läßt, darzustellen, worauf dann der geübte Geolog mehr oder weniger sichere Schlüsse auch über ihre unterirdische — also nicht unmittelbar beobachtbare — Verbreitung gründen kann, namentlich in den Fällen, in welchen die normale Reihenfolge ihrer Nebereinanderlagerung bekannt ist. Vieviel Details auf solchen Karten dargestellt werden können, hängt natürlich von der Größe ihres Maßstabes ab.

Auf der vorliegenden geologischen Karte von Deutschland mußten ihres sehr beschränkten Raums und deshalb kleinen Maßstabes wegen ganze Gruppen von Gesteinen und Formationen, die man auf größeren Karten voneinander zu trennen pflegt, zusammengefaßt und durch gemeinsame Farbenfelder dargestellt werden. Die hier gebildeten Gruppen be-

ruhen theils auf gemeinsamer Entstehungsart, theils auf gemeinsamer Periode der Entstehung, wobei natürlich besondere Bildungen von geringem Verbreitungsgebiet oft unberücksichtigt bleiben mußten, weil dadurch die Uebersichtlichkeit nutzlos beeinträchtigt worden wäre. Selbstverständlich mußte unter solchen Umständen hierbei mehr noch das individuelle Urtheil als ein ganz bestimmtes Princip zur Richtschnur dienen.

Ueber die auf der Karte zur Darstellung gebrachten Abtheilungen sei in absteigender Reihe — d. h. von den obersten, neuesten zu den untern, immer ältern, vordringend — Folgendes bemerkt:

1) Die weiß gelassenen Flächenräume bestehen aus ganz neuen, sogenannten quartären oder recenten und diluvialen Ablagerungen, wie Sand, Gerölle, Lehm, Löss, Torf u. dgl.

2) Durch Gelb sind alle tertiären Formationen bezeichnet, welche man ihrem Alter nach in pliocäne, miocäne und eocäne, oder neogene und paläogene trennt, während sie nach dem darin vorherrschenden oder charakteristischen Material in Braunkohlensformationen, Molasse- (Sandstein und Conglomerat) Formationen, Flysch, Nummulitenkalk, Süßwasser- und Meereskalk: oder Mergelablagerungen unterschieden werden können.

Blau überhaupt stellt die Verbreitung der secundären Formationen dar, und zwar sind 3) unter Dunkelblau zusammengefaßt: Kreide, Quadersandstein und Pläner, Jura oder Keuper (Sandstein, Mergel und Thon), Keupersandstein mit Steinkohlenslagern, weißer Jurakalk und Dolomit, brauner Jura (Sandstein, Thon und Mergel mit Eisensteinslagern) sowie schwarzer Jura oder Lias, vorherrschend aus dunkeln bituminösen Kalksteinen und Mergeln bestehend; 4) unter Hellblau dagegen: die sogenannte Trias, bestehend aus Keuper (Sandstein, Mergel und Gips), Muschelkalk mit Gips und Steinsalz, sowie Buntsandstein mit Schieferthon, Kogenstein, Gips und Steinsalz.

5) Dunkelbraun stellt die Verbreitung der so besonders wichtigen Steinkohlensformation dar, welche vorherrschend aus Sandstein und Schieferthon mit Schwarzkohleneinlagerungen besteht.

6) Gelbbraun umfaßt alle sogenannten Primärformationen, nämlich: a) die sogenannte Devon, bestehend aus der Zechsteinformation, Kalkstein, Dolomit, Keuperschiefer, Gips und Steinsalz, und das Rothliegende, vorherrschend aus Sandsteinen und Conglomeraten bestehend, sowie alle devonischen, silurischen und cambrischen Ablagerungen, welche — in Deutschland auch Grauwade genannt — vorherrschend aus mächtigen Wechsellagerungen von Thonschiefer und Sandstein mit untergeordneten Einlagerungen von Quarzit, Kiesel-schiefer, Alaunschiefer, Grünschiefer und Kalkstein oder Dolomit bestehen.

7) Violet stellt die Verbreitung der krystallinischen Schiefer dar, zu denen namentlich Gneis, Glimmerschiefer, Thonschiefer, Talk- und Chloritschiefer, Hornblendeschiefer mit Einlagerungen von krystallinisch-körnigem Kalkstein (Marmor), Magnetkiesstein u. dgl. gehören. Sehr wahrscheinlich sind diese Schiefer größtentheils durch Ummwandlung aus ursprünglichen sedimentären Ablagerungen entstanden.

8) Unter Plutonisch (blauviolett) sind alle diejenigen Eruptivgesteine zusammengefaßt, welche nicht wie die Laven an der Erdoberfläche, sondern in beträchtlicher Tiefe unter derselben zur Erstarrung gelangt zu sein scheinen, sodas sie erst durch theilweise Abschwemmung ihrer Bedeckung beobachtet werden

konnten; wir rechnen dahin besonders alle Granite und Syenite, wie Grünsieine, Quarzporphyr, Porphyrite und Mandelsteine (zum Theil sogenannte Melaphyre).

9) Dunkelroth endlich bezeichnet die in der Regel nicht zusammenhängende Verbreitung der, wie die Raven der Vulkanen an der Erdoberfläche zur Erstarrung gelangten und deshalb vulkanisch genannten Gesteine, wie z. B. Basalt, Trachyt und Phonolith.

Man wird auf der Karte leicht erkennen, daß diese vulkanischen Gesteine besonders in einer vom Rhein bis zum Riesengebirge ausgedehnten Zone liegen, während sie dagegen dem Alpengebiet gänzlich fehlen.

Meteorologie.

Bearbeitet von Professor Dr. F. Müller.

(Tafel 13 bis 16.)

Vertheilung der Wärme auf der Erdoberfläche.

Temperatur der untern Luftschichten.

Die Wärme der Erdoberfläche und der auf ihr ruhenden Atmosphäre rührt fast ausschließlich von den Sonnenstrahlen her, die Wärmeverhältnisse eines Ortes auf der Erdoberfläche hängen demnach zunächst davon ab, wie er von den Sonnenstrahlen getroffen wird. In dieser Beziehung unterscheidet man auf der Erdoberfläche fünf Zonen.

1) Die heiße Zone, derjenige zu beiden Seiten des Aequators liegende Gürtel, innerhalb dessen die Sonne das Zenith erreichen kann. Dieser Gürtel ist durch die beiden Wendekreise begrenzt, davon einer $23\frac{1}{2}$ Grad nördlich, der andere aber ebenso weit südlich vom Aequator liegt. Zwischen den Wendekreisen ist Tag und Nacht das ganze Jahr hindurch nahezu gleich lang.

2) Die beiden kalten Zonen, die Umgebung des Nordpols bis zum nördlichen, und die Umgebung des Südpols bis zum südlichen Polarkreis ($23\frac{1}{2}$ Grad vom entsprechenden Pol), innerhalb deren der längste Tag sowie die längste Nacht 24 Stunden (auf den Polarkreisen) bis zu einem halben Jahr (auf den Polen selbst) dauert, werden von den Sonnenstrahlen so schräg getroffen, daß hier keine erhebliche Erwärmung stattfinden kann.

3) Die beiden gemäßigten Zonen, welche auf der nördlichen und südlichen Hemisphäre zwischen dem Wendekreis und dem entsprechenden Polarkreis liegen. In den gemäßigten Zonen beträgt die Dauer des längsten Tags und die der längsten Nacht $13\frac{1}{2}$ bis 24 Stunden.

Wäre die gesammte Erdoberfläche fest und gleichförmig eben, gäbe es weder Meer noch Luft, so hinge die Temperatur eines Ortes bloß von seiner Entfernung vom Aequator ab. So aber wird die Wirkung der Sonnenstrahlen wesentlich durch Bobengestaltung und Wolken modificirt, durch Luft- und Meeresströmungen wird die Wärme von einem Orte zum andern übertragen, und so kommt es, daß Orte von gleicher geographischer Breite oft ein sehr verschiedenes Klima haben.

Da die klimatischen Verhältnisse eines Ortes durch sehr verschiedene, uns nicht hinlänglich bekannte Ein-

flüsse modificirt werden, so ist es nicht möglich, sie auf rein theoretischem Wege abzuleiten, man kann sie nur durch die Erfahrung kennen lernen.

Wenn man von Mitternacht zu Mitternacht jede Stunde die Lufttemperatur beobachtet und aus diesen 24 Beobachtungen das Mittel nimmt, so erhält man die mittlere Temperatur des fraglichen Tags.

Die mittlere Tagestemperatur kann man aber auch erhalten, ohne Tag und Nacht von Stunde zu Stunde das Thermometer zu beobachten, wenn man das Maximum und das Minimum der Temperatur kennt, welches innerhalb 24 Stunden stattfand. Den höchsten und niedrigsten Thermometerstand der letzten 24 Stunden erhält man aber durch den Thermometrogramphen. Taf. 16, Fig. 1 stellt die bekannteste Form des Thermometrogramphen dar. Auf einem Bret ist ein Quecksilber- und ein Weingeistthermometer befestigt, deren Augen nach entgegengesetzten Seiten liegen. In der Röhre des Quecksilberthermometers befindet sich ein Stahlstäbchen, welches, wenn es auf der Quecksilbersäule aufsteigt, bei steigender Temperatur fortgeschoben wird, aber an der Stelle der höchsten Temperatur liegen bleibt, wenn sich das Quecksilber bei sinkender Temperatur wieder zurückzieht. In der Röhre des andern Thermometers befindet sich ein aus farbigem Glas verfertigtes Glasstäbchen, welches mit zwei Knöpfen endet, deren Durchmesser noch etwas kleiner ist als der Durchmesser der Röhre. Befindet sich der eine Knopf des ganz im Weingeist siedenden Glasstäbchens ganz am Ende der Weingeistssäule, so wird es bei sinkender Temperatur durch Capillarität mit zurückgeführt. Beginnt dann aber die Temperatur wieder zu steigen, so bleibt das Stäbchen an der Stelle des Temperaturminimums liegen, indem der sich ausdehnende Weingeist an ihm vorbeigeht. Um das Instrument zur Beobachtung in Stand zu setzen, wird es nach der linken Seite geneigt, sodas das Glasstäbchen auf die Quecksilbersäule, das Glasstäbchen bis zum Ende der Weingeistssäule herabfällt, und dann wieder in seine horizontale Lage zurückgebracht. Hat man dies des Abends gethan, so kann man am nächsten Abend ablesen, welches in den letzten 24 Stunden der höchste und niederste Thermometerstand war. Das Mittel aus diesen beiden Temperaturen ist sehr nahe der mittlern Tagestemperatur gleich.

Das eben beschriebene Instrument kommt sehr leicht in Unordnung; viel zuverlässiger ist das Metallthermometer, Taf. 16, Fig. 2. Eine Spirale, aus einem zusammengelötheten Streifen von Stahl und Messing gebildet, ist in seiner Mitte befestigt. Bei wachsender Temperatur bewegt sich das freie Ende b der Spirale nach der linken, bei sinkender nach der rechten Seite. Hinter der Spirale befinden sich zwei mit gelber Leinwand bewegliche Zeiger, deren jeder einen bis zum freien Ende der Spirale hervorragenden Stift trägt. Der Stift p des Zeigers c liegt links, der Stift q des Zeigers s liegt rechts von b. Hat man die beiden Stifte mit dem Spiralende b in Berührung gebracht, so wird bei steigender Temperatur der Zeiger cd nach der linken Seite geschoben, um bei der Stelle der höchsten Temperatur liegen zu bleiben, wenn die Temperatur zu sinken beginnt. In gleicher Weise markirt der Zeiger s die Minima der Temperatur.

Bestimmt man nun auf die eine oder die andere Weise die mittlere Temperatur für alle Tage eines Monats, nimmt man alsdann das Mittel aus den so erhaltenen 30 oder 31 Zahlen, so erhält man die mittlere Temperatur eines bestimmten Monats, während endlich das Mittel aus den 12 Monatsmitteln die mittlere Temperatur des ganzen Jahres liefert.

Hat man für einen bestimmten Ort die mittlere Temperatur mehrerer aufeinanderfolgender Jahre bestimmt, so findet man, daß diese Jahresmittel keineswegs ganz gleich sind. Nimmt man das Mittel aus einer möglichst großen Zahl von Jahresmitteln, so erhält man die mittlere Jahrestemperatur des Ortes. Diese ist zum Beispiel für London $8,3^{\circ}$ R., für Berlin $7,2^{\circ}$ R., für Petersburg $3,4^{\circ}$ R., für Rom $12,7^{\circ}$ R. u. s. w.

Vergleicht man die mittlere Jahrestemperatur verschiedener Orte miteinander, so findet man bald, daß Orte gleicher geographischer Breite keineswegs auch gleiche mittlere Jahrestemperatur haben, daß also die Jahres-Isothermen, d. h. die Linien gleicher mittlerer Jahreswärme, keineswegs dem Aequator parallel sind.

Gumboldt führte den Begriff der Isothermen in die Wissenschaft ein und konstruirte die erste Isothermenkarte. Taf. 13, Fig. 1 zeigt den Lauf der Jahres-Isothermen, wie es dem gegenwärtigen Beobachtungsmaterial entspricht.

Man übersieht aus dieser Karte, daß die mittlere Jahrestemperatur im westlichen Europa bedeutend höher ist als bei gleicher Breite im Innern von Asien und an den Ostküsten von Nordamerika, denn die Jahres-Isothermen steigen an den Westküsten Europas sehr weit nach Norden, während sie im Innern Asiens und im östlichen Nordamerika sehr weit nach Süden herabsinken. Europa verbannt sein verhältnismäßig mildes Klima vorzugsweise dem Golfstrom, dessen warme Gewässer bis zu den Westküsten Europas vordringen, dann aber dem wärmenden Einfluß der Südwestwinde, welche hier ungeschwächt ihre Wirkung thun. Unter dem Einfluß der Südwestwinde steigen die Isothermen auch an den Westküsten Nordamerikas wieder nach Norden.

Die Temperatur der Erdoberfläche und der untern Luftschichten ist fortwährenden Schwankungen unterworfen, in welchen sich eine tägliche und eine jährliche Periode geltend macht.

Wenn man den Gang der Temperatur an einem einzelnen Tage verfolgt, so zeigen sich mehr oder weniger große Unregelmäßigkeiten, welche unter Umständen den normalen Gang der täglichen Periode ganz maskiren können. So stellen zum Beispiel in Fig. 7 und 8, Taf. 13, die beiden seiner gezogenen Curven den Gang der Temperatur dar, wie er am 10. und 18. Juli 1841 zu München beobachtet worden ist. Die Abscissen dieser Figur sind den (astronomisch gezählten) Tagestunden, die Ordinaten sind Réaumur'schen Graden proportional aufgetragen. Nimmt man aber aus allen während der Jahre 1841, 1842 und 1843 im Juli morgens um 4 Uhr (16 Uhr astronomisch) gemachten Beobachtungen das Mittel, so erhält man $9,8^{\circ}$. Ebenso ergibt sich für 6 Uhr morgens die Durchschnittstemperatur $11,8^{\circ}$, für 8 Uhr 14° u. s. w. Bestimmt man so die Durchschnittstemperatur für alle Tagestunden des Juli, so erhält man den normalen Gang der Temperatur im Laufe eines Julitags wie er durch die stärker ausgezogene Curve in Fig. 7 dargestellt ist.

In gleichem Sinne ist in Fig. 8 der Gang der Temperatur am 9. und 10. Januar 1841 durch die beiden untersten fein ausgezogenen Curven, der normale Gang der Temperatur im Laufe eines Januartags aber durch die stärkere Curve dargestellt.

Im Durchschnitt fällt die niedrigste Temperatur auf die Stunde des Sonnenaufgangs, die höchste im Winter auf 1 Uhr, im Sommer auf 2 Uhr nachmittags. Die Differenz zwischen dem täglichen Maxi-

mum und Minimum ist im Winter weit kleiner als im Sommer, sie beträgt zum Beispiel für München durchschnittlich im Juli $6,2^{\circ}$ R., im Januar nur 2° R.

Durch die jährliche Periode ist die Abweichung der Jahreszeiten bedingt. In der heißen Zone sind die Schwankungen der Lufttemperatur im Laufe eines Jahres unbedeutend. Der Charakter der Jahreszeiten ist am stärksten in der Mitte der gemäßigten Zone ausgeprägt. Je mehr man sich der heißen Zone nähert, desto geringer wird der Unterschied zwischen Sommer und Winter, je mehr man sich den Polarkreisen nähert, desto greller wird dieser Unterschied, während die Uebergangsperioden, Frühling und Herbst, fast verschwinden.

Man erhält eine Uebersicht der jährlichen Periode der Lufttemperatur, wenn man die mittlere Temperatur eines Ortes für jeden der einzelnen Monate des Jahres ermittelt und danach die jährliche Temperaturcurve konstruirt, wie es in Taf. 13, Fig. 5 für Havana, Rom und Barnaul (in Sibirien), und in Fig. 6 für Moskau und Kestjavit (auf der Insel Island) geschehen ist. Man sieht zum Beispiel in Fig. 5, daß in Rom die mittlere Temperatur des kältesten Monats (Januar) ungefähr 6° R., die des heißesten (Juli) beinahe 20° R. beträgt, die Differenz zwischen der mittleren Temperatur des heißesten und des kältesten Monats beträgt für Rom also ungefähr 14° R. Diese Differenz beträgt für Havana nicht ganz 5° R., für Barnaul aber beträgt sie über 32° R.

Für Orte gleicher mittlerer Jahreswärme ist deshalb der normale Gang der Temperatur im Laufe eines Jahres keineswegs derselbe. So haben z. B. Moskau und Kestjavit nahezu gleiche mittlere Jahrestemperatur ($3,6^{\circ}$ und $3,3^{\circ}$ R.), die jährliche Temperaturcurve ist aber, wie man aus Fig. 6 sieht, für Kestjavit eine viel flachere als für Moskau. Für Moskau ist der Sommer heißer und der Winter kälter als für Kestjavit. Für Moskau ist die Temperatur des heißesten Monats um $23,5^{\circ}$ R., für Kestjavit ist sie nur um $12,5^{\circ}$ R. höher als die des kältesten Monats.

Durch die Nähe des Meeres, namentlich an den Westküsten von Europa und Nordamerika, sind die Gegensätze zwischen Sommer und Winter sehr gemäßig (Seeclima), während sie im östlichen Europa und in Nordasien ebenso wie im Innern von Nordamerika sehr groß sind (Continentalclima). Kestjavit gehört dem Seeclima, Moskau gehört dem Continentalclima an.

Das beste Bild der gleichzeitigen Vertheilung der Wärme auf der Erdoberfläche bieten die Monats-Isothermen, d. h. die Curven gleicher mittlerer Monatswärme. Taf. 13, Fig. 2 zeigt den Verlauf der Januar-, und Fig. 3 zeigt den der Juli-Isothermen. Man übersieht aus diesen Karten unter andern, daß Washington im Januar gleiche Temperatur mit Kestjavit und den westlichsten Vorgebirgen Norwegens, im Juli aber gleiche Temperatur mit der Südküste von Sicilien hat. Die Isotherme von 20° R., welche im Januar etwas südlich von St. Domingo herläuft, steigt während der folgenden 6 Monate bis nach Washington, im westlichen Asien steigt sie von der Südküste Arabiens bis zur Mitte des Kaspiischen Meeres. In der Nähe der Capverdischen Inseln bleibt dagegen die Lage der Isothermen von 20° R. fast un geändert.

Temperatur der höhern Luftschichten.

Mit der Erhebung über das Niveau der Meeresfläche sinkt die Temperatur, mag man sich nun in einem Luftballon erheben oder hohe Berge bestiegen.

Gasp. Lussac stieg im Jahre 1804 in einem Luftballon bis zu einer Höhe von 21000 Fuß auf und beobachtete in dieser Höhe eine Temperatur von $-7,6^{\circ}$ R., während am Boden eine Temperatur von $24,8^{\circ}$ R. herrschte. Auf Taf. 14 gibt Fig. 4 eine vergleichende Uebersicht der thermischen Beobachtungen, welche bei drei im Jahre 1852 in England unternommenen Luftfahrten angestellt wurden. Die Zahlen auf der linken Seite geben die nach pariser Fuß gemessenen Höhen, die Zahlen, welche auf den schattirten Streifen stehen, geben die an den entsprechenden Stellen beobachteten Temperaturen in Réaumur'schen Graden an.

Auf hohen Bergen zeigt schon die Veränderung der Vegetation die Abnahme der Temperatur an. Je höher man steigt, desto mehr nimmt die Vegetation den Charakter kälterer Himmelsstriche an. In Südamerika kann man in einem Tage aus der Region der Palmen bis zum ewigen Schnee aufsteigen. In der Andesette ist nach Humboldt die mittlere Jahres-temperatur in einer Höhe über dem Meere von

0 Fuß	22° R.
6000 "	$14,4^{\circ}$ "
12000 "	$5,6^{\circ}$ "
15000 "	$1,2^{\circ}$ "

Am Abhang großer Gebirgsmassen kann man sich isothermische Linien gelegt denken, welche nahezu als horizontale Curven erscheinen werden. Taf. 14, Fig. 5 zeigt den Verlauf der Höhen-Isothermen in den Alpen. Man übersieht leicht, daß die Isotherme von 0° R. in einer Höhe von 6000 bis 7000 Fuß um die Alpen herumzieht.

Unter sonst gleichen Umständen ist es auf Hochebenen wärmer als auf isolirten Berggipfeln gleicher Höhe.

Die Temperaturabnahme in den höhern Lustregionen wird dadurch besonders markirt, daß auf hohen Gebirgen der Schnee selbst in den Sommermonaten nicht wegschmilzt, sodaß diese Gipfel stets mit Schnee bedeckt bleiben. Die untere Grenze des ewigen Schnees rückt um so tiefer gegen den Meeresspiegel herunter, je mehr man sich vom Aequator aus den Polen nähert. So ist z. B.:

für Quito	0° n.Br.	die Höhe der Schneegrenze	15320'
" Mexico	19° "	" "	13900'
" Alpen	46° "	" "	8350'
" Norwegen	71° "	" "	2220'

Wie ungleich die Höhe der Schneegrenze auf den Gebirgen verschiedener Gegenden ist, wird durch Fig. 8 auf Taf. 15 anschaulich gemacht, in welcher die vorzüglichsten Höhen von Amerika, Asien und Europa in Gruppen zusammengestellt sind. Nr. 1, 2 und 3 sind der Illimani, der Alencagua und der Chimborasso in Südamerika. Dem Himalajagebirge gehören Nr. 4 und 5 (Schamalari und Dhaulagiri) an, Nr. 6 stellt den Kautajns dar. Die übrigen Gipfel entsprechen europäischen Gebirgen: Nr. 7 den Pyrenäen, Nr. 8 den Alpen, Nr. 9 dem Sulistma in Norwegen und Nr. 10 der Insel Nagerö, deren nördlichste Spitze das Nordcap bildet.

Aus Fig. 5 auf Taf. 14 sieht man, daß die Schneegrenze (die Grenzlinie zwischen braun und blau) merklich höher liegt als die Jahres-Isothermen von 0° . Die Höhe der Schneegrenze ist vorzugsweise bedingt durch die Temperatur des heißesten Monats und die Menge des Schneefalls. Wie man aus Fig. 8, Taf. 15, sieht, liegt die Schneegrenze auf dem Nordabhang des Himalaja höher als auf dem Südabhang, weil auf dem Südabhang viel mehr Schnee fällt.

Da in hohen Gebirgen oberhalb der Schneegrenze

mehr Schnee fällt als an Ort und Stelle wegschmelzen kann, so müßte hier eine ins Unendliche fortgehende Anhäufung von Schneemassen stattfinden, wenn nicht durch die Gletscher eine Ausgleichung vermittelt würde. Die Gletscher sind langsam fortschreitende Eisströme, welche sich in hohen Gebirgen aus der Region des ewigen Schnees in den Thälern bis weit unter die Region der Schneegrenze herabziehen, so daß das untere Gletscherende oft von einer blühenden Vegetation umgeben ist.

Der ursprünglich aus feinen Nadeln bestehende Schnee wird durch theilweises Schmelzen und wieder Gefrieren in eine körnige Masse, den Firn, verwandelt, welcher sich durch häufige Wiederholung desselben Processes allmählich in eine aus einzelnen wohnußgroßen, aber fest zusammengeklebten Körnern bestehende Eismasse verwandelt, welche aus ihrer geneigten Unterlage langsam thalabwärts gleitet. Fig. 7, Taf. 15, ist eine Ansicht des Rosenlaugletschers, welche sehr geeignet ist, einen richtigen Begriff von der Gletscherbildung zu geben. Man sieht, wie sich aus den ausgedehnten Schnees- und Firnsfeldern die Eismasse, einer ungeheuren Abnahme nicht ganz unähnlich, in die Tiefe hinabsenkt. Fig. 5, Taf. 15, stellt den Rhôneletscher dar, welcher, nachdem er in einem engern und steilern Thale, einer Eiscazade ähnlich, herabgestiegen ist, sich nun auf der erweiterten Thalsohle fächerförmig ausbreitet.

Aus der Karte des Mer de Glace im Chameunithal, Taf. 14, Fig. 6, sieht man, wie dieser mächtige Eisstrom durch die Vereinigung mehrerer Abseitsströme entsteht. Aus den Firnsfeldern des Col du Géant fließt sich der Glacier du Géant herab, der sich weiter unten mit dem Glacier du Lédaud und dem Glacier du Telleire vereinigt. Das untere Ende des Mer de Glace bei k liegt 3670 Fuß über dem Meeresspiegel, also ungefähr 4330 Fuß unter der Schneegrenze.

Im Jahre 1788 ließen die Begleiter Saussure's am obern Ende des Glacier du Géant bei g, Fig. 6, eine Leiter zurück, deren Bruchstücke im Jahre 1832, also nach 56 Jahren bei s wiedergefunden wurden. In 56 Jahren hat demnach der Eisstrom die Strecke von g bis s zurückgelegt, im Durchschnitt also jährlich einen Weg von 375 Fuß.

Das Eis des Col du Géant braucht 120 Jahre, um das untere Ende des Eismeers zu erreichen.

Von den Thalwänden, zwischen welchen die Gletscher eingebettet sind, fallen mehr oder minder große Felsstücke, Steingerölle und Gerölle auf die Ufer des Eisstroms, welche von dem Eise langsam thalabwärts getragen werden. Wenn nun zwei Gletscher zusammenstoßen, so gelangen diese Felsstücke, welche bis dahin auf den einander zugewendeten Ufern lagen, auf die Mitte des durch die Vereinigung gebildeten Gletschers und wandern nun auf der Mitte desselben (Mittelmoräne) fort, allen Krümmungen des Eisstroms folgend. Taf. 15, Fig. 6, welche den vom Eisechorn aus gesehenen Unterlaugletscher darstellt, ist eine Mittelmoräne in ausgezeichneter Weise sichtbar.

Das untere Ende der Gletscher ist stets von bedeutenden Gesteins- und Geröllmassen umgeben (Frontmoränen), welche durch das Eis allmählich herabgetragen worden sind. Wenn nun das untere Gletscherende einige Jahre lang vorrückt, so wird der Trümmerswall, welcher dasselbe umgibt, mit unvordringlicher Gewalt fortgeschoben, um liegen zu bleiben, wenn dann das untere Gletscherende sich wieder für einige Zeit zurückzieht. So sieht man Taf. 15, Fig. 5 einige alte Frontmoränen, welche wallartig das untere Ende des Rhôneletschers umgeben.

Mit der Entfernung vom Aequator steigen auch die Gletscher tiefer herab, um endlich in den Polarregionen beider Hemisphären den Meerespiegel zu erreichen. So stellt Fig. 1 auf Taf. 15 einen Gletscher auf Spitzbergen und Fig. 2 einen solchen auf der Westküste von Grönland dar, welche beide von den Meeresmagneten umspült werden.

Temperatur des Bodens und der Quellen.

Um die Temperatur der obern Bodenschichten zu beobachten, kann man die Lamont'sche Vorrichtung, Taf. 16, Fig. 3, anwenden. In den Boden ist eine hölzerne Röhre von quadratischem Querschnitt eingebohrt, in welche 4 Ballen passen, von denen einer auf dem andern steht und welche mittels einer Stange der Reihe nach herausgezogen werden können. In jedem dieser Ballen ist eine Vertiefung angebracht, in welcher ein Thermometer mit großem Gefäß angebracht ist. Die fünf Thermometer befinden sich der Reihe nach 4, 8, 12, 16 und 20 Fuß tief unter der Oberfläche. Um die Beobachtung zu machen, wird erst A herausgezogen und das oberste Thermometer rasch abgelesen, dann das zweite u. s. w. Eine solche Beobachtung wird jede Woche einmal gemacht.

Nach solchen jahrelang zu München fortgesetzten Beobachtungen ist der jährliche Gang der Temperatur in Fig. 9, Taf. 13, für eine Tiefe von 4, 12 und 20 Fuß graphisch dargestellt. Die Figur zeigt, daß die jährlichen Extreme einander um so näher rücken, je tiefer man in den Boden eindringt. Für eine Tiefe von 20 Fuß beträgt diese Differenz nur noch $1\frac{1}{4}^{\circ}$ R. Außerdem aber tritt das jährliche Maximum und Minimum für tiefere Schichten später ein als für höhere. Während das Temperaturmaximum und Minimum auf der Oberfläche im Juli und Januar eintritt, geschieht dies in einer Tiefe von 20 Fuß erst im December und Mai.

Im mittlern Europa verschwinden die jährlichen Variationen der Temperatur in einer Tiefe von 70 Fuß, obgleich hier beständig die gleiche Temperatur herrscht, welche nur wenig höher ist als die mittlere Temperatur des Beobachtungsortes an der Oberfläche. Für Orte, deren mittlere Temperatur unter dem Gefrierpunkt liegt, wie dies im nördlichen Sibirien der Fall ist, bleibt der Boden in der Tiefe von einigen Fuß beständig gefroren.

Noch über die Tiefe hinaus, für welche die jährlichen Variationen der Temperatur verschwinden, in den Boden eindringend, wird die Temperatur stets höher; so fand man in einem Bohrloch

zu Gränsdorsf in einer Tiefe von	680'	17° C.
„ Grenelle	„ „ „ 1650'	28° „
„ Neufalzwert	„ „ „ 2050'	33° „

Im Durchschnitt steigt die Temperatur um 1° C., wenn man um 100 Fuß tiefer in den Boden eindringt. Demnach müßte man schon in einer Tiefe von 10000' die Temperatur des siedenden Wassers finden und in einer Tiefe von fünf Meilen müßte eine Hitze herrschen, bei welcher Onkisen und Basalt flüssig sind. Demnach läßt sich kaum bezweifeln, daß sich das Innere der Erde in feurig-flüssigem Zustande befindet.

Daß in den Boden eindringende Regenwasser nimmt die Temperatur der Erd- und Felschichten an, mit welchen es längere Zeit in Berührung bleibt, und so kommt es, daß die Temperatur etwas wärmerer Quellen das ganze Jahr hindurch ziemlich constant

bleibt und daß sie wenig von der mittlern Temperatur des Ortes verschieden ist, an welchem sie hervorbrechen. Solche Quellen jedoch, deren Wasser bis zu einer größern Tiefe eingebrungen war, werden eine um so höhere Temperatur zeigen, aus je größerer Tiefe ihr Wasser kommt. Zu den interessantesten heißen Quellen gehören die periodischen Springquellen Jélands, namentlich aber der große Geyfir.

Auf dem Gipfel eines ungefähr 70 Fuß hohen Hügelns befindet sich ein Bassin von 48 Fuß, in dessen Mitte sich ein 9 Fuß weites Rohr bis zu einer Tiefe von 70 Fuß vertical hinabsenkt. Rohr und Bassin sind meist mit heißem Wasser gefüllt. Taf. 16, Fig. 5 ist das Bild einer Geyfiration, Fig. 4 dagegen ist eine Ansicht des Bassins und der Mündung des Rohrs zu einer Zeit, in welcher das Bassin wasserfrei ist.

Von Zeit zu Zeit schwillt das Wasser im Beden an und große Dampfblasen steigen auf. In Zwischenräumen von 80—90 Minuten wiederholt sich dieselbe Erscheinung, bis endlich eine große Eruption erfolgt. Das Wasser im Bassin schwillt höher an und ein Wasserstrahl schießt 80—100 Fuß hoch senkrecht in die Luft (Fig. 6); ungeheure Dampfswolken verballen zum Theil die Wasserfäule. Nach einer solchen Explosion ist das Bassin und das Rohr bis zu einer Tiefe von etwa 6 Fuß von Wasser entleert. Nach und nach steigt das Wasser wieder, bis das Bassin voll ist und nach einem oder mehreren Tagen eine neue Eruption erfolgt.

Durch Kanäle, welche man nicht weiter verfolgen kann, tritt das weit über 100° C. erhitzte Wasser am untern Ende des Rohrs in dasselbe ein, seine Temperatur sinkt aber um so mehr, je höher es aufsteigt. An jeder einzelnen Stelle ist die Temperatur des Wassers unmittelbar nach einer großen Eruption am geringsten, sie steigt aber allmählich wieder bis zur nächsten Eruption. Ueberall aber ist die Temperatur des Wassers geringer, als die Temperatur des Siedepunktes an dieser Stelle, welche mit der Tiefe wächst, weil außer dem Druck der Atmosphäre auch noch der Druck einer Wasserfäule zu tragen ist. Ungefähr in einer Tiefe von 50 Fuß kommt die Temperatur des Wassers der Temperatur des entsprechenden Siedepunktes am nächsten. Bildet sich nun hier wirklich einmal eine große Dampfblase, so wird ein Theil des Wassers aus dem Rohre hinauszugeworfen, der Druck, welcher auf den tiefern Wasserschichten lastet, wird vermindert und infolge davon tritt ein massenhaftes Kochen ein, durch welches das siedende Wasser hoch in die Luft geschleudert wird.

Um das Geyfirphänomen im kleinen nachzuahmen, dient der Apparat Fig. 6, Taf. 16; ein 5 Zoll weites, 5 Fuß langes Blechrohr mündet oben in ein flaches Beden. Mit Wasser gefüllt steht das Rohr unten in einem Kohlenbeden, während in seiner Mitte ein zweites Kohlenbeden angebracht ist. In diesem Apparat erfolgt eine Eruption nach je 5 Minuten. Das Wasser wird dann 2—3 Fuß hoch in die Höhe geschleudert.

Temperatur der Meere.

Man hat versucht, Isothermen der Oberfläche des Meerwassers zu konstruiren, allein sie verlaufen so gekrümmt, daß man nicht wohl annehmen kann, daß sie das Gesetz der wahren Vertheilung der Wärme auf der Meeresoberfläche darstellen. Von größerer, namentlich zoologischer Bedeutung sind dagegen die Isotrymen, welche auf der Karte Taf. 13, Fig. 4 aufgetragen sind. Sie verbinden die Orte, an denen die Temperatur der Meeresoberfläche während

der 30 aufeinanderfolgenden kältesten Tage des Jahres gleich niedrig ist.

Während das Wasser der Landseen in großen Tiefen stets eine Temperatur von 4 bis 5° C. (also ungefähr die Temperatur seines Dichtigkeitsmaximums) hat, ist die Temperatur des salzhaltigen Wassers aller Meere in der Tiefe noch geringer. Selbst im Indischen Ocean fand man in einer Tiefe von 6000 Fuß eine Temperatur zwischen 2 und 3° C., während die Temperatur an der Oberfläche 24° C. betrug. Auch in den Tiefen der Polarmeere ist die Temperatur des Wassers 2 bis 3° C.

Dass selbst in den Tiefen der Äquatorialmeere eine so niedrige Temperatur herrscht, läßt sich nur dadurch erklären, daß in der Tiefe stets das an den Polen erkaltete Wasser dem Äquator zufließt. Das ist aber nicht möglich, ohne daß an der Oberfläche des Meeres Strömungen vorkommen, welche das Wasser der Tropen den Polen zuführen. Auf der Karte Taf. 14, Fig. 1 sind die bedeutendsten Strömungen an der Oberfläche des Meeres eingezeichnet, und zwar die warmen roth, die kalten schwarz. Für Europa ist der Golfstrom von besonderer Wichtigkeit, welcher, aus dem Mexikanischen Meerbusen kommend, zunächst an den Küsten von Nordamerika hinläuft und sich dann gegen Europa wendet.

Während sich der Lauf der Strömungen an der Oberfläche des Meeres durch Beobachtungen feststellen läßt, entziehen sich die Strömungen in der Tiefe vollständig der Wahrnehmung. Auch auf theoretischem Wege läßt sich ihr Lauf nicht ermitteln und zwar um so weniger, da uns die Gestalt und des Meeresbodens fast ganz unbekannt ist. Nur für wenige Gegenden kennt man das Profil des Meeresbodens genauer, wie z. B. für den Atlantischen Ocean zwischen Irland und Neufundland, wo man es wegen Legung des Telegraphenabels sondirte. Fig. 13 auf Taf. 16 stellt dieses Profil dar, und zwar sind hier die Meerestiefen in einem hundertmal größern Maßstab aufgetragen als die horizontalen Entfernungen. Die größte Meerestiefe zwischen St. Johns (a) und Valencia (b) beträgt 2170 Faden (1 Faden = 6 Fuß englisch).

Eine andere Bewegung der Meeresoberfläche, welche nicht thermischen Ursprungs ist, welche aber doch am besten hier besprochen wird, ist die Ebbe und Flut. 6 Stunden 12 1/2 Minuten lang steigt das Meer, das ist die Flut; dann fällt es wieder in den nächsten 6 Stunden 12 1/2 Minuten, und dieses Sinken wird die Ebbe genannt. Innerhalb 24 Stunden 50 Minuten (die Zeit von einer Mondculmination zur nächsten) findet also zweimal Ebbe und zweimal Flut statt. Daraus erhellt man schon, daß Ebbe und Flut vorzugsweise durch den Mond bedingt sind, was noch augenscheinlicher dadurch hervortritt, daß das Maximum der Flut stets um eine bestimmte Zeit nach dem (obern und untern) Durchgang des Mondes durch den Meridian stattfindet. Diese Zeit, welche den Namen Hafenzeit führt, ist von einem Orte zum andern infolge localer Ursachen verschieden. So beträgt die Hafenzeit in

Cadix . . . 1 St. 15 M.	Plymouth . . 6 St. 5 M.
Lissabon . 4 „ 0 „	Calais . . . 11 „ 45 „
Bayonne 3 „ 30 „	Hamburg . 5 „ 0 „

Die Fluthöhe, d. h. der Unterschied zwischen der Höhe des Meeresspiegels zur Zeit der Flut und zur Zeit der darauffolgenden Ebbe, ist für einen und denselben Ort veränderlich, indem sie theils periodische, theils zufällige Schwankungen erleidet. Die periodischen rühren daher, daß auch die Sonne eine Ebbe und Flut veranlaßt, welche aber geringer ist als die Mond-

flut. Die Höhe der Fluten ist deshalb am größten zur Zeit des Neumondes und des Vollmondes (Zerflut); sie ist am kleinsten zur Zeit des ersten und letzten Mondviertels.

Die zufälligen Schwankungen werden vorzüglich durch Winde und Stürme bedingt, welche je nach Umständen das Steigen der Flut begünstigen oder hemmen. Ebenso ist die Fluthöhe von localen Verhältnissen abhängig. Im Mittelländischen Meere kaum merklich, sie an den Küsten von England und Frankreich bedeutend. So ist z. B. die mittlere Höhe der Flut zu Bayonne 9 Fuß, zu London 18 Fuß, zu Malo 36 Fuß, in der Fundybay (Britisch-Nordamerika) bis 70 Fuß. Auf kleinen mitten im Ocean liegenden Inseln ist die Fluthöhe unbedeutend, z. B. 3 Fuß St. Helena, 2 Fuß auf den kleinen Inseln der Azoren.

Mit dem Namen der Zfloodaden bezeichnet man solche Curven, welche, wie die Taf. 14, Fig. 1 zeigen, alle Orte der Meeresoberfläche miteinander verbinden, die gleichzeitig den Gipfel einer Flutwelle bilden. Haben z. B. alle Punkte einer bestimmten Curve zu einer bestimmten Stunde des Tages Hochwasser, so wird die Flutwelle in zwei, vier, in sechs Stunden bis zu den folgenden 6, 8 bezeichneten Curve vorgegeben sein.

Bei der großen Kälte, welche an der Oberfläche der Polarmeere herrscht, muß eine massenhafte Eisschicht stattfinden. Da aber beim Gefrieren des salzhaltigen Meerwassers sich salzfreies Eis bildet, so ist die Bildung von der Ausscheidung einer concentrirten Salzlösung begleitet, welche zwischen den getrennten Eisschättchen eingeschlossen bleibt, weshalb denn auch das aus Meerwasser entstandene Eis nicht so hart und fest ist, wie das Süßwasseris, sondern leicht zerbrechlich und schwammig.

Wenn die Oberfläche des Meeres gefriert, so dehnt sich meilenweit ausgebreitete Eissfelder, welche sich den Wogenschlagen zerbrochen, das Treibeis bilden. Durch Meeresströmungen und Winde wird das Treibeis oft ziemlich weit gegen den Äquator hingetragen. In der Karte Taf. 14, Fig. 1, ist die durchschnitten Grenze des Treibeises auf beiden Hemisphären von V. V. bezeichnet.

Das Treibeis ragt nicht weit über den Meeresspiegel empor. Manchmal begegnet man aber schwimmenden Eisbergen, welche 100—120 Fuß hoch über den Meeresspiegel emporragen. Diese Eisberge, welche weiter gegen den Äquator vordringen als das Treibeis, bestehen aus festem Süßwasseris und bestehen von Gletschern, welche in das Meer vorgeschoben, der übrigen Eismasse abgebrochen und durch die Wogen von ihrem Bildungsorte weggeführt wurden. Taf. 15, Fig. 3 und 4 sind Ansichten solcher schwimmender Eisberge.

Das Lustmeer, sein Druck und seine Strömungen.

Größe und Variationen des Luftdrucks.

Wenn man sich über den Spiegel des Meeres erhebt, so sinkt die Barometersäule. Ungefähr in der Höhe der punktirten Horizontallinie, Taf. 15, Fig. 1, welche den Gipfel des Caucasus streift, ist der mittlere Barometerstand nur noch halb so hoch als im Meeresniveau des Meeres. Der kleine Ballon, den man in dieser Figur etwas rechts über dem Berggipfel sehen sieht, bezeichnet die Höhe, bis zu welcher Cap. Taf. 15,

Luftballon aufgestiegen war. In einer Höhe von geographischen Meilen ist die Dichtigkeit der Luft 5 mal geringer als am Spiegel des Meeres.

Wenn man das an einem bestimmten Orte aufgestellte Barometer einige Zeit lang beobachtet, so ergiebt sich bald, daß es regellos um einen mittlern Wert schwankt. In diesen unregelmäßigen, zufälligen Schwankungen lassen sich jedoch auch periodische Schwankungen nachweisen, wenn man aus langen Beobachtungsreihen die entsprechenden Mittelzahlen berechnet. Nimmt man z. B. das Mittel aus allen im Laufe eines Jahres um 6, 7, 8 Uhr u. s. w. gemachten Beobachtungen, so läßt sich danach der mittlere tägliche Gang des Barometers bestimmen. Das Mittel aus allen im Laufe eines Monats gemachten Barometerbeobachtungen liefert den mittlern Barometerstand des Monats, und wenn man das barometrische Mittel für alle Monate des Jahres berechnet hat, so giebt sich danach das Gesetz der jährlichen Variationen des Barometerstandes.

In unsern Gegenden sind die periodischen Schwankungen des Barometers sehr klein gegen die zufälligen, daß sie erst durch längere Beobachtungsreihen sichtbar gemacht werden können. In den Tropen dagegen treten die periodischen Variationen des Barometers viel entschiedener hervor, wie man aus den Figuren auf S. 8, Taf. 14, ersieht. Fig. 7 stellt den Gang der täglichen, und Fig. 8 stellt den Gang der jährlichen Variationen des Barometers für Kalkutta und Petersburg dar.

Die Ursache der Barometerchwankungen liegt darin, daß eine wärmere Luftsäule bei gleicher Höhe einen geringern Druck ausübt als eine kältere, das Barometer wird also im allgemeinen steigen müssen für die kälteren, es wird fallen müssen für die wärmeren Gegenden kommen. Im Allgemeinen wird deshalb auch der Gang des Thermometers und des Barometers ein entgegengesetzter sein müssen, wie sich dies auch im Winter am entschiedensten ausdrückt. So stellt z. B. die obere Curve in Fig. 10, Taf. 13, den Gang des Thermometers, die untere Curve stellt den des Barometers zu Frankfurt a. M. vom 11. Januar bis zum 6. Februar 1837 dar.

Bei uns sind nun die von den Aequatorialgegenden kommenden Südwestwinde zugleich feuchte Regenwinde, die kalten Nordostwinde sind zugleich trodene Winde, daher es denn kommt, daß das Barometer bei regnerischem Wetter durchschnittlich tiefer, bei hellem, trockenem Wetter aber höher steht.

Wenn dieser Gegensatz im Sommer nicht so rein auftritt, so ist der Grund davon darin zu suchen, daß im Sommer die unmittelbare Wirkung der Sonne mehr in den Vordergrund tritt. Die Wirkung der Sonnenstrahlen wird aber bei Südwestwind durch die Wolkendecke gemildert, während sie bei dem heitern Himmel, den der Nordostwind bringt, ganz ungehindert auftritt.

Winde und Stürme.

Die Entstehung der Winde ist durch die ungleiche Verteilung der Wärme in der Atmosphäre bedingt. Da wo die Erdoberfläche durch die Sonnenstrahlen am stärksten erhitzt wird, muß die erwärmte Luft wegen ihres geringern spezifischen Gewichtes aufsteigen, um oben seitwärts abzusinken, während am Boden frische Luft von kältern Gegenden zuströmt.

Im kleinen läßt sich dies durch folgenden Versuch darstellen. Man öffne im Winter die Thür eines ge-

heizten Zimmers, welche in einen kalten Raum führt so weit, daß ein ungefähr zwei Finger breiter Spalt entsteht, wie Taf. 16, Fig. 7 andeutet, und halte dann eine brennende Kerze in den Spalt, so wird die Flamme nach außen geblasen, wenn man sie in die obere, nach innen, wenn man sie in die untere Hälfte der Spaltöffnung hält, während die Flamme in der mittlern Höhe der Spaltöffnung unbewegt bleibt.

Demnach muß also dem Aequatorialgürtel der Erde in den untern Schichten der Atmosphäre von beiden Polen her stets Luft zuströmen, und so müßte auf der einen Seite dieses Gürtels ein beständiger Nord-, auf der andern Seite ein beständiger Südwind wehen; durch die Rotation der Erde werden aber diese Winde in beständige Nordost- und Südostwinde verwandelt, welche den Namen der Passatewinde führen.

In voller Regelmäßigkeit wehen diese Passatwinde nur auf dem offenen Meere. Taf. 14, Fig. 3, die Region des Nordostpassats, sowie die des Südostpassats, sind durch rothe Färbung ausgezeichnet.

Da wo der Nordostpassat von der nördlichen, der Südostpassat von der südlichen Hemisphäre zusammenstreffen, combiniren sie sich zu einem rein östlichen Winde, der aber unmerklich wird, weil die horizontale Bewegung durch eine verticale Bewegung der in Folge ihrer starken Erwärmung mächtig aufsteigenden Luft neutralisirt wird. Es würde hier fast vollkommene Windstille herrschen, wenn nicht die heftigen Stürme, welche die fast täglich unter Blitz und Donner stattfindenden Regengüsse begleiten, die Ruhe der Atmosphäre störten. — Die Zone, welche die Passatwinde der beiden Hemisphären trennt, ist die auf der Karte Taf. 14, Fig. 3 gleichfalls verzeichnete Region der Calmen.

Die Region der Calmen fällt nicht mit dem Aequator zusammen, sondern sie liegt etwas nördlich von demselben, was eine Folge davon ist, daß auf der nördlichen Halbkugel viel mehr Land liegt als auf der südlichen.

Die in der Region der Calmen aufsteigende Luft fließt in der Höhe nach beiden Seiten hin ab, um sich nach den Polen zu ergießen. Die Richtung dieses obern Passats ist der des untern entgegengesetzt; sie ist auf der nördlichen Halbkugel eine südwestliche, auf der südlichen eine nordwestliche.

In größerer Entfernung vom Aequator senkt sich der obere Passat mehr und mehr gegen die Erdoberfläche. Auf dem Gipfel des Pic von Teneriffa wehen häufig Südwestwinde, während am Meeresspiegel der Nordostpassat herrscht.

Im Indischen Ocean ist die Regelmäßigkeit der Passatwinde durch die Configuration der Landmassen gestört. Im südlichen Theile des Indischen Oceans, zwischen Madagaskar und Neuholand, herrscht freilich das ganze Jahr hindurch der Südostpassat, in dem nördlichen Theile dieses Meeres aber weht der Nordost vom September bis zum April, der Südwest dagegen vom April bis zum September. Diese regelmäßig abwechselnden Winde werden Moussons genannt. Auf der Karte Taf. 14, Fig. 3 ist die Region der Moussons gleichfalls bezeichnet.

Der von den Aequatorialgegenden abströmende, sich mit der Annäherung gegen die Pole immer mehr senkende obere Passat erreicht endlich den Boden, und zwar auf der nördlichen Hemisphäre als Südwest-, auf der südlichen als Nordwestwind. Außerhalb der Region der Passate gehen also die beiden Strömungen, welche die Luft dem Aequator zu und von demselben wegführen, nicht mehr übereinander, sondern nebeneinander her, indem sie sich abwechselnd gegenseitig

verdrängen; bald erlangt der Nordost, bald der Südwest die Oberhand, und bei dem Uebergange aus einer dieser Hauptwindrichtungen in die andere sehen wir die Zwischenwinde nach allen Richtungen der Windrose wehen.

Der bei oberflächlicher Betrachtung ganz regellose Wechsel der Windrichtungen unterliegt, wie genauere Untersuchungen gezeigt haben, doch einem bestimmten Gesetze, indem die Winde innerhalb der nördlichen gemäßigten Zone in der Regel in folgender Ordnung aufeinanderfolgen: Süd, Südwest, West, Nordwest, Nord, Nordost, Ost, Südost, Süd.

Am regelmässigen läßt sich diese Drehung des Windes im Winter beobachten. Häufig springt der Wind in einer dem eben angeführten Drehungsgesetz entgegengesetzten Richtung um 45–90 Grad zurück, um sich dann wieder in normaler Richtung, also wie der Zeiger einer Uhr, weiter zu drehen.

In der südlichen gemäßigten Zone erfolgt die Drehung des Windes nach der entgegengesetzten Richtung.

Ein Wind, dessen Geschwindigkeit 30–40 Fuß in der Secunde beträgt, wird ein starker, ein solcher von 40–60 Fuß Geschwindigkeit wird ein heftiger genannt. Wächst die Geschwindigkeit des Windes über 60 Fuß in der Secunde, so geht er in Sturm über. Die stärksten Stürme von 120–150 Fuß Geschwindigkeit werden als Orkane bezeichnet.

Stürme sind stets die Folge einer irgendwo eingetretenen starken Verminderung des Luftdrucks, weshalb sie denn auch stets von einem starken Fallen des Barometers begleitet sind. Bei heftigen Stürmen sinkt das Barometer öfters rasch um 18–22 Linien. Die Luft strömt aber nicht einfach von allen Seiten her gegen die Stelle der größten Luftverdünnung hin, sondern sie nimmt eine wirbelnde Bewegung um das selbst fortgeschreitende barometrische Minimum an.

In der nördlichen gemäßigten Zone schreitet das Minimum des Luftdrucks in südwestlicher Richtung vor, wie es der gediehene Pfeil in Fig. 8, Taf. 16, anzeigt, welche den Verlauf des Sturms vom 24. auf den 25. December 1821 darstellt. Um die Stelle des geringsten Luftdrucks wirbelt aber die Luft entgegengesetzt dem Zeiger einer Uhr, also in der Richtung der ungefederten Pfeile der Fig. 8. An den Orten, welche auf dem Wege des barometrischen Minimums liegen, wie z. B. zu London in dem durch Fig. 8 erläuterten Fall, beginnt also der Sturm mit Südost, um dann rasch in Nordwest umzuschlagen. An Orten, welche südöstlich vom Wege des Minimums liegen, beginnt der Sturm mit Südwest und schlägt durch Süd nach West um; auf der Nordwestseite des Minimums dagegen setzt der Sturm mit Ostwest ein und schlägt durch Ost nach Nord um.

Auf der Südostseite des Minimums wüthet der Sturm weit heftiger als auf der Nordwestseite, denn auf der Südostseite summirt sich die Geschwindigkeit des Wirbels zu der Geschwindigkeit, mit welcher das Minimum fortschreitet, auf der Nordwestseite dagegen sind diese beiden Geschwindigkeiten einander entgegengesetzt.

In der Nordhälfte der heißen Zone ist die Rotationsrichtung der Wirbelstürme dieselbe wie in der nördlichen gemäßigten Zone, das Centrum des Sturms schreitet aber in südlicher Richtung vorwärts, um beim Uebergang in die gemäßigte Zone nach südwestlicher Richtung umzubiegen, wie Taf. 16, Fig. 9 erläutert. Auf der südlichen Hemisphäre ist die Rotationsrichtung der Wirbelstürme die entgegengesetzte von der auf der nördlichen Halbkugel stattfindenden. Inner-

halb der heißen Zone schreiten südlich vom Centrum der Wirbelstürme in nordöstlicher Richtung vorwärts, um beim Uebergang in die südlich gemäßigte Zone eine nordwestliche Richtung anzunehmen wie Fig. 10 zeigt.

Wir haben eben Wirbelwinde im großartigsten Maße betrachtet; ganz ähnliche Erscheinungen haben aber auch im kleinsten Maßstabe vor. Bei nahenden Gewittern sieht man oft Luftwirbel, Durchmesser nur einige Fuß beträgt, welche Staub und Sand noch Blätter, Stroh, kleine Zweige u. s. w. mit in die Höhe nehmen. Diese Winde von größern Dimensionen (20–100 Fuß Durchmesser) und größerer mechanischer Kraft Wetterfäulen oder Tromben genannt. Sie im Stande, Bäume zu brechen und zu entzweigen und Bäume hoch in die Luft zu heben. Hunderte von Schritten fortzuführen u. s. w. aufgewirbelte Staubmassen werden sie auf sichtbar gemacht. Ueber das Meer, über Seen, Flüsse hinziehend, wühlen sie das Wasser so hoch auf, daß es sich wirbelnd zu einer schäumenden Pyramide (Wasserhose) erhebt. Taf. 16, Fig. 11 eine am 10. Juni 1858 in der Nähe von Wien im Winter auf dem Rhein beobachtete Wasserhose.

In neuerer Zeit hat man vielfach den elektrischen Telegraphen zu Sturmwarnungen benutzt. Zwar werden am zweckmässigsten die telegraphischen Witterungsberichte zu diesem Zwecke benutzt, verschiedenen Ländern hat man Centralstationen eingerichtet, welche täglich telegraphische Nachrichten über den Stand der meteorologischen Instrumente von einer Reihe von Stationen empfangen, die mit ihr in Verbindung stehen. Das großartigste System telegraphischer Witterungsberichte ist ohne Zweifel dasjenige, Centralstation die pariser Sternwarte ist und fast ganz Europa umfaßt. Jeden Morgen um geht ein telegraphischer Bericht von einigen schwedischen, norwegischen, russischen, niederländischen, englischen, französischen, spanischen, italienischen, österröischen Stationen ein; also fast aus ganz Europa wird um 8 Uhr der Witterungszustand telegraphisch nach berichtet und von da aus werden dann gleichfalls telegraphischem Wege verschiedenen Geschäften die wichtigsten Notizen mitgetheilt. Außerdem aber auch die eingelaufenen Berichte über Thermometer- und Barometerstand, Windrichtung, Bewölkung, Regen u. s. w. täglich in dem Bulletin international zusammengefaßt und diesem noch ein Kärtchen von Europa beige in welchem die nach den berichteten Barometerstand konstruirten Isobaren, d. h. Linien gleichem Barometerstandes, eingetragen sind. Taf. 16, Fig. 11 ist die Copie des für den 15. November konstruirten Kärtchens. An der Grenze zwischen Island und Schottland bestand am Morgen jenes ein barometrisches Minimum von 729^{mm}, um 10 Uhr die Isobaren von 730^{mm} (73 Centimeter), um 12 Uhr von 740^{mm} als geschlossene Curven herumlaufen. An südwestlichen Küsten von Norwegen, der Südküste von England und der Südwestküste von Island war Barometerstand 745^{mm} u. s. w.

Wenn, wie es hier der Fall ist, um ein barometrisches Minimum die von 5 zu 5^{mm} schreitenden Isobaren dicht gedrängt herumlaufen, findet sicherlich eine stürmische Bewegung der Luft statt, welche nach den besprochenen Gesetzen an der Stelle des tiefsten Barometerstandes herumläuft. Das Centrum des Wirbelsturms aber schreitet mit einer Geschwindigkeit von 70–100 geographischen Meilen in 24 Stunden fort, so daß es meist

iglich ist, die vom Sturm zunächst bedrohten Häfen warnen.

Hydrometeore.

In einem luftersättigten Raume kann ebenso viel Wasserdampf enthalten sein, wie bei gleicher Temperatur in einem gleichgroßen luftleeren Raume. Wird etwas Wasser in einen luftleeren Raum gebracht, so geht die Verdampfung so rasch vor sich, daß er in kürzester Zeit mit Wasserdampf erfüllt ist, bringt man aber Wasser mit einem luftersättigten Raum in Berührung, so geht die Dampfbildung nur allmählich vor sich, weil die Luft ein mechanisches Hinderniß für die Verdampfung des Wasserdampfes bildet, sodaß erst nach einiger Zeit der Sättigungszustand eintritt. Daher nimmt es, daß unsere Atmosphäre, obgleich sie vielfach mit Wasser in Berührung ist, selten mit Wasserdampf gesättigt ist.

Die Menge des Wasserdampfes, welchen ein gegebener luftleerer oder mit Luft erfüllter Raum aufnehmen im Stande ist, hängt von der Temperatur ab. Ein Kubimeter Luft kann aufnehmen

bei 0° C. 5,4 Gramm, 20° C. 17,4 Gramm,
10° C. 9,7 „ 30° C. 29,4 „

Wenn also bei 30° C. in 1 Kubimeter Luft nur 7,4 Gramm Wasserdampf enthalten sind, so ist sie nicht gesättigt, sie enthält nur $\frac{17,4}{29,4} = 0,59$, d. h.

59 Procent des Wasserdampfes, welchen sie bei 30° C. überhaupt aufnehmen im Stande ist.

Um den Wassergehalt der Luft zu ermitteln, hat man verschiedene Instrumente konstruirt. Daniel's Psychrometer, Taf. 16, Fig. 21, besteht aus einer gekrümmten Röhre, welche mit zwei Kugeln endigt. Die eine, a, ist vergoldet, die andere ist mit einem Leinwandläppchen umwickelt. a ist zur Hälfte mit Aether gefüllt und enthält ein kleines Thermometer, dessen Theilung in die Röhre t hineinragt. Der Apparat ist vollkommen luftleer. Wenn man nun Aether auf die Kugel b tröpfelt, so wird sie durch dessen Verdampfung erkaltet, in ihrem Innern werden Aetherdämpfe condensirt und dadurch eine Verdampfung in der Kugel a bewirkt, welche eine Abkühlung derselben zur Folge hat. Ist die Abkühlung bis zu der Temperatur fortgeschritten, für welche die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist, so beschlägt sich die Kugel a mit einer zarten Thauschicht. Die Temperatur, welche das Thermometer in t dem Augenblicke zeigt, in welchem der Beschlag auf a erscheint, ist der Thaupunkt, d. h. die Temperatur für welche die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist. Nehmen wir an, die Temperatur der Luft sei 30° C., im Moment des Beschlags zeige das Thermometer in t 20° C., so enthält die Luft gerade so viel Wasserdampf, als sie bei 20° C. aufnehmen im Stande ist, jedes Kubimeter Luft enthält also 17,4 Gramm Wasserdampf, d. h. 59 Procent des für 30° C. möglichen Wassergehalts.

August's Psychrometer, Taf. 16, Fig. 22, besteht aus zwei an einem und demselben Gestell befestigten Thermometern. Die Kugel des einen, A, ist mit einem Leinwandläppchen umgeben, während die Kugel B, des andern frei bleibt. Dem Leinwandläppchen von A wird aus einer Glasröhre B stets etwas Wasser zugeführt, sodaß es beständig feucht bleibt. Ist nun die Luft mit Wasserdampf gesättigt, so kann aus der Leinwandhülle von A nichts verdampfen, beide Thermometer stehen gleich hoch. Ist aber die Luft nicht ge-

sättigt, so findet bei A' eine Verdampfung statt, infolge deren diese Thermometerkugel um so mehr erkaltet wird, je weiter die Luft von ihrem Sättigungspunkte entfernt, je lebhafter also die Verdampfung bei A' ist. Aus der Differenz der beiden Thermometer läßt sich der Wassergehalt der Luft berechnen.

Während man durch die beiden eben besprochenen Instrumente den absoluten Wassergehalt der Luft erfährt, gibt das Saussure'sche Haarpsychrometer, Taf. 16, Fig. 23, den relativen Wassergehalt der Luft an, d. h. es gibt an, wie viel Procent des für die herrschende Temperatur möglichen Wassergehalts in der Luft wirklich vorhanden sind. Das Haar c ist mit seinem obern Ende durch ein Zängelchen d gefaßt, das untere Ende aber ist in einer Rinne der Rolle o befestigt, um deren zweite Rinne ein Seidenfaden geschlungen ist, welcher ein kleines Gewicht p trägt, durch welches das Haar beständig gespannt erhalten wird. An der Achse der Rolle ist ein Zeiger befestigt, welcher an einem Gradbogen hin- und hergeht, wenn die Rolle nach der einen oder andern Seite gedreht wird. Bei feuchter Luft absorbiert das Haar Wasserdampf, es verlängert sich und die Spitze des Zeigers geht abwärts. In trockener Luft verliert sich das Haar, und die Spitze des Zeigers geht in die Höhe. Der Punkt der Skala, in welchem sich der Zeiger einstellt, wenn sich das Instrument in absolut trockener Luft befindet, wird mit o, derjenige dagegen, in welchem er sich in einer mit Feuchtigkeit gesättigten Luft einstellt, wird mit 100 bezeichnet und der Zwischenraum in 100 gleiche Theile getheilt.

Mit Hilfe dieser Instrumente hat man gefunden, daß im Sommer durchschnittlich der Wassergehalt der untern Luftschichten bei Sonnenaufgang am geringsten ist. Er nimmt dann rasch zu bis 9 Uhr morgens, wo er wieder zu sinken beginnt, weil ein aufsteigender Luftstrom nun den Wasserdampf in die Höhe führt, und zwar dauert das Sinken bis gegen 4 Uhr nachmittags. Um 9 Uhr abends erreicht der Wassergehalt der Luft ein zweites Maximum, um dann bis Sonnenaufgang zu sinken.

Im Winter findet nur ein Maximum des Wassergehalts, und zwar um 2 Uhr nachmittags statt, während das Minimum des Wassergehalts auf die Zeit des Sonnenaufgangs fällt.

Wir sagen die Luft sei trocken, wenn das Wasser rasch verdunstet, wir nennen sie feucht, wenn verdunstete Gegenstände langsam trocknen. Feucht nennen wir also die Luft, wenn sie ihrem Sättigungspunkte nahe, trocken dagegen, wenn ihr Wassergehalt weit vom Sättigungspunkte entfernt ist. An einem heißen Sommertage kann sehr viel Wasserdampf in der Luft enthalten sein, und wir nennen sie doch trocken, weil sie bei der herrschenden Temperatur noch weit mehr aufnehmen könnte. An einem Wintertage enthält die Luft weit weniger Wasserdampf, wir nennen sie aber doch feucht, weil sie ihrem Sättigungspunkte nahe ist. In diesem Sinne ist die Luft zur Zeit des Sonnenaufgangs am feuchtesten, obgleich der absolute Wassergehalt derselben zu dieser Zeit am geringsten ist.

Wird die Luft noch unter die Temperatur erkaltet, für welche sie mit Wasserdampf gesättigt ist, also noch unterhalb ihres Thaupunktes, so muß ein Theil ihres Wasserdampfes als Wasser ausgeschieden werden. Bringt man an einem heißen Sommertage eine mit Wasser gefüllte Flasche, welche in einem kalten Keller gestanden hat, ins Freie, so wird sie sich ringsum mit feinen Wassertröpfchen überziehen, sie wird sich beschlagen. Die mit der Flasche zunächst in Berührung kommenden Luftschichten werden so weit erkaltet, daß

sie einen Theil ihres Wassergehalts in Thauform an den kalten Körper abgeben müssen. So entsteht der Thau auf einer Wiese, wenn in einer heitern windstillen Nacht das Gras durch Strahlung gegen den Himmelraum erkalte und seine niedrige Temperatur auch den untern mit Wasserdampf beladenen Luftschichten mittheilt. Reif entsteht, wenn die Temperatur des Körpers, an welchen sich der condensirte Wasserdampf ansetzt, unter den Gefrierpunkt erkalte ist.

Wenn die Verdichtung der Wasserdämpfe nicht durch Verührung mit kalten Körpern, sondern durch die ganze Masse der Luft hindurch vor sich geht, so entstehen Nebel. Frei in der Luft schwebende Nebel werden Wollen genannt. Unter den unendlich mannichfaltigen Gestalten der Wollen hat man folgende Hauptformen unterschieden:

1) Die Fiedervolke, cirrus, besteht aus zarten loden- oder federartigen Fasern. In Fig. 9, Taf. 15, welche die wichtigsten Wollenformen darstellt, sieht man die Fiedervollen in der Ede oben rechts, bis herunter wo die zwei Vögel schweben.

2) Die Haufenwolke, cumulus, welche in unserer Figur gerade unter der Fiedervolke gezeichnet ist, bildet große halbkugelförmige Massen, welche auf horizontaler Basis zu ruhen scheinen. Diese Wollen zeigen sich vorzugsweise im Sommer; manchmal thürmen sie sich zu malerischen Gruppen auf und bieten dann von der Sonne beschienen den Anblick ferner Schneegebirge.

3) Die Schichtwolken, stratus, sind horizontale Wollenschichten, in unserer Figur unter dem cumulus, welche vorzugsweise bei Sonnenuntergang mit großer Farbenpracht erscheinen.

Diese Grundformen geben auf mannichfaltige Weise ineinander über; solche Uebergangsformen werden als cirro-cumulus, cirro-stratus und cumulo-stratus bezeichnet. Wenn die Haufenwolken dichter werden, so gehen sie in die streifigen Haufenwolken über, welche oft den ganzen Horizont mit einem blauschwarzen Farbenton überziehen und endlich in die eigentliche Regenwolke, nimbus (in Fig. 9 links), übergehen.

Wenn durch fortwährende Condensation von Wasserdämpfen die einzelnen Nebelbläschen größer und schwerer werden, wenn endlich einzelne Bläschen sich nähern und zusammenfließen, so bilden sie Wassertropfen, welche nun als Regen herabfallen.

Die Instrumente, welche dazu dienen, die Regenmenge zu messen, werden Ombrometer, Regenmesser genannt. Taf. 16, Fig. 24 stellt einen Regenmesser der einfachsten Art dar. Der Regen fällt in das Blechgefäß, dessen obere freie Oeffnung einen Flächeninhalt von 500 Quadratcentimetern hat. Aus diesem fällt das Wasser durch eine Oeffnung von 1 Centimeter Durchmesser in ein Reservoir, aus welchem es jeden Tag um 2 Uhr nachmittags durch einen Hahn abgelassen und in dem graduirten Glascyllinder, Fig. 25, aufgefangen wird. Die Theilung des Glascyllinders ist so eingerichtet, daß man an derselben ablesen kann, wie hoch mittels der im Laufe der letzten 24 Stunden gefallenen Regenmenge eine Fläche von 500 Quadratcentimetern bedeckt worden wäre. In diesem Sinne beträgt die jährliche Regenmenge zu

Lissabon	25	pariser Zoll.
Dover	44	" "
London	23	" "
Paris	21	" "
Nürnberg	21	" "
Berg	83	" "
Petersburg	17	" "
Rom	29	" "

In England, auf den Westküsten von Irland in den Niederlanden und in Norwegen herrscht Herbstregen, in Deutschland, den westrheiniischen Ländern, Dänemark und Schweden, herrschen die Sommerregen vor. Die Sommerregen fehlen fast in südöstlichen Frankreich, Italien, dem südlichen Spanien und Portugal u. s. w.

Die Anzahl der Regentage nimmt im Allgemeinen von Süden nach Norden zu. Im Durchschnitt kommen auf das Jahr

im südlichen Europa	120	Regentage
„ mittlern „	146	„
„ nördlichen „	180	„

Wenn im nördlichen Europa die Zahl der Regentage zunimmt, so nimmt dagegen die Intensität des Regens ab.

In den Tropen ist die Regenmenge im Allgemeinen sehr bedeutend. Sie beträgt zu

Bombay	74	Zoll
Rio de Janeiro	69	„
Kandi	69	„
San Domingo	146	„
Sierra-Leona	81	„
Havana	180	„

In denjenigen Ländern, welche in der Tropenzone liegen, treten periodische Regen auf. In trockenen Jahreszeit, während die Sonne auf dem nördlichen Hemisphäre steht, ist der Himmel meist klar und es regnet selten; die Regenzeit tritt ein, wenn sich die Sonne dem Zenith nähert. In der Tropenzone regnet es von 9 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags, des Nachts aber ist der Himmel heiter. Zu Anfang und gegen Ende der Regenzeit wird die Zeit des Tags, in welcher es regnet, kürzer. Diese Regenschauer sind meist von Gewittern begleitet.

An der steilen Westküste von Vorderindien fällt die Regenzeit mit der Zeit unser Sommer zusammen, während auf der Ostküste (Koromandel) die Regenzeit mit unserm Winter zusammenfällt.

In der Region der Calmen finden fast täglich heftigen Regengüsse statt. Die Sonne geht fast nie bei heiterm Himmel auf, gegen Mittag überziehen einzelne Wollen, welche immer dichter werden, endlich unter heftigen Windstößen und donnerartigen Entladungen eine ungeheure Regenmenge auf den Gegen Abend zerstreut sich das Gewölk, und die Sonne geht meist bei heiterm Himmel unter.

Die Karte Taf. 14, Fig. 3 soll dazu dienen, ein Bild von der Vertheilung des Regens auf der Erdoberfläche zu geben, und zwar ist die Schattirung so dunkler, je größer die Regenmenge des Jahres in dem Orte ist.

Bei niedriger Temperatur geht der Regen in Schnee über. Wenn bei ruhiger Luft spärliche Schneefälle fallen, so zeigen dieselben überraschend regelmäßig Kristallformen. Fig. 9—12 auf Taf. 14 zeigen die häufigsten Formen der Schneekristalle, aus denen man ersehen kann, daß sie sich im wesentlichen aus sechsseitigen Stern zurückführen lassen, wonach die Schneekristalle dem hexagonalen Krystallsystem (dem System des Bergkrystalls) angehören.

Die Graupelförner sind gewissermaßen als Schneebällchen, sie bestehen aus zusammengehängten Eiskugeln.

Die Hagelförner sind meist weit größer als Graupelförner. Sie bestehen aus durchsichtigen, abstrahlig gebildetem Eise, in dessen Mitte sich ein durchsichtiger Graupelförner befindet. Die Bildung der Hagelförner ist wahrscheinlich dadurch zu erklären, daß Graupelförner durch eine sehr hohe und dichte Schicht

urchfallen, deren Bläschen dampf, ohne seinen flüssigen and zu verlieren, weit unter 0° erkaltet ist. Wird die Erstarrung durch die Graupelförner eingeleitet, so erfolgt sie so massenhaft, daß sich die Graupeln mit einer dicken Eisschicht überziehen.

Die atmosphärischen Lichterscheinungen.

o durchsichtig die Luft auch im Vergleich zu allen a und flüssigen Stoffen sein mag, so ist sie doch stets vollkommen durchsichtig, was schon daraus orgeht, daß alle fernern Gegenstände, namentlich entfernte Gebirge mit einem zarten blauen Schleier zogen scheinen (Luftperspective). Um die Größe Lichtabsorption in der Atmosphäre zu messen, hat assure eine Vorrichtung construiert, welche er Dia- nometer nannte. Es besteht aus zwei weissen eiben a und b (Fig. 14, Taf. 16), deren größere uß im Durchmesser hat, während der Durchmesser kleinern zwölfmal kleiner ist. In der Mitte der n ist ein schwarzer Kreis von 2 Fuß Durchmesser, der letzten ist ein schwarzer Kreis von zwölfmal erm Durchmesser aufgesetzt. Beide Scheiben werden nebeneinander aufgestellt. Man wird sich nun auf trede e entfernen müssen, damit der kleine schwarze s auf der Scheibe b aufhört sichtbar zu sein; da- aber der größere schwarze Kreis auf der Scheibe erschwimmt, muß man sich um eine weit größere ede E entfernen. Wäre die Luft vollkommen durch- ig, so müßte offenbar $E = 12 e$ sein. In der t aber findet man, daß $E < 12 e$, und zwar um kleiner als die Luft weniger durchsichtig ist. Bei m in der Nähe von Zürich angestellten Versuch o man $E = 10,3 e$. In der Nähe des Monte- a, bei einer Höhe von 12000 Fuß über dem Meere, o man $E = 11,9 e$. In der Höhe ist also die t weit durchsichtiger als in der Tiefe. Uebrigens ert sich die Durchsichtigkeit der Luft an einem und elben Orte von einem Tag zum andern, wie schon t dem veränderten Ansehen der Landschaft hervor- t.

Die unvollkommene Durchsichtigkeit der Luft hat in ihren Grund, daß die Lufttheilchen selbst, sowie in der Luft schwebenden Nebelbläschen, Staub- lichen u. s. w. das sie treffende Licht zum Theil ecutiren. Von dieser Reflexion rührt aber auch die gemeine Tageshelle her, vermöge deren bei Tage b noch im Schatten eine bedeutende Helligkeit rscht. Bei unbewöltem Himmel erscheint uns der nnel hellblau, weil alle Theilchen der Luft Licht o zwar vorzugsweise blaues Licht reflectiren. Wäre Luft vollkommen durchsichtig, so könnte sie kein t reflectiren, im Schatten müßte absolute Dunkel- t herrschen und das Himmelsgewölbe könnte uns t blau, es müßte uns vollkommen schwarz er- en.

Damit hängt auch die Dämmerung zusammen. ch dem Untergang der Sonne bleibt es noch eine t lang ziemlich hell, weil wir noch reflectirtes Licht n westlichen Himmel empfangen.

Ein Lichtstrahl erleidet somit beim Uebergang aus em luftleeren in einen luftfüllten, als auch beim ergang aus einem Raum, der mit verdünnterer t gefüllt ist, in einen solchen, welcher verdichtete t enthält, eine Ablenkung in der Art, daß er dem allsichtbar genähert wird. Daraus folgt nun auch, ß das Licht der Sterne nicht in gerader Linie zu s kommen kann, da es die gegen die Erdoberfläche t immer dichter werdende Atmosphäre durchlaufen

muß. Aus dem luftleeren Weltraum in die oberste äußerst verdünnte Luftschicht eindringend, wird der vom Stern s, (Fig. 15, Taf. 16, kommende Lichtstrahl st etwas von seiner Richtung abgelenkt, und zwar so, daß er den Verticalen etwas genähert wird. In jeder folgenden tiefern und deshalb dichtern Luftschicht wird er in diesem Sinne noch weiter abgelenkt, so- daß er den Weg s t e d c b a beschreibt. Ein in a be- findliches Auge erblickt also den Stern in der Richtung a b s', der Stern erscheint also durch die atmosphärische Refraction gehoben. Die scheinbare Hebung des Sterns durch die atmosphärische Refraction ist natürlich um so größer, je größer die Zenitdistanz des Sterns ist, sie beträgt $43,9''$ für eine Zenitdistanz von 40° , und $5' 19''$ für eine Zenitdistanz von 80° u. s. w.

Es kommt häufig vor, daß die Temperatur der untern Luftschichten vom Boden aus nach oben bis zu einer gewissen Höhe hin wächst und daß dann erst bei fortwährendem Steigen ein Sinken der Temperatur eintritt. In solchen Fällen muß natürlich die Dichtig- keit der Luft vom Boden aus nach oben sehr rasch abnehmen, wodurch dann eine merkliche Refraction schon in den untern Luftschichten bedingt ist. Es sei z. B. a (Fig. 16, Taf. 16, ein Ort, welcher sich in geringer Höhe über einer Ebene oder über dem Spiegel eines größeren Gewässers befindet, t ein etwas tiefer liegender Ort, so wird, wenn die Dichtigkeit der Luft von der Ebene aus nach oben sehr rasch ab- nimmt, ein Lichtstrahl von t aus nicht in gerader Linie nach a gelangen können, sondern die von t nach a gelangenden Strahlen müssen den Weg der in der Figur verzeichneten krummen Linie t c a zurücklegen, von a aus wird man also den Thurm t nach der Richtung a t' hin sehen, er scheint uns also höher zu liegen, als es in der That der Fall ist.

Solche durch ungewöhnliche atmosphärische Refraction verursachte Hebungen werden mit dem Namen der Kimmung bezeichnet. Wenn man von Ramsgate aus mit dem Fernrobre nach Dover hinschaut, so er- blickt man bei schönem Wetter die Spitzen der vier höchsten Thürme des Schlosses; der Rest des Gebäudes ist hinter einem Gergräben verborgen. Manchmal aber wird durch die Kimmung das ganze Schloß bis zum Boden sichtbar. Von Konstanz aus sieht man öfters mit einem kleinen Handfernrohr Schiffe, welche so weit entfernt sind, daß sie unter gewöhnlichen Um- ständen in oder noch hinter dem normalen Wasser- horizonte erscheinen würden, durch Kimmung so ge- hoben, wie es Fig. 17, Taf. 16, darstellt, sodaß nicht allein das ganze Schiff, sondern auch noch sein Spiegel- bild im Wasser sichtbar wird.

In diese Kategorie gehört auch die Erscheinung der Fata-Morgana, welche man oft an den Küsten Ca- labriens und Siciliens wahrnimmt. Die durch Kim- mung gehobenen Gegenstände erscheinen oft nicht allein verzerrt, sondern auch in steter Bewegung, was ohne Zweifel daher rührt, daß die Dichtigkeit der Luft- schichten unregelmäßig vertheilt und einem steten Wechsel unterworfen ist.

Während die Kimmung dadurch hervorgerufen wird, daß die Dichtigkeit der Luft von unten nach oben außergewöhnlich rasch abnimmt, beruht die unter dem Namen der Luftpiegelung bekannte Erscheinung darauf, daß die auf dem Boden unmittelbar auf- liegenden Luftschichten bedeutend heißer und weniger dicht sind als die höhern. Bei starker Sonnenhitze und ruhiger Luft ist es nämlich möglich, daß die untern vom heißen Boden erbigten Luftschichten trotz ihres geringern specifischen Gewichts nicht in die Höhe steigen, sondern ruhig auf dem Boden ausge-

breitet bleiben. Es sei nun ab Fig. 18, Taf. 16, der horizontale Boden, h irgendein erhabener Punkt, so ist klar, daß das Auge bei p zunächst ein directes Bild von h in der Richtung ph sieht. Unter den Strahlen, welche h ausendet, sind aber auch solche, welche den Weg hilmnp verfolgen und also in der Richtung zp ins Auge gelangend, ein verkehrtes Bild des Gegenstandes geben. In der That wird der Strahl hi, wenn er auf eine tiefere, weniger dichte Luftschicht trifft, so gebrochen, daß er sich von dem verticalen Einfallslothe entfernt; ebenso wird er sich wieder vom Einfallslothe entfernen, wenn er auf die nächsttiefere, abermals weniger dichte Luftschicht trifft u. s. w. So wird denn die Richtung der Strahlen immer schräger, bis sie endlich fast horizontal in die nächst tiefere und dünnere Schicht nicht mehr eintreten können, sondern eine totale Reflexion erfahren; um endlich in der Richtung np ins Auge zu gelangen.

Die Erscheinung der Luftspiegelung wird in Aegypten und Aethiopien häufig beobachtet, wenn der ebene Boden der weiten Thäler durch die glühenden Sonnenstrahlen erhitzt ist. Da der Beobachter außer dem directen auch noch ein Spiegelbild aller erhöhten Gegenstände, der Dörfer, Bäume u. s. w. sieht, so hat er den Eindruck, als ob hier ein See vorhanden wäre. Für die Soldaten der französischen Expedition nach Aegypten war dies eine furchtbare Täuschung, wenn sie durch forcierte Märsche und die Sonnenhitze ermüdet, einen See zu sehen glaubten, dessen Ufer bei ihrer Annäherung immer wieder zurückwichen.

Eine der bekanntesten atmosphärischen Lichterscheinungen ist der Regenbogen, welcher bekanntlich beobachtet wird, wenn man eine regnende Wolke vor sich und die Sonne hinter sich hat. Bei vollem Sonnenschein und hinlänglich starkem Regen sieht man zwei concentrische Regenbogen, einen lichtstärkern innern und einen lichtschwächern äußern. Der Regenbogen ist ein kreisförmiges Farbenband, in welchem die prismatischen Farben in radialer Richtung aufeinanderfolgen, und zwar liegt beim innern Regenbogen das Roth nach außen, beim äußern dagegen liegt das Roth nach innen.

Für den innern Regenbogen beträgt der Radius des rothen Ringes $42^{\circ} 30'$, der des violetten aber nur $40^{\circ} 30'$, die Breite des innern Regenbogens ist demnach ungefähr 2 Grad. Für den äußern Regenbogen beträgt der Radius des rothen Ringes 50° , der des violetten $53\frac{1}{2}^{\circ}$, die Breite des äußern Regenbogens ist demnach ungefähr $3\frac{1}{2}^{\circ}$. Der Zwischenraum zwischen den beiden Regenbogen beträgt ungefähr $7\frac{1}{2}^{\circ}$.

Der innere Regenbogen wird durch Sonnenstrahlen gebildet, welche den Tropfen nach einmaliger innerer Spiegelung verlassen, wie man Taf. 15, Fig. 10 sieht, während der äußere Regenbogen seine Entstehung solchen Strahlen verdankt, welche, wie dieselbe Figur zeigt, den Tropfen nach zweimaliger innerer Spiegelung verlassen.

Die Gesamtheit der Sonnenstrahlen, welche als ein paralleles Bündel auf einen Regentropfen fällt, wird nach einmaliger innerer Spiegelung den Tropfen als ein divergirendes Strahlenbündel verlassen, weshalb schon in geringer Entfernung vom Tropfen der Lichteindruck der vom Tropfen kommenden Strahlen ein verschwindend kleiner sein wird. Nur solche Strahlen können einen merklichen Eindruck hervorbringen, für welche die Divergenz ein Minimum ist, welche also nahezu parallel austreten, und das sind diejenigen Strahlen, welche unter allen austretenden mit den

einfallenden Strahlen den kleinsten Winkel machen. Dieses Minimum der Ablenkung SVO, Fig. 10, beträgt für rothe Strahlen $42^{\circ} 30'$. Da nun aber den OP mit SV parallel ist VOP = SVO, so muß uns der rothe Ring des innern Regenbogens unter einem Winkel von $42^{\circ} 30'$ erscheinen. Eine ähnliche Betrachtung zeigt auch, warum uns der rothe Ring des äußern Regenbogens unter einem Winkel von 50° erscheint u. s. w.

Wenn der sonst heitere Himmel mit einem leichten Schleier überzogen ist, so sieht man manchmal die Sonne, häufiger aber den Mond mit einem kreisförmigen Ringe von ungefähr 23° Radius umgeben, ungefähr wie es Fig. 19, Taf. 16, darstellt. Der Ring um den Mond erscheint ganz weiß, der um die Sonne schwach gefärbt, und zwar das Roth nach innen. Dieser Ring wird durch die Brechung der Sonnenstrahlen in Eisknadeln erklärt, welche in der Luft schweben. Diese Eisknadeln sind kleine sechsseitige Säulchen, an welchen immer je zwei nicht parallele und nicht zusammenstoßende Seitenflächen einen Winkel von 60° miteinander machen, die also gewissermaßen dreiseitige gleichseitige Prismen bilden, für welche das Minimum der Ablenkung ungefähr 23° beträgt. Solche Strahlen aber, welche in den Eisknadeln das Minimum der Ablenkung erfahren haben, sind den wirksamen Strahlen des Regenbogens analog.

Oft erscheint der erwähnte Lichtring von einem horizontalen leichten Streifen durchschnitten, welcher in gleicher Höhe mit der Sonne sich öfters bis zu dieser hin erstreckt. Dieser Streifen ist da am besten, wo er den Ring durchschneidet. Diese hellen Stellen, welche man zu beiden Seiten der Sonne, am Umfang des Ringes erblickt, sind die Nebensonnen. Die horizontalen Nebensonnenstreifen erklärt man durch die Reflexion der Sonnenstrahlen an den verticalen Flächen der Eisknadeln. Bisweilen erscheint im Gipfel des leichten Ringes noch ein heller Berührungsbogen, wie dies gleichfalls in Fig. 19 dargestellt ist.

Außer dem eben besprochenen Ringe von 23° Halbmesser erscheint die Sonne manchmal auch, wenn auch weit seltener, von einem Lichtringe umgeben, dessen Halbmesser 46° beträgt und welcher durch Lichtstrahlen erklärt wird, die in einem Eiszprisma das Minimum der Ablenkung erfahren haben, dessen brechender Winkel 90° beträgt, also durch Eiszprismen, deren eine brechende Fläche die gerade Endfläche, deren andere aber eine Säulenfläche ist.

Ganz andern Ursprungs als diese Lichtringe sind die Hufe, welche aus mehreren farbigen Ringen bestehen, welche unmittelbar um die Sonne oder den Mond wie eine Glorie herumliegen. Sie sind gleich dem Hufe, welchen man erblickt, wenn man durch eine mit semen lycopodii dünn bestreute Glasplatte nach einer Kerzenflamme schaut, ein Beugungsphänomen. Am prächtigsten erscheinen die Farben dieser Ringe, wenn sie nicht den Mond oder die Sonne selbst, sondern wenn sie den Schatten umgeben, welchen der Kopf des Beobachters, der die Sonne im Rücken hat, auf eine vor ihm befindliche Nebelwand wirft, wie man dies in gebirgigen Gegenden öfters zu beobachten Gelegenheit hat. Taf. 16, Fig. 20 ist diese Erscheinung dargestellt. Der oft riesenhafte erscheinende Schatten des Beobachters wird als Nebelbild, öfters auch als Brodengespenn bezeichnet. Jeder Beobachter kann nur seinen eigenen mit der Glorie umgebenen Schatten, nicht den anderer sehen. Daß uns dieser Schatten, welcher nicht größer sein kann als der Beobachter selbst, riesenhafte erscheint, ist nur eine optische Täuschung.

Die elektrischen Erscheinungen der Atmosphäre.

Der erste elektrische Funke, welcher beobachtet wurde, und auch alsbald mit dem Blitz verglichen und benannte die Ansicht, daß der Blitz ein elektrisches Anomen sei; diese Ansicht ward noch bekräftigt, als in mit Füllender Leydener Flasche kräftige Funken erzeugen konnte.

Nachdem Franklin die elektrische Wirkung der Funken kennen gelernt hatte, sprach er sich dahin aus, daß man versuchen müsse, mit Hülfe metallischer Spitzen die Electricität der Gewitterwolken gleichsam herabzuholen. Diese Idee wurde, ehe Franklin selbst derartige Versuche anstellte, von Dalibard in der Nähe von Paris ausgeführt (1752). Er ließ eine Hütte bauen, auf welcher eine 40 Fuß hohe Eisenstange aufgesetzt wurde, deren unteres isolirtes Ende in die Hütte hineinragte. Als eine Gewitterwolke über der Hütte zuzog, ließen sich aus dem isolirten Ende Funken ziehen und eine elektrische Batterie laden.

Den gleichen Erfolg erhielt Franklin mittels eines in einer metallenen Spitze versehenen Drachens, nachdem die Schnur durch Regen feucht und dadurch leitend gemacht worden war. De Romas erzielte am unteren Ende der Drachenschnur 10 Fuß lange Funken, nachdem er auf den glücklichen Gedanken gekommen war, an seinen Metalldraht ihrer ganzen Länge nach eine Schnur einzulegen.

Mit Hülfe eines Sammelapparates von der Art, wie ihn Dalibard construirt hatte, kann man nun nachweisen, daß die Gewitterwolken bald mit positiver, bald mit negativer Electricität geladen sind. Eine elektrische Wolke wirkt aber vertheilend nicht nur auf nachbarte Wolken, sondern auch auf die Erdoberfläche, und häuft namentlich in allen in die Höhe ragenden Gegenständen die ihr entgegengesetzte Electricität an. Hat diese Anhäufung eine gewisse Grenze erreicht, erfolgt eine Entladung in Form eines Blitzes, welcher entweder von der Wolke zu einem Gegenstand auf der Erdoberfläche, oder von einer Wolke zu einer nachbarten überschlägt.

Um das Einschlagen des Blitzes zu verhindern, contruirte Franklin den Blitzableiter. Das zu häuende Gebäude wird mit einer dasselbe überragenden metallenen Spitze versehen, von welcher aus eine rechte eiserne Leitung bis in den feuchten Boden hinabgeht. Mit dieser Leitung müssen alle bedeutenden Metallmassen des Gebäudes, namentlich auch die Wasserleitungen, in leitende Verbindung gesetzt werden. Wenn eine elektrische Wolke über dem Blitzableiter schwebt, wird die gleichnamige abgestoßene Electricität durch die metallische Leitung in den Boden entweichen, während die von der Wolke angezogene, ihr entgegengesetzte Electricität der Spitze zuwandert, um hier vollständig auszufließen, wodurch eine Anhäufung der Electricität im Hause, und also auch ein Ueberschlagen des Blitzes verhindert wird. Sollte aber dennoch ein Einschlagen des Blitzes eintreten, so folgt er der Leitung bis in den Boden, ohne daß das Gebäude beschädigt wird.

Damit der Blitzableiter seinen Zweck gehörig erfülle, muß die Aufhängelänge oben gehörig zugespitzt sein, vor allen Dingen aber darf die Leitung von der Spitze bis in den Boden nirgends unterbrochen sein, denn an einer solchen Unterbrechungsstelle könnten elektrische Schläge erfolgen, selbst wenn kein Blitz von oben die Aufhängelänge trifft. Ein Blitzableiter mit unter-

brochener Leitung ist für ein Haus gefährlicher als der gänzliche Mangel eines Blitzableiters.

Taf. 16, Fig. 26 ist die Spitze eines Blitzableiters dargestellt, wie dieselben in Frankreich ausgeführt werden. Auf eine eiserne Stange ist zunächst ein messingener Konus aufgesetzt, in dessen oberem Ende eine Platinspitze eingeschraubt ist. In Deutschland wird die eiserne Spitze des Blitzableiters verguldet, um das Kosten derselben zu verhüten.

Der Blitzschlag bringt in großem Maßstabe dieselben Wirkungen hervor, welche man beim Entladungsschlag der Leydener Flasche im kleinen beobachtet. Er schmelzt Metalle, zerstückt schlechtleitende Körper, entzündet brennbare und tödtet die getroffenen Thiere. Dem Knall, welcher den Entladungsschlag der Leydener Flasche begleitet, entspricht der Donner, dessen Rollen nur daher rührt, daß bei der meist bedeutenden Länge des Blitzes die einzelnen Partien desselben in verschiedener Entfernung vom Beobachter liegen, der Schall also ungleiche Zeit braucht, um sein Ohr zu erreichen.

Zu den interessantesten Wirkungen des Blitzschlags gehören die Blitzröhren, welche bei einem äußern Durchmesser von 2—5 Centimeter oft eine Länge von 8—10 Meter haben. Ihre innere Fläche ist vollkommen verglast, die äußere bildet eine mit zusammengebackenen Sandkörnern bedeckte Kruste. Sie entstehen, wenn der Blitz durch eine Sandschicht hindurchschlägt, unter welcher sich in einiger Tiefe unter der Oberfläche eine stagnierende Wasserschicht befindet. Taf. 16, Fig. 27 stellt ein Stück einer solchen Blitzröhre in natürlicher Größe dar.

Elektrische Ladungen zeigen sich aber nicht nur, wenn Gewitterwolken am Himmel sind, sondern selbst, wenn auch schwach, bei heiterm Himmel. Um diese Luftelectricität nachzuweisen, wandte Volta das Taf. 16, Fig. 28 erläuterte Verfahren an. In der einen Hand hielt er einen isolirenden Stab, welcher oben mit einer Metallspitze versehen war, von welcher ein dünner Metalldraht zu der innern Belegung einer kleinen Leydener Flasche herabführte, deren äußere Belegung der Beobachter in der andern Hand hält. Wird der isolirende Stab nur kurze Zeit in die Höhe gehalten, wie die Figur zeigt, so nimmt die Flasche eine elektrische Ladung an, welche man leicht mittels eines Elektrometers prüfen kann. Mittels des eben beschriebenen Apparates hat man nachgewiesen, daß bei heiterm unbewölktem Himmel die Luftelectricität stets positiv ist. Sehr stark wird die Luftelectricität bei Nebeln.

Die magnetischen Erscheinungen der Erdoberfläche sind zum größten Theil schon im Text zur physikalischen Abtheilung des „Wilder-Atlas“ besprochen worden, weil die Lehre vom Magnetismus ohne Berücksichtigung des Erdmagnetismus gar nicht entwickelt werden kann. Es bleibt deshalb hier nur noch die Besprechung des mit dem Erdmagnetismus in innigster Beziehung stehenden Nordlichts übrig.

Taf. 15, Fig. 12 stellt ein Nordlicht dar, wie es bei uns gewöhnlich beobachtet wird, wenn es seine volle Ausbildung erreicht. Es erscheint dann als ein lichter, verwischener Bogen, aus welchem grünlich oder röthlich leuchtende Strahlen in die Höhe schießen, welche meist mit einer von West nach Ost gerichteten Bewegung behaftet sind. Der Gipfel des Lichtbogens steht immer nahezu in der Richtung des magnetischen Meridians.

In höhern Breiten steigen die Nordlichter schon hoch über den Horizont heraus, ja sie erreichen das Zenith und gehen selbst über dasselbe hinaus und

bilden dann die sogenannte Krone. Im hohen Norden erscheint das Nordlicht oft als ein langes Strahlenband (Fig. 11.), welches sich windet und biegt, wie eine vom Winde bewegte Fahne. — Ähnliche Erscheinungen sind von den Seefahrern in den Polar-gegenden der südlichen Hemisphären beobachtet worden; man kann sie Südlichter nennen und das Phänomen der beiden Hemisphären unter dem Namen des Polarlichts zusammenfassen.

Der Umstand, daß die Polarlichter stets in der

Richtung des magnetischen Meridians ge-
und daß ihr Erscheinen von einem starken Schwin-
der Declinationsnadel begleitet ist, beweist, daß
dem Erdmagnetismus in Beziehung stehen, welche
Humboldt als magnetische Gewitter be-
net hat.

Die Polarlichter rühren offenbar von einer
Nähe der magnetischen Pole durch die hohen
dünnen Luftregionen hindurch stattfindenden elek-
Ausströmung her.

Anatomie.

Bearbeitet

von

Bernhard Hermann Oßf,

Doctor der Medicin.

Inhalt.

	Seite	
Einleitung	3	7. Hautsystem.
Geschichtliche Skizze der Entwicklung der Anatomie	6	8. Drüsenystem.
Bestandtheile des menschlichen Körpers	7	Specielle Anatomie.
Die Zelle	7	Knochenlehre (Tafel 1 bis 4)
Gewebe	8	Bänder (Tafel 5).
1. Bindegewebsarten	9	Topographische Anatomie.
2. Hornewebe	11	Kopf und Hals (Tafel 6)
3. Knorpelgewebe	12	Rumpf (Tafel 7)
4. Muskelgewebe	15	Thorax (Tafel 8 und 9).
5. Gefäßsystem	17	Unterleib (Tafel 10 bis 12)
6. Nervensystem	19	Obere Extremitäten (Tafel 13)
		Untere Extremitäten (Tafel 14 und 15)

Einleitung.

Anatomie (Anatomia) im weitesten Sinne des Wortes ist diejenige Wissenschaft, welche uns mit der Beschaffenheit und anderer technischer Mittel einzelnen Theile eines Organismus kennen lehrt. Der Name ist von dem griechischen Worte *anatomein* entlehnt, welches zerschneiden bedeutet.

Nach der Art des Organismus, ob Pflanze oder Thier, zerfällt die Anatomie in eine Pflanzen- und Thieranatomie (Phyto- und Zoologia). Besonderer ist wiederum die Anatomie des Menschen (Anthropologia) ein besonderer Theil, und versteht man unter dem Namen „Anatomie“ schlechthin nur die

Während der Wortlaut nur eins der vielen Mittel ausdrückt, deren sich diese Wissenschaft zur Erreichung ihrer Zwecke bedient, betrachtet die Anatomie die Form und den Bau des menschlichen Körpers und seiner einzelnen Theile nicht nur in deren plastischer Gestaltung, sondern, indem sie auch deren Functionen im Auge faßt, forscht sie zugleich nach den Zwecken, welche die Beziehungen der einzelnen Organe zu einander und zum Ganzen zu ergründen, ebenso wie das Entstehen und Werden des Organismus mit Aufmerksamkeit verfolgt. Somit hat die Anatomie es nicht nur mit der todtten Materie, sondern auch mit dem lebendig bewegten Körper, nicht nur mit räumlichen, sondern auch mit zeitlichen Verhältnissen zu thun, und ist dadurch eine Verbänderte der Physiologie, der Entwicklungs- und der Krankheitsgeschichte.

Außer der groben Vergliederung des Körpers durch die Sinne verfolgt die Anatomie noch andere Wege, wobei ihr eine große Menge technischer Mittel zu Gebote stehen, sobald selbst die dem bloßen Auge nicht mehr wahrnehmbaren Theile zur Anschauung gelangen, ja schließlich macht sie sich selbst chemie dienstbar und forscht nicht nur nach den Ursachen, sondern auch nach den Mischungselementen. Man kann also, in Ansehung der Mittel, deren sich die Anatomie in der Vergliederung bedient, schlechtweg, welche es mit den größeren, auch dem freien Auge sichtbaren Theilen zu thun hat, in die makroskopische Anatomie, welche die dem unassneten Auge nicht mehr wahrnehmbaren Formbestandtheile des Körpers beschäftigt, und die Anatomic, oder die allgemeineren Auffassung, in die Zochemie, welche die Mischungselemente des menschlichen Organismus und deren Verbindungen zu ergründen hat, einteilen.

Beim wir den Zustand, in dem sich der Körper befindet, ins Auge fassen, und sehen ob er gesund oder krank ist, so werden je nachdem auch die Organe und die Elemente, wenn auch nicht immer sichtbar, Modificationen an sich tragen, denen nachzuforschen gleichfalls Aufgabe der Anatomie ist. Hat die Anatomie mit dem Körper im gefunden Zustande zu thun, heißt sie normale oder wol auch physiologische Anatomie. Betrachtet sie jedoch die durch Krankheiten hervorgebrachten Veränderungen, so wird sie

pathologische Anatomie genannt und steht als solche in denselben Verhältnisse zur Pathologie, der Krankheitslehre, wie die normale Anatomie zur Physiologie. Wie „Anatomie“ schlechthin nur die Anatomie des Menschen bedeutet, so versteht man unter ihr ohne jeden weiteren Zusatz auch nur die normale Anatomie des Menschen.

Je nach der Art und Weise nun, wie sich die normale Anatomie mit dem menschlichen Körper beschäftigt, unterscheidet man verschiedene Arten derselben. Geht sie darauf aus, die durch das Auge unmittelbar wahrnehmbaren Eigenschaften des Körpers und seiner Theile zu erforschen, die Form und Lage derselben und deren Verhältnisse zueinander festzustellen, und behandelt sie dabei die Organe in ihrer Zusammengehörigkeit nach Bildung und Function, indem sie Gleichartiges zu einem System vereinigt, während sie ungleichartige Apparate, sobald sie einem gemeinschaftlichen Zwecke dienen, als Ganzes zusammenfaßt, so nennt man sie beschreibende, specielle oder systematische Anatomie (Anatomia descriptiva, specialis oder systematica), alles Namen, welche den Gehalt dieses Zweigs nicht vollständig auszudrücken vermögen.

Die specielle Anatomie nun, welche Bezeichnung wir als die passendste festhalten wollen, zerfällt wieder in besondere Unterabtheilungen, je nach den Systemen und Apparaten, welche sie zur Darstellung bringt, sobald wir für erstere eine Knochen-, Bänder-, Muskeln-, Gefäß- und Nervenlehre haben, während die letztern unter den Eingeweiden und Sinneswerkzeugen abgehandelt werden.

Geht die Anatomie dagegen generalisirend zu Werke, indem sie die einzelnen Systeme und Apparate unter allgemeine Gesichtspunkte stellt, wobei sie namentlich den feineren Bau der Organe ins Auge faßt, die Formelemente aufsucht und sieht, wie dieselben zu Geweben sich vereinen und diese wiederum zu Systemen und Apparaten zusammensetzen, so heißt sie allgemeine Anatomie oder Gewebelehre, Histologie, vom Griechischen *ιστός* oder auch *ιστιον*, Gewebe. Da dieser Theil der Anatomie vorzugsweise mit dem Mikroskop arbeitet, wird er auch, freilich wenig bezeichnend für sein Wesen, mikroskopische Anatomie genannt. Als Gegensatz zur speciellen ist wol der passendste Ausdruck: „allgemeine Anatomie“, und nur aus praktischen Gründen, wegen der Kürze, kann man dem Worte Histologie den Vorzug geben und dasselbe allgemein anwenden.

Faßt die specielle Anatomie die einzelnen Theile des menschlichen Körpers nicht nach deren Gleichartigkeit oder nach dem Endzweck der Functionen als zu einem System gehörig zusammen, sondern behandelt sie das räumliche Nebeneinandersein derselben, wie sie die plastische Form des Menschen zusammensetzen, so wird sie topographische Anatomie genannt, ein Zweig, der besonders praktischen Werth hat und namentlich für den Arzt von Bedeutung ist, da er durch sie in erster Linie die Anhaltspunkte erhält, inwiefern ein kranker Körper von der Norm abweicht. Da hier vorzugsweise der Chirurg in Betracht kommt, so wird sie auch chirurgische Anatomie genannt, welcher Aus-

druck jedoch mit Rücksicht darauf, daß auch der Arzt für innere Krankheit ihrer keineswegs entbehren kann, besser in angewandte Anatomie umzuwandeln wäre.

Da nun die äußere Erscheinung des Körpers das Resultat der Gruppierung aller Theile, sowohl der innern wie der äußern ist, so leuchtet ein, daß eine genaue Kenntniß der äußern Gestalt des Menschenleibes auch zur Beurtheilung innerer Verhältnisse von hoher Bedeutung ist.

Betrachtet die Anatomie die Formen des Körpers von ihrer ästhetischen Seite, sucht sie dabei nach den der Schönheit der Gestalt bedingenden Ursachen, und gibt sie, dadurch dem schaffenden Künstler Anhaltspunkte zur lebenswahren Darstellung des menschlichen Leibes, so wird sie plastische Anatomie genannt.

Hat die Anatomie, wie wir sie bisher ins Auge gefaßt, den Menschen als Repräsentanten der ganzen Gattung, „insofern der gemeinsame Charakter aller ihm gleichartigen Individuen an ihm sich darstellt“, betrachtet, so kann sie ihn nun auch in seiner Individualisirung zu den einzelnen Völkern und deren Zweigen untersuchen, wodurch wir die Rassenanatomie erhalten. Weiter gehend in der Individualisirung kann sie dann ferner auch die einzelne Person sowie die Altersstufen des Menschen betrachten, doch sind diese Ableser zu beschränkt, um Stoff zu einer selbständigen Disciplin zu geben, und werden die selben deshalb am zweckmäßigsten an geeigneter Stelle in die specielle Anatomie eingegliedert.

Gehen wir noch einen Schritt weiter, lassen wir die Anatomie nicht nur den Menschen gleichsam monographisch behandeln, sondern denselben auch im Zusammenhang mit der übrigen organischen Schöpfung, speciell mit dem Thierreiche, betrachten; sehen wir, wie er sich von den übrigen Organismen unterscheidet und was alle miteinander verbindet, um dadurch gleichsam der der Schöpfung zu Grunde liegenden Idee nachzuspüren, so haben wir die vergleichende Anatomie, eine Wissenschaft, die zwar keine praktischen Zwecke verfolgt, aber dafür an sich einen höhern Werth durch die Beförderung der wissenschaftlichen Erkenntniß erhält.

Die Entwicklungsgeschichte oder Evolutionstheorie, um diese noch schließlich zu erwähnen, betrachtet, wie wir schon oben angebeutet haben, den Körper nicht wie er ist, sondern wie er geworden, sie forscht nach Ursprung und Entstehung und verfolgt das allmähliche Werden vom ersten Keime bis zur höchsten Vollendung. Das Verständniß des Ganzen und die morphologische Bedeutung der einzelnen Theile wird erst durch sie vollkommen klar, indem sie uns zeigt, wie die Wandlungen vor sich gehen und wie oft das anscheinend Verschiedene eine gleiche Abstammung hat, jedoch wir erst durch sie den morphischen Werth eines Organes richtig beurtheilen lernen.

Geschichtliche Skizze der Entwicklung der Anatomie.

Erste Periode.

Eine heilige Scheu hat von jeher den Menschen, sobald er eine gewisse Stufe der Civilisation erreicht, abgehalten, sich an den irdischen Ueberresten seines gleichen zu vergreifen, und wenn der Kannibalsmus, einst weit verbreitet, aber auch jetzt noch hier und da in Blüte stehend, von diesem Zuge der menschlichen

Natur keine Ahnung zu haben scheint, so ist dies dem Umstande zuzuschreiben, daß dieser durch stärkere Gewalt, den Hunger, unterdrückt wurde, als daß er selbst bei den rohesten Naturvölkern wenigstens im Keime vorhanden wäre, wenn auch das Thier keine Spur davon verräth.

Wie viele Wissenschaften, so verliert sich auch Anatomie in das Gebiet der Sage. So soll der koptische Gott Thoth bei den Aegyptern, der die Heilungssucht aller Krankheiten zugesprochen hat, sechs Bücher über die Heilkunde verfaßt haben, die die Anatomie, die Lehre von den Krankheiten, die Anwendung der Arzneimittel und auch die Krankheiten behandeln sollen. So werden auch in Indien und später Serapis als heilbringende Götter genannt.

Die anatomischen Thatfachen, welche durch die balsamirten Leiden sich ergaben, und welche zufällig entdeckt wurden, kann man umgekehrt wissenschaftlich hinstellen, da ihnen der innere Zusammenhang und eine planmäßige Entdeckung fehlt. „Erst als die Heilwissenschaft“, sagt Celsus, „sich mit der Anatomie verbunden und das Bedürfnis ihre äußere Belantheit nachsuchte, nahm sie den Charakter einer Wissenschaft an.“ Der Entwicklungsgang war, wie jener der Naturwissenschaften überhaupt, ein langsame und öfters unterbrochene. Die Schwierigkeiten, die sich ihrem Gedeihen entgegenstellten, schienen unüberwindlich zu sein und weniger im natürlichen Abfließen vor dem Auge der Wissenschaft — der Leide, als in der Gewohnheit der Aberglaubens und des Vorurtheils. Selbst die größten Vorstellungen des Alterthums sprachen Verdammungsurtheil über sie aus.

Daß unter diesen Verhältnissen die Anatomie geringe Fortschritte machte, leuchtet ein, zumal man auch die Schwierigkeiten, welche das Verstehen erfordert, mit in Betracht zieht. Aus dem Alterthum heissen, hat nicht viel historischen Werth, der ewig gültigen Wahrheit in demselben nur wenige aus Licht gefördert. Als der erste, der ein anatomisches Werk geschrieben soll, wird von Galen Alkmaeon, ein Schüler des Pythagoras, aus Kroton gebürtig und um 500 v. Chr. Geburt lebend, genannt, der in den bedeutendsten Gelehrten seines Jahrhunderts in der vorchristlichen Periode gerechnet wird. Den Kern seiner Lehre bildet die Annahme, daß das Gehirn der Sitz der Seele ist, und daß derselbe die Sinneswerkzeuge in Verbindung mit sich, welche die von außen aufgenommenen Eindrücke in besondere Gänge zu dem Gehirn leiteten.

Auch Anaxagoras aus Klazomenai, um 500 v. Chr., als „Vater der Medicin“ betrachtet, obgleich ihm verschiedene anatomische Schriften zugeschrieben wurden, die sich jedoch als unecht erweisen, hat sich vorzüglich mit der vergleichenden Anatomie beschäftigt, weshalb er auch von seinen Zeitgenossen für irrsinnig gehalten worden ist.

Wie bedeutend auch Hippokrates, 460 v. Chr., als „Vater der Medicin“ betrachtet, obgleich ihm verschiedene anatomische Schriften zugeschrieben wurden, die sich jedoch als unecht erweisen, hat sich vorzüglich mit der vergleichenden Anatomie beschäftigt, weshalb er auch von seinen Zeitgenossen für irrsinnig gehalten worden ist. Nur mit dem v. Chr. scheint er näher bekannt gewesen zu sein, auch von den Vätern einige, wenn auch nur

Gleichwie auf den übrigen Gebieten des Wissens nimmt auch in der Anatomie Aristoteles (384 bis 322 v. Chr.) für seine Zeit die erste Stelle ein. Durch Zergliederung von Thieren hat er sich hauptsächlich die anatomischen Kenntnisse erworben, die auch in unserer Zeit von den Fachmännern als bewundernswürdig anerkannt werden. Die einzelnen Organe, welche Aristoteles beschreibt, sind nur von Thieren genommen, wegen er Anatomie am Menschen nicht getrieben zu haben scheint.

Nach Aristoteles ist das Herz das Centralorgan des Körpers, von welchem die pulsirenden Adern, welche das Blut den Organen zuführen, entspringen. Nach ihm verlieren sich alle Gefäße zuletzt in blinde Endigungen, sodaß er von einer Rückleite des Blutes durch die Venen zum Herzen noch keine Idee hatte. Auch über das Athmen hat Aristoteles seine eigenen Gedanken, in welchen sich Wahres und Falsches innig vermischt. — Sehr mangelhaft sind seine Kenntnisse über das Nervensystem, von dem er nur Gehirn und Rückenmark kennt, während er von den eigentlichen Nerven keine Vorstellung hat.

Einmal nachgerufen, fand die Anatomie in der von Ptolemäus I. zu Alexandrien im Jahre 320 v. Chr. gestifteten medicinischen Schule eine bedeutende Förderung und gewaltigen Aufschwung, ja man kann sagen, daß auf diesem Gebiete die Leistungen der alexandrinischen Ärzte alles Frühere überragen. Der berühmteste derselben ist Herophilus aus Chalkedon, ein Schüler des Praxagoras und Chrysiptus, der namentlich über Gehirn und Nerven wichtige Entdeckungen gemacht hat. Zwar verwechselte auch er die letzten noch mit den Sehnen, doch erkannte er sie schon als die Organe der Empfindung und Bewegung. Einige Arbeiten desselben gehören sogar zu dem Glanzzeiten, was das Alterthum auf diesem Gebiete hervorgebracht hat, so die Untersuchungen über das Auge und die Feststellung der anatomischen Unterschiede von Arterien und Venen. Er sowie wie sein jüngerer Zeitgenosse Erasistratos sollen selbst lebende Leeteker, die ihnen überliefert worden waren, seziert haben.

Nach Herophilus ist der schon erwähnte Erasistratos von Julius auf Keos zu nennen, der den ausschließlichen Ursprung der Nerven im Gehirn nachwies und die Unterscheidung der Empfindungs- und Bewegungsnerven festlegte.

Ein weiteres Licht am medicinischen Himmel nach jener trüben Zeit ist Claudius Galenus, 131 n. Chr. zu Pergamus geboren, er machte zu Alexandria seine anatomischen Studien, wohin er gereist war, um ein vollständiges menschliches Skelet zu sehen. Seine Schriften haben sich eines Aufsehens zu erfreuen gehabt, wie kaum jemals die eines andern Arztes, was er vorzüglich seinen Leistungen auf dem Gebiete der Anatomie verdankt, auf welchem er bis zum 15. Jahrhundert als Orakel gegolten hat, obgleich es wol feststeht, daß er niemals menschliche Leichen zergliedert hat, denn alle seine Beschreibungen passen besser zur Anatomie der Affen und Hunde, als zu der des Menschen, wiewol er sie als von demselben entlehnt angibt. Besonders auf dem Gebiete der Nervenlehre hat Galen Bedeutendes geleistet, weniger werthvoll ist dagegen die Beschreibung der zusammengefügten Organe des Körpers, unter welchen das Herz noch am besten behandelt ist.

Alle auf Galen folgenden Anatomen sind blinde Nachtreter desselben, bis auf Luigi Mondini, welcher zu Ende des 13. und zu Anfang des 14. Jahrhunderts als Professor und der berühmten medicinischen

Schule zu Bologna wirkte. Durch ihn ward die in den Galen'schen Lehren verdorrte Anatomie wieder neu belebt, indem er als der Erste wieder menschliche Leichen bei seinen Studien zur Verfügung hatte.

Nach seinen eigenen, wenn auch noch ziemlich mangelhaften Untersuchungen fertigte Mondini ein anatomisches Lehrbuch, das bis zum Ende des 15. Jahrhunderts im größten Ansehen stand, obgleich es noch ein gutes Theil der Irrthümer Galen's fortpflanzte und in denselben nicht wenig besangenen war.

Es folgen nunmehr eine Reihe von Anatomen, die von keiner größern Bedeutung als Mondini sind. Alle folgen noch den Fußstapfen Galen's, der bis zu Anfang des 16. Jahrhunderts seine Herrschaft behauptete. Nur Einer wußte sich von den hergebrachten Ansichten einigermaßen zu emancipiren und selbständigere Wege zu gehen, wiewohl der Einfluß Galen's auch bei ihm nicht zu verkennen ist. Es war Jacobus Sylvius. Als Professor der Anatomie zu Paris übte er einen großen Einfluß auf seine Schüler aus, doch konnte er es nicht verhindern, daß mit ihm die alte Galen'sche Anatomie zu Grabe getragen wurde. Er bildet den Schluß der ersten Periode unserer Wissenschaft, die lange genug ein lebloser Leichnam, vom Fortschritt unberührt geblieben war.

Zahlreiche Schüler verdanken ihre Ausbildung dem Wirken dieses Mannes, dessen nicht zu unterschätzendes Verdienst es gewesen ist, dieselben zum praktischen Zergliedern angehalten zu haben. Aus der großen Reize derselben ging auch der Reformator der Anatomie im 16. Jahrhundert hervor, durch dessen bahnbrechende Arbeiten die neue Ära eingeleitet wurde.

Zweite Periode.

Mit Andreas Vesalius bricht die Morgenröthe eines neuen Tages in der Anatomie an, der erste Lichtstrahl, der in das Dunkel einer langen, einsfürigen Nacht fiel und nun mit einem male die unburchdringliche Finsterniß erhellte, sodaß neues Leben aller Orten entpfoß und mächtig emporwuchs, welches von neuem nicht wieder ersterben, sondern zu einer Blüte gelangen sollte, die in unserm Jahrhundert zur Frucht reifte. „In jener folgenseichen Zeit, in welcher der menschliche Geist die Fesseln einer geistlosen Scholastik zerbrach, erwachte auch mit Macht das Bewußtsein der Nothwendigkeit anatomischer Studien und hielt gegen Bann und Verfolgung siegreichen Stand. Die Wisbegierde warf sich mit dem Feuer-eifer des Enthusiasmus auf das noch brachliegende Feld der Anatomie. Lehrkatzeln erhoben sich in den bedeutendsten Städten Italiens, Frankreichs und Deutschlands, und ein edler Wettstreit spornte die Befürworter der Wissenschaft zu nimmer rastender Thätigkeit an. In den speculativen Wissenschaften, in Kunst und Poesie kann das Genie seine Zeit überflügeln —, in der Erfahrungswissenschaft bringt der ruhige Fleiß der Zeit, was der Gedankenflug nicht in Eile erreichen kann. Diese Zeit war nun für die Anatomie gekommen, und der große Mann, der sie brachte, war Andreas Vesalius, der Reformator der Anatomie.“

Zu Brüssel im Jahre 1513, oder wie andere wollen, 1514 geboren, stammte er jedoch durch seine Vorfahren aus einer deutschen Stadt im Herzogthume Kleve, Wesel, weshalb auch die Familie ihren ursprünglichen Namen „Wittings“ in „Wesele“ oder „Wesle“ umänderte.

Es war ein medicinisches Geschlecht, in dem der junge Andreas aufwuchs und in welchem der Riesen-

geist seine erste wissenschaftliche Nahrung erhielt. „Er studirte — wie es heißt — zu Ewien, und mußte, vieler Verfolgungen wegen, die ihm sein Eifer für die Anatomie zuzog, indem er nach seinem eigenen Verstandniß die Kirchhöfe plünderte und die Leichname der Verbrecher von Galgen und Rad entwendete, sein Vaterland verlassen.“ Er begab sich nunmehr nach Montpellier und von da nach Paris, wo er Gelegenheit fand, den Unterricht des damals in der Anatomie so berühmten Jacobus Sylvius zu genießen, den er bald durch seine Kenntnisse wie durch sein Genie überflügelte, wodurch er sich dessen Haß und Feindschaft in nicht geringem Grade zuzog.

Es war ein bewegtes Leben, welches der größte Anatom seiner Zeit geführt hat. Gefeiert wie wenige und zu hohen Ehren gelangt, starb er, seines Glühs und Ruhms wegen von seinen Zeitgenossen auf das unwürdigste verkannt und gekränkt, nachdem er seine Handschriften verbrannt und sein Amt als Leibarzt Kaiser Karls V. und seines Nachfolgers Philipp's II. niedergelegt, in seinem fünfzigsten Jahre, auf der Rückkehr von einer Pilgerfahrt nach Jerusalem, die er zur Sühne des Verbrechens, Anatom gewesen zu sein, unternehmen mußte, schiffbrüchig an der Küste der Insel Jante, wo sein Leichnam von einem Goldschmied erkannt und in der Kapelle der Heiligen Jungfrau beigesetzt wurde. So endete der Mann, der unserer Wissenschaft das Licht gebracht, welches geleuchtet hat bis auf unsere Tage.

Auf Grund reicher Erfahrungen hat Vesal, der „erste anatomische Denker“, mit fester Hand das alte uralte Gebäude der Galen'schen Anatomie umgestürzt, indem er nachwies, daß die Lehren des großen römischen Arztes nur auf die Kenntniß von Affen und Hunden gegründet seien. Er war der erste, welcher selbständig den ganzen Bau des menschlichen Körpers erforschte und in großen, von den hergebrachten Irrthümern befreiten Figuren darstellte.

Wader halfen an diesem Riesenvorte mit arbeiten die Zeitgenossen Vesal's Gabriele Fallopius und Bartolomeo Eustachio. Ersterer, ein Schüler und Freund des großen Reformators, setzte die Arbeit seines Lehrers fort, prüfend und scheidend, was dieser in genialem Wurf geschaffen, während Eustachius sich durch seine Opposition, indem er für Galen in die Schranken trat und für dessen Wahrheiten einstand, um die Wissenschaft verdient machte.

Es folgen nun eine Reihe bedeutender Namen, die alle nicht wenig den großen Bau mit fördern halfen. In erster Linie sind hier die Koryphäen der italienischen Schule zu nennen, die sich rühmen können, zunächst die Erbschaft Vesal's angetreten zu haben. Doch auch mancher Deutsche glänzt gleichzeitig, und unser Vaterland hat in dieser Zeit nicht minder wichtige Entdeckungen auf dem Gebiete der Anatomie aufzuweisen.

Einen neuen Aufschwung nahm die Wissenschaft durch die Entdeckung des Kreislaufs des Blutes. Vielfache Vorarbeiten waren schon von Italienern dazu geliefert worden, als es dem Engländer William Harvey, 1578 zu Foulsham in der Grafschaft Kent geboren, die Lehre von der Circulation des Blutes aufzustellen und durch unumstößliche Gründe zu beweisen gelang. Es ist ein glänzender Triumph, welchen die Wissenschaft durch diese neue Wahrheit errungen, und die eine gewaltige Anregung zur weitem Ausbildung der Anatomie gab.

Entdeckung folgte nun auf Entdeckung in regelmäßigen Schritten, bis durch die Erfindung des Mikroskops ein neuer ungehinder Aufschwung der Anatomie bewirkt wurde. Der erste, der sich desselben mit außer-

ordentlichen Erfolgen bediente, war Marcello Malpighi; er zeigte an den Lungen und dem Gehirne der Frösche den Kreislauf des Blutes, wie er auch sonst bei Beobachtung der Thier- und Pflanzenkörper den ausgedehnten Gebrauch von dem neuen Instrumente machte.

Der Auf bedeutender Leistungen ging nunmehr zu den Niederländern über. Männer wie Leeuwenhoek, Swammerdam, namentlich aber Ruysch, schritten rasch auf der neueröffneten Bahn vorwärts und waren die glänzendsten Gestirne des 17. Jahrhunderts. Besonders war es der letztere, welcher durch seine Einspritzungen von flüssigen, nachher erstarrenden Massen in die feinsten Blutgefäße, wodurch ein werthvolles Mittel zur Kenntniß des Gefäßsystems gewonnen wurde, eine große Veräbntheit erlangte, so daß Peter der Große die Sammlung von dessen Präparaten, sowie des Recetv zu den Injectionen für 36000 Golgulden kaufte.

In einen neuen Marktstein gelangte die Anatomie durch den großen schweizer Gelehrten Albert Haller, den bedeutendsten Mann, den vielleicht je die Schweiz hervorgebracht, welcher, am 16. October 1708 geboren, durch das Einführen der physiologischen Methode in die Anatomie das Leben mit der starren Masse des Leichnams verknüpfte. „Haller's Name wird jetzt noch — so läßt sich Hystl vernehmen — 100 Jahre nach seinem Tode, mit Ehrfurcht genannt. Die Zankarten der Wissenschaft schmückt den Vorber seines Grabes mit immer frischem Laube. Und so wird es sein in spätere Zukunft, wenn von den Größen der Gegenwart und dem trivialen Lärm, den sie erregen, kein Nachhall mehr klingen wird.“ — Der große Mann sprach mit dem Finger an der Radialarterie und mit dem Worten: „Sie schlägt nicht mehr.“

Je mehr wir uns der Gegenwart nähern, desto reicher und vielseitiger werden die Entdeckungen auf dem Gebiete der Anatomie, immer neue Elemente werden in sie hineingetragen und entwickeln sich zu erstaunlichen Größen. Alle Zweige gelangen jetzt zur Mäthe. Die vergleichende Anatomie, die Gewebelehre, die Entwicklungsgegeschichte, wie der technische und der der Heilkunde dienende Theil, beschäftigen nunmehr beiderseits die Geister. „Wer zählt die Völker, nennt die Namen“, die nunmehr um den Preis wetten; einer sucht immer den andern zu überbieten und die Palme zu erringen. Ohne Ueberhebung können wir es aber sagen, und wir dürfen stolz darauf sein, Deutschland ist in keinem Zweige der Anatomie zurückgeblieben, die deutschen Namen können sich den besten des Auslandes an die Seite stellen, ja auf manchen Gebieten, wie dem der Entwicklungsgegeschichte, stehen sie unerrätzt da, ein Ruhm, der mit dem Glanze der nationalen Thaten der Preis jener geistigen Thätigkeit ist, die das deutsche Volk in seinem Innersten durchdringt und treu gepflegt dasselbe auch auf der erreichten Höhe unangefochten erhalten wird.

Allgemeine Anatomie.

Die allgemeine Anatomie oder Gewebelehre betrachtet, wie schon erwähnt, den menschlichen Körper aus Gesichtspunkten, welche die gemeinschaftliche Grundlage aller einzelnen Theile ins Auge fassen und deren Abänderung zu den verschiedenen Zwecken erörtern. Sonach hat es die allgemeine Anatomie zunächst mit den Bestandtheilen des Körpers zu thun, die sich in zweifacher Beziehung uns darstellen, und zwar als Mischungsbestandtheile und Formbestandtheile, welche in ihren Theilen, nicht mehr in differente

Theile zu zerlegenden Gliedern als Elemente, und zwar die erstern als chemische, die letztern als Formelemente bezeichnet werden.

Während die Betrachtung der Nahrungsbestandtheile der Chemie anheimfällt, gehört die der Formbestandtheile in das Reich der Anatomie, deren Elemente nur mit Hülfe des Mikroskops wahrzunehmen sind.

Bestandtheile des menschlichen Körpers.

Nahrungsbestandtheile.

Der thierische und somit auch der menschliche Körper besteht nur aus Stoffen, die auch in der unorganischen Natur vorkommen, doch nur in verhältnismäßig kleiner Theil der unorganischen Substanzen findet sich im thierischen Körper wieder und tritt meist zu Verbindungen zusammen, die mit dem Namen der organischen bezeichnet werden.

Von den chemischen Elementen finden sich als normale Bestandtheile im thierischen Leibe nur der Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenstoff und Wasserstoff, Phosphor, Chlor, Schwefel, Fluor, Kalium, Natrium, Calcium, Magnesium, Silicium, Mangan und Eisen, während Aluminium, Titan, Arsen, Kupfer, Zink, Brom und mehrere andere noch nur zufällig darin gefunden worden sind.

Die Verbindungen nun, in welchen diese chemischen Elemente im thierischen Körper auftreten, sind doppelter Art, und zwar unorganische oder organische.

Die unorganischen Verbindungen im thierischen Körper finden sich auch außerhalb desselben in der unorganischen Natur, während die organischen nur in den Organismen angetroffen werden und im Gegensatz zu jenen eine eigene chemische Constitution zeigen.

Formbestandtheile.

Die Formbestandtheile unseres Körpers charakterisiren sich zunächst je nach dem Aggregatzustande als feste, flüssigkeitsflüssige oder gasförmige.

Die festen Formbestandtheile bilden in quantitativer Beziehung den geringsten Theil des menschlichen Körpers und zeigen sich als:

Körner (Granula), die kleinsten Formelemente, welche entweder frei in Flüssigkeiten suspendirt vorkommen, oder sich zu mehr oder minder großen Klümpchen vereinigen.

Zellen (Cellulae), kleine mikroskopische Bläschen von sehr verschiedener Größe und Gestalt.

Röhren (Tubuli), hohle einfache oder sich verzweigende Cylinder.

Fasern (Fibrae), fadenförmige Gebilde von solidem Bau, welche zu Bündeln (Fasciculi) oder zu breiten flachen Blättern (Lamellae) zusammentreten können.

Alle diese Theile werden durch eine in den verschiedenen Zuständen sich befindende Zwischensubstanz miteinander verbunden und von derselben zusammengehalten.

Als Grundform, aus der alle übrigen Formen hervorgehen, muß man die Zelle ansehen. Röhren und Fasern sind nur Umwandlungen derselben.

Die Vereinigung der Formelemente und ihrer Umwandlungen bilden die organischen Gewebe.

Alle Organe, welche aus gleichem Gewebe bestehen, gehören zu Einem Systeme. Diese Systeme können nun im Körper ein zusammenhängendes Ganzes bilden, wie das Bindegewebe, Gefäß- und Nervensystem, oder sie sind zerstreut und gehören nur durch ihren gleichartigen Bau zusammen, wie das Drüsen-, Knochen- und Knorpelsystem u. s. w.

Die flüssigen Bestandtheile des Körpers machen fast vier Fünftel von dessen ganzem Gewicht aus und durchdringen zum Theil sämmtliche Gewebe, wodurch deren Consistenz in vorwiegendem Grade bedingt wird, zum Theil hindert sie in den vollkommen geschlossenen, vielfach bis zu mikroskopischer Feinheit verzweigten Röhren des Gefäßsystems eingeschlossen, wie Blut, Lymphe, Chylus, oder sie befinden sich in besondern Kanälen und Behältern, um von da entweder als Excrete aus dem Körper entfernt zu werden, wie Urin, Schweiß u. s. w., oder um zu einer bestimmten Lebensverrichtung aufs neue verwendet zu werden, wie Speichel, Galle, Milch, Magenjuft u. s. w.

Die gasförmigen Bestandtheile kommen entweder frei in den offenen Höhlen des Körpers, wie in den Respirationsorganen, dem Darmkanale u. s. w. vor, oder sie sind, wie die Kohlensäure in den Mineralwässern, mechanisch mit tropfbaren Flüssigkeiten, so z. B. der Sauerstoff, Stickstoff und die Kohlensäure, mit dem Blute gemengt.

Die Zelle.

Unter Zelle (Cellula), im anatomischen Sinne versteht man ein bläschenartiges Gebilde von meist kugelförmiger Gestalt, umschlossen von einer Haut, der Zellmembran, an welcher mit Bestimmtheit weder eine Structur noch sichtbare Dehnungen nachgewiesen werden können. Die Zelle wird erfüllt von dem Zellinhalt, einer mehr oder minder dickflüssigen homogenen Masse von eiweißartiger Substanz, in welcher sich außer sehr kleinen eingestreuten Moleculen ein größerer Kern befindet, der wiederum ein oder mehrere Kernkörperchen enthält.

Die Zellmembran (Membrana cellulae) ist, wie schon erwähnt, ohne eine nachweisbare Structur und meist auch ohne jegliche sichtbare Dehnung, nur an manchen Thieren ist eine solche, die sogenannte Mikrovyle, sowie an einigen andern Zellenarten sind den „Porenkanälen“ ähnliche radiale Streifungen bemerkt worden.

Der Zellinhalt (Protoplasma, Cytoplasma, Sarcocoe) ist bei verschiedenen Zellen auch sehr verschiedenartig, von einer halbflüssigen, mehr oder wenig zähen Consistenz, mit kleinen körnigen Einlagerungen, bestehend aus Eiweißkörperchen, feinsten Fetttröpfchen u. s. w.

Der Zellkern (Nucleus, Cytoblastos) von 0,002 — 0,05 im Durchmesser, ist ein festes oder bläschenförmiges Gebilde, welches sich meist einfach entweder in der Mitte des Zellinhaltes befindet oder eine excentrische, eine wandständige Stellung an der innern Fläche der Zellmembran einnimmt.

Das Kernkörperchen (Nucleolus) ist ein das Licht stärker brechender, glänzender Theil des Kerns im Innern desselben, gewöhnlich einfach, zuweilen aber auch zwei- und mehrfach.

Diese die thierische Zelle bildenden Theile brauchen aber nicht in ihrer Gesamtheit vorhanden zu sein, der eine oder der andere kann mangeln, ohne daß dadurch die Existenz der Zelle gefährdet würde. So kann die Membran fehlen, ohne daß die Zelle aufhört ein Elementarorganismus zu sein, sie bildet dann ein Protoplasmaklümpchen mit Kern und Kernkörperchen; oder der Zellkern und das Kernkörperchen sind nicht vorhanden, während ohne Protoplasma eine Zelle nicht zu denken ist.

Die Größe der Zellen schwankt ungemein und variiert zwischen 0,1" und 0,003".

Die Zelle bildet das Elementarorgan des thierischen Körpers, aus welchem sich alle Theile desselben, alle

Gewebe, Organe und schließlich der gesammte Organismus, von einer einzigen Zelle, dem thierischen Ei, ausgehend, entwickeln.

Wo die Zellen nicht unmittelbar hart aneinander liegen, befindet sich eingeschaltet eine Zwischenmaterie, die Interzellularsubstanz, welche von den Zellen ausgeschieden wird und in verschiedener Dichtigkeit als Zwischenzellensubstanz im Blut, der Lymphe, dem Chylus, den Drüsen- und Parenchymäströmen vorkommt, aber auch von fester Consistenz, wie bei Knorpel und Knochen sein kann.

Die Lehre von der Zelle ist gegenwärtig in einer Ausbildung begriffen, worauf wir jedoch hier um so weniger eingehen können, als die Meinungen noch vielfach getheilt sind und an die Entscheidung im Augenblicke auch nicht gedacht werden kann.

Auf die Entstehung der Zellen können wir uns hier auch nicht weiter einlassen, nur so viel sei erwähnt, daß eine freie Zellenbildung aus organischer aber nicht organisirter Substanz bis jetzt mit Bestimmtheit noch nicht nachgewiesen worden ist. Jede Zelle stammt von einer Zelle oder einem deren Stelle vertretenden Elementarorganismus ab, bei welchem Vorgange die Natur zwei Wege einschlägt, wobei mit der Erneuerung zugleich eine Vermehrung der Zellen erzielt wird. Diese findet entweder durch einfache Theilung oder durch Bildung im Innern einer schon vorhandenen Zelle, endogene Zellenbildung, statt.

Die Vermehrung der Zelle durch einfache Theilung geschieht auf folgende Weise. Zunächst beginnt der Zellkern sich zu verlängern und bekommt eine Furche, die allmählich immer tiefer wird, bis der Kern in zwei Theile getheilt ist; oder, was auch der Fall ist, der Kern löst sich in dem Protoplasma auf, worauf dann zwei neue Kerne in demselben auftreten. Gleichzeitig fängt auch die Zellmembran, indem die Zelle an Umfang gewinnt und meist eine ovale Form annimmt, an sich einzuschnüren, wodurch gleichfalls eine Furche gebildet wird, die auch den Zellinhalt in zwei Theile scheidet und so lange wächst, bis sich die gegenüberliegenden Wände berühren, wodurch die Theilung vollbracht ist. Auf diese Weise kann eine Zelle gleichzeitig in zwei, drei und mehr neue zerfallen, welche dann wiederum denselben Proceß durchmachen können. Zuweilen ist der Vorgang ein wenig anders, indem anstatt der Einschnürung der Zellmembran, nachdem sich der Kern in mehrere getheilt und diese sich an verschiedenen Stellen an die Zellwand angelegt haben, sich letztere knospenförmig ausbuchtet, was als Knospung oder Sprossbildung bezeichnet wird. Diese Auswüchse wachsen, während die Verbindung mit der ursprünglichen Zelle immer fadenförmiger wird, bis endlich eine vollständige Trennung eintritt.

Die zweite Art der Zellenbildung ist die endogene. Auch hier geht die Vermehrung zunächst vom Kerne aus, der sich in einer Zelle sogar dreißig- und mehrfach theilen kann, worauf sich der Zellinhalt um die neuen Kerne zusammenballt, welche Protoplasmahaufen dann eine eigene Membran bekommen, sobald sich schließlich eine ganze Brut von Zellen, Tochterzellen, in der ursprünglich einen, der Mutterzelle, befinden, deren Membran fortbestehen oder auch zu Grunde gehen kann, sobald die eingeschlossenen Tochterzellen durch Perforation der Mutterzellmembran dann frei werden. Jede Tochterzelle kann dann in ihrem Innern wieder neue Zellen erzeugen und so zur Mutterzelle werden. Hierher gehört auch die sogenannte Furchung, wie sie beim Ei beobachtet wird.

In ihrer ursprünglichen Gestalt ist die Zelle ein rundes Kügelchen, das jedoch im Verlauf seiner Existenz

vielfachen Veränderungen und Umgestaltungen ausgesetzt ist. Zunächst findet nur eine Größenzunahme statt, die Zelle wächst; dann aber erleidet sie Formveränderungen, während der Inhalt Umstellungen eingehen kann; immer aber bleibt die Zelle als solche fortbestehen, wie es bei den ausflüssigen Bläsen frei schwimmenden Blut-, Schleim- und Schleimkörperchen, bei den Zell- und Epithelzellen, sowie bei den Epithelzellen der Fall ist, so zwar isolirt bleibenden Zellen können in der That in der mannichfachen Weise verändert werden. Die ursprünglich runden Zellen gehen in cylindrische über, auch können sie sich gegen Platten und eckig werden, oder sie verlängern sich nehmen eine spinelförmige Gestalt an, andere treiben winperartige Fortsätze, welche, solange die Zelle lebt, sich in einer schwingenden Bewegung sogenannten Zitterbewegung befinden. Der Kern und das Kernkörperchen können sich ändern und von ihrer runden Gestalt mehr oder weniger abweichen.

Auch der Zellinhalt geht Veränderungen aus, wird mehr oder weniger kernchenreich, sogar können Zellen in ihm zuweilen auf.

Weitere Umgestaltungen erleidet die Zelle durch Auflagerungen auf die Innen- oder Außenfläche der Membran, wodurch dieselbe in verschiedener Gestalt wird.

Ferner treiben die Zellen, indem sie sich selbstständig erhalten, aber mit anderen in Verbindung treten, einen oder mehrere Fortsätze, die sie ein sternförmiges Aussehen bekommen. Diese Auswüchse können sich dann wieder ästig theilen in ähnlichen Fortsätzen anderer benachbarter Zellen Verbindungen eingehen, wie die Nervenzellen, Muskelkörperchen, Haargefäße u. s. w.

War bisher die Zelle als solche bestehen geblieben, kann sie nunmehr auch ihre Isolirtheit aufgeben und sich selbstständig auflösen, indem sie vorerst mit der Zellsubstanz vollständig verschmilzt, sobald der Innenraum der Zelle als Lücke der Interzellularsubstanz übrigbleibt, wie bei den Knorpelzellen. Es kommt es auch vor, daß zwei oder mehrere Zellen einander verwachsen, worauf an der Peripherie die Zwischenwände schwinden, so daß die Höhle größer wird als der Innenraum einer Zelle.

Ferner lagern sich die Zellen aneinander, eine zusammenhängende Reihe gebildet wird, wie bei den Nervenfaserzellen zeigen.

Endlich können auch die nach zwei Richtungen verlängerten Zellen sich der Länge nach zertheilen und in derselben Richtung zu Bündeln oder tubulären Fasern zerfasern, welche Form man bei Bindegewebe findet; oder sie verlängern sich bedeutend, ohne jedoch sich aneinander zu verbinden, werden dann in Fasern umgewandelt, wie bei den Muskelfasern.

Auch die Kerne sollen sich zerfasern und von Hensen sogenannten Kernfasern bilden, welche von verschiedenen Seiten bestritten werden.

Gewebe.

Nur die niedrigsten thierischen Organismen bestehen aus einfachen Zellen; sobald eine nur einstufige höhere Entwicklung eintritt, erleiden die Zellen Umwandlungen und vereinigen sich zu den legeren Geweben (Telae).

Als Gewebe bezeichnet man sonach jede aus mäßige in gleichen Theilen immer in

wiederkehrende Anordnung der Elemente. Vereint sich aber eine gewisse Anzahl Elementarteile von bestimmter Form und Funktion, so erhält man nach Kölliker ein n. Vereinen sich mehrere oder viele Organe oder verschiedener Art zu einer höhern, so heißt dies ein System, welches ein zusammenhängendes Ganzes bildet und an Zusammensetzung aller größern Theile des Körpers theilnimmt, wie Gefäß- und Nervensystem, oder mehrere zwar nicht nebeneinander zusammenhängende, aber gleichartig gebauten und gleichartig wirkenden Organen, wie das Muskelsystem, besteht. Bezug auf die Gewebe stellt Kölliker mit besonderer Berücksichtigung der chemischen und physiologischen Verhältnisse sowie der Entwicklung derselben die Arten auf:

Zellengewebe:

Oberhautgewebe,

Gewebe der echten Drüsen.

Gewebe der Bindefsubstanz:

Einfache Bindefsubstanz,

Knorpelgewebe,

faserige Bindefsubstanz (Bindegewebe und elastisches Gewebe),

Knochengewebe und Zahnbrein.

Muskulargewebe:

Gewebe der glatten Muskeln,

Gewebe der quergestreiften Muskeln.

Nervengewebe.

In diesen Geweben sind es nur das Zellengewebe und Bindefsubstanz, welche für sich allein Organe einfacher bilden, während in allen höhern Organen dagegen Gewebe, ja selbst einfache und zusammengesetzte Drüsen vertreten sind, wobei jedoch meist das eine oder andere die Uebergewicht hat. Auf Grund dieser Beobachtung gibt nun Kölliker folgende Einteilung der Organe: Einfache Organe.

I. Organe des Zellengewebes.

Epidermis, Epithelien, Haare, Nägel, Linse. Einfache Drüsen ohne Bindegewebskapsel.

II. Organe der Bindefsubstanz.

Glaskörper (Schleimgewebe).

Chorda dorsalis, gefäßlose Knorpel, elastische Knorpel.

Sehnen, Bänder, Fascien u. s. w.

Zusammengesetzte Organe.

III. Organe mit Vorwiegen des Zellengewebes.

Größere echte Drüsen.

IV. Organe mit Vorwiegen der Bindefsubstanz:

Gefäßhaltige Bindegewebskapseln (äußere Haut, Schleimhäute, seröse Häute, eigentliche Gefäßhäute).

Knochen, Zähne.

Gefäße.

Blutgefäßdrüsen.

V. Organe mit Vorwiegen des Muskelgewebes.

Glatte und quergestreifte Muskeln.

VI. Organe mit Vorwiegen des Nervengewebes.

Ganglien, Nerven, Hirn, Mark.

VII. Organe, in denen alle Gewebe vertreten sind.

Die einzelnen Organe des Darmes.

Die Organe des Geschlechtsapparates.

Die größeren Drüsen.

Höhere Sinnesorgane.

Endlich treten die Organe noch zu besondern Systemen zusammen, deren Kölliker folgende aufstellt:

1) Das System der äußern Haut.

Dasselbe besteht aus der Lederhaut, der Oberhaut, den Haargebilden, den größern (Milchdrüsen) und kleinern Drüsen der Haut.

2) Das Knorpelsystem

mit den Knochen, Knorpeln, Bändern und Gelenkkapseln.

3) Das Muskelsystem

mit den Muskeln des Stammes und der Extremitäten, den Sehnen, Fascien, Sehnenbändern und Schleimbeuteln.

4) Das Nervensystem

mit den großen und kleinen Centralorganen, den Nerven und höhern Sinnesorganen.

5) Das Darmsystem

mit dem Darmlanal, den Speicheldrüsen, der Schilddrüse, der Leber, der Bauchspeicheldrüse und den Athmungsorganen.

6) Das Gefäßsystem

mit dem Herzen, den Blut- und Lymphgefäßen, sowie den Lymphdrüsen, der Thymus und der Milz.

7) Das Harn- und Geschlechtssystem.

Da wir kein anatomisches Lehrbuch zu schreiben beabsichtigen, sondern hier nur die Vorbedingungen zu einem allseitigen Verständniß der Tafeln geben wollen, so würde es uns zu weit führen, Gewebe, Organe und Systeme einzeln in dem von uns soeben aufgezählten Umfange betrachten zu wollen. Wir begnügen uns daher dieselben in einer etwas andern Weise gruppiert vorzuführen, und wählen dazu folgende wesentlich vereinfachte Einteilung:

1) Bindegewebsarten:

Fibrilläres Bindegewebe, Fettgewebe, Schleimgewebe, cytogenes Bindegewebe, homogenes Bindegewebe, elastisches Gewebe, und anhangsweise Pigmentbindegewebe.

2) Horngewebe:

Epidermis, Haare, Nägel, Epithelien, und anhangsweise Pigment.

3) Knorpelsystem:

Knochen, Knorpel, Bänder.

4) Muskelsystem:

Muskeln, Sehnen, Fascien, Schleimbeutel, Schleimscheiden.

5) Gefäßsystem:

Gefäße, Blut, Lymphe, Lymphdrüsen.

6) Nervensystem:

Nerven, Ganglien, Gehirn, Rückenmark.

7) Hautsystem:

Fibröse und seröse Häute, Schleimhäute, Gefäßhäute.

8) Drüsenystem.

1. Bindegewebsarten.

Zu diese Gruppe gehört eine Anzahl von Geweben, die zwar in ihrer äußern Erscheinungsweise sehr voneinander abweichen, jedoch namentlich durch die Entwicklung als zu einem System gehörend sich präsentieren.

Zu erster Linie ist das eigentliche Bindegewebe (fibrilläres Bindegewebe, Zellgewebe oder Zellstoff, Tela cellulosa, auch Textus cellulosus) zu rechnen. Es ist von allen Geweben im menschlichen Körper das am weitesten verbreitete und spielt gleichsam im Organismus eine kosmopolitische Rolle. Je nachdem es theils die einzelnen Organe umhüllt und miteinander

verbindet, sowie die Lücken zwischen denselben ausfüllt, theils aber auch in den Bau derselben mit eingeht und so als Bindemittel der verschiedenen, die einzelnen Theile zusammensetzenden Elemente einen wesentlichen Bestandteil derselben bildet, unterscheidet man ein peripherisches oder umhüllendes, und ein organisches oder parenchymatöses Bindegewebe.

Was die mikroskopischen Elemente des Bindegewebes betrifft, so zeigen dieselben sich als solide, glattrandige, weiche, wasserhelle oder in größeren Massen weißliche, dünne, sanft wellenförmig gebogene, mehr platt als rund erscheinende Fasern, Bindagewebsfibrillen, welche im Mittel $0,0005''$ im Durchmesser haben, nie untereinander anastomosiren und zu wellenförmig aussehenden Bündeln zusammentreten. Diese Bündel können nun mit einander parallel laufen, oder sich in verschiedenen Richtungen kreuzen und verflechten, wodurch eine große Festigkeit erzielt wird.

Zwischen den Bündeln und Fibrillen befindet sich eine spärliche homogene, gallertartige oder fein granulirte Intercellularsubstanz, sowie Lücken und Kanäle, in welchen die Intercellularflüssigkeit sich befindet, welche zur Ernährung des Gewebes dient und aus dem Blute stammt.

Außerdem finden sich zwischen den Fasern noch reihenweise, meist in der Längsrichtung derselben, oder auch unregelmäßig zerstreut, wirkliche Zellen, aus Membran, Inhalt und Kern bestehend, sowie Zellen in den verschiedensten Uebergangsformen, ohne Membran nur ein Protoplasmahaufen mit Kern, von runder, ovaler, spinelförmiger oder auch strahliger Gestalt, welche Bindegewebskörperchen heißen.

Dem Bindegewebe sind meist elastische Fasern, zuweilen auch Fettzellen beigemischt, wie es auch von Blutgefäßen in veränderlicher und von Nerven nur in sehr geringer Menge durchsetzt wird.

Die Bindegewebsfibrillen entstehen aus der Zwischensubstanz der ursprünglich runden embryonalen Zellen, indem dieselben sich zerfasern, während die Zellen entweder als Bindegewebskörperchen fortbestehen oder in Fettzellen übergehen.

Das Bindegewebe zeigt sich in sehr verschiedenen Arten im Körper, von denen wir schon das peripherische und parenchymatöse hervorgehoben haben, das sich nur durch Lage und Vorkommen unterscheidet, während es mit Rücksicht auf die Form sich in folgende Klassen ordnen läßt:

1) Festes und geformtes Bindegewebe, von welchem man wieder unterscheiden kann: Sehnen und Bänder, Faserhäute und fibröse Häute (Tunicae fibrosae), seröse Häute und Synovialhäute der Gelenke, Schleimbeutel (Bursae mucosae), Sehnenscheiden, die Lederhaut, Schleimhäute (Tunicae mucosae), die Häute der Venen und Lymphgefäße, die Tunicae adventitiae der Arterien und das Endocardium, endlich die Gefäßhäute.

2) Lockeres, aerolares oder formloses Bindegewebe, das sich nur durch sein Gefüge von erstem unterscheidet und meist als Ausfüllungsmasse vorkommt.

Zu der Bindesubstanz gehört auch das für den Körper so wichtige Fettgewebe, bestehend aus kleinen Bläschen, welche mit Fett angefüllt sind, das während des Lebens flüssig ist und nach dem Tode erstarrt. Diese Fettbläschen, sogenannte Fettzellen, sind in größerer oder geringerer Masse im Bindegewebe vorhanden, wo sie Zellen aus einer außerordentlich zarten, structurenlosen und durchsichtigen Membran bilden, in deren Innerm sich ein Fettkörperchen befindet, in welchem unter Umständen ein Kern sichtbar wird. Zuweilen finden sich an Stelle des flüssigen Fettes in einzelnen

Zellen nadelförmige Gebilde, Margaritarzellen. Fettzellen sind meist von rundlicher Gestalt und nur durch gegenseitigen Druck abgeplattet, nach schwankt im Durchmesser zwischen $0,01-0,06''$. In der starken Lichtbrechung des Inhalts erhebt sich der Rand der Zellen stets dunkel und scharf. Im Inneren liegt ein Haufe solcher Zellen in dem des Bindegewebes, wo dann ein größeres aus diesen Fettklümpchen gebildet wird, das zur Zeit von einem dichten Netze von Capillargefäßen umgeben wird, welche auch ballenartig zwischen den Zellen durchlaufen. Die Fettklümpchen setzen zu Fettlappen und diese wiederum zu großen Massen. Ihrer Bedeutung nach sind sie nichts anderes als Bindegewebskörperchen, welche in ihr Inneres aufgenommen und die große rundliche Gestalt angenommen haben.

Die größten Ansammlungen von Fett sind im Unterhautbindegewebe als Panniculus, das an manchen Stellen des Körpers, wie am Unterleibe, an den Brüsten über Solidum. Ferner tritt das Fett noch in großen Massen in den Nieren und Gefäßen, besonders des Dünndarmes, gelbes Knochenmark in den langen Knochen, der Umgebung der Nieren, in den Intermuskeln, namentlich da, wo größere Arterien verlaufen.

Eine dritte wichtige Art der Bindesubstanz ist das elastische Gewebe (Tela elastica), welches mit dem Bindegewebe gemischt vorkommt. Es besteht aus runden oder bandartig flachen, spiralförmigen Fasern, welche in größeren Massen ausmäßig wellenförmig geschwungen erscheinen. Der Durchmesser dieser Fasern ist sehr verschieden, reicht von unmerklicher Feinheit etwa zwischen $0,0005''$ und $0,005''$ Dicke. Die elastischen Fasern sind entweder einzeln vor oder vereinigen sich untereinander und bilden dann Stränge, Bänder, Häute, welche in der Richtung der Fasern sehr stark sind und bei nachlassender Kraft ihre ursprüngliche Gestalt wieder annehmen. Die morphologische Bedeutung dieser Fasern ist dieselbe wie die der Bindegewebsfibrillen, indem sie aus verdichteter Substanz hervorgehen, welche nur von kleinen durchbrochen wird.

Das elastische Gewebe ist ein regelmäßiges, aus fibrillären Bindegewebes, während es ohne jegliche Beimischung fast nie vorkommt. Es findet sich in den gelben Bändern der Wirbelsäule, im Nackenbände, in den Bändern, welche die Rippen mit den Luftröhrenknorpeln verbinden, in den unteren Bändern und in dem Ligamentum suspensorium penis, endlich in der mittleren Haut der Arterien.

Von den übrigen Arten der Bindesubstanz ist nur das homogene Bindegewebe, das aus einem homogenen Bindegewebe (gallertartiges Bindegewebe) und der feinen Bindegewebssubstanz (auch abnorme Entzündung, conglobirte Drüsensubstanz) mit Namen des Bindegewebes spielen, gegen die im Vorhergehenden zu verstehen, nur eine untergeordnete Rolle, kommen und nicht in so großen Mengen im Organismus und stellen gleichsam ein, auf einer niedrigen Entwicklungsstufe stehendes Bindegewebe dar.

Das Pigmentbindegewebe zeichnet sich durch sternförmige Zellen mit zahlreichen Eintheilungen aus. Dasselbe findet sich beim Menschen im Auge, wo es in der Iris und Chorioidea vorkommt, sowie in der innersten Lage der Sklera getroffen wird.

2. Horngewebe.

Diese Gruppe rechnet man alle, die freien des Körpers — seien dieselben nach außen oder ein gelebt, indem sie entweder die Körperoberfläche, oder die offenen und geschlossenen Höhlen und die mit diesen zusammenhängenden inneren und geschlossenen Drüsenbläschen auskleiden — ein gefäß- und nervenloses Schichten.

Die äußere Körperfläche, die Haare und Nägel zu ihnen gehören, so die Oberhaut (Epidermis cuticula), während die Höhlen und Kanäle mit dem Namen Epithelium bezeichnet werden.

Charakteristisch für diese Organe ist es, daß sie alle ständig gebildeten Zellen bestehen, die untereinander mehr oder weniger fest vereinigt sind und die Körperoberfläche mit der Zeit einen gewissen Härte annehmen, aus welchem Grunde sie Horngewebe genannt werden, während die Epithelien ihrem ursprünglichen weichen Zustande ver-

weichen. Die reifen Epidermiszellen ist die Höhle ganzschwinden, während die Zellennukleolen trübe durchsichtig geworden ist. Das Schicksal des in diesen Zellen ist unbekannt. Die Form ist flach, indem die ursprünglich runden Zellen in trockenen spröden Schuppen sich abplatteten, mit ihren Nachbarn zu einer kontinuierlichen nicht verschmelzen, welche nur mechanische Verletzungen erleidet, indem sie mit der Zeit abgenutzt gerieben wird, während neue Zellen von innen kommen, so daß die abgestoßenen Schichten immer durch neuen Nachschub ersetzt werden. Die Zellen, halbflüssige Zwischensubstanz, welche die noch weichen Hornzellen umgibt, ist derselben Verwitterung und Verhärtung unterworfen wie die selbst, und dient zuletzt nur als schwaches Bindegewebe.

Die Haare und Nägel sind epidermoidale Gebilde, gleich nur zelliger Natur, von denen die letzteren eine verdickte Oberhaut sind. Die Epithelien bilden alle freien Flächen einer Membran im Innern des Körpers, einer Höhlenwand, sowie aller Organe, und bilden theils ein einfaches, theils ein mehrschichtiges Zellenlager. Die Form der Zellen ist verschieden. Alle haben einen Kern mit Kernhülle, der in jüngeren Zuständen fein granuliert ist, später ein mehr homogenes Aussehen annimmt. Anfangs umschließt die structurlose Zellennukleole den Kern dicht; in dem Maße aber, wie bei reitem dem Wachsthum sich die Zelle mit einem hellen flüssigen Inhalte füllt, rückt der Kern entfernt von der Wand ab, ohne jedoch eine centrale Hohlraum einzunehmen, oder er bleibt wandständig nach außen von Protoplasma umgeben. Die ursprünglich runden und ovalen Zellen verändern vielfach ihre Gestalt, entweder wachsen sie in die Breite oder in die Höhe, wonach man zwei Arten von Epithel, das Plattenepithel und das Cylinderepithel erhält, je nachdem sich verschiedene Uebergangsformen bilden.

Das Plattenepithel, wegen seines dem Straußenei ähnlichen mosaikartigen Aussehens so genannt, auch Plattenepithel, kommt am häufigsten vor, besteht aus anfangs runden, später flachen polygonalen Zellen, in welcher Form sie den Epithelzellen am nächsten stehen. Sie lagern meist so dicht aneinander, daß von einer Zwischenzellenlücke nichts bemerkt wird. Es findet sich entweder als

einfache Zellschicht auf den freien Flächen aller serösen Häute, ferner auf der innern Oberfläche der Blut- und Lymphgefäße, in den feinsten Verzweigungen der Drüsenausführungsgänge und der Luftwege der Lungen, sowie auf gewissen jarten Schleimhäuten, oder in mehrschichtigen geschichteten Lagern, wie in der Mundhöhle, dem Magen und der Speiseröhre, auf den Synovialhäuten und an verschiedenen Stellen des Verdauungs- und des urogenitalen Systems vor. Bei dem geschichteten Epithel sind die untern jüngeren Zellen stets rundlich. Die Regeneration des mehrfach geschichteten Epithels findet wie bei der Epidermis statt, während bei dem einfachen Zellenstratum der Ersatz für die abgestoßenen Zellen durch Theilung der zurückgebliebenen herbeigeführt wird.

Das Cylinderepithel entsteht dadurch, daß sich die Zellen gerade in dem Plattenepithel entgegengesetzter Richtung entwickeln. Während dieses in der Breite, mit der darunterliegenden Fläche parallel wächst, entwickelt sich jenes nach einer Richtung, die senkrecht auf der betreffenden Fläche steht. Die Form der Cylinderepithelzellen ist die eines abgestumpften Kegels, von welchem die Basis entweder flach oder schwach gewölbt nach der freien Fläche gerichtet ist, während die abgestumpften Spitzen auf der Unterlage ruhen, zwischen welchen die frei bleibenden Räume durch junge runde Zellen angefüllt werden. In der Mitte zwischen Spitze und Basis befindet sich der runde oder ovale Kern mit Kernkörperchen, der oft so groß ist, daß er die ganze Breite der Zelle ausfüllt und zuweilen sogar die Wand bauchig hervorwölbt. Der Inhalt der Zellen ist meist fein granuliert. Das Cylinderepithel ist meist einfach, seltener geschichtet, und werden die zu Grunde gegangenen Zellen im ersten Falle durch einfache Theilung, im letztern durch die jungen, zwischen den Keilspitzen sich befindlichen, ersetzt, welche sich gleichfalls durch Theilung vermehren. Das Cylinderepithel findet sich nur auf Schleimhäuten, wie im Darmkanal vom Mageneingange bis zum After, sowie in den Ausführungsgängen fast aller Drüsen.

Überall wird der Uebergang des einen Epithels in das andere durch Zwischenformen vermittelt, und nur an den Mündungen der Speicheldrüsen findet ein plötzlicher Wechsel statt.

Eine besondere Art des Cylinderepithels ist das Flimmer- oder Wimperepithel, welches sich von erstem nur dadurch unterscheidet, daß auf den freien Basen der sonst gleichgeformten Zellen haarähnliche, dünne, kurze, platte und spitz endigende, außerordentlich feine Fäden (Cilien, Wimpern) aufsitzen, welche, von wasserheller Farbe, in verschiedener Anzahl, bis zu 20, fortwährend in einer eigenthümlichen Schwingung — etwa wie ein reißes Kornfeld, wenn es vom Winde bewegt auf- und niederwogt — sich befinden, die von Nerveneinflüssen vollkommen unabhängig ist und sich bis zu 300 mal in der Minute wiederholen kann. Die Richtung dieser Bewegung der Cilien geht wol stets gegen die Mündung des betreffenden Kanals, in dem sich das Flimmerepithel befindet.

Das Vorkommen des Flimmerepithels ist ein weitverbreitetes. So findet es sich auf der Schleimhaut der respiratorischen Wege, wie der Nasenhöhle, soweit sie von innewandigen Wänden umgeben ist, jedoch mit Ausnahme des Kehlkopfs, auf welchem sich der Geruchsnerv verbreitet; ferner der Schleimhaut der Nebenhöhlen der Nase, des obern Theils des Rachens und des knorpeligen Theils der Ohrtrumpete, der untern Fläche des Kehlkopfs, und von der Stimmritze beginnend, des Kehlkopfs, der Luftröhre bis in deren feinere Verzweigungen herab. Ferner trifft man dasselbe auf der Schleimhaut des

Uterus und der Luten, in den Nebenhoden, in einer gewissen Periode auf dem häutigen Ueberzuge der Gehirnhäutchen und im Kanal des Rückenmarks.

Am zweckmäßigsten lassen sich an die Epithelien die Pigmentzellen anreihen. Von diesen Gebilden hängt die eigenthümliche Färbung einer Anzahl von Organen ab. Diefelben bilden runde, mehrseitige oder sternförmige Zellen, in denen, von einer zarten, durchsichtigen, structurlosen Membran umschlossen, ein körniger dunkelgefärbter Inhalt von sehr feinen Pigmentmoleculen sich befindet und entweder frei oder zu Klümpchen zusammengeballt herumschwimmt, wenn Zellen platten oder zerdrückt werden. Nicht immer ist ein Kern sichtbar, da er oft von den dunkeln Massen des Pigmentes verdeckt wird.

Solche Pigmentzellen finden sich unter der Oberhaut in dem sogenannten Malspighischen Netze (Rete Malspighii), wo sie, wie beim Neger, die dunkle Farbe der Haut bedingen oder der Grund der Sommerprossen und Leberflecke sind, ferner im Auge aller Menschenrassen, als sogenanntes Pigmentepithel der Chorioidea, wo sie dazu dienen, die falschen Lichtstrahlen zu absorbiren, wie die Schwärzung an der innern Oberfläche der optischen Instrumente. Vereinzelt kommen die Pigmentzellen noch an verschiedenen andern Stellen des Körpers vor, wie in den Bronchialdrüsen, in der Lungensubstanz, in den Schenkeln des Großhirns u. s. w., oder man trifft auch freie Pigmentklümpchen zwischen den Geweben.

Haare (Pili oder crines) und Nägel (Ungues) genügt es hier nur anzuführen, da dieselben vorzugsweise in das Gebiet der Histologie gehören, auf welches wir uns nur so weit verweisen dürfen, als es für das Verständniß der folgenden Betrachtungen nothwendig ist.

Von den Haaren erwähnen wir nur, daß dieselben aus dem Haarschaft oder Haarscylinder, welcher frei über der Oberfläche der Haut hervorragt, und aus der Haarwurzel, welche in der Lederhaut steckt, und deren unterster dicker, keulenförmiger, etwas ausgehöhlter Theil Haarzwiebel oder Haarknopf heißt und auf dem Haarkeime oder der Haarpapille aufliegt, bestehen. Die Haare sind mit Ausnahme weniger Stellen über den ganzen Körper verbreitet und kommen daselbst als dünne, weiche, kurze Wollhaare, oder als stärkere verschiedenfarbige Kopf- und Barthaare, Augenbrauen, Augenwimpern u. s. w. vor.

Von den Nägeln bemerken wir, daß sie als dünne elastische Hornplatten auf den Rückenflächen der letzten Finger- und Zehenglieder in einer Vertiefung der Lederhaut, dem Nagelbette, sitzen und rings herum mit der Epidermis in Verbindung stehen. An dem Nagel selber unterscheidet man: die Nagelwurzel, welche im Nagelsaße sitzt, den Nagelkörper und die Nagelspitze.

Megen des vollständigen Mangels an Nerven sind alle Horngewebe vollständig empfindungslos und schmerzen daher auch unter keiner Bedingung, ebenso entzünden sie sich nie, da sich auch keine Blutgefäße in ihnen befinden.

3. Knorpelsystem.

Das Knorpelsystem begreift Gewebe verschiedener Art in sich, und zwar erstens solche, die denselben specifisch eigen sind, wie das Knorpel- und Knorpelgewebe, dann aber auch solche, die es mit andern Systemen gemein hat, wie das Bindegewebe, elastische Gewebe und das Epithel in den Bändern und Gelenkkapseln.

Der Knorpel (cartilago) gehört nach den Knochen zu den festesten Theilen des menschlichen Körpers.

Ohne so spröde zu sein wie diese, besitzt er große Festigkeit und eine ungemaine Elasticität und Biegsamkeit. Die Farbe des Knorpels im frischen Zustande ist schwachbläulich oder gelblich und bei durchgehenden Lichte in dünnen Scheiben opalescirend durchscheinend getrocknet nimmt er eine bräunlichgelbe Färbung an schrumpft ein und wird brüchig.

Die Knorpel haben selber keine, oder unter gewöhnlichen Umständen nur äußerst wenig Blutgefäße, ebensoviele sie keine sichtbaren Nerven und Lymphgefäße dagegen sind sie von einer festen, fibrösen, gelblichen Membran, der Knorpelhaut (Perichondrium) überzogen, mit Ausnahme jener, welche als Gelenknorpel frei in die Gelenkhöhle hineinragen.

Wie für alle Theile des menschlichen Körpers ist auch für den Knorpel die Zelle das Grundelement, welche in einer Grundsubstanz eingebettet ist. Je nach der Beschaffenheit dieser Grundsubstanz, welche in Stellung nach mit den Intercellularsubstanzen, wie die Bindegewebsfasern, rangirt, unterscheidet man drei Arten von Knorpeln: echte oder hyaline Knorpel, Fasernorpel und Reithorpel, welche aber mit fache Uebergänge untereinander zeigen.

Bei den hyalinen Knorpeln ist die Grundsubstanz eine homogene Masse, während sie bei den beiden übrigen Arten gefasert ist, und zwar so, daß bei dem Fasernorpel die Fasern dem Bindegewebe ähnlich sind, während sie bei dem Reithorpel aus elastischen Fasern bestehen.

Eingestreut in die Grundsubstanz befinden sich in allen drei Arten Zellen, die Knorpelzellen oder Knorpelkörperchen, welche den Bindegewebskörperchen analog sind. Diefelben stellen rundliche oder ovale, häufig abgeplattete oder spinelförmige Zellen dar, deren Auscheidungen an der Oberfläche nach und nach verdickt wird. Diese secundären Schichten, Knorpelkapseln, verschmelzen allmählich mit der Grundsubstanz, so daß man sie von dieser nicht mehr trennen kann. Die Vermehrung der Zellen geschieht durch endogene Bildung, wobei zugleich die Grundsubstanz mit zunimmt, und wodurch das Wachsthum des Knorpels bewirkt wird.

Zu den hyalinen Knorpeln gehören die Knorpel des Kehlkopfs, mit Ausnahme des Kehlkopfs und der Santorinischen Knorpel, ferner die der Luftröhre und Bronchien, der Nase, der Rippen, sowie die knorpeligen Ueberzüge der Gelenkflächen der Knochen.

Die weichern und elastischen Fasernorpel finden sich weniger häufig als der hyaline Knorpel, in größerer Menge nur in den Zwischenwirbelbändern und sonst in einigen kleinern Gebilden.

Noch beschränkter in seinem Vorkommen ist der Reithorpel, welcher von gelber Farbe, sehr weich und elastisch ist und besonders in dem Knorpel der Gehörknöchelchen, des Ohres, Santorinischen und Weibergischen Knorpeln vorkommt.

Die Knorpel bleiben entweder das ganze Leben hindurch als solche bestehen und heißen dann Cartilages permanentes, oder sie verfallen nach und nach, indem sich die Zellen und die Grundsubstanz mit Kalksalzen imprägniren, in welchem Falle sie Cartilages ossificantes oder temporariae genannt werden. Hyaline Knorpel können auch in Fasernorpel übergehen, indem die homogene Grundsubstanz der erstern sich mit der Zeit zerfasert.

Der Knochen (Os) gehört zu den härtesten Gebilden des Körpers und wird in dieser Beziehung nur von den Zähnen übertroffen. Er ist von gelblich weißer Farbe, sehr fest und dabei doch elastisch, und nur in

krankhaften Zuständen, wie auch im Alter, spröde und bricht dadurch leicht. einzelnen Knochen sind untereinander zu einem Ganzen, dem Skelet, verbunden, welches Grundlage des Körpers bildet und demselben als Gerüst dient, indem es die Unterlage für alle Weichtheile abgibt. So bildet es auch welche den Eingeweiden und edlern Organen zu stützen und dieselben in ihrer Lage befestigen. Es dient es aber, indem seine Verbindungen, Bänder bewerkstelligt, beweglich sind, einen ismus dar, der den activen Bewegungen, den Muskeln, als Angriffspunkt dient und, indem dieselben bewegt, zum passiven Bewegungsorgane wird.

Eigenschaften der Knochen sind die Folge der von Bestandtheile derselben, indem in ihnen die Knochen Substanzen vorkommen. Dieselben, die Knochen, machen ungefähr zwei Dritttheile des Gewichts der Knochen aus und bestehen aus phosphorhaltigem Kalk mit Fluorcalcium, kohlensaurem Kalk, phosphorhaltiger Magnesia und Knochensalz. organischen Bestandtheile dagegen, welche dem Knochen seine Biegsamkeit und Elasticität geben, bilden einen Knorpel ähnliche Substanz, weshalb sie auch Knorpel genannt werden; derselbe ist von feinen Gefäßen, Fett- und Bindegewebe durchzogen und bildet die erste Anlage und Grundlage der Knochen. Knochen Substanz ist nicht nur in verschiedenen Theilen des Körpers verschieden, sondern auch in einem Knochen nicht in allen Theilen gleich. Man unterscheidet man zwei Arten der Knochen Substanz: compacte und schwammige.

compacte Knochen Substanz oder Rindenschicht (Substantia compacta oder Substantia externa) bildet die äußere Schicht der Knochen, ist dicker und weniger glatt, von dichtem Gefüge und abweichend, an der Oberfläche beginnenden feinen Gefäßen, in welchen die ernährenden Gefäße verlaufen, durchsetzt. Die compacte Substanz ist an den Enden der langen Röhrenknochen am dicksten, und sie gegen die Enden hin immer dünner wird, endlich an den mit Knorpel belegten Gelenken in eine Knochenhaut übergeht. An den breiten Knochen bildet die compacte Substanz zwei Tafeln, und sie die kurzen nur in einer sehr dünnen Schicht überzieht oder, wie an den Körpern der Wirbel, fehlt.

schwammige Knochen Substanz oder Markkammer (Substantia spongiosa oder Substantia interna) bildet das Innere der Knochen und grenzt sich an compacte Substanz an. Sie besteht aus zahlreichen Knochenblättern, die sich vielfach und in allen Richtungen kreuzen, so daß ein Gefüge von Knochen und Blättern, von Lücken und Hohlräumen entsteht, das einem gewöhnlichen Bienenstock nicht unähnlich ist. Vereinen sich mehrere Räume der schwammigen Substanz zu einer größeren, wie im Innern der Röhrenknochen, so bildet die Markhöhle, welche mit der Markhaut ausgekleidet und vom Knochenmark erfüllt ist. Bei sich in flachen Knochen die schwammige Substanz zwischen zwei compacten Knochenplatten, so heißt sie Lamelle.

Die Unterabtheilung der schwammigen Substanz ist die zellige oder netzförmige Knochen Substanz (Substantia reticularis oder Substantia reticularis), welche nur durch größere Feinheit der Blätter und Knochen auszeichnet und vorzüglich in den Gelenken und kurzen Knochen vorkommt.

Was die feinere Structur der Knochen betrifft, so finden wir, daß dieselben aus einer festen Grundsubstanz bestehen, welche von den unorganischen Bestandtheilen imprägnirt ist und sich in concentrischen Schichten um die Gefäßkanäle lagert, welche seltener auch Markkanäle heißen und nach dem englischen Anatomen Clopton Havers den Namen Havers'sche Kanäle (Canaliculi Haversiani) führen. Diese Havers'schen Kanäle finden sich in allen Knochen und sehen nur in sehr dünnen Knochenblättern, wie in der Lamina papyracea des Siebbeins. In den langen Röhrenknochen laufen sie mit der Längsachse parallel.

Zwischen den Lamellen dieser concentrischen Schichten der Grundsubstanz sieht man unter dem Mikroskop gleichmäßig vertheilt zahlreiche Lücken und Hohlräume, die sogenannten Knochenkörperchen (Corpuscula ossium oder Lacunae ossium) von spinel- oder linsenförmiger Gestalt, deren Größe 0,01—0,24" in der Länge, 0,003—0,006" in der Breite und 0,002—0,004" in der Dicke beträgt. Derartige Knochenkörperchen, die stets mit ihrer Breitseite den Oberflächen der Lamellen parallel stehen, kommen im Mittel 900 auf ein Quadrat-Millimeter. Von diesen Knochenhöhlen strahlen nach allen Seiten hin zahlreiche feine hohle Fortsätze aus, die entweder mit denen benachbarter Knochenkörperchen anastomosiren, oder in die Havers'schen Kanäle einmünden, auch in offener Verbindung mit den Hohlräumen der schwammigen Substanz stehen und frei, selten blind, an den Oberflächen der Knochen endigen. Stoßen sie, wie an den Gelenken, auf einen Knorpelüberzug, so gehen die einzelnen Kanäle an der Grenze bogenförmig ineinander über. Diese Fortsätze heißen Knochenkanäle (Canaliculi ossium, früher corpuscula chalcophora) und bilden ein zusammenhängendes System von feinen Röhren im Knochen, in welchen die aus den Blutgefäßen stammende Ernährungsflüssigkeit in alle Theile des Knochengewebes verbreitet wird.

Die Grundlage für diese Gebilde geben die Knochenzellen ab, welche im Innern der Knochenkörperchen liegen und dieselben entweder ganz oder nur zum Theil ausfüllen. Sie sind kleine, rundliche oder plattgedrückte Zellen, welche kernhaltig sind und aus einer dünnen Membran bestehen, die nach einigen auch die Knochenkanäle auskleiden, nach andern wiederum keine Fortsätze in dieselben schicken soll.

Ein für die Existenz des Knochens wesentliches Attribut bildet die Knochenhaut oder Knochenhaut (Periosteum). Dieselbe ist eine feste, fibröse, aus fibrilärem Bindegewebe und elastischen Fasern bestehende Haut, welche den Knochen überall, mit Ausnahme der durch Knorpel überzogenen Gelenken und der Stellen, an welchen sich Muskeln und Bänder ansetzen, überzieht. Im Gegensatz zu der die Markhöhle auskleidenden Haut, dem sogenannten Periosteum internum, wird die Knochenhaut auch Periosteum externum genannt.

Die Knochenhaut ist sehr reich an Gefäßen und Nerven, und indem sie von jenen zahlreiche Zweige an den Knochen abgibt, ist sie die Erhalterin desselben. Auch Nerven erhält der Knochen von der Knochenhaut. Durch die Havers'schen Kanäle dringen die arteriellen Blutgefäße durch die compacte bis in die schwammige Substanz, wo sie mit den durch die Ernährungsöffnungen (Foramina nutritia) — welche sich an der Oberfläche der Knochen befinden und Kanäle in denselben bilden — in das Mark gelangen und von da wiederum in den Knochen eingedrungenen Blutgefäßen anastomosiren.

Das Knochenmark (Medulla ossium) ist eine sehr

weiche gelbliche Masse, welche die Markhöhle der Knochen ausfüllt. Dieselbe besteht vorwiegend aus Fettzellen, welche von einem spärlichen, sehr gefäßreichen Bindegewebe durchsetzt sind, das gegen den Knochen zu dichter wird, ohne aber eine eigentliche, zusammenhängende Membran zu bilden, dennoch aber den Namen der Markhaut oder inneren Weinhaut (Endosteum oder Periosteum internum) erhält.

Außer den Blutgefäßen, Arterien und Venen wollen einige auch Lymphgefäße in den Knochen entbedt haben, was von andern jedoch verneint wird. Die Venen begleiten zum Theil die größern Arterien, zum Theil laufen sie aber auch für sich, namentlich die feineren Zweige, aus dem Knochen zur Weinhaut. Die Nerven verlaufen, und zwar ziemlich zahlreich, mit den größern Gefäßen, und dringen bis in die schwammige Substanz, während sie durch die Foramina nutritia bis in die Markhöhle gelangen.

In Bezug auf die Entstehung unterscheidet man zwei Arten von Knochen, primäre, welche aus einer knorpeligen Anlage hervorgehen, und secundäre, welche sich aus einem weichen Blastem herausbilden. Die meisten Knochen entstehen auf die erste Art, während der bei weitem kleinste Theil seinen Ursprung der zweiten Art verdankt.

Nach ihrer Form unterscheidet man lange, platte und dicke Knochen.

Die langen Knochen (Ossa longa), auch Röhrenknochen oder cylindrische Knochen (Ossa cylindrica) sind vorwiegend nach der Längsrichtung ausgebildet, so daß sie das Aussehen einer Röhre haben und sich überall da vorfinden, wo schnelle und ausgiebige Bewegungen herbeigeführt werden sollen. Man unterscheidet an ihnen ein Mittelstück (Corpus oder Diaphysis) und zwei Endstücke (Extremitates oder Apophyses).

Das Mittelstück ist meist von prismatischer oder cylindrischer Form, besteht fast nur aus Rindensubstanz und hat in seinem Innern eine mit Knochenmark ausgefüllte Höhle.

Die Endstücke schwellen an, sind weniger compact, indem sie fast nur aus schwammiger Substanz bestehen, welche von einer dünnen Schicht Rindensubstanz überkleidet wird, und dienen mit Knorpel bedeckt als Gelenkflächen. Im jugendlichen Zustande sind sie behufs des Wachstums durch Knorpel mit dem Mittelstück verbunden und heißen dann Epiphysen (Epiphyses), später verknöchern dieselben jedoch, so daß sie dann mit der Diaphyse ein Stück bilden.

Die platten oder breiten Knochen (Ossa plana oder Ossa lata) sind vorzugsweise in der Flächenrichtung ausgebildet. Sie dienen besonders zur Bildung von Höhlen, um wichtige Organe, wie das Gehirn, die Weidenorgane u. s. w. aufzunehmen, oder zur Anheftung vieler und starker Muskeln. Sie werden aus zwei compacten Knochen tafeln gebildet, zwischen welchen sich schwammige Knochen substanz, die sogenannte Diploë befindet. Werden lange Knochen mit zur Höhlenbildung verwendet, so zeigen sie eine breitgedrückte Form, wie die Rippen, welche die Brusteingeweide umfassen und schützen.

Die dicken Knochen (Ossa brevia oder Ossa multiformia) sind meist kurz und unregelmäßig vielseitig. Sie finden sich immer in größerer Zahl beieinander vor und werden da verwendet, wo neben einer bedeutenden Festigkeit, doch ein gewisser Grad von Beweglichkeit bezweckt wird, was dadurch erreicht wird, daß mehrere an sich nur wenig bewegliche Knochenstücke zu einer beweglichen Reihe vereinigt werden; wie wir bei der Wirbelsäule, bei den Hand- und Fuß-

wurzelknochen finden. Diese Knochen bestehen aus schwammiger Substanz und sind von einer Schicht Rindensubstanz überzogen.

An jedem Knochen finden sich bestimmte Winkel, Ränder, Erhabenheiten und Vertiefungen, welche besondere Namen führen.

Fläche (Superficies) wird jede den Knochen grenzende Ebene genannt. Ist dieselbe mehr überzogen und dient als Gelenkfläche, so heißt sie Superficies articularis oder Superficies glabra.

Ein Winkel (Angulus) wird gebildet, wenn zwei Knochenflächen mehr oder weniger schief aufeinander stoßen.

Unter Rand (Margo) versteht man die breitere Seite eines Knochen. Derselbe kann sehr verschieden sein.

Die Erhabenheiten sind sehr verschieden und werden nach ihrer Form bezeichnet mit: Kopfknochen (Capitulum), Gelenkfläche (Capitulum), wobei noch oft ein Hals (Collum) in Betracht kommt (Tuber, Tuberositas oder Trochanter), Höcker (Tuberculum), Erhabenheit (Processus), Stachel (Spina), Ast (Ramus), Fortsatz (Processus), Leiste oder Kamm (Crista), Linie (Linea).

Die Vertiefungen führen folgende Namen: Grube (Fovea, runder, Fossa, runder, Incisura), Spalte (Fissura), Loch (Foramen, Canalis).

Die Verbindung des Knochen mit dem Knochen (Nexus ossium oder Nexus ossium) findet auf die verschiedenste Art und Weise statt. Eine sehr häufige Ueberformung von den verschiedenen Verbindungen ist die Gelenkverbindung, die wir ihrer leichtesten Zusammenfassung folgen. Nach demselben hat man folgende Arten:

1. Die unbewegliche Verbindung (Ankylose).

A. Unmittelbare Synarthrose.

a. Naht (Sutura), wobei die Knochen durch einen Knochenrand in Vertiefungen des andern Knochen einrasten, wie dies zwischen den Kopfknochen der Fall ist.

α. Wahre Naht (Sutura vera), bei welcher die Knochen deutlich ausgeprägt sind.

1. Zahnnah (Sutura dentata), bei welcher die Knochen parallel laufende lange Zähne bilden, wie z. B. bei der Pfeilnaht (Sutura pectinata) des Schädels.

2. Sägenah (Sutura serrata), bei welcher die Knochen kleiner sind und mit ihren Rändern übereinander liegen, wie bei der Kranznaht (Sutura coronalis).

3. Zweignah (Sutura limbata), bei welcher die Knochen einzeln seitwärts liegen, wie bei der Lambdannaht (Sutura lambdoides).

β. Falsche Naht (Sutura spuria oder Sutura falsa), bei welcher die aneinanderliegenden Knochen ohne merkliche Vertiefungen aufeinander liegen. Sie ist:

1. Schuppenah (Sutura squamosa), bei welcher eine Knochenrand schuppenartig über den andern weggeschoben ist, wie bei der Schläfenbein.

2. Anlagerung (Harmonia), bei welcher die Knochen aneinanderstoßen, wie bei den Gesichtsknochen.

b. Einkinkung (Gomphosis), bei welcher ein Keil oder Nagel in den andern Knochen eingeklinkt ist, wie die Zähne in die Kiefer.

Mittelbare Synarthrose.

Knorpelhaft, Knorpelfuge (Synchondro- oder Symphysis), wobei zwischen zwei Knochenflächen ein Knorpel eingeschoben ist, wie an der Verbindung des Kreuzbeins mit dem Darmbeine.

Bandhaft (Syndesmosis), wobei zwei Knochen durch kurze, straff von einem zum andern zogene Bänder vereinigt sind.

Die bewegliche Verbindung, Gelenkbindung (Diarthrosis).

Straffes Gelenk (Amphiarthrosis). Dasselbe steht, wenn zwei sich berührende Knochen nurartig aneinander hin- und hergleiten können, z. B. bei den Hand- und Fußwurzelknochen.

Kroll- oder Drehgelenk (Notatio oder Trochoides), wobei sich ein Knochen nur in einem Bogen oder drittel Kreise entweder um seine eigene Achse oder um die ihm parallel liegende eines andern Knochens bewegt.

Winkels, Charnier- oder Gewerbegelekt, einwinde (Ginglymus). Dasselbe besteht darin, daß sich ein langer Knochen mit seinem Ende an ein andern immer nur in einer Ebene bewegt, wie die Fingerglieder und der Vorderarm in Oberarm.

Sattelgelenk. Dasselbe wird dadurch gebildet, daß die Gelenkflächen in einer Richtung convex in der darauf senkrechten concav gekrümmt sind, so daß die sich berührenden Knochen in zwei einander senkrechten Ebenen beweglich sind, wie z. B. Brustbein, Schlüsselbein und wie das Handwurzel-, Mittelhandwurzelgelenk des Daumens.

Freies Gelenk (Arthrodia). Dasselbe erlaubt eine Bewegung nach allen Richtungen hin, und entsteht dadurch, daß ein kugelig gekrümmter Gelenkknopf in eine gleich gekrümmte Vertiefung eingreift. Ist diese Grube sehr tief, daß sie den Gelenkknopf dicht umgreift, wie die Pfanne den Schenkelknopf, so nennt man dies ein **Kußgelenk** (Enarthrosis). Trefen von der Form der Gelenkenden, hängt beweglichkeit derselben auch von dem dabei begehenden Bandapparat ab, der seine größte Ausdehnung bei der Diarthrose erlangt. Wir finden hier ist die fibrösen Kapselbänder (Ligamenta laria) aus fibrillärem Bindegewebe, welche wie mehr oder weniger straffer Schlauch von einem Ende zum andern gehen und so die Gelenke umschließen. Ausgescheidet sind sie mit der Synovialhaut (Membrana synovialis), welche aus Bindegewebs- und elastischen Fasern mit wenigen Gefäßen und Nerven besteht. An ihrer freien, nach den Höhlen zugekehrten Fläche ist die Synovialhaut einem einfachen oder mehrschichtigen Pflasterkleid überzogen.

In der Synovialhaut wird die Gelenkschmiere (Synovia), eine dicke, fleberige, blaßgelbliche, eiweißreiche Flüssigkeit, abgesondert, welche dazu dient, die Reibung zwischen den Knochen auf sehr schon durch den die Knochen überziehenden Knorpel wesentlich verringert ist, mehr zu mindern.

Außer den Kapselbändern finden sich auch noch Kapselbänder oder Faserbänder (Ligamenta accessoria oder Ligamenta fibrosa), welche über das Gebinde von einem Knochen zum andern gehen zur Verstärkung der Kapselbänder dienen. Sie stützen die Verbindungen und schränken die Beweglichkeit der Gelenke zum Theil ein. Sie bestehen aus Bindegewebssträngen von großer Festigkeit und unter-

scheiden sich als äußere Kapselbänder (Ligamenta accessoria externa), welche meist mit den Kapselbändern verwachsen sind, und als innere Kapselbänder (Ligamenta accessoria interna), welche sich jedoch nicht an allen Gelenken finden und in der Gelenkhöhle, nur von der Synovialhaut überzogen, liegen.

An manchen Gelenken finden sich außer den Knorpeligen Gelenküberzügen auch noch Zwischen- oder Schallknorpel (Cartilagine interarticularis oder Menisci). Diefelben sind faserknorpelige Scheiben, welche in einigen Gelenkhöhlen den Gelenkflächen parallel liegen und hier elastische Unterlagen bilden, die entweder Reibung und Stoß vermindern oder die Gelenkflächen vergrößern oder vertiefen sollen. Die äußeren Ränder verwachsen mit dem Kapselbande, und so wird, wenn die Verwachsung vollständig ist, die Gelenkhöhle in zwei voneinander abgeforderte Räume getrennt, von denen jeder seine eigene Synovialhaut hat, die auch den Zwischenknorpel mit überzieht.

4. Muskelsystem.

Die Muskeln (Musculi) sind die Organe, welche die Bewegung im thierischen Körper hervorbringen. Sie werden, im Gegensatz zu den Knochen, welche die passiven Bewegungsorgane sind, und die ihnen meist zum Ursprung und Ansatz dienen, die activen genannt. Sie bilden räumlich den Haupttheil des Körpers und haben die Fähigkeit, auf Geheiß des Willens, oder durch andere Reize veranlaßt, sich zusammenzuziehen, wobei sie ihre Gestalt verändern, indem sie kürzer und so ihre Endpunkte einander genähert werden, wodurch die Distanz zwischen beiden kleiner wird, während das Volumen sich nur wenig verringert, da die Muskeln das, was sie an Länge einbüßen, an Umfang wieder gewinnen.

Die Muskeln sind von weicher Consistenz, feucht und von heller oder dunkelrother Farbe, je nach der Massenhaftigkeit der Substanz, und stellen so das Fleisch (Caro) dar. Zusammengefaßt werden sie aus größeren Bündeln (Fasciculi musculares), welche ziemlich parallel nebeneinander liegen und nur selten im Winkel aneinanderstoßen. Diese mit bloßem Auge wahrnehmbaren Bündel, welche von Bindegewebshüllen umgeben sind, die mit der den ganzen Muskel umgebenden gemeinschaftlichen Umhüllung (Vagina musculari) im Zusammenhange stehen, zerfallen wiederum in feinere Bündel, welche aus den sogenannten Muskelfasern (Fibrae musculares) bestehen. Von diesen unterscheidet man wiederum zwei Arten: die quergestreiften und die glatten Muskelfasern.

Die quergestreiften Muskelfasern, auch Muskelprimitivbündel genannt, kommen in allen durch den Willen bewegbaren, den animalischen Muskeln, ohne Ausnahme vor, sowie in einigen nicht von dem Willen abhängigen Muskeln, wie im Herzmuskel und dem obern Drittheil der Speiseröhre. Sie zeichnen sich besonders durch eine Querstreifung aus, welche die ganze Faser durchzieht. Ihre Dicke wechselt sehr und schwankt zwischen 0,25''' und 0,005'''. Ueber die Länge der Fasern sind noch die Meinungen getheilt. Nach der einen sollen, wenn auch nicht in allen, so doch in sehr vielen Fällen die Fasern die Länge des Muskels haben, dem sie angehören, nach der andern soll diese Länge geringer sein als die des betreffenden Muskels, jedoch sich mehrere Fasern aneinanderreihen müssen, um die Länge des Muskels hervorzubringen. An ihren Enden laufen die Muskelfasern spitz zu, oder, was auch vorkommt, dieselben spalten sich und greifen so ineinander.

Eine solche Muskelfaser besteht aus einer structur-

losen, sehr dünnen Hülle (Sarcolemma, oder Myolemma), welche der Zellennembran entspricht und die nur an den Muskelfasern des Herzens fehlen soll. Zu dieser Hülle befindet sich ein Inhalt, welcher die eigentliche contractionsfähige Substanz bildet und dem das quergestreifte Ansehen eigen ist. Die Frage, woher dasselbe rühre, ist noch unbeantwortet, und verschiedene Hypothesen suchen dieselbe zu lösen. Außerdem zeigen die quergestreiften Muskelfasern noch eine Längsstreifung, davon herrührend, daß der Inhalt nochmals in der Längsrichtung in höchst feine parallele liegende Fäserchen gespalten ist, die Primitivfasern oder Muskelfibrillen genannt werden. An der innern Fläche des Sarcolems finden sich auch noch in regelmäßigen Abständen längliche Kerne, Sarcolemerne, die Ueberbleibsel der früheren Zellkerne.

Die glatten Muskelfasern, auch muskulöse oder contractile Faferzellen genannt, kommen nur da vor, wo vom Willen unabhängige Bewegungen stattfinden, mit Ausnahme des Herzens und des obern Drittheils des Oesophagus, wieschon oben erwähnt wurde. Sie treten nie in so großen Massen auf, wie die quergestreiften Muskelfasern, und bilden stets einen integrierenden Bestandteil anderer Organe, als welcher sie den Namen organische Muskeln führen. Dieselben finden sich in den Muskelhäuten des Verdauungscanals vom untern Drittheil der Speiseröhre angefangen bis zum After, ferner in den Harnleitern, der Harnblase, den Samenbläschen und der Gebärmutter, sowie in der Iris, der Gefäßhaut des Auges, in den Bronchien der Lunge bis in deren feinste Verzweigungen, den Ansführungsgängen vieler Drüsen, in den Blutgefäßen, der Brustwarze, der Hautoberfläche des Hodens und endlich in der Leberhaut, soweit dieselbe behaart ist, indem die Muskelfasern zu ein bis zwei Bündeln vereinigt sich daselbst an die Haarbälge ansetzen und die Talgdrüsen umfassen.

Die glatten Muskelfasern sind spindelförmige, cylindrische oder leicht abgeplattete, rhombenförmige Fasern, die stets nur einen Kern enthalten und vollständige Zellen darstellen, die eine Länge von 0,02" bis 0,04" und eine Breite von 0,002" und darüber besitzen. Zellennembran und Inhalt sind innig miteinander verschmolzen und lassen nur selten einen Unterschied erkennen. Von den quergestreiften Muskelfasern unterscheiden sie sich zunächst durch den Mangel der Querstreifung und dann durch die bedeutend größere Kürze und Schmalheit.

Die contractilen Faferzellen können entweder einzeln und zerstreut vorkommen, oder sie werden gleichfalls durch lockeres Bindegewebe, dem elastische Fasern beigemengt sind, zu Muskelbündeln vereinigt und bilden dann entweder glatte Stränge oder Muskelhäute, wie wir sie vorzugsweise und besonders entwickelt im Verdauungscanal finden.

Bedarf seiner Ernährung, die bei der starken Thätigkeit eine sehr ergiebige sein muß, besitzt der Muskel zahlreiche Blutgefäße, die in geradem Verhältnisse zur Größe desselben stehen. Dagegen sind Lymphgefäße nur spärlich vorhanden und fehlen an kleineren Muskeln gänzlich.

Nerven, die die Thätigkeit des Muskels anregenden Organe, kommen in jedem Muskel vor, stehen aber in keinem Verhältnisse zur Größe desselben, denn kleine Muskeln können sehr zahlreiche Nerven besitzen, während umgekehrt große nur wenige haben. Ueber die Endigung der Nervenfasern in den Muskeln sind die Meinungen noch sehr getheilt und herrschen darüber vielfache, sich oft widerprechende Ansichten. Empfindungsnerven besitzt der Muskel nur wenige.

Außer nach ihren histologischen Eigenschaften nachdem quergestreifte oder glatte Fasern sind, oder nach ihren physiologischen, wobei natürliche oder unwillkürliche Thätigkeit ins Spiel wird, kann man die Muskeln nach ihrer mechanischen Erscheinung einteilen. Man unterscheidet zwei Hauptgruppen, und zwar solche und hohle Muskeln. Die soliden Muskeln unterscheiden sich je nach der Dimension, in welcher sie ausgebildet sind. Danach hat man:

Lange Muskeln (Musculi longi), bei denen besonders die lineare Ausdehnung vorherrscht, können wiederum einfache, in denen die Fasern weniger parallel laufenden Fasern gemischt springen und auch so wieder enden, oder ganz geflecht sein, je nachdem sie entweder ganz springe- oder Ansatstellen haben. Die langen kommen vorzugsweise an den Extremitäten vor.

Breite oder flächennuskeln (Musculi latissimi) mit vorwaltender Ausdehnung in die Breite. Es sind meist dünne, flache Muskeln, größerer Ausdehnung oder mit einzelnen Fasern den Knochen entspringen.

Dicke Muskeln (Musculi crassi), bei denen die Längsrichtung vorherrscht, dagegen weniger die Mächtigkeit stärker ausgedehnt.

Schließ- oder Ringmuskeln (Musculi anulares oder Sphincteres), welche aus kreisförmig einander gelagerten Fasern bestehen, meist von Mächtigkeit sind und gewisse natürliche Oeffnungen des Körpers, die sie durch ihre Zusammenziehung schließen können, umgeben. Dieselben nähern sich unwillkürlichen Muskeln und stehen auch mit Knochen in Verbindung, wie z. B. der Muskel des Mundes.

Die Hohluskeln sind meist unwillkürliche Muskeln. Sie kommen in so großen Massen vor, daß andern Muskeln und bilden meist Häute, die eine große flächenausdehnung. Nur im Herzen ist ein soliderer Hohlmuskel entgegen.

An den willkürlichen Muskeln unterscheiden wir wiederum verschiedene Theile, und zwar:

Den Kopf (Caput), das obere Ende, welches an einen festen oder relativ festern Punkt entspringt; oder Befestigungspunkt (Punctum fixum oder adhaesiones, Origo) ansetzt;

den Bauch (Venter), den mittlern Theil, der durch einen schnitt, der die eigentlichen muskulösen Theile stellt; und

den Schwanz (Cauda), das untere Ende, welches sich an einen beweglichen Punkt, den Ansatz (Punctum mobile oder insertio), der durch Zusammenziehung der Muskelfasern dem Ursprung genähert wird und so die passive Bewegung bringt, ansetzt.

Hat ein Muskel mehr als einen Kopf, so heißt er mehrköpfig (zwei- oder dreiköpfiger Muskel, Musculus biceps oder triceps u. s. w.). Köpfe zadenförmig, so heißen sie Zähne (Dentes oder Digitationes); ist der Bauch dagegen so breit, so heißt der Muskel mehrbändig (Digastri biverter). Setzen sich die Muskelfasern nicht zusammen, sondern treten sie schräg an einander heran, so wird der Muskel, wenn die Fasern an beiden Seiten der Sehne liegen, diese also zwischen sich gestiebt (Musculus pennatus) genannt, und sie sich dagegen nur an einer Seite der Sehne befinden, so heißt der Muskel halbgestiebt (Musculus semipennatus). Auch die Ansätze können ganz verschieden sein, in welchem Falle man dann einen mehrfachen

e I (Musculus bicaudatus oder tricaudatus u. s. w.) beid.

nach ihrer Wirkung werden die Muskeln ein-; danach unterscheidet man: zusammenwirkende Muskeln (Socii), welche, itig in Thätigkeit gesetzt, eine gemeinschaftliche ung hervorbringen.

Gegenwirkende Muskeln (Antagonistae), an entgegengesetzten Punkten liegend, in Thätig- setz, auch eine entgegengesetzte Wirkung hervor- n, wie z. B. Beuger und Strecker. Contrahiren gleichzeitig, so heben sie sich in ihrer Wirkung eig auf.

Muskeln, welche Theile in der Längsrichtung ein- nähern, heißen Beuger (Flexores), dagegen ter, wenn sie die Theile in derselben Richtung ander entfernen.

Wenn die Muskeln die einzelnen Theile der Mittel- des Körpers oder der Mittellinie eines Gliedes, den sie Anzieher (Adductores) genannt, ent- sie dieselben dagegen von der Mittellinie, so sie Abzieher (Abductores). Muskeln, welche Theil um seine eigene Achse oder um einen Theil als Achse in einem mehr oder weniger Kreisabschnitt bewegen, führen den Namen auskeln (Rotatores), und zwar, wenn die Be- z nach innen, nach der Mittellinie des Körpers stinbet, Wortwärtsdrehen (Pronatores), Rück- dreher (Supinatores) dagegen, wenn die Be- z nach außen hin ausgeführt wird.

Die Muskeln stehen eine Anzahl von Hülf- n in Verbindung, die zum größten Theil aus und elastischem Gewebe bestehen und deren ung in der mechanischen Wirkung derselben be- Es sind:

Fibröse Hülforgane. Ihrer Hauptmasse ach bestehen dieselben aus Bindegewebsfasern, ie zu einem dichten und festen Ganzen sich ver- inen und so mit einer gewissen Beugsamkeit eine rose Haltbarkeit verbinden. Je nach der Form, i welcher diese fibrösen Hülforgane sich zeigen, erterscheidet man:

1) Fleschen, Sehnen (Tendines). Dieselben stellen strangförmige Organe dar, welche die Endpunkte der Muskeln mit den Knochen ver- binden. Durch dieselben kann der Muskel auf sehr weit von seinem Ursprunge gelegene Punkte wirken und leicht eine andere Richtung durch Rollen (Retinacula) gegen den zu bewegenden Theil erhalten.

2) Fibröse Häute (Aponeuroses Fasciae, Tun- nicae fibrosae). Diese bilden breite, dünne Sehnen, welche an den Enden flacher Muskeln vorkommen, oder sie stellen sehnige Häute dar, welche theils alle Muskeln eines Gliedes oder größere Muskelpartien und auch einzelne Mus- keln einhüllen, um diese besser in ihrer Lage zu erhalten, theils aber auch Muskeln zum Ur- sprunge dienen. Die Scheidenwände, welche von den Muskeln umgebenden Häuten zwischen die einzelnen Muskelgruppen eindringen und sich an den Knochen anheften, heißen Zwischen- muskelbänder (Ligamenta intermuscularia).

3) Fibröse Sehnenscheiden (Vaginae tendinum fibrosae). Dieselben bilden Röhren, in denen die Fleschen geschützt und in unverrückbarer Richtung laufen; sie hängen mit der Knochenhaut zusammen und sind mit einer Synovialblase ausgekleidet.

4) Faserknorpelige Platten, Scheiden oder

Rinnen. Dieselben haben zum Zweck, die Reibung der Sehnen zu verhindern; sie befinden sich des- halb da, wo diese dicht über Knochen gehen und eine veränderte Richtung erhalten.

3) Synovialblasen. Dieselben sind in ihrem Bau und in ihrem Zweck ganz den Synovial- häuten der Gelenke analog und kommen da vor, wo Muskeln oder Sehnen an Knochen, Knorpeln, faserknorpeligen Scheiden aneinander hin- und her- gleiten, damit dieselben sich nicht gegenseitig reiben. Man unterscheidet zwei Arten von Synovialblasen:

a) Schleimbeutel (Bursae mucosae oder Bursae synoviales), welche einfache rundliche, mit Gelenkschmiere (Synovia) gefüllte Kapseln darstellen. Dieselben liegen meist zwischen Knochen und Muskeln oder zwischen Knochen und Sehnen und dienen den letztern vorzugsweise als elastische Unterlage, um namentlich bei Bewegungen die Reibungen der Theile an- einander zu verringern.

b) Schleimscheiden der Sehnen (Vaginae tendinum mucosae oder Vaginae tendinum synoviales), welche längliche, cylindrische, mit Synovia gefüllte Schläuche bilden, durch welche ein Kanal läuft, in welchem die Sehne liegt, sodas sie mit Leichtigkeit ohne große Reibung in demselben hin- und herbewegt werden kann.

5. Gefäßsystem.

Gefäße (Vasa) im weitern Sinne heißen alle im Körper vorkommenden hohlen Röhren, welche Flüssig- keiten führen. Dieselben sind vielfach verzweigt und unterscheiden sich je nach ihrem Inhalt in Blut-, Lymph-, Chylus-, Gallen-, Samen- u. s. w. Gefäße. Im engern Sinne versteht man unter Ge- fäßen dagegen nur die Blut- und Lymphgefäße.

Die Blutgefäße (Vasa sanguifera) bilden ein geschlossenes Röhrensystem und stehen alle miteinander in Verbindung. In ihnen befindet sich das Blut, welches durch die Thätigkeit des Herzens, das den Mittelpunkt des Gefäßsystems bildet, in einer ununter- brochenen Bewegung, dem Kreislauf, und zwar dem großen und kleinen Kreislauf, erhalten wird.

Man unterscheidet drei Arten von Blutgefäßen: Puls- oder Schlagadern (Arteriae), Blutadern (Venae) und Haargefäße (Vasa capillaria).

Die Pulsadern führen das Blut vom Herzen zu allen Theilen des Körpers. Die Blutadern leiten dasselbe wieder zum Herzen zurück, während die Haar- gefäße die feinsten Verzweigungen darstellen, welche die Verbindung zwischen Arterien und Venen ver- mitteln.

Die Lymphgefäße (Vasa lymphatica, auch Vasa absorbentia oder resorbentia), stehen mit dem Blut- gefäßsystem in Verbindung und führen eine weißliche Flüssigkeit, die Lymphe, welche sie in das Venenblut ergießen. Eine Unterabtheilung der Lymphgefäße bilden die Chylusgefäße (Vasa chylosa), welche den Speise- saft (Chylus) führen.

Alle Gefäße sind cylindrische Röhren, deren runde Oeffnungen (Lumina) sehr verschiedne große Durch- messer haben. Von einem gemeinamen Stamme (Truncus) ausgehend, verzweigen sie sich in die feinsten Aeste, deren Gesamtquerschnitt jedoch größer ist als der des Stammes.

Verbindungen von Gefäßen gleicher Art, also von Arterien mit Arterien und Venen mit Venen u. s. w., finden vielfach statt. Dieselben heißen:

1) Zusammenmündungen (Anastomosen), wenn zwei Gefäße unmittelbar ineinander übergehen.

2) Adernetz (Rete vasculosum), wenn mehrere kleine Gefäßzweige in verschiedenen Richtungen zusammentreten.

3) Adergeflecht (Plexus vasculosus), wenn mehrere in paralleler Richtung nebeneinanderlaufende Gefäße durch Anastomosen unter sich in Seitenverbindungen stehen.

Alle Gefäße, mit Ausnahme der Capillaren, bestehen aus concentrischen Schichten, von welchen man bei Arterien und Venen drei Lagen unterscheidet, und zwar:

a) Die innere Gefäßhaut (Tunica intima, auch Tunica glabra vasorum), welche aus elastischen Fasern besteht, die in der Längsrichtung des Gefäßes aneinander gelagert sind. Auf der freien Innenfläche ist die Tunica intima mit Pflasterepithel bedeckt.

b) Die mittlere Gefäßhaut, Ringfaserhaut (Tunica media). Dieselbe enthält vorzugsweise glatte Muskelfasern, welche senkrecht zur Längsrichtung an der Gefäßwand verlaufen. Außerdem finden wir hier noch elastische Faserneße sowie auch Bindegewebe, Gefäße und Nerven.

c) Die äußere Gefäßhaut (Tunica externa oder Tunica adventitia). Diese besteht vorzugsweise aus Bindegewebe mit elastischen Faserneßen, welche mit einem reichlichen Capillargefäßnetz versehen und durch lockeres Bindegewebe mit den benachbarten Organen verbunden sind.

Die kleinern Blutgefäße, welche die größern beaufsichtigen, heißen Gefäße der Ernährung derselben umstriden, heißen Gefäße der Gefäße (Vasa vasorum) und entspringen stets von benachbarten Gefäßen, aber niemals von dem zu ernährenden Gefäße selbst, und durchsetzen die äußere und mittlere Gefäßhaut, um an der äußern Fläche der innern Haut zu endigen.

Außer diesen allgemeinen Eigenschaften finden sich an einzelnen Theilen des Gefäßsystems auch noch besondere, die bestimmte Provingen charakterisiren.

Den Centralpunkt des ganzen Gefäßsystems bildet das Herz (Cor), ein hohler Muskel aus quergestreiften Fasern, die jedoch, wie schon oben erwähnt, nicht unter dem Einflusse des Willens stehen. Dieselben treten zu schmalen Bündeln zusammen, die sich wiederum in der verschiedensten Weise und in oft sehr verschlungenen Bahnen untereinander kreuzen. Zwischen den einzelnen Fasern findet sich ein spärliches Bindegewebe. Das Herz stellt einen hohlen Muskel dar, welcher durch verschiedene Scheidewände in mehrere Abtheilungen, die beiden Herzkammern mit ihren Vorhöfen, getheilt wird. Ausgekleidet wird das Herz durch eine durchsichtige oder matte Haut, das Endocardium, welche alle Theile des Herzinners überzieht und an einigen Stellen, den Einmündungen der Vorhöfe in die Kammern und an den Austrittspunkten der Schlagadern, Falten, die sogenannten Herzklappen, bildet. Das Endocardium läßt drei Schichten erkennen, eine innere aus ein- oder mehrschichtigem Pflasterepithelium, sodann eine Schicht elastischer Fasern und eine äußere unmittelbar an die Muskulatur angrenzende aus Bindegewebe, welche mit reichlichen elastischen Fasern durchsetzt ist. Außerdem finden sich im Herzfleisch noch ernährnde Gefäße sowie kleine Ganglien und Nervenfasern.

Die Schlag- oder Pulsadern (Arteriae) entspringen aus dem Herzen. Sie sind, da sie einen stärkern Druck als die übrigen Gefäße auszubalten haben, auch mit viel dickeren Wänden versehen als diese, namentlich ist die Ringfaserhaut stark entwidelt.

Je nach der Größe zeigen die Arterien verschiedene Bau, und kann man große, kleinere Arterien unterscheiden, welche letztere besonders dadurch auszeichnen, daß in der Mitte die elastischen Fasern fehlen.

Die Haargefäße (Vasa capillaria) nehmen Uebergang von den Arterien zu den Venen, in allen Theilen des Körpers, mit Ausnahme des Hörnorgewebe, mehr oder weniger dichte Gefäßnetz nach der Energie des Stoffwechsels in demselben gehen allmählich aus den sich immer mehr feinsten Arterien hervor.

Die Capillargefäße zeigen nicht verschiedene in ihrem Bau, sondern sie bestehen aus einer structurlosen, wasserhellen, zarten Haut, die aneinander gereihten Zellenmembranen, an deren oberer oder unterer Wand man noch in größeren oder kleineren Zwischenräumen längliche und ovale Kerne sieht. Diese Capillargefäßhaut ist die unmittelbare Begrenzung der Tunica intima der größern Gefäße und ihrer Innenfläche auch kein Epithel.

Die Blutadern (Venae) nehmen ihren Ursprung aus den Haargefäßen, indem dieselben zu größeren Gefäßstämmen vereinigen, die wiederum anastomosiren, bis sie die großen Venenstämmen setzen.

Da der Druck in den Venen geringer ist als in den Arterien, so sind deren Wände auch dünner als die der Arterien, die Ringfaserhaut ist schwach und eigentliche elastische Haut fehlt. In manchen Stellen bildet die Venenwand halbmondförmige, taschenähnliche Duplicationen, die zwei einander so gegenüberstehen, daß der Hohlraum centripetal gerichtet ist, so daß sie den Blutstrom staut, ausgebläht werden. In den Venen befinden sich diese Klappen, sondern in denjenigen Stellen, wo das Blut durch die Hohlraum der Blutadern oder durch Druck leicht fließen könnte.

Die Lymphgefäße, Saugadern (Vasa lymphatica oder Vasa resorbentia) gleichen in ihrem Bau den Venen, nur daß sie noch dünner sind. Sie bilden kein in sich zurücklaufendes System, denn während sie in fast allen Theilen des Körpers mit noch unbekannten Anfängen entspringen, so führen sie ihren Inhalt in das Venensystem. Der Hauptstamm bildet der Ductus thoracicus, eine besondere Art der Lymphgefäße bilden die Chylgefäße (Vasa chylifera), welche im Bau den Venen vollkommen gleich sind und sich nur dadurch auszeichnen, daß sie in der Darmwand verlaufen und die Darmzellen aufgesogenen Milchsaft zuführen.

Während ihres Verlaufs treten die Lymphgefäße ein oder mehrere mal in Lymphdrüsen (Glandulae lymphaticae) ein, verbreiten sich in denselben und laufen wiederum aus denselben heraus.

Den Inhalt der Blutgefäße bildet das Blut (Sanguis). Dasselbe ist eine verschiedenartige, dickflüssige, klebrige Flüssigkeit. Unter dem Mikroskop lassen sich in ihr zwei Elemente erkennen, die Blutkörperchen, welche theils schwachdrüthlich, theils farblos, eine wässrige Substanz, das Blutplasma, in dem das Blut sauerstoff- oder kohlensäurehaltig ist, enthalten, oder dunkelroth, und das das erste die Arterien, letzteres in den Venen des Körpers sich befindet, wird es auch arterielles und venöses Blut genannt.

Die Lymphe ist eine dem Blute ähnliche, aber von weißlicher oder schwach gelblicher

dem Blute besteht sie nur aus Plasma und Elementen, den Lymphkörperchen, welche den Blutkörperchen zum Verwechseln ähnlich sehen. In Blute hat die Lymphe gleichfalls die Färbigkeitsgerinnen gemein.

Chylus (Chylus) ist die von den Darmzotten Speiseflüssigkeit (Chymus) aufgesogene Flüssigkeit, die Farbe und Consistenz der Milch besitzt, an Fettmoleculen ist. Anfangs, ehe er die Mesenterialdrüsen hindurchgegangen ist, enthält noch wenig zellige Elemente, erst dann zeigen sie in größerer Menge, welche den Lymphkörperchen gleich sind, während der Reichtum an Leukocyten nachläßt. Keiner Milchsaft gerinnt nicht mit Blut und die Lymphe. Auf den Lymphgefäßen gelangt er mit der Lymphe in den Blutstrom, welchen er nach allen Theilen des Körpers gerichtet; für welche er die nährenden Stoffe entzieht, sich dann die einzelnen Organe assimiliren, später wieder dem Blutströme zu übergeben, dann durch die Lymphgefäße zugeführt werden.

6. Nervensystem.

Nervensystem ist die Vermittlerin zwischen der Außen- und Innenwelt, es befördert die von außen kommenden Anregungen zum Bewußtsein und läßt die Eindrücke der Sinnenwelt empfinden; es führt Befehle des Willens aus und gibt Raum zum Denken und Fühlen. Die Träger aller dieser Thätigkeiten sind das Gehirn und Rückenmark mit den Nerven, an welche sich als Hilfsorgane die Sinnesorgane anschließen. Den wesentlichen Theil bildet das Rückenmark und die Nerven.

Nervengewebe (Substantia nervosa) ist eine weiche Masse, welche entweder rein weiß oder weißlich gefärbt erscheint. Im ersten Falle heißt es weiße Substanz (Substantia alba), im letztern graue Substanz (Substantia cinerea) oder auch graue Substanz (Substantia corticalis), weil sie an der Peripherie des Gehirns liegt. Außerdem ist sie noch im Centrum des Rückenmarks, zerstreut an verschiedenen Stellen des Gehirns in den Ganglien. Die weiße Substanz dagegen bildet die Hauptmasse des Gehirns und Rückenmarks und ist das Nervensystem am häufigsten vorkommende.

Histologischen Elemente des Nervengewebes sind die feinen Fasern, Primitivfasern oder Nervenfasern genannt, und Zellen (Ganglienzellen). Nervenfasern kommen besonders in der weißen Substanz, die Primitivfasern überwiegend in der grauen Substanz.

Nervengewebe (Substantia nervosa) bilden den Theil des Nervensystems und überwiegen weit an Zahl. Sie sind feine runde Fäden von 0,001—0,01 Durchmesser und entweder marklos oder markig.

In den markhaltigen, sogenannten dunkel gefärbten Fasern kann man drei Theile unterscheiden: die Scheide, von dieser umgeben das Mark, in dessen Innern sich der Achsencylinder befindet.

Die marklosen Fasern unterscheiden sich von den markhaltigen dadurch, daß das Rückenmark fehlt und die Scheide den Achsencylinder unmittelbar umgibt. Die marklosen Fasern kommen besonders an den peripherischen Enden der Nerven vor, als Verlängerung der Nerven, sowie im Geruchs- und Geschmacksnerven.

Die Nervenzellen, auch Ganglienzellen (Cellulae nervae) sind runde oder ovale Zellen, meist mehr oder weniger abgeplattet, welche oft einen oder auch mehrere Fortsätze haben, durch welche sie mit Nervenzellen in Verbindung stehen. Die Zellen bestehen aus einer wasserhellen structurlosen Membran und einem körnigen, zum Theil pigmentirten Inhalte, in welchem sich ein Zellkern mit einem, selten mehreren dunklen Kernkörperchen befindet. Die Größe der Zellen variiert zwischen 0,003—0,06.

Das Gehirn und Rückenmark wie die Nerven werden von bindegewebigen Hüllen umgeben, die an verschiedenen Stellen einen andern Charakter tragen.

Im Gehirn und Rückenmark werden die Primitivfasern durch eine feine Bindegewebshülle, den Neuroglia (Neuroglia) zusammengehalten. Als Ganzes sind diese Organe in drei Hüllen eingehüllt: in die harte Hirnhaut und Rückenmarkshaut (Dura mater), die Spinnwebhaut (Tunica arachnoidea) und in die weiche Hirnhaut und Rückenmarkshaut (Pia mater), welche letztere unmittelbar Gehirn und Rückenmark umgibt, in alle Vertiefungen sich einsenkt und zahlreiche Fortsätze in die Substanz dieser Organe entsendet.

Jeder Nerv wird gleichfalls von einer bindegewebigen Hülle, der Nervenscheide (Neurilemma), umhüllt, die wiederum auch die einzelnen Faserbündel eines Nervenstammes umgibt und Fortsätze zwischen die einzelnen Nervenzellen sendet.

An Gefäßen ist die Nervensubstanz überaus reich, namentlich finden dieselben sich am dichtesten in der grauen Substanz, wo sie ein feines garteres Netz bilden.

Nach der Art der Function unterscheidet man das Cerebrospinalnervensystem, welches mit dem Willen in Connection steht sowie die Sinnes- und Denkfähigkeit vermittelt, und das sympathische Nervensystem, welches allen vegetativen und der Willkür nicht unterworfenen Functionen vorsteht.

An diesen Systemen unterscheidet man wiederum einen centralen und einen peripherischen Theil. Für das Cerebrospinalnervensystem, oder wie es auch als Haupttriebfeder des animalischen Lebens genannt wird, das animale Nervensystem ist, wie schon der Name andeutet, das Gehirn und Rückenmark der Centraltheil, während die von diesen ausgehenden Nerven, lange, dünne, graulich-weiße Stränge von ziemlicher Festigkeit, die sich durch den ganzen Körper verbreiten und das Cerebrospinalnervensystem heißen, den peripherischen Theil desselben bilden.

Für das sympathische Nervensystem sind die Ganglienknoten Centraltheil, und die aus diesen entspringenden Nerven bilden den peripherischen Theil.

7. Hautsystem.

Im allgemeinen versteht man unter Häuten alle in die Fläche ausgebreiteten weichen Theile des Körpers; hier haben wir es nur mit vier besonders Arten zu thun: den serösen Häuten (Membranae serosae), den Synovialhäuten (Membranae synoviales), den Schleimhäuten (Membranae mucosae) und den Gefäßhäuten (Tunicae vasculosae). Die Beschreibung dieser Häute ist zu sehr Gegenstand der Histologie, als daß wir hier näher darauf eingehen könnten, indem wir diese nur soweit berühren können, als sie zum Verständniß des Folgenden nothwendig ist.

8. Drüsen-system.

Drüsen (Glandulae) sind Organe von sehr verschiedenem Bau, welche den Zweck haben, aus dem

Blute, weshalb sie auch stets reich mit Gefäßen durchsetzt sind, gewisse Stoffe abzusondern, die entweder als Auswurfstoffe (Excreta) aus dem Körper gänglich entfernt wie Harn, Schweiß u. s. w., oder auch zu gewissen Verrichtungen im Organismus verwendet werden sollen, wie Milch, Galle u. s. w., und deshalb Absonderungsstoffe (Secreta) heißen.

Die Elemente der Drüsen bilden Zellen mit ihren verschiedenen Metamorphosen, und bilden dieselben meist Bläschen oder schlauchförmige Organe. Eine rationelle Eintheilung der Drüsen ist bis jetzt noch nicht gelungen, vom praktischen Standpunkte kann man folgende Arten aufstellen:

1. Drüsen ohne Ausführungsgänge und
 2. Drüsen mit Ausführungsgängen.
- Letztere kann man wiederum eintheilen in
- a. Schlauchförmige oder tubulöse Drüsen, welche wiederum sein können:
 - α. einfach, d. h. aus einem einzigen Schlauch bestehend (Schweißdrüsen, Ohrschmalzdrüsen u. s. w.),
 - β. zusammengesetzt mit verzweigten Röhren (Nieren, Hoden, Leber u. s. w.);
 - b. Traubenförmige oder acinöse Drüsen, auch diese sind wiederum:
 - α. einfach, indem ein unverästelter Ausführungsgang mit einer Gruppe von Drüsenbläschen besetzt ist (Schleimdrüsen, Talgdrüsen u. s. w.),
 - β. zusammengesetzt, indem mehrere einfache traubenförmige Drüsen in einen gemeinsamen Ausführungsgang zusammen eintreten (Speicheldrüsen, Milchdrüsen, Thränenrüsen u. s. w.).

Specielle Anatomie.

Wir haben schon in der Einleitung des Ausdrucks specielle Anatomie gedacht und gezeigt, was darunter zu verstehen sei. Bei dem Zwecke, den wir zu verfolgen haben, kann an ein strenges Einhalten der durch die Schule festgesetzten Normen nicht gedacht werden, wir müssen vielmehr immer die praktische Anordnung der logischen Schärfe vorziehen und nach diesem Grundsatz unsere Wege einschlagen. So wird ein durchaus systematischer Gang sich nicht wohl einhalten lassen. Es würde den Laien nicht nur ermüden, sondern auch tödlich langweilen, sollte er sich jeden Muskel mit seinem Ursprung und Ansatz, jedes Gefäß mit seinen Zweigen und Zweigeln, jeden Nerven mit seinem Verlauf vorzählen lassen. Wir übergehen daher alles, was reines Gedächtniswerk ist, ohne wenigstens durch eine gewisse Bedeutung bemerkenswerth zu werden, und die streng wissenschaftliche Klassifikation, als für unsern Fall unstatthaft, verlassend, suchen wir die systematische mit der topographischen Anatomie zu verbinden, wodurch das Interesse angeregt wird, ohne der Klarheit und dem Verständniß zu schaden.

So werden wir zunächst Knochen und Bänder systematisch betrachten, weil sie die morphische Grundlage des ganzen Körpers bilden und nur bei einem klaren Einblick in das Skelet die Form und Anordnung der übrigen Theile verständlich wird. Diese Theile aber wiederum ist es für den Laien von Wichtigkeit in ihrem Nebeneinander und in ihren Beziehungen zueinander kennen zu lernen, und nicht künstlich getrennt und einseitig gruppiert, wie es die systematische Anatomie thut, und wie es notwendig ist, will man Schüler der Anatomie ziehen, die ein wissenschaftliches Studium aus derselben machen. Dem Laien kommt

es darauf an, einen allgemeinen Einblick in die Architektur des menschlichen Körpers zu erhalten, aber jeden einzelnen Baustein kennen zu lernen, halb haben wir im übrigen die topographische Betrachtung der durchweg systematischen Vorarbeiten auch dabei der Ursprung und Ansatz eines Theils der Verlauf eines Gefäßes oder eines Nerven ganzes Länge nicht immer so klar, als man die Theile für sich allein vorgeführt würden, so ist wiederum nur auf diese Weise das Rekeniren Theile verständlich, und dies ist es, was die weitere Kreise von Interesse sein und sein kann.

Knochenlehre.

Die Knochenlehre, Osteologia (von *ὀστέον*, der Knochen, und *λέγω*, lehre), lehrt den Gegenstand die feste Grundlage des menschlichen Skelet, sowohl als Ganzes wie in dessen Theilen. Die Zahl dieser Theile wird sehr verschieden angegeben, je nachdem man mehrere Theile einem Knochen gehörend zusammenfaßt oder ständige Knochen bestehen läßt. Sieht man das Schädelsknochen als einfache Knochen an, so man die Zahl der einzelnen Theile auf 22, wobei die Zähne und Gehörknöchelchen mitgezählt werden.

Tafel 1.

Das Skelet, Gerippe, *skeleton* etc. (von dem Griechischen *σκάλεω*, Schenkelbau, als der bedeutendste Theil dem Ganzen gegeben), ist entweder ein natürliches, *skeleton naturale*, wenn es noch durch die natürlichen Bänder verbunden ist, ein künstliches, *skeleton artificiale*, wenn künstliche Verbindungsmittel zusammengehalten werden.

Das Skelet zerfällt in den Stamm und die Extremitäten; ersterer wiederum in den Kopf und die Extremitäten: Beine.

Figur 1. Skelet von vorn.

- Stamm:
- Kopf, *caput*.
1. Schädelsknochen, *ossa cranii*.
 1. Os frontis, Stirnbein.
 2. Os parietale, Scheitelbein (rechtes).
 3. Os temporum, Schläfenbein (rechtes).
 4. Ala magna ossis sphenoidalis, große des Keilbeins.
- Gesichtsknochen, *ossa faciei*.
5. Os maxillare inferius oder mandibuläres Kieferbein.
 6. Os maxillare superius, Oberkieferbein.
 7. Os zygomaticum, Wangen- oder Backenbein (rechtes).
 8. Ossa nasalia, Nasenbeine.
- Rumpf, *truncus*.
- Wirbelsäule, *columna vertebralis* oder *spina vertebralis*.
9. Vertebrae colli oder cervicis, Halswirbel.
 10. Vertebra dorsi oder thoracis primae, Brustwirbel.
 11. Vertebra dorsi duodecima, zwölfte Brustwirbel.
 12. Vertebra abdominis oder lumbalis prima, Lendenwirbel.
 13. Vertebra abdominis quinta, fünfte Lendenwirbel.
 14. Os sacrum, Kreuz- oder heiliges Becken.
 15. Costa prima, erste Rippe.

Costa duodecima, zwölfte Rippe.

Sternum, Brustbein.

n, pelvis.

Os ilei oder ileum, Darmbein.

Os pubis, Schambein.

Os ischii, Sitzbein.

Extremitäten.

Brachia.

Alter.

Clavicula, Schlüsselbein.

Scapula, Schulterblatt.

Arm.

Os humeri oder brachii, Oberarmknochen.

Antibrachium, Unterarm.

Radius, Speiche.

Ulna, Ellenbogenbein.

Hand, manus.

Ossa carpi, Handwurzelknochen.

Ossa metacarpi, Mittelhandknochen.

Ossa digitorum oder phalangum, Fingergliederknochen.

Beine.

Obersehenkel.

Os femoris oder femur, Oberschenkelknochen.

Untersehenkel, crus.

Patella, Kniegabel.

Tibia, Schienbein.

Fibula oder perone, Wadenbein.

Fuß, pes.

Ossa tarsi, Fußwurzelknochen.

Ossa metatarsi, Mittelfußknochen.

Ossa digitorum pedis, Zehenknochen.

Figur 2. Skelet von hinten.

mm.

caput.

Ossa parietalia oder bregmatica, Scheitel- oder Seitenbeine.

Os occipitis, Hinterhauptbein.

Os zygomaticum, Joch- oder Wangenbein.

Os temporum, Schläfenbein.

Os maxillare, Unterkiefer.

truncus.

Wirbelsäule, columna vertebralis.

Vertebrae colli oder cervicis, Halswirbel.

Vertebra dorsi prima, erster Brustwirbel.

Vertebra dorsi duodecima, zwölfter Brustwirbel.

Vertebra lumbalis prima, erster Lendenwirbel.

Vertebra lumbalis quinta, fünfter Lendenwirbel.

Os sacrum, Kreuzbein.

Os coccygis, Schwanzbein, Steißbein.

Extremitäten, thorax.

Costa prima, erste Rippe.

Costa duodecima, zwölfte Rippe.

pelvis.

Os ilei, Darmbein.

Os pubis, Schambein.

Os ischii, Sitzbein.

Foramen ovale oder obturatorium, Hüftloch.

Extremitäten.

Brachia.

Schulter.

Clavicula, Schlüsselbein.

Scapula, Schulterblatt.

Arm.

Os humeri, Oberarmknochen.

Antibrachium, Unterarm.

Radius, Speiche.

Ulna, Ellenbogenbein.

Hand, manus.

Ossa carpi, Handwurzelknochen.

Ossa metacarpi, Mittelhandknochen.

Ossa digitorum, Fingerknochen.

Beine.

Obersehenkel.

Femur, Oberschenkelknochen.

Untersehenkel, crus.

Tibia, Schienbein.

Fibula, Wadenbein.

Fuß, pes.

Ossa tarsi, Fußwurzelknochen.

Ossa metatarsi, Mittelfußknochen.

Ossa digitorum pedis, Zehenknochen.

Figur 3. Skelet von der Seite.

Stamm.

Kopf, caput.

Schädel, cranium.

Os frontis, Stirnbein.

Os parietale, Scheitelbein.

Os occipitis, Hinterhauptbein.

Ala magna ossis sphenoides, großer Flügel des Keilbeins.

Os temporum, Schläfenbein.

Gesicht, facies.

Os zygomaticum, Jochbein.

Os nasale, Nasenbein.

Os maxillare superius, Oberkieferknochen.

Os maxillare inferius, Unterkieferknochen.

Rumpf, truncus.

Wirbelsäule, columna vertebralis.

Vertebrae cervicis, Halswirbel.

Vertebra dorsi prima, erster Rückenwirbel.

Vertebra dorsi duodecima, zwölfter Rückenwirbel.

Vertebra lumbalis prima, erster Lendenwirbel.

Vertebra lumbalis quinta, fünfter Lendenwirbel.

Os sacrum, Kreuzbein.

Os coccygis, Schwanzbein.

Brust, thorax.

Sternum, Brustbein.

Costa prima, erste Rippe.

Costa duodecima, zwölfte Rippe.

Becken, pelvis.

Os ilei, Darmbein.

Os pubis, Schambein.

Os ischii, Sitzbein.

Extremitäten.

Arme, brachia.

Schulter.

Clavicula, Schlüsselbein.

Scapula, Schulterblatt.

Oberarm.

Os humeri, Oberarmbein.

Vorderarm, antibrachium.

Radius, Speiche.

Ulna, Ellenbogenbein.

Hand, manus.

Ossa carpi, Handwurzelknochen.

Ossa metacarpi, Mittelhandknochen.

Ossa digitorum, Fingerknochen.

Beine.

Obersehenkel.

Femur, Oberschenkelknochen.

Untersehenkel, crus.

Patella, Kniegabel.

Tibia, Schienbein.

Fibula, Wadenbein.

Fuß, pes.

35. Ossa tarsi, Fußwurzelknochen.

36. Ossa metatarsi, Mittelfußknochen.

37. Ossa digitorum pedis, Behebnochen.

Figur 4. Männliches Becken von vorn.

1. Vertebra lumbalis quinta, fünfter Lendenwirbel.

2. Os sacrum, Kreuzbein.

3. Os ilei, Darmbein.

4. Os pubis, Schambein.

5. Os ischii, Sitzbein.

6. Arcus oder angulus pubis, Schambogen, Schambowinkel.

7. Promontorium, Vorgebirge.

Figur 5. Männliches Becken von oben.

1. Vertebra lumbalis quinta, fünfter Lendenwirbel.

2. Os sacrum, Kreuzbein.

3. Os ilei, Darmbein.

4. Os pubis, Schambein.

5. Arcus pubis, Schambeinfuge.

6. Promontorium, Vorgebirge.

7. Os coccygis, Schwanzbein.

8. Processus spinosus ossis ischii, Stachelfortsatz des Sitzbeins.

Figur 6. Weibliches Becken von vorn.

1—7. wie bei Fig. 4.

Figur 7. Weibliches Becken von oben.

1—8. wie bei Fig. 5.

In allen Theilen des Skelets finden sich Unterschiede zwischen dem männlichen und weiblichen Geschlechte; während es bei jenem größer, stärker und solider, ist es bei diesem kleiner, schwächer und zierlicher gebaut. Dabei sind die Knochen des männlichen Skelets durch die Ansätze und den Zug der stärkeren und kräftigeren Muskeln unebener, rauher und ediger als die glatten, leichteren und mehr abgerundeten Knochen des weiblichen Skelets.

Von besonderer Bedeutung sind die Unterschiede im Becken, indem der Mechanismus des Geburtsactes wesentlich durch die Form desselben mit bedingt wird, wodurch die Verschiedenheit des Beckens beim Mann und Weibe eine nicht geringe praktische Wichtigkeit besitzt.

Das männliche Becken ist kleiner, weniger breit, enger und tiefer als das weibliche, dabei ist der Winkel, welchen der Schambogen (arcus pubis) bildet, spitzer. Das weibliche Becken dagegen ist breiter, weiter, flacher und weniger tief, während der Schambogen einen größeren Winkel aufweist. Bedingt werden diese Unterschiede durch eine größere Breite und mehr nach hinten hinausgebogene Lage des Kreuzbeins, durch die horizontalere Stellung und größere Ausdehnung des Darmbeins, durch die bedeutendere Kürze der Sitz- und Schambeine von oben nach unten, dagegen durch eine beträchtlichere Länge in horizontaler Richtung, und durch eine größere Beweglichkeit des Schwanzbeins beim Weibe, wodurch ein umfangreicherer Innenraum des Beckens als beim Manne erzeugt wird.

Tafel 2.

Diese Tafel zeigt uns die Wirbel, vertebrae, des menschlichen Körpers in deren verschiedenen Modifikationen in der Vereinigung zum Schädel, sowie in den charakteristischen Formen der Hals-, Brust-, Lenden-, Kreuz- und Steißbeinwirbel.

Den wichtigsten Theil des ganzen Skelets bilden

die Kopfknochen, ossa capitis, 22 an der Zahl, die theils paarig, theils unpaarig sind und in 8 Schädelknochen, ossa cranii, auch cranium, calvaria, ossa capitis, theca cerebri genannt, und 14 Gesichtsknochen, ossa faciei, zerfallen.

An den Schädel schließt sich die Wirbelsäule an, welche mit den 7 Halswirbeln beginnt, auf die folgen die 12 Brust- und 5 Lendenwirbel, während das Kreuz- und Steißbein den Beschluß macht.

Figur 1. Knochengestalt des Kopfes von vorn.

A. Os frontis oder frontale, Stirn- oder Vorderhauptbein.

B. Os parietale oder bregmatis, Scheitel- oder Seitenbein.

C. Ala magna ossis sphenoidi, großer Flügel des Keilbeins.

D. Os temporum, Schläfenbein.

E. Os zygomaticum oder malare, Wangen- oder Jochbein.

F. Os maxillare superius, Oberkieferbein.

G. Os nasale, Nasenbein.

H. Os maxillare inferius oder mandibula, Unterkiefer.

I. Septum narium, Scheidewand der Nase.

K. Os turbinatum inferius oder concha inferior, untere Nasenmuschel.

L. Concha media, mittlere Nasenmuschel.

a. Sutura coronalis, Kranznaht.

b. Sutura frontalis, Stirnnaht.

c. Sutura squamosa, Schuppennaht.

d. Tuber frontale, Stirnhöcker.

e. Arcus superciliaris, Augenbrauenbogen.

f. Glabella, Stirnglatze.

g. Processus zygomaticus ossis frontis, Wangenfortsatz des Stirnbeins.

h. Margo supraorbitalis, oberer Augenhöhlenrand.

i. Foramen oder incisura supraorbitalis, Öffnung oder Einschnitt des oberen Augenhöhlenrandes.

k. Pars oder processus nasalis ossis frontis, Nasenfortsatz des Stirnbeins.

l. Crista frontalis, äußere Stirnleiste.

m. Processus nasalis maxillae superioris, Nasenfortsatz des Oberkiefers.

n. Processus zygomaticus maxillae superioris, Jochbeinfortsatz des Oberkiefers.

o. Processus alveolaris maxillae superioris, Zahnhöhlenfortsatz des Oberkiefers.

p. Foramen infraorbitale, Öffnung im unteren Augenhöhlenrande.

q. Fovea maxillaris, Kiefergrube.

r. Spina nasalis anterior, vorderer Nasenstachel.

s. Apertura pyriformis, Eingang zur turbinären Nasenhöhle.

t. Margo infraorbitalis, unterer Augenhöhlenrand.

u. Fossa sacci lacrymalis, Thränenlächgrube.

v. Juxta alveolaria, Schambeiten der Zahnhöhlen.

w. Processus maxillaris ossis zygomatici, Oberkieferfortsatz des Wangenbeins.

x. Processus frontalis ossis zygomatici, Stirnfortsatz des Wangenbeins.

y. Processus temporalis ossis zygomatici, Schläfenfortsatz des Wangenbeins.

z. Foramina zygomatica anteriora, vordere Wangenbeinöffnungen.

a. Mentum oder spina mentalis externa, Kinn- oder äußerer Kinnstachel, oder Kinnhöcker.

β. Foramen mentale oder maxillare anterius, Kinn- oder vordere Unterkieferöffnung.

γ. Angulus maxillae inferioris, Unterkieferwinkel.

ramus mandibulae, Ast des Unterkiefers.
 Processus mastoideus ossis temporum, Zigen-
 oder Warzentheil des Schläfenbeins.
 Foramen opticum, Sehnervendöffnung.
 Fissura orbitalis superior, obere Augenhöhlen-
 spalte.
 Fissura orbitalis inferior, untere Augenhöhlen-
 spalte.

2. Knochengestalt des Kopfes von der Seite.

Os frontis, Stirnbein.
 Os parietale, Scheitelbein.
 Ala magna ossis sphenoidi, großer Flügel des
 Keilbeins.
 Os temporum, Schläfenbein.
 Os zygomaticum oder malare, Wangen- oder
 Jochbein.
 Os maxillare superius, Oberkieferbein.
 Os nasale, Nasenbein.
 Os lacrymale, Thränenbein.
 Lamina papyracea ossis ethmoidi, Papier-
 platte des Siebbeins.
 Maxilla inferior, Unterkiefer.
 Tuber frontale, Stirnbeinhöcker.
 Arcus superciliaris, Augenbrauenbogen.
 Glabella, Stirnlagel.
 Processus nasalis ossis frontis, Nasenfortsatz
 des Stirnbeins.
 Margo supraorbitalis, oberer Augenhöhlenrand.
 Foramen supraorbitale, obere Augenhöhlenrand-
 öffnung.
 Processus zygomaticus ossis frontis, Wangen-
 beinfortsatz des Stirnbeins.
 Crista frontalis externa, äußere Stirnleiste.
 Linea semicircularis, halbkreisförmige Linie.
 Sutura coronalis, Kranznaht.
 Tuber parietale, Scheitelbeinhöcker.
 Pars squamosa ossis temporum, Schuppentheil
 des Schläfenbeins.
 Pars mastoidea ossis temporum, Zigen- oder
 Schläfenbeins.
 Processus mastoideus ossis temporum, Zigen-
 fortsatz des Schläfenbeins.
 Incisura mastoidea, Einschnitt des Zigenfort-
 satzes.
 Meatus auditorius externus, äußere Gehörgang-
 öffnung.
 Arcus zygomaticus, processus zygomaticus
 ossis temporum, Jochbogen des Schläfen-
 beins.
 Processus temporalis ossis zygomatici, Schläfen-
 fortsatz des Jochbeins.
 Processus frontalis ossis zygomatici, Stirnfort-
 satz des Jochbeins.
 Processus maxillaris ossis zygomatici, Ober-
 kieferfortsatz des Jochbeins.
 Foramina zygomatica anteriora, vordere Joch-
 beinöffnungen.
 Processus zygomaticus ossis maxillaris superioris,
 Jochfortsatz des Oberkiefers.
 Fovea maxillae superioris, Oberkiefergrube.
 Foramen infraorbitale, Öffnung im untern
 Augenhöhlenrande.
 Superficies temporalis ossis maxillaris superioris
 mit dem tuber maxillare, Schläfenfläche des
 Oberkiefers mit dem Oberkieferhöcker.
 Processus frontalis ossis maxillaris superioris,
 Stirnfortsatz des Oberkiefers.
 Processus alveolaris ossis maxillaris superioris,
 Zahnhöhlenfortsatz des Oberkiefers.

Ala externa processus pterygoidei ossis sphenoidi, äußerer Flügel des Gaumenflügels
 des Keilbeins.
 Corpus maxillae inferioris, Körper des Unter-
 kiefers.
 Mentum oder Spina, auch protuberantia mentalis
 externa, Kinn, äußerer Kinnstachel oder Kinn-
 höcker.
 Foramen mentale oder maxillae anterius, Kinn-
 oder vordere Unterkieferöffnung.
 Linea obliqua externa maxillae inferioris, äußere
 schräge Linie des Unterkiefers.
 Margo alveolaris und juga alveolaria maxillae
 inferioris, Zahnhöhlenrand und Zahnhöhlen-
 erhabenheiten des Unterkiefers.
 Angulus maxillae inferioris, Unterkieferwinkel.
 Processus coronoideus maxillae inferioris, Kiemen-
 fortsatz des Unterkiefers.
 Processus condyloideus maxillae inferioris, Ge-
 lenkfortsatz des Unterkiefers.
 Incisura semilunaris oder sigmoidea maxillae
 inferioris, halbmondförmiger Einschnitt des
 Unterkiefers.
 Apertura pyriformis, birnförmige Öffnung, Ein-
 gang in die Innere Nasenhöhle.
 Spina nasalis anterior, vorderer Nasenstachel.
 Fossa saci lacrymalis, Thränenfächergrube.
 Sutura squamosa, Schuppennaht.
 Sutura mastoidea, Warzennaht.
 Sutura transversa, Quernaht.

Figur 3. Äußere Fläche der Schädelbasis.

A. Processus palatinus maxillae superioris, Gaumen-
 fortsatz des Oberkiefers.
 B. Processus alveolaris maxillae superioris, Zahn-
 höhlenfortsatz des Oberkiefers.
 C. Os maxillare superius, Oberkieferbein.
 D. Pars horizontalis ossis palatini, horizontaler
 Ast des Gaumenbeins.
 E. Processus pterygoideus ossis sphenoidi, flügel-
 artiger Fortsatz des Keilbeins.
 F. Ala magna ossis sphenoidi, großer Flügel des
 Keilbeins.
 G. Vomer, Pflugschar.
 H. Pars squamosa ossis temporum, Schuppentheil
 des Schläfenbeins.
 I. Pars mastoidea ossis temporum, Zigen- oder
 Warzentheil des Schläfenbeins.
 K. Pars petrosa ossis temporum, Felsen- oder
 Schläfenbeins.
 L. Pars basilaris ossis occipitis, Grundtheil des
 Hinterhauptbeins.
 M. Pars condyloidea ossis occipitis, Gelenktheil des
 Hinterhauptbeins.
 N. Pars occipitalis ossis occipitis, Hinterhaupt-
 theil des Hinterhauptbeins.
 O. Arcus zygomaticus, Jochbogen.
 a. Foramen incisivum oder canalis incisivus.
 b. Spina nasalis posterior, hinterer Nasenstachel.
 c. Foramina palatina, Gaumenhöcker.
 d. Ala interna processus pterygoidei ossis sphenoidi, innerer Flügel des flügelartigen Fort-
 satzes des Keilbeins, nach unten in den
 hamulus pterygoideus, den flügelartigen
 Haken endigend.
 e. Fossa pterygoidea ossis sphenoidi, Gaumen-
 flügelgrube des Keilbeins.
 f. Ala externa processus pterygoidei, äußerer
 Flügel des Gaumenflügels.

- g. Choanae narium, hintere Oeffnung der Nasenhöhle.
- h. Foramen ovale ossis sphenoidi, ovales Loch des Keilbeins.
- i. Foramen spinosum ossis sphenoidi, Stachelloch des Keilbeins.
- k. Fissura orbitalis inferior, untere Augenhöhlen-
spalte.
- l. Fossa articularis, Gelenkgrube für den Gelenk-
kopf des Unterkiefers.
- m. Tuberculum articulare, Gelenkhügel.
- n. Fissura Glaseri, Glaser'sche Spalte (führt in die
Paukenhöhle).
- o. Tuba Eustachii, Eustachische Trompete.
- p. Meatus auditorius externus, äußerer Gehörgang.
- q. Aditus ad canalem caroticum, Eingang in den
Kanal der Carotis.
- r. Processus styloideus ossis temporum, Griffel-
fortsatz des Schläfenbeins.
- s. Foramen stylo-mastoideum ossis temporum,
Griffelwarzenloch des Schläfenbeins.
- t. Aquaeductus cochleae, Schneckenwasserleitung.
- u. Foramen jugulare, Drosselloch.
- v. Condylus ossis occipitis, Gelenkkopf des Hinter-
hauptsbeins.
- w. Foramen condyloideum anterius ossis occipitis,
vorderes Loch des Gelenkkopfes des Hinter-
hauptsbeins.
- x. Foramen condyloideum posterius ossis occipitis,
hinteres Loch des Gelenkkopfes des Hinter-
hauptsbeins.
- y. Processus mastoideus ossis temporum, Warzen-
fortsatz des Schläfenbeins.
- z. Incisura mastoidea ossis temporum, Einschnitt
des Warzenfortsatzes des Schläfenbeins.
- a. Foramina mastoidea ossis temporum, Warzen-
löcher des Schläfenbeins.
- ß. Spina occipitalis externa, äußerer Hinterhaupts-
stachel.
- γ. Crista occipitalis externa, äußere Hinterhaupts-
leiste.
- δ. Linea semicircularis inferior ossis occipitis,
untere halbkreisförmige Linie des Hinterhaupts-
beins.
- e. Linea semicircularis superior ossis occipitis,
obere halbkreisförmige Linie des Hinterhaupts-
beins.
- f. Processus spinosus ossis sphenoidi, Stachel-
fortsatz des Keilbeins.

Figur 4. Innere Fläche der Schädelbasis.

- A. Os frontis, Stirnbein.
- B. Ala parva ossis sphenoidi, kleiner Flügel des
Keilbeins.
- C. Ala magna ossis sphenoidi, großer Flügel des
Keilbeins.
- D. Pars squamosa ossis temporum, Schuppentheil
des Schläfenbeins.
- E. Pars petrosa ossis temporum, Felsentheil des
Schläfenbeins.
- F. Pars mastoidea ossis temporum, Warzentheil
des Schläfenbeins.
- G. Os occipitis, Hinterhauptsbein.
- H. Pars basilaris ossis occipitis, Grundtheil des
Hinterhauptsbeins.
- a. Jaga cerebrialia, Gehirnerhabenheiten (des Kno-
chens).
- b. Impressiones digitatae, Fingereindrücke.
- c. Crista frontalis interna, innere Stirnleiste.

- d. Crista galli ossis ethmoidi, Galgen-
Riechbeins.
- e. Foramina cribrosa ossis ethmoidi, Sieb-
beins.
- f. Processus clinoidi anteriores ossis sphenoidi,
Foramen opticum, Sehlloch.
- g. Processus clinoidi medii ossis sphenoidi,
Mittlerer Riechbeins.
- h. Sella turcica mit fossa pro glandula pituitaria,
Türkensattel mit der Grube für den
Hirnanhang.
- k. Processus clinoidi posteriores ossis sphenoidi,
Hinterer Riechbeins.
- l. Sulcus caroticus, Rinne für die Carotis.
- m. Fissura orbitalis superior, obere Augen-
spalte.
- n. Foramen rotundum ossis sphenoidi, rundes
Loch des Keilbeins.
- o. Foramen ovale ossis sphenoidi, ovales
Loch des Keilbeins.
- p. Foramen spinosum ossis sphenoidi, Stachel-
loch des Keilbeins.
- q. Hiatus canalis Fallopii, Oeffnung des
Fallopi'schen Kanals.
- r. Meatus auditorius internus, innerer Gehörgang.
- s. Aquaeductus vestibuli, Vorhofswasserleitung.
- t. Foramen jugulare, Drosselloch.
- u. Fossa pro medulla oblongata, Rinne für
verlängerte Rückenmark.
- v. Processus anonymus oder clinoides ossis occipitis,
Ungekannter Fortsatz des Hinterhaupts-
beins.
- w. Foramen condyloideum anterius ossis occipitis,
vorderes Gelenkkopfloch des Hinterhaupts-
beins.
- x. Foramen condyloideum posterius ossis occipitis,
hinteres Gelenkkopfloch des Hinterhaupts-
beins.
- y. Foramen mastoideum ossis temporum, Warzen-
fortsatzloch des Schläfenbeins.
- z. Foramen magnum, Hinterhauptsloch.
- a. Fossa sigmoidea, Sigmabögenförmige Grube.
- ß. Spina occipitis interna, innerer Hinterhaupts-
stachel.
- γ. Crista occipitis interna, innere Hinterhaupts-
leiste.
- δ. Foramen caecum ossis ethmoidi, hinterer
Loch des Siebbeins.
- e. Ephippium oder clivus Blumenbachii, Blumen-
bach'scher Abhang.
- f. Fossa cerebelli, Grube für das kleine Gehirn.
- g. Lingula, Züngelchen.
- h. Sulcus transversus, Querrinne.
- i. Pars condyloidea ossis occipitis, Gelenk-
theil des Hinterhauptsbeins.

Figur 5. Atlas von oben und hinten.

- a. Arcus anterior, vorderer Bogen.
- b. Arcus posterior, hinterer Bogen.
- c. Massa oder pars lateralis atlantis, Seiten-
theil des Atlas.
- d. Tuberculum atlantis posticum, hinterer
Hügel.
- e. Superficies glenoidalis, Gelenkoberfläche.
- f. Fossa condyloidea, Gelenkgrube.
- g. Processus transversus atlantis, Querfortsatz
des Atlas.
- h. Foramen vertebrale, Wirbelloch.
- i. Foramen oder Sulcus in arcu posteriore
für die Arteria vertebralis, Loch oder Rinne
im hintern Bogen des Atlas für die
Wirbelsader.

Foramen atlantis laterale, seitlicher Atlas-
höder.
Foramen atlantis spinale, Oeffnung für den Rückgrats-
kanal.

Figur 6. Atlas von unten.

Processus anterior, vorderer Bogen.
Processus posterior, hinterer Bogen.
Foramen atlantis posticum, hinterer Atlas-
höder.
Processus transversus atlantis, Querfortsatz des
Atlas.

Foramen vertebrale, Wirbelloch.
Foramen oder **Sulcus** im **arcus posterior atlantis**,
Loch oder Rinne im hintern Bogen des Atlas.
Foramen spinale, Oeffnung für den Rückgrats-
kanal.

Foramen atlantis anticum, vorderer Atlas-
höder.

Superficies articularis für den **Epistropheus**,
Gelenkoberfläche für den zweiten Halswirbel.

Figur 7. Epistropheus von vorn.

Corpus epistrophei, Körper des zweiten Hals-
wirbels.

Processus odontoideus, Zahnfortsatz.
Foramen processus odontoidei, Hals des Zahn-
fortsatzes.

Superficies glenoidalis processus odontoidei,
Gelenkoberfläche des Zahnfortsatzes.

Apex processus odontoidei, Spitze des Zahn-
fortsatzes.

Processus obliquus oder **articularis superior**,
oberer Gelenkfortsatz.

Processus obliquus inferior, unterer Gelenk-
fortsatz.

Processus transversus epistrophei, Querfortsatz
des zweiten Halswirbels.

Figur 8. Halswirbel von oben.

Corpus, Körper.

Arcus, Bogen.

Processus spinosus, Stachelfortsatz.

Incisura processus spinosi, Einschnitt im Stachel-
fortsatz.

Processus transversus, Querfortsatz.

Processus obliquus superior, oberer Gelenkfortsatz.

Foramen vertebrale, Wirbelloch.

Foramen spinale, Oeffnung für den Rückgrats-
kanal.

9. Rückenwirbel, *vertebra thoracis*, von
oben.

Corpus, Körper.

Arcus, Bogen.

Incisura vertebralis, Wirbelschnitt.

Processus spinosus, Stachelfortsatz.

Processus transversus, Querfortsatz.

Superficies articularis für das **tuberculum**
costae, Gelenkfläche für das Rippenhöckerchen.

Processus obliquus superior, oberer Gelenk-
fortsatz.

Foramen spinale, Rückgratsloch.

10. Lendenwirbel, *vertebra lumbalis*,
von oben.

— mit Ausnahme von f, wie bei Figur 9.

11. Kreuzbein, *os sacrum*, von vorn.

Processus obliqui superiores, obere Gelenk-
fortsätze.

b. **Basis ossis sacri** mit dem **Promontorium**, Grund-
fläche des Kreuzbeins mit dem Vorgebirge.

c. **Apex**, Spitze.

d. **Foramina sacralia anteriora**, vordere Kreuzbein-
öffnungen.

e. **Linea arcuata**, gekrümmte Linie.

Figur 12. Kreuzbein, *os sacrum*, von hinten.

a. **Processus obliqui superiores**, obere Gelenk-
fortsätze.

b. **Basis**, Grundfläche.

c. **Apex**, Spitze.

d. **Foramina sacralia posteriora**, hintere Kreuzbein-
öffnungen.

e. **Facies auricularis**, ohrartige Gelenkfläche.

f. **Aditus ad canalem sacralem**, Eingang in den
Kreuzbeinkanale.

g. **Exitus canalis sacralis**, Ausgang des Kreuzbein-
kanals.

h. **Processus spinosi spurii**, falsche Stachelfortsätze.

i. **Processus transversi** und **obliqui spurii**, falsche
Quer- und Gelenkfortsätze.

k. **Cornua sacralia**, Kreuzbeinhörner.

Figur 13. Steißbein, *os coccygis*, von vorn.

a. **Vertebra spuria prima**, erster falscher Wirbel.

b. " " **secunda**, zweiter " "

c. " " **tertia**, dritter " "

d. " " **quarta**, vierter " "

e. **Cavitas articularis**, Gelenkfläche für das Kreuz-
bein.

f. **Cornua coccygea**, Steißbeinhörner.

g. **Processus transversus spurius**, falscher Quer-
fortsatz.

Figur 14. Steißbein, *os coccygis*, von hinten.

a.—d., mit Ausnahme von e, sowie f und g, wie
bei Figur 13.

Alle hier vorgestellten Theile des Skelets: Schädel,
Wirbel, Kreuzbein und Steißbein, sind aus der Grund-
form des Wirbels hervorgegangen und lassen sich auf
diese zurückführen.

Wie schon erwähnt, sind die Knochen des Schädels
theils paarig, theils unpaarig. Zu erstern gehören
die beiden Scheitelbeine und die Schläfenbeine, zu
letztern das Stirnbein, Siebbein, Keilbein und Hinter-
hauptbein. Die paarigen Knochen bilden einen von
der einen Seite zur andern gehenden Ring, der nach
unten offen ist, während die unpaarigen einen in der
Richtung von vorn nach hinten gehenden und oben
offenen Ring bilden. Sonach kreuzen sich beide Ringe,
und indem sie ineinandergreifen, bilden sie die Schädel-
höhle, den Raum für das Gehirn.

Auch sämtliche Gesichtsknochen sind paarig, und
nur der Unterkiefer und das Flügelohrbein machen
eine Ausnahme davon, auch wird das Zungenbein,
os hyoideum oder *linguale*, mit zu den unpaarigen
Knochen gezählt.

Das Stirnbein.

Das Stirn- oder Vorderhauptbein, *os frontis*
oder *os frontale* (Taf. 2; 1A, 2A, 4A), am vordersten
Theile des Schädels gelegen, bildet die Stirn. Man
unterscheidet an demselben den Stirntheil, *pars*
frontalis oder *coronalis* (Taf. 2; 1A, 2A), die Augen-
höhlentheile, *partes orbitales* (Taf. 2; 4A), und den
Nasentheil, *pars* oder *processus nasalis* (Taf. 2;
1k, 2d). Das Stirnbein grenzt an die beiden Scheitel-
beine, die großen und kleinen Flügel des Keilbeins

die Jochbeine, das Siebbein, die Thränenbeine, die Oberkieferbeine und die Nasenbeine.

Der Stirntheil, pars frontalis, hat eine äußere convexe und innere concave Fläche und verbindet sich durch die Kranznaht, sutura coronalis (Taf. 2; 1a, 2k), mit den Scheitelbeinen. In der Jugend wird der Stirntheil durch die Stirnnaht, sutura frontalis (Taf. 2; 1b), in zwei Theile getheilt, auf welchen sich auf der äußeren Fläche die Stirnhöcker, tubera frontalia (Taf. 2; 1d, 2a), befinden, sowie die Augenbrauenbogen, arcus superciliares (Taf. 2; 1e, 2b), die Stirnlagze, glabella (Taf. 2; 1f, 2c), die Incisurae oder foramina supraorbitalia (Taf. 2; 1i, 2f), die oberen Augenhöhlentränder, marginis supraorbitales (Taf. 2; 1h, 2e), die Wangenfortsätze, processus zygomatici (Taf. 2; 1g, 2g), und die äußere Stirnleiste, crista frontalis externa (Taf. 2; 1j, 2h).

Die innere concave Fläche zeigt die fingerförmigen Eindrücke, impressiones digitatae (Taf. 2; 4h), und die Gehirnerhabenheiten, juga cerebralia (Taf. 2; 4a), ferner die innere Stirnleiste, crista frontalis interna (Taf. 2; 4c), und das blinde Loch, foramen caecum (Taf. 2; 4d).

Die Augenhöhlentheile, partes orbitales, liegen horizontal am untern Ende des Stirntheils, mit dem sie nahe einen rechten Winkel bilden. Sie dienen der Augenhöhle als Dach und verbinden sich mit dem Siebbein, das sich zwischen sie hineinschiebt, dem Wangenbein und den Keilbeinflügeln.

An der untern concaven Fläche befindet sich die Grube für die Thränenröhre, fovea lacrymalis, während die obere schwach convexe Fläche wiederum juga cerebralia und impressiones digitatae zeigt.

Der Nasentheil, processus nasalis, liegt zwischen den beiden Augenhöhlentheilen, und hat an seinem untern Rande die spina nasalis.

Die Scheitelbeine.

Die Scheitel- oder Seitenbeine, ossa parietalia oder hregmatis (Taf. 2; 1B, 2B), bilden den obersten Theil des Schädels; sie sind paarig und liegen zu beiden Seiten der Pfeilnaht, sutura sagittalis; Verbindungen finden statt mit dem Stirnbein durch die Kreuznaht, mit dem Hinterhauptbein durch die Lambda-naht, sutura lambdae, dem Schläfenbein durch die Schuppennaht, sutura squamosa, und mit den großen Flügeln des Keilbeins. Die Gestalt ist viereckig, die Flächen sind gewölbt und zwar mit der convergen Seite nach außen, der concaven Seite nach innen.

An der äußeren Fläche befinden sich die Scheitelbeinhöcker, tubera parietalia (Taf. 2; 2i), sowie die halbkreisförmige Linie, linea semicircularis (Taf. 2; 2i). Die Innenfläche zeigt gleichfalls die juga cerebralia und impressiones digitatae.

Das Hinterhauptbein.

Das Hinterhauptbein, os occipitis (Taf. 2; 3LN, 4G), befindet sich am hintern und untern Theile des Schädels und ist mit dem Keilbein zu dem os basilaria verbunden. Das Hinterhauptbein zerfällt in vier Theile: den Hinterhauptstheil, pars occipitalis (Taf. 2; 3N, 4G), zwei Gelenktheile, partes condyloideae oder jugulares (Taf. 2; 3M, 4I), und den Grundtheil oder Zapfentheil, pars basilaris (Taf. 2; 3L, 4H). Diese vier Theile umschließen das Hinterhauptsfloß, foramen magnum (Taf. 2; 42). Verbunden ist das Hinterhauptbein mit den Scheitelbeinen, den Schläfenbeinen, dem Keil-

bein, und zwar durch Nähte, mit dem ersten Wirbel dagegen durch ein Gelenk.

Der Hinterhauptstheil, pars occipitalis, der die hinterste Wölbung des Schädels bildet, bindet sich nach oben mit den Scheitelbeinen, er nach unten in die beiden Gelenkfortsätze, die sich mit dem ersten Halswirbel verbinden, unterscheidet an demselben eine äußere, concave innere, concave Fläche.

An der äußeren Fläche ist zu bemerken die äußere Hinterhauptsfloßstachel, spina externa (Taf. 2; 3B), und die äußere Hauptsfloßleiste, crista occipitalis externa (Taf. 2); ferner die obere halbkreisförmige Linie, linea semicircularis superior (Taf. 2; 3e), und die untere halbkreisförmige Linie, linea semicircularis inferior (Taf. 2; 3d).

Die innere Fläche des Hinterhauptstheils den innern Hinterhauptsfloßstachel, crista occipitalis interna (Taf. 2; 3B), die innere Hauptsfloßleiste, crista occipitalis interna (Taf. 2); die Grube für das kleine Gehirn, fossa cerebelli (Taf. 2; 4f), und den Querschnitt des Hinterhauptsfloßes, foramen transversum (Taf. 2; 4g).

Die Gelenktheile, Kopfstücke, partes condyloideae oder jugulares, bilden die Gelenktheile des großen Hinterhauptsfloßes und des Grund- und vor dem Hinterhauptsfloßstheil des Hinterhauptsfloßes. An den Gelenktheilen unterscheidet man eine äußere, untere, und eine innere obere Fläche.

Die untere Fläche, welche gegen die Drosseltheile des Halses gerichtet ist, weist die Gelenkköpfe, condyloidei (Taf. 2; 3v), das vordere Gelenkpfloß, foramen condyloideum anterius (Taf. 2; 3w), das hintere Gelenkpfloß, foramen condyloideum posterius (Taf. 2; 3x), den Drossel-Einschnitt, incisura jugularis, und mit einem ähnlichen Einschnitt im Jochbein, Schläfenbein das Drosselfloß, foramen transversum (Taf. 2; 3u), bildet.

Die obere Fläche der Gelenktheile des Hinterhauptsfloßes ist nach der Schädelhöhle zu gerichtet, zeigt das Drosselfloß, foramen jugulare (Taf. 2; 4t), den Ungenannten Fortsatz, processus nymus (Taf. 2; 4v), das vordere Gelenkpfloß, foramen condyloideum anterius (Taf. 2; 4x) und das hintere Gelenkpfloß, foramen condyloideum posterius (Taf. 2; 4x).

Der Grund- oder Zapfentheil, pars basilaris, des Hinterhauptsfloßes bildet den vordern Theil des Schädels und verbindet sich mit dem Körper des Keilbeins, mit dem er unzertrennlich verwachsen ist, und bildet das Grundbein, os basilaria.

An dem Grundbein unterscheidet man die obere und eine Kante, und zwar eine obere obere Fläche mit der Rinne für das vordere Rückenmark, fossa pro medulla oblongata (Taf. 2); eine untere oder äußere Fläche, welche die obere und eine Erhabenheit, den Grundhaken, basilaris (Taf. 2; 3L) trägt, eine seitliche Fläche, welche an der äußeren Fläche des Keilbeins zu dem Grundbein verwächst, und eine hintere Kante, welche den vordern Umfang des Hinterhauptsfloßes bildet.

Die Jochbeine.

Die Joch- oder Wangenbeine, ossa maxillaria oder malaria (Taf. 2; 1E, 2E), bilden die

Punkte des Gesichts und verbinden sich mit der Nase, den Schläfenbeinen, den Oberkiefern und den großen Flügeln des Keilbeins. Man findet an denselben den Körper, corpus (Taf. 2; 1, und drei Fortsätze, processus.

Der Körper, corpus, wiederum zeigt drei Flächen: eine vordere oder Gesichtsfäche, superficies facialis (Taf. 2; 1 E, 2 E), mit dem vordern Wangenbein verbundenen zygomaticum anterius oder faciale (Taf. 2; 1 z, 2 v), welches meist doppelt vorhanden ist, eine obere oder Augenhöhlenfläche, superficies superior, und die hintere oder Schläfengrubenfläche, superficies temporalis.

Fortsätze, processus, sind der obere oder Stirnsatz, processus frontalis (Taf. 2; 1 x, 2 t), welcher sich mit dem Wangenbeinsatz des Stirns verbindet, der äußere oder Schläfenfortsatz, processus temporalis (Taf. 2; 1 y, 2 s), welcher mit dem Wangenbeinsatz des Schläfenbeins verbunden ist, der Nasensatz, processus nasalis (Taf. 2; 30), bildet den Nasensatz, processus maxillaris, welcher mit dem Wangenbeinsatz des Oberkiefers verbunden ist.

Die Thränenbeine.

Thränenbeine, ossa lacrymalia (Taf. 2; 2 U), befinden sich in der vordern innern Seite der Augenhöhle gelegen, verbinden sich mit dem Siebbein, dem Stirnbein, dem Oberkieferbein und dem untern Nasenmuschel. Unterscheidet zwei Flächen an denselben: eine äußere und eine innere.

Die äußere Fläche ist nach der Augenhöhle gerichtet und zeigt die Thränenfadenröhre, fossa lacrymalis (Taf. 2; 2 π), sowie die dieselbe nach hinten gerichtete Thränenfadenröhre, crista lacrymalis. Die innere Fläche grenzt an das Siebbein und die vordere sinus ethmoidales.

Die Nasenbeine.

Nasenbeine, ossa nasalia (Taf. 2; 1 G, 2 G), bilden die Nasenwurzel und verbinden sich mit dem Siebbein, den Oberkieferbeinen, dem Siebbein und den Nasenknorpeln. Man unterscheidet an denselben eine äußere oder Gesichtsfäche und eine innere, gegen die Nasenhöhle zu gewendete Fläche.

Die übrigen auf Taf. 2 zur Anschauung gebrachten Knochen des Kopfes werden erst bei Betrachtung der Taf. 3, auf welcher sie einzeln dargestellt sind, betrachtet werden.

Die Wirbel.

Wirbel, vertebrae, welche in ihrer Vereinigung die Wirbelsäule, columna vertebralis, bilden, und die als Ganzes auf Taf. 4, Fig. 1 und 2 zur Anschauung bringen, zerfallen in die wahren Wirbel, vertebrae verae, und in die falschen Wirbel, vertebrae spuriae.

Die wahren Wirbel.

Die wahren Wirbel, vertebrae verae (Taf. 2; 7, 8, 9, 10), sind der Zahl nach 24, und zerfallen in 7 Hals-, vertebrae colli oder cervicis (Taf. 2; 5, 6, 7, 8), 12 Brust- oder Rückenwirbel, vertebrae dorsi oder thoracis (Taf. 2; 9), und 5 Kreuz- oder Lendenwirbel, vertebrae lumborum oder abdominis (Taf. 2; 10).

In den Wirbeln unterscheidet man den Körper, corpus (Taf. 2; 7 a, 8 a, 9 a, 10 a), den Bogen, arcus (Taf. 2; 8 b, 9 b, 10 b) und 7 Fortsätze, processus, welche letztere wiederum in die Muskelfor-

tsätze, processus musculares, und Gelenkfortsätze, processus articulares oder obliqui, von welchen erstere drei, von letztern vier gibt, zerfallen.

Die Muskelfortsätze sind: der Dorn- oder Stachelfortsatz, processus spinosus (Taf. 2; 8 c, 9 d, 10 d), welcher auf der Mitte des Bogens nach hinten hervorragt, und die zwei Querfortsätze, processus transversi (Taf. 2; 5 g, 6 g, 7 h, 8 e, 9 e, 10 e).

Von den Gelenkfortsätzen hat jeder Wirbel zwei obere (Taf. 2; 7 f, 8 f, 9 g, 10 g) und zwei untere (Taf. 2; 7 g), von denen jedesmal die beiden untern mit den beiden obern des nächstfolgenden Wirbels verbunden sind.

Auch treten die Wirbelkörper durch dazwischengelegte Bandscheiben in Verbindung.

Der Körper und Bogen der Wirbel vereinigen sich zu einem Ring, welcher das Rückgratsloch, foramen spinale oder medullare (Taf. 2; 5 l, 6 l, 8 h, 9 h, 10 h), umgibt. Da wo der Bogen in den Körper übergeht, befindet sich zu beiden Seiten, sowohl am obern wie am untern Rande des Bogens, ein Ausschnitt, der Wirbelauschnitt, incisura vertebralis (Taf. 2; 9 c, 10 c), von welchem je zwei zweier aufeinanderfolgender Wirbel ein Zwischenwirbelloch, foramen intervertebrale, bilden.

Wie schon erwähnt, zerfallen die 24 wahren Wirbel in 7 Hals-, 12 Brust- und 5 Lendenwirbel, die in ihrer Form wesentlich voneinander verschieden sind.

Die Halswirbel zeichnen sich besonders durch einen kleinen, niedrigen, vorn schwach gewölbten Körper aus, der an seiner obern Fläche von rechts nach links concav, von vorn nach hinten convex, dagegen an der untern von vorn nach hinten concav und von rechts nach links convex ist. Das Rückgratsloch ist sehr weit und hat eine einem Dreieck nahe kommende Gestalt. Besonders bemerkenswerth sind die Querfortsätze, welche kurz und breit sind und in denen ein Loch, das Wirbelloch, foramen vertebrale (Taf. 2; 5 h, 6 h, 8 g), sich befindet. Von den Gelenkfortsätzen sind die obern mit ihren Gelenkflächen schräg nach hinten, die untern dagegen schräg nach vorn gerichtet. Die Dornfortsätze sind kurz, breit, etwas schräg nach abwärts gerichtet und am Ende gabelförmig gespalten (Taf. 2; 8 d).

Die Brustwirbel sind im ganzen größer als die Halswirbel, namentlich ist der Körper höher, platt und auf seiner obern und untern Fläche herzförmig gestaltet; der Umfang ist gewölbter und hat an jeder Seite zwei halbe Gelenkflächen für die Articulation der Rippenköpfe, nur am ersten und zwölften Wirbel befindet sich eine ganze Gelenkfläche. Das Rückgratsloch ist bei den Brustwirbeln, namentlich bei den obern, enger und rundlich. Die Querfortsätze sind länger als bei den Halswirbeln, rundlich und haben an ihrem Ende eine Gelenkfläche, superficies articularis (Taf. 2; 9 f), für das Rippenköpfchen, tuberculum costae. Während bei den Halswirbeln die Gelenkfortsätze schräg stehen, stehen sie bei den Brustwirbeln fast senkrecht, und zwar die obern mit den Gelenkflächen gleichfalls nach hinten, die untern nach vorn gerichtet. Die Dornfortsätze sind lang und dachziegelartig übereinanderliegend, und schwellen gegen das Ende etwas an.

Die Lendenwirbel sind von allen wahren Wirbeln die größten und stärksten, und bildet der Körper derselben auf seiner obern wie untern Fläche ein ziemlich regelmäßiges Oval, das nur nach dem Rückgratsloch zu etwas abgeplattet ist. Letzteres bildet eine dreieckige Öffnung, die etwas weiter als bei den Brustwirbeln ist. Die sogenannten Querfortsätze sind dünn, platt und

haben keine Gelenkgrube wie die der Brustwirbel, da sich an den Lendenwirbeln keine Rippen ansetzen. Die Gelenkfortsätze stehen senkrecht, und stehen die obern mit ihren concaven Gelenkflächen nach innen, die untern dagegen, welche im Gegensatz concave Gelenkflächen besitzen, sind nach außen gerichtet. Die Dornfortsätze stehen gerade nach hinten und sind an den Seiten platigedrückt.

Der Atlas.

Ausgezeichnet vor den übrigen wahren Wirbeln sind die beiden ersten, von welchen der Atlas (Taf. 2; 5, 6) derjenige ist, welcher den Kopf unmittelbar trägt. Derselbe ist ziemlich ringförmig, mit einem vordern und hintern Bogen, arcus anterior und arcus posterior (Taf. 2; 5a und 5b, 6a und 6b), auch besitzt er keinen Körper und ebenso wenig einen Dornfortsatz. An der äußern Seite in der Mitte des vordern Bogens befindet sich eine kleine Erhöhung, der vordere Atlashöcker, tuberculum atlantis anticum (Taf. 2; 6m), eine gleiche an der Mitte des hintern Bogens, der hintere Atlashöcker, tuberculum atlantis posticum (Taf. 2; 5d), entsprechend dem Dornfortsatz. An der hintern Seite des vordern Bogens befindet sich in der Mitte eine kleine runde Gelenkfläche für den Zahnfortsatz des zweiten Halswirbels, superficies glenoidalis (Taf. 2; 5e). Zu beiden Seiten, wo die Bogen aneinanderstoßen, liegen die beiden Seitentheile, partes obae massae laterales (Taf. 2; 5c, 6c), an deren innerer Fläche ein kleiner Vorsprung, der seitliche Atlashöcker, tuberculum atlantis laterale (Taf. 2; 5k), sich befindet. Die obern Gelenkfortsätze sind wenig über die Seitentheile erhoben und bilden concave Gelenkgruben, fossae condyloideae (Taf. 2; 5f), für die Gelenkfortsätze des Hinterhauptbeins. Hinter den Gelenkgruben befindet sich eine Oeffnung oder eine Rinne für die Wirbelarterie, arteria vertebralis (Taf. 2; 5i). Die untern Gelenkfortsätze, superficies articularis pro epistropheo (Taf. 2; 6n), sind ebenfalls platt und wenig über die Seitentheile erhoben. Sie sind schräg nach außen gerichtet und articuliren mit den obern Gelenkfortsätzen des zweiten Halswirbels.

Der Epistropheus.

Der zweite Halswirbel, Umdreher, epistropheus (Taf. 2; 7), ist schon den übrigen Halswirbeln viel ähnlicher. Er besitzt wie diese einen Körper, corpus (Taf. 2; 7a), nur daß an dessen oberer Seite ein Zapfen, der Zahnfortsatz, processus odontoides (Taf. 2; 7b), hervortritt, der an seinem vordern Umfange eine Gelenkfläche, superficies glenoidalis (Taf. 2; 7d), besitzt, welche mit der entsprechenden des vordern Bogens des Atlas articulirt. Der obere rundliche Theil des Zahnfortsatzes, das Köpfchen, capitulum, steht durch einen dünnern Theil, den Hals, collum (Taf. 2; 7c), mit dem Körper des Epistropheus in Verbindung und endigt in eine Spitze, apex (Taf. 2; 7e). Die obern Gelenkfortsätze sind flach und schräg nach außen abhängend, während die untern wie bei allen Halswirbeln sind. Der Dornfortsatz des Epistropheus ist breiter als bei allen andern Halswirbeln und nächst dem des siebenten auch der längste.

Die falschen Wirbel.

Die falschen Wirbel, vertebrae spuriae, setzen einestheils das Kreuzbein, os sacrum (Taf. 2; 11, 12), andernteils das Steißbein, os coccygis (Taf. 2; 13, 14), zusammen.

Das Kreuzbein.

Das Kreuz- oder heilige Bein, os sacrum (Taf. 2; 11, 12), hat die Gestalt einer kleinen Pyramide, die mit der Spitze nach unten steht. Die vordere und hintere Fläche, von welcher die hintere concav, die letztere convex ist, sind die beiden seitlichen, welche mit den Hüftbeinen in Verbindung treten, die schmälern. Außerdem unterseits noch die Basis, welche mit dem fünften Lenden durch ein Gelenk verbunden ist, und die Spitze nach vorn gebogen ist.

Die Basis, basis (Taf. 2; 11b, 12b), hat ihrer nach oben gerichteten Fläche zwei Gelenkfortsätze, processus obliqui superiores (Taf. 2; 11c). Ihr vorderer Umfang ist wie der eines Zahns und heißt das Vorgebirge, promontorium, hinten umschließt der Bogen den Eingang zum Kreuzbeinkanale, aditus ad canalum (Taf. 2; 12f).

Die Spitze, apex (Taf. 2; 11c, 12c), ist innen gebogen und hat eine überknorpelte Fläche für das Steißbein.

Die vordere Fläche, welche concav ist, zeigt Stellen, wo sich die Körper der falschen Wirbeln und miteinander verachsen, vier Querleisten, außerdem auf jeder Seite der vier vordere Kreuzbeinlöcher, foramina anteriora (Taf. 2; 11d).

Die hintere convexe Fläche läßt zunächst die Gelenkfortsätze, processus spurii, erkennen, und die falschen Dornfortsätze, processus spinosi (Taf. 2; 12b), sowie die verwachsenen falschen und Gelenkfortsätze, processus transversarii und processus obliqui spurii (Taf. 2; 12i). Ferner sieht man zwischen den falschen Querfortsätzen, nach oben von den falschen Gelenkfortsätzen, auf jeder Seite die hintere Kreuzbeinöffnungen, foramina posteriora (Taf. 2; 12d). Gegen die Spitze sind die untern falschen Gelenkfortsätze des letzten Kreuzbeinwirbels die beiden Kreuzbeinhörner, cornua sacralia (Taf. 2; 12k), zwischen welchen der Ausgang des Kreuzbeinkanals, exitus ad canalum sacralis (Taf. 2; 12g), befindet.

Die Seitenflächen articuliren mit dem Hüftbein, haben zu diesem Zwecke eine Gelenkfläche, facies auricularis (Taf. 2; 12e).

Das Steißbein.

Das Steiß-, Schwanz- oder Kukulbein, os coccygis (Taf. 2; 13, 14), bildet das unterste Ende der Wirbelsäule. Dasselbe besteht aus vier kleinen Wirbeln, vertebrae spuriae (Taf. 2; 13a, b, c, d). In Verbindung tritt das Steißbein mit dem Kreuzbein, und zwar mit seinem oberem falschen Wirbel.

Der oberste falsche Wirbel (Taf. 2; 13a) ist der größte und hat an seiner obern nach hinten gerichteten Seite eine Gelenkfläche für das Kreuzbein, cavitas articularis (Taf. 2; 13e). Gleichsam wie die Gelenkfortsätze bilden die beiden Steißbeinhörner, cornua coccygea (Taf. 2; 13f, 14f), welche durch eine Bandmasse mit den Kreuzbeinhörnern verbunden sind. An der Seite befinden sich kleine Erhebungen, die falschen Querfortsätze, processus spurii (Taf. 2; 13g, 14g).

Die übrigen falschen Wirbel des Steißbeins hängen sich nach der Spitze zu immer mehr aneinander und schließen sich untereinander entweder mit Knorpel oder Bandmasse, so daß sie ein bewegliches Ganzes bilden.

Tafel 3.

ußer einem Profildurchschnitt des Schädels bringt diese Tafel einzelne Theile desselben, welche ent-
 weder auf der vorigen Tafel noch nicht zur Anschauung
 gebracht werden konnten, oder welche wegen ihrer com-
 plicirten Verhältnisse noch einer besondern Darstellung
 bedürfen. Hierher gehört namentlich das
 Schläfenbein, das Keilbein und der Oberkiefer.

Figur 1. Profildurchschnitt des Schädels.

Os frontis, Stirnbein.
 Os parietale, Scheitelbein.
 Os occipitis, Hinterhauptbein.
 Os sphenodeum, Keilbein.
 Os temporum, Schläfenbein.
 Os ethmoideum, Riechbein; lamina perpendi-
 cularis, senkrechte Tafel.
 Vomer, Flügelchar.
 Os nasale, Nasenbein.
 Os maxillare superius, Oberkiefer.
 Os turbinatum inferius, oder concha inferior,
 untere Nasenmuschel.
 Os palatinum, Gaumenbein.
 Os maxillare inferius, Unterkiefer.
 Sulcus anticus arteriae meningae mediae, vordere
 Schlagaderfurche.
 Sulcus posticus arteriae meningae mediae,
 hintere Schlagaderfurche.
 Sutura coronalis, Kranznaht.
 Sutura lambdoidea, Hinterhauptnaht.
 Sutura squamosa, Schuppennaht.
 Sulcus transversus, Querfurche (für den Quer-
 blutleiter).
 Spina frontalis interna, innerer Stirnstachel.
 Sinus sphenoidalis, Keilbeinhöhle.
 Fossa sellae turcicae pro glandula pituitaria,
 Grube des Türkenfättels.
 Dorsum ephippii, Lehne des Türkenfättels.
 Clivus, schiefe Ebene des Türkenfättels.
 Processus pterygoideus ossis sphenoidalis ala in-
 terna, flügelartiger Fortsatz des Keilbeins,
 inneres Blatt.
 Ala externa processus pterygoidei, flügelartiger
 Fortsatz des Keilbeins, äußeres Blatt.
 Hamulus pterygoideus, Haken des flügelartigen
 Fortsatzes.
 Processus clinodeus anterior.
 Pars condyloidea ossis occipitis, Gelenktheil des
 Hinterhauptbeins.
 Foramen condyloideum anterius ossis occipitis,
 vorderes Gelenktheilloch des Hinterhauptbeins.
 Spina occipitalis externa, äußerer Hinterhaupt-
 stachel.
 Incisura jugularis, Drosselabereinschnitt.
 Meatus auditorius internus, innerer Gehörgang.
 Fissura aquaeductus vestibuli, Spalte der Vor-
 hofswasserleitung.
 Sinus frontalis, Stirnhöhle.
 Processus nasalis ossis maxillaris superioris,
 Nasenfortsatz des Oberkiefers.
 Processus palatinus ossis maxillaris superioris,
 Gaumenfortsatz des Oberkiefers.
 Foramen incisivum, Schneidezahnloch.
 Processus pyramidalis ossis palatini, Pyramiden-
 fortsatz des Gaumenbeins.
 Foramen sphenopalatinum, Keilbein-Gaumen-
 öffnung.
 Corpus ossis maxillaris inferioris, Körper des
 Unterkiefers.

δ. Mentum, Kinn.
 c. Spina mentalis interna, innerer Kinnstachel.
 ζ. Linea obliqua interna, innere schräge Linie.
 η. Angulus maxillae inferioris, Kieferwinkel.
 θ. Foramen maxillae posterius oder Foramen al-
 veolare inferius, Eingang zum Kieferkanal.
 ι. Processus condyloideus oder condylus maxillae
 inferioris, Gelenkfortsatz des Unterkiefers.
 κ. Incisura semilunaris oder sigmoidea, halbmond-
 förmiger Einschnitt.

Figur 2. Äußere Fläche des linken Schläfen-
 beins ossis temporum (s. auch Taf. 2, Fig. 2).

A. Pars squamosa, Schuppentheil.
 B. Pars mastoidea oder mammillaris, Zitzen- oder
 Warzentheil.
 C. Pars petrosa oder os petrosum, Felsentheil oder
 Felsenbein.
 a. Processus zygomaticus, Jochbeinfortsatz.
 b. Tuberculum articulare, Gelenkhöcker.
 c. Fossa articularis, Gelenkgrube.
 d. Fissura Glaseri, Glaser'sche Spalte.
 e. Meatus auditorius externus, äußerer Gehörgang.
 f. Processus mastoideus, Warzenfortsatz.
 g. Foramen mastoideum, Warzenloch.
 h. Incisura mastoidea, Warzeineinschnitt.
 i. Processus styloideus, Griffelfortsatz.

Figur 3. Innere Fläche des linken Schläfen-
 beins, ossis temporum (s. auch Taf. 2, Fig. 4 und
 Taf. 3, Fig. 1).

A. Pars squamosa, Schuppentheil.
 B. Pars mastoidea, Warzentheil.
 C. Pars petrosa, Felsentheil.
 a. Impressiones digitatae, Fingereindrücke.
 b. Juxta cerebrialia, Gehirnerhöhungen.
 c. Processus zygomaticus, Jochfortsatz.
 d. Processus mastoideus, Warzenfortsatz.
 e. Fossa sigmoidea, Sigmalförmige Grube.
 f. Foramen mastoideum, Warzenloch.
 g. Processus styloideus, Griffelfortsatz.
 h. Spina des Felsentheils mit der Öffnung des
 Kanals der Carotis.
 i. Meatus auditorius internus, innerer Gehörgang.
 k. Margo oder angulus petrosus, Felsenbeinrand
 oder Felsenbeinwinkel.
 l. Aquaeductus vestibuli, Vorhofswasserleitung.
 m. Eminentia arcuata.

Figur 4. Obere Fläche des Keilbeins, ossis
 sphenoides (s. auch Taf. 2, Fig. 4).

A. Corpus oder basis ossis sphenoides, Körper des
 Keilbeins.
 B. Alae parvae oder processus ensiformes, kleine
 Flügel des Keilbeins.
 C. Alae magnae (superficies cerebrales), große
 Flügel des Keilbeins (Gehirnfläche).
 a. Processus clinodei medii.
 b. Sella turcica auf der fossa pro glandula pitui-
 taria, Türkenfattel mit der Grube für den Ge-
 hirnanhang.
 c. Processus clinodei posteriores.
 d. Sulcus caroticus, Rinne für die arteria carotis.
 e. Processus clinodei anteriores.
 f. Foramen opticum, Loch für den Sehnerven.
 g. Fissura orbitalis superior, obere Augenhöhlen-
 spalte.
 h. Foramen rotundum, rundes Loch.
 i. Foramen ovale, ovales Loch.

- k. Foramen spinosum, Dornenloch.
- l. Processus spinosus, Dornenfortsatz.
- m. Lingula, Zünglein.
- n. Crista sphenoidalis, Keilbeinkleiste.
- o. Margo superior, oberer Rand, zur Verbindung mit dem Stirnbein.
- p. Margo posterior superior, hinterer Rand zur Verbindung mit dem Schuppentheile des Schläfenbeins.
- q. Clivus Blumenbachii.

Figur 5. Vordere Fläche des Keilbeins, ossis sphenoidi.

- A. Corpus, Körper.
- B. Alae parvae, kleine Flügel.
- C. Alae magnae, große Flügel.
- D. Processus pterygoidei, Gaumenflügel oder flügelartige Fortsätze.
- a. Processus clinoidi posteriores.
- b. Sella turcica, Türkenstättel.
- c. Sinus sphenoidales, Keilbeinhöhlen, Öffnung derselben.
- d. Crista sphenoidalis, Keilbeinkleiste.
- e. Fissura orbitalis superior, obere Augenhöhlenspalte.
- f. Superficies orbitalis alae magnae ossis sphenoidi, Augenhöhlenfläche des großen Flügels des Keilbeins.
- g. Foramen rotundum, rundes Loch.
- h. Canalis Vidianus, Vidianischer Kanal.
- i. Processus spinosus, Dornenfortsatz.
- k. Sulcus pterygoideus, Flügelfortsatzrinne.
- l. Ala externa processus pterygoidei, äußerer Flügel des flügelartigen Fortsatzes.
- m. Ala interna processus pterygoidei, innerer Flügel des flügelartigen Fortsatzes.
- n. Incisura pterygoidea, Einschnitt des Gaumenflügels.
- o. Hamulus pterygoideus, Hafen des flügelartigen Fortsatzes.

Figur 6. Obere Fläche des Siebbeins, ossis ethmoidi.

- A. Lamina cribrosa oder horizontalis, Siebplatte oder horizontale Platte.
- B. Labyrinthus, Labyrinth.
- C. Lamina perpendicularis, perpendiculäre Platte.
- a. Crista galli, Hahnentamm.
- b. Foramina cribrosa, Sieblöcher.
- c. Lamina papyracea, Papierplatte.

Figur 7. Untere Fläche des Siebbeins, ossis ethmoidi.

- A. Labyrinthus, Labyrinth.
- B. Lamina perpendicularis, senkrechte Platte.
- C. Lamina cribrosa, Siebplatte.
- a. Processus uncinatus, Hafenfortsatz.
- b. Concha media, mittlere Nasenmuschel.
- c. Concha superior, obere Nasenmuschel.

Figur 8. Obertiefer, os maxillare superius, mit umgebenden Theilen von außen.

Man sieht in dieser Figur das linke Obertieferbein, die innere Wand der innern Augenhöhle, und die Flügelgaumengrube, fossa sphenomaxillaris oder palatina mit deren nächster Umgebung.

- A. Os frontis, Stirnbein.
- B. Os nasale, Nasenbein.
- C. Os maxillare, Obertieferbein.

- D. Os palatinum (pars perpendicularis), Gaumenbein (senkrechte Platte).
- E. Os ethmoideum (lamina papyracea), Siebbein (Papierplatte).
- F. Os lacrymale, Thränenbein.
- G. Os sphenoidale, Keilbein.
- a. Fossa pro sacco lacrymali, Grube für den Thränenack.
- b. Foramen infraorbitale, Öffnung am unteren Rande der Augenhöhle.
- c. Canalis infraorbitalis, Kanal an der untern Fläche der Augenhöhle.
- d. Foramina ethmoidalia, Riechbeinöffnungen.
- e. Sinus maxillaris oder antrum Highmori, Oberkieferhöhle oder Highmorsche Höhle.
- f. Processus pterygoideus ossis sphenoidi, Gaumenflügel des Keilbeins.
- g. Canalis pterygo-palatini, Flügel-Gaumenkanal.
- h. Foramen sphenopalatinum, Keilbein-Gaumenöffnung.
- i. Processus orbitalis ossis palatini, Augenhöhlenfortsatz des Gaumenbeins.
- k. Processus sphenoidalis ossis palatini, Keilbeinfortsatz des Gaumenbeins.
- l. Pars orbitalis ossis frontis, Augenhöhlentheile des Stirnbeins.
- m. Processus clinoides anterior ossis sphenoidi.
- n. Sella turcica, Türkenstättel.
- o. Foramen opticum, Sehnervengloch.
- p. Processus clinoides posterior ossis sphenoidi.
- q. Canalis caroticus, Carotischer Kanal.
- r. Lingula ossis sphenoidi, Zünglein des Keilbeins.
- s. Canalis Vidianus, Vidianischer Kanal.
- t. Processus styloideus ossis temporum, griffelartiger Fortsatz des Schläfenbeins.

Figur 9. Obertiefer, os maxillare superius, mit umgebenden Theilen von innen.

Man sieht auf dieser Figur den Theil des linken Obertieferbeins, welcher die äußere Wand der linken innern Nasenhöhle mit deren Muskeln bildet.

- A. Os frontis, pars frontalis, Stirntheil des Stirnbeins.
- B. Corpus ossis sphenoidi, Körper des Keilbeins.
- C. Processus pterygoideus ossis sphenoidi, Gaumenflügel des Keilbeins.
- D. Pars perpendicularis ossis palatini, senkrechter Theil des Gaumenbeins.
- E. Pars horizontalis ossis palatini, horizontaler Theil des Gaumenbeins.
- F. Processus palatinus maxillae superioris, Gaumenfortsatz des Obertieferbeins.
- G. Concha inferior, untere Nasenmuschel.
- H. Lamina nasalis ossis ethmoidi, Nasenplatte des Siebbeins.
- I. Processus frontalis oder nasalis maxillae superioris, Stirn- oder Nasenfortsatz des Obertiefers.
- K. Os nasale, Nasenbein.
- a. Sinus frontalis ossis frontis, Stirnhöhle.
- b. Sinus ethmoidalis, Siebhöhle.
- c. Sinus sphenoidalis, Keilbeinhöhle.
- d. Concha superior, obere Nasenmuschel.
- e. Concha media, mittlere Nasenmuschel.
- f. Foramen sphenopalatinum, Keilbein-Gaumenöffnung.
- g. Ala interna processus pterygoidei, innerer Flügel des Gaumenflügels.

Ala externa processus pterygoidei, äußerer Flügel des Gaumensflügels.

Exitus canalis lacrymalis, Ausgang des Thränenkanals.

Canalis incisivus, Schneidezahnkanal.

Sulcus pro nervo ethmoidali, Rinne für den nervus ethmoidalis.

Figur 10. Rechtes Gaumenbein, os palatinum dextrum, von innen.

Pars horizontalis, horizontaler Theil.

Pars perpendicularis, senkrechter Theil.

Processus orbitalis, Augenhöhlenfortsatz.

Processus sphenoidalis, Keilbeinfortsatz.

Crista nasalis, Nasenleiste.

Spina nasalis posterior, hinterer Nasenstachel.

Linea transversa ober **crista turbinalis inferior**, untere Querlinie, ober untere Leiste für die Nasenmuschel.

Linea transversa ober **crista turbinalis superior**, obere Querlinie, ober obere Leiste für die Nasenmuschel.

Incisura speno-palatina, Keilbein:Gaumen: einschchnitt.

Foramen speno-palatinum, Keilbein:Gaumen:öffnung.

Figur 11. Rechtes Gaumenbein, os palatinum dextrum, von außen.

Pars perpendicularis, senkrechter Theil.

Processus pyramidalis, Pyramidenfortsatz.

Processus orbitalis, Augenhöhlenfortsatz.

Processus sphenoidalis, Keilbeinfortsatz.

Sulcus palatinus, Gaumenrinne.

Incisura speno-palatina, Keilbein:Gaumen: einschchnitt.

Foramen speno-palatinum, Keilbein:Gaumen:öffnung.

Figur 12. Untertiefer, maxilla inferior, von vorn.

Corpus oder **pars horizontalis**, Körper oder horizontaler Theil.

Ramus oder **processus**, Ast oder Fortsatz.

Basis oder **margo inferior corporis**, Basis oder unterer Rand des Körpers.

Margo alveolaris, Zahnhöhlenrand.

Spina oder **protuberantia mentalis externa**, äußerer Kinnstachel.

Foramen mentale oder **maxillare anterius**, Rinne: oder vordere Untertieferöffnung.

Linea obliqua externa, äußere schräge Linie.

Angulus maxillae inferioris, Untertieferwinkel.

Processus condyloideus, Gelenkfortsatz.

Processus coronoideus, Kronenfortsatz.

Incisura semilunaris oder **sigmoidea**, halbmond: förmiger Einschchnitt.

Dentes incisivi, Schneidezähne.

Dens angularis sinister, linker Eckzahn.

Dentes molares, Backzähne.

Figur 13. Untertiefer, maxilla inferior, von oben.

Corpus, Körper.

Ramus, Ast.

Spina mentalis externa, äußerer Kinnstachel.

Spina mentalis interna, innerer Kinnstachel.

Foramen mentale, Kinnöffnung.

Linea obliqua externa, äußere schräge Linie.

Basis oder **margo inferior corporis**, Basis oder unterer Rand des Körpers.

l. Foramen maxillare posterius, hinteres Unterkieferloch.

g. Lingula, Zünglein.

h. Processus coronoideus, Kronenfortsatz.

i. Processus condyloideus, Gelenkfortsatz.

k. Incisura semilunaris oder **sigmoidea**, halbmond: förmiger Einschchnitt.

l. Collum processus condyloidei, Hals des Gelenk: fortsatzes.

m. Dentes incisivi, Schneidezähne.

n. Dentes angulares, Eckzähne.

o. Dentes molares, Backzähne.

Figur 14. Zungenbein, os hyoideum.

a. Corpus, Körper.

b. Cornua majora, große Hörner.

c. Cornua minora, kleine Hörner.

d. Tubercula cornuum majorum, Köpfschen an den großen Hörnern.

Figur 15. Oberer mittlerer Schneidezahn, dens incisivus superior medius, von vorn.

a. Corona, Krone.

b. Collum, Hals.

c. Radix, Wurzel.

Figur 16. Oberer mittlerer Schneidezahn, dens incisivus superior medius, von der Seite.

Figur 17. Oberer mittlerer Schneidezahn, dens incisivus superior medius, im Durchschnitt.

a. Cavum dentis, Zahnhöhle.

b. Canalis dentis, Zahnanal.

Figur 18. Unterer Eckzahn, dens caninus inferior, von vorn.

Figur 19. Unterer Eckzahn, dens caninus inferior, von der Seite.

Figur 20. Unterer Eckzahn, dens caninus inferior, im Durchschnitt.

Figur 21. Vorderer Backzahn, dens buccalis anterior, von vorn.

Figur 22. Vorderer Backzahn, dens buccalis anterior, von der Seite.

Figur 23. Vorderer Backzahn, dens buccalis anterior, im Durchschnitt.

Figur 24. Hinterer Backzahn, dens molaris oder **buccalis posterior**, von vorn.

Figur 25. Hinterer Backzahn, dens molaris, von der Seite.

Figur 26. Hinterer Backzahn, dens molaris, im Durchschnitt.

Figur 27. Gehörknöchelchen, ossicula auditoria, in natürlicher Größe, einzeln.

a. Malleus, Hammer.

b. Incus, Amboss.

c. Stapes, Steigbügel.

Figur 28. Hammer.

a. Caput, Kopf.

b. Collum, Hals.

c. Manubrium, Handgriff.

d. Processus longus oder **foliatus**, langer Fortsatz.

e. Gelenkfläche für den Amboss.

Figur 29. Amboß.

- a. Corpus, Körper.
- b. Gelenkgrube für den Hammer.
- c. Processus brevis, kurzer Fortsatz.
- d. Processus longus, langer Fortsatz.
- e. Ossiculum lenticulare Sylvii, des Sylvius linseförmiges Knöchelchen.

Figur 30. Steigbügel.

- a. Capitulum, Köpfchen.
- b. Crura, Schenkel.
- c. Basis, Basis oder Fußtritt.

Figur 31. Gehörknöchelchen, ossicula auditoria, verbunden.

- a. Caput mallei, Kopf des Hammers.
- b. Collum mallei, Hals des Hammers.
- c. Manubrium mallei, Handgriff des Hammers.
- d. Processus longus mallei, langer Fortsatz des Hammers.
- e. Processus brevis oder obtusus mallei, kurzer Fortsatz des Hammers.
- f. Corpus incutis, Körper des Amboßes.
- g. Processus brevis incutis, kurzer Fortsatz des Amboßes.
- h. Processus longus incutis, langer Fortsatz des Amboßes.
- i. Crus stapetis, Schenkel des Steigbügels.
- k. Basis stapetis, Fußtritt des Steigbügels.

Figur 32. Linkes Labyrinth, labyrinthus osseus sinister, von vorn.

- A. Cochlea, Schnecke.
- B. Vestibulum, Vorhof.
- C. Canalis semicircularis superior, oberer halbcirkelförmiger Bogengang.
- C'. Canalis semicircularis inferior, unterer halbcirkelförmiger Bogengang.
- C". Canalis semicircularis externus, äußerer halbcirkelförmiger Bogengang.
- a. Cupula cochleae, Spitze der Schnecke.
- b. Fenestra rotunda, rundes Fenster.
- c. Fenestra ovalis, ovales Fenster.
- d. Ampulla ossea, knöcherne Ampulle.

Figur 33. Linkes Labyrinth, labyrinthus osseus sinister, von innen.

- A. Cochlea, Schnecke.
- B. Vestibulum, Vorhof.
- C. Canalis semicircularis superior, oberer halbcirkelförmiger Bogengang.
- C'. Canalis semicircularis inferior, unterer halbcirkelförmiger Bogengang.
- C". Canalis semicircularis externus, äußerer halbcirkelförmiger Bogengang.
- a. Modiolus, Spinbel.
- b. Canalis centralis modiolus, Centralkanal der Spinbel.
- c. Tractus spiralis foraminalentus, durchlöcherter Spirallauf.
- d. Foramen rotundum, rundes Loch.
- e. Ampulla ossea, knöcherne Ampulle, flaschenförmige Erweiterung der halbcirkelförmigen Kanäle, an deren einem sich in den Vorhof öffnenden Ende.

Das Schläfenbein.

Die Schläfenbeine, ossa temporum (Zaf. 3, Fig. 2, 3), liegen zu beiden Seiten des Schädels und werden vorzugsweise begrenzt von dem Keilbeine, Scheitel-

beine und Hinterhauptbeine. Man unterscheidet an demselben drei Abschnitte: den Schuppentheil, Zitzen- und Felsenheil. Verbindungen gibt das Schläfenbein ein mit dem Keilbeine, Scheitelbeine, Hinterhauptbeine, Jochbeine und dem Unterkiefer.

Der Schuppentheil, pars squamosa (Zaf. 3, Fig. 2A, 3A) bildet den obersten Theil des Schläfenbeins, ist plattenförmig und besitzt eine äußere und innere Fläche.

Von der äußern Fläche geht in horizontaler Richtung der Jochfortsatz, processus zygomaticus (Zaf. 3, Fig. 2a, 3c) aus, unter dessen Wurzel sich die Gelenkgrube, fossa articularis oder cavitas glenoidalis (Zaf. 3, Fig. 2c), für den Gelenkknopf des Unterkiefers befindet. Vor der Gelenkgrube bildet der Schuppentheil, tuberculum articulare (Zaf. 3, Fig. 2b), einen Knochenwulst. Die Glaser'sche Spalte, fissura Glaseri (Zaf. 3, Fig. 2d), welche der Bantienischorda tympani, einem Zweige des Gehörnervus, nervus facialis, zum Durchgang dient, befindet sich an der pars petrosa, an der untern vordern Seite des Schläfenbeins.

Die innere Fläche des Schuppentheils, welche etwas concav ist, zeigt wie die übrigen Schädelknochen die Schlagaderfurchen, sulci arteriosi, der arteria meningea media (Zaf. 3, Fig. 1, die Zweige, welche von a aus über E laufen), ferner die fingerförmigen Eindrücke, impressiones digitatae (Zaf. 3, Fig. 3A) und die Gehirnverwundungen, juga cerebri (Zaf. 3, Fig. 3B).

Der Zitzen- oder Warzentheil, pars mastoidea oder mammillaris (Zaf. 3, Fig. 2B, 3B), liegt hinter und unter dem Schuppentheil und ragt spitz nach unten als Warzenfortsatz, processus mastoideus (Zaf. 3, Fig. 2f, 3d), hervor. Der Warzentheil gehört zu den spongiösen Knochen, an ihm ist noch bemerkenswerth auf der äußern Seite der Warzeinschnürlinse, incisura mastoidea (Zaf. 3, Fig. 2h) und das Warzenloch, foramen mastoideum (Zaf. 3, Fig. 2g, 3f), durch welches ein Blutgefäß geht, und auf der innern Seite die sigmaförmige Grube, fossa sigmoidea (Zaf. 3, Fig. 3e).

Der Felsenheil des Felsenbeins oder der Pyramide, pars petrosa, os petrosum oder pyramidale (Zaf. 3, Fig. 2C, 3C), ist der wichtigste Theil des Schläfenbeins; denn es enthält eins der bedeutendsten Sinneswerkzeuge, das Gehörorgan. Es bildet ein dreiseitig, schräg von außen und hinten nach innen und vorn liegende Pyramide, an welcher man die Basis, Spitze und drei Flächen unterscheidet.

Die Basis, basis ossis petrosi, ist nach außen gerichtet, liegt zwischen dem Joch- und Zitzenfortsatz und zeigt den äußern Gehörgang, meatus auditorius externus (Zaf. 3, Fig. 2e).

Die Spitze, apex ossis petrosi, liegt nach innen, stößt an den Körper des Keilbeins und hat eine Fortsetzung, durch welche die große Kopfschlagader, arteria carotis, hindurchgeht (Zaf. 3, Fig. 3h).

Von den drei Flächen des Felsenbeins unterscheidet man eine vordere, hintere und untere Fläche, von denen die beiden erstgenannten im Innern des Schädels, die letztere nach außen liegen. Die vordere und hintere Fläche stoßen durch den Felsenbeinrand oder Felsenbeinwinkel, margo oder angulus petrosus (Zaf. 3, Fig. 3k), zusammen. Zu bemerken ist noch an der hintern Fläche der innere Gehörgang, meatus auditorius internus (Zaf. 3, Fig. 1u, 3i), sowie die Vorhofswasserleitung, aquaeductus vestibuli (Zaf. 3, Fig. 1v, 3l). Das innere Gehörorgan wird äußerlich angedeutet durch die eminentia arcuata (Zaf. 3,

(Fig. 3m). Von der untern Fläche geht ein dünner, langer und spitzer Knochenfortsatz aus, der Griffelfortsatz, *processus styliformis* (Zaf. 3, Fig. 2i, 3g), welcher Muskeln zum Ansaß dient.

Das Keilbein.

Das Keilbein, *os sphenoidale*, auch *pars sphenoidae ossis basilaris* (Zaf. 3, Fig. 4, 5), bildet die Mitte des Schädelgrundes und verbindet sich mit allen Schädelknoten, sowie von den Gesichtsknochen mit den Jochbeinen, Gaumenbeinen, den Oberkieferbeinen und der Flügelchar. Man unterscheidet in dem Keilbein vier Theile: den Körper, die beiden großen und kleinen Flügel, und die beiden flügelartigen Fortsätze.

Der Körper, *corpus, diaphysis, basis ossis sphenoidalis* (Zaf. 3, Fig. 1D, 4A, 5A), bildet den mittelften Theil des ganzen Knochens, von dem die übrigen Theile als Fortsätze ausgehen. Derselbe ist hohl, indem die Keilbeinhöhlen, *sinus sphenoidales* (Zaf. 3, Fig. 1b, 5c), welche durch eine senkrechte Scheidewand in zwei seitliche Hälften getrennt werden, sich in ihm befinden. Der Eingang zu denselben, welcher auf unserer Tafel durch die Oeffnung (Fig. 5c) sichtbar ist, wird durch die Keilbeinhörner, *ossicula Vermii* oder *cornua sphenoidalia*, bis auf eine kleine Oeffnung, durch welche die Keilbeinhöhlen mit den Seitzellen in Verbindung stehen, geschlossen.

Das dasäußere des Keilbeinkörpers betrifft, so hat derselbe sechs Flächen, eine obere, zwei seitliche, eine vordere, eine hintere und eine untere.

Die obere Fläche, der Türken- oder Pferdehaupte, *sella turcica* oder *equina* (Zaf. 3, Fig. 4b, 5b), hat aufzuweisen die Grube für den Gehirnanhang, *fossa pro glandula pituitaria* (Zaf. 3, Fig. 4b), ferner die *processus clinoides medii* (Zaf. 3, Fig. 4a) und *processus clinoides posteriores* (Zaf. 3, Fig. 4c, 5a), sowie den *chvus Blumenbachii* (Zaf. 3, Fig. 11, 4q). Die zwei seitlichen Flächen zeigen die Rinne für die *arteria carotis*, *sulcus caroticus* (Zaf. 3, Fig. 4d), sowie das Zünglein, *lingula* (Zaf. 3, Fig. 4m).

Die vordere Fläche wird durch eine Erhabenheit, die Keilbeinleiste, *crista sphenoidalis* (Zaf. 3, Fig. 4a, 5d), in zwei Hälften getheilt, auf welchen sich die Oeffnungen zu den Keilbeinhöhlen, *sinus sphenoidales* (Zaf. 3, Fig. 5c), befinden.

Die hintere Fläche legt sich an den Grundtheil des Hinterhauptbeines an, mit welchem sie zu einem Ganzen ver wächst, während die untere Fläche, an welchem der Keilbeinschnabel, *rostrum sphenoidale*, hervorragt, durch diesen mit der Flügelchar in Verbindung tritt.

Die kleinen Flügel oder schwertförmigen Fortsätze, *alae parvae* oder *processus ensiformes* (Zaf. 3, Fig. 4B, 5B), entspringen mit zwei Wurzeln aus dem vordern und obern Theile des Körpers des Keilbeins und legen sich an die Augenhöhletheile des Stirnbeins an. Bemerkenswerth sind an ihnen die *processus clinoides anteriores* (Zaf. 3, Fig. 4e), sowie das Loch für den Sehnerv, *foramen opticum* (Zaf. 3, Fig. 5f).

Die großen Flügel, *alae magnae*, liegen unter den vorigen und entspringen aus den Seiten des Keilbeinkörpers; zwischen ihnen und den kleinen Flügeln befindet sich eine Spalte, die obere Augenhöhle: spalte, *fissura orbitalis superior* (Zaf. 3, Fig. 4g, 5e), welche Nerven und Venen zum Durchgang dient. Die großen Flügel haben drei Flächen, eine innere, vordere und äußere, welche bei der Bildung der Schädel,

Augen- und Schläfenhöhle sich theilnehmen, sowie sechs Hände, und zwar einen innern obern, vordern obern, vordern untern, hintern obern oder äußern, und hintern untern.

Die innere oder Gehirnsfläche, *superficies cerebralis* (Zaf. 3, Fig. 4C), zeigt ebenfalls *juga cerebralia* und *impressiones digitales*, ferner befinden sich drei Oeffnungen auf ihr, das runde Loch, *foramen rotundum* (Zaf. 3, Fig. 4h, 5g), das ovale Loch, *foramen ovale* (Zaf. 3, Fig. 4i), und das Dornenloch, *foramen spinosum* (Zaf. 3, Fig. 4k), welche theils Nerven, die beiden erstern, theils der *arteria meningea media*, das letztere, zum Durchgang dienen.

Die vordere oder Augenhöhlenfläche, *superficies orbitalis* (Zaf. 3, Fig. 5f), hat die Gestalt eines verschobenen Vierecks und bildet den hintern Theil der äußern Wand der Augenhöhle; zwischen dieser Fläche und dem Oberkiefer befindet sich die untere Augenhöhlenpalte, *fissura orbitalis inferior* (Zaf. 2, Fig. 1z), welche Nerven und Venen zum Durchtritt dient.

Die äußere oder Schläfenfläche, *superficies temporalis* (Zaf. 2, Fig. 1C, 2C, 3F), ist durch eine Querlinie, auf Zaf. 2, Fig. 2C die scharfe Kante, in zwei Theile, einen obern und einen untern, getrennt. Am untersten, äußern Winkel des letztern befindet sich der Dornenfortsatz, *processus spinosus* oder *spina angularis*, auch *ala parva Ingrassiae* (Zaf. 3, Fig. 4l, 5i), daneben der Ausgag des Dornenloches, *foramen spinosum* und etwas weiter nach oben das ovale Loch, *foramen ovale*.

Von den sechs Händen bildet der innere die obere Augenhöhlenpalte bilden, der obere, *margo superior* (Zaf. 3, Fig. 4n), verbindet sich mit dem Stirn- und Scheitelbein, der vordere obere sieht an das Jochbein, während der vordere untere die untere Augenhöhlenpalte bilden hilft. Der hintere obere oder äußere Rand, *margo posterior superior* (Zaf. 3, Fig. 4p) legt sich an den Schuppentheil des Schläfenbeins, während der hintere untere Rand, *margo posterior inferior*, auf unserer Taf. 3 in Fig. 4 der Theil zwischen l und m, den Seitenheil des Schläfenbeins berührt.

Die flügel förmigen Fortsätze, oder Gaumenflügel, *processus pterygoidei* (Zaf. 3, Fig. 5D), steigen aus der mittlern Fläche der Seitenbeile des Körpers, hinter den Gaumen- und Oberkieferbeinen, gerade herab. Gebildet werden sie aus zwei Knochenplatten, die unter einem spitzen Winkel nach vorn zusammenstoßen und dadurch eine nach hinten offene Rinne bilden. Die eine Platte heißt der äußere Flügel, *ala externa* (Zaf. 3, Fig. 5l), die andere der innere Flügel, *ala interna* (Zaf. 3, Fig. 5m). Der letztere enügt in den Haken des flügel förmigen Fortsatzes, *hamulus pterygoideus* (Zaf. 3, Fig. 5o). Am untern Ende trennen sich die beiden Flügel von ihrer Verwüchsellinie, wodurch der Einschnitt des Gaumenflügels, *incisura pterygoidea* (Zaf. 3, Fig. 5), entsteht. Die von beiden Flügeln gebildete, nach hinten offene Rinne heißt die Gaumenflügelgrube, *fossa pterygoidea*. Noch zu erwähnen ist nahe der Wurzel der Vidianische Kanal, *canalis Vidianus* (Zaf. 3, Fig. 5h), welcher dem Nervus Vidianus und der *arteria Vidianica* zum Durchgang dient.

Das Siebbein.

Das Niechbein oder Siebbein, *os ethmoidale* oder *cribiforme* (Zaf. 3, Fig. 6, 7), liegt vorzugsweise in der Nasenhöhle und schließt dieselbe gegen die Schädelhöhle ab. Es verbindet sich mit dem

Stirnbein, dem Keilbein, den Nasenbeinen, dem Oberkiefer, den Gaumenbeinen und der Pfingstschär. Man unterscheidet an denselben vier Theile, die Siebplatte, die Perpendicularplatte und zwei Labyrinthbeine.

Die Siebplatte oder Horizontalplatte, *lamina cribrosa* oder *horizontalis* (Taf. 3, Fig. 6A, 7C), steht mit ihrer obern Fläche nach der Schädelhöhle und liegt in dem Kiechbeineinschnitte des Stirnbeins (Taf. 2, Fig. 4), vor dem Körper des Keilbeins. An ihr sind bemerkenswerth die Siebbeinlöcher, *foramina cribrosa* (Taf. 3, Fig. 6B), welche vorzugsweise dem Geruchsnerven zum Durchgang dienen, und der Gähnenlamme, *crista galli* (Taf. 3, Fig. 6A).

Die senkrechte Platte, *lamina perpendicularis*, bildet mit der vorigen einen rechten Winkel und steigt von deren unterer Fläche in die Nasenhöhle herab, wo sie sich an die Pfingstschär anlegt und so mit dieser die Nasenseidewand bilden hilft, deren obere Theil sie ausmacht.

Die Labyrinth oder Seitentheile, *labyrinthi* (Taf. 3, Fig. 6B, 7A), sind ihrer zwei, ein rechtes und ein linkes, und liegen zu beiden Seiten der senkrechten Platte. Sie bilden zwei zarte, leichte Körper, welche in ihrem Innern die durch seine Knochenplättchen gebildeten Siebbeinzellen, *sinus ethmoidales*, enthalten, die außen durch die Papierplatte, *lamina papyracea* (Taf. 3, Fig. 6C), welche zugleich die innere Augenhöhlenwand bildet, nach innen durch die Nasenplatte, *lamina nasalis*, geschlossen werden. Diese Nasenplatte ist durch einen horizontalen Einschnitt in zwei Abtheilungen, eine obere und eine untere, getrennt, welche obere Nasenmuschel, *concha superior* (Taf. 3, Fig. 7C, 9D), und mittlere Nasenmuschel, *concha media* (Taf. 3, Fig. 7B, 9E), genannt werden. Eine Quertwand theilt auch noch die Siebbeinzellen in vordere und hintere, von welchen erstere der Hakenfortsatz, *processus uncinatus* (Taf. 3, Fig. 7A), gegen die untere Nasenmuschel, welche einen besondern Knochen bildet, herabgeht.

Die Oberkieferbeine.

Die Oberkieferbeine, *ossa maxillaria superiora* (Taf. 3, Fig. 8, 9), nehmen den vordern mittlern Theil des Gesichtes ein (s. auch Taf. 2, Fig. 1F, 2K, 3A), sind paarig und verbinden sich sowohl untereinander, wie mit den Nasenbeinen, dem Stirnbein, den Thränenbeinen, dem Siebbein, dem Keilbein, den Gaumenbeinen, den Jochbeinen, der Pfingstschär, und der untern Nasenmuschel. Man unterscheidet an den Oberkieferbeinen den Körper und vier Fortsätze, und zwar den Nasen-, Wangen-, Zahn- und Gaumenfortsatz.

Der Körper, *corpus* (Taf. 3, Fig. 8C), bildet den mittlern Theil des Knochens. Er ist hohl, und unterscheidet man an demselben vier Flächen, plana, und zwar die Gesichtsfäche, Schläfenfläche, Augenhöhlenfläche und Nasenhöhlenfläche.

Die Gesichtsfäche, *planum faciale* (Taf. 3, Fig. 1C), bildet den vordern nach außen gerichteten Theil. In ihr ist besonders bemerkenswerth die Oberkiefergrube, *fovea maxillaris* (Taf. 2, Fig. 1Q, 2X), ferner der untere Augenhöhlenrand, *margo infraorbitalis* (Taf. 2, Fig. 1, 2), und das untere Augenhöhlenloch, *foramen infraorbitale* (Taf. 3, Fig. 8B, f. auch Taf. 2, Fig. 1P, 2Z).

Die Schläfenfläche, *planum temporale*, bildet den hintern äußern, nach der Schläfengrube zu gelegenen Theil des Oberkieferbödchens, nüber maxillare, sowie die hintern Zahnhöhlenöffnungen, *foramina alveolaria posteriora*.

Die Augenhöhlenfläche, *planum orbitale*, ist

nach oben gelegen und umschließt den unteren Augenhöhlenanal, *canalis infraorbitalis* (Taf. 3, Fig. 8C).

Die Nasenhöhlenfläche, *planum nasale* (Taf. 3, Fig. 9), ist nach innen der Nasenhöhle zugewandt. An ihr befindet sich der Eingang zur Highmore'schen Höhle oder Oberkieferhöhle, *antrum Highmorei* oder *sinus maxillaris*, welche den ganzen innern Raum des Oberkiefers einnimmt und welche an dem gegenseitigen Oberkiefer (Taf. 3, Fig. 8E) sichtbar ist. Außerdem eine Erhabenheit vorhanden, die Nasenmuschelleiste, *Crista turbinalis inferior*, zum Ansatze für die untere Nasenmuschel.

Die Fortsätze, *processus*, sind:

Der Nasen- oder Stirnfortsatz, *processus nasalis* oder *frontalis* (Taf. 2, Fig. 1M, 2D; Taf. 3, Fig. 9), geht nach oben und zeigt an seiner äußern Seite eine Rinne, die Thränenrinne, *sulcus lacrymalis*, durch welcher zur Bildung der Thränenfossa grube, *fossa sad lacrymalis* (Taf. 2, Fig. 2P; Taf. 3, Fig. 8A), und die Thränenkanäle, *canalis lacrymalis*, beiträgt.

Der Jochfortsatz oder Wangenfortsatz, *processus zygomaticus* (Taf. 2, Fig. 1N), ist die äusserste Verlängerung des Oberkieferbeins, welche sich mit dem Wangenbein verbindet.

Der Zahnhöhlenfortsatz, *processus alveolaris* (Taf. 2, Fig. 2B, 3H), bildet den untersten Theil des Oberkiefers, in welchem sich auf jeder Seite acht Zahnzellen, *alveoli*, für zwei Schneidezähne, einen Eckzahn und fünf Backenzähne befinden. Außerlich werden dieselben durch die Zahnzellenerhabenheiten, *juga alveolaria* (Taf. 2, Fig. 1V) angebeudet. Außerdem ist noch zu bemerken der vordere Nasenknöchel, *spina nasalis anterior* (Taf. 2, Fig. 1R, 2E), sowie der Schneidezahnkanal, *canalis incisivus* (Taf. 3, Fig. 1Z, 9F), welcher dem nervus nasopalatinus *Scarpae* und der *arteria nasopalatina* zum Durchgang dient.

Der Gaumenfortsatz, *processus palatinus* (Taf. 3, Fig. 3A; Taf. 3, Fig. 1Y, 9F), bildet den innern unteren Theil des Oberkiefers, liegt horizontal und stößt mit demselben Fortsatz des Oberkieferbeins der andern Seite zusammen. Beide zusammen stellen die Gaumennaht, *sutura palatina*, und die Nasenleiste, *crista nasalis*, auf welche sich die Pfingstschär aufstößt, dar.

Die Gaumenbeine.

Die Gaumenbeine, *ossa palatina* (Taf. 3, Fig. 10, 11), liegen zwischen den Oberkieferbeinen und den flügelartigen Fortsätzen des Keilbeins, und zwar vor diesen und hinter den Gaumenfortsätzen und der Nasenfläche des Oberkiefers. Die Gaumenbeine verbinden sich mit den Oberkieferbeinen, dem Keilbein, der untern Nasenmuschel und der Pfingstschär. Jedes Gaumenbein zerfällt in zwei Theile, einen horizontalen und einen senkrechten.

Der horizontale oder Gaumentheil, *pars horizontalis* oder *palatina* (Taf. 2, Fig. 3B; Taf. 3, Fig. 10A) liegt sich unmittelbar an den Gaumenfortsätzen des harten Gaumens an, und trägt, indem er sich mit dem der andern Seite verbindet, zur Bildung dieses bei. Durch die Vereinigung beider horizontalen Theile entsteht die Gaumennaht, *sutura palatina*, mit der Nasenleiste, *crista nasalis* (Taf. 3, Fig. 10A), an deren hintern Ende der hintere Nasenknöchel, *spina nasalis posterior* (Taf. 3, Fig. 10B), hervorsteht.

Der senkrechte oder aufsteigende Theil, *pars perpendicularis* oder *ascendens* (Taf. 3, Fig. 10B, 11A), liegt sich nach hinten an die Nasenfläche des Oberkiefers und nach vorn an den flügelartigen Fortsatz des Oberkieferbeins an. An der innern, der Nasenhöhle zu

hrtten Fläche befindet sich die untere Querlinie der unteren Leiste für die untere Nasenmuschel, *linea transversa* oder *crista turbinalis inferior* (Taf. 3, Fig. 10c), und die obere Querlinie oder obere Leiste für die mittlere Nasenmuschel, *linea transversa* oder *crista turbinalis superior* (Taf. 3, Fig. 10d). An der äußeren Fläche ist zu bemerken: die Kieferrinne, *sulcus palatinus*, welche zur Bildung der Flügel-Gaumentanal, *canalis pterygo-palatinus* beiträgt. An dem senkrechten Theile sind die drei Fortsätze zu unterscheiden, und zwar:

Der Pyramidenfortsatz, *processus pyramidalis* (Taf. 3, Fig. 11B). Derselbe führt in den Einschnitt des siebelförmigen Fortsatzes des Keilbeins und wird vom innern und äußern Gaumentanal, *canalis palatinus internus* und *externus*, durchbohrt.

Der Augenhöhlenfortsatz, *processus orbitalis* (Taf. 3, Fig. 10C, 11C), legt sich an die Papierrplatte des Siebbeins und an die Augenhöhlenfläche des Oberkiefers an, so daß er die hintere untere Fläche der Augenhöhle mit bilden hilft.

Der Keilbeinfortsatz, *processus sphenoidal* (Taf. 6, Fig. 10D, 11D), legt sich an den Körper des Keilbeins und an die Keilbeinhörner an.

Zwischen dem Augenhöhlenfortsatz und dem Keilbeinfortsatz befindet sich der Keilbein-Gaumentaneinschnitt, *incisura sphenopalatina* (Taf. 3, Fig. 10e, 11h), und der Keilbein-Gaumenöffnung, *foramen sphenopalatinum* (Taf. 3, Fig. 10f, 11c).

Die untern Nasenmuschel.

Die untern Nasenmuschel, *ossa turbinate inferiora* oder *conchae inferiores* (Taf. 3, Fig. 9g), liegen auf beiden Seiten an der untern äußeren Wand der Kieferhöhlen. Sie sind aus poröser Knochenstoffe gebildet und haben eine innere und äußere Fläche, die drei Fortsätze, den Thränen-, Oberkiefer- und Kieferfortsatz, *processus lacrymalis*, *maxillaris* und *ethmoidalis*. In Verbindung treten die Nasenmuschel mit dem Oberkiefer, den Gaumenbeinen, den Kieferbeinen und den Thränenbeinen. Die innere Fläche, welche frei nach der Nasenhöhle zu sieht, ist convex, während die äußere nach dem Oberkiefer zu gerichtet und concav ist.

Die Pflugschar.

Die Pflugschar oder das Scheidebein, *vomer*, hat eine senkrechte Richtung, theilt die Nasenhöhle von oben nach hinten in zwei Theile und erstreckt sich von der Perpendicularplatte des Siebbeins bis zur Nasenleiste. Die Pflugschar hat die Gestalt eines verhältnißmäßig viereckigen, zwei Flächen, von denen die eine die rechte, die andere in die linke Nasenhöhle sieht, die vier Ränder, und zwar:

den einen obern oder Keilbeinrand, *margo sphenoidal*, welcher sich mit zwei Flügeln, *alae vomeris*, an den Keilbeinhörner anlegt,

den einen untern oder Gaumenrand, *margo palatinus*, welcher sich an die Nasenleiste der Gaumentafel des Oberkiefers und der horizontalen Theile des Gaumenbeins anlegt,

den einen vordern oder Siebbeinrand, *margo ethmoidalis*, welcher sich mit der Perpendicularplatte des Siebbeins verbindet,

den einen hintern Rand, *margo posterior* (Taf. 3, Fig. 3 G), welcher frei in den Haken schaut und die Scheidewand der hintern Nasenhöhlöffnung bildet.

Der Unterkiefer.

Der Unterkiefer, *os maxillare inferius* oder *maxilla inferior*, auch *mandibula* (Taf. 2, Fig. 18, 2k; Taf. 3, Fig. 1M, 12, 13), bildet den tiefsten Theil des Gesichtes und schließt dasselbe nach dem Hals zu ab. Er hat eine hufeisenförmige Gestalt, besteht aus dem Körper und zwei Ästen und tritt mit dem Schläfenbein durch ein Gelenk in Verbindung.

Der Körper oder horizontale Theil, *corpus* (Taf. 3, Fig. 12A, 13A), ist bogenförmig gekrümmt. Der mittlere untere Theil bildet das Kinn, *mentum* (Taf. 3, Fig. 18). Am Körper unterscheidet man zwei Flächen, eine innere und eine äußere, und zwei Ränder, einen obern und einen untern.

Die äußere Fläche, *superficies externa* (Taf. 3, Fig. 12A, 13A), trägt in ihrer Mitte den äußern Kinnstachel, *spina* oder *protuberantia mentalis externa* (Taf. 3, Fig. 12c, 13a). Zu beiden Seiten davon, etwas nach außen, befindet sich die Kinn- oder vordere Unterkieferöffnung, *foramen mentale* oder *maxillare anticum* (Taf. 3, Fig. 12d, 13c), welche den Ausgang des untern Zahnhöhlenkanals, *canalis alveolaris inferior*, bildet. An den Seitentheilen des Körpers ist noch die äußere schräge Linie, *linea obliqua externa* (Taf. 3, Fig. 12e), zu bemerken.

Die innere Fläche, *superficies interna* (Taf. 3, Fig. 12M), zeigt in der Mitte den innern Kinnstachel, *spina mentalis interna* (Taf. 3, Fig. 12f, 13b), und die innere schräge Linie, *linea obliqua interna* (Taf. 3, Fig. 12f).

Der obere oder Zahnhöhlenrand, *margo alveolaris* (Taf. 3, Fig. 12b), enthält 16 Zahnzellen, *alveoli*, für die vier Schneidez. (Taf. 3, Fig. 12k, 13M), zwei Eckz. (Taf. 3, Fig. 12l, 13n) und zehn Backenzähne (Taf. 3, Fig. 12m, 13o) des Unterkiefers, die sich äußerlich durch die Zahnhöhlenerhabenheiten, *juga alveolaria* (Taf. 3, Fig. 12b), markiren.

Der untere Rand oder die Basis, *margo inferior* oder *basis corporis* (Taf. 3, Fig. 12a), ist dick, kuglig und dient Muskeln zum Ansatze.

Die Äste, *rami*, verbinden sich unter einem Winkel, dem Unterkieferwinkel, *angulus maxillae inferioris* (Taf. 3, Fig. 12f, 13f), mit dem Körper.

Jeder der beiden Äste spaltet sich in den Gelenkfortsatz, *processus condyloideus* oder *condylus* (Taf. 3, Fig. 12g, 13i), welcher in die Gelenkgrube des Schläfenbeins eingefügt ist und daselbst das Unterkiefergelenk bildet, und in den Kronenfortsatz, *processus coronoides*, welcher dem Schläfenmuskel zum Ansatze dient. Zwischen dem Gelenkfortsatz und dem Kronenfortsatz befindet sich der halbmondförmige Einschnitt, *incisura semilunaris* oder *sigmoidea* (Taf. 3, Fig. 12h, 13k), und an der Innenfläche der beiden Äste das hintere Unterkieferloch, *foramen maxillare posterius* oder *alveolare inferius* (Taf. 3, Fig. 12i, 13f), welches den Eingang zum Unterkieferkanal bildet. Daneben befindet sich eine kleine Knochenlamelle, das Zünglein, *lingula* (Taf. 3, Fig. 13g), und etwas weiter nach unten die Rinne für den musculus mylo-hyoideus.

Das Zungenbein.

Das Zungenbein, *os hyoideum* oder *linguale* (Taf. 3, Fig. 14), liegt parallel unter dem untern Rande des Unterkiefers am vordern Theile des Halses über dem Kehlkopf, ohne direct mit irgendeinem Theile des Skelets in Verbindung zu treten. Man unterscheidet an ihm den Körper, zwei große und zwei

kleine Hörner. Nur durch lange, schmale Bänder tritt es in Verbindung mit den Griffelfortsätzen der Schläfenbeine und dem Schildknorpel des Kehlkopfes.

Der Körper oder die Basis, corpus oder basis ossis hyoidei (Taf. 3, Fig. 14a), ist das mittlere Stück; es hat eine äußere obere convexe, und eine innere untere concave Fläche. An beide Enden setzen sich

die großen Hörner, cornua majora (Taf. 3, Fig. 14b), an, welche an ihrem freien Ende mit einem runden Knötchen, dem Knöpfchen der großen Hörner, tuberculum cornuum majorum (Taf. 3, Fig. 14d), enden.

Die kleinen Hörner, cornua minora (Taf. 3, Fig. 14c), steigen schräg nach auf- und rückwärts vom Körper da, wo sich derselbe mit den großen Hörnern verbindet.

Die Zähne.

Die Zähne, dentes, mordices (Taf. 3, Fig. 12k, l, m, 13m, n, o, 15—23) sind knochenähnliche Körper, an der Zahl 32, welche mit einem Theile, der Krone, corona (Taf. 3, Fig. 16a), frei in die Mundhöhle hervorragen, mit dem andern Theile, der Wurzel, radix (Taf. 3, Fig. 15c), in den Zahnzellen des Ober- und Unterkiefers stehend; beide Theile werden durch den Hals, collum (Taf. 3, Fig. 15b) miteinander verbunden. Die Zähne bilden zwei Reihen, zu je 16 Stück, welche dem Ober- und Unterkiefer eingefügt sind. Jede Reihe zerfällt wieder in vier Schneidezähne, dentes incisivi (Taf. 3, Fig. 12k, 13m, 15, 16, 17), welche die Mitte des Kiefers einnehmen, zwei Eck- oder Spitzzähne, dentes canini (Taf. 3, Fig. 12l, 13p, 18, 19, 20), von denen der eine rechts, der andere links von den Schneidezähnen seinen Platz hat; und zehn Backzähnen, dentes buccales (Taf. 13, Fig. 12m, 13o, 21—26), welche sich zu je fünf an beiden Seiten den Eckzähnen anschließen; von diesen heißen die sechs größten hintern Mahlzähne, dentes molares (Taf. 13, Fig. 24, 25, 26).

Jeder Zahn hat in seinem Innern eine Höhle, die Zahnhöhle, cavum dentis (Taf. 3, Fig. 17a), zu welcher von der Spitze der Wurzel ein feiner Gang, der Zahncanal, canalis dentis (Taf. 3, 17b), führt.

Außer den bereits oben erwähnten Theilen: der Krone, dem Halse und der Wurzel, unterscheidet man an jedem Zahne drei Substanzen: den Zahnschmelz oder die Email, substantia vitrea, die Knochen- oder Bindesubstanz, auch Cement genannt, substantia osteoidea, und die Eisenbein- oder Zahnschubstanz, auch das Zahnbein, substantia eburnea oder dentinea.

Die Krone, corona (Taf. 3, Fig. 15a), ist der frei in die Mundhöhle ragende Theil des Zahnes, sie besteht aus Zahnschubstanz und ist außen mit Zahnschmelz überzogen; in das Innere der Krone erstreckt sich ein Theil der Zahnhöhle.

Der Hals, collum (Taf. 3, Fig. 15b), ist der Theil des Zahnes, welcher sich unmittelbar an die Krone anschließt und vom Saume des Zahnfleisches umgeben wird. Er ist hohl und besteht aus Zahnschubstanz, die außen von einer Scheide Knorpelsubstanz überkleidet wird.

Die Wurzel, radix (Taf. 3, Fig. 15c), bildet den untern Theil des Zahns, welcher in der Zahnzelle steckt. Sie wird von dem Zahncanal durchsetzt und besteht aus Zahnschubstanz, die außen von Knorpelsubstanz umgeben ist.

Zur Unterscheidung der verschiedenen Zähne untereinander gibt Brod ein sehr instructives Schema an, das wir hier folgen lassen:

Schneidezähne, dentes incisivi, auch pectores oder incisores (Taf. 3, Fig. 12k, 13m, 15, 16, 17).

Es sind vier Stück in jedem Kiefer, welche einander in der Mitte der Zahneide und an den Enden nach vorn stehen. Man kann zwei rechte und zwei linke, oder zwei innere und zwei äußere Zähne annehmen.

Die Krone ist meißelförmig, breit, glatt, an vordern Fläche convex, auf der hintern schmal dreieckig concav, am freien oder kaudalen Ende breiter, aber dünner, gegen die Wurzel zu schmaler. Die Schneide ist mit drei nur aus den vorderen Enden bestehenden Spizen versehen, die sich aber nicht schleifen. Die Schmelzlage ist vorn dicker, hinten zu am dünnsten an den Seiten.

Die Wurzel ist einfach rundlich, stumpf, nicht so lang als bei den andern Zähnen.

Die obern Schneidezähne sind stärker, dicker, und hervorstechender als die untern, beiderseits in der Mitte. Die Richtung ihrer Achsen ist oben nach unten etwas vorwärts und gegenaußen. Die untern Schneidezähne sind viel kleiner als die obern; besonders klein ist das innere Paar, das recht steht, während das äußere Paar nach außen einanderweicht.

Spitzzähne, dentes canini, auch angulati oder laniarii (Taf. 3, Fig. 12l, 13n, 18, 19, 20).

Es sind zwei Stück in jedem Kiefer, welche einander gegenüber, der eine am rechten, der andere am linken äußern Schneidezahn steht. Die im Oberkiefer heißen auch Augenzähne, die untern Eck- oder Spitzzähne.

Die Krone ist größer, dicker und länger als die der Schneidezähne und bildet einen Kegelförmigen Pyramide, die rundlich, stumpf-spitzig, vorn etwas hinten in zwei ungleiche, etwas ausgehöhlte Flächen geschieden ist. Der Schmelz ist dicker, besonders an den Seiten, als bei den Schneidezähnen.

Die Wurzel ist einfach, länger, dicker und stumpfer als bei den Schneidezähnen, von der Spitze ist sie platt zusammengebrückt.

Die obern Spitz- oder Augenzähne sind länger als die untern, ihre Krone ist höher als die der Schneidezähne.

Die untern Spitz- oder Hundszähne greifen beim Schließen des Mundes zwischen den obern Eck- und Schneidezahn ein.

Backenzähne, dentes buccales (Taf. 3, Fig. 13o, 21—26), die hintern drei auf jeder Seite. Die vordern drei heißen Mahlzähne, dentes molares (Taf. 3, Fig. 24, 25, 26).

Es sind zehn Stück in jedem Kiefer, von denen fünf an den rechten, die andern fünf an den linken Spitzzahn anschließen. Die zwei vordern, vorderen, buccales genannt, sind die kleinern und haben zwei Wurzeln, weshalb sie zweispitzig, bicuspidati heißen, während die drei hintern, welche die Mahlzähne, dentes molares, heißen, größer sind und nur eine Wurzel haben, weshalb sie dreispitzig, tricuspidati oder quadricuspidati genannt werden.

Die Krone ist mehr breit als hoch, rundlich, seitig, zähig und eingekleift. Die Kronen der vorderen Zähne zeigen zwei kurze stumpfe Spizen, die äußere höhere und stärkere, und eine innere niedriger und schwächere. Die Mahlzähne haben die Krone der Kaulfläche, zwischen denen eine freistehende Vertiefung bleibt, versehen sind.

Die Wurzel ist, wie schon erwähnt, meist einfach und zwar bei den vordern Backzähnen mehr

te, doch kommt es auch vor, daß diese zu einem
ten, nur am äußersten Ende gespaltenen Zapfen
achsen, der aber dann immer noch zwei Kauläste
äst, als wenn die Wurzeln getrennt wären. Die
stämme sind seltener nur mit zwei, häufiger mit
meist mit drei Wurzeln versehen.

Die obern Backzähne sind mit ihren Achsen nach oben gerichtet und haben öfter eine Wurzel mehr als die ihnen entsprechenden untern Backzähne. Die untern Backzähne sind mit ihren Achsen nach unten gerichtet.

Der letzte Backzahn, sowohl oberer wie unterer, führt den Namen Weisheitszahn, dens sapientiae, er ist erst in spätern Jahren durch, bleibt auch oft ganze Leben über im Kiefer verborgen.

Die Sämelgebähne, Spitzgebähne und vordern Backgebähne werden gewechselt, während die Mahlgähne lebenslang bleibend sind. Die nicht bleibenden Gebähne werden Milchgebähne, dentes decidui, genannt, während die bleibenden dentes permanentes heißen. Die ersten sind etwas kleiner als die bleibenden, und besitzen auch etwas kürzere Wurzeln. Das Ausfallen der Milchgebähne findet vom sechsten oder siebenten Jahre an statt. Was die Gebähne bildenden Substanzen betrifft,

stellt das Zahnbein die Grundlage und Hauptstange der Zähne dar. Es umgibt die Zahnhöhle in der Zahnkrona und bildet das Innere der Krone, des Halses und der Wurzel. Umgeben ist es an der Krone von der Email, die namentlich an der Kaufläche am dichtesten aufgetragen ist und nach dem Halse hin immer dünner wird, während Hals und Wurzel von der Knochensubstanz überzogen werden. Diese ist die dichteste, härteste und sprödeste Masse im Körper, sie besteht fast nur aus anorganischen Theilen und ist außerordentlich fest mit dem darunter befindlichen Zahnbein verbunden. Die Knochensubstanz oder das Cement bildet eine Scheibe um den von der Email umgebenen dem Zahnschmelz nicht überzogenen Theil des Zahns, und stimmt mit der gewöhnlichen Knochenstruktur vollständig überein, während die Zahnhöhle weicher, dichter und undurchsichtiger als die Knochensubstanz ist und mehr erdige Bestandtheile als diese enthält. Sie besteht aus einer homogenen Grundsubstanz, durch welche sehr feine Nerven, etwas Blut und wellenförmig gebogen, in der Richtung von der Zahnhöhle nach der Oberfläche des Zahns verlaufen, der Zahnschmelz dagegen aus aneinander gereihten Prismen, welche regelmäßig angeordnet vom Zahnhorn bis zur Oberfläche des Zahns sich erstrecken. Dieser Zahnschmelz ist aus einem sehr zarten, vollkommen homogenen und verästelteten Substanz, das Schmelzoberhäutchen, cuticula, überzogen, das Zahnschmelz an seiner freien Oberfläche ist außerordentlich fest mit diesem verbunden.

Durch den Zahnlkanal tritt in die Zahnhöhle ein
sowie ein arterielles Blutgefäß ein, ein venöses
aus.

ie Gehörknöchelchen, ossicula auditoria.

Das Gehörorgan liegt zu beiden Seiten des Schädels im Schädelbeine und wird in drei Abtheilungen eingetheilt: in den äußern, welcher die eigentümlich-knochenartige Ohrmuschel, den äußern Gehörgang (Taf. 2, Fig. 2a, 3p; Taf. 3, Fig. 2e) und das Trommelfell umfaßt, in den mittlern, die sogenannte Paukenhöhle mit den Gehörknöchelchen und der Ohrtrompete, und in den innern, das Labyrinth.

Wir haben es gegenwärtig nur mit den Gehör-
schelchen und dem Labrinthe zu thun und gehen

auf die übrigen Theile nur insoweit ein, als es das Verständniß jener erfordert.

Der äußere Gehörgang, *meatus auditorius externus* (Taf. 2, Fig. 2q, 3p; Taf. 3, Fig. 2e), welcher mit einer trichterförmigen Oeffnung in der Ohrmuschel beginnt, zur Hälfte knorpelig, zur Hälfte knöchern ist und mit letzterer im Felsenbeine des Schläfenbeins etwas nach vorn, innen und unten läuft, wird an seinem innern Ende durch das Trommel- oder Paukenfell, *membrana tympani*, geschlossen. Dasselbe ist eine dünne elastische Haut, welche den äußern Gehörgang von der Paukenhöhle trennt. Die Lage dieser Membran ist schräg, jedoch der untere und vordere Theil des äußern Gehörgangs weiter nach innen reichen, als der obere und hintere. Gegen die Mitte ist das elliptisch gefornnte Trommelfell trichterförmig nach innen gezogen, von welcher Stelle aus etwas nach hinten eine kleine längliche Erhabenheit geht. Diese Unterbrechungen der Ebene werden durch den an der innern Fläche des Trommelfells angewachsenen Hammer hervorgebracht, welcher von außen angefangen, die Reihe der Gehörknöchelchen eröffnet, die durch die Paukenhöhle hindurchgehen und sich bis zum Labyrinth erstrecken.

Die Gehörknöchelchen, *ossicula auditoria* (Taf. 3, Fig. 27, 28, 29, 30, 31), sind der Zahl nach drei. Sie sind durch Gelenke miteinander verbunden, wodurch sie zu einer beweglichen, mehrfachen geknickten Kette (Taf. 3, Fig. 31) vereinigt sind, und in Bewegung gesetzt wie ein Kniehebel wirken. Sie bestehen aus Knorpelsubstanz, wie alle andern Knochen, und sind an ihren Gelenkflächen mit Knorpelsubstanz überzogen. Sie sind sehr klein und zart, wie die auf Taf. 3, Fig. 27a. b. c. wiedergegebene Abbildung zeigt.

Der Hammer, malleus (Taf. 3, Fig. 27a, 28), ist das größte der Gehörknöchelchen. Er hat die Form einer Keule, welche am Halse etwas gekniet ist, und von wo ziemlich unter einem Winkel von 90 Grad ein langer Fortsatz ausgeht.

Man unterscheidet am Hammer fünf Theile: den Kopf, Hals, Handgriff und den langen und kurzen Fortsatz.

Der Kopf, caput (Taf. 3, Fig. 28 a, 31 a), ist der oberste birnenförmige Theil des Hammers. An demselben befindet sich eine Gelenkfläche (Taf. 3, Fig. 28 c) für den Amboss. Unter derselben geht der Kopf, indem er sich verjüngt, in den

Halb, collum (Taf. 3, Fig. 28 b, 31 b), über. Der-
 selbe geht vom Kopf auswärts nach dem Trommelfell
 zu, und bildet mit dem

Handgriff, manubrium (Taf. 3, Fig. 28 c, 31 c), einen stumpfen Winkel. Derselbe, der sich vom Halse an bis zur Spitze immer mehr verjüngt, liegt schräg nach vor-, ab- und einwärts und ist in das Trommelfell eingefügt, dessen obere Hälfte bis über die Mitte herab er in radialer Richtung durchschneidet.

Der lange Fortsatz, processus longus oder Fohianus (Taf. 3, Fig. 28d, 31d), entspringt gleichfalls vom Halse des Hammers, bildet mit dem Handgriff ungefähr einen rechten Winkel und erstreckt sich von der vorderen Seite des Halses in horizontaler Richtung über das Trommelfell nach vorn.

Der kurze Fortsatz, processus brevis oder obtusus (Taf. 3, Fig. 31c), ragt an der Stelle, wo der Handgriff mit dem Halse einen klumpigen Winkel bildet, nach außen und etwas nach oben hervor und drängt an dieser Stelle das Trommelfell etwas nach dem äußern Gehörgang hervor, während die Spitze des Handgriffs dasselbe etwas nach innen zieht, wodurch dessen trichterförmige Gestalt hervorgebracht wird.

Der Amboss, *incus* (Taf. 3, Fig. 27b, 29), articulirt mit dem Hammer, legt sich an dessen Gelenkfläche an und erstreckt sich von da im hintern obern Theile der Paukenhöhle an deren äußerer Wand nach innen. Die Gestalt des Ambosses ist ziemlich die eines Badzahns, dessen beide Wurzeln stark auseinandergehen.

Man unterscheidet am Amboss vier Theile: den Körper, den kurzen und längen Fortsatz und das linsenförmige Knöchelchen.

Der Körper, *corpus* (Taf. 3, Fig. 29a, 31f), ist der oberste dicke Theil des Ambosses von länglich ovaler Gestalt. Derselbe ist an seiner vordern obern Fläche mit einer Gelenkgrube (Taf. 3, Fig. 29b) für den Kopf des Hammers versehen. Von dem obern und hintern Rande des Ambosses geht der

Kurze Fortsatz, *processus brevis* (Taf. 3, Fig. 29c, 31g), aus. Derselbe geht schräg ab- und rückwärts zur hintern untern Wand der Paukenhöhle.

Der lange Fortsatz, *processus longus* (Taf. 3, Fig. 29d, 31h), entspringt aus dem untern Rande des Körpers und geht fast parallel mit dem Handgriff des Hammers, hinter diesem frei in die Paukenhöhle hineinragend, nach abwärts. An der äußersten, schwach gebogenen Spitze desselben befindet sich das

Linseförmige Knöchelchen, *ossiculum lenticulare Sylvii* (Taf. 3, Fig. 29e), welches mit einer Gelenkfläche versehen ist, an die sich der

Steigbügel, *stapes* (Taf. 3, Fig. 27c, 30), anlegt. Derselbe bildet mit dem langen Fortsatz des Ambosses einen rechten Winkel und ragt ziemlich in horizontaler Richtung in die Paukenhöhle hinein, sich nach innen bis zum Labyrinth erstreckend, wo er dem ovalen Fenster desselben eingefügt ist. Die Form des Steigbügels wird vollständig durch den Namen gekennzeichnet. Man unterscheidet an ihm das Köpfchen, die beiden Schenkel und den Fußtritt.

Das Köpfchen, *capitulum* (Taf. 3, Fig. 30a), legt sich mit einer Gelenkfläche an das linsenförmige Knöchelchen an. Von demselben aus gehen in horizontaler Richtung die beiden schwach geträumelten

Schenkel, *crura* (Taf. 3, Fig. 30b, 31i), von welchen man einen vordern und hintern unterscheidet. Verbunden werden die beiden auseinandergehenden Schenkel nach innen durch den

Fußtritt oder die Basis, *basis stapedis* (Taf. 3, Fig. 30c, 31k). Dieselbe bildet auf ihrer Fläche ein längliches Oval, mit der sie in das ovale Fenster des Labyrinthes eingefügt ist.

Die Verbindung der Gehörknöchelchen unter sich findet durch Bänder statt, außerdem werden sie sämmtlich von der Schleimhaut der Paukenhöhle überkleidet und besitzen eigene kleine Muskeln, welche sie zu bestimmten Zwecken in Bewegung setzen können.

Das Labyrinth, *labyrinthus*.

Das Labyrinth bildet den innersten Theil des Gehörgangs. An demselben unterscheidet man das knöcherne Labyrinth, *labyrinthus osseus* (Taf. 3, Fig. 32, 33), und das häutige Labyrinth, *labyrinthus membranaceus*. Ersteres zerfällt in den Vorhof, die Vogengänge und die Schnecke.

Der Vorhof, *vestibulum* (Taf. 3, Fig. 32B, 33B), bildet die Verbindung zwischen den Vogengängen und der Schnecke und nimmt den mittlern Theil des Labyrinthes ein. Nach außen öffnet er an die Paukenhöhle, nach innen an den innern Gehörgang, durch welchen der Gehörnerv zum Labyrinth gelangt.

Nach der Paukenhöhle zu befindet sich im Vorhof eine größere Oeffnung, das ovale Fenster, *fenestra*

ovalis (Taf. 3, Fig. 32c), welches durch die Membran des Steigbügels bedeckt wird.

Die Vogengänge oder halbzirkelförmigen Kanäle, *canales semicirculares* (Taf. 3, Fig. 32d, 32e, 33c, 33d), stellen drei gebogene Röhren dar, welche aus dem Vorhof entspringen und den nach außen gelegenen Theil des Labyrinthes bilden. Aus der Ursprung im Vorhof sind die Vogengänge zum Theil angeknüpft, welche Erweiterung die Ampulle, *ampulla ossea* (Taf. 3, Fig. 32d, 33d), genannt wird, im weiteren Verlauf verengern sich aber.

Die drei halbzirkelförmigen Kanäle unterscheiden sich als obere, untere und äußere Vogengänge.

Der obere Vogengang (Taf. 3, Fig. 32d, 33d) steht senkrecht auf der Längsachse des Kopfes und biegt sich von vorn und innen nach hinten außen, so daß seine höchste Wölbung als eine Fortsetzung auf der obern Fläche des Felsenbeins des Kopfes hervortritt.

Aus dem Vorhof entspringt er mit der Ampulle, *ampulla superior* (Taf. 3, Fig. 32d, 33d), während der hintere Schenkel sich mit dem obern des untern Vogengangs gemeinschaftlich ohne Anschwellung wieder in den Vorhof öffnet.

Der untere oder hintere Vogengang (Taf. 3, Fig. 32e, 33e) ist mit seiner Ebene in einem stumpfen Winkel zu vorigem gestellt und liegt im vordern Theil des Felsenbeins. Der untere Schenkel springt mit der untern Ampulle, *ampulla inferior* (Taf. 3, Fig. 32e, 33e), aus der untern des Vorhofs, während, wie schon erwähnt, der hintere Schenkel mit dem hintern des obern Vogengangs gemeinsam in den Vorhof einmündet.

Der äußere oder horizontale Vogengang (Taf. 3, Fig. 32c, 33c) liegt mit seiner senkrechten zum Querschnitt des Felsenbeins. Er springt mit der vordern Ampulle, *ampulla lateralis* (Taf. 3, Fig. 32c, 33c), aus der äußern des Vorhofs und mündet in denselben nach zwischen den beiden Schenkeln des untern Vogengangs.

Die Schnecke, *cochlea* (Taf. 3, Fig. 32A), wird aus einer spiralförmig $2\frac{1}{2}$ mal aufgewunden sich nach oben verjüngenden Röhre gebildet. Sie nach vorn vom Vorhof und sieht mit ihrer Basis (Taf. 3, Fig. 32a), nach unten und mit ihrer Basis nach innen und etwas nach hinten oben. Im rechten Ohr ist die Schnecke nach links links gewunden.

Die Röhre wird der Länge nach durch ein knöchernes, halb häutige Scheidewand, die Lamina spiralis, in zwei Hälften getheilt, welche Treppen, *scalae*, heißen, von welcher obere, engere und längere, die Vorhofstreppe, *vestibuli*, die andere untere dagegen die Innenstreppe, *scala tympani*, genannt wird, nach dem runden Fenster, *fenestra rotunda* (Taf. 3, Fig. 32c, 33d), welches durch eine Membran geschlossen ist, ihren Anfang nimmt, während die obere in den Vorhof einmündet.

Die Windungen der Schnecke drehen sich um ein knöchernes Achse, welche an ihrer Basis das modiolus (Taf. 3, Fig. 33a), genannt wird, mehrere kleinen Röhren für den Durchstromen einen mittlern größern Kanal, den centralen modiolus (Taf. 3, Fig. 33b), enthält, zweite Windung heißt mit knöcherner Achse, *canalis, columella*, und für die letzte halb das Spindelblatt, *lamina modiolus*.

Innere des Labyrinths, in welchem der Gehörflüssigkeit sich ausbreitet, ist hohl und mit einer flüssigen perilymphe oder aqua Cotunni erfüllt, das im Vorhof und in den Bogengängen aufsteigende Labyrinth, labyrinthus membranosus, umspült, so daß dieses in ihr flottirt, und sie sich außerdem auch in die Treppen der Ampulle ergießt, wo die häutige Spiralschnecke, membrana spiralis, in ihr schwingen kann, und so leiten, wie in den Säcken des häutigen Labyrinths, die sich in den Ampullen befinden, der Nerv endet.

Tafel 4.

Nachdem auf den Taf. 2 und 3 die verschiedenen Arten der Wirbel sowie deren Modificationen in der Schädelknochen zur Anschauung gebracht worden bringt die uns vorliegende Taf. 4 zunächst die Beschreibung der einzelnen Wirbel zur Wirbelsäule mit den Anhängen, den Rippen, dem rechten Schlüssel- und Schulterblatt, sowie dem Brustbeine, also auch den Brustkorb oder Thorax, zur Darstellung. Am schließt sich als unterster Theil des Kumpfes das Becken, die Vereinigung der Darm-, Sitz- und Kniebeine als Ganzes mit dem Kreuzbeine. Außerdem bringt diese Tafel noch sämtliche Knochen der oberen und unteren Extremitäten, so daß mit ihr die Beschreibung der Knochenlehre geschlossen werden kann.

1. Der Brustkasten mit den Hals- und Lendenwirbeln, sowie den Schulterknochen der rechten Seite.

Atlas, Träger.

Epistropheus, Umdreher.

Vertebra prominens oder septima colli, der hervorstechende oder siebente Halswirbel.

Canalis vertebralis, Wirbelschale. Durchgang für die Arteria vertebralis.

Processus odontoides epistrophei, Zahnfortsatz des Umdrehers.

Vertebra thoracis oder dorsi prima, erster Brustwirbel.

Vertebra thoracis duodecima, zwölfter Brustwirbel.

Vertebra lumborum oder abdominalis prima, erster Lendenwirbel.

Vertebra lumborum quinta, fünfter Lendenwirbel.

Costa prima vera oder genuina, erste wahre Rippe.

Costa septima, siebente Rippe.

Costa octava, oder costa prima spuria, achte Rippe, oder erste falsche Rippe.

Costa duodecima, zwölfte Rippe.

Manubrium sterni, Handgriff oder Handhabe des Brustbeins.

Corpus sterni, Körper oder Mittelstück des Brustbeins.

Processus xiphoideus oder ensiformis sterni, schwertförmiger Fortsatz des Brustbeins.

Clavicula, Schlüsselbein.

Scapula, Schulterblatt.

Cavitas glenoidalis scapulae, Gelenkgrube des Schulterblattes.

2. Das Becken, pelvis, von vorn.

Acetabulum, Kreuz- oder heiliges Bein.

Pelvis, die Knochen des Beckens (im engeren Sinne).

C. Os ilei, Darm- oder Hüftbein.

D. Os ischii, Sitzbein.

E. Os pubis, Schambein.

a. Processus obliquus superior ossis sacri, oberer Gelenkfortsatz des Kreuzbeins.

b. Basis ossis sacri, Basis des Kreuzbeins.

c. Linea arcuata interna, innere bogenförmige Linie (Anhang auf dem Kreuzbeine).

d. Foramina sacralia anteriora, vordere Kreuzbeinlöcher.

e. Linea arcuata externa, innere bogenförmige Linie, Fortsetzung.

f. Symphysis sacro-iliaca, Hüft-Kreuzbeinlage.

g. Crista ilei, Darmbeinkamm.

h. Spina ilei anterior superior, vorderer oberer Darmbeinstachel.

i. Spina ilei anterior inferior, vorderer unterer Darmbeinstachel.

k. Incisura semilunaris anterior ossis ilei, vorderer halbmondförmiger Einschnitt des Darmbeins.

l. Spina ischii, Sitzbeinstachel.

m. Tuber ileo-pectineum, Darm-Schambeinkammhöcker.

n. Acetabulum, Pfanne.

o. Supercilium acetabuli, Pfannenrand.

p. Incisura acetabuli, Pfanneneinschnitt.

q. Foramen obturatorium, Hüftloch.

r. Ramus horizontalis ossis pubis, horizontaler Ast des Schambeins.

s. Spina pubis, Schambeinstachel.

t. Ramus descendens ossis pubis, absteigender Ast des Schambeins.

u. Symphysis ossium pubis, Schambeinlage.

v. Ramus ascendens ossis ischii, aufsteigender Ast des Sitzbeins.

w. Tuber ossis ischii, Sitzknorren.

x. Ramus descendens ossis ischii, absteigender Ast des Sitzbeins.

Figur 3. Rippe, costa, von außen.

A. Extremitas posterior costae, hinterer Rippenrand.

B. Corpus costae, Rippenkörper.

C. Extremitas anterior costae, vorderer Rippenrand.

a. Capitulum, Köpfchen.

b. Collum, Hals.

c. Tuberculum, Höckerchen.

d. Angulus, Winkel.

e. Margo superior, oberer Rand.

f. Margo inferior, unterer Rand.

g. Superficies externa, äußere Fläche.

h. Superficies interna, innere Fläche.

i. Sulcus costalis, Rippenrinne.

Figur 4. Rippe, costa, von innen.

A—C und a—h wie bei Fig. 3.

Figur 5. Das linke Schlüsselbein, clavicula sinistra, von vorn und oben.

a. Corpus claviculae, Körper oder Mittelstück des Schlüsselbeins.

b. Pars oder extremitas sternalis, inneres oder Brustbeinende.

c. Pars oder extremitas acromialis, äußeres oder Schulterblattende.

d. Superficies articularis, Gelenkfläche.

Figur 6. Das linke Schlüsselbein, *clavicula sinistra*, von unten und hinten.

- a. *Corpus claviculae*, Körper des Schlüsselbeins.
- b. *Pars sternalis*, inneres Ende.
- c. *Pars acromialis*, äußeres Ende.
- d. *Tuberositas* für das *ligamentum rhomboideum*, Höckerchen für das rautenförmige Band.
- e. *Tuberositas* für das *ligamentum coraco-claviculare*, Höckerchen für das Schulterblatt-Nabenschabelfortsatzband.

Figur 7. Das linke Schulterblatt, *scapula sinistra*, von hinten.

- a. *Fossa supraspinata scapulae*, Grube über der Schultergrube des Schulterblattes.
- b. *Fossa infraspinata scapulae*, Grube unter der Schultergrube des Schulterblattes.
- c. *Spina scapulae*, Schultergräte.
- d. *Acromion*, Schulterhöhe.
- e. *Superficies articularis* für die *extremitas acromialis claviculae*, Gelenkfläche für das äußere Ende des Schlüsselbeins.
- f. *Processus coracoideus*, Nabenschabelfortsatz.
- g. *Incisura scapulae*, Schulterblatteinschnitt.
- h. *Margo superior scapulae*, oberer Rand des Schulterblattes.
- i. *Angulus superior scapulae*, oberer Winkel des Schulterblattes.
- k. *Basis* oder *margo posterior scapulae*, hinterer Rand des Schulterblattes.
- l. *Angulus inferior scapulae*, unterer Winkel des Schulterblattes.
- m. *Margo anterior scapulae*, vorderer Rand des Schulterblattes.
- n. *Condylus scapulae*, Gelenkfortsatz des Schulterblattes.
- o. *Collum scapulae* mit *incisura colli*, Hals des Schulterblattes mit dem Halsbeinschnitt.
- p. *Cavitas glenoidalis*, Gelenkgrube.

Figur 8. Das linke Schulterblatt, *scapula sinistra*, von vorn.

- a. *Superficies anterior scapulae*, vordere Fläche des Schulterblattes.
- b. *Condylus scapulae*, Gelenkfortsatz des Schulterblattes.
- c. *Cavitas glenoidalis*, Gelenkgrube.
- d. *Supercilium glenoidale*, Rand der Gelenkgrube.
- e. *Acromion*, Schulterhöhe.
- f. *Superficies glenoidalis* für die *pars extremitas acromialis claviculae*, Gelenkfläche für das äußere Ende des Schlüsselbeins.
- g. *Processus coracoideus*, Nabenschabelfortsatz.
- h. *Margo superior scapulae*, oberer Rand des Schulterblattes.
- i. *Incisura scapulae*, Schulterblatteinschnitt.
- k. *Angulus superior scapulae*, oberer Winkel des Schulterblattes.
- l. *Basis* oder *margo posterior scapulae*, hinterer Rand des Schulterblattes.
- m. *Angulus inferior scapulae*, unterer Winkel des Schulterblattes.
- n. *Margo anterior scapulae*, vorderer Rand des Schulterblattes.
- o. *Tuberositas* für den *musculus triceps*, Höcker für den dreiköpfigen Muskel.

Figur 9. Dorsal- (Rücken-)fläche des linken Oberarmknochens, *ossis humeri*.

- a. *Caput ossis humeri*, Kopf des Oberarmknochens.
- b. *Tuberculum majus*, größerer Höcker.
- c. *Collum ossis humeri*, Hals des Oberarmknochens.
- d. *Corpus ossis humeri*, Körper oder Schaft des Oberarmknochens.
- e. *Margo externus*, äußerer Rand.
- f. *Margo internus*, innerer Rand.
- g. *Condylus internus*, innerer Gelenkfortsatz.
- h. *Condylus externus*, äußerer Gelenkfortsatz.
- i. *Rotula* oder *eminencia capitata*, kopfförmiger Fortsatz.
- k. *Fossa supratrochlearis posterior*, hinterer Trochantergrube.

Figur 10. Polarfläche des linken Oberarmknochens, *ossis humeri*.

- a. *Caput ossis humeri*, Kopf des Oberarmknochens.
- b. *Collum ossis humeri*, Hals des Oberarmknochens.
- c. *Tuberculum majus*, größerer Höcker.
- d. *Tuberculum minus*, kleinerer Höcker.
- e. *Sulcus intertubercularis* oder *longitudinalis*, Rinne zwischen beiden Höckern.
- f. *Spina tuberculi majoris*, Dorn oder Spitze des größeren Höckers.
- g. *Spina tuberculi minoris*, Dorn oder Spitze des kleineren Höckers.
- h. *Corpus*, Körper.
- i. *Margo internus*, innerer Rand.
- k. *Margo externus*, äußerer Rand.
- l. *Condylus internus*, innerer Gelenkfortsatz.
- m. *Condylus externus*, äußerer Gelenkfortsatz.
- n. *Processus cubitalis*, Ellenbogenfortsatz.
- o. *Rotula* oder *eminencia capitata*, kopfförmiger Fortsatz.
- p. *Trochlea*, Rolle.
- q. *Fossa anterior major*, vordere größere Grube.
- r. *Fossa anterior minor*, vordere kleinere Grube.

Figur 11. Dorsalfläche des linken Ellenbogenbeins, *ulnae sinistrae*.

- a. *Olecranon* oder *processus anconaeus*, Ellenbogen.
- b. *Processus coronoideus*, Kronenfortsatz.
- c. *Fossa sigmoidea major*, größere sichelförmige Grube.
- d. *Corpus*, Körper.
- e. *Angulus internus*, innerer Winkel.
- f. *Angulus externus*, äußerer Winkel.
- g. *Capitulum*, Köpfchen.
- h. *Processus styloideus ulnae*, griffelförmiger Fortsatz des Ellenbogenbeins.

Figur 12. Polarfläche des linken Ellenbogenbeins, *ulnae sinistrae*.

- a. *Olecranon*, Ellenbogen.
- b. *Processus coronoideus*, Kronenfortsatz.
- c. *Fossa sigmoidea major*, größere sichelförmige Grube.
- d. *Fossa sigmoidea minor*, kleinere sichelförmige Grube.
- e. *Corpus*, Körper.
- f. *Capitulum*, Köpfchen.
- g. *Processus styloideus ulnae*, griffelförmiger Fortsatz des Ellenbogenbeins.

Figur 13. Dorsalfäche der linken Speiche, radii sinistri.

Capitulum radii, Köpfchen der Speiche.
Circumferentia articularis, Gelenkumtreis.
Collum radii, Hals der Speiche.
Corpus, Körper.
Crista radii, Leiste der Speiche.
Extremitas inferior, unteres Ende.
Processus styloideus radii, griffelförmiger Fortsatz der Speiche.
Incisura ulnaris oder semilunaris radii, halbmondformiger oder Einbogeneinschnitt.
Cavitas glenoidalis inferior radii, untere Gelenkgrube der Speiche.

Figur 14. Die Volarfläche der linken Speiche, radii sinistri.

Capitulum, Köpfchen.
Cavitas glenoidalis für die rotula, Gelenkgrube für die knorpelförmige Erhabenheit.
Circumferentia articularis, Gelenkumtreis.
Collum radii, Hals der Speiche.
Tuberositas radii, Speichenhöckerchen.
Corpus, Körper.
Extremitas inferior, unteres Ende.
Processus styloideus radii, griffelförmiger Fortsatz der Speiche.
Incisura ulnaris radii, Einbogeneinschnitt der Speiche.
Cavitas glenoidalis inferior radii, untere Gelenkgrube der Speiche.
Crista radii, Leiste der Speiche.

Figur 15. Oberste Reihe der linken Handwurzelknochen, ossium carpi sinistri, von der Vorderarmfläche aus gesehen.

a. Os naviculare, Kahnbein.
b. Os lunatum, Mondbein.
c. Os triquetrum, dreieckiges Bein.
d. Os pisiforme, Erbsebein.
e. Os multangulum majus, großes vieleckiges Bein.
f. Hamulus ossis hamati, Haken des Hakenbeins.
g. Eminentia carpi radialis prima oder superior, erste oder obere radiale Hervorragung der Handwurzelknochen.
h. Eminentia carpi radialis secunda oder inferior, zweite oder untere radiale Hervorragung der Handwurzelknochen.
i. Eminentia carpi ulnaris prima oder superior, erste oder obere ulnare Hervorragung der Handwurzelknochen.
j. Eminentia carpi ulnaris secunda oder inferior, zweite oder untere ulnare Hervorragung der Handwurzelknochen.

Figur 16. Untere Reihe der linken Handwurzelknochen, ossium carpi sinistri, von der Fingerfläche aus gesehen.

a. Os multangulum majus, großes vieleckiges Bein.
b. Os multangulum minus, kleines vieleckiges Bein.
c. Os capitatum, Kopfbein.
d. Os hamatum, Hakenbein.
e. Hamulus ossis hamati, Haken des Hakenbeins.
f. Os pisiforme, Erbsebein.

Figur 17. Die Knochen der linken Hand, manus sinistrae, von der Hohlhandfläche aus gesehen.

Carpus, Handwurzel.

Erste Reihe.

- a. Os naviculare, Kahnbein.
- b. Os lunatum, Mondbein.
- c. Os triquetrum, dreieckiges Bein.
- d. Os pisiforme, Erbsebein.

Zweite Reihe.

- e. Os multangulum majus, großes vieleckiges Bein.
- f. Os multangulum minus, kleines vieleckiges Bein.
- g. Os capitatum, Kopfbein.
- h. Os hamatum, Hakenbein.
- i. Hamulus ossis hamati, Haken des Hakenbeins.

Metacarpus, Mittelhand.

- k. Ossa metacarpi, Mittelhandknochen.
- l. Basis ossium metacarporum, Basis oder oberes Ende der Mittelhandknochen.
- m. Capitulum ossium metacarporum, Köpfchen der Mittelhandknochen.
- Phalanges digitorum, Fingerglieder.
- n. Os phalangis primae pollicis, Knochen des ersten Gliedes des Daumens.
- o. Os phalangis secundae pollicis, Knochen des zweiten Gliedes des Daumens.
- p. Ossa phalangum digitorum, series prima oder superior, erste oder oberste Reihe der Fingergliederknochen.
- q. Ossa phalangum digitorum, series secunda oder media, zweite oder mittlere Reihe der Fingergliederknochen.
- r. Ossa phalangum digitorum, series tertia oder inferior, dritte oder untere Reihe der Fingergliederknochen.
- s. Ossa sesamoidea, Sesambeinchen.

Figur 18. Die Knochen der linken Hand, manus sinistra, im Zusammenhange von der Rückenfläche aus gesehen.

- A. Carpus, Handwurzel.
- B. Metacarpus, Mittelhand.
- C. Digni manus, Finger der Hand.
- Ossa carpi, Handwurzelknochen.

Erste Reihe.

- a. Os naviculare, Kahnbein.
- b. Os lunatum, Mondbein.
- c. Os triquetrum, dreieckiges Bein

Zweite Reihe.

- d. Os multangulum majus, großes vieleckiges Bein.
- e. Os multangulum minus, kleines vieleckiges Bein.
- f. Os capitatum, Kopfbein.
- g. Os hamatum, Hakenbein.
- Metacarpus, Mittelhand.
- h. Os metacarpi primum oder pollicis, erster Mittelhandknochen.
- i. Os metacarpi secundum oder indicis, zweiter Mittelhandknochen.
- k. Os metacarpi tertium oder digiti medii, dritter Mittelhandknochen.
- l. Os metacarpi quartum oder digiti annularis, vierter Mittelhandknochen.
- m. Os metacarpi quintum oder digiti minimi, fünfter Mittelhandknochen.
- n. Basis ossium metacarpi, Basis oder oberes Ende der Mittelhandknochen.

- o. Capitulum ossium metacarpi, Köpfchen der Mittelhandknochen.
- p. Os phalangis primae pollicis, erstes Glied des Daumens.
- q. Os phalangis secundae pollicis, zweites Glied des Daumens.
- r. Ossa phalangum, series superior, obere Reihe der Fingergliederknochen.
- s. Ossa phalangum, series media, mittlere Reihe der Fingergliederknochen.
- t. Ossa phalangum, series inferior, untere Reihe der Fingergliederknochen.

Figur 19. Der linke Oberschenkelknochen, os femoris sinistri, von vorn gesehen.

- a. Caput ossis femoris, Kopf des Oberschenkelknochens oder Schenkelkopf.
- b. Fossa ober fovea pro ligamento terete, Grube für das runde Schenkelband.
- c. Collum, Hals.
- d. Trochanter major oder externus, großer oder äußerer Rollhügel.
- e. Trochanter minor oder internus, kleiner oder innerer Rollhügel.
- f. Linea intertrochanterica anterior, vordere Linie zwischen den Rollhügeln.
- g. Corpus, Körper.
- h. Condylus externus femoris, äußerer Gelenkkopf des Oberschenkelknochens.
- i. Condylus femoris internus, innerer Gelenkkopf des Oberschenkelknochens.
- k. Superficies glenoidalis, Gelenkfläche.

Figur 20. Der linke Oberschenkelknochen, os femoris sinistri, von hinten gesehen.

- a. Caput, Kopf.
- b. Fossa pro ligamento terete, Grube für das runde Oberschenkelband.
- c. Collum Hals.
- d. Trochanter major, größerer Rollhügel.
- e. Trochanter minor, kleinerer Rollhügel.
- f. Linea intertrochanterica posterior, hintere Linie zwischen den Rollhügeln.
- g—h. Crura superiora der linea aspera, obere Schenkel der rauhen Linie.
- h. Linea aspera, rauhe Linie.
- i—l. Crura inferiora der linea aspera, untere Schenkel der rauhen Linie.
- k. Corpus, Körper.
- l. Fossa poplitea, Kniegelenkgrube.
- m. Condylus femoris externus, äußerer Gelenkkopf des Oberschenkelknochens.
- n. Condylus femoris internus, innerer Gelenkkopf des Oberschenkelknochens.
- o. Fossa intercondyloidea, Zwischengelenkkopfgrube.

Figur 21. Die linke Kniegelenkpatella, patella sinistra, von vorn gesehen.

- a. Basis, Basis.
- b. Corpus, Körper.
- c. Apex, Spitze.
- d. Margo internus, innerer Rand.
- e. Margo externus, äußerer Rand.

Figur 22. Die linke Kniegelenkpatella, patella sinistra, von hinten gesehen.

- a. Basis, Basis.
- b. Apex, Spitze.

- c. Margo internus, innerer Rand.
- d. Margo externus, äußerer Rand.
- e. Superficies articularis, Gelenkfläche.

Figur 23. Das linke Schienbein, tibia sinistra, von vorn gesehen.

- a. Condylus tibiae internus, innerer Gelenkfortsatz des Schienbeins.
- b. Condylus tibiae externus, äußerer Gelenkfortsatz des Schienbeins.
- c. Cavitas glenoidalis interna, innere Gelenkgrube.
- d. Cavitas glenoidalis externa, äußere Gelenkgrube.
- e. Eminentia intercondyloidea, Erhabenheit zwischen beiden Gelenkfortsätzen.
- f. Superficies glenoidalis lateralis oder peronea, seitliche Gelenkfläche für das Wadenbein.
- g. Tuberositas tibiae, Schienbeinhöcker.
- h. Corpus tibiae, Schienbeinkörper.
- i. Crista tibiae, Schienbeinleiste.
- k. Incisura fibularis tibiae, Wadenbeineinschnitt des Schienbeins.
- l. Fossa glenoidalis für den astragalus, Gelenkgrube für das Sprunggelenk.
- m. Malleolus internus, innerer Knöchel.
- n. Superficies interna tibiae, innere Fläche des Schienbeins.
- o. Superficies tibiae externa, äußere Fläche des Schienbeins.

Figur 24. Das linke Schienbein, tibia sinistra, von hinten gesehen.

- a. Condylus tibiae internus, innerer Gelenkfortsatz des Schienbeins.
- b. Condylus tibiae externus, äußerer Gelenkfortsatz des Schienbeins.
- c. Cavitas glenoidalis externa, äußere Gelenkgrube.
- d. Cavitas glenoidalis interna, innere Gelenkgrube.
- e. Eminentia intercondyloidea, Erhabenheit zwischen beiden Gelenkfortsätzen.
- f. Superficies glenoidalis lateralis oder peronea, seitliche Gelenkfläche des Wadenbeins.
- g. Linea obliqua tibiae, schräge Linie des Schienbeins.
- h. Corpus, Körper.
- i. Malleolus internus, innerer Knöchel.
- k. Incisura fibularis tibiae, Wadenbeineinschnitt des Schienbeins.
- l. Fossa glenoidalis für den astragalus, Gelenkgrube für das Sprunggelenk.

Figur 25. Das linke Wadenbein, fibula sinistra, von vorn gesehen.

- a. Capitulum fibulae, Köpfchen des Wadenbeins.
- b. Superficies articularis tibialis, Gelenkfläche für das Schienbein.
- c. Corpus, Körper.
- d. Malleolus externus, äußerer Knöchel.
- e. Superficies tibialis, Schienbeinoberfläche.
- f. Superficies glenoidalis für den astragalus, Gelenkoberfläche für das Sprunggelenk.

Figur 26. Das linke Wadenbein, fibula sinistra, von hinten gesehen.

- a—f. wie bei Figur 25.

27. Die Knochen des linken Fußes, ossa sinistri, von der Fußsohle aus gesehen.

Ossa tarsi, Fußwurzelknochen.

Reihe.

Astragalus oder talus, Sprungbein.

Corpus, Körper.

Tollum, Hals.

Caput, Kopf.

Cavitas articularis inferior pro calcaneo, untere Gelenkgrube für das Ferseubein.

Superficies articularis anterior, vordere Gelenkfläche.

Sulcus oder fovea tali, Sprungbeinrinne.

Calcaneus, Ferseubein.

Corpus, Körper.

Tuber calcanei, Ferseubeinhöcker.

Processus anterior calcanei, vorderer Ferseubeinfortsatz.

Superficies articularis anterior, vordere Gelenkfläche.

Sustentaculum tali, Stütze des Sprungbeins.

Reihe.

Ossa naviculare oder scaphoideum, Kahnbein.

Tuberositas ossis navicularis, Kahnbeinhöcker.

Ossa cuneiforme primum, erstes Keilbein.

Ossa cuneiforme secundum, zweites Keilbein.

Ossa cuneiforme tertium, drittes Keilbein.

Ossa cuboideum, Würfelbein.

Sulcus ossis cuboidei, Würfelbeinrinne.

Metatarsus, Mittelfuß.

Ossa metatarsi, Mittelfußknochen.

Basis ossis metatarsi, Basis des Mittelfußknochens.

Capitulum ossis metatarsi, Köpfchen des Mittelfußknochens.

Tuberositas ossis metatarsi quinti, Höcker des fünften Mittelfußknochens.

Ossa sesamoidea, Sesambeinchen.

Phalanges pedis, Zehen.

Ossa phalangis primae hallucis, Knochen des ersten Gliedes der großen Zehe.

Ossa phalangis secundae hallucis, Knochen des zweiten Gliedes der großen Zehe.

Ossa phalangium digitorum pedis series prima oder posterior, erste oder hinterste Reihe der Zehenknochen.

Ossa phalangium digitorum pedis series secunda oder media, zweite oder mittlere Reihe der Zehenknochen.

Ossa phalangium digitorum pedis series tertia oder anterior, dritte oder vordere Reihe der Zehenknochen.

28. Die Knochen des linken Fußes, pedis sinistri, im Zusammenhange von der Rückenfläche aus gesehen.

Tarsus, Fußwurzel.

Reihe.

Astragalus, Sprungbein.

Calcaneus, Ferseubein.

Reihe.

Ossa naviculare oder scaphoideum, Kahnbein.

Ossa cuneiforme primum, erstes Keilbein.

Ossa cuneiforme secundum, zweites Keilbein.

Ossa cuneiforme tertium, drittes Keilbein.

Ossa cuboideum, Würfelbein.

Metatarsus, Mittelfuß.

Ossa metatarsi hallucis, Mittelfußknochen der großen Zehe.

Ossa metatarsi, Mittelfußknochen.

Phalanges oder digiti pedis, Zehen.

k. Ossa phalangis primae hallucis, Knochen des ersten Gliedes der großen Zehe.

l. Ossa phalangis secundae hallucis, Knochen des zweiten Gliedes der großen Zehe.

m. Ossa phalangium digitorum pedis series prima oder posterior, erste oder hinterste Reihe der Zehenknochen.

n. Ossa phalangium digitorum pedis series secunda oder media, zweite oder mittlere Reihe der Zehenknochen.

o. Ossa phalangium digitorum pedis series tertia oder anterior, dritte oder vordere Reihe der Zehenknochen.

Die Wirbelsäule.

Die Wirbelsäule, auch das Rückgrat, columna vertebralis oder spina dorsi, wird aus den bereits auf Taf. 2 im einzelnen dargestellten Wirbeln, deren es 24 gibt, zusammengefaßt, wozu als Endglieder noch das Kreuzbein, os sacrum (Taf. 2, Fig. 11 und 12, sowie Taf. 4, Fig. 2A) und das Steißbein, os coccygis (Taf. 2, Fig. 13 und 14) kommen. Die 24 Wirbel, vertebrae, werden auch wahre Wirbel, vertebrae verae, genannt, im Gegensatz zu den falschen Wirbeln, vertebrae spuriae, unter welchen man das Kreuzbein und das Steißbein versteht.

Die 24 wahren Wirbel zerfallen wiederum in die sieben Halswirbel, vertebrae colli oder cervicis (Taf. 2, Fig. 5, 6, 7, 8; Taf. 4, Fig. 1a, 1b, 1c), welche den obersten Theil der Wirbelsäule bilden und von denen der erste der Träger, atlas (Taf. 2, Fig. 5, 6; Taf. 4, Fig. 1a), der zweite der Umdreher, epistropheus (Taf. 2, Fig. 7; Taf. 4, Fig. 1b), und der siebente der hervorragende Wirbel, vertebra prominens (Taf. 4, Fig. 1c) genannt wird, in die 12 Brustwirbel, vertebrae thoracis (Taf. 2, Fig. 9; Taf. 4, Fig. 1f bis 1g), und in die fünf Lendenwirbel, vertebrae lumborum oder abdominis (Taf. 2, Fig. 10; Taf. 4, Fig. 1h bis 1i).

Ueber die Gestalt der Wirbel im einzelnen haben wir bereits bei Taf. 2 gesprochen, sodaß wir hier darüber hinweggehen können. Als Ganzes betrachtet ist die Wirbelsäule sanft wellenförmig gebogen, und zwar in ihrem obern, dem Halstheile, nach vorn, in ihrem mittlern, dem Rückenheile, nach hinten, und in ihrem untern, dem Lendenheile, wiederum nach vorn. Der Anfang und das Ende sind am beweglichsten, während in der Mitte die einzelnen Theile fester aneinandergefügt sind. Außer den Stamm für den Rumpf zu bilden, enthält die Wirbelsäule einen langen Kanal, den Wirbelsäulenkanal, canalis spinalis, welchen die Summe der Wirbelsöffnungen, foramina spinalia (Taf. 2, Fig. 5l, 6l, 8h, 9h, 10h) bildet. Das Kreuz- und Steißbein ist bereits bei Taf. 2 behandelt worden.

Die Rippen.

Die Rippen, costae (Taf. 4, Fig. 1k, l, m, n und 3, 4) bilden die feste Grundlage der Seitenwand des Brustkastens. Es sind 24 Stüd, welche zur Hälfte rechts, zur Hälfte links liegen. Die 12 Rippen jeder Seite zerfallen in sieben wahre Rippen, vertebrae verae oder genuinae (Taf. 4, Fig. 1k—1l) und in fünf falsche Rippen, costae spuriae (Taf. 4, Fig. 1m—1n).

Die wahren Rippen sind die sieben obersten, welche mit ihrem hintern Theile mit der Wirbelsäule, mit ihrem vordern knorpeligen Ende mit dem Brustbeine zusammenhängen. Die obern sind kleiner, aber stärker gekrümmt als die untern, und während jene

mit ihren Flächen mehr nach oben und unten gewandt sind, sehen diese mit ihren breiten Seiten mehr nach aus- und einwärts. Die Rippenknorpel am vordern Ende nehmen von oben nach unten an Länge immer mehr zu und setzen sich unter einem immer spitzern Winkel an das Brustbein an.

Die falschen Rippen sind die fünf untersten; sie unterscheiden sich von den wahren Rippen dadurch, daß sie mit ihrem Knorpel das Brustbein nicht erreichen und von oben nach unten an Größe abnehmen.

Man unterscheidet an den Rippen drei Theile, ein hinteres Ende, den Körper und ein vorderes Ende.

Das hintere Ende, *extremities posterior* (Taf. 4, Fig. 3A, 4A), hat ein Köpfchen, *capitulum* (Taf. 4, Fig. 3a, 4a), welches frei an den Körper der Brustwirbel anliegt, einen Hals, *collum* (Taf. 4, Fig. 3b, 4b), und ein Höckerchen, *tuberculum costae* (Taf. 4, Fig. 3c, 4c), welches sich an den Seitenfortsatz der Brustwirbel anlegt.

Der Körper, *corpus* (Taf. 4, Fig. 3B, 4B), bildet den mittlern Theil der Rippe. An ihm bemerkt man zunächst den Rippenwinkel, *angulus costae* (Taf. 4, Fig. 3d, 4d), ferner einen obern Rand, *margo superior* (Taf. 4, Fig. 3e, 4e), einen untern Rand, *margo inferior* (Taf. 4, Fig. 3f, 4f), sowie eine äußere Fläche, *superficies externa* (Taf. 4, Fig. 3g, 4g), und eine innere Fläche, *superficies interna* (Taf. 4, Fig. 3h, 4h). An der innern Fläche befindet sich noch die Rippenrinne, *sulcus costalis* (Taf. 4, Fig. 3i), für die Rippengefäße und den Nippennerv.

Das vordere Ende, *extremities anterior* (Taf. 4, Fig. 3C, 4C), wird etwas dider und verbindet sich mit dem Rippenknorpel, *cartilago costalis*, dem vordern hellern Theil der Rippen in Fig. 1.

Das Brustbein.

Das Brustbein, *sternum* oder *os pectoris* (Taf. 4, Fig. 1o, 1p, 1q) bildet den vordern Theil des Brustkastens und liegt zwischen den vordern Enden der wahren Rippen, während sich oben auch noch die Schlüsselbeine ansetzen. Man unterscheidet am Brustbein, daß eine länglich-platte Gestalt hat, drei Theile: den Handgriff, den Körper, und den schwertförmigen Fortsatz.

Der Handgriff oder die Handhabe, *manubrium sterni* (Taf. 4, Fig. 1o), ist der oberste Theil des Brustbeins. Er hat zwei Gelenkgruben für das Schlüsselbein, *incisurae claviculares*, zwischen welchen sich der halbmondförmige Einschnitt, *incisura semilunaris*, befindet, außerdem befinden sich an jeder Seite zwei Grübchen, *foveae* oder *sinus articulares*, für die erste und zweite Rippe.

Der Körper oder das Mittelstück, *corpus sterni* (Taf. 4, Fig. 1p), ist dünner und schmaler als der Handgriff und hat an jeder Seite fünf kleine Gruben, *foveae* oder *sinus articulares*, für die dritte bis siebente wahre Rippe.

Der schwertförmige Fortsatz, *processus xiphoideus* oder *ensiformis* (Taf. 4, Fig. 1q), bildet das unterste, frei hervorragende spige Ende des Brustbeins, welches meist nur aus Knorpel besteht.

Das Becken.

Die Beckenknochen oder ungenannten Knochen, *ossa pelvis*, *ossa innominata*, oder *ossa coxarum* (Taf. 4, Fig. 2B), bilden die vordern und seitlichen Theile des Beckens, *pelvis*, das durch die Einfügung

des Kreuzbeins, *os sacrum* (Taf. 4, Fig. 2A, B, Fig. 11 und 12), in der hintern Wand zu einem Ganzen vereinigt wird und einen geschlossenen Ring bildet.

Die Beckenknochen oder ungenannten Knochen, welche paarig sind, bestehen jederseits aus drei Theilen: dem Darm-, Sitz- und Schambeine, *os ilium*, *os ischium*, *os pubis* (Taf. 4, Fig. 2a, b, c), welche paarig sind, bestehen jederseits aus drei Theilen: dem Darm-, Sitz- und Schambeine, *os ilium*, *os ischium*, *os pubis* (Taf. 4, Fig. 2a, b, c), welche paarig sind, bestehen jederseits aus drei Theilen: dem Darm-, Sitz- und Schambeine, *os ilium*, *os ischium*, *os pubis* (Taf. 4, Fig. 2a, b, c).

Das Darmbein oder Hüftbein, *os ilium* (Taf. 4, Fig. 2a), ist das größte oberste Stück der Beckenwand, von schaufelförmiger Gestalt. Man unterscheidet demselben eine innere und eine äußere Fläche, einen obern, vordern, hintern und untern Rand und den Körper.

Die innere Fläche, *superficies interna*, stellt die concave Seite einer Schale dar, welche die Darmbeingrube, *fossa iliaca*, begreift. Hinten und unten von ihr zieht sich, die Beckenwand bildend, die gebogene Linie, *linea arcuata interna* (Taf. 4, Fig. 2c, 2e), hin. An dem vordern, nach unten gebogenen Ende befindet sich der Schambeinhöcker, *tuber ilio-pectineum* (Taf. 4, Fig. 2m), während sich nach hinten die obere Fläche befindet, welche überknorpelt ist und mit der gleichen Fläche des Kreuzbeins die Darmbeinverbindung, *symphysis sacro-iliaca* (Taf. 4, Fig. 2f), bildet.

Die äußere Fläche, *superficies externa*, die Rückseite von unserer Darstellung des Darmbeins, An ihr ist nur die äußere gebogene Linie, *linea arcuata externa* oder *semicircularis*, zu bemerken.

Der obere Rand oder Hüftstamm, *crura* (Taf. 4, Fig. 2g), bildet einen breiten Rücken mit zwei Rippen, einer äußern Lippe, *labium externum*, und einer innern Lippe, *labium internum*, zwischen welchen sich auf dem Scheitel die Mittellinie, *linea intermedia*, befindet.

Der vordere Rand zeigt zunächst da, wo er mit dem obern Rande zusammenschließt, den vordern Darmbeinstachel, *spina ili anterior superior* (Taf. 4, Fig. 2h), während am untern Ende der vordern Darmbeinstachel, *spina ili anterior inferior* (Taf. 4, Fig. 2i), sich befindet; zwischen diesen zieht sich der vordere halbmondförmige Einschnitt, *incisura semilunaris anterior* (Taf. 4, Fig. 2k) hin.

Der hintere Rand hat wie der vordere einen hintern obern und hintern untern Darmbeinstachel, *spina ili posterior superior* und *spina ili posterior inferior*, zwischen welchen der hintere halbmondförmige Einschnitt, *incisura semilunaris posterior*, sich befindet.

Der untere Rand, welcher den obern Theil des großen Sitzbeineinschnittes, *incisura ischio-pubica major*, begrenzt, ist in unserer Darstellung nicht sichtbar.

Der Körper, *corpus*, des Darmbeins bildet den vordern unteren Theil des Beckens, welcher den hintern obern Theil der Pfanne bildet.

Das Sitzbein, *os ischii* (Taf. 4, Fig. 2D), bildet den unteren Theil des Beckens und begrenzt den Beckenausgang. Man unterscheidet an ihm den hintern absteigenden Ast und den aufsteigenden Ast.

Der Körper, *corpus*, ist der didere, obere Theil des Knochens, welcher den hintern, untern Theil der Pfanne bildet und nach hinten den großen Sitz-

nitt, incisura ischiadica major, welcher am einftachel, spina ischii (Taf. 4, Fig. 2c), be- und von da nach aufwärts geht, begrenzt.

absteigende Ast des Sitzbeins, ramus descendens ossis ischii (Taf. 4, Fig. 2x), begrenzt hinten den kleinen Sitzbeineinschnitt, incisura ischiadica minor, welcher sich vom Sitzbein- el, spina ischii (Taf. 4, Fig. 2l), nach abwärts st, und geht nach unten in den Sitznorren, ischii (Taf. 4, Fig. 2w), über.

auffsteigende Ast, ramus ascendens (Taf. 4, 2v), beginnt vom Sitznorren, geht nach auf- und verschmilzt mit dem absteigenden Aste des Schambeins.

das Schambein oder Schosbein, os pubis (Taf. 4, Fig. 2k), begrenzt den Eingang in das kleine Becken nach vorn. Man unterscheidet an ihm den oberen, den horizontalen Ast und den absteigenden Ast.

der Körper, corpus, bildet den vordern Theil der Pfanne. Da wo er mit dem Körper des Darm- schambeins zusammenstößt, befindet sich der Darm- Schambein- höcker, tuber ileo-pectineum (Taf. 4, Fig. 2m). der horizontale Ast, ramus horizontalis (Taf. 4, 2r), geht nach vorn und innen und hat an dem innern Ende den Schambeineinschnitt, spina (Taf. 4, Fig. 2s), von welchem nach dem Schambeinhöcker sich der Schambeinflamm, crista s. ober pecten, hinzieht.

der absteigende Ast, ramus descendens (Taf. 4, 2t), hat an seinem nach innen gefehrten Rande überknorpelte Fuge zur Bildung der Schambein- e, symphysis ossium pubis (Taf. 4, Fig. 2u). oberhalb der Schambeinfuge weichen die absteigenden, gegenseitig berührenden Schambeinflämme aneinander bilden den Schambogen, arcus pubis.

die Pfanne, acetabulum (Taf. 4, Fig. 2n), wird, schon erwähnt, von dem Körper des Darm- Sitz- Schambeins gebildet. Sie liegt an der äußern Seite des Beckens und dient zur Aufnahme des Hüftgelenks. Ihr oberer Rand, supercilium acetabuli (Taf. 4, Fig. 2o), ist mit Knorpel überzogen, während nach unten ein Einschnitt, der Pfanneneinschnitt, incisura acetabuli (Taf. 4, Fig. 2p), sich findet.

Das Hüftloch, foramen obturatorium oder foramen magnum (Taf. 4, Fig. 2q), liegt an der vordern Seite des kleinen Beckens, eingeschlossen von den Ästen des Sitz- und Schambeins. Es ist zum größten Theil, bis auf ein Loch am obern äußern Umfang, von einer Haut, der Verschliefungshaut, membrana obturatoria, überzogen.

Die Brusthöhle.

Die Brusthöhle, cavitas thoracis, wird von dem Brustkorb oder Brustkasten, thorax, umschlossen. Dieselbe bildet den obersten Theil des Rumpfes, des Brustkorbs, und reicht, unterhalb des Halses beginnend, bis zur zwölften Rippe. Er hat die Form eines abgestumpften Kegels mit der Spitze nach oben, unten abgerundet werdend, und zeigt im Horizontalschnitt eine kegelförmige Gestalt. Begrenzt wird der Brustkorb hinten durch die Brustwirbelsäule, seitlich durch die Rippen, und nach vorn durch das Brustbein. Oben und unten ist er offen zum Ein- und Austritt verschiedener Organe, während der hier bleibende Raum durch Weichtheile geschlossen wird. Der Brustkorb dient dazu, um vorzugsweise Herz und Lunge aufzunehmen und diesen zarten Organen Schutz zu gewähren.

Die Bauchhöhle.

Die Bauchhöhle, cavum abdominis, nimmt den mittlern Theil des Rumpfes ein und erstreckt sich von den Rippen bis zum Becken. Nur nach hinten wird die Bauchhöhle durch die knöchernen Lendenwirbelsäule begrenzt, während alle übrigen Wände durch Muskeln gebildet werden. Von der Brusthöhle ist die Bauchhöhle durch das Zwerchfell getrennt. Die Bauchhöhle dient dazu, um namentlich den Verdauungsapparat, den Magen und Darm, sowie Leber, Milz und Nieren aufzunehmen.

Die Beckenhöhle.

Die Beckenhöhle, cavitas pelvis, bildet den untersten Theil des Rumpfes und wird nach hinten begrenzt von dem Kreuz- und Steißbein, an den Seiten und nach vorn von den ungenannten Knochen. Der ganze von diesen Knochen umschlossene Raum zerfällt in zwei Theile, das große und das kleine Becken, welche durch die innere bogenförmige Linie, linea arcuata interna (Taf. 4, Fig. 2c und 2e), voneinander getrennt werden.

Das Becken dient vorzugsweise zur Aufnahme der innern Geschlechts- und Harnwerkzeuge, sowie eines Theils der Därme.

Ein großer Unterschied besteht zwischen dem männlichen und weiblichen Becken, welchen Taf. 1, Fig. 4, 5, 6, 7, veranschaulicht.

Das große Becken, pelvis major, ist trichterförmig, nach vorn offen, während es seitlich von den Schenkeln des Darmbeins, ossis ilei (Taf. 4, Fig. 2c), nach hinten von dem Kreuzbein, os sacrum (Taf. 4, Fig. 2A), begrenzt wird.

Das kleine Becken, pelvis minor, wird oben durch einen vollständigen Ring, der eine herzförmige Gestalt hat und durch die innere bogenförmige Linie, linea arcuata interna (Taf. 4, Fig. 2c und 2e), gebildet wird, umschlossen. Man unterscheidet an dem kleinen Becken die für den Geburtsact wichtigen Theile, die obere Oeffnung oder den Beckeneingang, die Beckenhöhle und die untere Oeffnung oder den Beckenausgang.

Die obere Oeffnung oder der Beckeneingang, apertura pelvis superior (Taf. 1, Fig. 5, 7), ist von länglich-runder und herzförmiger Gestalt, welche am besten durch die verschiedenen Durchmesser charakterisirt wird. So messen der gerabe Durchmesser, conjugata vera, welcher vom Vorgebirge, promontorium (Taf. 1, Fig. 4, 7, Fig. 5, Fig. 6, Fig. 7, und Taf. 4, Fig. 2b), zum obern Rande der Schambeinfuge (Taf. 1, Fig. 5; Taf. 5, Fig. 7s und Taf. 4, Fig. 2s) geht, 4" bis 4" 3"; der Querdurchmesser, diameter transversus, welcher von der Mitte der innern bogenförmigen Linie der einen Seite zu der der andern Seite geht (Taf. 4, Fig. 2c — 2e) 4" 9" bis 5". Die beiden schiefen Durchmesser, diametri obliqui oder dventeri, welche von der Kreuz- Darmbeinfuge, symphysis sacro-iliaca (Taf. 4, Fig. 2f) der einen Seite zum Darm- Schambeinhöcker, tuber ileo-pectineum (Taf. 4, Fig. 2m) der andern Seite gehen, 4" 6" bis 4" 8", während die innere bogenförmige Linie, linea arcuata interna (Taf. 4, Fig. 2c — 2e), einen Umfang von 15" bis 16" 6" hat.

Die Beckenhöhle, cavum pelvis, zeigt etwas andere Durchmesser, hier ist der gerabe Durchmesser, welcher von der Mitte der Vereinigungsstelle des zweiten und dritten Kreuzwirbels zur Mitte der Schambeinfuge geht, 4" bis 4" 6". Der

Querdurchmesser, welcher von der Mitte der innern Pfannenwand der einen Seite zu der der andern Seite sich erstreckt, 4" bis 4" 3", während der größte Umfang 13" 6" bis 15" 6" mißt.

Die untere Oeffnung, der Bedenausgang, apertura pelvis inferior, ist am engsten und wird gebildet von der Spitze des Steißbeins, os coccygis (Taf. 1, Fig. 5, —7), von den Bandmassen, welche den Bedenausgang umgeben, den absteigenden Ästen der Sigbeine und dem Schambogen, arcus pubis (Taf. 1, Fig. 4, 5, 6, 7, und Taf. 4, Fig. 2 u). Der gerade Durchmesser, welcher durch die Beweglichkeit des Steißbeins etwas veränderlich ist, geht von der Spitze dieses zum untern Rande der Schambeinfuge und mißt 2" 9" bis 3" 4", während der quere Durchmesser, welcher vom innern Rande des einen Sitznorren, tuber ischii (Taf. 4, Fig. 2 w), zu dem des andern geht, eine Größe von 3" bis 4" hat. Um auch für den geraden Durchmesser eine constante Größe zu haben, zieht man einen zweiten solchen, welcher von der Vereinigungsstelle des Kreuzbeins mit dem Steißbeine zum untern Rande der Schambeinfuge geht und 3" 6" bis 4" 3" mißt.

Die Knochen der Gliedmaßen.

Die Knochen der Gliedmaßen, ossa extrematum (Taf. 4; 5 bis 28) zerfallen in zwei Theile: in die Knochen der obern Extremität und in die der untern Extremität.

A. Knochen der obern Extremität.

Die Knochen der obern Extremität oder der Arme, brachia (Taf. 4; 5 bis 18) hängen zu beiden Seiten des Brustkorbes, an welchem sie beweglich befestigt sind, herab und zerfallen in die Knochen der Schulter, den Oberarmknochen, die Vorderarmknochen und die Knochen der Hand.

1. Knochen der Schulter.

Die Knochen der Schulter, ossa humeri (Taf. 4; 5 bis 8), bilden den obersten Theil des Arms und bestehen aus den beiden Knochen, dem Schlüsselbeine und dem Schulterblatte.

a. Das Schlüsselbein.

Das Schlüsselbein, clavicula (Taf. 4; 1 r, 5, 6), ist ein paariger Knochen, welcher vom obern Ende des Brustbeins in ziemlich horizontaler Richtung schräg von vorn, innen und unten nach hinten, außen und oben über die erste Rippe weg zum Schulterblatt geht und die Grenze zwischen Hals und Thorax bildet (Taf. 4; 1 r). Es hat eine längliche S-förmig gewundene Gestalt, an der man zwei Enden, das Brustbein- und Schulterblattende, sowie den Körper unterscheidet.

Der Körper oder das Mittelstück, corpus claviculae (Taf. 4; 5 a, 6 a), ist schwach gekrümmt, und zwar so, daß der innere Theil nach vorn, der äußere dagegen nach hinten convex ist.

Das Brustbeinende, auch inneres oder vorderes Ende, extremitas sternalis (Taf. 4; 5 b, 6 b), ist dick und mit einer überknorpelten Gelenkfläche versehen, mit welcher es am Handgriff des Brustbeins articulirt. An seiner untern Fläche hat es einen Höcker für das rantenförmige Band, tuberositas für das ligamentum rhomboideum (Taf. 4; 6 d).

Das Schulterblattende, auch äußeres oder vorderes Ende (Taf. 4; 5 c, 6 c), ist plattgedrückt

und zeigt eine Gelenkfläche zur Verbindung mit Schulterblatte, superficies articularis (Taf. 4; 5 a), einen Höcker zum Ansatze des Rhabdoideus, tuberositas für das Band, tuberositas coraco-claviculare (Taf. 4; 6 c).

b. Das Schulterblatt.

Das Schulterblatt, scapula, omoplatum (Taf. 4; 1 s, 7, 8), liegt am hintern obern Theile des Brustkorbes, neben der Wirbelsäule, und bedeckt an Stelle die zweite bis siebente Rippe (Taf. 4; 1 s). Die Gestalt ist flach, dreieckig, nach außen hin abwärts. Man unterscheidet an dem Schulterblatt innere und äußere Fläche, drei Ränder, zwei Winkel, einen hintern, vordern und obern Rand, drei Winkel, als einen obern, untern und vordern Winkel. Nur durch das Schlüsselbein steht das Schulterblatt mit dem Körper in knöcherner Verbindung.

Die innere oder vordere Fläche, superficies anterior (Taf. 4; 7 a), ist schwach concav und sieht gegen die Rippe.

Die äußere oder hintere Fläche, superficies posterior (Taf. 4; 7 a und 7 b), ist durch drei Gräten, spina scapulae (Taf. 4; 7 c), in drei Theile getheilt, in einen obern kleinern, die Gräte der Gräte, fossa supraspinata (Taf. 4; 7 d), in einen untern größern, die Grube unter der Gräte, fossa infraspinata (Taf. 4; 7 b). Die Gräte, welche einen dicken, nach hinten scharfen Rand hat, welcher eine obere und untere Lippe, superius und inferius zeigt, läuft nach unten und außen in die Schulterhöhle, acromion (Taf. 4; 7 d, 8 c), aus, an welcher sich für das Schulterblattende des Schlüsselbeins eine kleine Gelenkfläche, superficies articularis pro clavicula (Taf. 4; 7 d) befindet.

Der hintere Rand, basis scapulae (Taf. 4; 7 k, 8 l), ist der Wirbelsäule genähert und hat die größte Länge.

Der vordere, auch untere oder äußere Rand, margo anterior (Taf. 4; 7 m, 8 n), ist etwas abwärts gebogen, dafür aber dicker.

Der obere Rand, margo superior (Taf. 4; 7 h), ist der kleinste und ziemlich scharf. An seinem vordern Ende hat er einen kleinen Einschnitt, incisura scapulae (Taf. 4; 7 g, 8 i), neben welchem der Rhabdoideus, processus coracoideus (Taf. 4; 7 f, 8 g), entspringt.

Der obere oder hintere Winkel, angulus superior (Taf. 4; 7 i, 8 k), ist spitz und scharf.

Der untere Winkel, angulus inferior (Taf. 4; 7 l, 8 m), ist dagegen stumpf und abgerundet.

Der vordere und äußere Winkel, angulus anterior (Taf. 4; 7 j, 8 o), ist ebenfalls stumpf und abgerundet. Er ist mit einem ovalen Kopf, dem Gelenkkopf des Schulterblattes, condylus scapulae (Taf. 4; 7 n, 8 h), durch den Hals, collum scapulae (Taf. 4; 7 k), mit dem Hals einschnitt, incisura scapulae, versehen ist, mit dem Körper des Brustkorbes articulirt. An seinem äußersten Ende befindet sich eine Gelenkgrube, cavitas glenoidalis (Taf. 4; 7 p), Aufnahme des Oberarmkopfes, und unter derselben ein Höcker für den dreiköpfigen Muskel, tuberositas für den musculus triceps (Taf. 4; 8 o).

2. Oberarmknochen.

Der Oberarmknochen, os humeri (Taf. 4; 9 und 10), hängt zu beiden Seiten des Brustkorbes vom Schulterblatt herab. Er ist ein röhrenförmiger Knochen mit einem obern und einem untern Ende, zwischen welchen sich der Körper befindet.

Das obere Ende, oder der Oberarmkopf, *caput radii* (Taf. 4; 9a, 10a), legt sich an die Gelenkfläche des Schulterblatts an und ist durch den Hals des Arms, *collum humeri* (Taf. 4; 9c, 10b), mit dem Körper des Oberarmknochens verbunden. An dem Armkopf ist noch sichtbar der größere Höcker, *tuberculum majus* (Taf. 4; 9b, 10c), und der kleinere Höcker, *tuberculum minus* (Taf. 4; 10d). Von dem Höcker geht eine Leiste aus, die Leiste des großen Höckers, *spina tuberculi majoris* (Taf. 4; 10e), und die Leiste des kleinen Höckers, *spina tuberculi minoris* (Taf. 4; 10f), zwischen welchen die beiden Höcker sich eine Rinne befinden, die Zwischenhöckerrinne, *sulcus intertubercularis* oder *longitudinalis* (Taf. 4; 10g). Der Körper oder das Mittelstück, *corpus radii* (Taf. 4; 9d, 10h), hat die Form eines dreieckigen Prismas, mit einer innern oder vordern, einer hintern und einer äußern Seite, mit drei Winkeln, einem vordern, innern (Taf. 4; 9g, 10i) und einem äußern (Taf. 4; 10k).

Das untere Ende bildet das Gelenk für den Unterarm, an ihm ist zu bemerken der äußere Gelenkfortsatz, *condylus externus* oder *extensorius* (Taf. 4; 10m), und der innere Gelenkfortsatz, *condylus internus* oder *flexorius* (Taf. 4; 9g, 10l). Zwischen den Gelenkfortsätzen befindet sich der Ellenbogenfortsatz, *processus cubitalis*, zur Bildung des Ellenbogengelenks, welches aus zwei überknorpelten Gelenken, der sattelförmigen Rolle, *trochlea* (Taf. 4; 10p), der kopfförmigen Erhabenheit, *eminentia olecrani* oder *rotula* (Taf. 4; 9i, 10o), besteht. Bornet sich über der Rolle die vordere größere Grube, *fossa anterior major*, oder *fossa supratrochlearis anterior* (Taf. 4; 10q), und über der kopfförmigen Erhabenheit die vordere kleinere Grube, *fossa anterior minor* (Taf. 4; 10r), während sich unter der Rolle die hintere Grube, *fossa posterior* oder *fossa supratrochlearis posterior* (Taf. 4; 10s), befindet.

3. Die Vorderarmknochen.

Die Vorderarmknochen, *ossa antibrachii* (Taf. 4; 11a, 11b), werden aus zwei Theilen gebildet: dem Ellenbein und der Speiche.

a. Das Ellenbein.

Das Ellenbein, *ulna* oder *os olecrani* (Taf. 4; 11c, 11d), legt sich an die Rolle des Oberarmknochens an und bildet den innern oder Kleinfingerrand des Vorderarms. Es ist oben dick, lang und verjüngt sich nach der Hand zu. Man unterscheidet an dem oberen Ende, den Körper und das untere Ende.

Das obere Ende hat eine eigenthümliche halbkugelförmige Gestalt; man bemerkt an demselben die größere halbkugelförmige oder halbmondförmige Grube, *cavitas glenoidalis* oder *glenoidea major* (Taf. 4; 11c, 11d), welche an die Rolle anlegt, und die kleinere halbmondförmige Grube, *fossa glenoidalis minor* (Taf. 4; 11e, 11f), den Ellenbogenfortsatz, *olecranon* oder *processus anconaeus* (Taf. 4; 11a, 11b), und den Ellenbogenfortsatz, *processus coronoides* (Taf. 4; 11g, 11h).

Der Körper oder das Mittelstück, *corpus ulnae* (Taf. 4; 11d, 11e), ist prismatisch und hat eine hintere oder Rückfläche, eine innere und eine vordere oder Volarfläche, sowie drei Winkel, und

zwar einen äußern, den Ellenbogenbeinkamm, *angulus externus* oder *crista ulnae* (Taf. 4; 11f), einen innern, *angulus internus* (Taf. 4; 11e), und einen hintern, *angulus posterior*.

Das untere Ende hat ein rundliches Köpfchen, *capitulum ulnae* (Taf. 4; 11g, 11h), sowie den griffelförmigen Fortsatz, *processus styloideus ulnae* (Taf. 4; 11h, 11g).

b. Die Speiche.

Die Speiche, *radius* oder *os carpi* (Taf. 4; 13 und 14), liegt am äußern oder Daumenrande des Unterarms. Sie ist cylindrisch, oben dünn mit einem kopfförmigen Ende, und wird nach der Hand zu immer dicker. Auch an ihr unterscheidet man drei Theile, ein oberes Ende, den Körper und ein unteres Ende.

Das obere Ende oder das Köpfchen der Speiche, *capitulum radii* (Taf. 4; 13a, 14a), legt sich an die kopfförmige Erhabenheit des Oberarmknochens durch die obere Gelenkgrube, *cavitas glenoidalis pro rotula* (Taf. 4; 14b). Mit seinem großen Umfang, dem Gelenkkreis, *circumferentia articularis* (Taf. 4; 13b, 14c), legt es sich an die kleinere halbmondförmige Grube des Ellenbogenbeins, durch den Hals, *collum radii* (Taf. 4; 13c, 14d), unter welchem sich der Speichenhöcker, *tuberositas radii* (Taf. 4; 14e), befindet, verbindet sich das Köpfchen mit dem Körper.

Der Körper oder das Mittelstück, *corpus radii* (Taf. 4; 13d, 14f), ist dreieckig und hat eine vordere oder Volarfläche, eine äußere und eine hintere oder Rückenfläche, sowie drei Winkel, einen innern, sehr scharfen, die Speichenleiste, *crista radii* (Taf. 4; 13e, 14i), einen äußern und einen vordern.

Das untere Ende, *extremitas inferior* (Taf. 4; 13f, 14g), ist dick und breit. An demselben ist zu bemerken der griffelförmige Fortsatz, *processus styloideus radii* (Taf. 4; 13g, 14h), der Ellenbogenbein- oder halbmondförmige Einschnitt, *incisura ulnaris* oder *semilunaris* (Taf. 4; 13h, 14k), für das Köpfchen des Ellenbogenbeins, und die untere Gelenkgrube, *cavitas glenoidalis inferior* (Taf. 4; 13i, 14k), mit welcher die Speiche mit dem Schiffs- und Mondbein der ersten Reihe der Handwurzelknochen in Verbindung tritt.

4. Knochen der Hand.

Die Knochen der Hand, *ossa manus* (Taf. 4; 17, 18), zerfallen in drei Theile, in die Handwurzelknochen, die Mittelhandknochen und die Fingerknochen.

a. Handwurzelknochen.

Handwurzelknochen, *ossa carpi* (Taf. 4; 15, 16, 17a—i, 18A), werden acht Stück gezählt, welche in zwei Reihen, in eine obere Reihe (Taf. 4; 15) und eine untere Reihe (Taf. 4; 16) sich gruppieren, von denen jede vier Stück zählt. Die Handwurzelknochen sind der oberste Theil der Hand, welcher an den Oberarm anstößt, und bilden ein Gewölbe, das nach der Hohlhand concav, nach dem Handrücken convex ist. An beiden Seiten dieses Gewölbes oder Halbringes befinden sich nach der Hohlhandseite zu zwei Hervorragungen, *eminentiae carpi*, und zwar an der Daumen- oder Radialseite die erste oder obere radiale Hervorragung der Handwurzelknochen, *eminentia carpi radialis prima* oder *superior* (Taf. 4; 15g), und

die zweite oder untere radiale Hervorragung, *eminentia carpi radialis secunda* oder *inferior* (Taf. 4; 15h), sowie an der Kleinfinger- oder Ulnarseite die erste oder obere ulnare Hervorragung, *eminentia carpi ulnaris prima* oder *superior* (Taf. 4; 15i), und die zweite oder untere ulnare Hervorragung, *eminentia carpi ulnaris secunda* oder *inferior* (Taf. 4; 15k). An jedem Handwurzelknochen unterscheidet man sechs Seiten: eine Hohlhandseite, *superficies volaris*, eine Handrücken- oder Handgelenkseite, *superficies dorsalis*, eine Speichen- oder Radialseite, *superficies radialis*, eine Einbogen- oder Ulnarseite, *superficies ulnaris*, eine Arm- oder Brachialseite, *superficies brachialis*, und eine Finger- oder Digitalseite, *superficies digitalis*.

a. Handwurzelknochen der obern oder ersten Reihe.

Die Handwurzelknochen der obern oder ersten Reihe (Taf. 4; 15) sind durch ein Gelenk mit dem Unterarm verbunden, und werden gebildet von dem Kahnbein, dem Mondbein, dem dreieckigen Knochen und dem Erbsenbein.

1) Das Kahnbein, *os naviculare* (Taf. 4; 15a, 17a, 18a), ist der erste am Speichenrande befindliche Knochen der ersten Reihe der Handwurzelknochen, er stößt nach innen, der Kleinfingerseite, an das Mondbein, nach oben an die Speiche und nach unten an das große und kleine vielsichtige Bein und an das Kopfbein, und bildet nach außen die obere radiale Hervorragung, *eminentia carpi radialis prima* oder *superior* (Taf. 4; 15g).

2) Das Mondbein, *os lunatum* (Taf. 4; 15b, 17b, 18b), stößt nach außen, der Daumen- oder Radialseite, an das Kahnbein, nach innen an den dreieckigen Knochen, nach oben an die Speiche und nach unten an das Erbsenbein.

3) Der dreieckige Knochen, *os triquetrum* (Taf. 4; 15c, 17c, 18c), liegt am Kleinfingerende des Carpus, stößt nach außen an das Mondbein, nach oben an das Einbogenbein, und nach unten an das Halsbein. An der Hohlhandfläche hat es eine kleine Gelenkfläche für das Erbsenbein.

4) Das Erbsenbein, *os pisiforme* (Taf. 4; 15d, 16f, 17d), liegt am Kleinfingerende der ersten Handwurzelreihe, an der Hohlhandseite des dreieckigen Knochens, und bildet die erste oder obere ulnare Hervorragung der Handwurzelknochen, *eminentia carpi ulnaris prima* oder *superior* (Taf. 4; 15i).

β. Handwurzelknochen der untern oder zweiten Reihe.

Die Handwurzelknochen der untern oder zweiten Reihe grenzen nach oben an die Handwurzelknochen der ersten Reihe, während sie sich nach unten mit den Mittelhandknochen verbinden; sie sind das große und kleine vielwinkelige Bein, das Kopfbein und das Halsbein.

5) Das große vielwinkelige Bein, *os multangulum majus* (Taf. 4; 15e, 16a, 17e, 18d), bildet den äußeren Speichen- oder Daumenrand der zweiten Handwurzelreihe, stößt nach innen an das kleine vielwinkelige Bein, nach oben an das Kahnbein und nach unten an den ersten Mittelhandknochen. Der freie Hand bildet die zweite oder untere radiale Hervorragung der Handwurzelknochen, *eminentia carpi radialis secunda* oder *inferior* (Taf. 4; 15h).

6) Das kleine vielwinkelige Bein, *os multangulum minus* (Taf. 4; 16b, 17f, 18e), stößt nach außen an das große vielwinkelige Bein, nach innen

an das Kopfbein, nach oben an das Halsbein, nach unten an den zweiten Mittelhandknochen.

7) Das Kopfbein, *os capitatum* (Taf. 4; 17g, 18f), grenzt nach außen an das vielwinkelige Bein, nach innen an das Halsbein, oben an das Kahn- und Mondbein, und nach unten an den dritten Mittelhandknochen.

8) Das Halsbein, *os hamatum* (Taf. 4; 17h, 18g), bildet den inneren Einbogen- oder Ringfinger- oder vierten Finger-Ende des Ringfingerrand der zweiten Reihe der Handwurzelknochen und endet frei mit dem nach der Hohlhand gerichteten Gelenkfortsatz, *hamulus* oder *processus uncinatus* (Taf. 4; 15f), welcher zugleich die zweite oder untere Hervorragung der Handwurzelknochen, *eminentia carpi ulnaris secunda* oder *inferior* (Taf. 4; 15k) bildet. Nach außen grenzt das Halsbein an das Kopfbein, nach oben an den dreieckigen Knochen, nach unten an den vierten und fünften Mittelhandknochen.

b. Mittelhandknochen.

Die Mittelhandknochen, *ossa metacarpi* (Taf. 4; 17k, 18B), sind fünf nebeneinanderliegende Knochen, an welchen man ein oberes Ende, *basis*, und ein unteres Ende unterscheidet. Das obere Ende stößt an die Handwurzelknochen der ersten Reihe, während das untere Ende sich mit den Fingergrößen verbindet. Gezählt werden die Mittelhandknochen von der Speichen- oder Daumen- und ist der Mittelhandknochen des ersten Mittelfingers, *os metacarpi pollicis*, auch der erste Mittelhandknochen, *os metacarpi primum* (Taf. 4; 18A), und der Mittelhandknochen des kleinen Fingers, *os metacarpi digiti minimi*, auch der fünfte Mittelhandknochen, *os metacarpi quintum* (Taf. 4; 18C). Zwischen diesen beiden liegt der zweite, dritte und vierte Mittelhandknochen, *os metacarpi secundum*, *tertium* und *quartum*, *indicialis*, *digiti medi* und *digiti annularis* (Taf. 4; 18k, 18l).

Das obere Ende, *basis metacarpi* (Taf. 4; 18A), ist etwas dicker als der Körper und mit einer Gelenkfläche für den entsprechenden Handwurzelknochen versehen.

Der Körper oder das Mittelfeld, *corpus metacarpi*, ist dreikantig, mit einer etwas gewölbten Rück- und einer Radial- und Ulnarfläche, sowie den Enden von denen der untere der schärfste ist.

Das untere Ende oder das Köpfchen, *capitulum* (Taf. 4; 18o), bildet die Gelenkflächen für den fünften Finger.

c. Fingerknochen.

Die Fingerknochen, *ossa digitorum* oder *phalanges* (Taf. 4; 17n-r, 18c), bilden die Enden der Finger. Jeder Finger hat drei Glieder, *phalanges* (Taf. 4; 17p, q, r-s). Nur der Daumen hat bloß zwei (Taf. 4; 17a, b, 18p, q). Die Glieder werden von länglichen Knochen gebildet, von denen die erste Reihe die größte, die dritte die kleinsten hat. Sie sind platt und haben ein oberes und unteres Ende, eine Hand- und Rückenfläche, sowie einen Gelenkfortsatz, *hamulus* oder *processus uncinatus*, und Ulnar- und Radialfläche. Am oberen Ende befindet sich eine Gelenkgrube für das Köpfchen des entsprechenden Mittelhandknochens, oder des höher gelegenen Fingerknochens, während das untere Ende rollen- oder kugelförmig gestaltet ist.

Knochen der dritten oder untern Reihe fingerglieder, *ossa phalangum digitorum tertio* (Taf. 4; 17r, 18t), und der Knochen des vierten Gliedes des Daumens, *os phalangis pollicis* (Taf. 4; 17o, 18q), auch Nagelphalanx ungularis, genannt, endigt frei in einem Wulst.

den fünf Fingern unterscheidet man:

- den Daumen oder ersten Finger, *pollex* oder *digitus primus*,
- den Zeigefinger oder zweiten Finger, *index* oder *digitus secundus*,
- den Mittelfinger oder dritten Finger, *digitus medius* oder *tertius*,
- den Ringfinger oder vierten Finger, *digitus annularis* oder *quartus*,
- den Kleinen- oder Ohrfinger, oder fünften Finger, *digitus minimus*, auch *auricularis* oder *quintus*.

Die Sesambeine.

Sesambeine, *ossa* oder *ossicula sesamoidea* (Taf. 4; 17s), sind zwei kleine Knöchelchen, welche zwischen dem Sesambein, *os sesamoideum internum*, und dem Sesambein, *os sesamoideum externum*, zwischen dem Köpfchen des ersten Mittelfingerknochens und dem obern Ende der ersten Phalanx des Mittelfingers liegen.

B. Knochen der untern Extremität.

Knochen der untern Extremität ober der Ferse, *podes* (Taf. 4; 19 bis 28), bilden den untern Theil des menschlichen Körpers und gehen von jeder Seite des Beckens, wo sie in den Pfannen liegen, nach unten. Sie zerfallen in den Oberschenkelknochen, den Knieknochen und die Knochen des Unterschenkels.

1. Der Oberschenkelknochen.

Oberschenkelknochen, *os femoris* (Taf. 4; 19a), ist der oberste Knochen des Beins, der in der Pfanne des Beckens befestigt ist. Er ist lang, dick und der größte und stärkste Knochen des Körpers. Man unterscheidet an ihm ein oberes Ende, den Körper und ein unteres Ende.

Das obere Ende, der Kopf des Oberschenkelknochens oder Schenkelkopf, *caput ossis femoris* (Taf. 4; 19a, 20a), setzt sich unter einem stumpfen Winkel an den Körper des Oberschenkelknochens an und bildet an seinem freien Theile eine Gelenkfläche, die *fossa pro ligamento terete* (Taf. 4; 19b, 20b). Der Kopf ist durch den Schenkelhals, *collum femoris* (Taf. 4; 19c, 20c), mit dem Körper des Oberschenkelknochens verbunden. An demselben ist zu bemerken der größere oder äußere Rollhügel, *trochanter major* oder *externus* (Taf. 4; 19d, 20d), dessen freier Spitze sich nach hinten die Rollgrube, *fossa trochanterica*, befindet, ferner der kleinere oder innere Rollhügel, *trochanter minor* oder *internus* (Taf. 4; 19e, 20e), sowie zwischen den Rollhügeln die vordere Zwischenrollhügelgrube, *linea intertrochanterica anterior* (Taf. 4; 19f), die hintere Zwischenrollhügelgrube, *linea intertrochanterica posterior* (Taf. 4; 20f).

Der Körper oder das Mittelstück, *corpus femoris* (Taf. 4; 19g), ist in seinem Durchschnitt ziemlich rund, von oben nach unten schwach gewölbt, so daß er vorn schwach convex, hinten schwach concav ist. Die beiden

Körper steigen nicht senkrecht nach abwärts, sondern convergiren nach ihrem untern Ende zu. An der hintern Fläche befindet sich die rauhe Linie, *linea aspera* (Taf. 4; 20h), welche oben mit zwei Schenkeln, einem äußern und einem innern, von den beiden Rollhügeln entspringt, den obern Schenkeln der rauhen Linie, *crura superiora* der *linea aspera* (Taf. 4; 20g-g). Nach unten theilt sich die rauhe Linie wiederum und bildet die untern Schenkel, *crura inferiora* (Taf. 4; 20i-i), zwischen welchen sich die Kniekehlenfläche, *planum popliteum*, die nach unten in die Kniegelenkgrube übergeht, befindet.

Das untere Ende des Oberschenkels schwillt stark an, trägt zur Bildung des Knies bei und hat nach außen den äußern Gelenkknopf, *condylus femoris externus* (Taf. 4; 19h, 20m), nach innen den innern Gelenkknopf, *condylus femoris internus* (Taf. 4; 19i, 20n), zwischen welchen sich nach hinten und etwas nach oben die Kniegelenkgrube, *fossa poplitea* (Taf. 4; 20l), befindet, sowie nach unten und gleichfalls nach hinten zwischen den überknorpelten Gelenkflächen, *superficies glenoidalis* (Taf. 4; 19k), die Zwischenknieknopfgrube, *fossa intercondyloidea* (Taf. 4; 20o).

2. Knochen des Unterschenkels.

Die Knochen des Unterschenkels, *ossa cruris* (Taf. 4; 21 bis 26), bestehen aus drei verschiedenen Theilen, dem Schienbein, dem Wadenbein und der Kniegelenkgrube.

a. Das Schienbein.

Das Schienbein, *tibia* (Taf. 4; 23, 24) bildet den innern, am Greifgehendenrande gelegenen Theil des Unterschenkels, weshalb derselbe auch Schienbein- oder Tibialrand genannt wird. Das Schienbein tritt nach oben mit dem Oberschenkelknochen in Verbindung, es ist lang und hat eine dreiseitig prismatische Gestalt. Es zerfällt in ein oberes Ende, den Körper, und ein unteres Ende.

Das obere Ende, welches mit dem Oberschenkelknochen das Kniegelenk bildet, hat einen innern Gelenkfortsatz, *condylus tibiae internus* (Taf. 4; 23a, 24a), und einen äußern Gelenkfortsatz, *condylus tibiae externus* (Taf. 4; 23b, 24b). Auf jedem dieser Gelenkfortsätze befindet sich eine Gelenkgrube für die Gelenkfortsätze des Oberschenkelknochens, und zwar eine innere Gelenkgrube, *cavitas glenoidalis interna* (Taf. 4; 23c, 24c), und eine äußere Gelenkgrube, *cavitas glenoidalis externa* (Taf. 4; 23d, 24d). Zwischen beiden Gelenkflächen befindet sich die Zwischenknieknopfgrube, *eminentia intercondyloidea* (Taf. 4; 23e, 24e), während am äußern Gelenkfortsatz eine kleine Gelenkfläche, die seitliche Gelenkfläche für das Wadenbein, *superficies glenoidalis lateralis* oder *peronea* (Taf. 4; 23f, 24f), vorhanden ist. Vorn, unmittelbar unter den Gelenkfortsätzen, wo diese mit dem Körper in Verbindung treten, befindet sich der Schienbeinhöcker oder Schienbeinstachel, *tuberositas* oder *spina tibiae* (Taf. 4; 23g).

Der Körper oder das Mittelstück, *corpus tibiae* (Taf. 4; 23h, 24h), hat drei Seiten, eine innere Seite, *superficies tibiae interna* (Taf. 4; 23i), eine äußere Seite, *superficies tibiae externa* (Taf. 4; 23j), und eine hintere Seite, *superficies tibiae postica* (Taf. 4; 24i), sowie drei Kanten, und zwar eine

vordere Kante, die Schienbeinkleiste, *crista tibiae* (Taf. 4; 23i), die sehr scharf ist und von dem Schienbeinhöcker ihren Anfang nimmt, eine innere Kante und eine äußere.

Das untere Ende, welches mit dem Fuß in Verbindung tritt, hat nach innen den innern Knöchel, *malleolus internus* (Taf. 4; 23m, 24i), während sich an der entsprechenden Stelle nach außen ein Einschnitt mit einer Gelenkfläche befindet, der Wadenbeineinschnitt des Schienbeins, *incisura fibularis tibiae* (Taf. 4; 23k, 24k). Ebenso befindet sich nach unten die Gelenkgrube für das Sprunggelenk, *fossa glenoidalis pro astragalo* (Taf. 4; 23l, 24l).

b. Das Wadenbein.

Das Wadenbein, *fibula* oder *perone* (Taf. 4; 25, 26), liegt an der äußeren oder Kleinhirnseite des Schienbeins, weshalb diese Seite des Unterschenkels auch der Fibularrand genannt wird. Das Wadenbein ist lang und sehr dünn, und von oben nach unten etwas getrümmelt, mit der Wölbung nach hinten. Wie an allen langen Knochen unterscheidet man auch an ihm ein oberes Ende, den Körper und ein unteres Ende.

Das obere Ende oder das Köpfchen des Wadenbeins, *capitulum fibulae* (Taf. 4; 25a, 26a), ist verhältnismäßig dick und hat an seiner Innenseite eine kleine Gelenkfläche für das Schienbein, *superficies articularis tibialis* (Taf. 4; 25b, 26b).

Der Körper oder das Mittelfeld, *corpus fibulae* (Taf. 4; 25c, 26c), ist auf seinem Querschnitt dreieckig mit einer äußeren, inneren und hinteren Seite, sowie einem vordern, äußern und innern Winkel.

Das untere Ende bildet den äußern Knöchel, *malleolus externus* (Taf. 4; 25d, 26d). Derselbe ist an seiner Innenseite überknorpelt und legt sich zum Theil als Schienbeinoberfläche, *superficies tibialis* (Taf. 4; 25e, 26e), an den Wadenbeineinschnitt des Schienbeins, während der andere Theil als Gelenkoberfläche für das Sprunggelenk, *superficies glenoidalis pro astragalo* (Taf. 4; 25f, 26f), an der Bildung der Gelenkgrube für das Sprunggelenk, *fossa glenoidalis pro astragalo* (Taf. 4; 23l, 24l), theilnimmt und so dieselbe nach außen begrenzt.

c. Die Kniescheibe.

Die Kniescheibe, *patella* (Taf. 4; 21, 22), ist ein platter, rundlicher Knochen, an dem man eine vordere und hintere Fläche, sowie einen oberen und zwei seitliche Ränder, die nach unten unter einem stumpfen Winkel sich verbinden, unterscheidet. Die Kniescheibe liegt an der vordern Seite des Knies zwischen dem Oberschenkel und dem Schienbein und der Sehne des Streckmuskels des Schenkels.

Die vordere oder äußere Fläche, *superficies externa* (Taf. 4; 21b), ist schwach gewölbt, während die hintere oder innere Fläche, *superficies articularis* (Taf. 4; 22e), schwach concav ist und eine überknorpelte Gelenkfläche besitzt.

Der obere Rand, *basis patellae* (Taf. 4; 21a, 22a), ist breit, während der innere Rand, *margo internus* (Taf. 4; 21d, 22c), und der äußere Rand, *margo externus* (Taf. 4; 21e, 22d), in einem Bogen nach abwärts gehen und unter einem stumpfen Winkel sich verneigend die Spitze, *apex* (Taf. 4; 21c, 22b), bilden.

3. Knochen des Fußes.

Die Knochen des Fußes, *ossa pedis* (Taf. 4; 27, 28), bilden wie bei der Hand drei Abschnitte, die

Fußwurzelknochen, die Mittelfußknochen und die Zehnknochen.

a. Fußwurzelknochen.

Die Fußwurzelknochen, *ossa tarsi* (Taf. 4; 27l bis VII, und 28a bis 28g), sind sieben an der Zahl, welche eine hintere Reihe, gebildet aus dem Sprunggelenk und dem Fersenbein, sowie eine vordere Reihe, zusammengefasst aus dem Kahnbein, ersten, zweiten und dritten Keilbein und dem Würfelbein, darstellen.

a. Fußwurzelknochen der ersten oder hinteren Reihe.

1) Das Sprunggelenk, *astragalus* oder *talus* (Taf. 4; 27l, 28a), ist der oberste Knochen der Fußwurzelknochen, welcher mit dem Schien- und Wadenbein in Verbindung tritt und unmittelbar über dem Fersenbein liegt. Er ist annähernd würfelförmig, und man scheidet man an ihm den Körper, *corpus* (Taf. 4; 27la), mit einer oberen überknorpelten röhrenförmigen Fläche (Taf. 4; 28a), zwei platten überknorpelten Seitenflächen, welche mit den beiden Enden articuliren, einer untern Gelenkgrube für das Fersenbein, *cavitas articularis inferior pro calcaneo* (Taf. 4; 27ld), einer hinteren Fläche und einer vordern Fläche, ferner den Hals, *collum* (Taf. 4; 27lb), welcher aus der vordern Fläche hervorgeht und den Kopf, *caput* (Taf. 4; 27lc), welcher an den Hals aufsitzt, an seiner dem Kahnbein zugekehrten Seite die vordere Gelenkfläche, *superficies articularis anterior* (Taf. 4; 27le), hat und nach unten eine Rinne, die Sprunggelenkrinne, *sulcus sinus tali* (Taf. 4; 27lf), zeigt, welche mit einer Vertiefung des Fersenbeins die Fußwurzelhöhle, *sinus tarsi*, bildet.

2) Das Fersenbein, *calcaneus* (Taf. 4; 27m, 28b), liegt unter dem Sprunggelenk; es ist der größte und stärkste der Fußwurzelknochen und besteht aus dem Körper, *corpus* (Taf. 4; 27llg), aus welchem nach hinten der Fersenbeinhöcker, *tuber calcanei* (Taf. 4; 27llh), hervorpringt, und aus dem vordern Fersenbeinfortsatz, *processus anterior calcanei* (Taf. 4; 27lli), an dem die vordere Gelenkfläche, *superficies articularis anterior* (Taf. 4; 27li), befindet, welche mit dem Würfelbein in Verbindung tritt. Aus dem vordern Fersenbeinfortsatz entspringt seitlich nach innen noch ein zweiter kleiner Fortsatz, die Stütze des Sprunggelenks, *sustentaculum tali* (Taf. 4; 27lii), neben welcher sich oben und unten eine flache Rinne befindet, die obere und untere Rinne der Sprunggelenkstütze, *sulcus sustentaculi talii superior* und *inferior*.

β. Fußwurzelknochen der zweiten oder vordern Reihe.

3) Das Kahnbein, *os naviculare* oder *scaphoideum* (Taf. 4; 27III, 28c), liegt am innern großen Zehenrande des Fußes, unmittelbar vor dem Kopf des Sprunggelenks, während sich nach vorn die drei Keilbeine und nach außen das Würfelbein befinden. An der innern freien Seite befindet sich ein Höcker, der Kahnbeinhöcker, *tuberositas ossis navicularis* (Taf. 4; 27IIIm).

4) Das erste Keilbein, *os cuneiforme primum* (Taf. 4; 27IV, 28d), ist das innerste der drei Keilbeine und bildet so den innern Fußrand mit bildet. Es verbindet sich nach hinten mit dem Kahnbein, nach

dem mit dem ersten Mittelfußknochen und nach außen mit dem zweiten Keilbein. Seine Gestalt entspricht seinem Namen, und liegt seine Schärfe nach oben, der Rücken dagegen nach unten.

5) Das zweite Keilbein, os cuneiforme secundum (Taf. 4; 27 v, 28 e), liegt zwischen dem ersten und dritten Keilbeine, und wird nach hinten von dem Kahnbeine, nach vorn von dem zweiten Mittelfußknochen begrenzt. Bei ihm ist das Verhältniß ein umgekehrtes, die Schärfe des Keils sieht nach unten, während die Basis nach oben den Fußrücken mitbilden hilft.

6) Das dritte Keilbein, os cuneiforme tertium (Taf. 4; 27 VI, 28 f) liegt nach außen von dem zweiten Keilbein und nach innen von dem Würfelbeine, während es nach hinten von dem Kahnbein und nach vorn von dem dritten Mittelfußknochen begrenzt wird. Bei ihm liegt gleichfalls die Schärfe des Keils nach unten, während die Basis nach oben liegt.

7) Das Würfelbein, os cuboideum (Taf. 4; VII, 28 g), liegt am äußern oder Kleingehörende des Fußes, vor der vordern Gelenkfläche des Fersenbeins, während sich nach vorn der vierte und fünfte Mittelfußknochen und nach innen das Kahnbein und dritte Keilbein befinden. An seiner äußern und untern Seite hat das Würfelbein eine Rinne, die Würfelbeinrinne, sulcus ossis cuboidei (Taf. 4; 27 VII n), sowie an der untern Fläche eine schiefe Erhabenheit, eminentia obliqua.

b. Mittelfußknochen.

Die Mittelfußknochen, ossa metatarsi (Taf. 4; 27 o, 28 h, 28 i), sind längliche Knochen, an denen man ein hinteres Ende, den Körper, und ein vorderes Ende oder Köpfschen unterscheidet. Nach hinten treten dieselben mit den Fußwurzelknochen in Verbindung, während sie sich mit ihrem Köpfschen an das hintere Ende des ersten Gliedes der Zehenknochen anlegen.

Das hintere Ende, basis ossium metatarsi (Taf. 4; 27 p), verbindet sich durch ein Gelenk mit dem Fußwurzelknochen, und zwar das des ersten Mittelfußknochens, des Mittelfußknochens der großen Zehe, mit dem ersten Keilbeine, das des zweiten mit dem zweiten Keilbeine, das dritten mit dem dritten Keilbeine, das vierten und fünften mit dem Würfelbeine. An der Basis des fünften Mittelfußknochens, des Mittelfußknochens der kleinen Zehe, befindet sich ein kleiner Höcker, der Mittelfußknochenhöcker der kleinen Zehe, tuberositas ossis metatarsi quinti (Taf. 4; 27 r).

Der Körper oder das Mittelfuß, corpus (Taf. 4; 27 o), ist dreiseitig prismatisch mit einer obern etwas gewölbten Rückenfläche und zwei Seitenflächen, einer innern und äußern, sowie drei Kanten, einer untern schärfen, und zwei seitlichen stumpfern, einer innern und äußern.

Das vordere Ende oder Köpfschen, capitulum (Taf. 4; 27 q), verbindet sich, wie schon erwähnt, mit dem hintern Ende des ersten Gliedes der Zehen, die Seiten sind etwas flach gedrückt und zeigen ein kleines Grübchen, sinus, sowie zwei kleine Höckerchen, tubercula.

c. Zehenknochen.

Die Zehenknochen, ossa digitorum pedis oder phalanges pedis (Taf. 4; 27 t, u, v, w, x und 28 k, l, m, n, o), werden aus drei Gliedern, phalanges, dargestellt, nur die erste, große Zehe, hat deren nur zwei. Von diesen ist das erste Glied, phalanx prima (Taf. 4; 27 t, v und 28 k, n), das größte, das letzte oder Nagelglied, phalanx unguicularis (Taf. 4; 27 u, x und

28 l, o), das kleinste. An jedem Glied bemerkt man ein mit einer concaven Gelenkfläche versehenes hinteres Ende, basis, und ein mit einer rollenförmigen Gelenkfläche versehenes vorderes Ende oder Köpfschen, capitulum, zwischen welchen sich der Körper, corpus, befindet. Nur das letzte Nagelglied jeder Zehe hat kein Köpfschen, sondern endigt in eine raue Wulst. Die Zehenglieder sind flach gedrückt, mit einer schwach gewölbten Rücken- oder Dorsal- und einer etwas concaven Sohlen- oder Plantarfläche, sowie einem innern oder Tibial- und einem äußern oder Fibularrande.

Die große oder erste Zehe, hallux (Taf. 4; 27 t, u, und 28 k, l), hat die stärksten Knochen und, wie schon erwähnt, nur zwei Glieder.

Die Knochen der zweiten bis fünften Zehe ordnen sich in drei Reihen, einer ersten oder hintersten Reihe, series prima oder posterior (Taf. 4; 27 v, w, 28 m), einer zweiten oder mittlern Reihe, series secunda oder media (Taf. 4; 27 w, 28 n), und einer dritten oder vordern Reihe, series tertia oder anterior (Taf. 4; 27 x, 28 n). Die Glieder der Zehen nehmen von der ersten bis zur fünften Zehe immer an Größe ab, ebenso an jeder Zehe die Glieder, von dem ersten bis zum dritten Gliede.

d. Sesambeine.

Die Sesambeine, ossa sesamoidea (Taf. 4; 27 s), liegen an dem Gelenke zwischen dem Mittelfußknochen und ersten Gliede der großen Zehe in der Sehnenrolle und greifen in zwei an Köpfschen des Mittelfußknochens befindliche Rinnen ein. Es sind stets zwei Sesambeine, ein inneres und ein äußeres, os sesamoideum internum und externum, vorhanden. Ein drittes Sesambeinchen liegt am Gelenk zwischen dem ersten und zweiten Gliede der großen Zehe.

Tafel 5.

Diese Tafel zeigt uns die sämtlichen Hüftbänder des menschlichen Körpers, welche dazu dienen, in erster Linie die einzelnen Knochen des menschlichen Körpers untereinander zu verbinden, dann aber auch die Beweglichkeit der Gelenke einzuschränken.

Figur 1. Bänder des obern Theils der Wirbelsäule und der hintern Enden der obern Rippen von vorn gesehen.

- a. Corpus ossis sphenoides, Körper des Keilbeins.
- b. Os temporum, Schläfenbein (durchläßt).
- c. Atlas, Träger.
- d. Processus transversus atlantis, Querfortsatz des Trägers.
- e. Epistropheus, Umbreher.
- f. Vertebra colli septima, siebenter Halswirbel.
- g. Vertebra thoracis prima, erster Brustwirbel.
- h. Costa prima, erste Rippe (hinteres Ende).

1. Ligamentum longitudinale anterius, vorderes Längsband.
2. Ligamentum obturatorium oder latum atlantis anterius, vorderes oder breites Ausfüllungsband des Trägers.
3. Ligamenta intervertebralia et cartilagines intervertebrales, Zwischenwirbelbänder und Zwischenwirbelsmorpel.
4. Ligamenta intertransversalia, Zwischenquerfortsatzbänder.
5. Ligamenta capsularia capitulorum costarum, Kapselbänder der Rippenköpfchen.

6. Ligamenta colli costae interna, innere Bänder des Rippenhalbes.
7. Ligamenta colli costae externa, äußere Bänder des Rippenhalbes.

Figur 2. Bänder des untern Theils der Wirbelsäule, der hintern Enden der untern Rippen und des Beckens von vorn gesehen.

- a. Vertebra thoracis decima, zehnter Brustwirbel.
- b. Vertebra thoracis duodecima, zwölfter Brustwirbel.
- c. Costa decima, zehnte Rippe (hinteres Ende).
- d. Costa duodecima, zwölfte Rippe (hinteres Ende).
- e. Vertebra lumborum prima, erster Lendenwirbel.
- f. Vertebra lumborum quinta, fünfter Lendenwirbel.
- g. Os sacrum, Kreuzbein.
- h. Os coccygis, Steißbein.
- i. Os ilei, Darmbein.
- k. Crista ossis ilei, Kamm des Darmbeins.
- l. Spina anterior superior ossis ilei, vorderer oberer Darmbeinstachel.
- m. Spina anterior inferior ossis ilei, vorderer unterer Darmbeinstachel.
- n. Ramus horizontalis ossis pubis, horizontaler Ast des Schambeins.
- o. Ramus descendens ossis pubis, absteigender Ast des Schambeins.
- p. Symphysis ossis pubis, Schambeinfuge.
- q. Ramus ascendens ossis ischii, aufsteigender Ast des Sitzbeins.
- r. Tuber ischii, Sitzknorren.
- s. Ramus descendens ossis ischii, absteigender Ast des Sitzbeins.
- t. Os femoris, Oberschenkelknochen.
1. Ligamentum longitudinale anterius, vorderes Längsband.
2. Ligamenta intervertebralia et cartilaginea intervertebrales, Zwischenwirbelbänder und Zwischenwirbelschnur.
3. Ligamenta intertransversalia, Zwischenquerfortsatzbänder.
4. Ligamenta capsularia capitulorum costarum, Kapselbänder der Rippenköpfe.
5. Ligamenta intercostalia posteriora, hintere Zwischenrippenbänder.
6. Ligamentum lumbocostale, Lenden-Rippenband.
7. Ligamentum ileolumbale superius, oberes Hüftbein-Lendenband.
8. Ligamentum ileolumbale inferius, unteres Hüftbein-Lendenband.
9. Ligamenta sacro-iliaca, Kreuzbein-Hüftbeinbänder.
10. Ligamentum spinoso-sacrum, Stachel-Kreuzbeinband.
11. Ligamenta sacro-coccygea lateralia, seitliche Kreuz-Steißbeinbänder.
12. Ligamentum foraminis obturatorii, Band des Hüftloches.
13. Ligamentum capsulare femoris, Kapselband des Oberschenkels, Hüftgelenkskapselband.
14. Ligamentum arcuatum ossium pubis, bogenförmiges Band der Schambeinknochen.

Figur 3. Bänder der Halswirbelsäule, der obern Rückenwirbel und der hintern Enden der obern Rippen von hinten gesehen.

- a. Os occipitis, Hinterhauptbein (durchfällt).

- b. Processus mastoideus ossis temporum, Warzenfortsatz des Schläfenbeins.
- c. Fossa pro medulla oblongata, Rinne für das verlängerte Rückenmark.
- d. Atlas, Träger.
- e. Processus transversus atlantis, Querfortsatz des Trägers.
- f. Epistropheus, Umdreher.
- g. Vertebra colli septima, siebenter Halswirbel.
- h. Vertebra thoracis prima, erster Brustwirbel.
- i. Vertebra thoracis quarta, vierter Brustwirbel.
- k. Costa prima, erste Rippe.
- l. Costa quarta, vierte Rippe.
1. Ligamentum longitudinale posterius, hinteres Längsband (Anfangsstück).
2. Apparatus ligamentosus capitis et vertebrarum colli, Bandmasse des Kopfes und des Halswirbels.
3. Ligamenta accessoria capitis und ligamentum capsulare capitis cum atlante, Hüftbänder des Kopfes und Kapselband des Kopfes und Atlas.
4. Ligamenta apicum, Spitzenbänder.
5. Ligamentum transversale externum, äußerer Querband.
6. Ligamenta colli costae externa et interna, äußere oder innere Bänder des Rippenhalbes.

Figur 4. Bänder des untern Theils der Wirbelsäule, der hintern Enden der untern Rippen und des Beckens von hinten gesehen.

- a. Vertebra thoracis decima, zehnter Rückenwirbel.
- b. Vertebra thoracis duodecima, zwölfter Rückenwirbel.
- c. Vertebra lumborum prima, erster Lendenwirbel.
- d. Vertebra lumborum quinta, fünfter Rückenwirbel.
- e. Costa decima, zehnte Rippe.
- f. Costa duodecima, zwölfte Rippe.
- g. Os sacrum, Kreuzbein.
- h. Hiatus canalis sacralis, Ausgang des Kreuzbeinkanals.
- i. Os coccygis, Steißbein.
- k. Os ilei, Hüftbein.
- l. Os ischii, Sitzbein.
- m. Os pubis, Schambein.
- n. Os femoris, Oberschenkelknochen.
1. Ligamenta apicum, Spitzenbänder.
2. Ligamenta intercostalia posteriora, hintere Zwischenrippenbänder.
3. Ligamentum lumbocostale, Lenden-Rippenband.
4. Ligamentum transversale externum, äußerer Querband.
5. Ligamenta intertransversalia, Zwischenquerfortsatzbänder.
6. Ligamentum ileolumbale superius, oberes Hüftbein-Lendenband.
7. Ligamentum ileolumbale inferius, unteres Hüftbein-Lendenband.
8. Ligamentum ileo-sacrum longum, langes Hüftbein-Kreuzbeinband.
9. Ligamentum ileo-sacrum breve, kurzes Hüftbein-Kreuzbeinband.
10. Ligamentum ileo-sacrum inferius, unteres Hüftbein-Kreuzbeinband.
11. Ligamenta lateralia oder vasa postica ossis sacri, seitliche Bänder des Kreuzbeins.
12. Ligamenta sacro-coccygea postica, hintere Kreuz-Steißbeinbänder.

Ligamentum tuberoso-sacrum, Knorren-Kreuzbeinband.

Ligamentum spinoso-sacrum, Stachel-Kreuzbeinband.

Ligamentum obturatorium, Hüftfloßband.

Ligamentum arcuatum ossium pubis, bogenförmiges Band des Schambein-Knochens.

Ligamentum capsulare femoris, Kapselband des Oberschenkelkopfes.

Die Bänder des Körpers.

Alle Bänder des Körpers lassen sich in vier Gruppen unterbringen, und erhalten wir danach: Bänder am Kopfe, Bänder am Rumpfe, Bänder der oberen Extremität und Bänder an der unteren Extremität.

5. Äußere Bänder des rechten Unterliefersgelenks.

- a. Os temporum, Schläfenbein.
- b. Meatus auditorius externus, äußerer Gehörgang.
- c. Arcus zygomaticus, Jochbein.
- d. Ramus maxillae inferioris, Ast des Unterliefers.
- e. Processus condyloideus, Gelenkfortsatz.
- f. Processus coronoideus, Kronenfortsatz.
- g. Angulus maxillae inferioris, Unterlieferswinkel.
- h. Processus styloideus, Griffelfortsatz.
- i. Ligamentum capsulare maxillae inferioris, Kapselband des Unterliefers.
- j. Ligamentum laterale externum maxillae inferioris, äußeres seitliches Band des Unterliefers.
- k. Ligamentum stylo-maxillare, Griffelfortsatz-Unterliefersband.
- l. Ligamentum stylo-hyoideum, Griffelfortsatz-Zungenbeinband.

6. Innere Bänder des rechten Unterliefersgelenks.

- a. Os temporum, Schläfenbein.
- b. Os sphenoidum, Keilbein.
- c. Processus pterygoideus ossis sphenoidi, Flügel-fortsatz des Keilbeins.
- d. Ramus maxillae inferioris, Ast des Unterliefers.
- e. Condylus maxillae inferioris, Gelenkfortsatz des Unterliefers.
- f. Angulus maxillae inferioris, Winkel des Unterliefers.
- 1. Ligamentum capsulare maxillae inferioris, Kapselband des Unterliefers.
- 2. Ligamentum laterale internum maxillae inferioris, inneres seitliches Band des Unterliefers.

7. Die innern Bänder des Kopf-gelenks, durch Eröffnung der Wirbelsäule von hinten sichtbar gemacht; obere Lage.

- a. Os occipitis, Hinterhauptbein.
- b. Atlas, Träger.
- c. Epistropheus, Umdreher.
- d. Processus odontoides epistrophei, Zahnfortsatz des Umdrehers.
- 1. Ligamentum longitudinale posticum, hinteres Längsband.
- 2. Apparatus ligamentosus capitis et vertebrarum

colli, Bandmasse des Kopfes und der Halswirbel.

- 3. Ligamentum cruciatum, Kreuzband.
- 4. Ligamentum transversum atlantis, Querband des Atlas.
- 5. Appendix superior ligamenti cruciati, oberer Anhang des Kreuzbandes.
- 6. Appendix inferior ligamenti cruciati, unterer Anhang des Kreuzbandes.
- 7. Ligamentum laterale inferius dentis epistrophei, unteres seitliches Band des Zahnes des Umdrehers.
- 8. Ligamentum laterale superius dentis epistrophei, oberes seitliches Band des Zahnes des Umdrehers.
- 9. Ligamentum capsulare capitis cum atlante, Kapselband des Kopfes mit dem Träger.
- 10. Ligamentum capitis laterale, seitliches Kopfband.

Figur 8. Die innern Bänder des Kopf-gelenks, durch Eröffnung der Wirbelsäule von hinten sichtbar gemacht; untere Lage.

- a. Os occipitis, Hinterhauptbein.
- b. Atlas, Träger.
- c. Epistropheus, Umdreher.
- d. Processus odontoides epistrophei, Zahnfortsatz des Umdrehers.
- 1. Ligamentum laterale inferius dentis epistrophei, unteres seitliches Band des Zahnfortsatzes des Umdrehers.
- 2. Ligamentum laterale superius dentis epistrophei, oberes seitliches Band des Zahnfortsatzes des Unterliefers.
- 3. Ligamentum capsulare capitis cum atlante, Kapselband des Kopfes mit dem Träger.
- 4. Ligamentum capsulare atlantis et epistrophei, Kapselband des Trägers und Umdrehers.
- 5. Ligamentum suspensorium dentis epistrophei, Aufhängeband des Zahnfortsatzes des Umdrehers.

Figur 9. Vordere Bänder des Brustbeins.

- a. Pars sternalis claviculae, Brustbeintheil des Schlüsselbeins.
- b. Manubrium sterni, Handgriff des Brustbeins.
- c. Corpus sterni, Körper des Brustbeins.
- d. Processus ensiformis sterni, Schwertfortsatz des Brustbeins.
- e. Costa prima, erste Rippe.
- f. Costa septima, siebente Rippe.
- g. Costa octava oder costa prima spuria, achte oder erste falsche Rippe.
- 1. Ligamentum interclaviculare, Zwischenschlüsselbeinband.
- 2. Ligamentum capsulare internum claviculae, inneres Schlüsselbeinkapselband.
- 3. Ligamentum rhomboideum, rautenförmiges Band.
- 4. Ligamenta coruscautia oder intercostalia, Zwischenrippenbänder.
- 5. Membrana sterni propria anterior, vordere eigene Haut des Brustbeins.
- 6. Ligamenta sterno-costalia radiata externa, äußere Strahlenbänder des Brustbeins.
- 7. Ligamentum processus xiphoidei oder costo-xiphoideum externum, äußeres Schwertfortsatzband.



Figur 10. Hintere Bänder des Brustbeins.

- a. Pars sternalis claviculae, Brustbeintheil des Schlüsselbeins.
- b. Manubrium sterni, Handgriff des Brustbeins.
- c. Corpus sterni, Körper des Brustbeins.
- d. Processus xiphoideus sterni, Schwertfortsatz des Brustbeins.
- e. Costa prima, erste Rippe.
- f. Costa septima, siebente Rippe.
- g. Costa octava oder costa spuria prima, achte oder erste falsche Rippe.
1. Ligamentum claviculare anterius, vorderes Schlüsselbeinband.
2. Ligamentum capsulare claviculae internum, inneres Schlüsselbein kapselband.
3. Ligamentum rhomboideum oder costo-claviculare, rautenförmiges Band.
4. Ligamenta coruscantia oder intercostalia, Zwischenrippenbänder.
5. Membrana sterni propria posterior, hintere eigene Haut des Brustbeins.
6. Ligamenta sterno-costalia radiata interna, innere Strahlenbänder des Brustbeins.
7. Ligamentum processus xiphoidei internum, inneres Band des Schwertfortsatzes.

Figur 11. Äußere Bänder des Schultergelenks, von vorn gesehen.

- a. Pars acromialis claviculae, Schulterhöhenheil des Schlüsselbeins.
- b. Acromion, Schulterhöhe.
- c. Scapula, Schulterblatt.
- d. Processus coracoideus, Rabenschnabelfortsatz.
- e. Os brachii, Oberarmknochen.
- f. Caput ossis brachii, Kopf des Oberarmknochens.
- g. Tuberculum majus, größerer Höder.
1. Ligamentum claviculo-acromiale, Schlüsselbein-Schulterhöhenband.
2. Ligamentum trapezoideum, tischförmiges Band.
3. Ligamentum conoideum, kegelförmiges Band.
4. Ligamentum coraco-acromiale oder scapulae proprium anticum, Rabenschnabelfortsatz-Schulterhöhenband.
5. Ligamentum transversum oder scapulae proprium posticum, Querband oder hinteres eigenes Band des Schulterblattes.
6. Ligamentum capsulare humeri, Kapselband des Oberarmknochens.

Figur 12. Innere Bänder des Schultergelenks, von vorn gesehen.

- a. Pars acromialis claviculae, Schulterhöhenheil des Schlüsselbeins.
- b. Acromion, Schulterhöhe.
- c. Scapula, Schulterblatt.
- d. Processus coracoideus, Rabenschnabelfortsatz.
- e. Cavitas glenoidalis scapulae, Gelenkgrube des Schulterblattes.
- f. Spina scapulae, Schultergräte.
1. Ligamentum claviculo-acromiale, Schlüsselbein-Schulterhöhenband.
2. Ligamentum trapezoideum, tischförmiges Band.
3. Ligamentum conoideum, kegelförmiges Band.

4. Ligamentum coraco-acromiale oder scapulae proprium anticum, Rabenschnabelfortsatz-Schulterhöhenband oder vorderes eigenes Band des Schulterblattes.
5. Tendo bicipitis, Sehne des doppeltköpfigen Brustmuskels.
6. Ligamentum glenoideum, Gelenkgrubenband.

Figur 13. Bänder des linken Ellenbogengelenks, von der Volarfläche aus gesehen.

- a. Os brachii, Oberarmknochen.
- b. Condylus externus ossis brachii, äußerer Gelenkfortsatz des Oberarmknochens.
- c. Condylus internus ossis brachii, innerer Gelenkfortsatz des Oberarmknochens.
- d. Trochlea processus cubitalis, Rolle des Ellenbogenfortsatzes.
- e. Radius, Speiche.
- f. Collum radii, Hals der Speiche.
- g. Capitulum radii, Köpfchen der Speiche.
- h. Tuberositas radii, Höckerchen der Speiche.
- i. Ulna, Einbogenbein.
1. Ligamentum capsulare cubiti, Kapselband des Ellenbogens.
2. Ligamentum laterale cubiti externum, äußerer Seitenband des Ellenbogens.
3. Ligamentum laterale cubiti internum, innerer Seitenband des Ellenbogens.
4. Ligamentum annulare radii, Ringband der Speiche.
5. Ligamentum teres, rundes Band.
6. Ligamentum interosseum antibrachii, Zwischenknochenband des Vorderarms.

Figur 14. Bänder des linken Ellenbogengelenks, von der Rücken-(Dorsal-)fläche aus gesehen.

- a. Os brachii, Oberarmknochen.
- b. Condylus externus ossis brachii, äußerer Gelenkfortsatz des Oberarmknochens.
- c. Condylus internus ossis brachii, innerer Gelenkfortsatz des Oberarmknochens.
- d. Radius, Speiche.
- e. Collum radii, Hals der Speiche.
- f. Capitulum radii, Köpfchen der Speiche.
- g. Tuberositas radii, Höckerchen der Speiche.
- h. Ulna, Einbogenbein.
- i. Olecranon, Einbogenknorren.
1. Ligamentum capsulare cubiti, Kapselband des Ellenbogens.
2. Ligamentum laterale cubiti externum, äußerer Seitenband des Ellenbogens.
3. Ligamentum annulare radii, Ringband der Speiche.
4. Ligamentum teres, rundes Band.
5. Ligamentum interosseum antibrachii, Zwischenknochenband des Vorderarms.

Figur 15. Bänder der linken Hand von der Hohlhand- oder Volarfläche aus gesehen.

- a. Radius, Speiche.
- b. Ulna, Einbogenbein.
- c. Processus styloideus radii, Griffelfortsatz der Speiche.
- d. Processus styloideus ulnae, Griffelfortsatz des Einbogenbeins.
- e. Carpus, Handwurzel.
- f. Metacarpus, Mittelhand.

Valangues digitorum, Fingerglieder.
 Ligamentum interossum antibrachii, Zwischenknochenband des Vorderarms.
 Ligamenta carpi, Bänder der Handwurzel.
 Ligamenta ossium carpi et metacarpi volaria, Hohlhandbänder der Handwurzel und der Mittelhandknochen.
 Ligamenta baseos ossium metacarpi volaria, Hohlhandbänder der Basis der Mittelhandknochen.
 Ligamenta capitulorum ossium metacarpi, Bänder der Köpfchen der Mittelhandknochen.
 Ligamenta lateralia digitorum externa, äußere seitliche Bänder der Fingerglieder.
 Ligamenta lateralia digitorum interna, innere seitliche Bänder der Fingerglieder.

16. Bänder der linken Hand, von der dorsalen oder Dorsalfäche aus gesehen.
 Radius, Speiche.

Ulna, Einbogenbein.

Processus styloideus radii, Griffelfortsatz der Speiche.

Processus styloideus ulnae, Griffelfortsatz des Einbogenbeins.

Carpus, Handwurzel.

Metacarpus, Mittelhand.

Phalanges digitorum, Fingerglieder des Vorderarms.

Ligamentum interossum antibrachii, Zwischenknochenband des Vorderarms.

Ligamenta carpi, Handwurzelbänder.

Ligamenta ossium carpi et metacarpi dorsalia, Rückenbänder der Handwurzel und Mittelhandknochen.

Ligamenta baseos metacarpi dorsalia, Rückenbänder der Basis der Mittelhandknochen.

Ligamenta lateralia digitorum externa, äußere Seitenbänder der Fingerglieder.

Ligamenta lateralia digitorum interna, innere Seitenbänder der Fingerglieder.

17. Äußere Bänder des linken Kniegelenks, von vorn und von der Innenseite gesehen.

Os femoris, Oberschenkelknochen.

Condylus internus femoris, innerer Gelenkfortsatz des Oberschenkelknochens.

Patella, Kniefscheibe.

Tibia, Schienbein.

Tuberositas tibiae, Höcker des Schienbeins.

Tendo communis extensoris cruris, gemeinsame Sehne des Beinstreckers.

Ligamentum patellae medium, mittleres Band der Kniefscheibe.

Ligamentum patellae laterale internum, inneres seitliches Band der Kniefscheibe.

Ligamentum laterale genu internum, inneres seitliches Band des Knies.

Ligamentum capsulare genu, Kapselband des Knies.

18. Innere Bänder des linken Kniegelenks, von vorn gesehen.

Os femoris, Oberschenkelknochen.

Condylus internus femoris, innerer Gelenkfortsatz des Oberschenkelknochens.

c. Condylus externus femoris, äußerer Gelenkfortsatz des Oberschenkelknochens.

d. Fossa articularis pro patella, Gelenkgrube für die Kniefscheibe.

e. Tibia, Schienbein.

f. Condylus internus tibiae, innerer Gelenkfortsatz des Schienbeins.

g. Condylus externus tibiae, äußerer Gelenkfortsatz des Schienbeins.

h. Tuberositas tibiae, Höcker des Schienbeins.

i. Fibula, Wadenbein.

k. Caputulum fibulae, Köpfchen des Wadenbeins.

l. Eminentia intercondyloidea tibiae, Erhabenheit zwischen den Gelenkfortsätzen des Schienbeins.

1. Cartilago semilunaris externa, äußerer halbmondförmiger Knorpel.

2. Cartilago semilunaris interna, innerer halbmondförmiger Knorpel.

3. Ligamentum cruciatum genu anticum, vorderes Kreuzband des Kniegelenks.

4. Ligamentum cruciatum genu posticum, hinteres Kreuzband des Kniegelenks.

5. Ligamentum laterale genu internum, inneres Seitenband des Knies.

6. Ligamentum capsulare capituli fibulae, Kapselband des Wadenbeinköpfchens.

7. Ligamentum interossum cruris, Zwischenknochenband des Unterschenkels.

Figur 19. Innere Bänder des linken Kniegelenks, von hinten gesehen.

a. Os femoris, Oberschenkelknochen.

b. Condylus internus femoris, innerer Gelenkfortsatz des Oberschenkelknochens.

c. Condylus externus femoris, äußerer Gelenkfortsatz des Oberschenkelknochens.

d. Fossa intercondyloidea, Zwischenkniegelenkgrube.

e. Tibia, Schienbein.

f. Condylus externus tibiae, äußerer Gelenkfortsatz des Schienbeins.

g. Condylus internus tibiae, innerer Gelenkfortsatz des Schienbeins.

h. Fibula, Wadenbein.

i. Caputulum fibulae, Köpfchen des Wadenbeins.

1. Cartilago semilunaris externa, äußerer halbmondförmiger Knorpel.

2. Cartilago semilunaris interna, innerer halbmondförmiger Knorpel.

3. Ligamentum cruciatum genu anticum, vorderes Kreuzband des Kniegelenks.

4. Ligamentum cruciatum genu posticum, hinteres Kreuzband des Kniegelenks.

5. Ligamentum laterale genu internum, inneres Seitenband des Knies.

6. Ligamentum capsulare capituli fibulae, Kapselband des Wadenbeinköpfchens.

7. Ligamentum interossum cruris, Zwischenknochenband des Unterschenkels.

Figur 20. Bänder der Sohlen- oder Plantarfläche des Fußes.

a. Calcaneus, Fersebein.

b. Astragalus, Sprungbein.

c. Tuber ossis navicularis, Höcker des Kahnbeins.

d. Os cuneiforme primum, erstes Keilbein.

- e. Os cuboideum, Würfelbein.
- f. Ossa metatarsi, Mittelfußknochen.
- g. Phalanges digitorum pedis, Zehenglieder.
1. Ligamenta tarsi plantaria, Sohlenbänder der Fußwurzel.
2. Ligamentatarseo-metatarsia plantaria, Sohlenbänder der Fußwurzel mit dem Mittelfuße.
3. Ligamenta baseos metatarsi plantaria, Sohlenbänder der Basis des Mittelfußknochens.
4. Ligamenta capitulorum metatarsi, Bänder der Köpfchen der Mittelfußknochen.
5. Sulcus cartilagineus pro tendine flexoris pedis, Knorpelfrinne für die Sehne des Beugemusfels des Fußes.
6. Ligamenta digitorum pedis lateralia interna, innere seitliche Bänder der Zehen.
7. Ligamenta digitorum pedis lateralia externa, äußere seitliche Bänder der Zehen.
8. Ligamenta cruciata digitorum pedis, Kreuzbänder der Zehen.
9. Ligamentum intersesamoideum, Zwischenfesambeinband.

Figur 21. Bänder des linken Fußes von der innern Seite gesehen.

- a. Tibia, Schienbein.
- b. Malleolus internus, innerer Knöchel.
- c. Astragalus, Sprunggelenk.
- d. Calcaneus, Fersenbein.
- e. Tarsus, Fußwurzel.
- f. Os metatarsi hallucis, Mittelfußknochen der großen Zehe.
- g. Phalanx prima hallucis, erstes Glied der großen Zehe.
- h. Phalanx secunda hallucis, zweites Glied der großen Zehe.
1. Ligamenta tarsi marginis interni, Bänder der innern Seite der Fußwurzel.
2. Ligamentum articuli pedis posterius, hinteres Gelenkband des Fußes.
3. Ligamentum astragalo-calcaneum posterius, hinteres Sprunggelenk-Fersenbeinband.
4. Ligamentum calcaneo-cuboideum plantare, Fersenbein-Würfelbein-Sohlenband.
5. Ligamentum baseos metatarsi hallucis, Band der Basis des Mittelfußknochens der großen Zehe.
6. Ligamenta lateralia interna hallucis, innere Seitenbänder der großen Zehe.

Figur 22. Bänder der äußern Seite und des Rückens des Fußes.

- a. Fibula, Wadenbein.
- b. Tibia, Schienbein.
- c. Malleolus externus, äußerer Knöchel.
- d. Calcaneus, Fersenbein.
- e. Tarsus, Fußwurzel.
- f. Metatarsus, Mittelfuß.
- g. Phalanges digitorum pedis, Zehenglieder.
1. Ligamentum interosseum cruris, Zwischenknochenband des Unterschenkels.
2. Ligamenta tarsi dorsalia, Rückenbänder der Fußwurzel.
3. Ligamentum articuli pedis laterale, seitliches Gelenkband des Fußes.
4. Ligamenta tarso-metatarsia dorsalia, Fußwurzel-Mittelfußwurzel-Rückenbänder.

5. Ligamenta baseos metatarsi dorsalia, Rückenbänder der Basis der Mittelfußknochen.
6. Ligamenta lateralia externa digitorum pedis, äußere Seitenbänder der Zehen.

A. Bänder am Kopfe.

Die einzelnen Knochen des Kopfes sind, wenn auch nicht absolut unbeweglich aneinandergefügt, doch ebenso wenig durch Gelenke miteinander verbunden, sondern durch Nähte, welche eine bedeutende Festigkeit mit einem geringen Grade von Berrücktheit vereinen.

Nur drei Bandverbindungen gibt es am Kopfe. Die eine ist die mit dem Unterkiefergelenk, die zweite mit dem Zungenbein, und die dritte mit den Wirbelsäule.

I. Unterkiefergelenk.

Das Unterkiefergelenk, articulation maxillaris (Taf. 5; 5, 6), verbindet den Gelenkfortsatz des Unterkiefers mit der Gelenkgrube des Schläfenbeins und ist ein sogenanntes freies Gelenk, arthrodia, da aber die Beweglichkeit der Kinnlade nach auf- und abwärts größer ist als nach vor- und seitwärts, so ist die Arthrobie eine beschränkte. Bänder finden sich vier an diesem Gelenk: das Kapselband des Unterkiefers, das innere und äußere Seitenband des Unterkiefers und das Griffel-Unterkieferband.

a) Das Kapselband des Unterkiefers, Ligamentum capsulare maxillae inferioris (Taf. 5; 5, 6), umgibt sackförmig den Rand des Gelenkfortsatzes des Unterkiefers und die Gelenkgrube des Schläfenbeins. Die Gelenkhöhle wird durch einen Zwischenknorpel, cartilago interarticularis, in zwei Räume getheilt.

b) Das innere Seitenband des Unterkiefers, ligamentum laterale internum maxillae inferioris, (Taf. 5; 6₂), entspringt vom Dornfortsatz des Schläfenbeins und heftet sich an das Knochenblättchen an der hintern Unterkieferöffnung.

c) Das äußere Seitenband des Unterkiefers, ligamentum laterale externum maxillae inferioris (Taf. 5; 5₂), entspringt von der Wurzel des Dornfortsatzes des Schläfenbeins und heftet sich an den Gelenkfortsatz des Unterkiefers.

d) Das Griffel-Unterkieferband, ligamentum stylo-maxillare oder stylo-mylohyoideum (Taf. 5; 5₂), entspringt vom Griffelfortsatz des Schläfenbeins und steigt zum Winkel des Unterkiefers.

II. Bandverbindung zwischen Schädel- und Zungenbein.

Das Zungenbein ist durch ein längeres Band, das Griffel-Zungenbeinband oder das Aufhängelband des Zungenbeins, Ligamentum stylohyoideum oder ligamentum suspensorium ossis hyoidei (Taf. 5; 6₁), am Schädel befestigt. Dasselbe entspringt am Griffelfortsatz des Schläfenbeins und heftet sich an die kleinen Hörner des Zungenbeins.

Außerdem sind noch vom Zungenbein selbst zu erwähnen das Kapselband der großen Hörner, ligamentum capsulare cornuum majorum, und das Kapselband der kleinen Hörner, ligamentum capsulare cornuum minorum (s. hier die Abbildung des Zungenbeins, Taf. 3; 14).

III. Kopfgelenk.

Kopfgelenk, articulatio capitis, wird gebildet die Gelenkfortsätze des Hinterhauptbeins und dem schiefen Gelenkfortsatz des Trägers, wozu eine Anzahl Bänder kommen. Die Bewegung dieses ist eine doppelte. Zunächst kann er gestreckt, das heißt nach vorn und hinten werden, indem das oben erwähnte Gelenk ein Niergelenk, ginglymus, bildet. Dann findet auch noch eine Drehung des Kopfes nach beiden von je einem Viertelkreise im Umfang statt, jedoch die Bewegung der Halswirbelsäule mitschneidet. Diese horizontale Bewegung, eine Roll- Drehbewegung, rotatio, findet aber nicht am Kopf und Träger, sondern zwischen Träger und Umdreher statt, wobei der Zahnfortsatz des Umdrehers als Drehpunkt dient.

In den Kopfgelenkbändern hat man drei Arten zu unterscheiden, erstens Bänder zwischen Kopf und Träger, dann zwischen Kopf und Umdreher einerseits und zwischen Träger und Umdreher andererseits, drittens zwischen Kopf und mehreren Halswirbeln.

a. Bänder zwischen Kopf und Träger.

Unter zwischen Kopf und Träger sind drei: das Kapselband des Kopfes mit dem Träger, das äußere Ausfüllungsband und das hintere Ausfüllungsband zwischen Kopf und Träger. Das Kapselband des Kopfes mit dem Träger, ligamentum capsulare capitis cum atlante (Taf. 5; 7, 8), umgibt den Umfang der Gelenkfortsätze des Hinterhauptes sowie den Rand der obern Gelenkfortsätze des Trägers.

Das vordere Ausfüllungsband, ligamentum obturatorium oder latum atlantis anterioris (Taf. 5; 3), entspringt vom vordern Rande des Hinterhauptes und geht zum vordern Ende des Trägers. Der mittlere Theil des Bandes, der zum vordern Höckerchen des Trägers geht, ist dick und heißt das gerade Band, ligamentum rectum.

Das hintere Ausfüllungsband, ligamentum obturatorium oder latum atlantis posterioris, auf unserer Abbildung nicht sichtbar und geht vom hintern Rande des großen Hinterhauptes zum hintern Bogen des Trägers.

Bänder zwischen Kopf und Umdreher einerseits und zwischen Träger und Umdreher andererseits.

Wir haben hier gleichfalls drei Bänder zu nennen, und zwar die Flügelbänder des Zahnfortsatzes des Umdrehers, das Aufhängeband des Zahnfortsatzes und das Querband des Trägers.

1) Die Flügelbänder des Umdrehers, ligamenta lateralia dentis epistrophei oder alaria Mauriti (Taf. 5; 7, u. 8, 1, u. 2), zerfallen in die obern Flügelbänder, ligamenta alaria superiora (Taf. 5; 7, 8), und die untern Flügelbänder, ligamenta alaria inferiora (Taf. 5; 7, 8); dieselben springen von der Seitenfläche des Zahnfortsatzes des Umdrehers, und zwar die untern zu unterst, die untern zu oberst, und setzen sich an das Hinterhaupt des inneren Randes des Gelenkfortsatzes des Hinterhauptbeins und den vordern Umfang des großen

Hinterhauptes, wobei sich die untern nach außen, die obern nach innen anheften.

2) Das Aufhängeband des Zahnfortsatzes, ligamentum suspensorium dentis epistrophei (Taf. 5; 8), geht von dem vordern Umfang des großen Hinterhauptes zum Zahnfortsatz.

3) Das Querband des Trägers, ligamentum transversum atlantis (Taf. 5; 7), geht von einem Seitentheile des Trägers quer hinter dem Zahnfortsatz weg zum andern Theile. Nach oben zweigt sich der obere Anhang, appendix superior (Taf. 5; 7), zum vordern Umfang des großen Hinterhauptes gehend, und nach unten der untere Anhang, appendix inferior (Taf. 5; 7), an den Körper des zweiten Halswirbels sich anheftend, ab und bildet so mit dem Querband des Trägers das Kreuzband, ligamentum cruciatum (Taf. 5; 7).

Nur dem Namen nach wollen wir noch erwähnen das Kapselband des Trägers und Umdrehers, ligamentum capsulare atlantis et epistrophei (Taf. 5; 8).

c. Bänder zwischen Kopf und mehreren Halswirbeln.

Zwei Bänder sind es, welche hier in Betracht kommen, die Bandmasse des Kopfes und das Nackenband.

1) Die Bandmasse des Kopfes, apparatus ligamentosus capitis et vertebrae colli (Taf. 5; 3, 7), entspringt von dem Grundtheil des Hinterhauptes und setzt sich an die innere Fläche des Körpers des dritten und vierten Halswirbels.

2) Das Nackenband, ligamentum nuchae oder cervicis, auf unserer Tafel nicht sichtbar, geht von dem äußern Hinterhauptstachel zu den Dornfortsätzen der Halswirbel und setzt sich daselbst in dem Einschnitte fest.

B. Bänder am Rumpfe.

Die Bänder des Rumpfes dienen entweder zur Verbindung der Wirbel, der Rippen und des Brustbeins für sich, oder zur Vereinigung dieser verschiedenen Theile untereinander.

I. Verbindungen der Wirbel.

Die einzelnen Wirbel sind in der Hauptsache durch ein straffes Gelenk, amphiarthrosis, miteinander verbunden, wodurch die sich berührenden Knochen nur in geringem Maße gegeneinander verschoben werden können, während dabei die Wirbelsäule als Ganzes durch die Summe der Verschiebungen eine ziemliche Beweglichkeit besitzt. Mit Ausnahme des Trägers, der besondere Verhältnisse zeigt, ist bei den übrigen Wirbeln durch Zusammenrücken der zwischen je zwei gelegenen elastischen Fasernkörper eine Bewegung nach vorn, hinten und nach den Seiten gestattet, sowie eine drehende um die Längsachse der Wirbelsäule; doch werden diese Bewegungen durch die Gelenk- oder schiefen Fortsätze je nach den verschiedenen Theilen der Wirbelsäule etwas beschränkt. Am beweglichsten ist der Hals- und Lendenheil der Wirbelsäule, am wenigsten der Brustheil, sodas die Rückenwirbel, mit Ausnahme der untern, besonders zur Drehung um ihre senkrechte Achse sich eignen, während bei den Lendenwirbeln die Bewegung vorzugsweise nach vorn und hinten geschieht. Die Beweglichkeit der Wirbelsäule hängt, außer von der Größe und Höhe der Bandscheiben und von

der Stellung der Gelenkfortsätze, auch noch von der Größe der Wirbelskörper, von der günstigen oder ungünstigen Stellung der übrigen Wirbelsfortsätze und von den verschiedenen Bändern ab.

Bänder unterscheidet man fünf Arten an der Wirbelsäule, und zwar: Bänder der Wirbelskörper, Bänder der Wirbelbogen, Bänder der schiefen Fortsätze, Bänder der Stachelfortsätze und Bänder der Querfortsätze.

a. Bänder der Wirbelskörper.

Die Bänder der Wirbelskörper bestehen aus den Zwischenwirbelknorpeln, dem vordern und dem hintern Längsbande.

1) Die Zwischenwirbelknorpel oder Bandscheiben, *cartilagineae intervertebrales* oder *ligamenta intervertebraalia* (Taf. 5; 1, 2₁), sind dicke, feste, knorpelartige Scheiben, welche zwischen je zwei Wirbelkörpern liegen. Sie haben im Umfang die Gestalt der einander zugekehrten Flächen der Wirbelskörper und sind von verschiedener Höhe, am dicksten zwischen den Lendenwirbeln. Sie bestehen aus einem äußern breiten, elastischen Faserring und einem von diesem umschlossenen weichen, gallertartigen Kern.

2) Das vordere Längsband, *ligamentum longitudinale anterius* (Taf. 5; 1, 2₂), liegt an der vordern äußern Seite der Wirbelsäule. Es beginnt an dem vordern Höcker des Trägers und steigt, nach abwärts immer breiter werdend und Wirbelskörper sowie Bandscheiben überziehend und an denselben sich ansetzend, bis zum Kreuzbein herab.

3) Das hintere Längsband, *ligamentum longitudinale posterius* (Taf. 5; 3₁), liegt an der hintern Fläche der Wirbelskörper und steigt bis in den Kreuzbeinalkanal herab, wie das vorige an den Wirbelkörpern und an den Bandscheiben sich ansetzend.

b. Bänder der Wirbelbogen.

Die Zwischenwirbelbogenbänder, *ligamenta subflava, flava* oder *intercruralia*, gehen vom untern Rande eines Wirbelbogens zu dem obern Rande des folgenden und füllen so durch starke, gelbe, elastische Bandmassen die Lücken zwischen den einzelnen Wirbelbogen aus.

c. Bänder der schiefen Fortsätze.

Die Kapselbänder, *ligamenta capsularia*, verbinden die schiefen Fortsätze untereinander.

d. Bänder der Stachelfortsätze.

Die Bänder der Stachelfortsätze zerfallen in die Zwischenstachelfortsatzbänder und die Spitzensatzbänder.

1) Die Zwischenstachelfortsatzbänder, *ligamenta interspinalia*, füllen die Räume zwischen den Stachelfortsätzen aus.

2) Die Spitzensatzbänder, *ligamenta apicum* (Taf. 5; 3₂, 4₁), gehen von der Spitze des einen Stachelfortsatzes zu der des nächsten.

e. Bänder der Querfortsätze.

Die Zwischenquerfortsatzbänder, *ligamenta intertransversalia* (Taf. 5; 1₂, 2₂, 4₂), sind schmale, schlaffe Bänder, die von einem Querfortsatz zum andern gehen und namentlich an dem Lendenheile der Wirbelsäule stark ausgebildet sind. An der Spitze der Querfortsätze sind sie etwas stärker und dienen verschiedenen Muskeln der Wirbelsäule zum Ansatz.

II. Verbindungen der Rippen.

Jede Rippe ist an drei Punkten befestigt, nämlich hinten durch das Köpfchen mit den Wirbeln und durch das Höckerchen mit den Querfortsätzen, während sie nach vorn mit dem Rippenknorpel verbunden steht, welche von der ersten bis zur zehnten Rippe an das Brustbein sich ansetzen, während die übrigen bis zehnten Rippe sich an Knorpel der achten bis zehnten Rippe ansetzen und die der elften und zwölften Rippe an den Lendenwirbeln ansetzen. Die Verbindung der Rippenknorpel mit den Wirbelskörpern bildet ein Charniergelenk, während zwischen dem Rippenköpfchen und dem Querfortsatz ein straffes Gelenk besteht. Nach den Befestigungspunkten haben wir auch drei Arten von Bändern, und zwar Rippen-Wirbelkörperbänder, Rippen-Querfortsatzbänder und Rippenknorpelbänder.

a. Rippen-Wirbelkörperbänder.

Das Rippen-Wirbelkörpergelenk, *costo-vertebrale*, besteht aus einem Kopf-Wirbelgelenk und einem Querfortsatzgelenk. Das Kopf-Wirbelgelenk besteht aus dem Rippenköpfchen und dem Querfortsatz des Wirbels, welches sich an den Rand der Gelenkfläche des Wirbels ansetzt. Das Querfortsatzgelenk besteht aus dem Rippenknorpel und dem Querfortsatz des Wirbels, welches sich an den Rand der Gelenkfläche des Querfortsatzes ansetzt. Das Rippenknorpelgelenk besteht aus dem Rippenknorpel und dem Querfortsatz des Wirbels, welches sich an den Rand der Gelenkfläche des Querfortsatzes ansetzt.

b. Rippen-Querfortsatzbänder.

Das Rippen-Querfortsatzgelenk, *costo-transversale*, besteht aus dem Rippenknorpel und dem Querfortsatz des Wirbels, welches sich an den Rand der Gelenkfläche des Querfortsatzes ansetzt.

1) Das äußere oder hintere Querfortsatzband, *ligamentum costo-transversale externum* (Taf. 5; 3₂, 4₂), ist hart und geht von dem stumpfen Ende des Querfortsatzes zu dem obern, hintern, rauhen Theile des nächst entsprechenden Knorpels.

2) Das innere Band des Rippenknorpels, *ligamentum colli costae internum* (Taf. 5; 1₂), entspringt von dem obern Rande des Rippenknorpels und steigt zum niedern Rande der Spitze des Stachelfortsatzes des nächst obern Wirbels in die Höhe.

3) Das äußere Band des Rippenknorpels, *ligamentum colli costae externum* (Taf. 5; 1₂), entspringt von der hintern Fläche des Rippenknorpels und setzt sich an die Wurzel des Querfortsatzes an den äußern und hintern Rand des Gelenkes des nächst höhern Wirbels.

4) Die hintern Zwischenrippenbänder, *ligamenta intercostalia posteriora* (Taf. 5; 2₂, 4₂), springen am hintern untern Rande, besonders der letzten Rippen, nach außen von dem Rippenknorpel und setzen sich an den obern Rand der darauffolgenden Rippe an.

5) Das Lenden-Rippenband, *ligamentum costale* (Taf. 5; 2₂, 4₂), entspringt vom untern Ende der letzten Rippe und setzt sich an den Querfortsatz des ersten und zweiten Lendenwirbels an.

c. Bänder am vordern Ende der Rippen.

Die Bänder am vordern Ende der Rippen sind die Rippenknorpelbänder, die die Rippenknorpel untereinander verbinden.

ta sterno-costalia (Taf. 5; 9, 10), sind drei, die Kapselbänder, die Strahlenbänder vordern Zwischenknorpelbänder.

Das Kapselband, *ligamentum capsulare*, verbindet die Rippenknorpel mit dem Brustbein; nur der erste Knorpel wächst ganz mit dem ersten Brustbein.

Das Strahlenband, *ligamentum sterno-costale* (Taf. 5; 9, 10), wird von sehnigen Streifen, die von den Enden der Knorpel der vordern als äußeres Strahlenband, *ligamentum costarum externum* (Taf. 5; 9), inneres Strahlenband, *ligamentum costarum internum* (Taf. 5; 10), dem es über die äußere oder innere Fläche aussteht, besteht, sich hier mit dem der andern kreuzend, zu dem nächst obern Rippenknorpel der Seite erstreckt.

Die vordern Zwischenrippenbänder, *ligamenta intercostalia anteriora* oder *corusculantia*, gehen vom Rippenknorpel derselben Seite zum andern über, so die Zwischenräume zwischen denselben.

III. Bänder des Brustbeins.

Ursprünglich in der Jugend nur durch Knorpel, werden drei Stücke des Brustbeins verknöchern in einem Ganzen. An Bändern finden sich die Membran des Brustbeins und das Querfortsatzband.

Die eigene Membran des Brustbeins, *membrana sterni propria* (Taf. 5; 9, 10), überzieht die vordere und hintere Seite des Brustbeins, als die eigene Membran, *membrana sterni propria anterior* (Taf. 5; 9), und als hintere eigene Membran, *membrana sterni propria posterior*, die hinteren Flächen mit den Strahlenbändern verbindet.

Das Schwertfortsatzband, *ligamentum pro-xiphoidei* oder *costo-xiphoideum* (Taf. 5; 9), besteht von der äußeren Fläche des Schwertfortsatzes als das Schwertfortsatzband, *ligamentum costoe-xiphoideum externum* (Taf. 5; 9), zur vordern Fläche des Brustkörpers und zum untern Rande des siebenten Knorpels, und als inneres Schwertfortsatzband, *ligamentum costoe-xiphoideum internum* (Taf. 5; 9), zur hinteren Fläche des Brustkörpers und zum ersten Rippenknorpel.

IV. Bänder am Becken.

Bänder am Becken dienen entweder zur Verbindung der Beckenknochen untereinander oder mit den Wirbeln und dem Kreuzbein, sowie zur Verbindung des Kreuzbeins mit dem Steißbein. Danach lassen sich folgende vier Gruppen von Bändern:

a. Bänder zur Verbindung der Beckenknochen untereinander.

Die Beckenknochen unter sich treten nur die Schambeine durch Bandmassen zusammen, und zwar durch den Knorpel der Schambeinfuge und durch das bogenförmige Band.

Die Schambeinfuge, *symphysis ossium pubis* (Taf. 5; 2 p), wird durch einen Fasernknorpel, der die beiden aneinanderstoßenden Flächen der Schambeine eingeschoben ist, gebildet. Derselbe hat denselben Bau, wie die Zwischenwirbelbänder.

In seinem weichen, gallertartigen Kern befindet sich eine kleine Höhle, während er außen von bindegewebigen Massen, dem Ringbande der Schambeine, *ligamentum annulare ossium pubis*, umgeben ist.

2) Das bogenförmige Band, *ligamentum arcuatum* (Taf. 5; 2, 4, 10), befindet sich unter der Schambeinfuge und greift nach oben den Schambeinbogen ab. Es geht von dem absteigenden Aste des einen Schambeins zu dem des andern.

b. Bänder zwischen dem Hüftbein und den Lendenwirbeln.

Die Verbindung der Hüftbeine mit den Lendenwirbeln geschieht auf beiden Seiten durch ein doppeltes starkes Band, das obere und untere Hüft-Lendenband.

1) Das obere Hüft-Lendenband, *ligamentum ileo-lumbale superius* (Taf. 5; 2, 4), entspringt von der innern Lippe des Rammes des Hüftbeins und setzt sich an die Spitze des Querfortsatzes des fünften Lendenwirbels an.

2) Das untere Hüft-Lendenband, *ligamentum ileo-lumbale inferius* (Taf. 5; 2, 4), liegt dicht unter dem vorigen und mehr nach der Wirbelsäule zu. Es entspringt von dem hintern Theile der innern Fläche des Hüftbeins und geht an den untern Rand des Querfortsatzes des fünften Lendenwirbels.

c. Bänder zur Verbindung der Beckenknochen mit dem Kreuzbein.

Die Verbindung der Beckenknochen mit dem Kreuzbein findet statt durch die Hüft-Kreuzbeinfuge, die seitlichen Bänder des Kreuzbeins, das hintere lange und kurze, sowie untere Hüft-Kreuzbeinband, ferner durch das Knorren-Kreuzbeinband und das Stachel-Kreuzbeinband.

1) Die Hüft-Kreuzbeinfuge, *symphysis sacro-iliaca*, wird gebildet durch die überknorpelten, ohrförmigen Verbindungsflächen des Darm- und Kreuzbeins.

2) Die seitlichen Bänder des Kreuzbeins, *ligamenta lateralia* oder *vaga postica ossis sacri* (Taf. 5; 4, 11), entspringen vom Hüftbeinhöcker und gehen zur hinteren Fläche des Kreuzbeins.

3) Das lange Hüftkreuzbeinband, *ligamentum ileo-sacrum longum* oder *pelvis longum posticum* (Taf. 5; 4), entspringt vom hintern obern Hüftbeinstachel und geht zum falschen Querfortsatz des vierten Kreuzbeinwirbels.

4) Das kurze Hüftkreuzbeinband, *ligamentum ileo-sacrum breve* oder *pelvis breve posticum* (Taf. 5; 2, 4), entspringt vom hintern obern und untern Hüftbeinstachel und geht zum falschen Querfortsatz des dritten Kreuzbeinwirbels.

5) Das untere Hüftkreuzbeinband, *ligamentum ileo-sacrum inferius* (Taf. 5; 2, 4, 10), entspringt unmittelbar unter dem vorigen von dem hintern untern Hüftbeinstachel und geht zum falschen Querfortsatz des dritten Kreuzbeinwirbels. Es hilft nach hinten und oben den großen Hüftbeinausschnitt begrenzen.

6) Das Knorren-Kreuzbeinband, *ligamentum tuberoso-sacrum* (Taf. 5; 4, 11), entspringt vom Sitzknorren und geht zum Rand des dritten bis fünften Kreuzbeinwirbels sowie des obersten Steißbeinwirbels.

7) Das Stachel-Kreuzbeinband, *ligamentum spinoso-sacrum* (Taf. 5; 2, 10, 4, 11), welches unmittel-

bar vor dem vorhergehenden liegt und sich mit demselben kreuzt, entspringt vom Sigbeinhaken und geht zum untern seitlichen Rand des Kreuzbeins.

d. Bänder zwischen Kreuz- und Steißbein.

Das Steißbein ist mit dem Kreuzbein durch die hintern langen und kurzen Steiß-Kreuzbeinbänder und durch die seitlichen Steiß-Kreuzbeinbänder verbunden.

1) Die hintern langen Steiß-Kreuzbeinbänder, *ligamenta sacro-coccygea postica longa* (Taf. 5; 4₁₂), entspringen vom obern Rande des Ausgangs des Kreuzbeinkanals, welchen sie verschließen, und gehen zur hintern Fläche des Steißbeins.

2) Die hintern kurzen Steiß-Kreuzbeinbänder, *ligamenta sacro-coccygea postica brevia*, liegen unter den vorigen und gehen von dem Kreuzbein zu den Steißbeinhörnern. Sie verknöchern oft und bilden dann eine feste Verbindung zwischen Kreuz- und Steißbein.

3) Die seitlichen oder vordern Steiß-Kreuzbeinbänder, *ligamenta sacro-coccygea lateralia* oder *antica* (Taf. 5; 2₁₁), entspringen vom untern Theile des Seitenrandes des Kreuzbeins und gehen zum obern Theile des Seitenrandes des Steißbeins.

e. Der Hüftlochverschluss.

Das Hüftloch wird durch eine starke Bindegewebshaut, das Verschiebungsbänder, *ligamentum obturatorium* (Taf. 5; 2₁₂, 4₁₅), bedeckt. Dasselbe schließt das Hüftloch bis auf eine kleine Oeffnung am obern äußern Rande zum Durchtritt von Nerven und Gefäßen.

C. Bänder an den Extremitäten.

1. Bänder an der obern Extremität.

Die Bänder der obern Extremität dienen entweder zur Befestigung der Schulterknochen oder zur Verbindung des Oberarms mit dem Schulterblatte, ferner zur Verbindung des Ober- und Vorderarms, des Vorderarms mit der Hand, der Mittelhandknochen und der Fingerringknochen.

1. Bänder der Schulter.

Wir haben hier drei Gruppen von Bändern, und zwar: Bänder am Brustende des Schlüsselbeins, Bänder zwischen Schlüsselbein und Schulterblatt, und eigene Bänder des Schulterblattes.

a. Bänder am Brustende des Schlüsselbeins.

Die Bänder am Brustende des Schlüsselbeins, *ligamenta sterno-claviculæ* (Taf. 5; 9₁₀), werden gebildet durch das innere Kapselband, das Zwischen Schlüsselbeinband und das rautenförmige Band.

1) Das innere Kapselband, *ligamentum capsulare internum claviculae* (Taf. 5; 9₂, 10₂), entspringt vom dem Brustbeinende des Schlüsselbeins und geht zum Rande des Schlüsselbeineinschnitts am Handgriff des Brustbeins und zum Knorpel der ersten Rippe. Durch einen Gelenknorpel wird die Kapsel in zwei Gelenkhöhlen getheilt.

2) Das Zwischen Schlüsselbeinband, *ligamentum interclaviculare* (Taf. 5; 9₁), geht von dem Brustbeinende des einen Schlüsselbeins zu dem des andern

und füllt so den obern concaven Rand des Schulterblattes aus.

3) Das rautenförmige Band, *ligamentum rhomboideum* oder *costo-claviculare* (Taf. 5; 11₁), entspringt vom untern Rande des Brustbeins Schlüsselbeins und geht zum obern Rande des Rippenknorpels.

b. Bänder zwischen Schlüsselbein und Schulterblatt.

Die Bänder zwischen Schlüsselbein und Schulterblatt, *ligamenta acromio-claviculæ*, werden gebildet von dem äußern Kapselband, dem Schlüssel-Schulterhöhenbänder und dem Schlüsselbein-Nabenschweifband.

1) Das äußere Kapselband, *ligamentum capsulare externum claviculae* (Taf. 5; 11₂), entspringt vom Rande der Gelenkfläche des Schlüsselbeins und geht zum Rande der entsprechenden Gelenkfläche des Schulterblattes.

2) Das Schlüsselbein-Schulterhöhenband, *ligamentum claviculo-acromiale* (Taf. 5; 11₃), ist eine Verstärkung des vorigen Bandes, an dem obern Rande der Schulterhöhe zur obern Schulterhöhenfläche des Schlüsselbeins.

3) Das Schlüsselbein-Nabenschweifband, *ligamentum coraco-claviculare* (Taf. 5; 12₁, 11₁), entspringt von der obern Fläche des Nabenschweiffortsatzes und geht zu dem am Schulterhöhenende des Schlüsselbeins. Es besteht in zwei Theile, einen vordern, das vordere Band, *ligamentum trapezoideum* (Taf. 5; 12₂), und einen hintern, das kegelförmige Band, *ligamentum conoideum* (Taf. 5; 11₂, 12₂).

c. Eigene Bänder des Schulterblattes.

Eigene Bänder des Schulterblattes sind das Nabenschweifband und das Querband der Schulter.

1) Das Nabenschweif-Schulterhöhenband, *ligamentum coraco-acromiale* oder *scapulae anticum* (Taf. 5; 11₄, 12₄), geht vom obern Rande des Nabenschweiffortsatzes zur obern Schulterhöhe.

2) Das Querband der Schulter, *ligamentum transversum scapulae proprium posticum* (Taf. 5; 12₃), geht von einem Rande des Schulterblattes zum andern und bildet so ein Loch zum Durchtritt von Nerven und Gefäßen.

2. Bänder zur Verbindung des Schulterblattes mit dem Schulterblatt.

Die Verbindung des Schulterblattes mit dem Schulterblatt, *articulatio humeri*, wird durch das Gelenk, *arthrodia*, hervorgebracht, weshalb das Gelenk nur ein Kapselband, *ligamentum capsulare humeri* (Taf. 5; 11₅), ein schlaffer Band, dessen Bewegung der Knochen kaum hindert, besitzt. Es heftet sich an den Rand der Gelenkgrube des Schulterblattes, sowie an den Hals des Oberarmknochens. Wird von der langen Sehne des Brustmuskels, *tendo capitis longi m. m. d.* (Taf. 5; 12₅), durchbohrt. Am die Gelenkgrube des Schulterblattes befindet sich ein knorpeliger Gelenkgrubenband des Schulterblattes, *ligamentum glenoideum scapulae* (Taf. 5; 12₆), die flache Gelenkgrube vertiefen hilft.

nder zur Verbindung des Ober- und Vorderarms.

Elbogengelenk, *articulatio cubiti* (Taf. 5; 1), ist eins der complicirtesten Gelenke, da drei, das untere Ende des Oberarmknochens und die Enden der beiden Vorderarmknochen, daran nehmen. Dadurch können im Elbogengelenke zwei voneinander unabhängige Bewegungen ausgeübt werden, und zwar Beugung und Streckung des Vorderarms, wozu das Elbogenbein dient, indem es mit dem Oberarmknochen ein Winkelgelenk, *genu*, bildet, vermittels dessen der Vorderarm in einer Ebene gegen den Oberarm gebeugt kann; und Drehung, *rotatio*, der Speiche der beliebigen Winkelstellung des Vorderarms überarm, um eine Achse, welche man sich durch den Mittelpunkt der kugelförmigen Erhabenheit des Gelenkfortsatzes des Oberarms, das Köpfchen der Speiche, den Griffelfortsatz des Elbogenbeins gezogen muß. Diese letztgenannte Bewegung heißt, sie nach innen geschieht, Vorwärtsdrehung, *supinatio*, und wenn sie wieder in die ursprüngliche Stellung zurück geschieht, Rückwärtsdrehung, *pronatio*. Änderungen am Vorderarm dienen entweder zur Verbindung mit dem Oberarm, oder zwischen Speiche und Elbogenbein.

Bänder zwischen Ober- und Unterarm.

Bänder, welche den Ober- mit dem Unterarm verbinden, werden dargestellt durch das Kapselband des Elbogens und durch das äußere und innere Seitenband des Elbogens.

Das Kapselband des Elbogens, *ligamentum capsulare cubiti* (Taf. 5; 13, 14), entspringt vom Oberarmknochen noch über dem Elbogenfortsatz, der durch dasselbe umschlossen wird, und setzt sich in den Elbogengelenkfortsatz, die große halbmondförmige Grube und den Kronenfortsatz des Elbogenbeins, sowie das Ringband der Speiche.

Das äußere Seitenband des Elbogens, *ligamentum laterale cubiti externum* (Taf. 5; 13, 14), hängt vom äußeren Gelenkfortsatz des Oberarmknochens und setzt sich an den äußeren Umfang des Handes der Speiche.

Das innere Seitenband des Elbogens, *ligamentum laterale cubiti internum* (Taf. 5; 13), vom innern Gelenkfortsatz des Oberarmknochens zum innern Theil des innern Randes der großen halbmondförmigen Grube des Elbogenbeins.

Bänder zwischen Speiche und Elbogenbein.

Zwischen Speiche und Elbogenbein finden sich am unteren Ende und am Körper drei Bänder, am unteren Ende aber nur zwei.

Bänder am obern Ende und am Körper zwischen Speiche und Elbogenbein.

Das ist das Ringband der Speiche, das Seitenband und das Zwischenknochenband.

Das Ringband der Speiche, *ligamentum anulare radii* (Taf. 5; 13, 14), geht von dem vordern Ende der kleinen halbmondförmigen Grube des Elbogenbeins zum Köpfchen der Speiche herum zum obern Ende derselben Grube und hängt mit dem Seitenbande und dem äußern Seitenbande des Elbogengelenks zusammen.

Das runde Band, *ligamentum teres* oder

chorda transversalis cubiti (Taf. 5; 13, 14), geht von dem Köpfchen der Speiche zum Kronenfortsatz des Elbogenbeins. Es hindert eine allzu starke Rückwärtsdrehung des Unterarms.

3) Das Zwischenknochenband des Unterarms, *ligamentum interosseum ulnibrachii* (Taf. 5; 13, 14, 15, 16), verbindet als breite Membran die einander zugekehrten scharfen Ränder der Speiche und des Elbogenbeins.

β. Bänder am untern Ende der Speiche und des Elbogenbeins.

Dieselben werden gebildet von dem sackförmigen Kapselbande und dem dreieckigen Zwischenknorpel.

1) Das sackförmige Kapselband, *ligamentum capsulare sacciforme* oder *membrana sacciformis*, liegt über dem Kapselband des Handgelenks und geht vom halbmondförmigen Einschnitt der Speiche zum Köpfchen des Elbogenbeins.

2) Der dreieckige Zwischenknorpel, *cartilago triangularis intermedia*, ist eine Fortsetzung der dem Handgelenk zugekehrten Gelenkfläche, der Speiche, und geht über das Köpfchen des Elbogenbeins zum Griffelfortsatz desselben.

4) Bänder zur Verbindung des Vorderarms mit der Hand.

Das Handgelenk, *articulatio manus* (Taf. 5; 15e, 16e), wird aus den Gelenkflächen der untern Enden des Vorderarmknochens, sowie aus den Gelenkverbindungen der Handwurzelknochen untereinander gebildet. Die Hand ist nur mit der Speiche fest verbunden, und bilden dieselben zusammen ein beschränktes freies Gelenk, das Beugung und Streckung, Anziehung, *adductio*, und Abziehung, *abductio*, gestattet. Mit der Speiche zusammen kann auch die Hand vor- und rückwärts gedreht werden. Zwischen den einzelnen Handwurzelknochen findet nur eine sehr beschränkte Beugung und Streckung statt.

Zwischen der Speiche und dem dreieckigen Zwischenknorpel einerseits und der ersten Handwurzelreihe andererseits, befindet sich ein schlaffer Gelenkband, *ligamentum capsulare carpi et ulnibrachii*, der durch zahlreiche Hülsbänder sowohl an der Rücken- und Hohlhandseite, wie an der Radial- und Ulnarseite verstärkt wird.

Eben solche Kapsel- und Hülsbänder finden sich in großer Zahl (Taf. 5; 15, 16) sowohl an der Dorsal- wie Volarfläche der Hand, zwischen den beiden Handwurzelreihen sowohl, wie auch zwischen den einzelnen Handwurzelknochen. Sie werden nach den Knochen, an denen sie sich anheften, benannt, sodaß durch den Namen schon ihre Lage kenntlich wird. Sie dienen dazu, um der Hand eine bedeutende Festigkeit zu geben. Die Gelenke, welche sie überziehen, sind sämmtlich straffe Gelenke, *amphiarthroses*, die im einzelnen nur eine geringe Beweglichkeit gestatten, zusammen combinirt aber eine ausgiebigere Bewegung zulassen.

5. Verbindung der Mittelhandknochen.

Der erste Mittelhandknochen bildet mit dem großen vielsinkeligen Knochen ein freies Gelenk, während die übrigen Mittelhandknochen unter sich und mit der zweiten Reihe der Handwurzelknochen Amphiarthrosen bilden. Ein Kapselband befindet sich sowohl zwischen dem ersten Mittelhandknochen und dem großen vielsinkeligen Knochen, sowie zwischen den übrigen Mittelhandknochen und der

zweiten Reihe der Handwurzelknochen. Diese Kapselbänder werden durch zahlreiche Hilfsbänder, *ligamenta ossium carpi et metacarpi volaria* (Taf. 5; 15₁), und *dorsalia* (Taf. 5; 16₁), verstärkt.

Besonders erwähnen wollen wir nur die eigenen Bänder an den obern Enden der Mittelhandknochen, *ligamenta baseos ossium metacarpi* (Taf. 5; 15₂, 16₂), welche von der Basis des einen Mittelhandknochens zu der des andern gehen und nur zwischen dem ersten und zweiten Mittelhandknochen fehlen. Sie finden sich an der Rücken- wie Hohlhandseite der Basis als *ligamenta baseos ossium metacarpi volaria* (Taf. 5; 15₂) und *dorsalia* (Taf. 5; 16₂).

Ebenso finden sich am untern Ende der Mittelhandknochen drei Bänder, die jedoch nur auf der Volarfläche von einem Köpfchen des Mittelhandknochens zum andern gehen, ausgenommen vom Köpfchen des ersten zum zweiten Mittelhandknochen. Es sind dies die Bänder der Köpfchen der Mittelhandknochen, *ligamenta capitulorum ossium metacarpi* (Taf. 5; 15₃).

6. Verbindung der Fingerringknochen.

Alle Finger mit Ausnahme des Daumens sind mit ihrem ersten Gliede an das entsprechende Köpfchen des Mittelhandknochens durch ein freies Gelenk gebunden, nur bei dem Daumen ist an dieser Stelle ein Winkelgelenk vorhanden, ebenso zwischen den einzelnen Gliedern der Finger. Zwischen jedem Mittelhandknochen-Fingergliedergelenke, *articulatio metacarpophalangea*, sowie zwischen jedem Fingergliedergelenke, *articulatio interphalangea*, findet sich ein Kapselband, *ligamentum capsulare*, sowie ein äußeres Seitenband, *ligamentum laterale digitorum externum* (Taf. 5; 15₄, 16₄), am Abialrande der Finger, und ein inneres Seitenband, *ligamentum laterale digitorum internum* (Taf. 5; 15₅, 16₅), am Ulnarrande der Finger.

II. Bänder an der untern Extremität.

Die Bänder an der untern Extremität dienen entweder zur Verbindung des Oberschenkels mit dem Becken, oder zur Verbindung des Oberschenkels mit dem Unterschenkel, ferner zur Verbindung der Unterschenkelknochen, des Unterschenkels mit dem Fuße, der Fußwurzelknochen, der Mittelfußknochen und der Zehenknochen.

1. Bänder zur Verbindung des Oberschenkelknochens mit dem Becken.

Das Hüftgelenk, *articulatio coxae*, ein sogenanntes Kugelgelenk, *enarthrosis*, wird aus der Pfanne des Beckens und dem Gelenkkopfe des Oberschenkelknochens mit dem dazu gehörenden Bandapparate gebildet. Derselbe besteht in dem Kapselbande des Oberschenkelknochens, *ligamentum capsulare femoris* (Taf. 5; 21₁, 41₁), welches vom Pfannenrande zum Halse des Oberschenkelknochens geht. Außerdem wird der Rand der Pfanne innerhalb der Kapsel von einem knorpeligen Ringe, die Knorpelkappe der Pfanne, *lathrum cartilagineum acetabuli*, umgeben. Mehrere Hilfsbänder verstärken das Kapselband. In der Gelenkhöhle selber befindet sich das runde Schenkelband, *ligamentum teres femoris*, welches, von der Synovialhaut des Gelenks überzogen, von der Grube für das runde Band des Schenkelkopfs herab zur Pfannengrube steigt.

2. Bänder zur Verbindung des Oberschenkels mit dem Unterschenkel.

Im Kniegelenke, *articulatio genu*, tritt das Schienbein gegen den Oberschenkelknochen, werden, dann aber kann bei gebogenem Knie noch eine geringe Drehung des Schienbeins in Längsachse stattfinden. Die Bänder des Kniees sind das Kniekehlenband, das vordere Kreuzband, das Kniekehlenband, das innere und äußere Seitenband und das hintere Kreuzband.

1) Das Kniekehlenband, *ligamentum patellae* (Taf. 5; 17₁), ist die Fortsetzung der Sehne des musculus rectus femoris, welche am Schienbein als mittleres Kniekehlenband, *ligamentum patellae medium* (Taf. 5; 17₁), von der Kniekehle des Schienbeins, während sich zwei Flügel als inneres und äußeres Kniekehlenband, *ligamentum patellae internum* und *externum* (Taf. 5; 17₂), an den innern und äußern Gelenkfortsätzen des Schienbeins ansetzen.

2) Das Kapselband des Kniees, *ligamentum capsulare genu* (Taf. 5; 17₃), umgibt das Kniegelenk, an den Umfang der Gelenkfläche des Schienbeins nach vorn die Kniekehle vor sich habend. In der Kapsel befinden sich die halbmondförmigen Knorpel und die beiden Kreuzbänder.

3) Das Kniekehlenband, *ligamentum patellae*, ist eine Verstärkung des Kapselbandes und umschließt die äußern Gelenkfortsätze des Oberschenkelknochens über die Kniekehle weg zum innern Rande des Schienbeins, unmittelbar unter dem innern Gelenkfortsatze desselben.

4) Das innere seitliche Band des Kniees, *ligamentum laterale genu internum* (Taf. 5; 18₁, 19₁), geht vom innern Gelenkfortsatze des Oberschenkelknochens zum innern Gelenkfortsatze des Schienbeins.

5) Das äußere seitliche Band des Kniees, *ligamentum laterale genu externum*, geht vom äußern Gelenkfortsatze des Oberschenkelknochens zum äußern Gelenkfortsatze des Schienbeins.

6) Das vordere Kreuzband des Kniees, *ligamentum cruciatum genu anticum* (Taf. 5; 18₂, 19₂), geht von der innern Fläche des äußern Gelenkfortsatzes des Oberschenkelknochens etwas nach unten und unten zu der Grube vor der Erhabenheit des Schienbeins zwischen den Gelenkfortsätzen des Schienbeins.

7) Das hintere Kreuzband des Kniees, *ligamentum cruciatum genu posticum* (Taf. 5; 18₃, 19₃), geht von der gegen die Kniekehle gewendeten Seite des innern Gelenkfortsatzes des Oberschenkelknochens in die Grube hinter der Erhabenheit zwischen den Gelenkfortsätzen des Schienbeins.

Nach sind zu erwähnen die halbmondförmigen oder Zwischengelenkknorpel, *cartilagineae lunares* oder *interarticulars* (Taf. 5; 18₄, 19₄), welche zwischen den Gelenkfortsätzen des Oberschenkelknochens und des Schienbeins liegen. Sie sind halbmondförmig, mit ihrer offenen Seite der Gelenkhöhle zwischen den Gelenkfortsätzen des Schienbeins zu. Man unterscheidet einen äußern halbmondförmigen Gelenkknorpel, *cartilago semilunaris externa* (Taf. 5; 18₄, 19₄), und einen innern, *cartilago semilunaris interna* (Taf. 5; 18₅, 19₅).

3. Bänder zur Verbindung der Unterschenkelknochen.

Man unterscheidet am Unterschenkel

Ende, zwischen den Körpern und am Ende.

nder am obern Ende des Unterschenkelknochens.

ist nur das Kapselband des Wadenbeins, *ligamentum capsulare capituli fibulae* (Taf. 5; 18_a, 19_a), nen. Dasselbe geht vom Köpfchen des Wadenbeins zu der für dasselbe bestimmten Gelenkfläche am Gelenkfortsatz des Schienbeins.

nder zwischen den Körpern der Unterschenkelknochen.

haben wir das Zwischenknochenband des Unterschenkelknochens, *ligamentum interosseum cruris* (Taf. 5; 18_a, 19_a, 22_a). Dasselbe füllt den Zwischenraum zwischen Schienbein und Wadenbein aus und tritt an seinem obern Ende eine größere Lücke durch.

nder am untern Ende der Unterschenkelknochen.

selben verbinden als vordere und hintere Kapselbänder, *ligamenta tibio-fibularia antica* und *postica* (Taf. 5; 22), die untern Enden des Schienbeins.

nder des Fußes mit dem Unterschenkel.

er Fuß tritt mit dem Unterschenkel nur durch das Sprunggelenk in Verbindung und bildet mit dem Schienbein das Sprunggelenk, *articulatio talocalcanea*. Der Fuß kann gebeugt und gestreckt, auswärts und einwärts bewegt, sowie um seine Längsachse gedreht werden, an welchen Bewegungen auch die Gelenkflächen der einzelnen Fußwurzelknochen theilnehmen, welche das Fußgelenk, *articulatio pedis*, bilden. Das Sprunggelenk ist durch ein Kapselband dem Unterschenkel verbunden, das durch mehrere Kapselbänder verstärkt wird.

Bänder zur Verbindung der Fußwurzelknochen.

Die Fußwurzelknochen sind untereinander durch sehr viele Bänder verbunden, sodaß zwischen allen nur feine Gelenke vorhanden sind. Diefelben werden theils durch kurze, straffe Kapselbänder, *ligamenta capsularia tarsi propria*, welche entweder zwei oder mehrere Fußwurzelknochen verbinden. Diese Bänder werden durch kurze starke Hülsbänder verstärkt, die auf dem Fußrücken der Fußsohle und Seitenflächen des Fußes von einem Fußwurzelknochen zum andern gehen. Dadurch erhält man eigene Leistenbänder der Fußwurzel, *ligamenta tarsi propria dorsalia* (Taf. 5; 22_a), eigene Bänder der Fußsohle, *ligamenta tarsi propria plantaria* (Taf. 5; 20_a), und eigene Seitenbänder der Fußwurzel, *ligamenta tarsi propria lateralia* (Taf. 5; 21_a), die theils aus einer großen Zahl kleiner Bänder, welche Fußwurzelknochen zu Fußwurzelknochen gehen, bestehen und nach diesen auch benannt werden.

Bänder zur Verbindung der Mittelfußknochen.

Die Mittelfußknochen sind sowohl untereinander wie mit den Fußwurzelknochen durch straffe Gelenke verbunden. Man hat dreierlei Bänder am Mittelfußknochen, und zwar solche, welche die Mittelfußknochen mit den Fußwurzelknochen verbinden,

ferner solche zwischen den hintern Enden und solche zwischen den vordern Enden der Mittelfußknochen.

a. Bänder zwischen Fußwurzel und Mittelfußknochen.

Wir haben hier zunächst die Kapselbänder, sowie die Hülsbänder am Fußrücken, an der Fußsohle und an den Seiten des Fußes.

1) Die Kapselbänder, *ligamenta capsularia*, sind der Zahl nach drei und verbinden das erste Keilbein mit dem ersten Mittelfußknochen, das zweite und dritte Keilbein mit dem zweiten und dritten Mittelfußknochen, und das Viereckbein mit dem vierten und fünften Mittelfußknochen.

2) Die Hülsbänder, *ligamenta accessoria tarsi et metatarsi*, geben:

α. als Rückenbänder, *ligamenta accessoria dorsalia* (Taf. 5; 22_a), von dem Rücken der Fußwurzelknochen zum Rücken der entsprechenden Mittelfußknochen,

β. als Sohlenbänder, *ligamenta accessoria plantaria* (Taf. 5; 20_a), von der Sohle der Fußwurzelknochen zur Sohle der entsprechenden Mittelfußknochen,

γ. als Seitenbänder, *ligamenta accessoria lateralia* (Taf. 5; 21_a), von der Seite der Fußwurzelknochen zur entsprechenden Seite der Mittelfußknochen.

b. Bänder zwischen den hintern Enden der Mittelfußknochen.

Es sind dies die Basalbänder der Mittelfußknochen, *ligamenta bases metatarsi* (Taf. 5; 20_a, 22_a), und zwar vier Rückenbänder, *ligamenta dorsalia* (Taf. 5; 22_a), zwischen je zwei Mittelfußknochen eines, drei Sohlenbänder, *ligamenta plantaria* (Taf. 5; 20_a), nur zwischen den vier letzten Mittelfußknochen, und vier Zwischenmittelfußknochenbänder, *ligamenta intermetatarsia*, welche in den zwischen den Basen der Mittelfußknochen befindlichen Zwischenräumen liegen.

c. Bänder zwischen den vordern Enden der Mittelfußknochen.

Hier sind nur zu erwähnen die vier Bänder der Köpfe der Mittelfußknochen, *ligamenta capitulorum ossium metatarsi* (Taf. 5; 20_a), welche an der Fußsohle der Mittelfußknochen von einem Köpfchen zum andern gehen.

7. Bänder zur Verbindung der Zehenglieder.

Das untere Ende der ersten Zehenglieder verbindet sich mit dem Köpfchen des entsprechenden Mittelfußknochens durch ein freies Gelenk, *arthrodia*, während die einzelnen Zehenglieder unter sich durch Winkelgelenke verbunden sind. An sämtlichen Zehengelenken befinden sich Kapselbänder, *ligamenta capsularia*, die an der Fußsohle knorpelartig verästelt und rinnenartig ausgehöhlt sind (Taf. 5; 20_a), worin die Sehnen der Beugemuskel des Fußes liegen, die von den Kreuzbändern *ligamenta cruciata* (Taf. 5; 20_a), umschlossen und so an die Zehen angebrannt werden. In der verdichteten Kapselwand am ersten Gelenke der großen Zehe liegen auch zwei Sesambeine, zwischen welchen das Zwischenesambeinband, *ligamentum interesamoidium* (Taf. 5; 20_a), liegt.

Außerdem sind auch noch die einzelnen Zehen durch starke seitliche Hülsbänder, *ligamenta lateralia*

(Taf. 5; 20, u. 7, 21, 22), miteinander verbunden, und zwar am Großhebenrande einer jeden Zehe durch die innern Seitenbänder, *ligamenta lateralia interna* (Taf. 5; 20, 21), und am Kleingebenrande durch die äußern Seitenbänder, *ligamenta lateralia externa* (Taf. 5; 20, 22).

Topographische Anatomie.

Nachdem wir in den bisherigen Tafeln das Gerüst des menschlichen Körpers sowohl als Ganzes wie in seinen Theilen vorgeführt haben, bringen wir auf den folgenden Tafeln die Muskeln, Gefäße, Nerven und übrigen Organe des Körpers in ihrer topographischen Anordnung, ohne dabei in alle Einzelheiten eingehen zu können, da eine systematische Durchführung theils zu viel Raum in Anspruch nehmen, theils aber auch den Zweck dieser Tafeln, den Laien in der Anatomie über den menschlichen Körper und dessen Bau zu unterrichten, nicht erfüllen würde. Wir geben daher nur das Wichtigste, wenn auch dabei manche Lücken bleiben werden, die der Mann von Fach ausfüllen muß.

Tafel 6.

Diese Tafel, die erste topographische, bringt den Kopf und Hals in verschiedenen Ansichten zur Darstellung, wir sehen denselben sowohl nach Entfernung der Haut, wie der obersten Muskelschicht, als auch im Durchschnitt durch die Mittellinie, so daß man sich von den Hauptverhältnissen eine Vorstellung machen kann.

Figur 1. Kopf und Hals nach Entfernung der Haut.

- A. Cranium mit galea aponeurotica, Schädeldach mit der Sehnenhaube.
- B. Arcus zygomaticus, Zochbogen.
- C. Acromion, Schulterhöhe.
- D. Tragus auriculæ, vordere Ohrklappe oder Ohrede.
- E. Antitragus, hintere Ohrklappe oder Gegenede.
- F. Lobulus auriculæ cum folliculis sebaceis, Ohrfläppchen mit Talgdrüsen.

1. Musculus frontalis und occipitalis, Stirn- und Hinterhauptsmuskel.
2. Musculus orbicularis palpebrarum, Schließmuskel der Augenlider.
3. Musculus attollens auriculæ, Hebe- und Streckmuskel des Ohres.
4. Musculus retrahens auriculæ, Zurückziehmuskel des Ohres.
5. Musculus compressor nasi, Zusammenbrückmuskel der Nase.
6. Musculus procerus nasi Santorini, der lange Nasenmuskel des Santorini.
7. Musculus levator labii superioris alaeque nasi, Aufhebmuskel der Oberlippe und des Nasenflügels.
8. Musculus zygomaticus minor, kleiner Zochmuskel.
9. Musculus zygomaticus major, großer Zochmuskel.
10. Musculus levator labii superioris proprius, eigenerheber der Oberlippe.
11. Musculus orbicularis oris, Schließmuskel des Mundes.
12. Musculus depressor anguli oris, Herabzieher des Mundwinkels.
13. Musculus depressor labii inferioris, Niederzieher der Unterlippe.
14. Musculus risorius Santorini, Lachmuskel des Santorini.
15. Musculus masseter, Kaumuskel.

16. Musculus buccinator, Trompetenmuskel.
17. Musculus platysma myoides, breiter Halsmuskel.
18. Musculus sternocleidomastoideus, Brust- und Halsmuskel.
19. Musculus cucullaris, Kappenmuskel.
20. Musculus splenius capitis, Nackenmuskel des Kopfes.

21. Musculus splenius colli, Nackenmuskel des Halses.
22. Musculus levator anguli scapulae, Aufhebmuskel.

23. Musculi scaleni, Rippenhalter.
24. Musculus pectoralis major, großer Brustmuskel.
25. Musculus deltoideus, Deltamuskel.
26. Aponeurosis temporalis, Sehnenband des Kopfes.

- I. Glandula parotis, Ohrspeicheldrüse.
- II. Ductus Stenonianus, Ausführungsgang der Ohrspeicheldrüse.
- a. Arteria carotis externa, äußere Arterie des Halses.
- b. Arteriae coronariae labiorum, Krone der Lippen.
- c. Arteria angularis, Winkelarterie.
- d. Arteria occipitalis, Hinterhauptarterie.
- e. Arteria auricularis posterior, hintere Ohrarterie.
- f. Arteria temporalis, Schläfenarterie.
- g. Arteria transversa faciei, quere Gesichtarterie.
- h. Ramus frontalis arteriae temporalis, Frontalarterie der Schläfenarterie.

- i. Ramus occipitalis arteriae temporalis, Hinterhauptarterie der Schläfenarterie.
- k. Arteria frontalis ex ophthalmica, Frontalarterie aus der Augenslagader.

- l. Vena facialis anterior, vordere Gesichtarterie.
- m. Vena facialis posterior, hintere Gesichtarterie.
- n. Vena temporalis superficialis, oberflächliche Schläfenblutader.

- o. Vena temporalis profunda, tiefe Schläfenblutader.
- p. Vena cephalica, Speichenhautblutader.
- q. Vena jugularis externa, äußere Halsblutader.
- r. Ramus occipitalis venae jugularis externae, Hinterhauptarterie der äußeren Halsblutader.

- z. Nervus supraorbitalis, Oberaugenblutader.
3. Nervi subcutanei maxillares, Wangenblutaden.
- γ. Nervus infraorbitalis, Unteraugenblutader.
- δ. Nervus mentalis, Kinnnerv.

- e. Nervus accessorius Willisii, Glinernerv.
- ζ. Nervus occipitalis major, größerer Hinterhauptnerv.
- η. Nervus occipitalis minor, kleinerer Hinterhauptnerv.

5. Nervus auricularis magnus, großer Ohrnerv.
- ι. Nervi supraclaviculares, Oberarmblutaden.

Figur 2. Kopf und Hals nach Entfernung der Hautblutaden, des breiten Halsmuskels und des Kappenmuskels.

- A. Cranium mit der galea aponeurotica, Schädel mit der Sehnenhaube.
- B. Arcus zygomaticus, Zochbogen.
- C. Maxillae inferioris ramus horizontalis, unterer Kiefer.
- D. Os hyoideum, Zungenbein.
- E. Clavicula, Schlüsselbein.
- F. Acromion, Schulterhöhe.
- G. Spina scapulae, Schultergräte.
- H. Processus coracoideus, Rabenschnabelfortsatz.

- I. Caput humeri, Kopf des Oberarmknochens.
- K. Ligamentum claviculo-acromiale, Schlüsselbeinband.
- L. Ligamentum coraco-claviculare, Rabenschnabelfortsatz-Schüsselbeinband.

amentum coraco-acromiale, Rabenschweif-
fortsatz = Schulterhöhenband.
sculus frontalis, Stirnmuskel.
sculus occipitalis, Hinterhauptsmuskel.
sculus orbicularis oculi, Schließmuskel der
Augenlider.
sculus attollens auriculae, Hebemuskel des
Ohres.
sculus retrahens auriculae, Zurückziehmuskel
des Ohres.
sculus compressor nasi, Zusammenbrück-
muskel der Nase.
sculus procerus nasi Santorini, der lange
Nasenmuskel des Santorini.
sculus levator labii superioris alaeque nasi,
Aufhebmuskel der Oberlippe und des Nasen-
flügels.
sculus zygomaticus minor, kleiner Zoch-
muskel.
sculus zygomaticus major, großer Zochmuskel.
sculus levator labii superioris proprius, eigener
Hebemuskel der Oberlippe.
sculus orbicularis oris, Schließmuskel des
Mundes.
sculus depressor anguli oris, Herabziehe-
muskel des Mundwinkels.
sculus depressor labii inferioris, Herabziehe-
muskel der Unterlippe.
sculus masseter, Kaumuskel.
sculus buccinator, Trompetermuskel.
sculus sternocleido-mastoidens, Kopfnicker.
sculus biventer cervicis, zweibäuchiger Rachen-
muskel.
sculus splenius capitis, Bauschmuskel des
Kopfes.
sculus splenius colli, Bauschmuskel des Halses.
sculus levator scapulae, Schulterblattheber-
muskel.
sculus rhomboideus minor, kleiner rauten-
förmiger Muskel.
sculi scaleni, Rippenhalter.
sculus omohyoideus, Schulter-Zungenbein-
muskel.
sculus sterno-hyoideus, Brust- und Zungen-
beinmuskel.
sculus hyothyreoideus, Zungenbein-Schild-
knorpel.
sculus digastricus, zweibäuchiger Untertiefer-
muskel.
sculus mylohyoideus, Untertiefer-Zungenbein-
muskel.
sculus pectoralis major, großer Brustmuskel.
sculus pectoralis minor, kleiner Brustmuskel.
sculus infraspinatus, Untergrätenmuskel.
sculus biceps brachii, tendo capitis longi,
zweibäuchiger Armmuskel, Sehne des langen
Kopfes.
Mandula submaxillaris, Untertieferdrüse.
arteria carotis externa, äußere Kopfpulsader.
arteria carotis interna, innere Kopfpulsader.
arteria thyroidea superior, obere Schilddrüsen-
pulsader.
arteria lingualis, Zungenpulsader.
arteria maxillaris externa, äußere Kieferpulsader.
ramus submentalialis arteriae maxillaris externae,
Untertinnast der äußern Kieferpulsader.
arteria coronaria labiorum, Kranzpulsader der
Lippen.
arteria nasalis lateralis, Winkels- oder Seiten-
pulsader der Nase.

- i. Arteria occipitalis, Hinterhauptspulsader.
- k. Arteria auricularis posterior, hintere Ohrpulsader.
- l. Arteria temporalis, Schläfenpulsader.
- m. Arteria transversa faciei, quere Antlitzpulsader.
- n. Ramus frontalis arteriae temporalis, Stirnast
der Schläfenpulsader.
- o. Ramus occipitalis arteriae temporalis, Hinter-
hauptast der Schläfenpulsader.
- p. Arteria maxillaris interna, innere Kieferpulsader.
- q. Arteria frontalis ex arteria ophthalmica, Stirn-
pulsader aus der Augenpulsader.
- r. Arteria transversa scapulae, quere Pulsader des
Schulterblattes.
- s. Arteria cervicalis superficialis, oberflächliche Hals-
pulsader.
- t. Arteria subclavia sinistra, linke Unterhals-
beinpulsader.
- u. Vena subclavia sinistra, linke Unterhals-
beinblutader.
- α. Nervus supraorbitalis, Oberaugenhöhlennerv.
- β. Nervus supratrochlearis, Oberrollnerv.
- γ. Nervus infraorbitalis, Unteraugenhöhlennerv.
- δ. Nervus temporalis subcutaneus, Unterhautnerv
der Schläfe.
- ε. Nervus mentalis, Kinnnerv.
- ζ. Nervus facialis, Gesichtsnerv.
- η. Nervus auricularis posterior, hinterer Ohrnerv.
- θ. Pes anserinus, Gänsefuß.
- ι. Nervi temporales nervi facialis, Schläfenerven
des Gesichtsnerven.
- κ. Nervi zygomatici nervi facialis, Zochbogenerven
des Gesichtsnerven.
- λ. Nervus accessorius Willisii, Weinnerv.
- μ. Nervus hypoglossus, Uebergangsnerv.
- ν. Nervus occipitalis major, großer Hinterhauptsnerv.
- ξ. Nervus occipitalis minor, kleiner Hinterhauptsnerv.
- π. Plexus brachialis, Armgeflecht.

Figur 3. Kopf und Hals im Durchschnitt durch
die Mittellinie.

- A. Os frontis, Stirn.
- B. Os sphenoidum, Keilbein.
- C. Processus pterygoideus, Flügelfortsatz.
- D. Foramen ovale, ovales Loch.
- E. Foramen rotundum, rundes Loch.
- F. Foramen condyloideum anterius ossis occipitis,
vorderes Gelenkfortsatzloch des Hinterhaupts-
beins.
- G. Os parietale, Scheitelbein.
- H. Os nasi, Nasenbein.
- I. Processus nasalis maxillae superioris, Nasen-
fortsatz des Oberkieferbeins.
- K. Antrum Highmori, Highmorchöhle.
- L. Processus alveolaris maxillae superioris, Zahn-
höhlenfortsatz des Oberkiefers.
- M. Maxilla inferior, Untertiefer.
- N. Os hyoideum, Zungenbein.
- O. Processus spinosus atlantis, Dornfortsatz des
Trägers.
- P. Arcus anterior atlantis, vorderer Bogen des
Trägers.
- Q. Processus spinosus epistrophei, Dornfortsatz
des Umdrehers.
- R. Processus odontoides epistrophei, Zahnfortsatz
des Umdrehers.
- S. Vertebra tertia colli, dritter Halswirbel.
- T. Vertebra septima colli, siebenter Halswirbel.
- U. Vertebra prima dorsi, erster Brustwirbel.
- V. Manubrium sterni, Handgriff des Brustbeins.
- W. Septum narium, Scheidewand der Nase.

- X. Epiglottis, Kehlkopf.
- Y. Cartilago thyroidea, Schilddrüse.
- Z. Cartilaginee annulares tracheae, Ringknorpel der Luftröhre.
1. Cartilago intervertebralis, Zwischenwirbelband.
2. Ligamentum longitudinale anterius, vorderes Längsband.
3. Dura mater cerebri, harte Hirnhaut.
4. Dura mater medullae spinalis, harte Rückenmarkshaut.
5. Ligamentum hyo-thyroideum, Zungenbein-Schilddrüsensband.
6. Ligamentum hyo-epiglotticum, Zungenbein-Kehlkopfband.
7. Ligamenta glottidis, Stimmritzenbänder.
8. Bulbus, Augapfel.
9. Palpebrae oculi, Augenlider.
10. Lingua, Zunge.
11. Frenulum linguae, Zungenbändchen.
12. Tonsilla dextra, rechte Mandel.
13. Uvula, Zäpfchen.
14. Palatum mobile, beweglicher Gaumen.
15. Arcus glosso-palatinus, Zungen-Gaumenbogen.
16. Arcus pharyngo-palatinus, Schlund-Gaumenbogen.
17. Apertura tubae Eustachii, Oeffnung der Eustachischen Trompete.
18. Isthmus faucium, Rachenenge.
19. Oesophagus, Speiseröhre.
20. Glandula thyroidea, Schilddrüse.
21. Tela cellulosa inter oesophagum et columnam vertebrae, Zellgewebsschicht zwischen der Speiseröhre und der Wirbelsäule.
22. Levator palpebrae superioris, Aufhebemuskel des obern Augenlides.
23. Musculus obliquus oculi inferior, unterer schiefer Augenmuskel.
24. Musculus mylohyoideus, Kiefer-Zungenbeinmuskel.
25. Musculus geniohyoideus, Kinn-Zungenbeinmuskel.
26. Musculus genioglossus, Kinn-Zungenmuskel.
27. Musculi anteriores colli lateris dextri, vordere Muskeln der rechten Seite des Halses.
28. Musculi nuchae, Nackenmuskeln.
 - a. Arcus aortae, Bogen der großen Körperpulsader.
 - b. Arteria innominata, ungenannte Pulsader.
 - c. Arteria carotis interna, innere Kopfpulsader.
 - d. Arteria basilaris, Basispulsader.
 - e. Arteria ophthalmica, Augenpulsader.
 - f. Arteria corporis callosi, Ballenpulsader.
 - g. Vena cava superior, obere Halsvene.
 - h. Venae jugulares communes, gemeinschaftliche Halsblutadern.
 - i. Sinus transversus, Querblutleiter.
 - k. Torcula Herophili, Pforten des Herophilus.
 - l. Sinus longitudinalis superior, oberer Längsblutleiter.
 - m. Sinus longitudinalis inferior und sinus quartus, unterer Längsblutleiter und Zeltblutleiter.
- a. Nervus opticus, Sehnerv.
- ß. Nervus oculomotorius, ramus inferior, gemeinschaftlicher Augenmuskelnerve, unterer Ast.
- γ. Nervus trochlearis, Rollmuskelnerve.
- δ. Nervus trigeminus, dreigetheilter Nerv.
- e. Nervus ophthalmicus, ramus primus nervi trigemini, Augenhöhlennerv, erster Ast des dreigetheilten Nerven.
- e'. Nervus maxillaris superior, ramus secundus nervi trigemini, Oberkiefernerv, zweiter Ast des dreigetheilten Nerven.

- e". Nervus maxillaris inferior, ramus tertius nervi trigemini, Unterkiefernerv, dritter Ast des dreigetheilten Nerven.
- ζ. Nervus frontalis, Stirnnerv.
- η. Nervi ciliares, Blenbungsnerven.
- z. Ganglion sphenopalatinum, Gaumen-Kiefernervennoten.
- ι. Nervus infraorbitalis, Unteraugenhöhlennerv.
- κ. Ganglion oticum, Ohrnoten.
- λ. Ganglion cervicale supremum, oberer Halsnervennoten.
- μ. Corpus striatum, Streifenhügel.
- ν. Hemisphaera cerebri dextra, superficies interna, rechte Gehirnhemisphäre, innere Fläche.
- ξ. Corpus callosum, Ballen.
- π. Genu corporis callosi, Knie des Ballens.
- ρ. Foramen Monroi, Monro'sches Loch.
- σ. Talamus nervi optici dexter, rechter Sehhügel.
- τ. Plexus chorioideus, Aderhautgeflecht.
- υ. Glandula pinealis, Zirbeldrüse.
- φ. Corpora quadrigemina, Vierhügel.
- χ. Glandula pituitaria, Hirnanhang.
- ψ. Ventriculus tertius, dritte Hirnhöhle.
- ω. Ventriculus quartus, vierte Hirnhöhle.
- α'. Pons Varoli, Barockbrücke.
- β'. Medulla oblongata, verlängertes Mark.
- γ'. Centrum cinereum medullae oblongatae et medullae spinalis, grauer Kern des verlängerten Markes und des Rückenmarkes.
- δ'. Corpus medulare cerebelli, Markkörper des kleinen Gehirns.
- e'. Arbor vitae cerebelli, Lebensbaum des kleinen Gehirns.

Figur 4. Horizontaldurchschnitt durch die beiderseitigen Augen und die Nasengegend.

1. Integumentum, äußere Haut.
2. Ala magna ossis sphenoidi, großer Flügel des Keilbeins im horizontalen Durchschnitt.
3. Processus frontalis ossis zygomatici, Stirnhöcker des Jochbeins.
4. Orbita, superficies interna, Augenhöhle, innere Fläche.
5. Musculus obliquus oculi superior, oberer schiefer Augenmuskel.
6. Trochilea musculi obliqui superioris, Rolle des obern schiefen Augenmuskels.
7. Musculus levator palpebrae superioris, insertio posterior, Aufhebemuskel des obern Augenlides, hinteres Ende.
- 7'. Musculus levator palpebrae superioris, insertio anterior, Aufhebemuskel des obern Augenlides, vorderes Ende.
8. Musculus rectus oculi superior, oberer gerader Augenmuskel.
9. Musculus rectus oculi internus, innerer gerader Augenmuskel.
10. Musculus rectus oculi externus, äußerer gerader Augenmuskel.
11. Glandula lacrymalis, Thränendrüse.
12. Bulbus, Augapfel.
13. Arteria ophthalmica, Augenhöhlenpulsader.
14. Arteria lacrymalis, Thränenröhrenpulsader.
15. Arteria supra orbitalis, Oberaugenhöhlenpulsader.
16. Vena ophthalmica cerebri, Gehirnaugenhöhlenblutader.
17. Nervus ophthalmicus, Augenhöhlennerv.
18. Nervi ciliares, Ciliarnerven.
19. Nervus lacrymalis, Thränenröhrennerv.

trvus opticus sinister, pars cerebralis, linker Sehnerv, Gehirntheil.

trvus opticus dexter, pars cerebralis, rechter Sehnerv, Gehirntheil.

iasma nervorum opticorum, Sehnerven-Kreuzung.

ervus trochlearis, Rollmuskelnerv.

aberculum ephipii, Sattelnopf.

ssura orbitalis superior, obere Augenhöhlenspalte. a minor ossis sphenoides, kleiner Flügel des Keilbeins.

oramen opticum, Sehloch.

gumenta oculi, Hüllen des Auges.

orpus vitreum, Glaskörper.

ens crystallina, Krystalllinse.

analisis Petiti, Petit'scher Kanal.

analisis Schlemmii, Schlemm'scher Kanal.

is, Regenbogenhaut.

ornea, Hornhaut.

alpebra, Augenlid.

eptum narium, Nasenscheidewand.

inus ethmoidales, Siebbeinzellen.

ssa nasalis, Nasenbeine.

rocessus nasalis et frontalis ossis maxillae superioris, Nasen- und Stirnfortsatz des Oberkieferknochens.

evator labii superioris alaeque nasi, Aufheber der Oberlippe und des Nasenflügels.

usculus procerus Santorini, der lange Nasenmuskel des Santorini.

1. Die linke Augenhöhle, von der Seite geöffnet.

acunar orbitae, Dach der Augenhöhle.

inus frontalis, Stirnhöhle.

olum orbitae, Boden der Augenhöhle.

analisis infraorbitalis, Unteraugenhöhlenkanal.

inus ossis maxillae superioris, Oberkieferhöhle.

uperficies temporalis ossis maxillae superioris, Schläfensfläche des Oberkieferknochens.

la magna ossis sphenoides, großer Flügel des Keilbeins im Durchschnitt durch die Wurzel.

oramen rotundum, rundes Loch.

oramen ovale, ovales Loch.

ssura orbitalis superior, obere Augenhöhlenspalte.

rocessus pterygoideus lamina externa, äußere Platte des Flügelfortsatzes.

ssura orbitalis inferior, untere Augenhöhlenspalte.

rotis interna, innere Kopfpulsader.

ervus trigeminus, dreigetheilter Nerv.

anglion semilunare, halbmondförmiger Nervenknoten.

amus primus nervi trigemini, erster Ast des dreigetheilten Nerven.

amus secundus nervi trigemini, zweiter Ast des dreigetheilten Nerven.

amus tertius nervi trigemini, dritter Ast des dreigetheilten Nerven.

ervus opticus, Sehnerv.

usculus levator palpebrae superioris, Aufhebemuskel des oberen Augenlides.

usculus obliquus oculi superior, oberer schiefer Augenmuskel.

endo musculi obliqui superioris, Sehne des oberen schiefen Augenmuskels.

rochlea musculi obliqui superioris, Rolle des oberen schiefen Augenmuskels.

usculus obliquus oculi inferior, unterer schiefer Augenmuskel.

24. Musculus rectus oculi superior, oberer gerader Augenmuskel.

25. Musculus rectus oculi externus, äußerer gerader Augenmuskel.

26. Musculus rectus oculi inferior, unterer gerader Augenmuskel.

27. Musculus rectus oculi internus, innerer gerader Augenmuskel.

28. Bulbus oculi, Augapfel.

29. Conjunctiva bulbi, Liderhaut des Augapfels.

30. Conjunctiva palpebrae, Liderhaut des Augenlides.

31. Tarsus palpebrae superioris, Knorpel des oberen Augenlides.

32. Stratum musculare palpebrarum, Muskelschicht der Augenlider.

33. Integumentum, äußere Haut.

Figur 6. Senkrechter Durchschnitt durch die linke Augengegend und den linken Augapfel.

1. Lacunar orbitae, Dach der Augenhöhle.

2. Sinus frontalis, Stirnhöhle.

3. Canalis infraorbitalis, Unteraugenhöhlenkanal.

4. Sinus ossis maxillae superioris, Oberkieferhöhle.

5. Nervus infraorbitalis, Unteraugenhöhlennerv.

6. Integumentum nervi optici durae matris, Sehnervenscheide der harten Hornhaut.

7. Ala magna ossis sphenoides, großer Flügel des Keilbeins.

8. Foramen rotundum, rundes Loch.

9. Processus pterygoideus, Flügelfortsatz.

10. Levator palpebrae superioris, Hebemuskel des oberen Augenlides.

11. Musculus rectus oculi superior, oberer gerader Augenmuskel.

12. Musculus rectus oculi inferior, unterer gerader Augenmuskel.

13. Musculus obliquus oculi inferior, unterer schiefer Augenmuskel.

14. Arteria ophthalmica, Augenhöhlenpulsader.

15. Vena ophthalmica cerebialis, Gehirnaugenhöhlenblutader.

16. Nervus naso-ciliaris, Nasenaugennerv.

17. Nervus oculomotorius, gemeinschaftlicher Augenmuskel.

18. Nervus opticus, Sehnerv.

19. Tunicae oculi, Hüllen des Auges.

20. Corpus vitreum, Glaskörper.

21. Lens crystallina, Krystalllinse.

22. Iris, Regenbogenhaut.

23. Canalis Petiti, Petit'scher Kanal.

24. Cornea, Hornhaut.

25. Palpebra superior, oberes Augenlid.

25' Palpebra inferior, unteres Augenlid.

Kopf und Hals.

Der Kopf, caput, der oberste Theil des menschlichen Körpers, zerfällt in zwei Abschnitte, die Hirnschale, cranium, bestehend aus dem Schädeldach oder Schädelgewölbe, fornx cranii, und dem Schädelgrund, basis cranii, und das Gesicht, facies, welches den vordern untern Theil des Kopfes bildet.

An den Kopf nach unten schließt sich der Hals, collum, an, welcher das Verbindungsglied zwischen jenem und dem Rumpfe bildet.

Nach Entfernung der äußern Haut und des Unterhautzellgewebes stellen sich uns zunächst die Muskeln dar, welche in verschiedenen Schichten und Regionen das knöcherne Gerüst des Kopfes und Halses bedecken.

Muskeln am Kopfe und Halse.

I. Muskeln am Kopfe.

Nach den Gegenden zerfallen die Muskeln des Kopfes in sechs Gruppen, und zwar in die Muskeln der Kopfhaut, der Augenhöhle, des Ohrs, der Nase, der Lippen, des Kinnes und der Waden, sowie des Unterkiefers.

A. Muskeln der Kopfhaut.

Unter der Kopfhaut befindet sich die Sehnenhaube, galea aponeurotica (Taf. 6; 1A, 2A), welche eine sehnige Kappe darstellt, die über das Schädeldach gespannt, lödler mit der Knochenhaut, pericranium, desselben, fester aber mit der Kopfhaut verwachsen ist. Von ihr gehen vier Muskeln aus, die beiden Stirnmuskeln und die beiden Hinterhauptsmuskeln, welche zusammen den Schädeldachmuskel, musculus epicranii oder occipito-frontalis (Taf. 6; 1.) bilden, für welchen die Galea als die Zwischensehne zu betrachten ist.

1. Muskeln an der Stirn.

Stirnmuskel, musculus frontalis (Taf. 6; 1., 2.).

Lage:

Unmittelbar unter der Haut der Stirn, von der Nasenwurzel und dem obern Augenhöhlentrande emporsteigend.

Ansätze:

- a) Der innere Theil des obern Augenhöhlentrandes, der Augenbrauenbogen, der Nasenfortsatz des Oberkieferbeins und die Nasenwurzel.
- b) Der vordere Theil der Sehnenhaube.

Wirkung:

Zieht die Sehnenhaube mit der Kopfhaut nach vorn und unten.

Ein besonderer Theil des Stirnmuskels ist der Augenbrauenrunzler, musculus corrugator supercilii, welcher auch mit dem Schließmuskel des Augensides zusammenfließt und sich in der Haut der Augenbrauen verliert.

2. Muskeln am Hinterhaupte.

Hinterhauptsmuskel, musculus occipitalis (Taf. 6; 1., 2.).

Lage:

Unter der Haut des Hinterhauptes.

Ansätze:

- a) Die obere halbkreisförmige Linie des Hinterhauptbeins und der Wargentheile des Schläfenbeins.
- b) Der hintere Theil der Sehnenhaube.

Wirkung:

Zieht die Sehnenhaube mit der Kopfhaut nach hinten.

B. Muskeln der Augenhöhle.

1. Schließmuskel der Augenlider, musculus orbicularis oder sphincter palpebrarum (Taf. 6; 1., 2., 5.).

Lage:

Am Eingange der Augenhöhle, unmittelbar unter der Haut.

Ansätze:

- a) Der Stirnfortsatz des Oberkieferbeins und das innere Augenlidband, welches von der Stelle, wo der processus frontalis des os maxillare superius an das Stirnbein anstößt, zum innern Augenwinkel geht.
- b) Die Fasern dieses Muskels gehen ringförmig

um die Lidpalte herum und leben zu ihrem Ausgangspunkte zurück.

Wirkung:

Verengt die Augenlidpalte und schließt dieselbe.

2. Aufhebemuskel des obern Augenlides, musculus levator palpebrae superioris (Taf. 6; 3., 4., 5., 6.).

Lage:

Geht in der Augenhöhle von hinten dicht unter dem Dache derselben über den nächsten Muskel nach vorn.

Ansätze:

- a) Der obere Rand des Sehnervenauslasses in den kleinen Fügeln des Keilbeins.
- b) Der obere Rand des obern Augenlidmuskels.

Wirkung:

Zieht das obere Augenlid in die Höhe und nach hinten in die Augenhöhle zurück.

3. Der obere gerade Augenfelsmuskel, musculus rectus superior bulbi oculi (Taf. 6; 4., 5., 6.).

Lage:

Geht von der Spitze der Augenhöhle, unter dem Dache derselben nach vorn und oben zum Augapfel.

Ansätze:

- a) Der obere Rand des Sehnervenauslasses.
- b) Der vordere obere Theil der Lederhaut des Auges.

Wirkung:

Dreht den Augapfel um eine horizontale, von innen nach außen gebende Achse, welche mit der optischen Achse des Auges einen Winkel von 67° bildet, nach oben und etwas nach innen.

4. Der untere gerade Augenfelsmuskel, musculus rectus inferior bulbi oculi (Taf. 6; 5., 6.).

Lage:

In der Augenhöhle, wie der vorige, nur daß er auf dem Boden derselben nach vorn und unten zum Augapfel geht.

Ansätze:

- a) Der untere Rand des Sehnervenauslasses.
- b) Der vordere untere Theil der Lederhaut des Auges.

Wirkung:

Dreht den Augapfel um dieselbe Achse wie der vorige Muskel, nur nach unten und innen.

5. Der innere gerade Augenfelsmuskel, musculus rectus internus bulbi oculi (Taf. 6; 4., 5.).

Lage:

Geht von der Spitze der Augenhöhle an der innern Wand nach vorn und innen zum Augapfel.

Ansätze:

- a) Der innere Rand des Sehnervenauslasses.
- b) Der vordere innere Theil der Lederhaut des Auges.

Wirkung:

Dreht den Augapfel um seine senkrechte Achse nach innen.

6. Der äußere gerade Augenfelsmuskel, musculus rectus externus bulbi oculi (Taf. 6; 4., 5.).

Lage:

In der Augenhöhle an deren äußerer Seite, von hinten nach vorn und außen zum Augapfel gehend.

e:
Der äußere Rand des Sehnervenloches.
Der vordere äußere Theil der Lederhaut des Auges.

ing:
reht den Augapfel um seine senkrechte Achse nach außen.

erer schiefer Augenmuskel, musculus obliquus oculi superior (Taf. 6; 5₂₁).

n dem innern obern Theile der Augenhöhle, zwischen dem obern und innern geraden Augenmuskel. Er geht mit seinem Bauche von unten nach vorn, während seine Sehne (Taf. 6; 2₁) durch die Rolle, trochlea (Taf. 6; 5₂₂), ihre Richtung ändert und nach außen und etwas nach hinten geht.

ke:
Der innere obere Rand des Sehnervenloches.
Die Lederhaut des Auges hinter dem vordern Ansätze des obern geraden Augapfelmuskels.

ing:
reht den Augapfel um eine horizontale Achse, welche von vorn nach hinten gehend die optische Achse des Auges unter einem Winkel von 36° schneidet, so daß die Pupille dabei nach außen gerichtet wird.

terer schiefer Augenmuskel, musculus obliquus oculi inferior (Taf. 6; 3₂₂, 5₂₃, 6₁₃).

im vordern untern Augenhöhlenumfang.

ke:
Die Augenhöhlenfläche des Oberkieferbeins.
Der äußere Theil der Lederhaut des Auges zwischen dem obern und äußern geraden Augenmuskel.

ung:
Dreht das Auge um dieselbe senkrechte Achse wie der vorige Muskel, nur daß die Pupille dabei nach oben und außen gerichtet wird.

C. Muskeln des Ohres.

ebemuskel des Ohres, musculus attollens auriculae (Taf. 6; 1₂, 2₄).

über den Ohren.

ke:
Der äußere Theil der Sehnenhaube.
Der hintere obere Theil des Ohrknorpels.
ung:
zieht das Ohr in die Höhe.

ückwärtszieher des Ohres, musculus retrahens auriculae (Taf. 6; 1₄, 2₆).

hinter den Ohren.

ke:
a) Der Warzenheil des Schläfenbeins.
b) Die hintere, äußere Fläche der Ohrmuschel.
ung:
zieht das Ohr nach hinten.
gibt es einen Vorzieher des Ohres, musculus atrahens auriculae, der vom Jochbogen nach vordern Theile der Ohrmuschel geht, hier aber weggelassen werden müssen, um darunter liegende zu zeigen.

D. Muskeln der Nase.

1. Aufhebemuskel der Oberlippe und des Nasenflügels, musculus levator labii superioris alaeque nasi (Taf. 6; 4₂, 5₆, 6₂₀).

Lage:
Geht vom innern Augenwinkel zur Seite der Nase und zur Oberlippe herab.

Ansätze:
a) Der obere Theil des Nasenfortsatzes des Oberkieferbeins.
b) Für den kürzern Theil Knorpel und Haut der Nasenflügel, für den längern Theil die Haut der Oberlippe und der Schließmuskel des Mundes.

Der obere Ansatz wird von dem Schließmuskel der Augenlider bedeckt.

Wirkung:
Zieht die Nasenflügel und die Oberlippe zugleich in die Höhe.

2. Zusammendrücker der Nase, musculus compressor nasi (Taf. 6; 1₆, 2₆).

Lage:
An der Seite der Nasenflügel, von den Hebern der Oberlippe bedeckt.

Ansätze:
a) Die Gesichtsfäche des Oberkieferbeins über dem ersten Backzahn.
b) Der obere Theil des Nasenflügels.

Wirkung:
Drückt den Nasenflügel zusammen.

3. Der hohe Nasenmuskel des Santorin, musculus procerus nasi Santorini (Taf. 6; 1₆, 2₇).

Lage:
Auf dem Nasenrücken.

Ansätze:
a) Die Haut des Nasenrückens über der Nasenspitze und die schnelle Ausbreitung des Niederdrückers der Nase dasselbst.
b) Die innern Fasern des Stirnmuskels.

Wirkung:
Zieht die Stirnhaut herab nach der Nase zu. Erwähnen wollen wir nur noch den Niederdrücker der Nase, musculus depressor alae nasi, welcher neben dem Zusammendrücker der Nase liegt.

E. Muskeln der Lippen, des Kinnes und der Waden.

1. Schließmuskel des Mundes, musculus orbicularis oder sphincter oris (Taf. 6; 1₁₁, 2₁₂).

Lage:
Rings um die Mundöffnung in den Lippen.

Ansätze:
Entspringt von der äußern Haut, mit der er ziemlich fest verwachsen ist, ohne sich an einem Knochen zu befestigen.

Wirkung:
Schließt die Mundspalte und verändert deren Gestalt.

2. Der eigene Hebemuskel der Oberlippe, musculus levator labii superioris proprius (Taf. 6; 1₁₀, 2₁₁).

[Der Hebemuskel der Oberlippe und der Nasenflügel ist bereits bei der Nase abgehandelt worden.]

Lage:
Erstreckt sich vom untern Augenhöhlenrande, bedeckt von dem Schließmuskel der Augenlider, über das foramen infraorbitale weg zur Oberlippe.

Anfänge:

- a) Der untere Augenhöhlentrand.
- b) Die Oberlippe.

Wirkung:

Zieht die Oberlippe in die Höhe.

(Unter diesem Muskel liegt der Hebemuskel des Mundwinkels, musculus levator anguli oris.)

- 3. Kleiner Jochmuskel, musculus zygomaticus minor (Taf. 6; 1., 2.).

Lage:

Theils nach außen vom dem eigenen Hebemuskel der Oberlippe, theils denselben bedeckend.

Anfänge:

- a) Die Gesichtsfäche des Jochbeins.
- b) Die Oberlippe.

Wirkung:

Zieht die Oberlippe nach außen in die Höhe.

- 4. Großer Jochmuskel, musculus zygomaticus major (Taf. 6; 1., 2.).

Lage:

Nach außen vom dem kleinen Jochmuskel.

Anfänge:

- a) Die Gesichtsfäche des Jochbeins.
- b) Der Mundwinkel.

Wirkung:

Zieht den Mundwinkel schief nach außen in die Höhe.

- 5. Der Herabziehmuskel des Mundwinkels, musculus depressor anguli oris oder musculus triangularis menti (Taf. 6; 1., 2.).

Lage:

Zu beiden Seiten des Kinns.

Anfänge:

- a) Der untere Rand des Unterkiefers.
- b) Der Mundwinkel.

Wirkung:

Zieht den Mundwinkel nach außen und unten.

- 6. Der Niederziehmuskel der Unterlippe, musculus depressor labii inferioris oder musculus quadratus menti (Taf. 6; 1., 2.).

Lage:

Unter der Haut des Kinns, theils nach innen, theils unter dem Herabziehmuskel des Mundwinkels.

Anfänge:

- a) Der untere Rand des Kinns.
- b) Die Unterlippe.

Wirkung:

Zieht die Unterlippe nach abwärts.

- 7. Lachmuskel, musculus risorius Santorini (Taf. 6; 1.).

Lage:

Nach außen vom Mundwinkel.

Anfänge:

- a) Die Sehnenhaut des Lachmuskels und der Ohrspeicheldrüse.
- b) Der Mundwinkel.

Wirkung:

Zieht den Mundwinkel nach außen.

- 8. Der Baden- oder Trompetermuskel, musculus buccinator (Taf. 6; 1., 2.).

Lage:

Nach außen vom dem Mundwinkel die Baderbildend.

Anfänge:

- a) Der Flügelfortsatz des Keilbeins und die Höhlenfortsätze des Ober- und Unterkiefers nach hinten vom zweiten Backzahn.
- b) Der Schließmuskel des Mundwinkels, Jocher er sich verdingt.

Wirkung:

Zieht die Mundwinkel und Lippen nach oben oder verengert die Mundhöhle, wenn der Muskel des Mundes Widerstand leistet. (Die Schweißdrüsenmuskeln, musculus Cowperi, sind Fasern des Schließmuskels, welche zum Zahnhöhlenfortsatz des Oberkiefers und sich in der Vertiefung zwischen den Werten des innern und äußern Schweißdrüsen ansetzen.)

F. Muskeln des Unterkiefers

Raummuskeln, musculi mandibulares

Der Raummuskel, musculus masseter (Taf. 6; 1., 2.).

Lage:

Bedeckt den hintern Theil des Unterkiefers.

Anfänge:

- a) Der untere Rand des Jochbogens.
- b) Die äußere hintere Fläche des Unterkiefers und die äußere Fläche des Kieferwinkels.

Wirkung:

Zieht den Unterkiefer in die Höhe nach vorn.

Als Raummuskeln, welche auf den Abbildungen nicht haben sichtbar gemacht werden können, wir noch:

den Schläfenmuskel, musculus temporalis, welcher an der halbkreisförmigen Linien der Schläfenwand des Schädels sich ansetzt. Der vordere Fortsatz des Unterkiefers geht, und tiefer in die Höhe, sowie, wenn der Kiefer zugezogen ist, nach rückwärts zieht. Der vordere Fortsatz der Schläfenfascie, fascia temporalis (Taf. 6; 1.) bedeckt, welche Platten besteht, einer oberflächlichen und einer tieferen, und die nach oben mit der Sehne in Verbindung tritt, und an der halbkreisförmigen Linie, der Stirnbeinleiste und an dem vordern Theil des Unterkiefers angewachsen ist; den innern Flügelmuskel, musculus pterygoideus internus, welcher von der Sehne des Flügelfortsatzes des Oberkiefers und dem Pyramidenfortsatz des Oberkiefers zur innern Fläche des Unterkiefers und den Unterkiefer in die Höhe, und einseitig wirkt, zugleich etwas nach innen seiner Seite zieht; und den äußern Flügelmuskel, musculus pterygoideus externus, welcher von der Sehne des Flügelfortsatzes des Oberkiefers und von dem Oberkieferbänder sowie der Fläche des großen Flügels des Keilbeins zum andern Kopf zur innern Seite des Kiefergelenksfortsatzes des Unterkiefers geht, und einseitig wirkt, und nach vorn zieht; wenn jedoch beide zu gleicher Zeit wirken, wird derselbe gerade nach vorn gezogen.

II. Muskeln am Halse.

Die Muskeln am Halse sind in zwei Schichten lagert, in eine oberflächliche und in eine tiefe.

Muskeln der ersten Schicht zerfallen wiederum in Lagen, in eine vordere und hintere. Die rechte Lage befindet sich unmittelbar unter der Haut, und die hintere sich oberhalb und unterhalb des Kehlkopfs ansetzt. Die tiefere Schicht liegt hinter Zungenbein, dem Kehlkopf und der Luft- und Erdböhre, unmittelbar vor und zur Seite des Halskörpers.

Sonders zu erwähnen ist noch die Faserhaut Halses, fascia colli, welche in zwei Blätter ist, von denen das eine unter dem breiten Halses weggeht, während das andere mit einer vorderen se sich hinter dem oberflächlichen, mit einer hinteren vor der tieferen Schicht der Halsmuskeln hin-

Oberflächliche Schicht der Halsmuskeln.

a) Vordere Lage.

Breiter Halsmuskel, musculus latissimus, subcutaneus colli oder platysma myoides (Taf. 6; 117).

Be-
findet sich unmittelbar unter der Haut des Halses an der vorderen und seitlichen Fläche desselben, von dem oberen Theile der Brust bis zum Unterhals emporsteigend.

Lage:

a) Die Sehnenhaut des großen Brustmuskels in der Höhe der zweiten Rippe, und die Sehnenhaut des Deltamuskels.

b) Der Rand des Unterhalses, sowie die Gesichtshaut und die Fascien des Kaumuskels und der Ohrspeicheldrüse.

Wirkung:

Zieht den Unterhals nach abwärts, und wenn dieser befestigt ist, die Haut des untern Theils des Halses in die Höhe.

Kopfnider, musculus sterno cleido-mastoideus (Taf. 6; 118, 217. Taf. 7; 11, 21. Taf. 8; 11).

Lage:

Der Kopf liegt zu beiden Seiten des Halses, indem er schräg von oben, außen und hinten, nach unten, innen und vorn geht.

Lage:

a) Der Warzenfortsatz des Schläfenbeins und der äußere Theil der oberen halbkreisförmigen Linie des Hinterhauptbeins.

b) Der Handgriff des Brustbeins, an welchem sich der schmalere Theil, und das Brustbeinende des Schlüsselbeins, an welches sich der breitere Theil ansetzt.

Wirkung:

Wenn beide Muskeln gleichzeitig wirken, strecken sie den Kopf, wirkt dagegen nur der eine, so dreht er das Gesicht nach der entgegengesetzten, und zieht den Kopf gegen die Schulter seiner Seite.

b) Hintere Lage.

α. Unter dem Zungenbein.

Brust-Zungenbeinmuskel, musculus sterno-hyoideus (Taf. 6; 228. Taf. 7; 17).

Lage:

Zu beiden Seiten der Mittellinie des Halses, vom Brustbein zum Zungenbein gehend.

Ansätze:

a) Die hintere obere Fläche des Handgriffs des Brustbeins, sowie das Brustbeinende des Schlüsselbeins und der Knorpel der ersten Rippe, beide letzteren Theile nur aus wenigen Fasern bestehend.

b) Der untere mittlere Theil der vorderen Fläche des Körpers des Zungenbeins.

Wirkung:

Zieht das Zungenbein und die mit demselben verbundenen Theile nach abwärts.

2. Der Brustbein-Schildknorpelmuskel, musculus sterno-thyroideus, hat erst auf der folgenden Tafel sichtbar gemacht werden können (s. des- halb Taf. 7; 18).

Lage:

Unmittelbar unter dem Brust-Zungenbeinmuskel.

Ansätze:

a) Die hintere Fläche des Handgriffs des Brustbeins und der Knorpel der ersten Rippe.

b) Die schiefe Linie, linea obliqua, an der vorderen Fläche des Schildknorpels.

Wirkung:

Zieht den Kehlkopf und das mit diesem verbundene Zungenbein nach abwärts.

3. Zungenbein-Schildknorpelmuskel, musculus hyothyroideus (Taf. 6; 228. Taf. 7; 110. Taf. 8; 11).

Lage:

Unter dem oberen Theile des Brust-Zungenbeinmuskels, zwischen Kehlkopf und Zungenbein.

Ansätze:

a) Der untere Rand des Körpers des Zungenbeins.

b) Die schiefe Linie des Kehlkopfs.

Wirkung:

Nähert das Zungenbein dem Kehlkopf, wenn dieser befestigt, und umgekehrt.

4. Schulter-Zungenbeinmuskel, musculus omohyoideus (Taf. 6; 228. Taf. 8; 19).

Lage:

An der Seite der vorher erwähnten Halsmuskeln der hintern Lage, unter dem Kopfnider und sich mit demselben kreuzend, vom Schulterblatt, außen, hinten und unten, nach innen, vorn und oben zum Zungenbein gehend.

Ansätze:

a) Der obere Rand des Schulterblattes, unmittelbar neben dem Schulterblatteinschnitt.

b) Der äußere untere Theil des Körpers des Zungenbeins.

Wirkung:

Wirken beide Muskeln zugleich, so ziehen sie das Zungenbein nach unten und etwas nach rückwärts; wirkt der Muskel einer Seite allein, so zieht er das Zungenbein nach seiner Seite.

β. Ueber dem Zungenbein.

1. Zweibäuchiger Kiefermuskel, musculus digastricus oder musculus biventer maxillae inferioris (Taf. 6; 227. Taf. 7; 13. Taf. 8; 13).

Lage:

Der Muskel ist in zwei durch eine Sehne verbundene Bäuche getheilt, von denen der hintere vom oberen Theile des Kopfniders bedeckt ist, während der vordere unter dem breiten Halsmuskel liegt.

Anfänge:

- a) Der hintere Bauch im Wurzeneinschnitt des Schläfenbeins.
- b) Der vordere Bauch am untern Rande des Kinnes, während die verbindende Sehne durch ein fibröses Band mit dem Zungenbein verbunden ist, sodaß beide Bäuche in einen stumpfen Winkel gegeneinander gerichtet sind.

Wirkung:

Bei fixirtem Unterkiefer ziehen sie das Zungenbein in die Höhe, während umgekehrt jener vom Oberkiefer abgezogen und so der Mund geöffnet wird.

2. Kiefer-Zungenbeinmuskel, musculus mylohyoideus (Taf. 6; 2_{aa}, 3_{aa}, Taf. 7; 1_a, Taf. 8; 1_a).

Lage:

Ueber dem zweibäuchigen Kiefernustel, den Boden der Mundhöhle mit bilden helfend.

Anfänge:

- a) Die innere gebogene Linie des Unterkiefers.
- b) Der Körper des Zungenbeins, an welchen sich die hintern Fasern ansetzen, während die schräg herab und nach innen gebenden Bündel des Muskels beider Seiten sich in einer geraden, von der Mitte des Unterkiefers bis zum Zungenbein gehenden Linie vereinigen.

Wirkung:

Zieht das Zungenbein in die Höhe und verengt die Mundhöhle.

3. Kinn-Zungenbeinmuskel, musculus geniohyoideus (Taf. 6; 3_{aa}, Taf. 8; 1_a).

Lage:

Ueber dem Kiefer-Zungenbeinmuskel.

Anfänge:

- a) Der innere Kinnastfel.
- b) Der obere mittlere Theil des Zungenbeinkörpers.

Wirkung:

Zieht das Zungenbein nach vorn und in die Höhe.

4. Griffel-Zungenbeinmuskel, musculus stylohyoideus. Hat auf dieser Tafel nicht zur Darstellung gelangen können (s. Taf. 7, Fig. 1_a).

Lage:

Zum Theil hinter dem hintern Bauche des zweibäuchigen Kiefernustels, von dessen die beiden Bäuche vereinigen der Sehne sein vorderer unterer Theil durchbohrt wird.

Anfänge:

- a) Der äußere Umfang der Basis des Griffelfortsatzes.
- b) Der äußere Rand des Zungenbeinkörpers.

Wirkung:

Zieht das Zungenbein in die Höhe und etwas nach hinten.

- γ. Muskeln der Zunge, des Schlundkopfs, des Gaumens und des Kehlkopfs.

Die hier zu beschreibenden Muskeln gehören nicht unmittelbar zur hintern Lage der oberflächlichen Schicht der Halsmuskeln, sie bilden vielmehr ein System für sich und schließen sich nur topographisch den vorgehend erwähnten Halsmuskeln an. Sie gliedern sich in

Muskeln der Zunge, Muskeln des Schlundkopfs, Muskeln des Gaumens und Muskeln des Kehlkopfs.

αα. Muskeln der Zunge.

Die Zunge, lingua oder glossa (Taf. 6; 3_{1a}), ist ein muskulöser Körper, welcher auf dem Boden der Mundhöhle über den im Vorstehenden erwähnten Muskeln liegt. Man unterscheidet an ihr den hintersten Theil die Zungenwurzel, radix oder basis linguae, welche mit dem Zungenbein verbunden ist, daran sich anschließend den Zungenrücken, dorsum linguae, welcher als eine gewölbte Fläche frei in der Mundhöhle liegt, und den vordern Theil, die Zungenspitze, apex linguae. Weiter hat man an der Zunge die beiden Seitenränder und die untere Fläche, welche letztere zum größten Theil an den Boden der Mundhöhle angewachsen ist und nach vorn durch eine Falte der Mundschleimhaut, das Zungenbändchen, frenulum linguae (Taf. 6; 3₁₁), befestigt wird.

Auf dem Zungenrücken befinden sich zahlreiche kleine Erhabenheiten, die Zungen- und Geschmackswärchen, papillae linguae, sowie Schleim- und Glanduldrüsen; ferner gehen in die Zunge zahlreiche Blutgefäße und Nerven, von welchen letztern der Zungen-Schlundkopfnerv die Geschmacksempfindung vermittelt.

Den Hauptbestandtheil der Zunge bilden Muskelfasern, die in verschiedenen Richtungen verlaufen; darnach unterscheidet man folgende Muskeln:

1. Längsmuskel der Zunge, musculus lingualis (Taf. 6; 3_{1a}).

Lage:

Dieser Muskel bildet die Hauptmasse der Zungensubstanz und liegt in der Richtung von der Zungenspitze zur Zungenwurzel; in seinem Verlauf wird er von den Fasern der übrigen Zungenmuskeln durchsetzt.

Wirkung:

Er verlängert die Zunge.

2. Quermuskel der Zunge, musculus transversus linguae.

Lage:

Die Fasern des Quermuskels kreuzen die des Längsmuskels der Zunge und stehen somit auf diesem senkrecht.

Anfänge:

Der Quermuskel entspringt zu beiden Seiten der Zunge in zwei gleiche Hälften theilend die bindegewebige Scheidewand, septum linguae, und geht nach den Rändern der Zunge.

Wirkung:

Er nähert bei seinem Zusammenziehen die beiden Seitenränder der Zunge, sodaß dieselbe sich verjüngt.

3. Zungenbein-Zungenmuskel, musculus hyoglossus. (Hat auf dieser Tafel nicht dargestellt werden können, s. deshalb Taf. 7; 1_a und Taf. 8; 1_a, 2_a).

Lage:

Unmittelbar über dem Kiefer-Zungenbeinmuskel.

Anfänge:

- a) Der Körper sowie das große und kleine Horn des Zungenbeins, nach welchen verschiedene Ansätze man einen musculus baseoglossus, keratoglossus und chondroglossus unterscheiden kann.

Geht nach der Zungenwurzel, woselbst er sich mit dem Längsmuskel der Zunge verweht.
 19: bt die Zunge abwärts und etwas nach hinten.
 n: Zungenbeinmuskel, musculus genio-
 ssus (Taf. 6; 3₂₀ und Taf. 8; 1₂, 2₂).

mittelbar unter der Zunge.

Der innere Rinnstachel.

Geht zur Zungenwurzel und verschmilzt mit dem Längsmuskel der Zunge.

bt die Zunge nach vornwärts.

ffel: Zungenmuskel, musculus styloglossus (I. Taf. 8; 2₁).

nter dem Griffel-Zungenbeinmuskel, zur Seite
 s Zungenbein-Zungenmuskels.

Die Spitze des Griffelfortsatzes.

Der Zungenrand, in dem er sich verliert.

bt die Zunge nach hinten und in die Höhe.

3. Muskeln des Schlundkopfes.

Schlundkopf, pharynx (Taf. 6; 3₁₀. Taf. 9; 1) ein länglicher muskulöser Sack, welcher vor den Halswirbeln liegt und nach vorn mit der Nasenhöhle, sowie mit dem Kehlkopf in Verbindung nach oben setzt er sich an die Basis des Schädels, an die flügelartigen Fortsätze des Keilbeins, Unterliefer, das Zungenbein und an den Kehlkopf. Die hintere Nasenöffnung, choanae steht er mit der Nasenhöhle, durch die Rachen: isthmus faucium (Taf. 6; 3₁₂), mit der Mundhöhle in Verbindung. Der hintere, der Wirbelsäule r Basis des Schädels zugekehrte Theil heißt Rachen, fauces.

Schlundkopf besteht vorzugsweise aus Muskelfasern. Die Schlundkopfschnürr, musculus constrictor pharyngis, bilden. Derselbe läßt sich in drei Theile sondern, den oberen, mittlern und unteren Schlundkopfschnürr, constrictor pharyngis superior (Taf. 8; 2₁), medius und inferior. An letztern unmittelbar die Speiseröhre oder der Ösophagus (Taf. 6; 3₁₀), an, ein muskulöser Fortsatz von dem sechsten Halswirbel begiint und hinter der Speiseröhre zum Magen herabsteigt; derselbe besteht aus muskulösen Längs- und Ringfaserschicht, wie der Schlundkopf mit Schleimhaut ausgekleidet ist.

Die Schlundkopfschnürr, musculus constrictor pharyngis, welcher vom Griffelfortsatz des Keilbeins zum oberen und mittlern Theil des Schlundkopfes geht und denselben in die Höhe zieht.

77. Muskeln des Gaumens.

Gaumen, palatum, zerfällt in den harten oder harten Gaumen, palatum durum, welchen reits bei Betrachtung der Knochen behandelt und in den weichen Gaumen, das Gaumenvorhang, palatum molle, oder velum palatinum (Taf. 6; 3₁, 11₁). Derselbe hängt vom hintern Rande des Gaumens schräg nach hinten herab und ist in der obern Fläche von der Nasen-, an der untern Fläche aber von der Mundschleimhaut gebildet,

zwischen welchen Schleimhautplatten mehrere Muskeln liegen.

In der Mitte vom Gaumensegel hängt das Zäpfchen, uvula (Taf. 6; 3₁₁. Taf. 9; 11) herab, in welchem der Zäpfchenmuskel, musculus azygos uvulae, eingebettet liegt. Derselbe setzt sich an den hintern Nasenstachel und verliert sich in der Spitze des Zäpfchens. Er verlängert das Zäpfchen, krümmt es und zieht es in die Höhe.

Auf jeder Seite des Zäpfchens befinden sich zwei nach abwärts gehende bogenförmige Falten, die Gaumenbögen, arcus palatini (Taf. 6; 3₁₂, 3₁₃), welche die Rachenenge, isthmus faucium (Taf. 6; 3₁₂), bilden. Der vordere der Bogen hängt mit der Zungenwurzel zusammen und bildet den Zungen-Gaumenbogen, arcus glosso-palatini (Taf. 6; 3₁), in welchem der Zungen-Gaumenmuskel, musculus glosso-palatini oder constrictor isthmi faucium (Taf. 9; 1₁), liegt; derselbe geht vom seitlichen Rande der Zungenwurzel aus im Bogen nach dem Zäpfchen hin und zieht den weichen Gaumen gegen die Zunge herab, wobei er zugleich den Rachen verengt. Der hintere Bogen, der Schlundkopf-Gaumenbogen, arcus pharyngo-palatini (Taf. 6; 3₁), enthält den Rachen-schnürr oder Schlundkopf-Gaumenmuskel, musculus pharyngo-palatini (Taf. 9; 1₂), welcher von der seitlichen Wand des Schlundkopfes ausgehend sich gleichfalls zwischen den Platten des weichen Gaumens verbirgt und denselben herabzieht.

Nur dem Namen nach erwähnen wir hier noch den Gaumenheber, musculus levator palati molliis, und den Gaumenspanner, musculus circumflexus oder tensor palati molliis, deren Wirkung schon aus dem Namen erkennbar ist, und welche von der Eustachischen Trompete, deren Öffnung Taf. 6; 3₇, sichtbar ist, sowie ersterer auch noch von dem Felsentheile des Schläfenbeins, letzterer dagegen von der Spina angularis des Keilbeins herab zum weichen Gaumen gehen und sich daselbst zwischen den Schleimhautplatten verlieren, nachdem sich der Gaumenspanner zuvor um den Hals der innern Platte der flügelartigen Fortsätze des Keilbeins geschlossen hat.

Zwischen den Gaumenbögen liegen die Mandeln, tonsillae, und zwar eine rechte (Taf. 6; 3₁₂. Taf. 9; 11) und eine linke. Dieselben sind drüsige Organe von plattförmiger Gestalt und bestehen aus Bindegewebe und sogenannten geschlossenen Follikeln, sowie Blutgefäßen und Nerven.

88. Muskeln des Kehlkopfes.

Der Kehlkopf, larynx, auch organon vocis (Taf. 6; 3X, 3Y, 3Y', sowie Taf. 8; 2G, 2H und Taf. 9; 1M, 1N, 1O), bildet den obersten Theil der Luftröhre und liegt in der Mitte des vordern Theils des Halses, zwischen dem Zungen- und Brustbein, vor dem untern Theile des Schlundkopfes, vom vierten bis sechsten Halswirbel. Er wird von sieben Knorpeln gebildet, die durch Bänder miteinander verbunden sind und durch Muskeln bewegt werden können. In der Höhle derselben befinden sich die Stimmbänder, welche die Stimmritze bilden, die durch den Kehldedel geschlossen wird.

Die Knorpel des Kehlkopfes sind:

1. Der Schildknorpel, cartilago thyroidea (Taf. 6; 3Y. Taf. 8; 1C, 2G. Taf. 9; 1M), ist der größte der Knorpel des Kehlkopfes, dessen Haupttheil, die vordere und seitliche Wand, er einnimmt. Er ist aus zwei länglich viereckigen, nach unten etwas schmälern Hälften gebildet, die vorn von der Mittellinie, in welcher sie unter einem stumpfen, etwas ab-

gerundeten Winkel zusammenstoßen, dessen hervorragendster Theil der Adamsapfel, *ponum Adami*, heißt, schräg nach hinten und außen gehen. An der äußeren convergen Fläche jeder Hälfte befindet sich die schiefe Linie, *linea obliqua*, an welche sich der Brustbein-Schildknorpel- und Zungenbein-Schildknorpelmuskel ansetzen. An der inneren concaven Seite des Kehlkopfs sind der Kehldedel und die Stimmrißbänder befestigt. Der obere Rand des Schildknorpels, welcher gegen das Zungenbein gerichtet ist, hat in seiner Mitte einen Einschnitt, den Schildknorpel-einschnitt, *incisura thyroidea*, von welchem der obere Rand bogenförmig nach hinten und außen geht. Der untere Rand sieht gegen den Ringknorpel. Die beiden seitlichen Ränder, welche den Schildknorpel nach hinten begrenzen, laufen oben und unten in eine zapfenförmige Verlängerung aus, in die oberen längern und untern kürzern dideren Hörner, *cornua superiora* oder *majora* und *cornua inferiora* oder *minora*.

2. Der Ringknorpel, *cartilago cricoidea* oder *annularis* (Taf. 6; 3Y. Taf. 8; 2H. Taf. 9; 1N), hat die Gestalt eines Siegelrings, dessen vordere, niedrigere Hälfte, den Bogen, *arcus*, des Ringes darstellt, während der hintere höhere Theil das Schild oder die Platte, *lamina*, desselben bildet. Der Bogen, mit der convergen Seite nach vorn gekehrt, liegt unter dem untern Rande des Schildknorpels. An jeder Seite befindet sich eine flache Gelenkgrube für die untern Hörner des Schildknorpels. Die Platte des Ringknorpels ist nach hinten geteilt, wo sie den Kehlkopf begrenzen hilft und nach oben sich zwischen die hintern Ränder des Schildknorpels einschiebt. Auf dem oberen Rande der Platte befinden sich zwei Gelenkflächen für die Gießkannenknorpel. Der untere Rand des Ringknorpels hängt mit der Luftröhre zusammen.

3. Die Gießkannenknorpel, *cartilaginee arytaenoideae* oder *pyramidales*, zwei Stück, sitzen auf dem obern Rande der Platte nebeneinander und bilden die hintere Wand des Kehlkopfs. Sie haben die Gestalt einer dreiseitigen, nach hinten geträumten und mit der Spitze nach oben stehenden Pyramide; sie sind durch eine schmale Spalte voneinander getrennt und tragen an der vordern Ede der Basis den Stimmbandfortsatz, *processus vocalis*, an der äußern Ede der Basis aber den Muskelfortsatz, *processus muscularis*.

4. Die Santorinischen Knorpel, *cartilaginee* oder *corpuscula*, auch *cornicula Santoriniana*, sind zwei kleine dreieckige Knöpfchen, die sich an die Spitzen der Gießkannenknorpel ansetzen.

5. Der Kehldedel, *epiglottis* (Taf. 6; 3X. Taf. 9; 10), ist eine dünne, herzförmige und sattelförmig gekrümmte Knorpelplatte, welche, an der concaven Seite des Schildknorpelwinkels mit ihrer Spitze befestigt, in aufrechter und etwas schräg nach hinten gerichteter Stellung dicht unter der Zungenwurzel hinter dem Schildknorpel und Zungenbein ihre Lage hat und einen aufstehenden Dedel über der Höhle des Kehlkopfs bildet, dessen freier oberer Rand gebogen und in seiner Mitte etwas ausgeschnitten ist.

Von den zahlreichen Bändern erwähnen wir nur die auf unsern Abbildungen sichtbaren; es sind:

1. Das Zungenbein-Schildknorpelband, *ligamentum hyo-epiglotticum* (Taf. 6; 3, Taf. 8; 2N. Taf. 9; 1S), fällt den Raum zwischen Schildknorpel und Zungenbein aus und heißt dann auch mittleres Zungenbein-Schildknorpelband, *ligamentum hyo-thyroideum medium*, im Gegensatz zu den beiden seitlichen Zungenbein-Schildknorpel-

bändern, *ligamenta hyo-thyroidea lateralia*, von den obern Hörnern des Schildknorpels stärkere Stränge zu den Knöpfchen an der Spitze des Zungenbeins gehen.

2. Das Zungenbein-Kehldedelband, *ligamentum hyo-epiglotticum* (Taf. 6; 3, Taf. 9; 17), verläuft von der hintern Fläche des Zungenbeinknopfes zur Fläche des Kehldedels geht.

3. Das Schildknorpel-Kehldedelband, *ligamentum thyreo-epiglotticum* (Taf. 6; 3, Taf. 9; 17), verläuft von der hintern Fläche des Schildknorpels zur Fläche des Kehldedels geht.

4. Das Ring-Schildknorpelband, *ligamentum crico-thyroideum* (Taf. 8; 2P. Taf. 9; 17), verläuft den Raum zwischen dem untern Rand des Ringknorpels und dem obern des Bogens des Schildknorpels aus und heißt dann auch mittleres Ringknorpelband, *ligamentum crico-thyroideum*, während die Kapselfäden, welche die Hörner des Schildknorpels mit der Fläche des Bogens des Ringknorpels verbinden, *ligamenta crico-thyroidea lateralia*, bezeichnet werden.

5. Die Stimmänder oder Stimmknorpel, *ligamenta glottidis* oder *ligamenta vocales* (Taf. 6; 3, Taf. 9; 17), sind der Zahl nach vier, zwei auf jeder Seite der hintern Fläche des Schildknorpels und zwei auf der vordern Fläche des Ringknorpels, welche die Stimmknorpelknorpels ausspannen.

a) Die obern Stimmänder, *ligamenta thyroideae superiora*, sind die Stimmänder, welche von der innern Fläche des Winkels des Schildknorpels nach oben verlaufen und sich etwas voneinander entfernend nach oben zum Stimmfortsatz des Gießkannenknorpels hinziehen.

b) Die untern Stimmänder, *ligamenta thyroideae inferiora*, sind die Stimmänder, welche von der innern Fläche des Winkels des Schildknorpels nach unten verlaufen und sich etwas voneinander entfernend nach unten zum Stimmfortsatz des Gießkannenknorpels hinziehen.

Zwischen den Stimmändern der rechten Seite bleibt eine längliche Spalte, die *rima glottidis* oder *glottis*, welche nach hinten weiter ist, und verengt werden kann.

Zwischen den obern und untern Stimmändern findet sich auf jeder Seite eine kleine Höhle, die *sinus glottidis*, welche Morgagni'sche Taschen, *sinus Morgagni*, genannt wird.

Was die Muskeln des Kehlkopfs betrifft, so sind außer denen, welche die Lage des Kehlkopfs verändern und die wir schon bei der Beschreibung der oberflächlichen Schicht der Halsmuskeln haben, noch Muskeln vorhanden, welche den Kehlkopf des Kehlkopfs bewegen. Die Kehlkopf-muskeln eigentümlichen Muskeln, *musculi proprii laryngis*, geht schon aus dem Namen hervor, sodaß wir sie hier nur aufzählen und nicht zur Darstellung haben gelangen können.

1. Die Ring-Schildknorpelmuskeln, *musculi crico-thyroidei*.
2. Die hintern Ring-Gießkannenknorpelmuskeln, *musculi crico-arytaenoides posteriores*.
3. Die seitlichen Ring-Gießkannenknorpelmuskeln, *musculi crico-arytaenoides laterales*.
4. Die Schild-Gießkannenknorpelmuskeln, *musculi thyreo-arytaenoides*.
5. Die schiefen Gießkannenknorpelmuskeln, *musculi arytaenoides obliqui*.

ie Gieflannentnorpel-Kehldedelmuskeln, musculi arytaenoidi-epiglottici.

er quere Gieflannentnorpelmuskel, musculus arytaenoides transversus, geht vom äußern Rand des einen Gieflannentnorpels quer zum äußern Rand des andern Gieflannentnorpels.

ie Schildnorpel-Kehldedelmuskeln, musculi thyreo-epiglottici.

Der vordern Seite des Halses, unterhalb der Schilddrüse, liegt auch die Schilddrüse, a thyroidea (Taf. 6; 3₂₀, Taf. 7; 1₁, Taf. 8; 1_T); ist den Bogen des Ringnorpels sowie das obere der Luftröhre von vorn und von der Seite. Besteht aus zwei Hörnern oder Seitenlappen, er cornua, welche durch einen schmälern Theil mus glandulae thyroideae miteinander verbunden werden.

Kehlkopf gehen Bänder zur Schilddrüse, die ngebänder der Schilddrüse, ligamenta soria glandulae thyroideae (Taf. 8; 1_P).

mittelbar an den Kehlkopf stößt die Luftröhre, oder arteria aspera (Taf. 6; 3_Z, Taf. 8; Taf. 9; 1_P). Dieselbe besteht aus 17 bis 20

ander liegenden halbmondförmigen Knorpeln, ch elastische Fasern sowie durch eine Muskel-

leimhaut zu einer Röhre zusammengefügt werden, an ihrem vordern Umfange gewölbt ist, an der

Seite aber platt durch eine Membran (Taf. 9; 1_V)

sen wird und vor den Körpern des sechsten

irbels etwas nach links neben der Luftröhre

liegt. Der oberste Knorpel der Luftröhre wird

das Ring-Luftröhrenband, ligamentum

cheale, mit dem Ringknorpel des Kehlkopfs

ven. Das untere Ende spaltet sich vor dem

des dritten Brustwirbels (vgl. Taf. 9; 1) in

este, Luftröhrenäste, bronchi.

Einzelnen C-förmigen Knorpel der Luftröhre heißen

öhrenringe, annuli cartilaginei tracheae

; 3_Z, Taf. 8; 1_D, 2₇), und sind die untern

n Enden oft gespalten.

Tiefe Schicht der Halsmuskeln.

Die tiefen Halsmuskeln lassen sich in zwei

n trennen, in solche, welche an der vordern

der Halswirbel, und solche, welche an der Seite

lswirbel liegen.

Tiefe Halsmuskeln an der vordern Fläche der

Halswirbel.

nger Halsmuskel, musculus longus colli

(Taf. 9; 1₁).

an der vordern Fläche der Hals- und obersten

rustwirbel.

se:

Die innerste Portion entspringt vom Körper

des dritten Brustwirbels, erhält Verstärkungs-

fasern von den höher gelegenen Wirbeln und

endet am Körper des Umdehlers.

Die unterste äußere Portion entspringt seit-

lich vom Körper des zweiten und dritten

Halswirbels und geht zum vordern Rande

der Querfortsätze der zwei bis drei letzten

Halswirbel.

Die obere äußere Portion entspringt vom

Querfortsatz des dritten und vierten Hals-

wirbels und geht zum tuberculum anticum

des Trägers.

Wirkung:

Ziehen sich alle drei Portionen des Muskels zu

gleicher Zeit zusammen, so beugen sie die Hals-

wirbelsäule und mit ihr den Kopf nach vorn.

2. Der vordere größere gerade Kopfmuskel,

musculus rectus capitis anticus major.

3. Der vordere kleine gerade Kopfmuskel,

musculus rectus capitis anticus minor.

Diese beiden Muskeln liegen nach außen am

langen Halsmuskel und unterstützen denselben in

seiner Wirkung.

b) Tiefe Halsmuskeln an der Seite der Hals-

wirbel.

1. Der seitliche gerade Kopfmuskel, musculus

rectus capitis lateralis.

Liegt zwischen dem Querfortsatz des Trägers und

dem Hinterhauptsbein.

2. Vorderer Rippenhalter, musculus scalenus

anticus (Taf. 6; 1₂₂, 2₂₂, 3₂₂, Taf. 7; 1₁₁, 2₂,

Taf. 8; 1₁₀).

Lage:

An der Seite des Halses.

Ansätze:

a) Die vordere Seite der Enden der Querfort-

sätze des dritten bis sechsten Halswirbels.

b) Der obere Rand der ersten Rippe.

Wirkung:

Ist die Wirbelsäule festgestellt, so zieht er die

erste Rippe in die Höhe, umgekehrt beugt er den

Hals nach seiner Seite, oder macht ihn gerade,

wenn er nach der andern Seite gebeugt ist.

3. Mittlerer Rippenhalter, musculus scalenus

medius (Taf. 6; 2₂₂, Taf. 7; 1₁₁, 2₂, Taf. 8; 1₁₁).

Lage:

Hinter dem vordern Rippenhalter, von welchem

er durch die Schlüsselbeinschlagader und das

Armnervengeflecht, die zwischen beiden Muskeln

hindurchgehen, getrennt wird.

Ansätze:

a) Der hintere Höder der Querfortsätze aller

sieben Halswirbel.

b) Der obere Rand der ersten Rippe.

Wirkung:

Ganz die des vorigen Muskels.

4. Hinterer Rippenhalter, musculus scalenus

posticus (Taf. 6; 2₂₂).

Lage:

Hinter dem mittlern Rippenhalter.

Ansätze:

a) Der hintere Höder der Querfortsätze des fünften

bis siebenten Halswirbels.

b) Der hintere Theil der zweiten Rippe.

Wirkung:

Hebt die zweite Rippe in die Höhe, oder beugt

den Hals nach seiner Seite.

III. Schultermuskeln.

Die auf dieser Tafel dargestellten Schultermuskeln

werden bei den Muskeln der obern Extremität auf

Tafel 13 besprochen, siehe deshalb wegen des

1. Deltamuskels, musculus deltoideus (Taf.

6; 1₂₂), S 114;

2. Untergrätenmuskel, musculus infraspi-

natus (Taf. 6; 2₂₁), S 114;

IV. Nackenmuskeln.

Die Erklärung der Nackenmuskeln dieser Tafel befindet sich bei der der Rückenmuskeln auf Taf. 9, siehe deshalb wegen des

1. Kappenmuskels, *musculus cucullaris* (Taf. 6; 1₁₀), S 92;
2. Bauischmuskels des Kopfes, *musculus splenius capitis* (Taf. 6; 1₂₀, 2₁₀), S 93;
3. Bauischmuskels des Halses, *musculus splenius colli* (Taf. 6; 1₂₁, 2₂₀), S 93;
4. zweibäuchigen Nackenmuskels, *musculus biventer cervicis* (Taf. 6; 2₁₀), S 93;
5. Schulterblattheber, *musculus levator anguli scapulae* (Taf. 6; 1₂₂, 2₂₁), S 93;
6. kleinen Rückenmuskels, *musculus rhomboideus minor* (Taf. 6; 2₂₂), S 93.

Blutgefäße des Halses und Kopfes.

Es ist hier unmöglich und würde dem Zwecke dieser Blätter durchaus nicht entsprechen, wenn wir alle einzelnen Blutgefäße aufzählen und namhaft machen wollten; wir beschränken uns deshalb nur auf die vorzüglichsten und heben nur die hervor, die auf den Tafeln sichtbar und zur Anschauung gelangt sind.

I. Pulsadern.

Sämmtliche Gefäße des Halses und Kopfes gehen aus den drei Pulsadern hervor, welche im Bogen der großen Körperpulsader, *arcus aortae* (Taf. 6; 3a. Taf. 8; 2a. Taf. 9; 1a), ihren Ursprung haben.

Es sind dies:

1. Die ungenannte Pulsader, *arteria anonyma* oder *innominata* (Taf. 6; 3b. Taf. 8; 1a, 2b. Taf. 9; 1c), welche sich in zwei Zweige theilt, in
 - a) die rechte gemeinschaftliche Kopfschlagader, *arteria carotis communis dextra* (Taf. 7; 1a. Taf. 8; 1b. Taf. 9; 1d), und in
 - b) die rechte Schlüsselbeinpulsader, *arteria subclavia dextra* (Taf. 8; 1d. Taf. 9; 1e).
2. Die linke gemeinschaftliche Kopfschlagader, *arteria carotis communis sinistra* (Taf. 8; 1c, 2c. Taf. 9; 1m).
3. Die linke Schlüsselbeinpulsader, *arteria subclavia sinistra* (Taf. 6; 2d. Taf. 7; 2c. Taf. 8; 1e, 2d. Taf. 9; 1n).

Die gemeinschaftliche Kopfschlagader.

Die gemeinschaftliche Kopfschlagader, *arteria carotis communis*, entspringt, wie wir gesehen haben, rechts aus der ungenannten Pulsader, links unmittelbar aus dem Bogen der Aorta. Sie theilt sich in zwei Aeste, in:

- I. Die äußere Kopfpulsader, *carotis externa* oder *facialis* (Taf. 6; 1a, 2a. Taf. 7; 1b), und in
- II. Die innere Kopfpulsader, *carotis interna* oder *cerebralis* (Taf. 6; 2b, 3c, 5₁₁. Taf. 7; 1c, 2a).

I. Zweige der äußern Kopfpulsader:

1. Obere Schilddrüsenpulsader, *arteria thyroidea superior* (Taf. 6; 2c. Taf. 7; 1d. Taf. 8; 1f).
 2. Zungenpulsader, *arteria lingualis* (Taf. 6; 1d. Taf. 7; 1e. Taf. 8; 1g).
 3. Antlispulsader, *arteria maxillaris externa* oder *facialis* (Taf. 6; 2e. Taf. 7; 1f. Taf. 8; 1h).
- Letztgenannte Pulsader gibt wieder folgende bemerkenswerthe Zweige ab:

- a) Die Unterkinnpulsader, *arteria submentalis* (Taf. 6; 2f).
- b) Die Kranzpulsadern der Lippen, *arteriae*

coronariae labiorum (Taf. 6; 1b, 1). diese sind wieder eine

- a) Kranzpulsader der Unterlippe, *arteria coronaria labii inferioris*, und
- ß) Kranzpulsader der Oberlippe, *arteria coronaria labii superioris*.
- c) Die Augenwinkel-Pulsader, *arteria angularis* oder *nasalis lateralis* (Taf. 6; 1d, 2i).
- d) Die Hinterhauptpulsader, *arteria occipitalis* (Taf. 6; 1d, 2i).
- e) Die hintere Ohrpulsader, *arteria auricularis posterior* (Taf. 6; 1e, 2i).
- f) Die Schläfenpulsader, *arteria temporalis* (Taf. 6; 1f, 2i).

Aus dieser gehen hervor die Zweige:

- a) Die quere Antlispulsader, *arteria transversa faciei* (Taf. 6; 1e, 2i).
- ß) Der Stirnzweig oder vorderer ramus frontalis oder anterior (Taf. 6; 1h, 2h).
- γ) Der Hinterhauptzweig, *ramus occipitalis posterior* (Taf. 6; 1i, 2o).

g) Die innere Kieferpulsader, *arteria maxillaris interna* (Taf. 6; 2p).

II. Zweige der innern Kopfpulsader:

1. Augenpulsader, *arteria ophthalmica* (Taf. 6; 3e, 4₁₃, 6₁₄).

Diese gibt wiederum folgende Aeste ab:

- a) Die Thränenpulsader, *arteria lacrimalis* (Taf. 6; 4₁₄).
- b) Die Oberaugenhöhlenpulsader, *arteria supra-orbitalis* (Taf. 6; 4₁₅).
- c) Die Stirnpulsader, *arteria frontalis* (Taf. 6; 1k, 2q).

2. Halsenpulsader, *arteria cervicalis* (Taf. 6; 3f).

Die Schlüsselbeinpulsader.

Die Schlüsselbeinpulsader entspringt aus der rechten gemeinschaftlichen Kopfschlagader, der ungenannten Pulsader, links direct aus dem Bogen und gibt folgende beachtenswerthe Zweige ab:

1. Die Wirbelpulsader, *arteria vertebralis* (Taf. 9; 1f). Dieselbe geht durch das große Hinterhaupt des Schädels, wo auf dem Grundtheile des Hauptbeins sich die einen Seite mit der andern zur *arteria basilaris* (Taf. 6; 3d) verbindet.
2. Oberflächliche Nackenpulsader, *arteria cervicalis superficialis* (Taf. 6; 2b).
3. Quere Schulterblattpulsader, *arteria transversa scapulae* (Taf. 6; 2f).

II. Blutadern.

Die Blutadern, *venae*, entstehen aus den Enden der Pulsadern, den Haargefäßen, dieselben zu immer größeren Stämmen zusammenzusetzen. Die Blutadern des Kopfes und Halses sind sämmtlich in der obern Hohlvene, *vena superior* oder *descendens* (Taf. 6; 3g), vereinigt. Diese wird wiederum zusammengeleitet aus der gemeinschaftlichen Drosselvene, *vena cava superior* oder *venae jugulares communes* (Taf. 8; 1o).

Zweige derselben sind:

1. Die innere Drosselader, *vena cava interna* (Taf. 7; 1k, 2d. Taf. 8; 1i), gebildet wird aus:

a) der gemeinschaftlichen Gesichtsb Blutader, vena facialis communis oder vena cephalica anterior, auch vena cephalica externa.

setzt sich wiederum zusammen aus:

der vordern Gesichtsvene, vena facialis anterior (Taf. 6; 1h),

der hintern Gesichtsvene, vena facialis posterior (Taf. 6; 1m), die ihren Ursprung nimmt aus:

der oberflächlichen Schläfenvene, vena temporalis superficialis (Taf. 6; 1n), und der tiefern Schläfenvene, vena temporalis profunda (Taf. 6; 1o).

b) der innern Kopfvene, vena jugularis cerebialis, auch cephalica posterior oder interna.

Sie nimmt ihren Ursprung im foramen jugulare unterhauptbeins und entsteht unmittelbar aus der Blutleiter, sinus transversus (Taf. 6; 3i), des hintern Hirnhautes. Derselbe liegt im sulcus transversus hinterhauptbeins und im hintern Rande der Falx cerebri, tentorium cerebelli.

Die Querblutleiter ergießen sich:

in die obere Längs- oder Sichelblutleiter, longitudinalis superior (Taf. 6; 3h), welcher aus longitudinalis und obern Rande der großen Sichel, falx cerebri, liegt, und

in die Zeltblutleiter, sinus quartus oder percularis, mit dem untern Längsblutleiter, sinus longitudinalis inferior (Taf. 6; 3m). Das hintere Ende der Blutleiter ergießt sich in den Querblutleiter, an der Stelle eine Erweiterung des Gefäßes statt, welche die Presse des Herophilius, dorerophili (Taf. 6; 3k), genannt wird.

Zu erwähnen ist hier: 1) Die Gehirn-Augen- vena ophthalmica cerebialis (Taf. 6; 4, 6, 11), der Augenpulsader entspricht, durch die obere Höhlenspalte in den Schädelraum tritt und sich in den Zeltblutleiter der harten Hirnhaut ergießt. 2) Die äußere Drosselader, vena jugularis externa oder superficialis (Taf. 6; 14. Taf. 7; 1e), welche sich der Hinterhauptsarterie, ramus occipitalis, ergießt. 3) Die äußere vordere Drosselader, vena jugularis externa anterior (Taf. 7; 1m), sehr variabel ist, und sich auch in die äußere Halsader ergießt. 4) Die Schlüsselbeinvene, subclavia (Taf. 6; 2n), sie ist die Fortsetzung der Halsvene, vena axillaris, in welche sich die Oberarmhautvene, vena cephalica oder vena radialis (Taf. 6; 1p), ergießt.

Gehirn und Nerven des Kopfes und Halses.

I. Das Gehirn.

Das Gehirn, encephalon, ist in der Schädelhöhle, es ausfüllt, sodass die Erhabenheiten und Vertiefungen des Gehirns an der innern Lamelle der Innenschale im Abdruck erscheinen, eingeflossen, von drei Häuten, den Hirnhäuten, überzogen. Die drei Hirnhäute, tunicae oder velamenta cerebri, sind drei ineinandergestülpte Säcke dar, welche zusammen das Gehirn umgeben und am großen Hinterhauptsloch sich in den Nüchternkanal erstrecken und bis das Rückenmark in derselben Weise, wie das Gehirn, umgeben.

Die drei Hirnhäute sind:

1. Die harte Hirnhaut, dura mater cerebri oder meninx fibrosa (Taf. 6; 3a), und die harte

Rückenmarkshaut, dura mater medullae spinalis (Taf. 6; 3a). Sie bilden einen fibrösen Sack für Gehirn und Rückenmark, der nur von durchgehenden Gefäßen und Nerven durchbohrt wird, und für den Schädel zugleich die innere Knochenhaut, das pericranium internum, darstellt. An einigen Stellen bildet die harte Hirnhaut doppelte Blätter, welche längliche, plattrunde und dreieckige Lücken zwischen sich lassen, welche venöses Blut führende Kanäle, die sogenannten von uns schon oben angeführten Blutleiter, sinus durae matris (Taf. 6; 3i, 3k, 3l, 3m), darstellen.

2. Die Spinnwebhaut, tunica arachnoidea oder meninx serosa. Sie ist die mittlere der drei das Gehirn umgebenden Häute, zarter und durchsichtiger als die harte Hirnhaut, und geht am großen Hinterhauptsloch ohne Unterbrechung in die Spinnwebhaut des Rückenmarks, tunica arachnoidea spinalis, über. An der Außenfläche der Spinnwebhaut befindet sich ein einfaches Plästerepithel, das sich auf die innere Fläche der harten Hirnhaut fortsetzt, zwischen welchen beiden Häuten sich eine mäßige Menge seröser Flüssigkeit befindet.

3. Die weiche Hirn- oder Gefäßhaut, pia mater oder meninx vasculosa, die dünnste, feinste und innerste der drei Hirnhäute. Sie ist überaus reich an Blutgefäßen, liegt der Oberfläche des Gehirns unmittelbar auf, in dessen Vertiefungen, Spalten und Furchen sie einbringt, und in welchen lektorn sie die sogenannten Überhautgeflechte, plexus chorioidei, bildet, von denen eine (Taf. 6; 3c) sichtbar ist.

Das Gehirn, encephalon, selbst theilt man in drei Abschnitte, das große Gehirn, cerebrum, das kleine Gehirn, cerebellum, und in das Mittelhirn, mesencephalon, ein.

1. Das große Gehirn.

Das große Gehirn, cerebrum (Taf. 6; 3v), füllt den größten Theil der Schädelhöhle aus, und nimmt den ganzen obern gewölbten Theil ein. Es wird von oben her durch eine in der Mitte verlaufende tiefe Längenspalte, fissura longitudinalis cerebri, welche auf unserer Tafel in Fig. 3 mit dem Durchschnitt zusammenfällt und bis zu den Balken, corpus callosum (Taf. 6; 3e), reicht, in zwei gleiche Seitenhälften, die beiden Hemisphären, hemisphaera cerebri, von denen unsere Tafel, Fig. 3v, die rechte Hemisphäre, hemisphaera dextra, zeigt, getheilt. Die Hemisphären bestehen hauptsächlich aus dem Hirnstiele, pedunculus cerebri, sowie den Hirnganglien, derartigen weißen Centralmasse und aus der grauen Substanz, welche sich an der Oberfläche ausbreitet. Jede Hemisphäre hat in ihrem Innern eine seitliche Höhle, ventriculus lateralis.

Der Hirnstiel oder die Hirnstiele, crura oder pedunculi cerebri, sind zwei rundliche Stränge, welche vom obern Rande der Brücke, pons (Taf. 6; 3x) sich divergirend schräg nach oben, vorn und außen, zu den Großhirnhemisphären erstrecken.

Die Hirnganglien werden gebildet aus dem Streifenhügel und dem Sehhügel.

Der Streifenhügel oder gestreifte Körper, corpus striatum, auch ganglion cerebri anterius (Taf. 6; 3u), ist ein dicker Körper, bestehend aus abwechselnden Lagen grauer und weißer Nervensubstanz, der den Boden des Seitenventrikels auf jeder Seite bilden hilft.

Der Sehhügel, thalamus nervi optici oder ganglion cerebri posterius (Taf. 6; 3o), ist wie der vorige paarig, liegt hinter dem Streifenhügel und sieht mit seiner obern gewölbten Fläche in den Seiten-

ventrikel. Der untere Theil der innern und senkrecht liegenden Fläche des Sehhügels bildet die Seitenwand des dritten Ventrikels.

Die dritte Hirnhöhle, *ventriculus tertius cerebri* (Taf. 6; 34), ist eine schmale, nach hinten sich etwas erweiternde, in der Mittellinie des großen Gehirns zwischen den beiden Sehhügeln liegende Spalte, die daher auf unserer Figur auch gerade in den Durchschnitt fällt.

Die Seitenventrikel, *ventriculi laterales*, in jeder Hemisphäre des großen Gehirns befindlich, sind durch eine Scheidewand, die durchschnitten die große, *septum pellucidum*, und das Gewölbe, *fornix*, voneinander geschieden, und stehen nur durch eine halbmondförmige Röhre, das Monroische Loch, *foramen Monroi*, (Taf. 6; 3e), untereinander und mit dem dritten Ventrikel in Verbindung.

Die Hauptmasse der Hemisphären besteht aus der weißen Centralsubstanz, die von der grauen Nervensubstanz, welche in darmähnlichen Windungen, mit mehr oder minder tiefen Einschnitten die Oberfläche des großen Gehirns bildet, überdeckt wird.

In der Mittellinie zwischen beiden Hemisphären befinden sich mehrere unpaare Theile des Gehirns, von denen wir den Balken erwähnen.

Der Balken, *corpus callosum* *trabeculae cerebri*, auch *commisura magna* (Taf. 6; 3f), ist ein länglicher, platter, weißer, aus Quersfasern zusammengesetzter Körper, welcher sich von vorn nach hinten erstreckt und die Längspalte des Gehirns nach unten begrenzt. Man unterscheidet am Balken drei Theile: den Körper oder Stamm, *truncus corporis callosi*, welcher den mittlern Theil bildet, ferner das Balkenknie, *genu corporis callosi* (Taf. 6; 3g), das vordere Ende, welches sich unrollt und in den nach unten und hinten gerichteten Balkenschäbel übergeht, und drittens den Balkenwulst, *splenium corporis callosi*, welche das hintere, freie und dicke Ende des Balkens bildet, welches nach unten auf den beiden Schenkeln des Gehirns, *fornix*, aufliegt und die Vierhügel sammt der Zirbeldrüse bedeckt. Nach hinten stößt der Balkenwulst auf das kleine Gehirn.

2. Das Mittelhirn.

Das Mittelhirn, *mesencephalon*, wird aus den Theilen, welche das große und kleine Gehirn, sowie Rückenmark miteinander verbinden, gebildet, und besteht aus dem verlängerten Mark, der Brücke und den Vierhügeln.

1. Das verlängerte Mark, *medulla oblongata* (Taf. 6; 3h), ist der oberste dicke Theil des Rückenmarkes, welcher unter dem kleinen Gehirn gelegen ist und von dem untern Rande der Brücke bis zum großen Hinterhauptslöcher reicht. Es besteht fast ganz aus weißer Substanz, die Fasernzüge in der Richtung der Längsachse bildet. Vorn und hinten werden dieselben durch eine Längspalte in zwei Hälften getheilt, an deren jeder drei Anschwellungen sichtbar sind: die Pyramiden, *corpora pyramidalia* oder *pyramides*, die Oliven, *corpora olivaria* oder *olivae*, auch *crura medullae oblongatae* ad *corpora quadrigemina* und die strangförmigen Körper, *corpora testiformia* oder *crura cerebelli* ad *medullam oblongatam*.

Die Pyramiden nehmen den vordersten Theil des verlängerten Markes unmittelbar neben der vordern Längspalte ein; die Oliven liegen nach außen von den Pyramiden, zur Seite des verlängerten Markes, während die strangförmigen Körper den hintern Theil desselben bilden, untereinander nur von der hintern Rückenmarkspalte getrennt. Nach oben reichen

sie auseinander und treten in das kleine Gehirn, wodurch sie zur Bildung der vierten Hirnhöhle beitragen.

Die vierte Hirnhöhle, *ventriculus quartus* (Taf. 6; 3i), befindet sich wie die dritte in der Mittellinie des Gehirns, und wird ebenfalls von dem Durchschnitt, welchen unser Schnitt getroffen. Sie stellt einen rautenförmigen Raum dar, welcher unten und oben enger, in der Mitte auf beiden Seiten erweitert ist. Der Boden der vierten Hirnhöhle bildet die vordere Wand des vierten Ventrikels, die obere Fläche der Brücke und der *calamus scriptorius* oder *sinus rhomboidalis oblongatae*, gebildet. Das Dach oder die hintere Wand stellt die untere Wand des kleinen Gehirns und von diesem wiederum die untere Wand des vierten Ventrikels dar. Die Seitenwände entstehen von den aufeinander ruhenden Strangförmigen Körpern, oben von den Schenkeln des großen Gehirns, zu den Vierhügeln gebildet. Das Ende des vierten Ventrikels hat eine Oefnung in die Spinoische Wasserleitung, *aqueductus Sylvii*, und durch diese zum dritten Ventrikel.

2. Die Brücke oder der Hirnstamm, *pons* (Taf. 6; 3d, Taf. 7, 2a), stellt einen breiten, ringförmigen, durch den Taf. 6, 3e, einen Querschnitt zeigt. Die Brücke liegt im Schädel zwischen dem verlängerten Mark und dem kleinen Gehirn. Die Brücke besteht aus dem Längs- und Quersfasern von weißer Substanz, welche die ersten von den Pyramiden, den Schenkeln, und von den Oliven in die Richtung der vierten Hirnhöhle gehen.

3. Die Vierhügel, *corpora quadrigemina* (Taf. 6; 3f), bilden den obern Theil des Mittelhirns und bestehen aus vier rundlichen, an seine obere Endfläche dem Balkenwulst gerichteten Fläche, mit vier versehenen Körpern dar. Auf den beiden Vierhügeln liegt die Zirbeldrüse, *glandula pinealis* (Taf. 6; 3v), auf, ein ovales röhrenförmiges Organ, welches mehrere rundlich edige Gebilde, den Hirnschankel, *arcervulus cerebri*, enthält.

3. Das kleine Gehirn.

Das kleine Gehirn, *cerebellum* (Taf. 6; 3j), wird gleichfalls in zwei Hälften, eine rechts, eine links, *hemisphaera dextra* und *sinistra*, getheilt, die durch den mittlern Theil, den Vermis, getrennt werden.

Jede Hemisphäre zerfällt durch den Hinterspalz, *sulcus horizontalis* oder *transversus*, in obere und eine untere Hälfte, und jeder Theil in einen Schenkel und einen Markkörper.

1. Die Lappen, *lobuli*, befinden sich auf der oberen Fläche des Kleinhirns, und werden durch die Horizontalspalte ziemlich concentrisch in Einschnitte voneinander getrennt.

2. Die Schenkel des kleinen Gehirns, *crura cerebelli*, sind die drei bereits erwähnten Schenkel, *crura cerebelli ad pontem*, *crura cerebelli ad corpora quadrigemina* und *crura cerebelli ad medullam oblongatam*.

3. Der Markkörper der Hemisphären, *medullae* (Taf. 6; 3k), bilden den Kern des Kleinhirns, bestehend aus dem Kern des Kleinhirns, mit den Schenkeln zusammen. Von außen eindringenden, bald tiefer

tte, welche die Lappen bilden, ist der Marktsack zerklüftet und in Aeste gespalten, welche r Oberfläche mit grauer Substanz umgeben iefe baumförmige Verzweigung des Markkörpers r Lebensbaum, arbor vitae (Taf. 6; 3c'). mittlere, beide Hemisphären trennende Theil en Gehirns, der auf unserer Figur gleichfalls Durchschnittebene liegt, der Wurm, vermis, durch den Horizontalspalt ebenfalls in)erwurm, vermis cerebelli superior, und nterwurm, vermis cerebelli inferior.

II. Die Sehnerven.

irnerven, nervi cerebrales, zählt man zwölf ie sind:

Der Geruchsnerv, nervus olfactorius, oder tractus olfactorius. Derselbe liegt an der untern Fläche des vorderen Hirnlappens und endet auf der Siebplatte des Siebbeins, durch welche er zahlreiche Nervenfasern zum Geruchsorgan senket.

Der Sehnerv, nervus opticus (Taf. 6; 3a, 4₂₀, 4₂₀, 5₁₀, 6₁₀), entspringt aus der Sehnervenkreuzung, chiasma nervorum opti- corum (Taf. 6; 4₂₁), welche aus dem Seh- streifen, tractus nervorum opti- corum (Taf. 6; 4₂₀, 4₂₀), der vom Auge abgewendete Theil vor der Kreuzung, gebildet wird. Hinter der Sehnervenkreuzung liegt in der Grube des Türkensattels der Hirnanhang, glandula pituitaria oder hypophysis cerebri (Taf. 6; 3x), welcher am Ende des grauen Höders, tuber cinereum, hängt. Von der Sehnervenkreuzung aus läuft der Sehnerv zum Sehnervenloch, durch welches er in die Augenhöhle und zum Augapfel gelangt. Er ist von einer Scheide, der Sehnervenscheide (Taf. 6; c₂), ein- gehüllt, die eine Fortsetzung der harten Hirn- haut ist.

Der gemeinschaftliche Augenmuskel: nerv, nervus oculomotorius (Taf. 6; 3b, 6₁₁, Taf. 7; 2a), welcher durch die obere Augen- höhlenpalte in die Augenhöhle und zu den Augenmuskeln gelangt, welche er sämtlich, mit Ausnahme des musculus obliquus superior und musculus rectus externus, innervirt.

Der Rollmuskelner, nervus trochlearis oder patheticus (Taf. 6; 3a, 4₂₂ Taf. 7; 2a'). Derselbe gelangt gleichfalls durch die obere Augenhöhlenpalte in das Auge und gibt vorzugs- weise Zweige zum musculus obliquus superior. Der dreigetheilte Nerv, nervus trigeminus (Taf. 6; 3b, 5₁₄). Derselbe entsteht aus einer hinter größeren sensibeln Wurzel, portio major, und einer vordern kleinern motorischen Wurzel. Vor der Dreitheilung schwillt die größere Partie zu einem platten Knoten, dem halbmondförmigen Knoten, ganglion semilunare oder ganglion Gaseri (Taf. 6; 5₁₄), an. Dieses Ganglion theilt sich in drei Aeste:

- a) den Augenhöhlennerv, nervus ophthalmicus oder ramus primus nervi tri- gemini, welcher durch die obere Augen- höhlenpalte in die Augenhöhle tritt,
- b) den Obertieferner, nervus maxil- laris superior oder ramus secundus nervi trigemini (Taf. 6; 3c, 5₁₁), wel- cher durch das runde Loch und die Kiefer- Reilbeingrube gelangt, und

c) den Untertieferner, nervus maxil- laris inferior oder ramus tertius nervi trigemini (Taf. 6; 3c, 5₁₀), welcher durch das ovale Loch aus dem Schädel heraustritt.

Von dem ersten Aste des Trigeminus ist auf unserer Tafel nur sichtbar der Stirnnerv, nervus frontalis (Taf. 6; 3b), mit dem Oberaugenhöhlen- nerv, nervus supra orbitalis (Taf. 6; 1a, 2a), und der Oberrollnerv, nervus supra-trochlearis (Taf. 6; 2b), sowie der Nasen-Augennerv, nervus nasalis oder nasociliaris (Taf. 6; 6₁₀), mit den Blendungs- nerven, nervi ciliares (Taf. 6; 3a, 4₁₀) und der Thränendrüsennerv, nervus lacrymalis (Taf. 6; 4₁₀).

Von dem zweiten Aste des Trigeminus ist nur dargestellt der Wangenhautnerv, nervus subcutaneus maxillae (Taf. 6; 1b), der Keilbein- Gaumenner, nervus spheno-palatinus, mit dem Gaumenleilbein- oder Nasentnoten, ganglion spheno-palatinum (Taf. 6; 3b), sowie der Unter- augenhöhlennerv, nervus infraorbitalis (Taf. 6; 1a, 2a, 3a, 6a).

Von dem dritten Aste des Trigeminus, mit dem sich auch die kleine motorische Wurzel verbindet, erwähnen wir nur noch den Ohrknoten, ganglion oticum (Taf. 6; 3x), welcher mit dem Ohrschlafes- nerven, nervus auriculo-temporalis (Taf. 6; 2b), in Verbindung tritt, und den untern Zahnner, nervus alveolaris inferior, welcher den Kinnast, ramus mentalis (Taf. 6; 1b, 2c) bildet.

Die übrigen Hirnnerven, welche auf unserer Ab- bildung nur zum Theil zur Anschauung gebracht wer- den können, erwähnen wir nur kurz, sie sind:

6. Der äußere Augenmuskelnerv, nervus abducens (Taf. 7; 2y).
7. Der Gesichtsnerv, nervus facialis oder com- municans facies (Taf. 6; 2c Taf. 7; 2b), welcher durch den Fallopiischen Kanal geht, und durch das Griffelwarzenloch aus dem Schädel heraus- tritt. Derselbe gibt den hintern Ohrner, nervus auricularis posterior (Taf. 6; 2a) ab und bildet das Ohrspeicheldrüsengeflecht, plexus parotideus oder pes anserinus (Taf. 6; 2b), aus welchem die Schläfennerven, nervi temporales (Taf. 6; 2c) und die Zoch- beinnerven, nervi zygomatici (Taf. 6; 2x) hervorgehen.
8. Der Gehörnerv, nervus acusticus oder auditorius (Taf. 7; 2b).
9. Der Zungenschlundkopfnerv, nervus glosso-pharyngeus (Taf. 7; 2c).
10. Der Zungenmagennerv, auch der herum- schweifende Nerv genannt, nervus vagus (Taf. 7; 2a).
11. Der Beinerv, nervus accessorius Willisci (Taf. 6; 1c, 2a. Taf. 7; 2c).
12. Der Zungenfleischnerv, nervus hypo- glossus (Taf. 6; 2a. Taf. 7; 2v).

III. Rückenmarksnerven.

Die Rückenmarksnerven, nervi spinales, zer- fallen in 8 Paare Halsnerven, nervi cervicales, 12 Paare Brustnerven, nervi dorsales, 5 Paare Lendenner, nervi lumbales, 5 Paare Kreuz- beinnerven, nervi sacrales, und 1 oder seltener 2 Paare Steißbeinnerven, nervi coccygei.

Die Nerven des Rückenmarks entspringen mit einer doppelten Wurzel, einer vordern und hintern, von den vordern und hintern Strängen an jeder Seite

des Rückenmarks. Beide Wurzeln, von denen die vordere Bewegungsfasern, die hintere Empfindungsfasern enthält, vereinigen sich zu einem Rückenmarksnerven, der auf jeder Seite durch das Zwischenwirbelloch aus der Wirbelsäule hervortritt und sich in einen vordern und hintern Ast spaltet.

Die Halsnerven.

Von den Halsnerven, *nervi spinales cervicales*, vereinigen sich die vier obern durch Zweige, welche ihre vordern Äste gegenseitig abgeben, wodurch Schlingen entstehen, aus denen das Halsgeflecht, *plexus cervicalis*, gebildet wird, welches dann wieder Zweige abgibt. So entsteht aus dem zweiten Halsnerven der große Hinterhauptsnerv, *nervus occipitalis magnus* oder *majus* (Taf. 6; 17, 2v), und aus der Schlinge zwischen dritten und vierten Halsnerven, der kleinere Hinterhauptsnerv, *nervus occipitalis minor* (Taf. 6; 17, 2E), und der große Ohrnerv, *nervus auricularis magnus* (Taf. 6; 15), während aus der Schlinge zwischen vierten und fünften Halsnerven die Oberklässelbeinnerven, *nervi supra-claviculares* (Taf. 6; 1c), hervorgehen.

Die vier untern Halsnerven haben bedeutend stärkere vordere Äste als die obern Halsnerven; dieselben vereinigen sich unter spigen Winkeln miteinander und bilden das Armgeflecht, *plexus brachialis* (Taf. 6; 2π).

IV. Der sympathische Nerv.

Der sympathische Nerv, *nervus sympathicus*, läuft zu beiden Seiten der Wirbelsäule herab, wo er zahlreiche Nervenknoten, *ganglia*, bildet, von denen der erste, der oberste Halsnervenknoten, *ganglion cervicale supremum* (Taf. 6; 3), auf unserer Tafel sichtbar ist.

1. Das Auge.

Das Auge oder Seheorgan, *oculus* oder *organon visus*, liegt in der Augenhöhle, und wird gebildet vom Augapfel und einer Anzahl von Nebenorganen, welche den Augapfel zum Theil in dessen Verrichtungen unterstützen, theils denselben schützen und reinigen, wozu die Augenbrauen, Augenlider, Thränenbrüsen u. s. w. gehören.

Der Augapfel, *bulbus oculi* (Taf. 6; 3, 4, 5₂₀), ist das Hauptorgan des Gesichtsinnes. Derselbe wird gebildet aus drei concentrisch umeinander herumliegenden Häuten, in deren innern sich ein wasserheller Kern befindet. Der Augapfel in Gestalt einer Kugel, die an ihrer vordern Seite eine sphärische Erhebung, die Hornhaut hat, ist in dem Telle der Augenhöhle eingebettet und kann durch die von uns bereits besprochenen Augenmuskeln auf das leichteste nach allen Richtungen hin bewegt werden.

Die drei den Augapfel bildenden Häute sind von außen gezählt: die harte Augenhaut, die Aderhaut und die Netzhaut.

1. Die harte oder weiße Augenhaut, *tunica sclerotica* oder *albuginea* (Taf. 6; 4₂₇, 6₁₀), ist von außerordentlicher Steifigkeit, sie bildet die äußerste Lage der Augenhäute und gibt dem Augapfel seine Form. An dieselbe setzen sich die verschiedenen Augenmuskeln an. Die in ihrem größten Umfange weiße, undurchsichtige, aus Bindegewebsfasern bestehende Haut, hat an ihrer vordern Seite eine etwas stärker gestrümmte, durchsichtige Stelle, die Hornhaut, *tunica cornea* (Taf. 6; 4₂₂, 6₂₂), welche den Lichtstrahlen den Durchgang gestatten, um ins Innere des Auges zu gelangen. Da wo die hintere Kante des Sclerotica-

randes sich mit der Hornhaut verbindet, bildet ein Kanal, der wie die Vereinigungshaut ist, und der Schlemm'sche Kanal, *canalis sin. circularis venosus iridis* (Taf. 6; 4₂₂, 6₂₂), heißt, der ein venöses Gefäß ist, und der in der Regenbogenhaut als Abzugskanal dient. In der hintern innern Theile wird die harte Augenhaut den Sehnerven (Taf. 6; 4₂₀, 4₂₀, 6₁₁) an-

2. Die Gefäß- oder Aderhaut, *tunica vasculosa* (Taf. 6; 4₂₇, 6₁₀), bildet die Lage der Augenhäute und liegt der Regenbogenhaut an der innern Fläche unmittelbar an. Sie ist dünn, sehr gefäßreich und reichlich mit Blut versehen, wodurch sie eine schwarzbraune Farbe und zur Abhaltung durch die Sclerotica dient, sowie zur Auffangung überflüssigen Blutes. Man unterscheidet an der Aderhaut drei Theile; der wichtigste ist die Regenbogenhaut, die Blendung, auch Augensitter, *iris* (Taf. 6; 4₂₁, 6₂₁), genannt. Derselbe ist eine dünn verschiedene gefärbte, sehr gefäß- und nervenreiche Haut, welche die Aderhaut, deren vordern Segment fehlt, nach vorn begrenzt. Sie besteht aus einer in der Mitte von einem kreisförmigen Sehloch, *pupilla*, durchbohrten Scheibe, die hinter der Hornhaut, wie das Stüßstück hinter dem Ubrglatze. Der Raum zwischen der Hornhaut und der Regenbogenhaut heißt die vordere Augenkammer, *camera oculi anterior*, welche von der Regenbogenhaut und der Aderhaut begrenzt ist; die hintere Augenkammer, *camera oculi posterior*, welche die Pupille mit der vordern in Verbindung bringt, und die Aderhaut von beiden spült. Die Muskelfasern der Aderhaut sind ringförmigen Muskel, den Verengerer der Pupille, *musculus sphincter pupillae*, und der Erweiterer, *musculus dilatator pupillae*, angeordnet. Die Aderhaut mit der Regenbogenhaut vereinigt, beginnt der Ubrkörper oder Faltenkranz, *corpus ciliare*, an der vordern Theil der gewölbten Aderhaut und die Linse ringförmig umgibt.

3. Die Netz- oder Nervenhaut, *tunica n. retina* (Taf. 6; 4₂₇, 6₁₀), ist die dritte und äußerste Lage der Augenhäute, von außerordentlicher Zartheit, vollkommen durchsichtig. Sie dient dem Seheorgan zur Ausbreitung, der etwas nach innen liegende, in Gestalt eines flachen Hügel, *papilla* oder *colliculus nervi optici*, in der innern Fläche der Netzhaut hervorsticht und membranartig auseinandergehend mit der Aderhaut, dem sogenannten latoptrischen Apparat des Auges, in Verbindung tritt.

Dem latoptrischen Apparat entgegengeordnet ist der dioptrische, welcher aus der Hornhaut und dem Kammerwasser besteht, aus der Krystalllinse und dem Glaskörper. Alle diese Theile sind durchsichtig und lassen das Licht von außen durch die Hornhaut eindringenden bis zur Netzhaut gelangen.

Die Linse oder Krystalllinse, *lens* (Taf. 6; 4₂₀, 6₂₁), ist ein durchsichtiger Körper, welcher die Gestalt einer doppelt gekrümmten Linse hat, deren hintere Fläche flacher als die vordere, gewölbt ist. Sie liegt in einem Kapsel, *capsula lentis*, eingebettet.

hinter der Pupille in einer der hintern stark in die Fläche entsprechenden Vertiefung des Glaskörpers. Um den kreisförmigen Rand der Linse läuft der vitreus Kanal, *canalis Petitii* (Taf. 6; 4₃₀, 6₃₃), auf seinem Durchschnitt von dreieckiger Gestalt, geschlossen und mit einer wässrigen Flüssigkeit gefüllt.

Der Glaskörper, *corpus vitreum* (Taf. 6; 4₂₀, 6₃₀), das Auge ausfüllender und dessen innere Begrenzende Körper. Er besteht aus der sogenannten Glaskörperflüssigkeit, *humor vitreus*, die die Glaskörperhaut, *membrana hyaloidea* oder *vitreosa*, ist. Derselbe theilt sich in zwei Blätter, ein vorderes und ein hinteres dünneres, welches die hintere Wand der Linsenkapsel anlegt und sich vergrößert, während das vordere Blatt zum vordern geht. Durch das Auseinanderweichen der Blätter der Glaskörperhaut entsteht der schon erwähnte vitreus Kanal.

Die Schutz- und Stützorganen für den Augapfel außer den bereits behandelten Augenmuskeln sind die Augenhöhle noch zu erwähnen die Brauen, *supercilia*, und die Augenlider, *palpebrae* (Taf. 6; 3₁, 4₃₃), von welchen man ein oberes Augenlid, *palpebra superior* (Taf. 6; 6₂₃), und ein unteres Augenlid, *palpebra inferior* (Taf. 6; 6₂₃) unterscheidet. Die Augenlider werden von der äußern Haut, *integumentum palpebrae* (Taf. 6; 5₃₃), darauf folgt die von dem vorderen Muskel der Augenlider, *musculus orbicularis palpebrarum* (Taf. 6; 1₂, 2₃) gebildete Muskelschicht des Augenlides, *stratum musculare palpebrae* (Taf. 6; 5₃₃), nach innen davon befindet sich die Hornhaut, wie am untern Augenlid der Augapfel, *tarsus* (Taf. 6; 5₃₃). In der Substanz der Hornhaut sind eingebettet die Meibom'schen Drüsen, *glandulae Meibomianae*, während die Hornhaut der Augenlider, *conjunctiva palpebrae* (Taf. 6; 5₃₀), die innere hintere Fläche der Hornhaut überzieht und auf den Augapfel übergeht, die Bindehaut des Augapfels, *conjunctiva bulbi* (Taf. 6; 5₃₃) bildet.

Zu erwähnen sind die Thränenröhren, *ductus lacrymales*, zwei traurige Drüsen, welche am äußern Augenvinkel, hinter dem obern Augenlid, in den beiden Thränenröhrengruben, *foveae lacrymales*, des Stirnbeins liegen.

2. Das Ohr.

Das Gehörorgan, *organon auditus*, zerfällt in drei Theile, das äußere, mittlere und innere. Da auf unserer Tafel nur das erstere zur Darstellung gelangt, so beschränken wir uns auf dasselbe. Das äußere Ohr (Taf. 7; 1₁), *auricula*, ist eine runde, in verschiedenen Richtungen ein- und auswärts bewegliche, von der äußern Haut überzogene Haut und da mit Muskeln besetzte Knorpel, welche durch Bänder, die Haut und den äußern Gehörgang festrecht an die Seitenwand des Schädels angeheftet ist und mit ihrem mittlern Theile in den äußern Gehörgang übergeht. In diesem Theile zu bemerken: Die Ohrleiste oder Ohrkrempe, *helix auricularis*, die äußerste nach vorn umgebogene Rand. Die Gegenleiste oder Nebenkrempe, *antihelix*, die weiter nach innen, parallel mit der Ohrleiste verlaufende Erhabenheit. Die vordere Ohrklappe, *Ohrrede*, *tragus* (Taf. 6; 11), der abgerundete Vorsprung der Deckung des Gehörganges.

Atlas. 2. Aufl. — Anatomie.

4. Die hintere Ohrklappe oder Gegenecke, *antitragus auricularis* (Taf. 6; 1E), der kleine der vordern Ohrklappe gegenüber befindliche Vorsprung.

5. Der Ohreinschnitt, *incisura auricularis* oder *intertragica*, der Einschnitt über dem Ohrklappchen, *lobulus auricularis* (Taf. 6; 1F).

6. Die Ohrmuschel, *concha auris*, der vertiefte Theil des Ohrs, welcher in den äußern Gehörgang, *meatus auditorius externus*, übergeht.

3. Die Mundspeicheldrüsen.

Mundspeicheldrüsen, *glandulae salivales oris*, welche zusammengefaßt traubenförmige Drüsen sind, gibt es drei Paar:

1. Die Ohrspeicheldrüse, *glandula parotis* (Taf. 6; 11), an der Seite des Gesichts, vor dem Ohr und unterhalb des Jochbogens, mit dem horizontal über die Wange verlaufenden und dieselbe durchbohrenden Ausführungsgang, dem Stenonian'schen Gang, *ductus Stenonianus* (Taf. 6; 11), welcher bei dem ersten oder zweiten Badzahn auf der Mundschleimhaut endet.

2. Die Unterkieferdrüse, *glandula submaxillaris* (Taf. 6; 21), liegt an der innern Fläche des Unterkieferwinkels, deren Ausführungsgang, der Wharton'sche Gang, *ductus Whartonianus*, zur Seite des Zungenbäumchens auf der Mundschleimhaut mündet.

3. Die Zungendrüse, *glandula sublingualis* (Taf. 8; 2₁), liegt auf dem Boden der Mundhöhle, unter der Zungenspitze, wird von der Mundschleimhaut bedeckt. Der Ausführungsgang der Zungendrüse, der Bartholin'sche Gang, *ductus Bartholinianus*, mündet entweder für sich auf der Mundschleimhaut oder verbindet sich mit dem Wharton'schen Gange.

Knochen und Bänder.

Die Knochen und Bänder (Taf. 6; 1A bis 1C, 2A bis 2M, 3A bis 3W, 4₂₋₄, 4₃₂₋₃₇, 5₁₋₁₇, 6₁₋₄) sind bei Tafel 2 und 3 sowie bei Tafel 5 auf Seite 56 erläutert.

Tafel 7.

Diese Tafel zeigt zunächst den Rumpf nach Entfernung der Haut von vorn gesehen, sowie das Rückenmark mit den Anfängen der Spinalnerven nach geöffneter Wirbelsäule und den Grenzstrang des sympathischen Nerven.

Figur 1. Der Rumpf von vorn gesehen.

- A. Os maxillare inferius, Unterkieferbein.
- B. Os hyoideum, Zungenbein.
- C. Clavicula, Schlüsselbein.
- D. Clavicula, Schlüsselbein.
- E. Acromion, Schulterhöhe.
- F. Processus coracoideus, Rabenschnabelfortsatz.
- G. Caput humeri, Oberarmkopf.
- H. Costa secunda, zweite Rippe.
- I. Costa septima, siebente Rippe.
- K. Costa decima, zehnte Rippe.
- L. Ligamentum interclaviculare, Zwischenschlüsselbeinband.
- M. Ligamentum capsulare claviculae internum, inneres Kapselband des Schlüsselbeins.
- N. Ligamentum claviculo-acromiale, Schlüsselbein-Schulterhöhenband.
- O. Ligamentum trapezoidum et conoideum, oder Ligamentum coraco-claviculare, Rabenschnabelfortsatz-Schüsselbeinband.
- P. Ligamentum coraco-acromiale, Rabenschnabelfortsatz-Schulterhöhenband.

- Q. Ligamentum capsulare sterno-costale, Brustbein-Rippen-Kapselband.
- R. Ligamenta radiata, Strahlenbänder.
- S. Ligamenta coruscantia oder intercostalia, Zwischenrippenbänder.
- T. Aponeurosis colli profundae pars, Theil der tiefen Halsaponeurose.
- U. Aponeurosis musculorum abdominis, Sehne der Unterleibsmuskeln.
1. Glandula thyroidea, Schilddrüse.
 1. Musculus sternocleido-mastoideus, Kopfnicker.
 2. Musculus cucullaris, Kappenmuskel.
 3. Musculus digastricus oder biverter maxillae inferioris, zweiköpfiger Kiefermuskel.
 4. Musculus mylohyoideus, Kieferzungenbeinmuskel.
 5. Musculus hyoglossus, Zungenbein-Zungenmuskel.
 6. Musculus stylohyoideus, Griffel-Zungenbeinmuskel.
 7. Musculus sternohyoideus, Brustzungenbeinmuskel.
 8. Musculus sternothyroideus, Brustbein-Schildkorpelmuskel.
 9. Musculus omohyoideus, Schulter-Zungenbeinmuskel.
 10. Musculus hyothyroideus, Zungenbein-Schildkorpelmuskel.
 11. Musculi scaleni, die Rippenhalter.
 12. Musculus levator anguli scapulae, Schulterblattheber.
 13. Musculus pectoralis major, großer Brustmuskel.
 14. Musculus pectoralis minor, kleiner Brustmuskel.
 15. Musculus subclavius, Schlüsselbeinmuskel.
 16. Musculus serratus anticus major, großer Sägemuskel.
 17. Musculi intercostales externi, äußere Zwischenrippenmuskeln.
 18. Musculi intercostales interni, innere Zwischenrippenmuskeln.
 19. Musculus obliquus abdominis externus, äußerer schiefer Bauchmuskel.
 20. Musculus obliquus abdominis internus, innerer schiefer Bauchmuskel.
 21. Linea alba, weiße Linie.
 22. Musculus rectus abdominis, gerader Bauchmuskel.
 23. Inscriptiones tendineae, Sehnenstreifen.
 24. Musculus deltoideus, Deltamuskel.
 25. Musculus biceps brachii, zweiköpfiger Armmuskel.
 - 25' Musculus biceps, caput breve, kurzer Kopf des zweiköpfigen Armmuskels.
 - 25'' Musculus biceps, caput longum, langer Kopf des zweiköpfigen Armmuskels.
 26. Musculus coraco-brachialis, Rabenschweiffortsatz-Oberarmmuskel.
 27. Musculus brachialis internus, innerer Oberarmmuskel.
 28. Musculus triceps brachii, dreiköpfiger Armmuskel.
 - a. Arteria carotis communis dextra, rechte gemeinschaftliche Kopfpulsader.
 - b. Arteria carotis externa, äußere Kopfpulsader.
 - c. Arteria carotis interna, innere Kopfpulsader.
 - d. Arteria thyroidea superior, obere Schilddrüsenpulsader.
 - e. Arteria lingualis, Zungenpulsader.
 - f. Arteria maxillaris externa, äußere Antlitzpulsader.
 - g. Arteriae mammae externae, äußere Brustpulsadern.
 - h. Arteria thoracico-acromialis, Rumpf-Schulterhöhenpulsader.
 - i. Arteria brachialis, Armpulsader.
 - k. Vena jugularis interna, innere Halsvene.
 - l. Vena jugularis externa, äußere Halsvene.
 - m. Vena jugularis externa anterior, vordere Halsvene.
 - n. Vena subclavia, Schlüsselbeinpulsader.
 - o. Vena cephalica, Speichenhautpulsader.
 - p. Vena brachialis, Armpulsader.
 - q. Nervi cutanei pectoris interni, innere Nerven der Brust.
 - r. Nervi cutanei pectoris externi, äußere Nerven der Brust.
 - s. Nervi cutanei abdominis interni, innere Nerven des Unterleibes.
 - t. Nervi cutanei abdominis externi, äußere Nerven des Unterleibes.

Figur 2. Das Rückenmark mit den 31. der Spinalnerven nach von vorn zur Wirbelsäule und der Grenzstrang pathischen Nerven.

- A. Pars petrosa ossis temporum, Schläfenbein.
- B. Meatus auditorius internus, innerer Gehörgang.
- C. Canalis caroticus, Kanal der Carotis.
- D. Processus styloideus, Griffelfortsatz.
- E. Foramen jugulare, Drosselloch.
- F. Meatus auditorius externus, äußerer Gehörgang.
- G. Atlas, Träger.
- H. Vertebra cervicis septima, siebenter Halswirbel.
- J. Vertebra dorsi prima, erster Rückenwirbel.
- K. Vertebra dorsi duodecima, zwölfter Rückenwirbel.
- L. Vertebra lumbalis prima, erster Lendenwirbel.
- M. Costa prima, erste Rippe.
- N. Costa duodecima, zwölfte Rippe.
1. Auricula, äußeres Ohr.
1. Musculus sternocleido-mastoideus, Kopfnicker.
2. Musculus scalenus anticus, vorderer Halsmuskel.
3. Musculus scalenus medius, mittlerer Halsmuskel.
4. Musculi intercostales interni, innere Zwischenrippenmuskeln.
5. Musculi intercostales externi, äußere Zwischenrippenmuskeln.
6. Musculus quadratus lumborum, vierseitiger Rückenmuskel.
7. Musculus psoas major, großer Lendenmuskel.
- a. Arteria carotis interna, innere Halsvene.
- b. Arteria intercostalis posterior, hintere Zwischenrippenpulsader.
- c. Arteria subclavia, Schlüsselbeinpulsader.
- d. Vena jugularis interna, innere Halsvene.
- e. Vena intercostalis posterior, hintere Zwischenrippenpulsader.
- α. Pons Varoli, Varolsbrücke.
- α' Nervus oculomotorius, gemeinschaftlicher Sehnerv.
- α'' Nervus trochlearis oder patheticus, Sehnerv.
- β. Nervus trigeminus, dreigetheilter Sehnerv.
- γ. Nervus abducens, äußerer Augenmuskel.
- δ. Nervus facialis und nervus acusticus, Gesichtsnerv und Gehörnerv.
- ε. Nervus glosso-pharyngeus und nervus laryngeus, Zungenschlundspeiser- und Kehlkopfnerve.
- ζ. Nervus accessorius Willisi, Beinaern.
- η. Nervus vagus, herumwandernder Nerve.

Nervus hypoglossus, Zungenfleischnerv.
Medulla oblongata, verlängertes Mark.
Medulla spinalis, pars cervicalis, Halstheil des Rückenmarks.
Medulla spinalis, pars dorsalis, Rückentheil des Rückenmarks.
Medulla spinalis, pars lumbalis mit dem *Conus medullaris*, Lendentheil des Rückenmarks mit dem Rückenmarkszapfen.
Stilum terminale, Rückenmarksfaden.
Nervus cervicalis primus, erster Halsnerv.
Nervus cervicalis octavus, achter Halsnerv.
Plexus cervicalis, Halsnervengeflecht.
Plexus brachialis, Armnervengeflecht.
Nervus dorsalis primus, erster Rückenerv.
Nervus dorsalis duodecimus, zwölfter Rückenerv.
Nervus lumbalis primus, erster Lendenerv.
Nervus sympathicus, sympathischer Nerv.
Ganglion cervicale medium nervi sympathici, mittlerer Halsknoten des sympathischen Nerven.
Ganglion cervicale inferius nervi sympathici, unterer Halsknoten des sympathischen Nerven.
Ganglia thoracica nervi sympathici, Brustknoten des sympathischen Nerven.

3. Das Rückenmark nach von hinten eröffneter Wirbelsäule gesehen.
Os occipitale, Hinterhauptbein.
Vertebra colli prima, erster Halswirbel.
Vertebra colli septima, siebenter Halswirbel.
Vertebra dorsi prima, erster Rückenwirbel.
Vertebra dorsi duodecima, zwölfter Halswirbel.
Costa prima, erste Rippe.
Costa duodecima, zwölfte Rippe.
Ligamentum colli costae externum, äußeres Rippenhalsband.
Ligamentum colli costae internum, inneres Rippenhalsband.
Dura mater medullae spinalis, facies externa, äußere Seite der harten Rückenmarkshaut.
Dura mater spinalis, facies interna, innere Seite der harten Rückenmarkshaut.
Arachnoidea medullae spinalis, Spinnwebhaut des Rückenmarks.
Ligamentum denticulatum, gezacktes Band.
Arteria vertebralis, Wirbelspinalader.
Medulla oblongata, verlängertes Mark.
Medulla spinalis cervicis, Halsmark.
Medulla spinalis dorsi, Rückentheil des Rückenmarks.
Medulla spinalis, pars lumbalis, mit dem *Conus medullae spinalis*, Lendentheil des Rückenmarks mit dem Rückenmarkszapfen.
Stilum terminale, Rückenmarksfaden.
Nervus glossopharyngeus und *nervus vagus*, Zungen- und Schlundkopfnerv und herumschweifender Nerv.
Nervus hypoglossus, Zungenfleischnerv.
Nervus accessorius Willisii, Weinnerv.
Nervus cervicalis primus, erster Halsnerv.
Nervus cervicalis duodecimus, zwölfter Halsnerv.
Nervi spinales dorsi, Rückenerven.

Der Rumpf.

Der Rumpf, *truncus*, zerfällt in zwei Theile, die *thorax*, und den Unterleib, *abdomen*. An beiden Seiten des Thorax hängen die Arme, während unten am Becken die Beine artikuliren; oben ist auf den Brustkasten der Hals mit dem aufgesetzt.

Wiederum treten uns nach Entfernung der Haut und des Unterhautzellgewebes zunächst die Muskeln entgegen, die hier am Rumpf meist große breite Flächen bilden.

I. Muskeln am Hals, an der Brust, am Unterleib, am Rücken und am Arm.

1. Muskeln am Hals.

Die Muskeln am Hals sind bereits bei der Erklärung der Tafel 6 abgehandelt worden, weshalb wir hier unterlassen darauf zurückzukommen, und verweisen wir für den

1. Kopfnieder, *musculus sternocleido-mastoideus* (Taf. 7; 1, 2), auf S. 71;
2. zweibäuchigen Kiefermuskel, *musculus digastricus* (Taf. 7; 1_a), auf S. 71;
3. Kiefer-Zungenbeinmuskel, *musculus mylohyoideus* (Taf. 7; 1_a), auf S. 72;
4. Zungenbein-Zungenmuskel, *musculus hyoglossus* (Taf. 7; 1_a), auf S. 72;
5. Griffel-Zungenbeinmuskel, *musculus stylohyoideus* (Taf. 7; 1_a), auf S. 72;
6. Brust-Zungenbeinmuskel, *musculus sternohyoideus* (Taf. 7; 1_a), auf S. 71;
7. Brustbein-Schildknorpelmuskel, *musculus sterno-thyroideus* (Taf. 7; 1_a), auf S. 71;
8. Schulter-Zungenbeinmuskel, *musculus omohyoideus* (Taf. 7; 1_a), auf S. 71;
9. Zungenbein-Schildknorpelmuskel, *musculus hyo-thyroideus* (Taf. 7; 1_a), auf S. 71;
10. die Rippenhalter, *musculi scaleni* (Taf. 7; 1₁, 2₂, 3₃), auf S. 75.

2. Nackenmuskeln.

Der erläuternde Text zu diesen Muskeln findet sich bei den Rückenmuskeln, Taf. 9, und zwar zu

1. dem Nackenmuskel, *musculus cucullaris* (Taf. 7; 1_a), auf S. 92;
2. dem Schulterblattheber, *musculus levator anguli scapulae* (Taf. 7; 1₁), auf S. 93.

3. Muskeln an der Brust.

Sämmtliche Muskeln der Brust werden von einer oberflächlichen Fascie, *fascia superficialis*, überzogen, die nach Entfernung der Haut und des darunter befindlichen Zellgewebes sichtbar wird. Darauf zeigen sich folgende Muskeln:

1. Der große Brustmuskel, *musculus pectoralis major* (Taf. 6; 1₂, 2₂, Taf. 7; 1₁, Taf. 8; 1₁).

Lage:
Unmittelbar unter der Haut der Brust.

Ansätze:

- a) Mit dem Brustbeintheile (*portio sternalis*) an das Brustbein und die Knorpel der zweiten bis siebenten Rippe, mit dem Schlüsselbeintheile (*portio claviculæ*) an das Brustbeinende des Schlüsselbeins.
- b) Die *spina tuberculi majoris* des Oberarmbeins.

Wirkung:

Zieht den Arm an die Brust, während er bei fixirten Armen eine Erweiterung des Thorax bewirken kann.

2. Der kleine Brustmuskel oder der vordere kleine Sägemuskel, *musculus pectoralis minor* oder *serratus anticus minor* (Taf. 6; 2₃, Taf. 7; 1₁, Taf. 8; 1₁).

Lage:

Unter dem großen Brustmuskel, hart auf den Rippen aufliegend.

Anfänge:

- a) Die äußere Fläche der vordern knöchernen Enden der dritten bis fünften Rippe.
b) Der Rabenschnabelfortsatz des Schulterblattes.

Wirkung:

Zieht das Schulterblatt nach vorn herab und kann bei fixirter Schulter die dritte bis fünfte Rippe heben.

3. Der Schlüsselbeinmuskel, *musculus subclavius* (Taf. 7; 1₁₀).

Lage:

Zwischen dem Schlüsselbein und der ersten Rippe.

Anfänge:

- a) Der Knorpel und das vordere Ende der ersten Rippe.
b) Die untere Fläche des Schlüsselbeins.

Wirkung:

Zieht das Schlüsselbein gegen die erste Rippe.

4. Der vordere große Sägemuskel, *musculus serratus anticus major* (Taf. 7; 1₁₀, Taf. 8; 1₁₀, Taf. 9; 2₁₇).

Lage:

Zur Seite des Thorax, unmittelbar auf den Rippen.

Anfänge:

- a) Mit neun Zaden an die vordern knöchernen Enden der acht obersten Rippen, indem er an der zweiten Rippe mit zwei Zaden sich ansetzt.
b) Die innere Lippe des hintern Schulterblattes.

Wirkung:

Zieht das Schulterblatt nach außen und vorn, wobei der untere Winkel desselben weiter nach vorn geschoben wird, als der obere innere, so daß das Schulterblatt in der Art gedreht wird, daß die Gelenkfläche für den Arm nach oben und außen zu stehen kommt.

5. Die äußern Zwischenrippenmuskeln, *musculi intercostales externi* (Taf. 7; 1₁₇, 2₁, Taf. 8; 1₁₈, 2₁, Taf. 9; 1₁₈, 2₁, Taf. 10; 1₁₈).

Lage:

In den Zwischenräumen der Rippen, so daß sie mit ihren Fasern von der obern Rippe schräg von hinten nach vorn zur untern Rippe laufen. Dieselben beginnen am Rippenbalse und füllen den Zwischenrippenraum, reichen aber nicht ganz bis an das Brustbein.

Anfänge:

- a) Der untere Rand der ersten bis siebenten Rippe.
b) Der obere Rand der zweiten bis zwölften Rippe.

Wirkung:

Sie ziehen die Rippen aneinander. Ist die oberste Rippe fixirt, so heben sie die übrigen Rippen, ist aber die zwölfte Rippe festgestellt, so ziehen sie die darüber befindlichen Rippen herab.

6. Die innern Zwischenrippenmuskeln, *musculi intercostales interni* (Taf. 7; 1₁₈, 2₁, Taf. 8; 1₁₉, 2₁, Taf. 9; 1₁₉, 2₁, Taf. 10; 2₁).

Lage:

In den Zwischenräumen der Rippen unter den vorigen, wo sie mit ihren Fasern von oben und vorn nach unten und hinten laufen. Sie fangen erst am Rippenwinkel an, so daß sie am hintern Ende des Interostalraumes eine Lücke lassen, reichen aber nach vorn bis an das Brustbein.

Anfänge:

- a) Der untere Rand der ersten bis ersten Rippe.
b) Der obere Rand der zweiten bis zwölften Rippe.

Wirkung:

Diese ist dieselbe wie bei den äußern Zwischenrippenmuskeln.

7. Der dreieckige Brustmuskel, *musculus triangularis sterni* (Taf. 8; 1₁₂).

Lage:

An der hintern Fläche des Brustbeins.

Anfänge:

- a) Der Körper und der Schwertfortsatz des Brustbeins.
b) Der untere Rand des vordern Endes der zweiten bis fünften Rippe und deren Knorpel.

Wirkung:

Zieht die zweite bis fünfte Rippe nach abwärts.

4. Muskeln des Unterleibes.

Die Muskeln des Unterleibes werden bei Betrachtung der Tafel 10 abgehandelt, siehe deshalb wegen des

1. äußern schiefen Bauchmuskels, *musculus obliquus abdominis externus* (Taf. 7; 1₁₉), S. 97;
2. innern schiefen Bauchmuskels, *musculus obliquus abdominis internus* (Taf. 7; 1₂₀), S. 97;
3. geraden Bauchmuskels, *musculus rectus abdominis* (Taf. 7; 1₂₁), S. 97;

Ferner wegen des

- vieredigen Lebermuskels, *musculus quadratus lumborum* (Taf. 7; 2₆), f. S. 98 und
des großen Lebermuskels, *musculus psoas major* (Taf. 7; 1₇), f. S. 124.

5. Armmuskeln.

Die Armmuskeln dieser Tafel finden sich abgehandelt bei der Erklärung zu Tafel 13, siehe deshalb wegen der

1. Deltamuskel, *musculus deltoideus* (Taf. 7; 1₂₂), S. 114;
2. zweiköpfigen Armmuskels, *musculus biceps brachii* (Taf. 7; 1₂₃, 1_{23'}, 1_{23''}), S. 114;
3. Rabenschnabelfortsatz: Oberarmmuskel, *musculus coraco-brachialis* (Taf. 7; 1₂₄), S. 114;
4. innern Oberarmmuskels, *musculus brachialis internus* (Taf. 7; 1₂₅), S. 114;
4. dreiköpfigen Oberarmmuskels, *musculus triceps brachii* (Taf. 7; 1₂₆), S. 115.

II. Gefäße.

Die Erklärung der Halspulsadern (Taf. 7; 13-f, 23) und der Halsblutadern (Taf. 7; 1k-m, 20), siehe bei dem Texte der Tafel 6 auf S. 76.

Die Schlüsselbeinpulsader, *arteria subclavia* (Taf. 7; 2c), entspringt rechts aus der ungenannten Pulsader, links unmittelbar aus dem Bogen der Aorta. Folgende Zweige derselben sind auf unserer Tafel sichtbar:

1. Die Wirbelpulsader, *arteria vertebralis* (Taf. 7; 3M), welche in der Gegend der ersten Rippe entspringt und im *canalis vertebralis*, in welchem sie durch das sechste foramen vertebrale eintritt, bis zum zweiten Halswirbel in die Höhe steigt und sich um den Querfortsatz des Trägers herumkrümmend durch das große Hinterhauptslöch in den Schädel gelangt.

2. Die äußern Brustpulsadern, *arteriae mammae externae*, welche aus der innern Brustpulsader, *arteria mammaria interna* (Taf. 9; 1g), entspringen, die wiederum ein Zweig der Schlüsselbeinpulsader ist, und an der innern Seite der Rippenknorpel herabläuft. Die äußern Brustpulsadern, auch *rami perforantes* genannt, durchbohren die Zwischenrippenmuskeln und verzweigen sich in den Muskeln der Haut und der Brust.

Fortsetzung der Schlüsselbeinpulsader ist die elpulsader, arteria axillaris, aus welcher die :rn Brustastpulsadern, arteriae thoracicae nae, mit dem Schulterast, ramus acromialis 7; 1h), entspringen.

is der Achselpulsader geht die Armpuls: :;, arteria brachialis (Taf. 7; 1i) hervor, deren rn Verlauf man auf Tafel 13 sieht.

ie hintern Zwischenrippenpulsadern, ar- e intercostales posteriores (Taf. 7; 2b. Taf. 9; 1o), Zweige, welche aus der Brustaotha entspringen und in den Zwischenrippenräumen mit Abgabe hiebener Aeste verlaufen. Es sind deren neun, die beiden obern Zwischenrippenräume von der ia intercostalis suprema versorgt werden.

ie Schlüsselbeinblutader, vena subclavia i. 7; 1n), entsteht aus der Armblutader, vena hialis (Taf. 7; 1p). In sie mündet auch die a cephalica (Taf. 7; 1o).

ie hintern Zwischenrippenblutadern, venae rcostales posteriores (Taf. 7; 2e. Taf. 9; 1q), aufen in den Zwischenrippenräumen und münden die unpaarige und halbunpaarige Blut: r, vena azygos und hemiazygos.

III. Gehirn, Rückenmark und Nerven.

A. Gehirn und Gehirnnerven.

Die Erklärung der auf dieser Tafel sichtbaren Theile Gehirns und der vorhandenen Gehirnnerven (Taf. 7; 2, 3e-2), s. im Text zu Taf. 6 auf S. 71 und 72.

B. Rückenmark und Rückenmarksnerven.

a) Rückenmark.

Das Rückenmark, medulla spinalis, ist eine Fortang des verlängerten Markes, medulla oblon- a (Taf. 7; 2v, 3a), und zerfällt in das Hals: rkt, medulla spinalis cervicis (Taf. 7; 2x, 3b), den Brusttheil, medulla spinalis dorsi (Taf. 7; 3y), und in das Lendenmark, medullae sp- is, pars lumbalis (Taf. 7; 2u, 3d). Es ist im dgratskanal aufgehängt und von denselben drei uten, wie das Gehirn, umschlossen, und zwar von harten Rückenmarkshaut, dura mater me- lae spinalis (Taf. 7; 3K und 3K'), von der Rücken: rts: Spinnwebenhaut, arachnoidea medullae nalis (Taf. 7; 3L), welche zu beiden Seiten des denmarks eine Reihe dreieckiger Zaden bildet, deren ßis an die weiche Rückenmarkshaut, die Spigen an harte Rückenmarkshaut stoßen, und so das ge- hute Band, ligamentum denticulatum (Taf. 7; 3L'), den, und von der weichen Rückenmarkshaut, pia ter medullae spinalis.

Das Ende des Lendenmarks bildet der Rücken: rtszapfen, conus medullaris (Taf. 7; 2u, 3d), s welchem der Rückenmarksfaden, filum ter- nale (Taf. 7; 2v, 3d'), hervorgeht und welcher mit n anliegenden Lenden- und Kreuzbeinnerven den ferdeschweif, cauda equina, bildet.

b) Rückenmarksnerven.

Die Rückenmarksnerven, nervi spinales, sind r Zahl nach 31 oder 32 Paare, welche mit doppelten urzeln, einer vordern und einer hintern, von der eite des Rückenmarks ausgehen, und durch die wischenwirbellocher aus den canalis spinalis ach außen gelangen. Dieselben zerfallen in acht aare Halsnerven, nervi cervicales (Taf. 7; 2x-2), zwölf Paare Brustnerven, nervi

dorsales (Taf. 7; 2x-u, 3a), fünf Paare Lenden: nerven, nervi lumbales (Taf. 7; 2q), fünf Paare Kreuzbeinnerven, nervi sacrales und ein oder zwei Paare Steißbeinnerven, nervi coccygei.

Von den vordern Aesten der vier obern Halsnerven wird das Halsgeflecht, plexus cervicalis (Taf. 7; 2p), gebildet, während aus den vordern Aesten der vier untern Hals- und des ersten Brustnerven das Arm: geflecht, plexus brachialis (Taf. 7; 2q), hervorgeht.

Die auf Tafel 7; 1a und 1b sichtbaren innern und äußern Brusthautnerven, nervi cutanei pectoris interni und externi, sind Zweige der vordern Aeste der Brustnerven, ebenso wie die innern und äußern Hautnerven des Unterleibes, nervi cutanei abdominis interni und externi (Taf. 7; 1y und 1d), und zwar stammen die ersten vom zweiten bis siebenten Brustnerven, die letztern dagegen vom achten bis zwölften.

C. Der sympathische Nerv.

Der sympathische Nerv, nervus sympathicus (Taf. 7; 2x), zerfällt in einen Kopftheil, pars cephalica nervi sympathici, einen Hals: theil, pars cervicalis nervi sympathici, einen Brust: theil, pars thoracica nervi sympathici, einen Lenden: theil, pars lumbalis nervi sympathici, und einen Kreuzbein: theil, pars sacralis nervi sympathici.

Der Hals: theil besteht aus drei durch den Stamm miteinander verbundenen Nervenknoten, dem obersten Halsnervenknoten, ganglion cervicale supremum, dem mittlern Halsnervenknoten, ganglion cervicale medium oder thyroideum (Taf. 7; 2y), und dem untern Halsnervenknoten, ganglion cervicale inferum (Taf. 7; 2w), und liegt dicht an der vordern Fläche des musculus rectus capitis anticus major und des musculus longus colli.

Der Brust: theil, welcher die Fortsetzung des Hals: theils ist, liegt vor den Querfortsätzen der Brustwirbel und vor der vordern Fläche der Rippenköpfe. Er besteht aus elf bis zwölf Brustnervenknoten, ganglia thoracica (Taf. 7; 2w), welche durch den sympathischen Nervenstamm miteinander verbunden werden.

Der Lenden: theil ist eine Fortsetzung des Brust: theils, während der Kreuzbein: theil wieder eine Fortsetzung jenes ist.

Knochen und Bänder.

Die Knochen und Bänder (Taf. 7; 1A bis 1S, 2A bis 2N, 3A bis 3J) sind bei Tafel 2, 3 und 4 sowie bei Tafel 5 auf S. 25—28, 32—35, 43, 57 erläutert.

Tafel 8.

Diese Tafel zeigt uns den geöffneten Thorax mit den Brusteingeweiden, der Lunge und dem Herzen.

Figur 1. Der Thorax nach Entfernung der vordern Wand.

- A. Maxilla inferior, Unterkiefer.
- B. Os hyoideum, Zungenbein.
- C. Cartilago thyroidea, Schilddrüse.
- D. Cartilagineae annulares tracheae, Ringknorpel der Luftröhre.
- E. Manubrium sterni, Handgriff des Brustbeins.
- F. Processus xiphoideus sterni, Schwertfortsatz des Brustbeins.
- G. Clavicula, Schlüsselbein.
- H. Acromion, Schulterhöhe.
- J. Processus coracoideus scapulae, Rabenschnabel: fortsatz des Schulterblattes.

- K. Caput humeri, Kopf des Oberarmbeins.
 L. Spina scapulae, Schultergräte.
 M. Costa prima, erste Rippe.
 N. Costa septima, siebente Rippe.
 O. Cartilago costarum spuriarum, Knorpel der falschen Rippe.
 P. Ligamentum suspensorium glandulae thyroideae, Aufhängeband der Schilddrüse.
 Q. Ligamentum capsulare claviculae internum, inneres Kapselband des Schlüsselbeins.
 Q. Ligamentum capsulare claviculae externum, äußeres Kapselband des Schlüsselbeins.
 R. Ligamentum coraco-claviculare, Rabenschnabelfortsatz = Schlüsselbeinband.
 S. Ligamentum coraco-acromiale, Rabenschnabelfortsatz = Schulterhöhenband.
 F. Ligamentum capsulare capitis humeri, Kapselband des Oberarmgelenks.
 U. Tendo musculi bicipitis, Sehne des zweiköpfigen Muskels.
 V. Pleura, Brustfell.
 V. Membrana sterni, cavum mediastini anterioris obtegens, Brustbeinhaut, die vordere Mittelfellhöhle bedeckend.
 W. Pericardium, Herzbeutel.
 X. Fascia transversalis abdominis, Quersäcie des Unterleibes.
 Y. Peritoneum, Bauchfell.
 I. Glandula thyroidea, Schilddrüse.
 I. Pulmo sinister, linke Lunge.
 II' Pulmo sinister lobulus inferior, unterer Lappen der linken Lunge.
 1. Musculus sternocleidomastoideus, Kopfnieder.
 2. Musculus cucullaris, Kappenmuskel.
 3. Musculus digastricus maxillae inferioris, zweiköpfiger Kiefermuskel.
 4. Musculus mylohyoideus, Kiefer-Zungenbeinmuskel.
 5. Musculus geniohyoideus, Kinn-Zungenbeinmuskel.
 6. Musculus genioglossus, Kinn-Zungenmuskel.
 7. Musculus hyoglossus, Zungenbein-Zungenmuskel.
 8. Musculus hyothyroideus, Zungenbeinschildknorpelmuskel.
 9. Musculus omohyoideus, Schulter-Zungenbeinmuskel.
 10. Musculus scalenus anticus, vorderer Rippenhalter.
 11. Musculus scalenus medius, mittlerer Rippenhalter.
 12. Musculus triangularis sterni, dreieckiger Brustmuskel.
 13. Diaphragma, Zwerchfellmuskel.
 14. Musculus pectoralis major, großer Brustmuskel.
 15. Tendo musculi pectoralis minoris, Sehne des kleinen Brustmuskels.
 16. Musculus deltoideus, Deltamuskel.
 17. Musculus latissimus dorsi, breiter Rückenmuskel.
 18. Musculi intercostales, Zwischenrippenmuskeln.
 19. Musculus serratus anticus major, vorderer großer Sägenmuskel.
 a. Arteria innominata, ungenannte Pulsader.
 c. Arteria carotis communis dextra, rechte gemeinschaftliche Kopfpulsader.
 c. Arteria carotis communis sinistra, linke gemeinschaftliche Kopfpulsader.
 d. Arteria subclavia dextra, rechte Schlüsselbeinpulsader.
 e. Arteria subclavia sinistra, linke Schlüsselbeinpulsader.
 f. Arteria thyroidea superior, obere Schilddrüsipulsader.
 g. Arteria lingualis, Zungenpulsader.
 h. Arteria maxillaris externa, äußere Antilppulsader.
 i. Arteria mammaria interna, innere Brustpulsader.
 i' Arteria epigastrica superior, obere Bauchpulsader.
 k. Arteria cervicalis superficialis, oberflächliche Halspulsader.
 l. Arteria axillaris, Achselpulsader.
 m. Arteria brachialis, Armpulsader.
 n. Arteriae intercostales, Zwischenrippenpulsaden.
 o. Vena jugularis communis, gemeinschaftliche Drosselblutader.
 p. Vena jugularis interna, innere Drosselblutader.
 q. Vena jugularis externa, äußere Drosselblutader.
 r. Vena jugularis anterior, vordere Drosselblutader.
 r' Vena thyroidea inferior oder ima, untere Schilddrüsenblutader.
 s. Vena subclavia, Schlüsselbeinblutader.
 t. Vena mammaria interna, innere Brustblutader.
 u. Venae intercostales anteriores, vordere Zwischenrippenblutadern.
 v. Vena cephalica, Speichenhautblutader.
 w. Ductus thoracicus, Brustgang.
 z. Nervus supra-clavicularis, Oberschlüsselbeinnerv.
 β. Plexus brachialis dexter, rechtes Armergeflecht.
 γ. Nervus subclavius, Schlüsselbeinnerv.
 δ. Nervi thoracici anteriores, vordere Brustnerven.
 ε. Nervi thoracici posteriores, hintere Brust- oder Rücken-schulterblattnerven.
 ζ. Nervus cutaneus brachii medius, mittlerer Armnerv des Arms.
 η. Nervus ulnaris, Einbognennerv.
 θ. Nervus medianus, Mittelarmer-nerv.
 ι. Nervus radialis, Speichennerv.

Figur 2. Der Thorax im senkrechten Durchschnitt von vorn gesehen.

- A. Angulus ossis maxillae inferioris, Winkel des Unterkieferbeins.
 B. Os hyoideum, Zungenbein.
 C. Vertebra colli septima, siebenter Halswirbel.
 D. Costa prima, erste Rippe.
 E. Costa septima, siebente Rippe.
 F. Costa decima, zehnte Rippe.
 G. Cartilago thyroidea, Schildknorpel.
 H. Cartilago cricoidea, Ringknorpel.
 J. Cartilagine annulares tracheae, Ringknorpel der Luftröhre.
 K. Bronchi pulmonis dextri, Luftröhrenast der rechten Lunge.
 L. Bronchi pulmonis sinistri, Luftröhrenast der linken Lunge.
 M. Cartilago costarum spuriarum, Knorpel der falschen Rippe.
 N. Membrana hyothyroidea, Zungenbein-Schildknorpelhaut.
 O. Ligamentum hyothyroideum, Zungenbein-Schildknorpelband.
 P. Ligamentum cricothyroideum, Ring-Schildknorpelband.
 Q. Ligamentum colli costae, Rippenhalterband.
 I. Glandula sublingualis dextra, rechte Zungendrüse.
 II. Cordis ventriculus dexter, rechte Herzkammer.
 II' Cordis ventriculus sinister, linke Herzkammer.
 II'' Atrium dextrum, rechter Vorhof.
 II''' Atrii sinistri auricula, linkes Herzohr.

- Pulmo sinister**, linke Lunge.
Pleura costalis, Rippenheil des Brustfells.
Pleura diaphragmatica, Zwerghellheil des Rippenfells.
Peritoneum, Bauchfell.
Ventriculus, Magen.
Omentum majus, großes Reh.
Hepar, Leber.
Musculus styloglossus, Griffel-Zungenmuskel.
Musculus genioglossus, Kinn-Zungenmuskel.
Musculus hyoglossus, Zungenbein-Zungenmuskel.
Musculus constrictor pharyngis superior, oberer Schlundtopfschnürer.
Musculus levator scapulae, Schulterblattheber.
Diaphragma, Zwerghellmuskel.
Centrum tendineum diaphragmatis, schräger Mittelheil des Zwerghells.
Arcus aortae, Aortenbogen.
Arteria innominata, ungenannte Pulsader.
Arteria carotis sinistra, linke Kopfpulsader.
Arteria subclavia sinistra, linke Schlüsselbeinpulsader.
Arteria coronaria cordis, Kranzader des Herzens.
Arteria pulmonalis communis, gemeinschaftliche Lungenpulsader.
Arteria pulmonalis dextra, rechte Lungenpulsader.
Arteria pulmonalis sinistra, linke Lungenpulsader.
Vena cava superior, obere Hohlvene.
Vena jugularis communis, gemeinschaftliche Drosselvene.
Vena cava inferior, untere Hohlvene.
Nervus vagus, herumschweifender Nerv.
Nervus hypoglossus, Zungenfleischnerv.
Ramus descendens nervi hypoglossi, herabsteigender Ast des Zungenfleischnerven.
Plexus cervicalis mit dem nach unten zum Zwerghell gehenden Phrenicus dexter, Halsgeflecht mit dem rechten Zwerghellnerven.
Nervus occipitalis major, großer Hinterhauptsnerv.
Plexus brachialis, Armmervengeflecht.
Nervus sympathicus, sympathischer Nerv.
Ganglion cervicale supremum, oberer Halsnervenknoten.
Ganglion cervicale medium, mittlerer Halsnervenknoten.
Ganglion cervicale inferum, unterer Halsnervenknoten.

I. Muskeln.

1. Halsmuskeln.

- Die Erklärung der Halsmuskeln siehe bei Tafel 6 und zwar des
 1. **Kopfnickers**, musculus sternocleidomastoideus (Taf. 8; 1₁), auf S. 71;
 2. **zweibäuchigen Kiefermuskels**, musculus digastricus maxillae inferioris (Taf. 8; 1₂), auf S. 71;
 3. **Kiefer-Zungenbeinmuskel**, musculus mylohyoideus (Taf. 8; 1₃), auf S. 72;
 4. **Kinn-Zungenbeinmuskel**, musculus geni-hyoideus (Taf. 8; 1₄), auf S. 72;
 5. **Kinn-Zungenmuskel**, musculus genioglossus (Taf. 8; 1₅, 2₁), auf S. 73;
 6. **Zungenbein-Zungenmuskel**, musculus hyoglossus (Taf. 8; 1₆, 2₂), auf S. 72;
 7. **Griffel-Zungenmuskel**, musculus styloglossus (Taf. 8; 2₃), auf S. 73;
 8. **Zungenbein-Schildknorpelmuskel**, musculus hyo-thyroideus (Taf. 8; 1₇), auf S. 71;

9. **Schulter-Zungenbeinmuskel**, musculus omo-hyoideus (Taf. 8; 1₈), auf S. 71;
 10. **vordern Rippenhalters**, musculus scalenus anticus (Taf. 8; 1₉), auf S. 75;
 11. **mittlern Rippenhalters**, musculus scalenus medius (Taf. 8; 1₁₀), auf S. 75;
 12. **dreieigen Brustmuskels**, musculus triangularis sterni (Taf. 8; 1₁₁), auf S. 84;
 13. **obern Schlundtopfschnürers**, musculus constrictor pharyngis superior (Taf. 8; 2₄), auf S. 73.

2. Brustmuskeln.

Die Erklärung der Brustmuskeln siehe bei Tafel 7 und zwar des

1. **großen Brustmuskels**, musculus pectoralis major (Taf. 8; 1₁₂), auf S. 83;
 2. **kleinen Brustmuskels**, musculus pectoralis minor (Taf. 8; 1₁₃), auf S. 83;
 3. **vordern großen Sägemuskels**, musculus serratus anticus major (Taf. 8; 1₁₄), auf S. 84;
 4. **Zwischenrippenmuskeln**, musculi intercostales (Taf. 8; 1₁₅, 2₅), auf S. 84.

3. Nackenmuskeln.

Die Erklärung der Nackenmuskeln siehe bei den Nackenmuskeln auf Tafel 9, und zwar des

1. **Kappenmuskels**, musculus cucullaris (Taf. 8; 1₁₆), auf S. 92;
 2. **Schulterblatthebers**, musculus levator scapulae (Taf. 8; 2₆), auf S. 93;
 3. **breiten Rückenmuskels**, musculus latissimus dorsi (Taf. 8; 1₁₇), auf S. 93.

4. Armmuskeln.

1. **Deltamuskel**, musculus deltoideus (Taf. 8; 1₁₈), siehe die Erklärung der Armmuskeln der Tafel 13 auf S. 114;
 2. **Zweiföpfiger Armmuskel**, musculus biceps brachii. Siehe die Erklärung ebendaselbst.

5. Zwerghell.

Das Zwerghell, diaphragma (Taf. 8; 1₁₉, 2₇, Taf. 9; 1 VII. Taf. 12; 1₁), ist ein flacher Muskel, welcher die Brusthöhle von der Bauchhöhle trennt. Dasselbe besteht aus einem muskulösen peripheren Theil (Taf. 8; 2₇), und einem faserigen centralen Theil, centrum tendineum (Taf. 8; 2₇). Nach der Brusthöhle zu ist das Zwerghell stark gewölbt, und zwar in der rechten Hälfte mehr als in der linken; nach der Bauchhöhle zu ist es entsprechend concav. Der periphere Theil zerfällt in einen Rippenheil, pars costalis, und einen Leberheil, pars lumbalis. Der erstere befestigt sich an der inneren Fläche der sechs untern Rippen und an dem Schwertfortsatz des Brustbeins, während der Leberheil mit drei Schenkeln auf jeder Seite von den obern Leberwirbeln entspringt, und zwar mit den innern Schenkeln, crura interna (Taf. 10; 1₁), von der vordern Fläche des dritten und vierten Leberwirbels, mit den mittlern Schenkeln, crura media, von dem Seitentheile des zweiten Leberwirbels, und mit den äußern Schenkeln, crura externa, von dem Seitentheile und Querfortsätze des ersten Leberwirbels. Zwischen den innern Schenkeln bleibt eine Spalte, der Aorten-schließ, hiatus aorticus, für den Durchgang der aorta und des ductus thoracicus, worauf sich dieselben vor der Aorta vereinigen und dann wieder zur Bildung des Speiseröhrenloches, foramen oesophageum,

4, wodurch auch äußerlich die im Innern durch Scheidewand bewirkte Theilung in zwei Hälften angedeutet wird, sowie eine Quersfurche, *sulcus sversus* oder *atrio-ventricularis*, welche rings um Herz herumläuft und äußerlich andeutet, wo sich Innern die Querränder zwischen den Vorhöfen Kammern befinden.

Die Vorhöfe sind nicht nur von den Kammern durch Querrand geschieden, sondern auch untereinander eine dünne Scheidewand, dem *septum atriorum*, mit. In jedem Vorhofe befindet sich nach vorn der Mittellinie des Herzens zugekehrt an dem Winkel ein sackförmiger Anhang, das Herz-*auricula cordis* (Taf. 8; 21"). Die Wände der Vorhöfe sind dünner als die der Kammern, während die Wände der rechten Herzkammer dünner als die linken sind.

Das ganze Herz steht ähnlich wie die Lungen in einem vollkommen abgeschlossenen serösen Sack, dem *pericardium* (Taf. 8; 1W), in welchen von oben her gleichsam hineingestülpt ist. Die rechte Fläche des Herzens ist von dem eingestülpten Blatt, dem innern oder visceralen Blatte des Herz-*sac* überzogen und fest mit demselben verwachsen, und das äußere oder parietale Blatt, welches dem entgegengesetzten entspricht, theils mit dem Zwerchfelle, theils dem Brustfelle verwachsen ist. In der geschlossenen Kapsel des Herzbeutels befindet sich eine schwach gelblichflüssige, der *liquor pericardii*.

2. Blutgefäße.

A. Gefäße des kleinen Kreislaufs.

Der kleine Kreislauf des Blutes, *circulus minor*, auch die Lungenblutbahn genannt, ist kein vollständiger Kreislauf, sondern nur Theil des Gesamtkreislaufs des Körpers. Er entspringt aus der gemeinschaftlichen Lungenpulsader, *arteria pulmonalis* oder *venosa communis* (Taf. 8; 2f), in welche das rechte Herz durch die Einmündung, *ostium arteriosum* oder *pulmonale*, das in demselben befindliche venöse Blut in diese Mündung befinden sich drei halbmondförmige Klappen, *valvulae semilunares*, welche das Zurücktreten des Blutes in die rechte Herzkammer verhindern. Die Lungenpulsader theilt sich in einen rechten und linken Ast, *arteria pulmonalis dextra* (Taf. 8; 2g), und *arteria pulmonalis sinistra* (Taf. 8; 2h), für jede Lunge.

Indem sich die Zweige der Lungenarterie immer theilen, gehen sie schließlich in die Haargefäße der Lunge über, aus deren Zusammenfluß dann die rechte Lunge führenden Lungenblutadern, *venae pulmonales* oder *arteriosae*, entstehen, welche in vier Armen, aus jeder Lunge zwei, in den linken Vorhof des Herzens münden, aus dem das arterielle Blut durch die venöse Oeffnung, *ostium venosum*, einem Ventile, der *valvula mitralis* oder *bicuspidalis*, die linke Herzkammer gelangt.

B. Gefäße des großen Kreislaufs.

a) Pulsadern.

Der große Kreislauf des Blutes, *circulus major*, auch Körperblutbahn genannt, tritt in der arteriösen Mündung, *ostium arteriosum* oder *aorticum*, der linken Herzkammer, der großen Körperpulsader, *arteria aorta* (Taf. 8; 2a, Taf. 9; 1a). In ihrer Austrittsstelle aus der linken Herzkammer befinden sich wie bei der Lungenpulsader drei halbmondförmige Klappen,

valvulae semilunares, welche das Zurücktreten des Blutes aus der Pulsader in die Herzkammer verhindern.

Gleich am Anfangstheil der großen Körperpulsader, der Aortenwurzel oder Aortenzwiebel, *bulbus aortae*, entspringt:

1. Die rechte Kranzpulsader des Herzens, *arteria coronaria cordis dextra* (Taf. 8; 2e, im *sulcus transversus dexter*), welche ihren Ursprung da nimmt, wo im Innern die vordere rechte halbmondförmige Klappe liegt und dann zwischen rechtem Vorhof und rechter Herzkammer in der Quersfurche der rechten Herzhälfte von vorn um das rechte Herz nach hinten läuft und sich dann in der hintern Längsfurche zur Spitze des Herzens begibt.

2. Die linke Kranzpulsader des Herzens, *arteria coronaria cordis sinistra* (Taf. 8; 2e, im *sulcus longitudinalis anterior*), welche ihren Ursprung da aus der Aorta nimmt, wo im Innern die vordere linke halbmondförmige Klappe liegt, und sich dann in zwei Zweige theilt, von denen der eine in der vordern Längsfurche (Taf. 8; 2c) zur Spitze des Herzens herabläuft, während der andere zwischen linkem Vorhof und linker Herzkammer in der linken Quersfurche von vorn um das linke Herz nach hinten gelangt.

Von der linken Herzkammer steigt die große Körperpulsader, als aufsteigende Aorta, *aorta ascendens*, von hinten links und unten nach vorn rechts und oben in die Höhe, und biegt sich hier wieder nach links und hinten um, den Aortenbogen, *arcus aortae* (Taf. 8; 2a, Taf. 9; 1a) bildend, aus dessen nach oben gekrümmter Convexität die ungenannte Pulsader, die linke gemeinschaftliche Kopf-*pulsader* und die linke Schlüsselbeinpulsader entspringen.

a) Die ungenannte Pulsader, *arteria anonyma* oder *innominata* (Taf. 8; 1a, 2b, Taf. 9; 1a), theilt sich wieder in die rechte gemeinschaftliche Kopf-*pulsader* und die rechte Schlüsselbeinpulsader.

b) Die gemeinschaftliche Kopf-*pulsader*, eine rechte, *arteria carotis communis dextra* (Taf. 8; 1b, Taf. 9; 1d), aus der *arteria anonyma*, und eine linke, *arteria carotis communis sinistra* (Taf. 8; 1c, 2i, Taf. 9; 1m), aus dem *arcus aortae*, theilt sich auf jeder Seite in die äußere Kopf-*pulsader*, *carotis externa* oder *facialis* (Taf. 6; 1a, 2a), und in die innere Kopf-*pulsader*, *arteria carotis interna* oder *cerebralis* (Taf. 6; 2b, 2c).

Von der äußern Kopf-*pulsader* entspringen folgende Zweige:

1. Die obere Schilddrüsenpulsader, *arteria thyroidea superior* (Taf. 8; 1f).

2. Die Zungenpulsader, *arteria lingualis* (Taf. 8; 1g).

3. Die äußere Antlitzpulsader, *arteria maxillaris externa* (Taf. 8; 1h).

Die hintern und obern Zweige der äußern Kopf-*pulsader* sind auf dieser Tafel nicht sichtbar.

c) Die Schlüsselbeinpulsader, eine rechte, *arteria subclavia dextra* (Taf. 8; 1e, Taf. 9; 1d), aus der *arteria anonyma*, und eine linke, *arteria subclavia sinistra* (Taf. 8; 1n, 2d, Taf. 9; 1e), aus dem *arcus aortae*, gibt folgende Zweige ab:

a) nach oben:

1. Die Wirbelpulsader, *arteria vertebralis* (Taf. 9; 1f).

2. Die untere Schilddrüsenpulsader, *arteria thyroidea inferior* (Taf. 9; 1h).

3. Die aufsteigende Nadenpulsader, *arteria cervicalis ascendens* (Taf. 9; 1i).

4. Die oberflächliche Nadenpulsader, arteria cervicalis superficialis (Zaf. 8; 1k. Zaf. 9; 1k).
5. Die quere Schulterblattpulsader, arteria transversa scapulae (Zaf. 9; 1l).

Die quere Nadenpulsader, arteria transversa colli und die tiefe Nadenpulsader, arteria cervicalis profunda, gleichfalls obere Zweige der Schlüsselbeinpulsader, haben nicht zur Darstellung gelangen können.

b) Nach unten:

1. Die innere Brustpulsader, arteria mammaria interna (Zaf. 8; 1i. Zaf. 9; 1g), welche nach unten in die obere Bauchdeckenpulsader, arteria epigastrica superior (Zaf. 8; 1f) übergeht und mit der arteria epigastrica inferior anastomosirt.
2. Die obere Zwischenrippenpulsader, arteria intercostalis suprema. Ist nicht sichtbar zu machen gewesen.

Die Schlüsselbeinpulsader geht in die Achselpulsader, arteria axillaris (Zaf. 8; 1l), und diese wieder in die Armpulsader, arteria brachialis (Zaf. 8; 1m) über, deren weiterer Verlauf auf Tafel 13 zu sehen ist.

Vom Aortenbogen steigt die große Körperpulsader wieder nach abwärts und bildet die absteigende Aorta, aorta descendens, deren oberster in der Brusthöhle gelegener Theil die absteigende Brustaorta, aorta descendens thoracica (Zaf. 9; 1b), ist.

Von dieser gehen außer verschiedenen kleinern Zweigen die hintern Zwischenrippenarterien, arteriae intercostales posteriores (Zaf. 9; 1o), aus. Dieselben sind neun Stück auf jeder Seite, für den dritten bis ersten Zwischenrippenraum. Sie spalten sich sehr bald nach ihrer Entstehung in einen Rücken- und in einen Zwischenrippenzweig, ramus dorsalis und ramus intercostalis. Während der erstere nach hinten tritt, läuft der zweite im Zwischenrippenraume nach vorn und theilt sich in einen obern Zweig, ramus superior oder infracostalis und einen untern Zweig, ramus inferior oder supracostalis, indem der erstere am untern Rande der höher gelegenen Rippe, der zweite längs des obern Randes der tiefer gelegenen Rippe verläuft.

Von der innern Brustpulsader, arteria mammaria interna, entspringen die vordern Zwischenrippenpulsadern, arteriae intercostales anteriores (Zaf. 8; 1n), welche in den sechs ersten Zwischenrippenräumen von vorn nach hinten verlaufen und mit den hintern Zwischenrippenpulsadern anastomosiren.

b) Blutadern.

Die Pulsadern, arteriae, des großen Kreislaufs, nachdem sie sich in den verschiedenen Theilen und Organen des Körpers in die kleinsten Zweige, die Capillargefäße, gespalten, vereinigen sich wieder zu größern Stämmen, den Blutadern, venae, des großen Kreislaufs, welche, während jene sauerstoffreiches, arterielles Blut führen, sauerstoffarmes und kohlensäurereiches, venöses Blut enthalten.

Sämmtliche Blutadern des großen oder Körperkreislaufs vereinigen sich in der obern Hohlvene, vena cava superior oder descendens (Zaf. 8; 2i), in der untern Hohlvene, vena cava inferior oder ascendens (Zaf. 8; 2l. Zaf. 9; 1p), und in den Herzvenen, venae cordis. Diese sämmtlichen Blutadern münden in den rechten Vorhof, aus welchem das Blut durch die Vorhofsmündung, ostium venosum, in die rechte Herzkammer gelangt.

Die obere Hohlvene setzt sich zusammen aus den beiden gemeinschaftlichen Drosselvenen, venae jugulares communes oder anonymae, einer rechten, dextra, und einer linken, sinistra (Zaf. 8; 1o, 2k). Und diese nehmen wiederum auf:

1. Die innere Drosselader, vena jugularis interna (Zaf. 8; 1p).
2. Die äußere Drosselader, vena jugularis externa oder superficialis (Zaf. 8; 1q).
3. Die vordere Drosselader, vena jugularis anterior (Zaf. 8; 1r).
4. Die untere Schilddrüsenblutader, vena thyroidea inferior (Zaf. 8; 1r).
5. Die Schlüsselbeinblutader, vena subclavia (Zaf. 8; 1s), welche eine Fortsetzung der Achselblutader, vena axillaris, ist und die Speichenhautvene, vena cephalica (Zaf. 8; 1v), aufnimmt.
6. Die innere Brustblutader, vena mammaria interna (Zaf. 8; 1t), in welche die vordern Zwischenrippenblutadern, venae intercostales anteriores (Zaf. 8; 1u) münden, während die hintern Zwischenrippenblutadern, venae intercostales posteriores (Zaf. 9; 1q), in die unpaarige und halbunpaarige Blutader eintreten.

c) Lymphgefäße.

Den Hauptstamm der Lymphgefäße oder Saugeadern, vasa lymphatica, bildet der Brustgang, ductus thoracicus oder truncus lymphaticus communis sinister (Zaf. 8; 1w. Zaf. 9; 1r), welcher in der Brusthöhle an der rechten und hintern Seite des großen absteigenden Körperpulsaders, aorta thoracica descendens, liegt. In der Gegend des sechsten Brustwirbels steigt der Brustgang hinter der Speiseröhre in die Höhe und läuft im obersten Theile der Brusthöhle mehr an der linken Seite zwischen der Aorta und Speiseröhre, geht dann hinter dem Bogen der Aorta weg, erreicht in der Gegend des siebenten Halswirbels die linke Schlüsselbeinblutader, geht hinter dieser in die Höhe, beugt sich dann nach vorwärts und mündet in dem Winkel, den die linke Schlüsselbeinblutader mit der linken innern Drosselader bildet, in jene.

IV. Nerven.

Die auf unserer Tafel verzeichneten Nerven stammen entweder vom Gehirn und Rückenmark, oder sie gehören dem sympathischen Nerven an.

Von Gehirnerven sind zu verzeichnen:

1. Der herumtschweifende Nerv, nervus vagus (Zaf. 8; 2a, s. auch Zaf. 7; 2n), und
2. der Zungenfleischernerv, nervus hypoglossus (Zaf. 8; 2b, s. auch Zaf. 7; 2b), mit dem herabsteigenden Aste, ramus descendens hypoglossus (Zaf. 8; 2v), welcher sich mit Nervenfasern vom herumtschweifenden Nerven und vom Halsgeflecht vermischt und Aeste zum Herzsgeflecht abgibt.

Von Rückenmarksnerven ist zu erwähnen:

1. Das Halsgeflecht, plexus cervicalis (Zaf. 8; 2d), von vordern Zweigen der vier obern Halsnerven mit den nach unten durch die Brusthöhle zum Zwerchfell gehenden Zwerchfellnerven, nervi phrenici.
2. Der große Hinterhauptsnerv, nervus occipitalis major, welcher aus dem zweiten Halsnerven entspringt.
3. Die Oberschlüsselbeinnerven, nervi supraclaviculares (Zaf. 8; 1a).
4. Das Armgeflecht, plexus brachialis (Zaf. 8;

von den vordern Zweigen der vier untern und dem ersten Brustnerven ausgehend. Dem Armgeläch nehmen folgende Nerven ihren Ursprung:

Der Schlüsselbeinnerv, nervus subclavius (Taf. 8; 17).

Die vordern Brustlastennerven, nervi thoracici anteriores (Taf. 8; 18), zwei bis fünf Stück.

Die hintern Brustlastennerven oder Rücken-schulterblattnerven, nervi thoracici posteriores (Taf. 8; 18).

Der mittlere Hautnerv des Arms, nervus cutaneus brachii medius (Taf. 8; 18).

Der Ellenbogenerv, nervus ulnaris oder cubitalis (Taf. 8; 17).

Der Mittellarmnerv, nervus medianus (Taf. 8; 15).

Der Speichennerv, nervus radialis (Taf. 8; 17).

Dem sympathischen Nerven, nervus sympathicus (Taf. 8; 27), ist außer dem Stamm sichtbar:

Der oberste Halsknoten, ganglion cervicale supremum (Taf. 8; 25).

Der mittlere Halsknoten, ganglion cervicale medium oder thyroideum (Taf. 8; 17).

Der untere Halsknoten, ganglion cervicale infimum (Taf. 8; 25).

V. Unterleibsorgane.

Erklärung der auf dieser Tafel dargestellten und Organe des Unterleibes siehe im Text zu 11, und zwar:

die Quersfaszie des Unterleibes, fascia transversalis abdominis (Taf. 8; 1X), auf S. 106;

das Bauchfell, peritoneum (Taf. 8; 1Y, 2VI), auf S. 106;

den Magen, ventriculus (Taf. 8; 2VII), auf S. 103;

das große Netz, omentum majus (Taf. 8; 2VIII), auf S. 106;

die Leber, hepar (Taf. 8; 2IX), auf S. 104.

Knochen und Bänder.

Die Knochen und Bänder (Taf. 8; 1A und B, 1E O, 1Q bis 1T, 2A bis 2F und 2M) sind bei Tafel 1 und 4 sowie bei Tafel 5 auf S. 27—28, 43—45, 59 erläutert.

Tafel 9.

Diese Tafel zeigt uns in Figur 1 den geöffneten Thorax nach Entfernung sämtlicher Brusteingeweide von vorn gesehen, sowie den obern Theil des Rumpfes von hinten nach Entfernung der Haut, sodass die Rücken-, Rücken- und Schultermuskeln zur Darstellung kommen.

1. Der Thorax im senkrechten Querschnitt nach Entfernung sämtlicher Brusteingeweide von vorn gesehen.

Os maxillare inferius, Untertiefer.

Os hyoideum, Zungenbein.

Vertebra colli septima, siebenter Halswirbel.

Costa prima, erste Rippe.

Costa septima, siebente Rippe.

Costa decima, zehnte Rippe.

Claviculae pars acromialis, Schulterblattnerven des Schlüsselbeins.

Scapula, Schulterblatt.

Spina scapulae, Schultergräte.

I. Processus coracoideus, Rabenschnabelfortsatz.

K. Cavitas glenoidea scapulae dissecta, Durchschnitt durch die Gelenkfläche des Schulterblattes.

L. Caput humeri dissectum, durchschnittenen Gelenkkopf des Oberarmbeins.

M. Cartilago thyroidea, Schilddrüse.

N. Cartilago cricoidea, Ringknorpel des Kehlkopfes.

O. Epiglottis, Kehlkopf.

P. Tracheae cartilagineae annulares, Ringknorpel der Luftröhre.

Q. Bronchus sinister, linker Luftröhrenast.

Q' Bronchus dexter, rechter Luftröhrenast, geöffnet.

R. Cartilago articularis cavitatis glenoidea scapulae dissecta, Gelenknorpel der Gelenkfläche des Schulterblattes im Durchschnitt.

S. Membrana hyothyroidea, Zungenbein: Schilddrüsennorpel und Zungenbeinschilddrüsennorpelband.

T. Ligamentum thyreo-epiglotticum, Schilddrüsenstehbedeckelband.

U. Ligamentum cricothyroideum oder conoideum, Ring: Schilddrüsennorpelband.

V. Ligamentum colli costae, Rippenhalsband.

W. Ligamentum coraco-acromiale, Rabenschnabelfortsatz: Schulterhöhenband.

X. Tendo musculi bicipitis, Sehne des zweiköpfigen Armmuskels.

I. Tonsillae, Mandeln.

II. Uvula cum glandulis mucosis, Zäpfchen mit den Schleimdrüsen.

II' Velum palatinum, Gaumensegel.

III. Membrana mucosa pharyngis, Schleimhaut des Rachens.

IV. Membrana mucosa tracheae ab extrema parte, Schleimhaut der Luftröhre von der äußern Seite gesehen.

V. Membrana mucosa tracheae, facies interna, innere Seite der Schleimhaut der Luftröhre.

VI. Membrana mucosa bronchi dextri, Schleimhaut des rechten Luftröhrenastes.

VIII. Diaphragma, Zwerchfell.

VII. Oesophagus, Speiseröhre.

VIII' Pleura costalis, Rippenheil des Brustfells.

IX. Cardia ventriculi, Magenmund.

X. Ventriculus, Magen.

X' Curvatura ventriculi major, große Magenkrümmung.

X'' Linea qua omentum majus rescitum est, Linie, von welcher das große Netz abgeschnitten ist.

XI. Hepatis pars sinistra divisa, Durchschnitt durch den linken Leberlappen.

XII. Vesicula fellea aperta, geöffnete Gallenblase.

XIII. Splen, Milz.

1. Musculus glosso-palatinus, Gaumen: Zungenmuskel.

2. Musculus pharyngopalatinus, Gaumenschlundkopfmuskel.

3. Musculus longus colli, langer Halsmuskel.

4. Musculi intercostales interni, innere Zwischenrippenmuskeln.

5. Musculi intercostales externi, äußere Zwischenrippenmuskeln.

a. Arcus aortae, Aortenbogen.

b. Aorta thoracica descendens, absteigende Brust-aorta.

c. Arteria innominata, ungenannte Pulsader.

d. Arteria carotis dextra communis, rechte gemeinschaftliche Kopfpulsader.

e. Arteria subclavia dextra, rechte Schlüsselbeinpulsader.

- f. Arteria vertebralis, Wirbelpulsader.
- g. Arteria mamma interna, innere Brustpulsader.
- h. Arteria thyroidea inferior, untere Schilddrüsenpulsader.
- i. Arteria cervicalis ascendens, aufsteigende Nackenpulsader.
- k. Arteria cervicalis superficialis, oberflächliche Nackenpulsader.
- l. Arteria transversa scapulae, quere Schulterblattpulsader.
- m. Arteria carotis communis sinistra, linke gemeinschaftliche Kopfpulsader.
- n. Arteria subclavia sinistra, linke Schlüsselbeinpulsader.
- o. Arteriae intercostales, Zwischenrippenpulsader.
- p. Vena cava inferior, untere Hohlvene.
- q. Venae intercostales posteriores, hintere Zwischenrippenpulsadern.
- r. Ductus thoracicus, Brustgang.
- z. Nervus vagus, herumschweifender Nerv.
- β. Nervus recurrens oder nervus laryngeus inferior, rücklaufender oder unterer Kehlkopfnerv.
- γ. Nervi tracheales inferiores, untere Luftröhrennerven.
- δ. Plexus pulmonalis, Lungengeflecht.
- ε. Plexus oesophageus anterior, vorderes Speiseröhrengeslecht.
- ζ. Plexus gastricus anterior, vorderes Magengeflecht des Magens.
- η. Nervus sympathicus, sympathischer Nerv.
- η' Nervi sympathici ganglion cervicale supremum, oberer Halsnoten des sympathischen Nerven.
- η'' Ganglion cervicale medium, mittlerer Halsnervennoten.
- η''' Ganglion cervicale infimum, unterer Halsnervennoten.

Figur 2. Der Thorax von hinten nach Entfernung der Haut.

- A. Scapulae margo posterior, hinterer Rand des Schulterblattes.
- B. Spina scapulae, Schultergräte.
- C. Acromion, Schulterhöhe.
- D. Extremitas acromialis claviculae, Schulterhöhenende des Schlüsselbeins.
- E. Tuberculum majus ossis humeri, größerer Oberarmknochenhöcker.
- F. Costae, Rippen.
- 1. Musculus sternocleidomastoideus, Kopfnicker.
- 2. Musculus cucullaris, Kappennmuskel.
- 3. Musculus latissimus dorsi, breiter Rückenmuskel.
- 4. Musculus splenius capitis, Haufschmuskel des Kopfes.
- 5. Musculus splenius colli, Haufschmuskel des Halses.
- 6. Musculus levator anguli scapulae, Schulterblattheber.
- 7. Musculus rhomboideus minor, kleiner Rautenmuskel.
- 8. Musculus rhomboideus major, großer Rautenmuskel.
- 9. Musculus serratus posticus inferior, hinterer unterer Sägemuskel.
- 10. Musculus biventer cervicis, zweibäuchiger Nackenmuskel.
- 11. Musculus complexus cervicis, durchflochtener Nackenmuskel.
- 12. Musculus transversalis cervicis, querer Nackenmuskel.
- 13. Musculus lombo-costalis, Lenden-Rippenmuskel.

- 14. Musculus longissimus dorsi, langer Rückenmuskel.
- 15. Musculus spinalis dorsi, Dornmuskel.
- 16. Musculus obliquus abdominis externus, schiefer Bauchmuskel.
- 17. Musculus serratus anticus major, vorderer Sägemuskel.
- 18. Musculus deltoideus, Deltamuskel.
- 19. Musculus supraspinatus, Obergrätenmuskel.
- 20. Musculus infraspinatus, Untergrätenmuskel.
- 21. Musculus teres minor, kleiner Rautenmuskel.
- 22. Musculus teres major, großer Rautenmuskel.
- 23. Musculus triceps brachii, dreiköpfiger Armmuskel.
- 24. Musculi intercostales externi, äußere Zwischenrippenmuskeln.
 - a. Arteria transversa scapulae, quere Schulterpulsader.
 - b. Arteria circumflexa scapulae, umgebogene Schulterpulsader.
 - b' Arteria dorsalis scapulae, Schulterpulsader.
 - c. Arteria thoracica longa, lange Brustpulsader.
 - d. Rami musculares ex arteriis intercostalibus, Muskelzweige aus den Zwischenrippenpulsadern.
 - e. Nervus dorsalis scapulae, Schulterpulsnerv.
 - β. Nervus suprascapularis, Ober Schulterpulsnerv.
 - γ. Nervi suprascapulares rami ad musculos spinatum, Zweige des Ober Schulterpulsnerv zum Obergrätenmuskel.
 - δ. Nervi suprascapulares rami ad musculos spinatum, Zweige des Ober Schulterpulsnerv zum Untergrätenmuskel.
 - ε. Nervus thoracicus dorsalis, Brustpulsnerv.
 - ζ. Nervus circumflexus brachii etc., Achselnerv.
 - η. Nervus cutaneus brachii posterior, Hautnerv des Arms.
 - θ. Nervi cutanei pectorales, Hautnerven der Brust.
 - ι. Rami posteriores nervorum cervicalium, Zweige der Halsnerven.
 - κ. Rami posteriores nervorum dorsali, Zweige des Rückenmarksnerven.

Muskeln.

I. Muskeln am Nacken und Rücken.

- A. Erste Schicht der Nacken-Rückenmuskeln.
- 1. Der Kappennmuskel, musculus cucullaris (Taf. 6; 1., Taf. 7; 1., Taf. 9; 1.).

Lage:

Unmittelbar unter der Haut des Nackens.

Ansätze:

- a) Der äußere Hinterhauptsknochen, die kreisförmige Linie des Hinterhauptes, der Nackenband und die Stachelfortsätze des Wirbels.
- b) Das Schulterblattende des Schlüsselbeins, die Schulterhöhe und die Schultergräte.

Wirkung:

Zieht die Schulter und mit dieser den Kopf nach rückwärts, wirkt nur der obere Theil in die Höhe, wirkt dagegen der untere Theil, so zieht er dieselbe nach unten.

breite Rückenmuskel, musculus latissimus dorsi (Taf. 8; 1., Taf. 9; 2., Taf. 12; 2.).

geht nach unten von der Haut der Lenden- und Kreuzbeingegegend, nach oben von dem Rückenmuskel bedeckt, und bildet mit seinem obern und äußern Theile die hintere Wand der Achselhöhle.

Die Stachelfortsätze der sechs bis acht untern Brust-, sowie aller Lenden- und Kreuzbeinwirbel, ferner der hintere Theil des obern Randes des Darmbeins und die vier untern Rippen.

Die spinatuberculi minoris, des Oberarmbeins. Wirkung: zieht den Arm nach hinten an den Rumpf und stellt ihn dabei etwas nach innen.

weite Schicht der Nacken- und Rückenmuskeln.

Muskeln der zweiten Schicht am Nacken. Waischmuskel des Kopfes, musculus splenius capitis (Taf. 6; 1., 2., Taf. 9; 2.).

bedeckt vom Rückenmuskel und theilweise vom Nackenmuskel.

Die Stachelfortsätze des dritten bis siebenten Hals- und des ersten und zweiten Brustwirbels. Der Warzenfortsatz des Schläfenbeins und die obere halbkreisförmige Linie des Hinterhauptbeins.

Wirkung: wirken beide Muskeln gemeinschaftlich, so strecken den Kopf, wirkt nur einer, so zieht er den Kopf schief nach hinten.

Waischmuskel des Halses, musculus splenius colli (Taf. 6; 1., 2., Taf. 9; 2.).

leben dem Waischmuskel des Kopfes an dessen äußerer Seite.

Die Dornfortsätze des dritten bis fünften Brustwirbels.

Die Querfortsätze des ersten bis dritten Halswirbels.

Wirkung: zieht den Hals schief nach hinten, wobei er denselben etwas dreht; wirken beide Muskeln zusammen, so strecken sie den Hals.

Schulterblattheber, musculus levator angulae (Taf. 6; 1., 2., Taf. 7; 1., Taf. 8; 2., Taf. 9; 2.).

leben dem Waischmuskel des Halses, an dessen äußerer Seite.

Die Querfortsätze des ersten bis vierten Halswirbels.

Der obere, innere Winkel des Schulterblattes.

Wirkung: zieht das Schulterblatt in die Höhe.

Muskeln der zweiten Schicht am Nacken. Der kleine oder obere Nackenmuskel, musculus rhomboideus minor oder superior (Taf. 6; 2., Taf. 9; 2.).

zwischen dem hintern Rande des Schulterblattes und der Wirbelsäule.

Ansätze:

a) Die Dornfortsätze des sechsten und siebenten Halswirbels.

b) Der obere Theil der äußern Lippe des hintern Randes des Schulterblattes.

Wirkung:

Zieht das Schulterblatt nach rückwärts und dabei etwas nach oben.

2. Der größere oder untere Nackenmuskel, musculus rhomboideus major oder inferior (Taf. 9; 2.).

Lage:

Am untern Rande des kleinen Nackenmuskels.

Ansätze:

a) Die Dornfortsätze des ersten bis vierten Brustwirbels.

b) Der untere Theil der äußern Lippe der Basis des Schulterblattes.

Wirkung:

Zieht das Schulterblatt nach rückwärts.

3. Der untere hintere Sägemuskel, musculus serratus posticus inferior (Taf. 9; 2., Taf. 12; 2.).

Lage:

Unter dem breiten Rückenmuskel in der Lendengegend.

Ansätze:

a) Die Dornfortsätze des elften und zwölften Brust-, sowie des ersten und dritten Lendenwirbels.

b) Der untere Rand der vier untern Rippen.

Wirkung:

Zieht die vier untern Rippen nach abwärts.

4. Der obere hintere Sägemuskel, musculus serratus posticus superior, ist auf unserer Tafel nicht sichtbar.

Lage:

Unter den Nackenmuskeln.

Ansätze:

a) Die Dornfortsätze des sechsten und siebenten Hals-, sowie des ersten und zweiten Brustwirbels.

b) Die äußern Flächen der zweiten bis fünften Rippe in der Nähe der Rippenwinkel.

Wirkung:

Zieht die zweite bis fünfte Rippe in die Höhe.

C. Dritte Schicht der Nacken- und Rückenmuskeln.

Die Muskeln dieser Schicht liegen unter der vorhergehenden Schicht und entspringen zum größten Theil von den Querfortsätzen der Brustwirbel.

a) Muskeln der dritten Schicht am Nacken.

1. Der zweibauchige Nackenmuskel, musculus biventer cervicis (Taf. 6; 2., Taf. 9; 2.).

Lage:

Unmittelbar neben dem Nackenbände oben vom Rückenmuskel, unten von den beiden Waischmuskeln bedeckt.

Ansätze:

a) Die Querfortsätze des vierten bis sechsten Brustwirbels und die Dornfortsätze des dritten und vierten Brustwirbels.

b) Der mittlere Theil der obern halbkreisförmigen Linie des Hinterhauptbeins.

Wirkung:

Zieht den Kopf nach hinten.

2. Der durchflochtene Nackenmuskel, musculus complexus cervicis (Taf. 9; 2.).

Lage:

Nach außen vom zweibauchigen Nackenmuskel, mit welchem er verwachsen ist.

Ansätze:

- a) Die Querfortsätze des ersten bis dritten Brustwirbels und die Gelenkfortsätze des dritten bis siebenten Halswirbels.
- b) Die obere halbkreisförmige Linie des Hinterhauptbeins.

Wirkung:

Zieht den Kopf nach rückwärts.

3. Querer Nackenmuskel, *musculus transversalis cervicis* (Taf. 9; 2₁).

Lage:

An der Seite des Nackens.

Ansätze:

- a) Die Querfortsätze des ersten bis sechsten Brustwirbels.
- b) Die Querfortsätze des zweiten bis sechsten Halswirbels.

Wirkung:

Wirken die Muskeln beider Seiten zugleich, so strecken sie den Hals, wirkt nur einer, so wird der Hals nach der Seite dieses gebeugt.

Die übrigen Nackenmuskeln der dritten Schicht haben nicht dargestellt werden können, der Vollständigkeit wegen führen wir sie hier an, da man sich durch die Angabe der Ansätze ein Bild ihrer Lage machen kann, es sind:

4. Der Nacken-Warzenmuskel, *musculus trachelo-mastoideus*.

Lage:

Zwischen dem vorigen Muskel und dem durchflochtenen Nackenmuskel.

Ansätze:

- a) Die Querfortsätze des fünften bis siebenten Hals-, sowie des ersten bis dritten Brustwirbels, und die Gelenkfortsätze des fünften bis siebenten Halswirbels.
- b) Der hintere Theil des Warzenfortsatzes des Schläfenbeins.

Wirkung:

Zieht den Kopf nach rückwärts sowie nach seiner Seite.

5. Aufsteigender Nackenmuskel, *musculus cervicalis ascendens*.

Lage:

Zwischen dem queren Nackenmuskel, an dessen äußerer Seite er sich befindet, und zwischen dem hintern Rippenhalter, an der Seite des Halses.

Ansätze:

- a) Der obere Rand der dritten bis sechsten Rippe in der Nähe der Rippenwinkel.
- b) Die Querfortsätze des dritten bis sechsten Halswirbels.

Wirkung:

Beugt den Hals nach seiner Seite, kann auch die Rippen heben.

- b) Muskeln der dritten Schicht am Nacken. Es ist hier nur ein Muskel zu nennen, der jedoch in verschiedene Theile zerfällt:

Der gemeinschaftliche Nackengratsheber, *musculus sacro-lumbaris* oder *extensor trunci communis*.

Lage:

Zu beiden Seiten der Wirbelsäule und an der hintern Fläche derselben, vom Kreuzbein bis heraus zum Nacken.

Ansätze:

Der gemeinschaftliche Bauch, die Hauptmasse des Muskels, welche zu beiden Seiten der Lendenwirbelsäule liegt, entspringt von der hintern

Fläche des Kreuzbeins, von der *tuberositas ossis ilei*, und dem hintern Theile des Hüftbeinlamens, sowie von den Dornfortsätzen der Lendenwirbel.

In der Gegend der letzten Rippe theilt sich der gemeinschaftliche Bauch in zwei Partien, die nun getrennte Muskeln bilden, und zwar:

- a. Den langen Rückenmuskel, *musculus longissimus dorsi* (Taf. 9; 2₁).

Lage:

Hinter den Querfortsätzen der Brustwirbel.

Ansatz:

In acht äußere Portionen getrennt am Halfe des dritten bis zehnten Rippe, und in zwölf inneren an den Querfortsätzen sämtlicher Brustwirbel.

- β. Den Lenden-Rippenmuskel, *musculus lumbocostalis* (Taf. 9; 2₁₂).

Lage:

An den hintern Enden der Rippen, nach innen vom Rippenwinkel.

Ansatz:

In zwölf Portionen getrennt an dem unteren Rande einer jeden Rippe in der Gegend des Rippenwinkels. Außerdem verbinden sich mit dem Muskel von dem obern Rande der sieben unteren Rippen ausgehend Muskelbündel, die mit der Hauptmasse zu den höher gelegenen Rippen aufsteigen.

Wirkung:

Wirkt der Gesamtmuskel auf beiden Seiten, so streckt er den Rücken, zieht er sich jedoch nur auf der einen Seite zusammen, so beugt er die Wirbelsäule nach dieser. Der Lenden-Rippenmuskel zieht auch die Rippen nach abwärts.

Die übrigen Schichten der Nacken- und Rückenmuskeln, welche meist kürzer und kleiner sind, haben nicht zur Darstellung gelangen können, weshalb wir sie hier übergehen; erwähnen wollen wir nur noch den Dornmuskel des Nackens, *musculus spinatus dorsi* (Taf. 9; 2₁₀).

Lage:

Zwischen dem langen Rückenmuskel an dessen innerer Seite und den Dornfortsätzen der Wirbel.

Ansätze:

- a) Die Dornfortsätze des zehnten bis zwölften Brust-, sowie des ersten und zweiten Lendenwirbels.
- b) Die Dornfortsätze des zweiten bis achten Brustwirbels.

Wirkung:

Dient mit zur Streckung der Wirbelsäule.

II. Halsmuskeln.

Kopfnicker, *musculus sternocleido-mastoideus* (Taf. 9; 2₁), siehe den Text zu Tafel 6, S. 71.

III. Brustmuskeln.

Vorderer großer Sägemuskel, *musculus serratus anticus major* (Taf. 9; 2₁₇), und die äußeren Zwischenrippenmuskeln, *musculi intercostales externi* (Taf. 9; 2₂₂).

Ueber diese beiden Muskeln siehe den Text zu Tafel 7, S. 83 und 84.

IV. Schultermuskeln.

Die Muskeln an der Schulter finden sich abgehandelt bei den Armmuskeln der Tafel 13, siehe deshalb wegen des:

1. Deltamuskels, *musculus deltoideus* (Taf. 9; 2₁₈), S. 114;
2. Obergrätenmuskels, *musculus supraspinatus* (Taf. 9; 2₁₉), S. 114;

Untergrätenmuskels, musculus infraspinatus (Taf. 9; 2₂₀), S. 114;
kleinen runden Armmuskels, musculus minor (Taf. 9; 2₂₁), S. 114;
großen runden Armmuskels, musculus major (Taf. 9; 2₂₂), S. 114;
dreiköpfigen Muskels, musculus triceps (Taf. 9; 2₂₃), S. 114.

V. Bauchmuskeln.

äußerer schiefer Bauchmuskel, musculus abdominalis externus (Taf. 9; 2₁₄), siehe den zu Tafel 10 auf S. 97.

Gefäße.

I. Pulsadern.

Die **Pulsadern** (Taf. 9; 1a bis 1o) sind bereits Tafel 8 abgehandelt worden, siehe deshalb S. 89 fg.
 Die **quere Schulterblattpulsader, arteria transversa scapulae** (Taf. 9; 2a), ist ein Zweig der **Ährleinpulsader, von welcher sie ausgehend durch Schulterblatteinschnitt zur Obergrätengrube des Schulterblattes gelangt.**

Die **Schulterblatttrüdenpulsader, arteria dorsoscapulae** (Taf. 9; 2b), ist ein Ast der **queren Tenpulsader, arteria transversa colli**, welche herum ein Zweig der **Schlüsselbeinpulsader** Sie läuft an der Basis des Schulterblattes zwischen Hautmuskeln und dem vordern großen Säge-

Die **umgebogene Schulterblattpulsader, arteria circumflexa scapulae** (Taf. 9; 2c), ist ein der **Unterschulterblattpulsader, arteria subscapularis**; welche wiederum ein Zweig der **Achselpulsader** ist. Von der **Unterschulterblattpulsader** gehend schlägt sie sich um den vordern Rand des Schulterblattes herum, um zur Untergrätengrube zu gelangen.

Die **lange Brustastpulsader, arteria thoracica longa** (Taf. 9; 2c), ist die Fortsetzung des Stammes der **Unterschulterblattpulsader**, welche an Seite des Thorax herabläuft.

Die **Muskelzweige aus den Zwischenrippenpulsadern, rami musculares ex arteriis intercostalibus** (Taf. 9; 2o), sind die nach hinten durchgehenden **Rüdenäste, rami dorsales** oder **posteriores, hinteren Zwischenrippenpulsadern.**

II. Blutadern.

Die **Blutadern**, Taf. 9; 1p und 1q, sind bereits Tafel 8 abgehandelt worden, siehe deshalb S. 90.

III. Sangadern.

Der **Brustgang, ductus thoracicus** (Taf. 9; 2r), bereits erwähnt im Text zu Tafel 8 auf S. 90.

Nerven.

Von **Gehirnnerven** finden wir auf dieser Tafel nur den

herumschweifenden Nerv oder Lungenmagen-, nervus vagus oder **nervus pneumogastricus** (Taf. 9; 1a), in seinem Verlauf außerhalb der Schädelkapsel. Hier steigt er zu beiden Seiten des Halses Brusthöhle herab, innerhalb welcher er im **cavum diaphragmatis postici** bis zum **Zwerchfell** herabsteigt, durch dessen **Speiseröhrenloch** er hindurchtritt, um bis in den Magen zu gelangen.

Von **Zweigen** des herumschweifenden Nerven haben wir hier zu erwähnen:

1. Den **zurücklaufenden Nerven, nervus re-rens** oder **laryngeus inferior** (Taf. 9; 1p), welcher

im oberen Theile der Brusthöhle sich vom Stamme abtrennt und rechts hinter der **Schlüsselbeinpulsader**, links um den **Aortenbogen** herum zurück zum **Kehlkopf** läuft.

2. Die **untern vordern Luftröhrennerven, nervi tracheales inferiores** oder **bronchiales anteriores** (Taf. 9; 1r), welche mit den **Luftröhrenästen** zur Lunge verlaufen und das

Lungengeflecht, plexus pulmonalis (Taf. 9; 1d), bilden.

3. Das **Speiseröhrengengeflecht, plexus oesophageus** (Taf. 9; 1e), welches die Fortsetzung der in zahlreiche Fäden zerpaltenen Stämme der herumschweifenden Nerven ist, die vielfach untereinander anastomosiren und ein vorderes und hinteres **Speiseröhrengengeflecht, plexus oesophageus anterior** (Taf. 9; 1e) und **posterior**, bilden.

Das Ende des herumschweifenden Nerven bildet schließlich das

Magenengeflecht, plexus gastricus (Taf. 9; 1f), welches die Fortsetzung des **Speiseröhrengengeflechts** ist und sich an der vordern und hintern Magenwand ausbreitet, zu welcher es durch das **foramen oesophageum** gelangt.

Rückmarksnerven.

Die auf dieser Tafel vorkommenden **Rückenmarksnerven** stammen entweder vom **Armgeflecht** oder von den **Brustnerven** her. Von erstern kommen:

1. Der **Schulterblatttrüdenerv, nervus dorsalis scapulae** oder **thoracicus posterior** (Taf. 9; 2a).

2. Der **Oberschulterblattnerve, nervus suprascapularis** (Taf. 9; 2b), der durch die **incisura scapulae** zum **Schulterblatt** gelangt und sich zerpalte in:

- a) den **Zweig zum Obergrätenmuskel, ramus ad musculus supraspinatum** (Taf. 9; 1r),
- b) den **Zweig zum Untergrätenmuskel, ramus ad musculus infraspinatum** (Taf. 9; 2d).

3. Der **Brusttrüdenerv, nervus thoracicus dorsalis** (Taf. 9; 2e).

4. Der **Achselnerve, nervus axillaris** oder **circumflexus brachii** (Taf. 9; 2f), von welchem der **hintere Hautnerve des Armes, nervus cutaneus posterior brachii** (Taf. 9; 2g), ein Zweig ist.

5. Die **hinteren Äste der Halsnerven, rami posteriores nervorum cervicalium** (Taf. 9; 2i), welche nach hinten die **Muskeln** durchbohren.

Von **Brustnerven** haben wir:

1. Die **Hautnerven der Brust, nervi cutanei pectorales** (Taf. 9; 2j), welche die Fortsetzung der **Zwischenrippennerven** sind.

2. Die **hinteren Zweige, rami posteriores nervorum dorsalis** (Taf. 9; 2k), welche die **Rückenmuskeln** durchbohren.

Sympathischer Nerv.

Der **Sympathische Nerv, nervus sympathicus** (Taf. 9; 1n), ist bereits bei Tafel 7 und 8 abgehandelt worden, ebenso der obere, mittlere und untere **Halsknoten, ganglion cervicale supremum, medium und infimum nervi sympathici** (Taf. 9; 1n, 1n', 1n''), weshalb wir auf S. 85 und 91 verweisen.

Hals- und Brusteingeweide.

Die **Erklärung der Hals- und Brusteingeweide** (Taf. 9; 1Mb bis 1Q und 1Q', 1S bis 1U, sowie 1I bis 1VII und 1VIII), findet sich im Text zu Tafel 6 und Tafel 8, siehe deshalb S. 73 und 87 fg.

Baucheingeweide.

Die Baucheingeweide (Taf. 9; I VIII bis I XIII) werden abgehandelt bei Tafel 11, s. deshalb S. 102 fg.

Knochen.

Die Knochen (Taf. 9; 1A bis 1L und 2A bis 2E) find bei Tafel 2, 3 und 4 auf S. 27 fg., 35 fg. u. 43 fg. erläutert.

Tafel 10.

Der Unterleib, abdomen, ist der Theil des Rumpfes, welcher unterhalb der Brust liegt, und bis zum Becken reicht. Sein vorderer Theil heißt der Bauch, venter, der hintere das Lendenstück, regiones lumbares. Der Bauch wiederum wird in drei Bezirke eingetheilt: in die Oberbauchgegend, regio epigastrica, welche den Raum vom Schwertfortsatz des Brustbeins und der Herzgrube bis zum untern Rand der Rippen und bis in die Nähe des Nabels einnimmt, in die mittlere Bauchgegend, regio mesogastrica, in welcher der Nabel der Mittelpunkt ist und welche sich von der untern Grenze der Oberbauchgegend bis zu einer Linie erstreckt, welche von dem obern vordern Hüftbeinfachel der einen Seite zu dem andern Seite gezogen wird, und in die Unterbauchgegend, regio hypogastrica, welche von oben genannter Linie bis zum Schambogen und den horizontalen Resten der Schambeine reicht. Die Oberbauchgegend wird wiederum in die rechte und linke Unterrippengegend, hypochondrium dextrum und sinistrum oder regio hypochondriaca dextra und sinistra, sowie in die zwischen diesen beiden mitten innen liegende Oberbauchgegend im engeren Sinne, von welcher die Herzgrube, anticardium, den obersten Abschnitt bildet, getheilt. Desgleichen unterscheidet man bei der mittlern Bauchgegend eine rechte und linke Darmbeingegend, regio iliaca dextra und sinistra, welche die Weichen einnehmen und über dem mittlern Theile der beiden Darmbeintämme liegen, während der nach vorn dazwischen sich befindende Abschnitt die Nabelgegend, regio umbilicalis, genannt wird. Endlich wird der hinterste, zu beiden Seiten der Wirbelsäule gelegene Theil dieser Bauchgegend die Lendengegend, regio lumbaris, genannt. Bei der Unterbauchgegend unterscheidet man noch einen mittlern Theil, regio hypogastrica medialis, und zwei seitliche Theile, die Leistengegend, regio hypogastrica lateralis oder inguinalis.

Figur 1. Vorderansicht des Unterleibes, die rechte Seite nach Entfernung der Haut, die linke Seite nach Entfernung des äußern schiefen Bauchmuskels.

- A. Costa septima, siebente Rippe.
- B. Costa decima, zehnte Rippe.
- C. Spina anterior superior ossis ilium, vorderer oberer Darmbeinfachel.
- D. Os pubis, Schambein.
- E. Cartilago costarum spurium, Knorpel der falschen Rippe.
- F. Linea alba, weiße Linie.
- G. Ligamentum Poupartii, Leistenband oder Schenkelbogen.
- H. Aponeurosis musculi obliqui abdominis externi, Sehne des äußern schrägen Bauchmuskels.
- J. Annulus abdominis externus, äußerer Bauchring.
- K. Aponeurosis musculi obliqui abdominis interni, Sehne des innern schrägen Bauchmuskels.
- L. Fascia musculi recti abdominis, Sehnenfascie des geraden Bauchmuskels.

- M. Tunica dartos scroti, Fleischhaut des Hodens.
- N. Ligamentum suspensorium penis, Aufhänger des Gliedes.
- O. Fascia lata femoris, Oberschenkelbinde.
- P. Fossa semicircularis, halbkreisförmige Grube.
- I. Testis cuti scrotali obductus, Hoden in der Haut des Hodensackes überzogen.
- II. Testis musculo cremastro obductus, Hoden dem Hodenmuskel bedeckt.
- III. Glandula lymphatica, Lymphdrüse.
- IV. Penis fascia superficiali obductus, Glied oberhalb bedeckt.
- V. Glans penis, Eichel.
1. Musculus obliquus abdominis externus, äußerer schiefer Bauchmusk.
2. Musculus obliquus abdominis internus, innerer schiefer Bauchmusk.
3. Musculus cremaster, Hodenmuskel.
4. Musculus rectus abdominis, gerader Bauchmusk.
5. Musculi intercostales externi, äußere Zwischenrippenmuskeln.
6. Musculus sartorius in fascia lata, Schenkelheber in der Oberschenkelbinde eingeschlossen.
7. Musculus tensor fasciae latae, Schenkelspanner.
- a. Arteria epigastrica superficialis, oberflächliche Bauchbedenpulsader.
- b. Arteriae pudendae externae, äußere Schenkeladern.
- c. Arteria cruralis, Schenkelpulsader.
- d. Vena cruralis, Schenkelblutader.
- e. Vena saphena magna, große Knieader.
- f. Venae cutaneae femoris, Hautvenen des Schenkels.
- g. Nervus ilioinguinalis, Hüftleistennerve.

Figur 2. Vorderansicht des Unterleibes, die rechte Seite nach Entfernung des inneren schiefen Bauchmuskels, die linke Seite nach Entfernung sämtlicher Bauchdeckenmuskeln.

- A. Costa septima, siebente Rippe.
- B. Costa decima, zehnte Rippe.
- C. Processus xiphoideus sterni, Schwertfortsatz des Brustbeins.
- D. Spina anterior superior ossis ilium, vorderer Hüftbeinfachel.
- E. Crista iliaca, Hüftbeintamm.
- F. Symphysis ossium pubis, Schambeinverwachsung.
- G. Cartilaginum costalium pars, Theil der falschen Rippen.
- H. Aponeurosis musculi transversi abdominis, Sehne des queren Bauchmuskels.
- J. Pars fasciae transversae, Theil der Leistenfascie des Unterleibes, welche die gemeinschaftliche Samenstränge und Hoden bildet.
- K. Pars postica canalis inguinalis, hinterer Theil des Leistenkanales.
- L. Ligamentum suspensorium penis, Aufhänger des Gliedes.
- M. Ligamentum Poupartii, Leistenband.
- N. Ligamentum Gimbernati, Gimbernatisches Band.
- O. Fascia lata femoris, pars superior, oberer Theil der Oberschenkelbinde.
- O. Umbilicus, Nabel.
- I. Testiculus, Hoden.
- II. Corpus cavernosum penis, Schwellkörper des Gliedes im Durchschnitt.
- III. Glans penis, Eichel.
- IV. Urethrae, pars anterior, vorderer Theil der Harnröhre.

Fossa navicularis urethrae oder Morgagnii,
Morgagnische Grube der Harnröhre.
Vesicae urinariae facies anterior, vordere Seite
der Harnblase.
Pleura costalis, Rippenheil des Brustfells.
Pleura diaphragmatica, Zwerchfellheil des Brust-
fells.
Pulmo, Lunge.
Ventriculus, Magen.
Omentum majus, großes Nef.
Intestinum ileum, Krummdarm.
Musculus rectus abdominis, gerader Bauch-
muskel.
Inscriptiones tendineae, sehnige Querstreifen des
geraden Bauchmuskels.
Musculus pyramidalis abdominis, Pyramiden-
muskel des Unterleibes.
Musculus transversus abdominis, querer Bauch-
muskel.
Musculi intercostales interni, innere Zwischen-
rippenmuskeln.
Musculus sartorius, Schneidermuskel.
Musculus tensor fasciae latae, Spanner der
Oberschenkelbinde.
Musculus rectus femoris, gerader Oberschenkel-
muskel.
Musculus pectineus, Kammmuskel.
Musculus adductor femoris longus, langer Zu-
zieher des Beins.
Musculus gracilis, schlanker Schenkelmuskel.
Musculus iliacus internus, innerer Hüftbein-
muskel.
Musculus psoas major, großer Lendenmuskel.
Musculus rectus externus, äußerer großer Schenkel-
muskel.
Musculus cruralis, Oberschenkelmuskel.
Arteria cruralis, Oberschenkelpulsader.
Arteria circumflexa ilium, Kranzpulsader der
Hüfte.
Arteria epigastrica interna oder inferior, innere
oder untere Bauchbedenpulsader.
Arteria epigastrica superficialis, oberflächliche
Bauchbedenpulsader.
Arteria pudenda externa, äußere Schampulsader.
Arteria profunda femoris, tiefe Schenkelpulsader.
Arteria circumflexa femoris externa, äußere
Kranzpulsader des Oberschenkels.
**Ramus descendens arteriae circumflexae femoris
externae**, absteigender Ast der äußern Kranz-
pulsader des Oberschenkels.
Arteria dorsalis penis, Rückenpulsader des Gliedes.
Vena cruralis, Schenkelblutader.
Vena epigastrica, Bauchbedenblutader.
Vena saphena magna, große Aftenerader.
Nervus cruralis, Schenkelnerv.

Muskeln.

I. Bauchmuskeln.

Die Bauchmuskeln, *musculi abdominis*, zerfallen
in Muskeln an der Seitenwand, an der vordern Wand
an der hintern Wand des Bauches.
Muskeln an der Seitenwand des Bauches.
äußerer schiefer Bauchmuskel, *musculus
obliquus abdominis externus* (Taf. 7; 1., Taf. 9; 2.,
Taf. 10; 1.).

an beiden Seiten des Bauches, unmittelbar unter
der Haut desselben.

an Mit acht Zaden am untern Rande der acht
der Rippen. 2. Aufl. — Anatomie.

untern Rippen, zwischen den Zaden des vordern
großen Sägemuskels und des breiten Rücken-
muskels sich einschiebend.

b) Die weiße Linie des Bauches, *linea alba*
(Taf. 10; 1 F), der Dornfortsatz des horizon-
talen Astes des Schambeins und der Scham-
beinklammer, sowie der äußere Rand des Hüft-
kammes.

Wirkung:

Verengt die Bauchhöhle, und wirkt dadurch auf die
Entleerung des Darm- und Blaseninhalts u. s. w.,
zieht auch die Rippen nach abwärts.

2. Innerer schiefer Bauchmuskel, *musculus
obliquus abdominis internus* (Taf. 7; 1., Taf. 10; 1.).

Lage:

Unter dem äußern schiefen Bauchmuskel.

Anfänge:

a) Die äußere Hälfte des Leistenbandes, der Hüft-
kamm und die Rückenlendenfascie.

b) Die untern Ränder der drei untersten Rippen
und die weiße Linie des Bauches.

Wirkung:

Wie der äußere schiefe Bauchmuskel.

3. Querer Bauchmuskel, *musculus trans-
versus abdominis* (Taf. 10; 2.).

Lage:

Unter dem innern schiefen Bauchmuskel.

Anfänge:

a) Die innere Fläche der sieben untern Rippen-
knorpel, die Rückenlendenfascie, der innere
Rand des Hüftbeinkammes und die äußere
Hälfte des Leistenbandes.

b) Die weiße Linie.

Wirkung:

Schnürt den Leib zusammen.

b) Muskeln an der vordern Wand des
Bauches.

1. Gerader Bauchmuskel, *musculus rectus
abdominis* (Taf. 7; 1., Taf. 10; 1., 2.).

Lage:

Neben der Mittellinie des Bauches, eingebüllt in
der fascia recto-abdominalis (Taf. 10; 1.).
Beide Muskeln werden durch die weiße Linie,
linea alba (Taf. 10; 1 F), voneinander getrennt.
Die geraden von oben nach unten verlaufenden
Fleischbündel dieses Muskels sind von drei, zu-
weilen von vier ziemlich gleich weit voneinander
entfernten sehnigen Querstreifen (Taf. 7; 1.,
Taf. 10; 1.) durchseht, die jedoch meistentheils
nicht durch die ganze Dicke des Muskels gehen
und oft auch nicht die ganze Breite desselben
einnehmen; stets sind sie aber mit der Sehnen-
scheide des Muskels verwachsen.

Anfänge:

a) Die vordere Fläche des fünften bis siebenten
Rippenknorpels und der Schwertfortsatz des
Brustbeins.

b) Die Schambeinfuge.

Wirkung:

Verengt die Bauchhöhle, zieht die Rippen nach
abwärts und beugt den Rumpf nach vorn.

2. Der Pyramidenmuskel des Unterleibes
musculus pyramidalis abdominis (Taf. 10; 2.).

Lage:

Am untern Ende des geraden Bauchmuskels,
denselben an dieser Stelle bedeckend, zu beiden
Seiten der weißen Linie.

Anfänge:

- a) Der innere Theil des horizontalen Astes des Schambeins und die Schambeinfuge.
- b) Die weiße Linie.

Wirkung:

Spannt die weiße Linie.

3. Hodenmuskel, musculus cremaster (Taf. 10; 1H, 1a).

Lage:

Am Samenstrange, ausgehend vom innern schiefen Bauchmuskel, von welchem der Hodenmuskel ein abgetrennter Theil ist.

Anfänge:

- a) Der innere schiefe Bauchmuskel.
- b) Die gemeinschaftliche Scheidenhaut des Samenstranges und Hodens.

Wirkung:

Zieht den Hoden in die Höhe.

- c) Muskeln an der hintern Wand der Bauchhöhle.

Vierediger gerader Lendenmuskel, musculus quadratus lumborum. Hat nicht zur Darstellung gelangen können. Der Vollständigkeit wegen und da man sich leicht seine Lage und sein Bild vorstellen kann, führen wir ihn hier an.

Lage:

Neben den Lendenwirbeln.

Anfänge:

- a) Der innere Rand des hintern Theils des Darmbeinkammes, das Darmbeinleidenband und der Querfortsatz des fünften Lendenwirbels.
- b) Die Querfortsätze der vier obern Lendenwirbel, und der untere Rand des hintern Endes der zwölften Rippe.

Wirkung:

Biegt die Wirbelsäule nach seiner Seite, und zieht die zwölfte Rippe nach abwärts.

Nach oben gegen die Brusthöhle wird die Bauchhöhle von dem Zwerchfell, diaphragma (Taf. 10; 2 VIII), abgeschlossen. Dasselbe ist bereits bei Taf. 8 abgehandelt worden, siehe deshalb S. 87.

Hier lassen sich zugleich am zweckmäßigsten einige sehnige Gebilde besprechen, die zu den Muskeln der vordern und seitlichen Bauchwand in innigster Beziehung stehen. Es sind:

Die weiße Linie, linea alba (Taf. 7; 1., Taf. 10; 1F), welche von den in der Mittellinie des Bauches zusammenstoßenden Sehnen der seitlichen Bauchmuskeln gebildet wird. Sie läuft vom Schwertfortsatz des Brustbeins zur Schambeinfuge. Auf ihr liegt der Nabel, umbilicus (Taf. 10; 20).

Das Leisten- oder Schenkelband, Ligamentum Poupartii oder arcus cruralis (Taf. 10; 1G, 2M. Taf. 11; 2K). Dasselbe wird gebildet von dem untern nach innen umgerollten Rande der Aponeurose des äußern schiefen Bauchmuskels, aponeurosis musculi obliqui abdominis externi (Taf. 10; 1H), welcher sich von dem obern vordern Darmbeinsattel schief nach innen und unten zur Schambeinfuge erstreckt. Durch die Umröllung des freien Saumes der Aponeurose entsteht eine Rinne, in welcher der Samenstrang verläuft. Derselbe durchbohrt die Aponeurose nach vorn, welche Spalte der äußere Bauchring, annulus abdominalis externus oder inguinalis externus (Taf. 10; J), genannt wird, im Gegensatz zum innern Bauchring, annulus abdominalis internus, womit die nach der Bauchhöhle zu führende Oeffnung des Leistenkanals, canalis inguinalis, bezeichnet wird, in welchem der

Samenstrang verläuft. Die hintere Wand des Leistenkanals (Taf. 10; 2K) wird auch von den Theilen der Sehne des innern schiefen Bauchmuskels, aponeurosis musculi obliqui abdominis interni (Taf. 10; 1K), und der Sehne des äußern schiefen Bauchmuskels, aponeurosis musculi transversi abdominis (Taf. 10; 2H), gebildet.

Das Gubernaculöse Band, ligamentum gubernaculi (Taf. 10; 2M'), ist der Theil des Leistenkanals, welcher sich in Gestalt eines dreieckigen Schwammes an den Schambeinkamm ansetzt.

Die Querschleife des Unterleibs, lacuna transversa abdominis (Taf. 8; 1X), ist eine Leiste, welche den queren Bauchmuskel an seiner Basis überzieht und am Leistenkanal sich in denselben erstreckt.

II. Brustmuskeln.

Die äußern und innern Zwischenrippenmuskeln, musculi intercostales externi (Taf. 10; 2a), und interni (Taf. 10; 2b), sind bereits abgehandelt worden, weshalb wir auf S. 84 u.

III. Muskeln an der untern Extremität.

Die Muskeln der untern Extremität werden in ihrer Erklärung erst bei Taf. 14, hier wegen des

1. Schneidermuskels, musculus sartorius (Taf. 10; 2a), S. 126;
2. Spannungsmuskel der Oberschenkelhaut, musculus tensor fasciae latae (Taf. 10; 1, 2), S. 126;
3. großen Oberschenkelmuskel, musculus gluteus maximus (Taf. 10; 2N), und der halbbovalen Grube, fossa ovalis (Taf. 10; 1P), S. 125;
4. geraden Oberschenkelmuskel, musculus rectus femoris (Taf. 10; 2c), S. 126;
5. Kammuskel, musculus pectineus (Taf. 10; 2a), S. 126;
6. langen Zuziehers des Beins, musculus adductor longus femoris (Taf. 10; 2c), S. 126;
7. schmalen Schenkelmuskel, musculus adductor brevis (Taf. 10; 2c), S. 126;
8. innern Hüftbeinmuskels, musculus internus (Taf. 10; 2d), S. 124;
9. großen Lendenmuskels, musculus major (Taf. 10; 2a), S. 124;
10. äußern großen Schenkelmuskels, musculus rectus externus (Taf. 10; 2a), S. 126;
11. Oberschenkelmuskels, musculus vastus (Taf. 10; 2a), S. 126.

Blutgefäße.

Die Pulsadern (Taf. 10; 1a bis 1c und 2a bis 2c) sowie die Blutadern (Taf. 10; 1d bis 1f und 2d bis 2f) werden erwähnt bei Taf. 12, S. 110.

Nerven.

Ueber die Nerven (Taf. 10; 1a und 2a) Text zu Taf. 12, S. 110.

Brusteingeweide.

Die Erklärung der Brusteingeweide (Taf. 10; 2IX), siehe bei Taf. 8, S. 88.

Baucheingeweide.

Die Erklärung der Baueingeweide (Taf. 10; 2XII) siehe bei Taf. 11, S. 102–108.

Harnorgane.

Der Harnapparat oder die Harnorgane, bestehen in ihren Haupttheilen aus den Nieren, den Harnleitern, der Harnblase und der Harnröhre.

Nieren.

Nieren, *renes* (Taf. 12; 1 VII), sind zwei schlauchförmigen Drüsen gebaute Organe von unregelmäßiger Gestalt, welche in der rechten und linken Hohlkehle, zur Seite des ersten bis dritten Lendenbogens, vor den zwei letzten Rippen und dem obern Theile des vieredigen Lendenmuskels liegen. An jeder Niere unterscheidet man eine vordere und hintere Fläche, welche schwach gewölbt sind, und zwar die erstere mehr nach oben, die letztere, sowie einen äußern größern stark concaven und einen innern kleinen concaven Rand. In der Mitte befindet sich ein Längeneinschnitt, *renalis*, in welchem die Gefäße in die Nieren eintreten, sowie zugleich mit dem Harnleiter nach unten gelangen.

Harnleiter.

Der Harnleiter oder Harngang, *ureter* (Taf. 12; 1), ist eine lange, enge, cylindrische Röhre, welche aus dem Nierenbecken, *pelvis renalis*, hervorgeht, nach unten zum Becken läuft, wo sie an der innern untern Seite der Blase die Wand derselben durchdringt.

Harnblase.

Die Harnblase oder Urinblase, *vesica urinaria* (Taf. 10; 2 VI, Taf. 11; 1 XI, 2 XVI), ist ein häutiger, sackförmiger Sack, welcher im kleinen Becken unmittelbar unter dem Schambeinfuge und den Schambeinen liegt. Die Blase unterscheidet sich von der Harnröhre durch eine Schleimhaut und einer darauffolgenden Muskelhaut, *corpus vesicae*, den mittlern Theil, *apex*, *vertex*, die obere Wölbung, und den Grund, *fundus vesicae*, der nach vorn in den Harnhals, *collum vesicae*, übergeht, aus welchem die Harnröhre ihren Ursprung nimmt und wo beim Mann die Vorsteherdrüse, *prostate* (Taf. 11; 2 XVII), liegt. An der Seite des Körpers der Harnblase liegen die Seitenbänder, *ligamenta vesicae lateralia* (Taf. 11; 1), welche nach aufwärts convergirend zum Nabel führen, die Ueberbleibsel der frühern Nabelpulsader des fötalen Blutkreislaufs. Von dem Scheitel der Blase geht gleichfalls ein Band zum Nabel in die Leber, das mittlere Blasenband, *ligamentum vesicae medium* oder *ligamentum suspensorium*, auch Harnstrang, *urachus* (Taf. 11; 1 G), aus, welcher gleichfalls ein Rest des embryonalen Nabels ist.

Harnröhre.

Die Harnröhre, *urethra* (Taf. 10; 2 IV, Taf. 11; 1), ist eine runde, mit Schleimhaut ausgekleidete Röhre, welche den Ausführungsgang der Harnblase bildet. Sie erstreckt sich vom Blasenhalse nach vorwärts, und läuft unter der Schambeinfuge hindurch, um sich an den äußern Geschlechtstheilen zu öffnen. Die mit der Blase in Verbindung stehende Röhre heißt die Blasenöffnung, *ostium vesicae*, während die nach außen gerichtete Röhre die Hautöffnung, *ostium cutaneum*, genannt wird. Die Harnröhre ist verschieden ist die weibliche von der männlichen Harnröhre, während jene kurz, etwa 1 1/2 Zoll lang und weit ist, ist diese enger und länger, 3 Zoll lang.

Die männliche Harnröhre unterscheidet man in drei Theile, den hintern oder Anfangstheil, auch Harnröhrenhals, *pars prostatica urethrae*, den mittleren Theil, *pars membranacea*, den häutigen Theil, *pars membranacea*

urethrae, welcher der engste ist und unter dem Schambeinbogen liegt, und den schwammigen Theil, *corpus cavernosum urethrae*. Der letztere ist der längste, beginnt mit einem diden Körper, der Harnröhrenzwiebel, *bulbus urethrae* (Taf. 11; 1 XIV), und endet auf der Spitze der Eichel, innerhalb welcher sie sich zu der Fossa navicularis *urethrae* (Taf. 10; 2 V), erweitert.

Geschlechtstheile.

Die Geschlechtstheile oder Zeugungsorgane, *organa genitalia* oder *sexualia*, sind zweierlei Art, männliche und weibliche. In unsern Abbildungen haben wir die ersten einen Platz gefunden, weshalb wir diese auch nur einer Betrachtung unterwerfen.

Männliche Geschlechtstheile.

An den männlichen Geschlechtstheilen, *organa genitalia virilia*, unterscheidet man den Hodensack, die Hoden, den Samenstrang mit dem Samenleiter, die Samenbläschen und die Vorsteherdrüse sowie das männliche Glied.

Hodensack.

Der Hodensack, *scrotum* (Taf. 10; 1), wird durch die äußere Haut gebildet, welche zwischen den beiden Schenkeln und vor dem Schambogen beutelförmig herabhängt. Derselbe wird in verticaler Richtung durch eine linienförmige Erhabenheit, die Naht, *raphe*, welche vom Gliede rückwärts über den Damm bis zum After verläuft, in zwei Hälften getheilt, die auch im Innern durch eine Scheidewand getrennt werden. An den Hodensack nach innen legt sich die Hautoberhaut, *tunica dartos* (Taf. 10; 1 M), die durch lockeres Zellgewebe mit der äußern Haut verwachsen ist, und sich nach oben in die oberflächliche Fascie des Bauches, Dammes und des Gliedes verliert.

Hoden.

Die Hoden, *testes* oder *testiculi*, auch *orchides* und *didymi* genannt (Taf. 10; 1 I, II, 2 I, Taf. 11; 1 XV), sind zwei länglich ovale Körper, ungefähr von der Größe und Gestalt eines Taubeneyes, welche eingekapselt in der gemeinschaftlichen Scheidenhaut des Hodens, *tunica vaginalis propria testis* (Taf. 11; 1 XVI), und bedeckt vom Hodenmuskel, *musculus cremaster* (Taf. 10; 1 N), im Hodensack nur durch die Scheidenhaut und des Hodensackes, *septum scroti*, voneinander getrennt, liegen. Jeder Hoden besteht aus dem eigentlichen Hoden, *testis* oder *didymus* (Taf. 11; 1 XV), welcher aus röhrenförmigen Drüsen zusammengesetzt ist, die durch eine fibröse Kapsel, die weiße Haut, *tunica albuginea* (Taf. 11; 1 XV), zusammengehalten werden, und dem Nebenhoden, *epididymis* (Taf. 11; 1 XVI), einem länglichen, cylindrischen Körper, in welchen die Drüsenbläschen des Hodens münden. Derselbe entspringt am obern Ende des Hodens, welcher Theil des Nebenhodens der Kopf, *caput epididymidis*, genannt wird. Er verläuft dann an der hintern Seite des Hodens, wo er mit seinem untern Ende, dem Schwanz, *cauda epididymidis*, in den Samenleiter, *vas deferens*, übergeht. Der mittlere Theil des Nebenhodens heißt der Körper, *corpus epididymidis*. Der Nebenhoden bildet eine vielfach gewundene Röhre, die wie eine Wulst an der hintern Seite des Hodens liegt.

Samenstrang.

Der Samenstrang, *funiculus spermaticus* (Taf. 11; 1 XVII, 2 XVIII), welcher sich vom untern Ende des Nebenhodens, im Hodensack verlaufend, zum äußern Leistenringe begibt, dann im Leistenanal verläuft, und

durch den innern Leistenring in die Bauchhöhle gelangt, ist von rundlicher Gestalt. Er besteht aus dem Samenleiter oder Samengang, vas deferens, des Blut- und Lymphgefäßen, sowie den Nerven des Hodens, und wird von der gemeinsamen Scheidenhaut des Hodens und Samenstrangs, tunica vaginalis communis testis et funiculi spermatici (Taf. 10; 2J), umhüllt, um welche letztere sich noch der Hodenmuskel lagert.

Der Samenleiter, vas deferens, ein cylindrischer Kanal, von Nabelnagelgröße, ist die Fortsetzung des Nebenhodens, und verläuft im Samenstrang. Bei seinem Eintritt in die Bauchhöhle durch den innern Leistenring trennt er sich vom Samenstrang und läuft zum Blasengrund. Dasselbst nähern sich die beiderseitigen Samenleiter immer mehr, so daß sie dicht nebeneinander liegen. Sie geben dann zur Vorsteherdrüse und münden, nachdem sie zuvor die Ausführungsgänge der an ihren äußern Seiten gelegenen Samenbläschen aufgenommen haben, in den Vorsteherdrüsentheil der Harnröhre.

Samenbläschen.

Die Samenbläschen, vesiculae seminales oder spermaticae, sind zwei längliche häutige Säcke, die am Blasengrunde nach außen von den Samenleitern liegen, mit welchen sich ihr Ausführungsgang zu dem Ausführgang, ductus ejaculatorius, vereinigt, der wie schon erwähnt in den Anfangstheil der Harnröhre mündet.

Vorsteherdrüse.

Die Vorsteherdrüse, glandula prostata (Taf. 11; 2XVII), ist eine traubige Drüse von der Form einer Kastanie, welche dicht vor dem Blasenbalse liegt und den Anfangstheil der Harnröhre umgibt.

Männliches Glied.

Das männliche Glied oder die Ruthe, membrum virile oder penis (Taf. 10; 1IV), auch priapus genannt, ist ein länglicher Körper von schwammiger Beschaffenheit, an dessen unterer Seite die Harnröhre liegt. Der hintere an den Schambeinen befestigte Theil des Gliedes heißt die Wurzel, radix penis, an welcher sich das Aufhängeband der Ruthe, ligamentum suspensorium penis (Taf. 10; 1N, 2L), befindet. Der obere Theil des Gliedes heißt der Rücken, dorsum penis, welcher breit und flach ist, und im erschlafften Zustande nach vorn sieht. Zusammengefaßt wird das Glied aus den zwei Schwellkörpern, corpora cavernosa penis (Taf. 10; 2II. Taf. 11; 1XIII), zwei walzenförmigen, von einer starken fibrösen Hülle, der weißen Haut, tunica albuginea, umgebenen Körpern. In der durch die beiden aneinander stoßenden Schwellkörper gebildeten Rinne an der untern Fläche des Gliedes liegt die Harnröhre. Nach vorn werden die beiden Schwellkörper von der Eichel, glans penis, aus balanus oder caput penis genannt (Taf. 10; 1V, 2III), umfaßt, welche die Gestalt eines abgestumpften Kegels hat, und von der Harnröhre durchbohrt wird, welche auf dem Scheitel der Eichel nach außen mündet. Innerhalb der Eichel erweitert sich auch die Harnröhre zu der sogenannten Morgagnischen Grube, fossa Morgagni oder navicularis (Taf. 10; 2V). Die Basis der Eichel wird von einem wulstigen abgerundeten Rande umgeben, welcher die Krone, corona glandis, heißt. Wie die Schwellkörper, wird auch die Eichel von der äußern Haut überzogen, die hier den Namen Vorhaut, praeputium, führt und sich von der Eichel zurückstreifen läßt, indem sie nur um die Krone herum, sowie durch

das Bändchen, frenulum praeputii, an der untern hintern Seite der Eichel, festgewachsen ist. Die innere Platte der Vorhaut geht an der Krone unmittelbar auf die Eichel über.

Knochen und Bänder.

Die Erklärung der auf dieser Tafel vorkommenden Knochen und Bänder (Taf. 10; 1A bis 1Z und II bis 2G) siehe im Text zu den Tafeln 1, 4 und auf S. 45 und 59.

Tafel 11.

Figur 1. Der Unterleib nach Entfernung sämtlicher Bauchdecken und des Rectums.

- A. Costa septima, siebente Rippe.
- B. Costa decima, zehnte Rippe.
- C. Spina anterior superior ossis ilei, vordere obere Hüfteinstachel.
- D. Crista ossis ilei, Hüfteinstamm.
- E. Symphysis ossium pubis, Schambeinfuge.
- F. Ramus horizontalis ossis pubis, horizontaler Theil des Schambeins.
- G. Ligamentum vesicale medium, mittleres Samenblasenband.
- G' Ligamentum vesicale laterale, seitliches Samenblasenband.
- H. Peritonei pars, Theil des Bauchfells.
- J. Pleura costalis, Rippenstheil des Brustfells.
- J' Pleura diaphragmatica, Zwerchfellstheil des Brustfells.
- K. Ligamentum Poupartii, Leistenband.
- L. Ligamentum suspensorium hepatis, Aufhängeband der Leber.
- I. Pulmo, Lunge.
- II. Hepar, lobulus dexter, rechter Leberlappen.
- II' Hepar, lobulus sinister, linker Leberlappen.
- II'' Lobulus quadratus hepatis, viereckiger Leberlappen.
- II''' Lobulus Spigelii hepatis, Spigel'scher Lappen der Leber.
- IIa Incisura hepatis oder interlobularis, Leberfurchung.
- IIb Fossa transversa hepatis, Querfurchung der Leber.
- IIc Fossa longitudinalis dextra hepatis, rechte Längsfurchung der Leber.
- IId Fossa longitudinalis sinistra hepatis, linke Längsfurchung der Leber.
- III. Vesicula fellea, Gallenblase.
- III' Ductus cysticus, Blasengang.
- IV. Ductus hepaticus, Lebergang.
- IV' Ductus choledochus, Gallengang.
- V. Ventriculus, Magen.
- V' Cardia, Magenmund.
- VI' Fundus ventriculi, Magenrund.
- VI'' Pylorus, Pförtner.
- Va Curvatura ventriculi minor, kleiner Bogen des Magens.
- Vb Curvatura ventriculi major, großer Bogen des Magens.
- VI. Intestinum duodenum, Zwölffingerdarm.
- VII. Lien, Milz.
- VIII. Intestinum jejunum, Leerdarm.
- IX. Intestinum ileum, Krummdarm.
- X. Colon transversum, Quergrümdarm.
- X' Flexura coli dextra, rechte Quergrümdarmbiegung.
- X'' Flexura coli sinistra, linke Quergrümdarmbiegung.
- X''' Colon descendens, absteigender Grümdarm.
- Xa S romanum, römisches S.

- IX Appendices epiploicae, Nefenanhänge.
 X Vesica urinaria, Harnblase.
 XI Urethra, Harnröhre.
 XII Corpus cavernosum penis, Schwellkörper des Gliedes.
 XIII Bulbus urethrae, Harnröhrenknäuel.
 XIV Testis in tunica albuginea, Hoden in der weißen Haut.
 XV Epididymis, Nebenhode.
 XVI Tunica vaginalis propria testis, eigene Scheidenhaut des Hodens.
 XVII Funiculus spermaticus, Samenstrang.
 XVIII Diaphragma, Zwerchfell.
 1. Crura interna diaphragmatis mit dem hiatus aorticus, innerer Schenkel des Zwerchfells mit dem Aortenschlitze.
 2. Musculus obliquus abdominis externus, äußerer schiefer Bauchmuskel.
 3. Musculus obliquus abdominis internus, innerer schiefer Bauchmuskel.
 4. Musculus transversus abdominis, quere Bauchmuskel.
 5. Musculus tensor fasciae latae, Oberschenkelbindenspanner.
 6. Musculus sartorius, Schneidermuskel.
 7. Musculus rectus femoris, gerader Oberschenkelmuskel.
 8. Musculus pectineus, Kamm-Muskel.
 9. Musculus adductor longus, großer Zugzieher des Beins.
 10. Musculus gracilis, schlanker Schenkelmuskel.
 11. Musculus iliacus internus, innerer Hüftbeinmuskel.
 12. Musculus psoas major, großer Lendenmuskel.
 13. Musculus vastus externus, äußerer großer Schenkelmuskel.
 14. Musculus cruralis, Oberschenkelmuskel.
 a. Aorta abdominalis, Bauchpulsader.
 b. Arteriae phrenicae inferiores, untere Zwerchfellpulsadern.
 c. Arteria coeliaca, Eingeweidepulsader.
 d. Arteria lienalis, Milzpulsader.
 e. Arteria hepatica, Leberpulsader.
 f. Arteria coronaria ventriculi sinistra, linke Kranzpulsader des Magens.
 g. Arteria gastro-duodenalis, Magen-Zwölfingerdarmpulsader.
 h. Arteria coronaria ventriculi dextra, rechte Kranzpulsader des Magens.
 i. Arteria cystica, Gallenblasenpulsader.
 l. Arteriae ventriculi breves, kurze Magenpulsadern.
 l. Arteria gastro-epiploica sinistra, linke Magenpulsader.
 m. Arteria cruralis, Schenkelpulsader.
 n. Arteria epigastrica, untere Bauchdeckenpulsader.
 o. Arteria circumflexa ilei, Kranzpulsader der Hüfte.
 p. Arteria epigastrica superficialis, oberflächliche Bauchdeckenpulsader.
 q. Arteriae pudendae externae, äußere Schamspulsadern.
 r. Arteria profunda femoris, tiefe Schenkelpulsader.
 s. Arteria circumflexa femoris externa, äußere Kranzpulsader des Oberschenkels.
 t. Ramus descendens arteriae circumflexae femoris externae, absteigender Zweig der äußeren Kranzpulsader des Oberschenkels.
 u. Arteria dorsalis penis, Rückenpulsader des Gliedes.
 v. Vena portae, Pfortader.
 w. Vena cruralis, Schenkelblutader.
 x. Vena epigastrica, Bauchdeckenblutader.

- y. Vena saphena magna, große Rosenader.
 z. Venae pudendae externae, äußere Schamblutadern.
 a. Nervus lumbos-inguinalis, Lendenleistennerv.
 ß. Nervus cutaneus femoris anterior externus, vorderer äußerer Hautnerv des Oberschenkels.
 γ. Nervi obturatorii ramus anterior, vorderer Ast des Hüftlochnerven.
 δ. Nervus cruralis, Schenkelnerv.
 e. Nervus cutaneus femoris internus, innerer Hautnerv des Oberschenkels.
 ζ. Nervus cutaneus femoris anterior medius, vorderer mittlerer Hautnerv des Oberschenkels.
 η. Nervus saphenus major, großer Rosennerv.
 θ. Nervi cruralis rami musculares, Muskelzweige des Schenkelnerven.
 ι. Nervus cutaneus aus dem nervus ilio-hypogastricus, Hautnerv aus dem Hüftbedennerv.

Figur 2. Unterleib nach Entfernung des Dünndarms.

- A. Costa septima, siebente Rippe.
 B. Costa decima, zehnte Rippe.
 C. Spina anterior superior ossis ilei, oberer vorderer Hüftbeinfortsatz.
 C' Crista iliaca, Hüftbeinkamm.
 D. Symphysis ossium pubis, Schambeinjinne.
 E. Ramus horizontalis ossis pubis, horizontaler Schambeinast.
 F. Trochanter major, großer Rollhügel.
 G. Collum femoris, Schenkelhals.
 H. Arcus cruralis oder ligamentum Poupartii, Schenkelbogen.
 J. Fascia iliaca, Hüftbeinfascie.
 K. Peritoneum, Bauchfell.
 L. Mesenterium, Gekröse.
 M. Pleura, Brustfell.
 N. Ligamentum obturatorium, Hüftlochband.
 1. Lobulus dexter hepatis, rechter Leberlappen.
 l' Lobulus sinister hepatis, linker Leberlappen.
 l'' Ligamentum teres, rundes Band.
 II. Lien, Milz.
 III. Ventriculus, Magen.
 IV. Intestinum duodenum, Zwölffingerdarm.
 V. Intestini jejuni pars suprema, oberer Theil des Leerdarms.
 VI. Intestini ilei pars infima, unterer Theil des Krummdarms.
 VII. Processus vermiformis, Wurmfortsatz.
 VIII. Intestinum caecum, Blinddarm.
 IX. Colon ascendens oder dextrum, aufsteigender oder rechter Grimmdarm.
 X. Flexura coli dextra, rechte Biegung des Grimmdarms.
 XI. Colon transversum, Quergrimmdarm.
 XI' Appendices epiploicae, Nefenanhänge.
 XII. Flexura coli sinistra, linke Biegung des Grimmdarms.
 XIII. Colon descendens oder sinistrum, absteigender oder linker Grimmdarm.
 XIV. Flexura sigmoidea oder S roianum, römisches S.
 XV. Intestinum rectum, Mastdarm.
 XV' Anus, After.
 XVI. Vesica urinaria aperta, anterior pars, die Harnblase von vorn geöffnet.
 XVII. Prostata, pars posterior, hinterer Theil der Vorsteherdrüse.
 XVIII. Funiculus spermaticus, Samenstrang.
 1. Diaphragma, Zwerchfell.
 2. Musculi intercostales, Zwischenrippenmuskeln.

3. Musculus obliquus abdominis externus, äußerer schiefer Bauchmuskel.
4. Musculus obliquus abdominis internus, innerer schiefer Bauchmuskel.
5. Musculus transversus abdominis, schräger Unterleibsmuskel.
6. Musculus psoas major, großer Lendenmuskel.
7. Musculus iliacus internus, innerer Hüftbeinmuskel.
8. Musculus gluteus maximus, großer Gesäßmuskel.
9. Musculus gluteus medius, mittlerer Gesäßmuskel.
10. Musculus pectineus, Kammmuskel.
11. Musculus obturator externus, äußerer Hüftlochmuskel.
12. Musculus rectus femoris, gerader Oberschenkelmuskel.
13. Musculus adductor longus, langer Zuzieher des Beins.
14. Musculus adductor brevis, kurzer Zuzieher des Beins.
15. Musculus adductor magnus, großer Zuzieher des Beins.
16. Musculus gracilis, schlanker Schenkelmuskel.
17. Musculus vastus internus, innerer großer Oberschenkelmuskel.
18. Musculus vastus externus, äußerer großer Oberschenkelmuskel.
 - a. Arteria cruralis, Schenkelpulsader.
 - b. Arteria epigastrica, Bauchadenpulsader.
 - c. Arteria profunda femoris, tiefe Schenkelpulsader.
 - d. Vena cruralis, Schenkelpulsader.
 - e. Vena saphena magna, größere Rosenblutader.
 - f. Vena profunda femoris, tiefe Schenkelblutader.
 - g. Nervus obturatorius, ramus anterior, vorderer Ast des Hüftlochnerven.
 - h. Nervus obturatorius, ramus posterior, hinterer Ast des Hüftlochnerven.

Muskeln.

I. Bauchmuskeln.

Die Bauchmuskeln sind bereits abgehandelt bei der Tafel 10, siehe deshalb wegen des

1. äußern schiefen Bauchmuskels, musculus obliquus abdominis externus (Taf. 11; 1, 2), sowie wegen des Leistenbundes, ligamentum Poupartii (Taf. 11; 1k), S. 97;
2. innern schiefen Bauchmuskels, musculus obliquus abdominis internus (Taf. 11; 1, 2), S. 97;
3. queren Bauchmuskels, musculus transversus abdominis (Taf. 11; 1, 2), S. 97.

In Bezug auf das Zwerchfell, diaphragma (Taf. 11; 1, 2), und auf die innern Zwerchfellschenkel (Taf. 11; 1), sowie wegen des Rippen- und Zwerchfelltheils des Brustfelles, Pleura costalis und pleura diaphragmatica (Taf. 11; 1J und 1J', ferner Taf. 11; 2M), und der Lunge, Pulmo (Taf. 11; 1), siehe den Text zu Taf. 8, S. 88; desgleichen in Bezug auf die Zwischenrippenmuskeln, musculi intercostales (Taf. 11; 2), den Text zu Taf. 7; S. 84.

II. Muskeln an der untern Extremität.

Ueber die Muskeln der untern Extremität siehe den Text zu Taf. 14, und zwar wegen des

1. innern Hüftbeinmuskels, musculus iliacus internus (Taf. 11; 1, 2), S. 124;
2. großen Lendenmuskels, musculus psoas major (Taf. 11; 1, 2), S. 124;
3. großen Gesäßmuskels, musculus gluteus maximus (Taf. 11; 2), S. 125;

4. mittlern Gesäßmuskels, musculus medius (Taf. 11; 2), S. 124;
5. äußern Hüftlochmuskels, musculus ratorius externus (Taf. 11; 2, 1), S. 125;
6. Schneidermuskels, musculus (Taf. 11; 1), S. 126;
7. geraden Oberschenkelmuskels, rectus femoris (Taf. 11; 1, 2, 12), S. 127;
8. äußern großen Oberschenkelmuskel, musculus vastus externus (Taf. 11; 1, 2, 12), S. 127;
9. innern großen Oberschenkelmuskel, musculus vastus internus (Taf. 11; 2, 12), S. 127;
10. Oberschenkelmuskels, musculus (Taf. 11; 1, 1), S. 126;
11. schlanken Schenkelmuskels, gracilis (Taf. 11; 1, 2, 10), S. 126;
12. langen Zuziehers des Beins, adductor longus (Taf. 11; 1, 2, 11), S. 126;
13. kurzen Zuziehers des Beins, adductor brevis (Taf. 11; 2, 1), S. 126;
14. großen Zuziehers des Beins, adductor magnus (Taf. 11; 2, 1), S. 126;
15. Kamm-Muskel, musculus pectineus (Taf. 11; 2, 1), S. 126;
16. Schenkelbindenspanners, musculus fasciae latae (Taf. 11; 1), S. 125; wegen der Darmbeinfascie, fascia iliaca (Taf. 11; 2, 1), S. 125.

Verdauungsorgane.

Die Verdauungsorgane, organa digestiva, reichen vom Mund bis zum After, und sind in einen Kanal gebildet, der im wesentlichen in eine Richtung verläuft, von sehr verschiedenen Abzweigungen und zu welchem eine Anzahl drüsiger Organe angeschlossen sind, welche bei der Verdauung mit ins Spiel kommen. Den ganzen Verdauungskanal kann man in drei Abschnitte theilen, in die Mundhöhle, den Schlundkopf mit der Speiseröhre, und den Unterleib, bestehend aus dem Magen mit den Drüsen, welchen noch die verschiedenen drüsigen Organe hinzukommen.

I. Mundhöhle.

Die Mundhöhle, cavum oris, gebildet aus Ober- und Unterkieferknochen mit dem Gaumen über diese Taf. 2 und 3), sowie aus den Weichtheilen, die in der Hauptsache aus den drüsigen Gebilden, welche mit Schleimhaut ausgekleidet sind (siehe über diese Taf. 6), bestehen, und zur mechanischen Zerkleinerung der Speisen dienen, Zähne und zur Einspeichelung derselben dienen, von den Drüsen gelieferte Secret.

II. Schlundkopf und Speiseröhre.

Der Schlundkopf, pharynx (s. diesen Taf. 3, 12, 13, sowie Taf. 9; 1m), schließt sich nach oben an die Mundhöhle an, und geht nach unten in die Speiseröhre oder den Schlund, oesophagus (s. diesen Taf. 6; 3, 10 und Taf. 9; 1va), der Schlundkopf ist ein muskulöser Sad von länglich-förmiger Gestalt, welcher mit Schleimhaut ausgekleidet ist und von der Basis des Schädels herab vor dem 6ten Halswirbel liegt. Wo der Schlundkopf hört, beginnt die Speiseröhre, ein muskulöser Schleimhaut ausgekleideter Kanal, der anfangs der Luftröhre liegt und vor dem 6ten Halswirbel herab in die Brusthöhle gelangt, steigt er (s. Taf. 9) in der hintern Brusthöhle, cavum mediastini posteriori, anfangs in der Mitte vor den Körpern der Brustwirbel auf.

Seite der Brustorta herab, wendet sich aber allmählich nach links vor die Brustorta, tritt in der Gegend des neunten Brustwirbels das Speiseröhrenloch des Zwerchfells, in oesophageum diaphragmaticum, hindurch und tritt so in den Unterleib, wo sie sofort in den Magen übergeht. Schlundkopf und Speiseröhre dienen als Kanal, um die Nahrungsmittel in den Magen zu lassen.

III. Unterleibstheil des Verdauungsapparates.

Unterleibstheil des Verdauungsapparates zerfällt in Magen, die Därme und in die drüsigen Organe.

A. Magen.

Der Magen, ventriculus oder stomachus (Taf. 8; Taf. 9; 1X. Taf. 10; 2X. Taf. 11; 1V, 2III), einen häutigen Sack vor, der in der Obergegend des Unterleibes, vorzugsweise in der Unterrippengegend, regio hypochondriaca, unmittelbar unter dem Zwerchfell liegt.

Die Magenwand besteht aus drei Schichten, aus Schleims, Muskel- und seröser Haut.

Die Schleimhaut, tunica mucosa, bildet die innere Schicht des Magens und ist mit der Muskelhaut durch lockeres Bindegewebe verbunden. An ihrer Fläche ist sie mit Cylinderepithelium überzogen, und nach der Magenhöhle zu zahlreiche cylindrische Schläuche münden, welche von den Labdrüsen, glandulae digestivae, herrühren, welche die Schleimhaut durchsetzen. Außerdem finden sich in der Magenschleimhaut Balgdrüsen, glandulae mucosae, und am Uebergang in den Darm, an sogenannten Pfortnertheil, portio pylorica, die Pfortnerdrüsen, glandulae muciparae, sowie eine Schicht glatter Muskelfasern.

Die Muskelhaut, tunica muscularis, welche, wie erwähnt, durch lockeres Bindegewebe nach außen der Schleimhautschicht verbunden ist, besteht aus drei Schichten, welche theils in der Längsrichtung, theils in circularer Richtung verlaufen, und eine Ringfaser- und eine Längsfaser- Schicht bilden.

Die seröse Haut, tunica serosa, bildet den äußeren Ueberzug des Magens und ist mit der Muskelhaut ebenfalls durch Bindegewebe verbunden. Sie ist ein Theil des Bauchfells, das wir später betrachten werden, und an ihrer freien äußeren, nach der Bauchhöhle zu sehenden Fläche mit einem einfachen Pflaster-epithelium überzogen.

Am Magen unterscheidet man zwei Wandflächen, die jedoch eine vordere und eine hintere. Der Rand, an welchem die beiden Flächen an einander übergehen, wird mit dem Namen des Magensendes bezeichnet, und zerfällt in den kleinen und den großen Bogen des Magens. Der kleine Magenbogen, curvatura minor ventriculi (Taf. 11; 1Va), bildet den oberen, concaven, nach rechts sehenden Rand, der, wenn der Magen gefüllt ist, sich nach hinten wendet. Der große Magenbogen, curvatura ventriculi major (Taf. 9; 1X. Taf. 11; 1Vh), bildet den unteren und nach links sehenden concaven Rand, der bei vollem Magen nach vorn kehrt. Weiter unten unterscheidet man am Magen den linken weiteften Theil, den Magenfundus oder blinden Sack, fundus oder sacculus coecus ventriculi (Taf. 11; 1V'), der in der linken Unterrippengegend liegt, den mittleren Theil, den Körper, corpus ventriculi, welcher in der Oberbauchgegend im engeren Sinne liegt und den Pfortnertheil, portio pylorica

(Taf. 11; 1V'), welcher am engsten, das rechte Ende des Magens ausmacht, und durch den Pfortner, pylorus oder ostium duodenale, welcher äußerlich durch eine schwache Einschnürung (Taf. 11; 1V') erkenntlich ist, im Innern aber durch die an dieser Stelle besonders starke Ringfaser- und eine Schleimhautbuplicatur, valvula oder sphincter pylori, gebildet wird, in den Zwölffingerdarm übergeht, von welchem er jedoch durch Contraction der circularen Muskelschicht abgeschlossen werden kann. Der Pfortnertheil des Magens liegt in der rechten Unterrippengegend von der Leber bedeckt. Die Stelle, wo die Speiseröhre in den Magen einmündet, heißt der Mageneingang, cardia oder ostium oesophageum (Taf. 9; 1IX. Taf. 11; 1V'). Derselbe liegt in der regio epigastrica unmittelbar unter dem Zwerchfell, hinter dem Schwertfortsatz des Brustbeins und erstreckt sich von ihm bis zum Pfortner am oberen Rande des Magens der kleine Magenbogen.

B. Därme.

Die Därme, intestina, oder der Darmkanal, canal intestinalis, beginnen vom Pfortner und reichen bis zum After. Sie bilden einen röhrenförmigen Schlauch von einer Länge, die der fünf- bis sechsfachen des Körpers gleich ist, in dem sie sich befinden, nehmen den größten Theil der Bauch- und Beckenhöhle ein, durch welche sie sich in vielfachen Windungen hinziehen und bestehen aus denselben drei Häuten wie der Magen. Der obere Theil ist enger als der untere, und demgemäß zerfällt der ganze Darmkanal in zwei Abschnitte, in einen oberen engeren aber längeren, den Dünndarm, und in einen unteren widern und kürzern, den Dickdarm, mit dem Blinddarm auf der einen und dem Mastdarm auf der andern Seite. Die größte Bedeutung für den Darm hat die Schleimhaut, die zur Aufsaugung des Speisebreies für die Zwecke der Ernährung des Körpers dient. Zu diesem Behufe hat dieselbe zahlreiche Falten, welche wiederum unzählige Zotten tragen. Außerdem enthält dieselbe eine große Anzahl von drüsigen Gebilden, welche verschiedene Formen haben und verschiedenen Zwecken dienen.

a) Dünndarm.

Der Dünndarm, intestinum tenue, beginnt an dem Pfortner des Magens und erstreckt sich in vielfachen Windungen durch die Nabelgegend und Unterbauchgegend, um schließlich in der rechten Darmbeugegend in den Dickdarm einzumünden. Der Dünndarm zerfällt in drei Abschnitte: den Zwölffingerdarm, den Leer- und den Krummdarm.

a) Zwölffingerdarm.

Der Zwölffingerdarm, oder Gallendarm, intestinum duodenum (Taf. 11; 1VI. Taf. 12; 1VI, 2IV), ist der oberste Theil des Dünndarms, welcher am Pfortner beginnt und von der Gestalt eines Hufeisens ist, dessen concave Seite nach rechts sieht. Man unterscheidet am Zwölffingerdarm drei Abschnitte:

1) den oberen Quertheil, pars horizontalis oder transversa superior, welcher am Pfortner seinen Anfang nimmt und in horizontaler Richtung nach rechts geht.

2) den absteigenden Theil, pars descendens, welcher in der Gegend des ersten bis vierten Lendenwirbels unter einem Bogen nach abwärts und etwas nach links herabsteigt.

3) den unteren Quertheil, pars horizontalis inferior, welcher wiederum unter einem Bogen horizontal nach links läuft bis in die Gegend der linken Seite

des dritten Lendenwirbels, wo er ununterbrochen in den Leerdarm übergeht.

β) Leerdarm.

Der Leerdarm, *intestinum jejunum* (Taf. 11; VIII, 2V), ist die unmittelbare Fortsetzung des Zwölffingerdarms. Derselbe beginnt an der linken Seite des dritten Lendenwirbels und fällt unter zahlreichen Windungen die Nabelgegend und den obern vordern Theil der Unterbauchgegend. Derselbe geht ohne bestimmte Grenze in den Krummdarm über.

γ) Krummdarm.

Der Krummdarm, *intestinum ileum* (Taf. 10; 2XII, Taf. 11; 1IX, 2VI), zeigt wie der Leerdarm vielfache Windungen. Derselbe liegt in der Unterbauchgegend und reicht bis ins kleine Becken herab. Aus demselben steigt er wiederum nach rechts in die Höhe, um im untern Theile der rechten Darmbeingegegend unter einem rechten Winkel von der innern Seite in den Dickdarm zu münden (Taf. 11; 2VI), wo die Schleimhaut des Krummdarms ein aus zwei Platten bestehendes Ventil bildet, die Bauhinische Falte, *valvula Bauhini*, durch welches der Speisebrei wol in den Dickdarm gelangen, aber nicht wieder zurücktreten kann, indem sich dann das Ventil schließt.

δ) Dickdarm.

Der Dickdarm oder weite Darm, *intestinum crassum* oder *ampullum*, ist scharf vom Dünndarm abgegrenzt. Er ist viel weiter, aber auch kürzer als dieser. In dem untern Theile der rechten Darmbeingegegend beginnend, steigt er anfangs in der rechten Seite der Bauchhöhle in die Höhe bis unter die Leber, wo er sich umbiegt und in horizontaler Richtung quer unterhalb des Magens von der rechten Seite zur linken läuft. Hier bildet er aufs neue einen Winkel, um wiederum nach abwärts zu gehen. Auch am Dickdarm unterscheidet man eine innere, Schleimhaut, eine mittlere, Muskelhaut, und einen serösen Ueberzug, der an zahlreichen Stellen sich vom Darne löst und frei herabhängende Lappchen bildet, die *Megantabhängen*, *appendices epiploicae* (Taf. 11; 1Xa, 2XI).

Man unterscheidet drei Abschnitte am Dickdarm: den Blinddarm, den Grimmdarm und den Mastdarm.

α) Blinddarm.

Der Blinddarm, *intestinum caecum*, *caput coli* (Taf. 11; 2VIII), bildet den Anfang des Dickdarms und liegt im untersten Theile der rechten Darmbeingegegend. Er bildet einen kurzen, weiten, rundlichen und nach unten blind geschlossenen Sack, welcher unterhalb der Einmündungsstelle des Dünndarms in den Dickdarm liegt und nach oben in den Grimmdarm übergeht. Nahe dem blinden Ende geht ein enger Fortsatz aus dem Blinddarm hervor, der verschieden gekrümmt die Gestalt und Größe eines Regenwurmes hat, und deshalb Wurmfortsatz, *processus vermiformis* oder *appendix vermicularis* (Taf. 11; 2VII), genannt wird. Derselbe, durch eine enge Öffnung mit dem Blinddarm in Verbindung stehend, endet blind an seinem freien Ende.

β) Grimmdarm.

Der Grimmdarm, *intestinum colon*, ist der Haupttheil des Dickdarms. An ihm, wie am Blinddarm sieht man drei in der Länge des Darms verlaufende Streifen, das Grimmdarmband, *taenia coli*, während derselbe in querrer Richtung zahlreiche Einschnürungen zeigt, durch welche die Grimmdarmsäcker, *localamenta* oder *cellulae coli*, auch *haustri coli* genannt, entstehen.

Der Grimmdarm hat die Gestalt eines großen Hufe-

eisens und zerfällt in drei Theile: den aufsteigenden, queren und absteigenden Grimmdarm.

Der aufsteigende Grimmdarm, *colon ascendens* oder *dextrum* (Taf. 11; 2I), geht unmittelbar aus dem Blinddarm hervor und fängt an der rechten Seite des dritten Lendenwirbels an, wo sich der Dünndarm in den Dickdarm einmündet, steigt in der rechten Darmbeingegegend bis unter die rechten Leberlappen, dem rechten Hypochondrium die Höhe, woselbst er eine Krümmung nach rechts in die rechte Grimmdarmbiegung, *flexura coli dextra* (Taf. 11; 1X', 2X), und in den Quergrimmdarm übergeht.

Der Quergrimmdarm, *colon transversum* (Taf. 11; 1X, 2XI), geht aus der rechten Unterrippengegend an der Grenze zwischen Oberbauchgegend und Unterbauchgegend, in horizontaler Richtung nach der linken Unterrippengegend hinüber und bildet hier wiederum eine Krümmung nach unten, die linke Grimmdarmbiegung, *flexura coli sinistra* (Taf. 11; 1X''), um in den absteigenden Grimmdarm überzugehen.

Der absteigende Grimmdarm, *colon descendens* oder *sinistrum* (Taf. 11; 1X''', 2XIII), läuft an der linken Unterrippengegend, sich erst etwas nach rechts und dann nach vorwärts wendend, an der linken Seite zwischen Darmbein und Lendeengegend nach unten. An seinem untern Ende, in der Nähe des linken Beckens krümmt er sich erst nach rechts und dann etwas nach auf und rückwärts, sodann aber wieder nach unten, sodann bildet er eine Krümmung nach links, die linke Grimmdarmbiegung, *flexura coli sinistra* (Taf. 11; 1Xa, 2XIV), genannt wird. Diese Krümmung S geht sich nunmehr in den untern Theil des Dickdarms, den Mastdarm fort, indem er sich nach hinten und unten in das kleine Becken wendet.

γ) Mastdarm.

Der Mast- oder Afterdarm, *intestinum rectum* (Taf. 11; 2XV), ist der unterste Theil des Dickdarms und liegt an der hintern Wand des kleinen Beckens, woselbst er an der vordern concaven Fläche des Beckens nach abwärts läuft. Er nimmt seinen Ursprung aus der Weichenbeugung des Dickdarms, der Fortsetzung er ist, und endigt am After, *anus* (Taf. 11; 2XV). Er hat viel stärkere Muskeln als die übrigen Därme und gleicht in seiner Structur einer Speiseröhre; so besteht er aus einer Schicht einer der Speiseröhre ähnlichen Muskelhaut, um einen serösen Ueberzug, der sich nur an dem obern und seitlichen Theil befindet, während die untere Hälfte und der hintere Theil der obern Hälfte frei ist. Am Ende des Mastdarms verengt sich die Muskelhaut und bildet den innern Schließmuskel des After, *sphincter ani internus*.

C. Drüsige Nebenorgane des Verdauungsapparates.

Die drüsigen Nebenorgane des Verdauungsapparates liegen sämmtlich in der Bauchhöhle und sind die Leber mit der Gallenblase, die Speicheldrüsen und die Milz.

a) Leber.

Die Leber, *hepar* oder *jecur* (Taf. 8; Taf. 9; 1XI), ist eine große Drüse von der rechten Zwerchfellhöhlung. Sie hängt im rechten Unterrippenraum und erstreckt sich bis in die Lebergrube, ja zuweilen bis in den linken Unterrippenraum über den obern Theil des Magens hinweg. Sie ist von eigentümlichem Bau, indem sie aus zahllosen Blutgefäßen, Saugadern, Gallenkanälen, etc.

ten Leberzellen und Nerven besteht. An ihr theilt man folgende Flächen, Ränder, Lappen Furchen:

Die obere Fläche ist stark gewölbt, entsprechend Concavität der rechten Zwerchfellhälfte, welcher sie sowie dem obersten Theile der Bauchdecke an- und durch das Aufhängeband, *ligamentum suspensorium hepatis* (Taf. 11; 1L, 21'), welches Bauchfell gebildet wird, und über die ganze vom hintern bis zum vordern Rande verläuft, in zwei Hälften getheilt wird, den rechten Leberlappen, *lobulus hepatis dexter* (Taf. 11; 21), welcher der rechte Theil der Leber ist, und den linken Leberlappen, *lobulus hepatis sinister* (Taf. 11; 21'), der kleiner und dünner als der rechte Lappen ist. Die untere Fläche, welche nach hinten und unten hin ist schwach concav und bedeckt einen Theil des hintern und queren Grimmdarms mit der rechten Umbiegung, sowie den Zwölffingerdarm. In der Mitte der untern Fläche befinden sich drei Furchen, zwei Längsfurchen, eine rechte und eine linke, und eine Quersfurche, durch welche dieselbe in vier Lappen eilt wird. Die drei Furchen haben die Gestalt lateinischen H.

Die rechte Längsfurche, *fossa longitudinalis dextra* (Taf. 11; 11c), zerfällt in zwei Theile, einen vordern, die Furche für die Gallenblase, *fossa caecae felleae*, und einen hintern, die Furche für die untere Hohlvene, *fossa venae cavae*; in der ersten liegt die Gallenblase, in letzterer die untere Hohlvene. Nach rechts von der rechten Längsfurche liegt der rechte Leberlappen, *lobulus hepatis dexter* (Taf. 11; 11L, Taf. 12; 11), welcher hier kleiner ist als an der obern Fläche; nach links davon, und nach rechts von der linken Längsfurche, also zwischen den mittern, liegen der viereckige Leberlappen, *lobulus quadratus* ober anterior (Taf. 11; 11L, Taf. 12; 11'), und der Spigell'sche Lappen, *lobulus Spigelii* oder posterior, auch *caudatus* (Taf. 11; 11L, Taf. 12; 11'). Beide Lappen werden durch die Quersfurche oder Pforte, *porta hepatis* oder *venae portae* (Taf. 11; 11b), voneinander getrennt, und zwar so, daß der erstere nach vorn, der zweite nach hinten von der Quersfurche zu liegen kommt. Nach links werden diese beiden Lappen durch die linke Längsfurche, *fossa longitudinalis sinistra* (Taf. 11; 11d), begrenzt, an deren linken Seite sich der linke Leberlappen, *lobulus hepatis sinister* (Taf. 11; 11L, Taf. 12; 11'), befindet, der hier dieselbe Größe hat, wie an der obern Fläche.

Nach ist zu erwähnen der hintere Leberrand, *argo hepatis posterior* oder *obtus*, welcher nach hinten und oben an das Zwerchfell stößt. Derselbe ist abgerundet, sowie kürzer und dider als der vordere; ihn bestet sich das Bauchfell und bildet das Kronenband der Leber, *ligamentum coronarium hepatis*. Der vordere Rand, *margo anterior* oder *acutus*, ist nach vorn und abwärts gerichtet, weit dünner, kürzer und länger als der hintere, und hat an seinem vordern Theile einen Einschnitt, den Lebereinschnitt, *incisura hepatis* oder *interlobularis* (Taf. 11; 11a), daher da in die Wasse der Leber einbringt, wo die rechte Fläche durch das Aufhängeband in einen rechten und linken Lappen getheilt wird. Der Lebereinschnitt bildet das runde Band, *ligamentum teres* (Taf. 11; 21, 21'), auf, welches im vordern freien Rande des Aufhängebandes liegt und aus der frühern im thronalen Leben vorhandenen Nabelblutader entstanden ist.

Sämmtliche Gallengänge der Leber vereinigen sich

zu zwei Kanälen, welche in der Quersfurche aus dem rechten und linken Leberlappen hervorgehen. Dieselben treten nun wieder zu einer gemeinsamen Röhre zusammen, dem Lebergang, *ductus hepaticus* oder *excretorius hepatis* (Taf. 11; 11V, Taf. 12; 11''). Dieser Gang läuft im Leber-Zwölffingerdarmbande, *ligamentum hepato-duodenale* (Taf. 12; 111), einer Bauchfellfalte, von der Leberpforte aus schräg nach unten, hinten und links, um sich unter einem spitzen Winkel mit dem Gallenblasengange, *ductus cysticus* (Taf. 11; 111L, Taf. 12; 11''), zu dem Gallengange, *ductus choledochus* (Taf. 11; 11V'), zu vereinigen.

Als Aufbewahrungsort für die Galle dient die Gallenblase.

Die Gallenblase, *cystis* oder *vesica fellea* (Taf. 9; 1XII, Taf. 11; 111L, Taf. 12; 111), ist ein länglicher Sack von birnförmiger Gestalt, welcher an der untern Fläche der Leber in dem vordern Theile der rechten Längsfurche durch Zellgewebe angewachsen ist. Die untere freie Fläche der Gallenblase ist mit dem Bauchfell überzogen, während der Innenraum von Schleimhaut ausgekleidet wird, worauf nach außen eine Muskel- und Zellhaut folgt. An ihr unterscheidet man den Grund, *fundus*, das geschlossene halbkugelförmige Ende, welches am weitesten nach vorn, ein wenig über den vordern Leberrand hervorragend, und das Mittelfeld, den Körper, *corpus vesicae felleae*, an welchen sich der immer enger werdende Hals, *collum vesicae felleae*, anschließt, welcher in den Gallenblasengang, *ductus cysticus* (Taf. 11; 111L, Taf. 12; 11''), übergeht.

Der Gallenblasengang vereinigt sich von rechts kommend mit dem etwas mehr links liegenden Lebergang unter spitzem Winkel, welche beide dann zusammen den Gallengang, *ductus choledochus* (Taf. 11; 11V'), bilden. Derselbe verläuft anfangs im Leber-Zwölffingerdarmbande und mündet dann in den Zwölffingerdarm.

b) Bauchspeicheldrüse.

Die Bauchspeicheldrüse, *pancreas* (Taf. 12; 1V), ist eine traubenförmige Drüse von länglicher Gestalt, welche hinter dem Magen aus der linken Rippengegend quer über den zwölften Brust- und ersten Rippenwirbel weg bis in die Concavität des Zwölffingerdarms, in welchen sie einmündet, hinwegzieht. Man unterscheidet an ihr den Kopf, *caput pancreatis* oder *extremitas duodenalis* (Taf. 12; 1V'), den breitesten und dicksten nach rechts in der Krümmung des Zwölffingerdarms gelegenen Theil, den Schwanz, *cauda pancreatis* oder *extremitas splenica* (Taf. 12; 1V''), das linke, etwas dünnere und abgerundete Ende, sowie den zwischen Kopf und Schwanz mittern liegenden Körper, *corpus pancreatis*.

c) Milz.

Die Milz, *lien* oder *splen* (Taf. 9; 1XIII, Taf. 11; 1VII, 2II, Taf. 12; 11V), ist eine Blutdrüse, welche am Grunde des Magens in der linken Unterrippengegend vom Bauchfell eingehüllt, von welchem nach dem Magen das Magen-Milzband, *ligamentum gastro-lienale* (Taf. 12; 11V'), sich erstreckt, liegt. Die Milz hat die Gestalt eines Kugelabschnittes und zeigt demgemäß eine äußere concave Fläche, die nach oben und hinten gerichtet ist, und eine innere etwas concave Fläche, welche schräg nach vorn gewendet ist und mit dem Schwanz der Bauchspeicheldrüse zusammenhängt. Auf dieser Fläche befindet sich der Gefäß-Stiel und Eintritt an dem sogenannten Milznabel, *hilus lienalis*.

Bauchfell.

Wie das Brustfell zur Lunge, so steht das Bauchfell oder die Bauchhaut, peritoneum (Taf. 8; 1Y, 2VI. Taf. 11; 1H, 2K), zu den Baucheingeweiden in naher Beziehung, indem es dieselben zum größten Theil, ebenso wie die Bauchwandungen, überzieht. Dasselbe ist eine seröse Haut, welche beim Manne einen vollkommen geschlossenen Sack bildet, welcher zwischen den Bauchdecken und Baucheingeweiden innen liegt, und in welchen die Leptern eingefüllt sind. Danach hat man zwei Platten des Bauchfells, eine äußere Platte, peritoneum abdominale, welche an die Bauchwandungen angeheftet ist, und zwar unmittelbar an die Quersäule des Unterleibes, fascia transversalis abdominis (Taf. 8; 1X), welche die innere Fläche des queren Bauchmuskels überzieht, und eine innere Platte, peritoneum viscerales, welche die Baucheingeweide mehr oder weniger überkleidet. Die letztere Platte bildet theils hier und da von einem Eingeweide zum andern herübergehende Falten, wie das Leber-Zwölffingerdarmband, ligamentum hepato-duodenale (Taf. 12; 1III), und das Magen-Milzband, ligamentum gastro-livale (Taf. 12; 1IV), theils mit der hintern Bauchfellwand zusammenhängende größere Einsümpfungen, deren beide Blätter, ehe sie die Eingeweide zwischen sich nehmen, sich dicht aneinander legen und die sogenannten Gefäße bilden, von welchen wir nur das Dünndarmgefäß, mesenterium (Taf. 11; 2L), erwähnen, theils über ein Organ hinausgehende, aus zwei Blättern bestehende Verbindungen, sogenannte Netze, von denen das große Netz, omentum oder epiploon majus (Taf. 9; 2VIII. Taf. 10; 2XI), das bedeutendste ist. Dasselbe geht von der großen Curvatur des Magens (Taf. 9; 1XII) über den Quergrimmdarm, mit dessen vorderer Wand es verwachsen ist, den Leer- und Krummdarm bedeckend bis ins kleine Becken hinab.

Harn- und Geschlechtsorgane.

Die Harn- und Geschlechtsorgane, organa urinaria und organa genitalia oder sexualia (Taf. 11; 1G und G', sowie 1XI bis XVII und 2XVI bis 2XVIII), sind bereits bei Taf. 10 abgehandelt worden, siehe deshalb S. 99.

Blutgefäße.

Die Pulsadern (Taf. 11; 1a bis 1u und 2a bis 2c), sowie die Blutadern (Taf. 11; 1v bis 1z und 2d bis 2f), werden bei Taf. 12 betrachtet, siehe deshalb S. 108.

Nerven.

Die Nerven (Taf. 11; 1a bis 1c und 2a und 2g), finden gleichfalls ihre Erläuterung bei Taf. 12, siehe deshalb S. 110.

Knochen und Bänder.

Die Knochen (Taf. 11; 1A bis 1F und 2A bis 2H) find bei Taf. 4, S. 43, und das Hüftlochband, ligamentum obturatorium (Taf. 11; 2N), bei Taf. 5, S. 60 erläutert.

Tafel 12.

Figur 1. Der Unterleib nach Entfernung sämtlicher Bauchdecken, des Magens und aller Därme.

- A. Costa octava, achte Rippe.
- B. Crista ossis ilium, Darmbeinkamm.
- C. Spina anterior superior ossis ilium, vorderer oberer Darmbeinstachel.
- D. Spina anterior inferior ossis ilium, vorderer unterer Darmbeinstachel.
- E. Tuberculum ossis pubis, Schambeinhöcker.
- E' Ramus descendens ossis pubis, absteigender Ast des Schambeins.

- E'' Ramus horizontalis ossis pubis, horizontaler Ast des Schambeins.
- F. Tuber ischii, Sitzknorren.
- F' Ramus ascendens ossis ischii, aufsteigender Ast des Sitzbeins.
- G. Trochanter major, großer Rollhügel.
- H. Trochanter minor, kleiner Rollhügel.
- J. Membrana obturatoria, Hüftlochhaut.
- K. Capsula fibrosa articuli femoris, Kapselband des Hüftgelenks.
- K' Ligamentum zonale oder zona articularis, Band des Hüftgelenks.
- K'' Ligamentum ilio-femorale, Hüft-Lendenband.
- M. Ligamentum arcuatum pubis, beugendes Schamfugenband.
- N. Pecten ossis pubis, Schambeinband.
- I. Hepatis lobulus dexter, rechter Leberlappen.
- I' Lobulus quadratus hepatis, vieredriger Leberlappen.
- I'' Lobulus spigelii hepatis, Spigel'scher Leberlappen.
- I''' Lobulus sinister hepatis, linker Leberlappen.
- II. Vesica fellea, Gallenblase.
- II' Ductus cysticus, Gallenblasengang.
- II'' Ductus hepaticus, Lebergang.
- III. Ligamentum hepato-duodenale, Leber-Zwölffingerdarmband.
- IV. Lien, Milz.
- IV' Ligamentum gastro-livale, Magen-Milzband.
- V. Pancreas, Bauchspeicheldrüse.
- V' Caput pancreatis, Kopf der Bauchspeicheldrüse.
- V'' Cauda pancreatis, Schwanz der Bauchspeicheldrüse.
- VI. Duodeni pars, Theil des Zwölffingerdarms.
- VII. Ren, Niere.
- VII' Ureter, Harngang.
1. Musculus psoas major, großer Lendenmuskel.
2. Musculus iliocostalis internus, innerer Hüftmuskel.
3. Musculus pyriformis, birnförmiger Muskel.
4. Diaphragma, Zwerchfell.
5. Musculus obliquus abdominis externus, schiefer Bauchmuskel.
6. Musculus obliquus abdominis internus, schiefer Bauchmuskel.
7. Musculus transversus abdominis, quere Muskel.
- a. Aorta descendens abdominalis, Baucharterie.
- b. Arteria phrenica inferior, untere Zwerchfellarterie.
- c. Arteria suprarenalis sinistra, linke Nebennierenarterie.
- d. Arteria mesenterica superior, obere Mesenterialarterie.
- e. Arteria renalis, Nierenarterie.
- f. Arteria spermatica interna, Samenarterie.
- g. Arteria mesenterica inferior, untere Mesenterialarterie.
- h. Arteria lumbalis, Lendenarterie.
- i. Arteria sacro-media, mittlere Kreuzbeinarterie.
- k. Arteria iliaca communis, gemeinschaftliche Hüftarterie.
- l. Arteria hypogastrica oder iliaca interna, innere Hüftarterie.
- m. Arteria ileo-lumbalis, Hüft-Lendenarterie.
- n. Arteria sacro-lateralis, seitliche Kreuzbeinarterie.
- o. Arteria obturatoria, Hüftlocharterie.
- o' Ramus anterior oder internus arteriae obturatoriae, vorderer oder innerer Ast der Hüftlocharterie.
- o'' Ramus posterior oder externus arteriae obturatoriae, hinterer oder äußerer Ast der Hüftlocharterie.
- p. Arteria glutea superior, obere Gesäßarterie.

- Arteria ischiadica oder glutaea inferior, Sitzbeinpulsader.**
Arteria vesicalis superior, obere Harnblasenpulsader.
Arteria vesicalis inferior, innere Harnblasenpulsader.
Arteria pudenda communis oder interna, innere Schampulsader.
Arteria haemorrhoidalis externa, äußere Mastdarnpulsader.
Arteria transversa perinei, Dammpulsader.
Arteria penis, Pulsader des Gliedes.
Arteria dorsalis penis, Pulsader des Rückens des Gliedes.
Arteria profunda penis, tiefe Pulsader des Gliedes.
Arteria iliaca externa, äußere Hüftbeinpulsader.
Arteria cruralis, Schenkelpulsader.
Arteria epigastrica inferior oder interna, untere Bauchbedenpulsader.
Arteria pubica, Schambeinpulsader.
Arteria circumflexa ilium oder epigastrica externa, Krampfpulsader der Hüfte.
Arteria epigastrica superficialis, oberflächliche Bauchbedenpulsader.
Arteriae pudendae externae, äußere Schampulsadern.
Arteria profunda femoris, tiefe Schenkelpulsader.
Arteria circumflexa femoris interna, innere Krampfpulsader des Oberschenkels.
Ramus communicans arteriae circumflexae femoris internae, Verbindungsast der innern Krampfpulsader des Oberschenkels.
Arteria circumflexa femoris externa, äußere Krampfpulsader des Oberschenkels.
Ramus descendens arteriae circumflexae femoris externae, absteigender Ast der äußern Krampfpulsader des Oberschenkels.
Arteriae perforantes femoris, durchbohrende Pulsadern des Oberschenkels.
Vena cava inferior, untere Hohlvene.
Venae lumbales, Lendenblutadern.
Vena spermatica interna, innere Samenblutader.
Vena renalis, Nierenblutader.
Vena supraprenal, Nebennierenblutader.
Vena iliaca communis, gemeinschaftliche Hüftblutader.
Venae sacrales mediae, mittlere Kreuzbeinblutadern.
Vena hypogastrica oder iliaca interna, Bedenblutader.
Vena cruralis oder iliaca externa, Schenkelblutader.

2. Unterer Theil des Rückens und oberer Theil der untern Extremität.

- A. Costa decima, zehnte Rippe.
 B. Costa duodecima, zwölfte Rippe.
 C. Os coccygis, Steißbein.
 D. Crista ossis ilei, Darmbeinkamm.
 E. Spina posterior superior ossis ilei, hinterer oberer Darmbeinfachel.
 F. Tuber ischii, Sitzknorren.
 G. Ramus descendens ossis ischii, aufsteigender Ast des Sitzbeins.
 G' Ramus descendens ossis ischii, absteigender Ast des Sitzbeins.
 H. Trochanter major, großer Rollhügel.
 I. Processus spinosus vertebrae lumbalis primae, Dornfortsatz des ersten Lendenwirbels.
 K. Processus spinosus vertebrae lumbalis quintae, Dornfortsatz des fünften Lendenwirbels.

1. Musculus latissimus dorsi, breiter Rückenmuskel.
2. Musculus serratus posticus inferior, hinterer unterer Sägemuskel.
3. Musculus obliquus abdominis externus, äußerer schiefer Bauchmuskel.
4. Musculus obliquus abdominis internus, innerer schiefer Bauchmuskel.
5. Musculus glutaeus maximus, großer Gesäßmuskel.
6. Musculus glutaeus medius, mittlerer Gesäßmuskel.
7. Musculus pyriformis, birnförmiger Muskel.
8. Musculus gemellus superior, oberer Zwillingsmuskel.
9. Musculus obturator internus, innerer Hüftlochmuskel.
10. Musculus gemellus inferior, unterer Zwillingsmuskel.
11. Musculus quadratus femoris, viereckiger Schenkelmuskel.
12. Musculus vastus femoris externus, äußerer großer Schenkelmuskel.
13. Musculus gracilis, schlanker Muskel.
14. Musculus adductor magnus, großer Zuziehender des Beins.
15. Musculus biceps femoris, zweiköpfiger Schenkelmuskel.
16. Musculus semitendinosus, halbfaseriger Schenkelmuskel.
17. Musculus semimembranosus, halbhäutiger Schenkelmuskel.
 - a. Arteriae lumbales, rami musculares et cutis, Muskel- und Hautäste der Lendenpulsadern.
 - b. Arteria glutaea superior, Gesäßpulsader.
 - c. Arteria ischiadica oder glutaea inferior, Sitzbeinpulsader.
 - d. Arteria pudenda communis oder interna, innere Schampulsader.
 - e. Arteria perforans prima, erste durchbohrende Pulsader.
 - f. Arteria perforans secunda, zweite durchbohrende Pulsader.
 - α. Nervus ischiadicus, Hüftnerv.
 - β. Nervus glutaeus inferior, unterer Gesäßnerv.
 - γ. Nervus cutaneus femoris posterior, hinterer Hautnerv des Oberschenkels.
 - δ. Nervus pudendus communis, Schamnerv.
 - ε. Nervi haemorrhoidales medii, mittlere Mastdarnnerven.
 - ζ. Nervus haemorrhoidalis inferior, unterer Mastdarnnerv.
 - η. Nervi cutanei superiores clivium, obere Hautnerven des Gesäßes.
 - θ. Nervi cutanei dorsales, Hautnerven des Rückens.
 - ι. Nervi cutanei abdominales, Hautnerven des Unterleibes.

Muskeln.

I. Rückenmuskeln.

Die auf dieser Tafel vorkommenden Rückenmuskeln sind bereits bei Tafel 9 betrachtet worden, siehe deshalb wegen des:

1. breiten Rückenmuskels, musculus latissimus dorsi (Taf. 12; 2.), S. 93;
2. hinteren untern Sägemuskels, musculus serratus posticus inferior (Taf. 12; 2.), S. 93.

II. Bauchmuskeln.

Die Bauchmuskeln dieser Tafel sind bei Tafel 10 betrachtet worden, siehe deshalb wegen des:

1. äußern schiefen Bauchmuskels, *musculus obliquus abdominis externus* (Taf. 12; 1, 2), S. 97;
2. innern schiefen Bauchmuskels, *musculus obliquus abdominis internus* (Taf. 12; 1, 2), S. 97;
3. queren Bauchmuskels, *musculus transversus abdominis* (Taf. 12; 1), S. 97;
4. Zwerchfells, *Diaphragma* (Taf. 12; 1), siehe den Text zu Tafel 8, S. 87.

III. Muskeln der untern Extremität.

Die Muskeln der untern Extremität dieser Tafel werden abgehandelt bei Tafel 14, siehe deshalb wegen des

1. großen Lendenmuskels, *musculus psoas major* (Taf. 12; 1), S. 124;
2. innern Hüftbeinmuskels, *musculus iliaeus internus* (Taf. 12; 1), S. 124;
3. birnförmigen Muskels, *musculus pyriformis* (Taf. 12; 1, 2), S. 125;
4. großen Gesäßmuskels, *musculus gluteus maximus* (Taf. 12; 2), S. 125;
5. mittlern Gesäßmuskels, *musculus medius* (Taf. 12; 2), S. 124;
6. obern Zwillingmuskels, *musculus gemellus superior* (Taf. 12; 2), S. 125;
7. innern Hüftbeinmuskels, *musculus obturator internus* (Taf. 12; 2), S. 125;
8. untern Zwillingmuskels, *musculus gemellus inferior* (Taf. 12; 2), S. 125;
9. viereckigen Schenkelmuskels, *musculus quadratus femoris* (Taf. 12; 2), S. 125;
10. äußern großen Schenkelmuskels, *musculus vastus externus* (Taf. 12; 2), S. 126;
11. schlanken Schenkelmuskels, *musculus gracilis* (Taf. 12; 2), S. 126;
12. großen Zuziehers des Beins, *musculus adductor femoris magnus* (Taf. 12; 2), S. 126;
13. zweiköpfigen Schenkelmuskels, *musculus biceps femoris* (Taf. 12; 2), S. 127;
14. halbfaserigen Schenkelmuskels, *musculus semitendinosus* (Taf. 12; 2), S. 127;
15. halbhäutigen Schenkelmuskels, *musculus semimembranosus* (Taf. 12; 2), S. 127.

Harnorgane.

Die Harnorgane, *organa urinaria* (Taf. 12; I VII und I VII'), sind bereits bei Tafel 10 abgehandelt worden, siehe deshalb S. 99.

Baucheingeweide.

Die Erklärung der Baucheingeweide, *viscera abdominalia* (Taf. 12; I bis I VI), siehe im Text zu Tafel 11, S. 103.

Blutgefäße.

I. Pulsadern.

Die Bauchorta, *aorta descendens abdominalis* (Taf. 11; 1a. Taf. 12; 1a), ist die Fortsetzung der absteigenden Brustorta, und gelangt durch die Lortendöffnung des Zwerchfells, *hiatus aorticus*, aus der Brusthöhle in die Bauchhöhle, wo sie an der vordern Fläche des ersten bis vierten Bauchwirbels ein klein wenig nach der linken Seite zu herabläuft. Sie gibt folgende Zweige ab:

1. die untern Zwerchfellpulsadern, *arteriae phrenicae inferiores* (Taf. 11; 1b. Taf. 12; 2b), zwei Stüd, die dicht unter der Lortendöffnung des Zwerchfells entspringen und sich an der untern Fläche desselben verbreiten;
2. die Nebennierenpulsadern, *arteriae suprarenales* (Taf. 12; 1c), deren es auf jeder Seite zwei bis vier Stüd gibt;
3. die Nierenpulsadern, *arteriae renales* (Taf. 12;

1e), und zwar eine rechte, *dextra*, und eine linke, *sinistra*, für die rechte und linke Niere;

4. die Samenpulsadern, *arteriae spermaticae internae* oder *seminales* (Taf. 12; 1f), zwei sehr dünne Arterien, eine rechte und eine linke, von denen die eine oder die andere auch zuweisen aus der Nierenpulsader entspringt. Sie gehen nach unten, um beim Manne in den Samenstrang, bei der Frau zu den Eierstöcken und den Muttertrompeten und den Grund der Gebärmutter zu gelangen;

5. die Lendenpulsadern, *arteriae lumbales* (Taf. 12; 1h), deren vier Stüd auf jeder Seite der Bauchorta entspringen, die über die Lendenwirbelskörper quer nach außen und hinten verlaufen, wo sie sich am Rande der Wirbel in zwei Äste spalten, von denen der eine als Rückenast, *ramus dorsalis* oder *posterior* (Taf. 12; 2a), zu den Muskeln und der Haut des Rückens geht, während der andere, der Unterleibsast, *ramus abdominalis* oder *anterior*, zwischen den seitlichen Bauchmuskeln verläuft.

Für die Verdauungsorgane gibt die Bauchorta besondere Zweige ab, es sind die:

6. Eingeweidepulsader, *arteria coeliaca* (Taf. 12; 1c), eine kurze dicke Arterie, welche ungefähr in der Nähe des 12. Brustwirbels aus der vordern Wand der Bauchorta entspringt. Sie theilt sich sehr bald in drei Theile, den sogenannten Haller'schen Gang, *truncus Halleri*, indem sie folgende Äste abgibt:

a) die linke Kranzpulsader des Magens, *arteria coronaria ventriculi sinistra* (Taf. 11; 1f),

b) die Leberpulsader, *arteria hepatica* (Taf. 12; 1c), die sich wieder in die

a) rechte Kranzpulsader des Magens, *arteria coronaria ventriculi dextra* (Taf. 11; 1h),

β) Magen-3wölffingerdarmpulsader, *arteria gastro-duodenalis* (Taf. 11; 1g), und in den

γ) rechten und linken Leberast, *ramus hepaticus dexter* und *sinister* theilt, von welchen der rechte Leberast die Gallenpulsader, *arteria cystica* (Taf. 11; 1i), abgibt,

c) die Milzpulsader, *arteria lienalis* oder *splenoica* (Taf. 11; 1d), von welcher wiederum die

a) kurzen Magenpulsadern, *arteriae gastricae breves* (Taf. 11; 1k), und die

β) linke Magenpulsader, *arteria epiploica sinistra* (Taf. 11; 1e), entspringen;

7. obere Gefäßpulsader, *arteria mesenterica superior* (Taf. 10; 1d), welche dicht unter der Eingeweidepulsader entspringt und im Dünndarmgange bogenförmig bis in die rechte Darmbeingegegend, *regio iliaca dextra*, verläuft, und den Leer- und Krummdarm, sowie den aufsteigenden und queren Grimmdarm versorgt;

8. untere Gefäßpulsader, *arteria mesenterica inferior* (Taf. 12; 1g), welche den absteigenden Grimmdarm und den obern Theil des Mastdarms versorgt.

Vor dem vierten Lendenwirbel spaltet sich die Bauchorta in zwei Theile, die gemeinschaftlichen Hüftpulsadern, *arteriae iliacae communes* (Taf. 12; 1i), welche vom Körper des vierten und fünften Lendenwirbels nach außen und vorn gehen. In der Theilungsstelle entspringt aus der hintern Wand der Bauchorta die mittlere Kreuzbeinpulsader, *arteria sacra media* (Taf. 12; 1i), welche in der Mitte über die vordere Fläche des Körpers des fünften Lenden-

3 und in der Concavität des Kreuzbeins bis Steißbein herabgeht.

Die gemeinschaftliche Hüftpulsader theilt wiederum vor der Symphysis sacro-iliaca in zwei e, die

Bedenpulsader, arteria hypogastrica ober interna (Taf. 12; 1e), welche etwas schräg nach und hinten gekrümmt in das kleine Becken herab- und folgende Zweige abgibt:

die Hüftflankenpulsader, arteria ileo-lumbalis (Taf. 12; 1m);

die seitliche Kreuzbeinpulsader, arteria sacra lateralis (Taf. 12; 1n);

die Hüftschulpulsader, arteria obturatoria (Taf. 12; 1o), welche wiederum zwei Äste abgibt, einen

a) vordern oder innern Ast, ramus anterior oder internus (Taf. 12; 1o'), und einen

β) hintern oder äußern Ast, ramus posterior oder externus (Taf. 12; 1o'');

die Gesäßpulsader, arteria glutea superior (Taf. 12; 1p, 2b);

die Sitzbeinpulsader, arteria ischiadica ober glutea inferior (Taf. 12; 1q, 2c);

die innere Schampulsader, arteria pudenda communis ober interna (Taf. 12; 1s, 2d), welche wiederum folgende bemerkenswerthe Äste abgibt:

a) die äußern Mastdarpulsadern, arteriae haemorrhoidales externae oder inferiores (Taf. 12; 1s');

β) die Dampfpulsader, arteria transversa perinei (Taf. 12; 1s'');

γ) die Gliedpulsader, arteria penis (Taf. 12; 1t), welche sich wiederum in die

Rüdenpulsader des Gliedes, arteria dorsalis penis (Taf. 10; 2i, Taf. 11; 1u, Taf. 12; 1t'), und in die

tiefe Gliedpulsader, arteria profunda penis (Taf. 12; 1t''), theilt;

die Nabelpulsader, arteria umbilicalis, welche aber nur im Embryo vorhanden ist und beim

Erwachsenen die Harnblasenpulsader, arteria vesicalis, bildet, dieselbe theilt sich in eine

a) obere Harnblasenpulsader, arteria vesicalis superior (Taf. 12; 1r), und in eine

β) untere Harnblasenpulsader, arteria vesicalis inferior (Taf. 12; 1r').

Die äußere Hüftbeinpulsader, arteria iliaca (Taf. 12; 1a), welche von der Hüftkreuzbein-

schräg nach außen und vorn verläuft und über

Mitte des horizontalen Schambeinastes hinweg zum

Schenkel gelangt, wo sie dann den Namen Schenkel-

pulsader, arteria cruralis (Taf. 10; 1c, 2a, Taf. 11; 2a, Taf. 12; 1u'), führt.

Die äußere Hüftbeinpulsader, arteria iliaca

ru, gibt folgende Zweige ab:

a) die untere Bauchdeckenpulsader, arteria epigastrica inferior ober interna (Taf. 10; 2c, Taf. 11; 1n, 2b, Taf. 12; 1v), aus welcher

wiederum die

a) Schambeinpulsader, arteria pubica (Taf. 12; 1v'), und die

β) äußere Samenpulsader, arteria spermatica externa, welche an der äußern Seite

des Samenstranges verläuft, entspringt;

γ) die Kranzpulsader der Hüfte, arteria circumflexa ilei (Taf. 10; 2b, Taf. 11; 1o, Taf. 12; 1w), welche nach aufwärts, zum

obern vordern Darmbeinstachel geht, und

längs des innern Randes bogenförmig nach hinten verläuft.

Die Schenkelpulsader gibt in ihrem obern auf unserer Tafel, sowie auf den beiden vorhergehenden, sichtbaren Verlauf, folgende Zweige ab:

a) die oberflächliche Bauchdeckenpulsader, arteria epigastrica superficialis (Taf. 10; 1a, 2d, Taf. 11; 1n, Taf. 12; 1x);

b) die äußern Schampulsadern, arteriae pudendae externae (Taf. 10; 1b, 2e, Taf. 11; 1q, Taf. 12; 1x');

c) die tiefe Schenkelpulsader, arteria profunda femoris (Taf. 10; 2f, Taf. 11; 1r, 2c, Taf. 12; 1y), aus welcher wiederum mehrere Äste hervorgehen, und zwar die:

a) äußere Kranzpulsader des Oberschenfels, arteria circumflexa femoris externa (Taf. 10; 2g, Taf. 11; 1s, Taf. 12; 1z), mit dem absteigenden Ast, ramus

descendens (Taf. 10; 2h, Taf. 11; 1t, Taf. 12; 1z');

β) innere Kranzpulsader, des Oberschenfels, arteria circumflexa femoris interna (Taf. 12; 1y'), welche den Verbin-

dungsast, ramus communicans arteriae circumflexae femoris (Taf. 12; 1y''), abgibt;

γ) durchbohrenden Pulsadern des Oberschenfels, arteriae perforantes femoris (Taf. 12; 1z''), und zwar eine erste, arteria

perforans prima (Taf. 2; 2e), und eine zweite, arteria perforans secunda (Taf. 12; 2f).

II. Blutadern.

Die untere Hohlvene, vena cava inferior ober ascendens (Taf. 12; 1a), gelangt durch das vier-

seitige Loch, foramen quadrilaterum, aus der Bauchhöhle in die Brusthöhle und daselbst zum rechten Vorhof

des Herzens. In der Bauchhöhle entspringt sie der Bauch-

aorta und setzt sich aus folgenden Zweigen zusammen:

1. den Leidenblutadern, venae lumbales (Taf. 12; 13);

2. den Nierenblutadern, venae renales (Taf. 12; 1d), welche die Samenblutadern, venae spermaticae internae (Taf. 12; 1y), aufnehmen;

3. den Nebenlendenblutadern, venae supra-renales (Taf. 12; 1c);

4. den gemeinschaftlichen Hüftblutadern, venae iliacae communes (Taf. 12; 1c). Es sind dies

die beiden Hauptzweige, aus denen die untere Hohl-

vene sich zusammensetzt. Sie nehmen die mittlern

Kreuzbeinblutadern, venae sacrales mediae (Taf. 12; 1v), auf, und entstehen aus der

a) Beckenblutader ober innern Hüftblutader, vena hypogastrica ober vena iliaca interna (Taf. 12; 1v), und aus der

b) Schenkelblutader ober äußern Hüftblut-

ader, vena cruralis (Taf. 10; 1d, 2k, Taf. 11; 1w, 2d, Taf. 12; 1i), welche in ihren tiefen

Zweigen der Schenkelpulsader entspringt. Sie

setzt sich in der Hauptsache zusammen aus der

a) großen Rosenader, vena saphena magna interna (Taf. 10; 1e, 2m, Taf. 11; 1v, 2e),

welche die Hautvenen der innern Fläche des Schenkels, venae cutaneae femoris (Taf. 10; 1f), aufnimmt;

β) tiefen Blutader des Oberschenkels, vena profunda femoris (Taf. 11; 2f);

γ) Bauchdeckenblutader, vena epigastrica (Taf. 10; 2e, Taf. 11; 1x), und aus den

δ) äußern Schambblutadern, venae pudendae externae (Taf. 11; 1z).

III. Pfortader.

Die Pfortader, *vena portae* (Taf. 11; 1v), nimmt die Blutadern des Verdauungsapparates auf und läuft zwischen den Blatten des Leber-Zwölffingerdarmbandes zur Quersfurche der Leber oder der Leberpforte, *porta hepatis*, wo sie sich in zwei Zweige, den rechten und linken, *ramus dexter* und *sinister*, für jeden Leberlappen spaltet, in denen sie sich nochmals wie eine Pulsader verzweigt, um sich dann wieder in den Leberblutadern zu sammeln, die sich schließlich in die untere Hohlvene ergießen.

IV. Lymphgefäße.

Die Lymphgefäße der untern Extremitäten verlaufen theils oberflächlich, theils in der Tiefe und bilden die Lymphdrüsen, von denen die bemerkenswertheften die oberflächlichen Leistenröhren, *glandulae inguinales* (Taf. 10; 111), sind.

Nerven.

Die Nerven dieser wie der beiden vorhergehenden Tafeln nehmen ihren Ursprung theils von den Lenden- oder Bauchnerven, *nervi spinales lumbales*, theils von den Kreuzbeinnerven, *nervi spinales sacrales*.

I. Lendennerven.

Die Lendennerven, *nervi spinales lumbales*, spalten sich gleich nach ihrem Austritt aus dem Zwischenwirbelloch in zwei Äste, einen dünnern hintern und einen stärkern vordern Ast.

Die vordern Äste, *rami anteriores*, bilden das Lendengeflecht, *plexus lumbalis*, von denen die folgenden auf unsern Tafeln dargestellt sind:

1. Hüftbedecknerv, *nervus ilio-hypogastricus*, mit dem Hautast, *ramus cutaneus* (Taf. 11; 1c);
2. Hüftleistenerv, *nervus ileo-inguinalis* (Taf. 10; 1a);
3. Scham-schenkelnerb, *nervus genito-cruralis*, welcher den Lendenleistenerv, *nervus lumbinguinalis* (Taf. 11; 1a), abgibt;
4. vorderer äußerer Hautnerv des Oberschenkels, *nervus cutaneus femoris anterior externus*;
5. Hüftflochnerv, *nervus obturatorius*, der sich in einen stärkern vordern Ast, *ramus anterior* (Taf. 11; 1o, 2x), und in einen dünnern hintern Ast (Taf. 11; 2ß) spaltet;
6. Schenkelnerb, *nervus cruralis* (Taf. 10; 2a, Taf. 11; 1ß). Aus diesem nehmen ihren Ursprung folgende bedeutendern Nervenzweige:

- a) der kleine Kosenerv oder innere Hautnerv des Oberschenkels, *nervus saphenus minor* oder *cutaneus femoris internus* (Taf. 11; 1c);
- b) der mittlere vordere Hautnerv des Oberschenkels, *nervus cutaneus femoris anterior medius* (Taf. 11; 1k);
- c) der große Kosenerv, *nervus saphenus major* (Taf. 11; 1n);
- d) die Muskelzweige des Schenkelnerven, *rami musculares nervi cruralis* (Taf. 11; 1s).

Die hintern Äste, *posteriores*, gehen zu den Muskeln der Lendengegend, und geben die Hautzweige des Rückens, *nervi cutanei dorsales* (Taf. 12; 2y), sowie die obern Gefäß-Hautnerven, *nervi cutanei superiores clunium*, während die Unterleibshautnerven, *nervi cutanei abdominales* (Taf. 12; 2c), von den Brustnerven entspringen.

II. Kreuznerven.

Die Kreuznerven, *nervi spinales sacrales*, gehen aus dem Pferdegeschwanz, *cauda equina*, hervor und

theilen sich in gleicher Höhe mit den Kreuzbeinforamina *sacralia*, in zwei Äste, einen vordern und einen hintern Kreuzbeinnervenaft.

Die vordern Äste des Kreuzbeinnervens, *rami anteriores nervorum sacralium*, verlaufen zu dem Kreuzbein-Schamgeflecht, *plexus pudendalis*, dessen oberer Theil das Kreuzbein-Schamgeflecht bildet, dessen unterer Theil das Schamgeflecht bildet.

1. Hüft- oder Kreuzbeingeflecht, *plexus sacralis* oder *ischiadicus*.

Aus demselben entspringen:

- a) der hintere Hautnerv des Oberleibes, *nervus cutaneus femoris posterior* (Taf. 12; 2d);
- b) der obere Gefäßnerv, *nervus glutaeus superior* (Taf. 12; 2ß);
- c) der untere Gefäßnerv, *nervus glutaeus inferior* (Taf. 12; 2ß);
- d) der Hüftnerb, *nervus ischiadicus* (Taf. 12; 2g).

2. Schamgeflecht, *plexus pudendalis*, aus demselben entspringen:

- a) die mittlern Mastdarmnerven, *nervi rhoidales medii* (Taf. 12; 2c);
- b) der untere Mastdarmnerv, *nervi rhoidales inferior* (Taf. 12; 2c);
- c) der Schammern, *nervus pudendus cutaneus* (Taf. 12; 2ß).

Knochen und Bänder.

Die Knochen und Bänder (Taf. 12; 1a bis 1k), sind bei Tafel 4, S. 43 und Tafel 13 erläutert.

Tafel 13.

Die obern Extremitäten oder Bruchstücke, welche zum größten Theil auf dieser Tafel dargestellt sind, hängen zu beiden Seiten des Rumpfes herab, und gehören zu den beiden Theilen des menschlichen Körpers. Sie bestehen aus vier Abtheilungen: die Schulter, *pars humeri*, welche bereits auf Tafel 6, 7 und 8, dargestellt ist; der Oberarm, *brachium*, der Vorderarm, *antebrachium*, und die Hand, *manus*.

Figur 1. Der rechte Oberarm von vorn gesehen, nach Entfernung der Haut und Aponeurose, sowie des Deltas und großen Brustmuskels.

- A. Acromion, Schulterhöhe.
- B. Processus coracoideus, Rabenschnabelfortsatz.
- C. Tuberculum majus humeri, großer Oberarmknöchel.
- D. Tuberculum minus humeri, kleiner Oberarmknöchel.
- E. Sulcus bicipitalis, Rinne für die Sehne des zweiföpfigen Armmuskels.
- F. Condylus humeri internus, innerer Gelenkknopf des Oberarmknöchels.
- G. Ligamentum coraco-claviculare, Rabenschnabelfortsatzband.
- H. Ligamentum coraco-acromiale, Schulterband.
- I. Ligamentum capsulare humeri, Kapselband des Oberarmknöchels.

1. Musculus pectoralis major, großer Brustmuskel.
2. Musculus biceps brachii, zweiföpfiger Armmuskel.
- 2' Caput longum musculi bicipitis brachii, langer Kopf des zweiföpfigen Armmuskels.
- 2'' Caput breve musculi bicipitis brachii, kurzer Kopf des zweiföpfigen Armmuskels.
- 2''' Aponeurosis musculi bicipitis brachii, Sehne des zweiföpfigen Armmuskels.

fusculus coraco-brachialis, Rabenschnabelfortsatz-Arm-muskel.

Musculus brachialis internus, innerer Oberarm-muskel.

Musculus triceps brachii, dreiföpfiger Arm-muskel.

Musculus supinator longus, langer Rückwärts-dreher des Vorderarms.

Musculus pronator teres, runder Vorwärtsdreher des Vorderarms (am oberen Ende abgeschnitten).

Musculus flexor carpi radialis oder **radialis internus**, innerer Speichenmuskel (am oberen Ende abgeschnitten).

Musculus palmaris longus, langer Hohlhand-muskel (am oberen Ende abgeschnitten).

Musculus flexor digitorum communis sublimis, gemein-schaftlicher oberer Beugemuskel der Finger.

Arteria brachialis, Armpulsader.

Arteria profunda brachii, tiefe Armpulsader.

Arteria collateralis ulnaris superior, obere Ein-bogennebenpulsader.

Arteria radialis, Speichenpulsader.

Arteria recurrens radialis, zurücklaufende Speichen-pulsader.

Arteria ulnaris oder **cubitalis**, Einbogenpulsader.

Arteria antibrachii communis oder **interossea communis**, Zwischenknochenpulsader.

Arteria interossea externa, äußere Zwischen-knochenpulsader.

Arteria interossea interna, innere Zwischen-knochenpulsader.

Vena cephalica oder **cutanea radialis**, Speichen-hautblutader.

Stelle, wo die Mittelarmblutader, **Vena mediana**, in die Speichenhautblutader einmündet.

Venae brachii, Armblutadern, welche die Arm-pulsadern begleiten.

Stelle, wo sich die Einbogenhautblutader, **vena basilica** oder **cutanea ulnaris**, mit der inneren Oberarmblutader verbindet.

Venae profundae brachii, tiefe Armblutadern, welche die Pulsadern begleiten.

Venae radiales, Speichenblutadern, welche die Speichenpulsader begleiten.

Venae ulnares, Einbogenblutadern, welche die Einbogenpulsader begleiten.

2. Der rechte Oberarm von vorn gesehen weiter Entfernung des zweiföpfigen Oberarm-muskels.

Acromion, Schulterhöhe.

Processus coracoideus, Rabenschnabelfortsatz.

Tuberculum majus humeri, großer Oberarm-knochenhöcker.

Tuberculum minus humeri, kleiner Oberarm-knochenhöcker.

Condylus externus humeri, äußerer Gelenkfortsatz des Oberarmbeins.

Condylus internus humeri, innerer Gelenkfortsatz des Oberarmbeins.

Ligamentum coraco-claviculare, Rabenschnabel-fortsatz-Schlüsselbeinband.

Ligamentum coraco-acromiale, Rabenschnabel-fortsatz-Schulterhöhenband.

Ligamentum capsulare humeri, Kapselband des Oberarmbeins.

Vagina tendinis musculi bicipitis brachii, Sehnen-scheide des zweiföpfigen Arm-muskels.

Insertio musculi pectoralis majoris, Ansatzstelle des großen Brustmuskels.

Musculus deltoideus, Deltamuskel.

2. **Musculus biceps brachii**, zweiföpfiger Arm-muskel.
- 2' **Caput longum musculi bicipitis brachii**, langer Kopf des zweiföpfigen Arm-muskels.
- 2'' **Caput breve musculi bicipitis brachii**, kurzer Kopf des zweiföpfigen Arm-muskels.
3. **Musculus coraco-brachialis**, Rabenschnabelfortsatz-Arm-muskel.
4. **Musculus brachialis internus**, innerer Arm-muskel.
5. **Musculus triceps brachii**, dreiföpfiger Arm-muskel.
6. **Musculus extensor carpi radialis brevis** oder **musculus radialis externus longus**, äußerer langer Speichenmuskel.
7. **Musculus supinator brevis**, kurzer Rückwärts-dreher des Vorderarms.
8. **Musculus flexor digitorum communis sublimis**, oberer gemeinschaftlicher Beugemuskel der Finger.
 - a. **Arteria brachialis**, Armpulsader.
 - b. **Rami musculares arteriae brachialis**, Muskeläste der Armpulsader.
 - c. **Arteria profunda brachii**, tiefe Armpulsader.
 - d. **Arteria collateralis ulnaris superior**, obere Ein-bogennebenpulsader.
 - e. **Arteria collateralis ulnaris inferior**, untere Ein-bogennebenpulsader.
 - f. **Arteria radialis**, Speichenpulsader.
 - g. **Arteria recurrens radialis**, zurücklaufende Speichen-pulsader.
 - h. **Arteria ulnaris** oder **cubitalis**, Einbogenpulsader.
 - i. **Arteria antibrachii communis** oder **interossea communis**, gemeinschaftliche Pulsader des Vorderarms, oder gemeinschaftliche Zwischen-knochenpulsader.
 - k. **Arteria interossea externa**, äußere Zwischen-knochenpulsader.
 - l. **Arteria interossea interna**, innere Zwischenknochen-pulsader.
 - α. **Nervus medianus**, Mittelarmnerv.
 - β. **Nervus ulnaris** oder **cubitalis**, Einbogen-nerv.
 - γ. **Nervus cutaneus externus brachii**, äußerer Haut-nerv des Arms.
 - δ. **Nervus cutaneus medius brachii**, innerer Haut-nerv des Arms.
 - ε. **Nervus cutaneus externus antibrachii**, äußerer Hautnerv des Vorderarms.
 - ζ. **Nervus radialis**, Speichennerv.
 - ζ' **Ramus profundus nervi radialis**, tiefer Ast des Speichennerven.
 - ζ'' **Ramus superficialis nervi radialis**, oberflächlicher Ast des Speichennerven.

Figur 3. Der rechte Oberarm von hinten gesehen, nach Entfernung der Haut und Aponeurose, sowie des Deltamuskels und der Untergrätenmuskeln.

- A. **Spina scapulae**, Schultergräte.
- B. **Acromion**, Schulterhöhe.
- C. **Collum scapulae**, Hals des Schulterblattes.
- C' **Incisura colli scapulae**, Einschnitt des Schulterblattbasses.
- D. **Claviculae pars acromialis**, Schulterhöhen-theil des Schlüsselbeins.
- E. **Tuberculum majus humeri**, großer Oberarm-knochenhöcker.
- F. **Condylus internus humeri**, innerer Gelenkfortsatz des Oberarmbeins.
- G. **Olecranon**, Einbogenknorren.
- H. **Ulna**, Einbogenbein.
- J. **Ligamentum acromio-claviculare**, Schulterhöhen-Schüsselbeinband.

- K. Ligamentum incisurae colli scapulae, Band des Einschnitts des Schulterblattbalkens.
- L. Ligamentum capsulare humeri, Kapselband des Oberarmknochens.
1. Musculus triceps brachii, dreiköpfiger Armmuskel.
- 1' Caput internum musculi tricipitis brachii, innerer Kopf des dreiköpfigen Armmuskels.
- 1'' Caput longum musculi tricipitis brachii, langer Kopf des dreiköpfigen Armmuskels.
- 1''' Caput externum musculi tricipitis brachii, äußerer Kopf des dreiköpfigen Armmuskels.
2. Musculus brachialis internus, innerer Oberarmmuskel.
3. Musculus supinator longus, langer Rückwärtsdrehder des Vorderarms.
4. Musculus anconaeus quartus, kleiner Ellenbogenmuskel.
5. Musculus extensor carpi radialis longus oder musculus radialis externus longus, äußerer langer Speichemuskel.
6. Musculus extensor digitorum communis, gemeinschaftlicher Fingerstrecker.
7. Musculus extensor carpi ulnaris, oder musculus ulnaris externus, äußerer Ellenbogenmuskel.
8. Muskeln der Volarseite des Vorderarms.
- a. Arteria subscapularis, Unter Schulterblattpulsader.
- a' Arteria circumflexa scapulae, umgebogene Schulterblattpulsader.
- b. Arteria circumflexa humeri posterior, hintere Krampfpulsader des Arms.
- c. Arteria collateralis ulnaris superior, obere Ellenbogenpulsader.
- d. Arteria recurrens interossea, rücklaufende Zwischenknochenpulsader.

Figur 4. Der rechte Unterarm von vorn gesehen, nach Entfernung der Haut und der Aponeurose.

- A. Condylus internus humeri, innerer Gelenkfortsatz des Oberarmknochens.
- B. Phalanx prima digitorum, erster Fingergliedknochen.
- C. Phalanx secunda digitorum, zweiter Fingergliedknochen.
- D. Phalanx tertia digitorum, dritter Fingergliedknochen.
- E. Aponeurosis musculi bicipitis brachii, Sehnenhaut des zweiköpfigen Armmuskels.
- F. Fascia palmaris, Hohlhandfascie, an ihrem Ansätze abgeschnitten.
- G. Pars fasciae antibrachii, Theil der Fascie des Vorderarms, Volarseite.
- H. Ligamentum carpi volare proprium, das eigene Band der Handwurzel-Hohlhandseite.
- J. Ligamenta vaginalia digitorum auch ligamenta annularia und obliqua oder cruciata, Scheidenbänder der Fingerbeuger, auch Ring- und Kreuzbänder.
1. Tendo musculi bicipitis brachii inferior, untere Sehne des zweiköpfigen Armmuskels.
2. Musculus brachialis internus, innerer Oberarmmuskel.
3. Musculus triceps brachii, dreiköpfiger Armmuskel.
4. Musculus supinator longus, langer Rückwärtsdrehder des Vorderarms.
5. Musculus pronator teres, runder Vorwärtsdrehder des Vorderarms.
6. Musculus flexor carpi radialis, innerer Speichemuskel.
7. Musculus palmaris longus, langer Hohlhandmuskel.

8. Musculus flexor digitorum communis sublimis, oberflächlicher gemeinschaftlicher Beugemuskel der Fingerglieder.
9. Musculus flexor pollicis longus, langer Beugemuskel des Daumens.
10. Musculus flexor carpi ulnaris, oder ulnaris internus, innerer Ellenbogenmuskel.
11. Musculus pronator quadratus, viereckiger Vorwärtsdrehder des Vorderarms.
12. Musculus palmaris brevis, kurzer Hohlhandmuskel.
13. Musculus abductor pollicis brevis, kurzer Abzieher des Daumens.
14. Musculus opponens pollicis, Gegensteller des Daumens.
15. Musculus flexor pollicis brevis, kurzer Beugemuskel des Daumens.
16. Musculus adductor pollicis, Zuziehemuskel des Daumens.
17. Musculus abductor digiti minimi, Abzieher des fünften Fingers.
18. Musculus flexor brevis digiti minimi, kurzer Beuger des fünften Fingers.
19. Musculi lumbrales, Spul- oder Regenwurmmuskeln.
20. Tendo musculi flexoris digitorum communis profundus, Sehne des gemeinschaftlichen tiefen Beugemuskel des Fingers.
- a. Arteria brachialis, Armpulsader.
- b. Arteria radialis, Speichenpulsader.
- c. Ramus volaris superficialis arteriae radialis, oberflächlicher Hohlhandast der Speichenpulsader.
- d. Ramus volaris arteriae ulnaris, Hohlhandast der Ellenbogenpulsader.
- d' Arcus volaris sublimis arteriae ulnaris, oberflächlicher Hohlhandbogen der Ellenbogenpulsader.
- e. Arteriae digitales, Fingerpulsadern.
- f. Vena mediana cephalica, Mittelarmblutader der Speichenhautblutader.
- g. Venae profundae antibrachii, tiefe Blutaden des Vorderarms.
- a. Nervus radialis superficialis, oberflächlicher Speichennerv.
- β. Ramus anterior nervi radialis superficialis, vorderer Ast des oberflächlichen Speichennerven.
- γ. Ramus posterior nervi radialis superficialis, hinterer Ast des oberflächlichen Speichennerven.

Figur 5. Der rechte Unterarm von vorn gesehen, nach Entfernung der obern Muskelschicht.

- A. Condylus internus humeri, innerer Gelenkfortsatz des Oberarmknochens.
- B. Radius, Speiche.
- C. Ulna, Ellenbogenbein.
- D. Os pisiforme, Erbsebein.
- E. Processus uncinatus ossis hamati, Hakenfortsatz des Hakenbeins.
- F. Phalanx prima, erstes Fingerglied.
- G. Phalanx secunda, zweites Fingerglied.
- H. Phalanx tertia, drittes Fingerglied.
- J. Ligamentum carpi volare proprium, eigenes Band der Hohlhandseite der Handwurzel.
1. Musculus brachialis internus, innerer Oberarmmuskel.
2. Musculus supinator brevis, kurzer Rückwärtsdrehder des Vorderarms.
3. Musculus triceps brachii, dreiköpfiger Armmuskel.
4. Musculus extensor carpi radialis brevis, äußerer kurzer Speichemuskel.

tendo musculi bicipitis brachii, Sehne des zweiköpfigen Armmuskels.
 Musculus flexor digitorum communis sublimis, gemeinschaftlicher oberflächlicher Beugemuskel des Fingers.
 tendo musculi flexoris digitorum communis profundi, Sehne des gemeinschaftlichen untern Beugemuskel der Finger.
 Musculus flexor pollicis longus, langer Beugemuskel des Daumens.
 Musculus pronator quadratus, vierediger Vorwärtsdrehen des Vorderarms.
 Musculus opponens pollicis, Gegensteller des Daumens.
 Musculus flexor pollicis brevis, kurzer Beugemuskel des Daumens.
 Musculus adductor pollicis, Zuziehemuskel des Daumens.
 Musculus abductor digiti minimi, Abziehemuskel des fünften Fingers.
 Musculus flexor brevis digiti minimi, kurzer Beugemuskel des kleinen Fingers.
 Musculi interossei interni, innere Zwischenknochenmuskeln.
 Musculi interossei externi, äußere Zwischenknochenmuskeln.
 Arteria brachialis, Armpulsader.
 Arteria radialis, Speichenpulsader.
 Arteria volaris superficialis arteriae radialis, oberflächlicher Hohlhandast der Speichenpulsader.
 Ramus dorsalis arteriae radialis, Rückenast der Speichenpulsader.
 Arteria ulnaris, Einbogenpulsader.
 Arteria antibrachii oder interossea communis, gemeinschaftliche Zwischenknochenpulsader.
 Arteria ulnaris ramus volaris superficialis, oberflächlicher Hohlhandast der Einbogenpulsader.
 Arteria ulnaris ramus volaris profundus, tiefer Hohlhandast der Einbogenpulsader.
 Arteria volaris digiti minimi, Hohlhandpulsader des fünften Fingers.
 Arteria interossea volaris, Hohlhandzwischenknochenpulsader.
 Venae profundae antibrachii, tiefe Blutadern des Vorderarms.
 Nervus cutaneus externus brachii, äußerer Hautnerv des Arms.
 Nervus medianus, Mittelarmnerv.
 Nervi musculares nervi mediani, Muskeläste des Mittelarmnerven.
 Nervus interosseus internus, innerer Zwischenknochenerv.
 Nervi digitales volares, Hohlhandnerven der Finger.
 Nervus ulnaris volaris, Hohlhandzweig des Einbogenerven.
 Nervus ulnaris volaris ramus superficialis, oberflächlicher Ast des Hohlhandzweigs des Einbogenerven.
 Nervus ulnaris volaris ramus profundus, tiefer Ast des Hohlhandzweigs des Einbogenerven.
 Nervus radialis, Speichennerv.
 Nervus radialis superficialis, oberflächlicher Speichennerv.
 Ramus anterior nervi radialis superficialis, vorderer Ast des oberflächlichen Speichennerven.
 Ramus posterior, hinterer Ast des oberflächlichen Speichennerven.

Figur 6. Der rechte Unterarm von hinten gesehen, nach Entfernung der Haut und Aponeurose.

- A. Condylus internus humeri, innerer Gelenkfortsatz des Oberarmknochens.
 - B. Condylus externus humeri, äußerer Gelenkfortsatz des Oberarmknochens.
 - C. Olecranon, Einbogenfortsatz.
 - D. Ulna, Einbogenbein.
 - E. Radius, Speiche.
 - F. Os brachii, Oberarmbein.
 - G. Phalanx prima, erstes Fingerglied.
 - H. Phalanx secunda, zweites Fingerglied.
 - J. Phalanx tertia, drittes Fingerglied.
 - K. Ligamentum capsulare cubiti, Kapselband des Einbogensgelenks.
 - L. Ligamentum carpi dorsale, Rückenband der Handwurzelknochen.
 - M. Ligamenta capsularia digitorum, Kapselbänder der Finger.
1. Musculus triceps brachii tendo, Sehne des dreiköpfigen Armmuskels.
 2. Musculus supinator longus, langer Rückwärtsdrehen des Vorderarms.
 3. Musculus extensor carpi radialis longus, langer äußerer Speichennuskel.
 4. Musculus extensor carpi radialis brevis, kurzer äußerer Speichennuskel.
 5. Musculus extensor digitorum communis, gemeinschaftlicher Fingerrückstrecker.
 6. Musculus extensor digiti minimi proprius, eigener Strecken des kleinen Fingers.
 7. Musculus extensor carpi ulnaris, äußerer Einbogenbeinmuskel.
 8. Musculus anconaeus quartus, kleiner Einbogenmuskel.
 9. Musculus abductor pollicis longus, langer Abzieher des Daumens.
 10. Musculus extensor pollicis brevis, kurzer Strecken des Daumens.
 11. Musculus extensor pollicis longus, langer Strecken des Daumens.
 12. Musculus extensor indicis proprius, tendo, Sehne des eigenen Streckers des Zeigefingers.
 13. Musculi interossei externi, äußere Zwischenknochenmuskeln.
 - 13' Musculi interossei interni, innere Zwischenknochenmuskeln.
 14. Musculus adductor pollicis, Zuzieher des Daumens.
 15. Musculus abductor digiti minimi, Abzieher des kleinen Fingers.
 16. Muskeln der Finger-Backenfläche des Vorderarms.
 - a. Arteria collateralis ulnaris, Einbogennebenpulsader.
 - b. Arteria collateralis radialis, Speichennebenpulsader.
 - c. Arteria collateralis media, mittlere Nebenpulsader.
 - d. Ramus arteriae interossea externae, Ast der äußeren Zwischenknochenpulsader.
 - e. Ramus arteriae recurrens ulnaris, Ast der zurücklaufenden Einbogenpulsader.
 - f. Ramus dorsalis arteriae radialis, Rückenast der Speichenpulsader.
 - g. Ramus carpeus arteriae radialis dorsalis, Handwurzelast des Rückenzweigs der Speichenpulsader.
 - h. Arteria metacarpea dorsalis, Rücken-Mittelhandknochenpulsader.
 - i. Ramus ulnaris arteriae pollicis, Ulnarast der Daumenpulsader.

- k. Arteria princeps pollicis oder magna pollicis, Hauptpulsader des Daumens oder große Daumenpulsader.

Muskeln der oberen Extremität.

Die Muskeln der oberen Extremität zerfallen in Muskeln der Schulter, des Oberarms, des Unterarms und der Hand.

I. Muskeln an der Schulter.

A. Muskeln an der obern Seite der Schulter.

1. Deltamuskel, musculus deltoideus (Taf. 6; 1₂₅). Taf. 7; 1₂₄. Taf. 8; 1₁₆. Taf. 9; 2₁₈. Taf. 13; 2₁).

Lage:

Bedeckt das Schultergelenk.

Ansätze:

- a) Die Schultergräte, die Schulterhöhe und der Schulterhöhenheil des Schlüsselbeins.
- b) Die spina tuberculi majoris des Oberarmknochens.

Wirkung:

Hebt den Arm nach außen in die Höhe.

2. Hakenarmmuskel, musculus coraco-brachialis (Taf. 7; 1₂₆. Taf. 13; 1₃, 2₃).

Lage:

An der äußern Wand der Achselhöhle.

Ansätze:

- a) Die Spitze des Nabelschnurfortsatzes.
- b) Das untere Ende der spina tuberculi minoris und das innere Zwischenmuskelband.

Wirkung:

Zieht den Arm nach innen und vorn, und hebt ihn zu gleicher Zeit.

B. Muskeln an der äußern Seite der Schulter.

1. Obergrätenmuskel, musculus supraspinatus (Taf. 9; 2₁₀).

Lage:

An der hintern Fläche des Schulterblattes über der Schultergräte.

Ansätze:

- a) Die Fläche und die Ränder der Obergrätengrube des Schulterblattes.
- b) Die obere Fläche des großen Oberarmhöders.

Wirkung:

Hebt den Arm in die Höhe und rollt ihn auswärts.

2. Untergrätenmuskel, musculus infraspinatus (Taf. 6; 2₂₁. Taf. 9; 2₂₀).

Lage:

An der hintern Fläche des Schulterblattes unter der Schultergräte.

Ansätze:

- a) Die Fläche und die Ränder der Untergrätengrube des Schulterblattes.
- b) Der mittlere Theil des großen Oberarmhöders.

Wirkung:

Rollt den Arm nach auswärts und zieht denselben, wenn er gehoben war, nach hinten und unten.

3. Kleiner runder Armmuskel, musculus teres minor (Taf. 9; 2₂₁).

Lage:

An vordern Rande des Schulterblattes, an den vordern Rand des Untergrätenmuskels sich anlegend.

Ansätze:

- a) Die hintere Lippe des vordern Schulterblattendes.
- b) Die untere Fläche des großen Oberarmhöders.

Wirkung:

Rollt den Arm nach auswärts und zieht ihn nach hinten.

C. Muskeln an der innern Seite der Schulter.

1. Unterschlterblattmuskel, musculus scapularis.

Lage:

Bedeckt die ganze vordere, dem Rücken zugekehrte Fläche des Schulterblattes.

Ansätze:

- a) Die Fläche der fossa subscapularis des Schulterblattes.
- b) Der kleine Oberarmknochenhöder.

Wirkung:

Rollt den Arm nach innen und nach auswärts. (Dieser Muskel hat nicht ankommen können, da man sich ihn vorstellen kann, so haben wir ihn hier nicht wegen mit erwähnt.)

2. Großer runder Armmuskel, musculus major (Taf. 9; 2₂₂).

Lage:

An untern Rande des kleinen Armmuskels.

Ansätze:

- a) Der vordere Rand und untere Fläche des Schulterblattes.
- b) Die spina tuberculi minoris des Oberarmknochens.

Wirkung:

Rollt den Arm nach innen und zieht ihn hinten und unten.

II. Muskeln am Oberarm.

A. Muskeln an der vordern Fläche des Oberarms.

1. Zweiköpfiger Armmuskel, musculus bicipitis brachii (Taf. 7; 1₂₃. Taf. 13; 1₂₄).

Lage:

An der vordern innern Seite des Oberarmknochens.

Ansätze:

- a) Der lange Kopf, caput longum bicipitis brachii (Taf. 7; 1₂₃. Taf. 13; 1₂₄), geht an den obern Rand der Oberen Schulterblattes, die Sehne läuft in der Mitte zwischen beiden Oberarmhöden an den beiden Oberarmhöderleisten in der Mitte für den zweiköpfigen Armmuskel, vagina tendinis musculus bicipitis brachii (Taf. 13; 2₂₄), hin. Der kurze Kopf, caput breve (Taf. 7; 1₂₃. Taf. 13; 1₂₄), setzt sich an den Nabelschnurfortsatz des Schulterblattes an.
- b) Der gemeinschaftliche Bauch läuft in eine Sehne aus, welche sich an der Höhe ansetzt (Taf. 13; 4₁, 5₁), und sich in eine breite Ausbreitung, aponeurosis bicipitis brachii (Taf. 13; 1₂₄), in die Fascie des Vorderarms übergeht.

Wirkung:

Beugt den Vorderarm und zieht denselben, wenn er pronirt, das heißt nach innen, nach außen, welche Bewegung Supination und Pronation heißt.

Wirkung:

Beugt den Vorderarm und zieht denselben, wenn er pronirt, das heißt nach innen, nach außen, welche Bewegung Supination und Pronation heißt.

2. Innerer Oberarmmuskel, musculus internus (Taf. 7; 1₂₇. Taf. 13; 1₂, 2₂, 3₂).

Lage:

Unter dem zweiköpfigen Armmuskel an dem Knochen.

Ansätze:

- a) Die innere Fläche der untern Oberarmknochen und die vordere Fläche des Zwischenmuskelbänder.
- b) Der Kronenfortsatz des Einbeugers.

1. **Beugemuskel des Vorderarmes.**
 liegt an der Rückfläche des Oberarms.

3köpfiger Armmuskel, *musculus triceps* (Taf. 7; 1₂₀, Taf. 9; 2₂₀, Taf. 13; 1₀, 2₀, 3₁, 4₁, 5₁, 6₁).

der hintern Fläche des Oberarms.

Der lange Kopf, *caput longum*, auch der lange Ellbogenmuskel, *musculus anconaeus longus* (Taf. 12; 3₁), genannt, setzt sich an den vordern Rand des Schulterblattes unmittelbar unter der Gelenkgrube desselben zwischen den beiden runden Armmuskeln; der äußere Kopf, *caput externum*, auch äußerer Ellbogenmuskel, *musculus anconaeus externus* (Taf. 13; 3₁), genannt, geht zum äußern Winkel des Oberarmknochens und zur hintern Fläche des äußern Zwischenmuskelbandes; der innere Kopf, *caput internum*, auch innerer Ellbogenmuskel, *musculus anconaeus internus* (Taf. 13; 3₁), genannt, setzt sich an den innern Winkel des Oberarmknochens und an die hintere Fläche des innern Zwischenmuskelbandes.

Der Ellbogenknorren, *olecranon*, und der obere Theil der hintern Fläche und des äußern Winkels des Ellbogenbeins.

1. **Beugemuskel des Vorderarmes.**

einer Ellbogenmuskel, *musculus anconaeus quartus* (Taf. 13; 3₄, 6₄).

an dem obern hintern Theile des Vorderarms nach außen vom Ellbogenknorren.

Der äußere Gelenkfortsatz des Oberarmknochens, der obere Theil der äußern Fläche und des äußern Winkels des Ellbogenbeins.

1. **Beugemuskel des Vorderarmes.**

große Brustmuskel, *musculus pectoralis* (Taf. 13; 1₁), ist bereits bei den Brustmuskeln (S. 83) behandelt worden, siehe deshalb S. 83.

III. Muskeln am Vorderarm.

1. **Beugemuskel des Vorderarmes.**

Wolarfläche des Vorderarms (Taf. 13; 1₁) umfaßt den Vorwärtstreher des Vorderarms der Hand, sowie die Beugemuskeln der Hand am Theil auch die der Finger, weshalb sie auch zugehörig des Vorderarms genannt wird. Der Vorwärtstreher des Vorderarms, *musculus pronator teres* (Taf. 13; 1₁, 4₁).

an dem obern Theile der innern Fläche des Vorderarms, schräg von innen und oben nach außen und unten gehend.

Der innere Gelenkfortsatz des Oberarmknochens, ungefähr die Mitte der vordern äußern Fläche der Speiche.

1. **Beugemuskel des Vorderarmes.**
 pronirt Vorderarm und Hand, wobei die Speiche nach innen gerollt wird. Er unterstützt zugleich die Beugung des Vorderarms.

2. **Beugemuskel der Speichenseite (Radialseite) der Handwurzel, oder innerer Speichemuskel, musculus flexor carpi radialis oder radialis internus** (Taf. 13; 1₀, 4₀).

Lage:

An der Ulnarseite (Ellbogenbeinseite) des runden Vorwärtstrebers des Vorderarms von innen und oben schräg nach außen und unten gehend.

Ansätze:

a) Der innere Gelenkfortsatz des Oberarmknochens.
 b) Die Volarfläche der Basis des zweiten Mittelhandknochens.

Wirkung:

Beugt die Hand im Handgelenk und hilft sie proniren.

3. **Langer Hohlhandmuskel, musculus palmaris longus** (Taf. 13; 1₀, 4₀).

Lage:

In der Mitte der Volarfläche des Vorderarms.

Ansätze:

a) Der innere Gelenkfortsatz des Oberarmknochens.
 b) Das eigene Hohlhandband der Handwurzel und die Aponeurose der Hohlhand (Taf. 13; 4F).

Wirkung:

Beugt die Hand.

4. **Beugemuskel der Ellbogenbeinseite (Ulnarseite) der Handwurzel oder innerer Ellbogenbeinmuskel, musculus flexor carpi ulnaris oder ulnaris internus** (Taf. 13; 4₁₀).

Lage:

Am meisten nach innen an der Volarfläche des Vorderarms, entlang dem Ellbogenbein.

Ansätze:

a) Der innere Gelenkfortsatz des Oberarmknochens, der innere Rand des Ellbogenknorrens und das obere Drittel der hintern Kante des Ellbogenbeins.
 b) Das Erbknöchelchen.

Wirkung:

Beugt die Hand und zieht sie nach der Kleinfingerseite hin.

5. **Oberflächlicher gemeinschaftlicher Beugemuskel der Finger, auch durchbohrter Beugemuskel der Finger genannt, musculus flexor digitorum communis sublimis oder perforatus** (Taf. 13; 1₁₀, 2₀, 4₀, 3₀).

Lage:

In der Mitte der Volarfläche des Vorderarms unter den vorerwähnten Muskeln der Beugeseite. Das untere Ende dieses Muskels spaltet sich in vier Theile, die mit vier Sehnen unter dem eigenen Hohlhandbande der Handwurzel hinweggehen. In der Gegend des ersten Fingergliedes spaltet sich wiederum jede Sehne in zwei Schenkel, zwischen welchen die Sehne des tiefen gemeinschaftlichen Beugers der Finger hindurchgeht.

Ansätze:

a) Der innere Gelenkfortsatz des Oberarmknochens, der obere Theil der innern Fläche des Ellbogenbeins und die vordere Kante des mittlern Theils der Speiche.
 b) Jede Sehne mit je einem ihrer beiden Schenkel an je eine Seite der Volarfläche des Knochens des zweiten Gliedes vom zweiten bis fünften Finger.

Wirkung:

Beugt das zweite Glied des zweiten bis fünften Fingers.

6. Tiefer gemeinschaftlicher Beugemuskel der Finger, auch durchbohrender Beugemuskel der Finger genannt, *musculus digitorum communis profundus* oder *perforans* (Taf. 13; 4₂₀, 5₇).

Lage:

In der Mitte der Volarfläche des Vorderarms, unter dem oberflächlichen gemeinschaftlichen Beugemuskel der Finger, dessen Sehne er an der Spaltungsstelle am ersten Fingergliede durchbohrt (Taf. 13; 5₇).

Ansätze:

a) Die zwei oberen Drittel der innern Fläche und des innern Winkels des Einbogenbeins und das Zwischenknochenband.

b) Die Basis des Knochens des dritten Gliedes der vier letzten Finger.

Wirkung:

Beugt das dritte Glied des zweiten bis fünften Fingers.

7. Langer Daumenbeuger, *musculus flexor pollicis longus* (Taf. 13; 4₉, 5₈).

Lage:

In der innern Fläche der Speiche, nach außen von dem tiefen gemeinschaftlichen Beugemuskel der Finger.

Ansätze:

a) Die zwei oberen Drittel der vordern Fläche der Speiche von dem Speichenhöcker an, und das Zwischenknochenband.

b) Die Basis des zweiten Gliedes des Daumens, mit seiner Sehne unter dem eigenen Hohlhandbande der Handwurzel hinweggehend.

Wirkung:

Beugt das zweite Glied des Daumens.

8. Vierediger Vorwärtsdrehder des Vorderarms, *musculus pronator quadratus* (Taf. 13; 4₁₁, 5₉).

Lage:

Am untern Ende der Volarfläche des Vorderarms, dicht über dem Handgelenk und auf dem Knochen aufliegend, quer von dem Einbogenbein zur Speiche gehend.

Ansätze:

a) Die innere Kante des untern Endes des Einbogenbeins.

b) Die Vorderfläche des untern Endes der Speiche.

Wirkung:

Pronirt Vorderarm und Hand.

B. Muskeln an der Rückenfläche des Vorderarms.

Die Rückenfläche des Vorderarms umfasst die Rückwärtsdrehder des Vorderarms und der Hand, sowie die Streckmuskeln der Hand und Finger, weshalb sie auch die Streckfläche des Vorderarms genannt wird.

1. Langer Rückwärtsdrehder des Vorderarms, *musculus supinator longus* (Taf. 13; 1₈, 3₂, 4₆, 6₂).

Lage:

Am Radialrande des Vorderarms.

Ansätze:

a) Die äußere Seite des äußern Gelenkfortsatzes des Oberarms und das äußere Zwischenknochenband.

b) Der Griffelfortsatz der Speiche.

Wirkung:

Beugt den Vorderarm und supinirt ihn, d. h. dreht ihn nach rückwärts, wenn er stark pronirt, d. h. vorwärts gedreht war.

2. Kurzer Rückwärtsdrehder des Vorderarms, *musculus supinator brevis* (Taf. 13; 1₉).

Lage:

Am obern äußern Ende der Speiche, des langen Rückwärtsdrehers des Vorderarms.

Ansätze:

a) Der äußere Gelenkfortsatz des Oberarms und der äußere Winkel dieses Knochens.

b) Die innere Fläche der Speiche zwischen dem Speichenhöcker.

Wirkung:

Supinirt Vorderarm und Hand, zieht die Speiche nach außen rollt.

3. Langer Streckmuskel der Radialen Handwurzel, auch langer äußerer Streckmuskel genannt, *musculus extensor carpi longus*, oder *radialis externus longus* (Taf. 13; 3₃, 6₃).

Lage:

Am obern äußern Ende der Speiche, zwischen dem langen Rückwärtsdrehder des Vorderarms.

Ansätze:

a) Der äußere Gelenkfortsatz des Oberarms und der äußere Winkel dieses Knochens.

b) Die Rückenfläche der Basis des zweiten Handknochens.

Wirkung:

Streckt die Hand und adducirt sie, zieht sie nach der Seite des Daumens.

4. Kurzer Streckmuskel der Radialen Handwurzel, auch kurzer äußerer Streckmuskel genannt, *musculus extensor carpi brevis*, oder *radialis externus brevis* (Taf. 13; 3₄, 6₄).

Lage:

Unmittelbar neben dem langen äußern Streckmuskel an dessen innerer Seite.

Ansätze:

a) Der äußere Gelenkfortsatz des Oberarms und ein Streifen der Einbogenfläche des Knochens.

b) Die Rückenfläche der Basis des zweiten Handknochens.

Wirkung:

Streckt die Hand und adducirt dieselbe.

5. Streckmuskel der Einbogenseite der Handwurzel, auch äußerer Einbogenmuskel, *musculus extensor carpi ulnaris* oder *ulnaris* (Taf. 13; 3₇, 6₇).

Lage:

Das Einbogenbein entlang.

Ansätze:

a) Der äußere Gelenkfortsatz des Oberarms und der obere Theil der Fascie des Vorderarms.

b) Der Höcker an der Basis des fünften Handknochens.

Wirkung:

Streckt die Hand und adducirt sie, d. h. nach der Kleinfingerseite.

6. Gemeinschaftlicher Fingerstreckder, *extensor digitorum communis* (Taf. 13; 1₁₀, 3₅, 4₇, 6₅).

Lage:

In der Mitte der Rückenfläche des Vorderarms zwischen dem äußern kurzen Speichermuskel und dem äußern Einbogenmuskel.

Ansätze:

a) Der äußere Gelenkfortsatz des Oberarms und ein Theil der Rückenfascie des Vorderarms.

b) Der Muskel geht nach unten in vier Bänder über, deren eine jede sich auf der Rückenfläche der Finger befindet.

ersten Fingergliedes in drei Theile spaltet, von denen der mittlere sich auf der Rückenfläche der Basis des Knochens des zweiten Gliedes der vier letzten Finger ansetzt, während die beiden Seitentheile zum dritten Gliede derselben Finger gehen.

Wirkung:
 streckt den zweiten bis fünften Finger.
 eigener Streckmuskel des kleinen Fingers, *musculus extensor digiti minimi proprius* (Taf. 13; 6₉).

zwischen dem äußern Ellenbogenmuskel und dem gemeinschaftlichen Fingerstrecker.

Verlauf:
 Der äußere Gelenkfortsatz des Oberarmknochens und die äußere Kante des Ellenbogenbeins.
 Vereintigt sich mit der vierten Sehne des gemeinschaftlichen Fingerstreckers und geht mit dieser zum fünften Finger.

Wirkung:
 streckt den kleinen Finger.
 Finger Abzieher des Daumens, *musculus abductor pollicis longus* (Taf. 13; 6₉).

an seinem Ursprung von dem gemeinschaftlichen Fingerstrecker bedeckt, läuft er an der hinteren Fläche der Speiche zur Hand herab.

Verlauf:
 Die Rückenfläche des Ellenbogenbeins, das Zwischenknochenband und die hintere Fläche der Speiche in ihrem mittlern Theile.

Die Basis des Mittelhandknochens des Daumens.
Wirkung:
 zieht den Daumen vom Zeigefinger ab und streckt ihn zugleich.

kurzer Streckmuskel des Daumens, *musculus extensor pollicis brevis* (Taf. 13; 6₁₀).

nach innen und etwas nach unten von dem langen Abzieher des Daumens.

Verlauf:
 Die äußere Kante des Ellenbogenbeins und das Zwischenknochenband.
 Die Rückenfläche der Basis des ersten Daumengliedes.

Wirkung:
 streckt das erste Daumenglied.

langer Streckmuskel des Daumengliedes, *extensor pollicis longus* (Taf. 13; 6₁₁).

an der innern Seite des kurzen Daumenstreckers.

Verlauf:
 Die Rückenfläche des Ellenbogenbeins und das Zwischenknochenband an der oberen Hälfte des Unterarms.
 Die Sehne verbindet sich mit der des kurzen Daumenstreckers und geht zum zweiten Gliede des Daumens.

Wirkung:
 streckt das zweite Daumenglied.

Eigener Streckmuskel des Zeigefingers, *extensor indicis proprius* (Taf. 13; 6₁₂).

An der innern Seite des langen Daumenstreckers.

Verlauf:
 a) Die hintere Seite des Ellenbogenbeins und das Zwischenknochenband.

b) Die Sehne dieses Muskels verschmilzt in der Gegend des Rückens des zweiten Mittelhandknochens mit der zum zweiten Finger gehenden Sehne des gemeinschaftlichen Fingerstreckers und setzt sich mit dieser an den Rücken des zweiten und dritten Gliedes des Zeigefingers an.

Wirkung:
 streckt den Zeigefinger.

IV. Muskeln an der Hand.

A. Muskeln am Ballen des Daumens.

1. Kurzer Abzieher des Daumens, *musculus abductor brevis pollicis* (Taf. 13; 4₁₃).

Verlauf:
 An der äußern Seite der Hohlhandfläche des Daumenballens.

Verlauf:
 a) Das eigene Hohlhandband der Handwurzel und der Höcker des großen vielwinkligen Knochens.
 b) Der Radialrand der Basis des ersten Daumengliedes.

Wirkung:
 zieht den Daumen vom Zeigefinger ab.

2. Kurzer Beuger des Daumens, *musculus flexor pollicis brevis* (Taf. 13; 4₁₂, 5₁₁).

Verlauf:
 Bildet den innern Rand des Ballens des Daumens. Er legt sich mit seinem äußern Rande unmittelbar an den innern Rand des kurzen Abziehers des Daumens, so daß er mit diesem scheinbar einen Muskel bildet. Auf unserer Tafel ist in Fig. 4 sowohl von dem kurzen Beuger des Daumens, sowie von dem kurzen Abzieher des Daumens, da wo beide Muskeln aneinanderstoßen, ein Stück weggenommen, um den darunter liegenden Gegensteller des Daumens sichtbar zu machen.

Verlauf:
 a) Entspringt mit zwei Portionen, einer oberflächlichen von dem eigenen Hohlhandbande der Handwurzel, und mit einer tiefern von dem kleinern vielwinkligen Knochen und dem Kopfbein.
 b) Die beiden Sesambeine und das erste Glied des Daumens.

Wirkung:
 beugt das erste Glied des Daumens.

3. Gegensteller des Daumens, *musculus opponens pollicis* (Taf. 13; 4₁₄, 5₁₀).

Verlauf:
 Unter dem kurzen Abzieher und kurzen Beuger des Daumens.

Verlauf:
 a) Das eigene Hohlhandband der Handwurzel.
 b) Der Radialrand und das Köpfchen des ersten Mittelhandknochens.

Wirkung:
 rollt den Daumen nach innen und bewirkt zugleich die Hohlmachung der Hand.

4. Zuziehmuskel des Daumens, *musculus adductor pollicis* (Taf. 13; 4₁₀, 5₁₂, 6₁₄).

Verlauf:
 In der Hohlhand zwischen dem Daumen und dem Mittelhandknochen des dritten Fingers.

Verlauf:
 a) Das Kopfbein und der dritte Mittelhandknochen.
 b) Die Basis des ersten Gliedes des Daumens.

Wirkung:
 zieht den Daumen gegen den Zeigefinger.

B. Muskeln am Ballen des kleinen Fingers.

1. Kurzer Hohlhandmuskel, *musculus palmaris brevis* (Taf. 13; 4₁₂).

Lage:

Unter der Haut des Ballens des kleinen Fingers in dem daselbst befindlichen fettreichen Bindegewebe.

Anfänge:

- a) Der Ulnarrand des mittlern Theils der Hohlhandaponeurose.
- b) Die Haut am Ulnarrande des kleinen Fingers.

Wirkung:

Knizelt die Haut des Ballens des kleinen Fingers.

2. Abzieher des kleinen Fingers, *musculus abductor digiti minimi* (Taf. 13; 4₁₇, 6₁₈).

Lage:

Am Ulnarrande des fünften Mittelhandknochens.

Anfänge:

- a) Das eigene Hohlhandband der Handwurzel und das Erbsenbein.
- b) Der Ulnarrand der Basis des ersten Gliedes des fünften Fingers.

Wirkung:

Zieht den kleinen Finger vom vierten Finger ab.

3. Kurzer Beugemuskel des kleinen Fingers, *musculus flexor digiti minimi brevis* (Taf. 13; 4₁₀, 5₁₄, 6₁₆).

Lage:

Am Radialrande des Abziehers des kleinen Fingers.

Anfänge:

- a) Der Gelenkfortsatz des Gelenkbeins und das eigene Hohlhandband der Handwurzel.
- b) Der Ulnarrand des ersten Gliedes des fünften Fingers.

Wirkung:

Beugt das erste Glied des kleinen Fingers.

4. Gegensteller des kleinen Fingers, *musculus opponens digiti minimi*.

Lage:

Ist vom kurzen Beuger des kleinen Fingers bedeckt, weshalb er auf unserer Tafel nicht sichtbar ist, doch kann man sich nach den Anfängen leicht seine Lage vorstellen.

Anfänge:

- a) Der Gelenkfortsatz des Gelenkbeins und das eigene Hohlhandband der Handwurzel.
- b) Der Ulnarrand und die Vorderfläche des Köpfchens des Mittelhandknochens des kleinen Fingers.

Wirkung:

Rollt den kleinen Finger nach der Radialseite der Hand und bewirkt dadurch die Hohlhandmachung derselben.

C. Muskeln in der Mitte der Hohlhand.

1. Spul- oder Regenwurmmuskeln, *musculi lumbricales* (Taf. 13; 4₁₀).

Lage:

Es sind vier Stüd dieser Muskeln an jeder Hand und befinden sich dieselben unter der Hohlhandfascie, je einer an der Radialseite einer der vier Sehnen des tiefen gemeinschaftlichen Fingerbeugers.

Anfänge:

- a) Die Radialränder der vier Sehnen des tiefen gemeinschaftlichen Fingerbeugers.
- b) Die Radialseite des ersten Gliedes des zweiten bis fünften Fingers. Die Sehne der Spulmuskeln verschmilzt dabei mit der Sehne der Zwischenknochenmuskeln und der Sehne des gemeinsamen Streckmuskels der Finger.

Wirkung:

Sie beugen das erste Glied des fünften Fingers.

2. Innere Zwischenknochenmuskeln, *interossei interni* oder *volares* (Taf. 13; 5₁₅).

Lage:

Es gibt drei innere Zwischenknochenmuskeln unter den Spulmuskeln in der Hohlhand. Die beiden Mittelknochen des zweiten bis fünften Fingers liegen.

Anfänge:

Der erste innere Zwischenknochen entspringt an der Ulnarseite des ersten Mittelhandknochens und geht an den Ulnar-Basis des ersten Gliedes des zweiten Fingers.

Der zweite innere Zwischenknochen entspringt am Radialrand des zweiten Mittelhandknochens und geht an die Basis des ersten Gliedes des dritten Fingers.

Der dritte innere Zwischenknochen entspringt am Radialrand des dritten Mittelhandknochens und geht an die Basis des ersten Gliedes des fünften Fingers.

Wirkung:

Sie ziehen den zweiten, vierten und fünften Finger zum Mittelfinger hin.

- D. Muskeln auf dem Rücken der Hand.

Äußere Zwischenknochenmuskeln, *interossei externi* oder *dorsales* (Taf. 13; 5₁₆).

Lage:

Es gibt vier äußere Zwischenknochenmuskeln auf dem Rücken der Hand in den Zwischenräumen zwischen dem ersten bis fünften Mittelhandknochen. Sie ragen in die Hohlhand und erscheinen daselbst neben den inneren Zwischenknochenmuskeln, je nach ihren Anfängen an der äußeren oder inneren Seite derselben.

Anfänge:

- a) Sie entspringen mit je zwei Köpfen an der äußeren und inneren Seite der ersten beiden Mittelhandknochen.

- b) Sie setzen sich mit ihrer Sehne an der Basis des ersten Fingergliedes, und zwar:
 - der erste äußere Zwischenknochenmuskel an die Radialseite der Basis des ersten Gliedes des zweiten Fingers,
 - der zweite äußere Zwischenknochenmuskel an die Radialseite der Basis des zweiten Gliedes des dritten Fingers,
 - der dritte äußere Zwischenknochenmuskel an die Ulnarseite der Basis des ersten Gliedes des dritten Fingers,
 - der vierte äußere Zwischenknochenmuskel an die Ulnarseite der Basis des ersten Gliedes des vierten Fingers.

Wirkung: Wirken sämmtliche äußere Zwischenknochenmuskeln zu gleicher Zeit, so wird der Mittelfinger gestreckt, während der zweite und dritte Finger von demselben abgezogen wird. Wird nur der zweite und dritte äußere Zwischenknochenmuskel so wird der Mittelfinger nach der äußeren Seite zu gezogen. Die Wirkung des vierten äußeren Zwischenknochenmuskels ist dieselbe.

Wirkung:

Wirken sämmtliche äußere Zwischenknochenmuskeln zu gleicher Zeit, so wird der Mittelfinger gestreckt, während der zweite und dritte Finger von demselben abgezogen wird. Wird nur der zweite und dritte äußere Zwischenknochenmuskel so wird der Mittelfinger nach der äußeren Seite zu gezogen. Die Wirkung des vierten äußeren Zwischenknochenmuskels ist dieselbe.

Die Muskeln des Ober- und Unterarmes sind von einer sehnigen Haut umschlossen, der *fascia brachialis*, und der Unterarm von einer sehnigen Haut umschlossen, der *fascia antebrachialis*.

abrachii. Am Oberarm dringt dieselbe sowohl Außen: wie Innen: zwischen den Muskeln *b* bildet, indem sie zum äußern und innern des Oberarmbeins geht, eine Scheidewand den Bogen- und Streckmuskeln des *us*, das äußere Zwischenmuskelband, *um intermusculare externum* und das innere *um intermusculare*, *ligamentum intermusculare*.

Blutgefäße der obren Extremität.

I. Pulsadern.

*h*schelpulsader, *arteria axillaris*, welche wir über bei Tafel 6 und 7 zu betrachten Gelegenheit haben, und von welcher die auf dieser sichtbaren Pulsadern:

*h*nterschlulterblattpulsader, *arteria subscapularis* (Taf. 13; 3a), aus welcher die umgekehrte *h*schulterblattpulsader, *arteria circumscapularis* (Taf. 13; 3a'), hervorgeht, und die hintere Kranzpulsader des Arms, *circumflexa humeri posterior* (Taf. 13; 3b), weigen, setzt sich fort in die *pulsader*, *arteria brachialis* (Taf. 13; 4a, 5a). Dieselbe verläuft in der Mitte der Fläche des Oberarms herab, und gelangt über den Bogenbogen, indem sie sich nach oben wendet, zum Vorderarm, wo sie sich in zwei die Speichen- und Elbogenpulsader. In ihrem Verlauf gibt sie folgende Äste ab: *e* tiefe Armpulsader, *arteria profunda* (Taf. 13; 1b, 2c); *e* Speichennebenpulsader, *arteria collateralis* (Taf. 13; 6b); *e* obere Elbogennebenpulsader, *arteria ulnaris superior* (Taf. 13; 1c, 2d, 3c); *e* untere Elbogennebenpulsader, *arteria ulnaris inferior* (Taf. 13; 2e, 6a); *e* mittlere Nebenpulsader, *arteria collateralis* (Taf. 13; 6c); *e* Muskelzweige, *rami musculares* (Taf. 13; 2b).

Pulsadern des Vorderarms.

e Speichenpulsader, *arteria radialis* (Taf. 13; 4b, 5b), ist der äußere und schwächere Endast *pulsader*. Sie läuft an der innern Fläche eiche herab, wo sie sich um den Radialrand der Handwurzel auf den Rücken derselben schlägt und *e* zwischen dem ersten und zweiten Mittelhandgelenk hindurch in die Hohlhand gelangt. Sie gibt *e* Zweige ab:

e rücklaufende Speichenpulsader, *arteria ulnaris* (Taf. 13; 1e, 2g); *e* Hohlhandzweig der Speichenpulsader, *ramus volaris arteriae radialis* (Taf. 13; 4c, 5c), in den obern Hohlhandbogen eintritt; *e* Rückenweig der Speichenpulsader, *dorsalis arteriae radialis* (Taf. 13; 5d, 6f), welcher wiederum entspringt: *e* der Rückenast der Handwurzel, *ramus carpeus dorsalis* (Taf. 13; 6g); *e* der Rückenast der Mittelhand, *ramus metacarpus dorsalis* (Taf. 13; 6h); *e* die Ulnarhandpulsader des Daumens, *arteria ulnaris pollicis* (Taf. 13; 6i); *e* die große Daumenpulsader, *arteria princeps* oder *magna pollicis* (Taf. 13; 6k); *e* der Endast der Speichenpulsader, welcher sich zwischen dem ersten und zweiten Mittel-

handknochen in die Hohlhand schlägt und *e* selbst dicht auf der Volarfläche der Basis der Mittelhandknochen den tiefen Hohlhandbogen, *arcus volaris profundus*, bildet.

B. Die Elbogenpulsader, *arteria ulnaris* oder *cubitalis* (Taf. 13; 1f, 2h, 4o, 5e), ist der innere stärkere Ast der Armpulsader. Sie geht an der innern vordern Fläche des Elbogenbeins herab und gelangt in die Hohlhand, wo sie unmittelbar unter der Hohlhandaponeurose liegt und den oberflächlichen Hohlhandbogen, *arcus volaris sublimis* (Taf. 13; 4d, 5g), bildet. Sie gibt folgende Zweige ab:

1. die rücklaufende Elbogenpulsader, *arteria recurrens ulnaris* (Taf. 13; 6e);

2. die gemeinschaftliche Zwischenknochenpulsader, *arteria interossea communis* (Taf. 13; 1g, 2i, 5f), welche aus der Rückenwand der Elbogenpulsader, nahe an deren Ursprungsstelle, unter der rücklaufenden Elbogenpulsader entspringt; sie theilt sich alsbald in zwei Zweige:

- die äußere Zwischenknochenpulsader, auch die obere oder durchbohrende Zwischenknochenpulsader genannt, *arteria interossea externa*, oder *superior*, auch *perforans* (Taf. 13; 1h, 2k, 6d), welche zwischen Speiche und Elbogenknochen hindurchgeht und auf die Rücken- seite des Arms gelangt, wo sie nach Abgabe der rücklaufenden Zwischenknochenpulsader, *arteria recurrens interossea* (Taf. 13; 3d), nach abwärts bis zur Handwurzel läuft, wo sie in den von dem Rückenast der Speichenpulsader gebildeten Rückenhandwurzelbogen, *arcus carpi dorsalis* ober *rete carpeum dorsale* (Taf. 13; 6g u. 6h), eintritt;
- die innere Zwischenknochenpulsader, *arteria interossea interna* (Taf. 13; 1i, 2e), welche die Fortsetzung des Stammes ist, auf der Volarfläche des Zwischenknochenbogens nach abwärts läuft und, dasselbe in dessen untern Theile durchbrechend, gleichfalls in den Rückenhandwurzelbogen einmündet;

3. den Hohlhandast der Elbogenpulsader, *ramus volaris arteriae ulnaris*, derselbe theilt sich in einen:

- oberflächlichen Ast, *ramus volaris sublimis* oder *superficialis* (Taf. 13; 5g), welcher den oberflächlichen Hohlhandbogen, *arcus volaris sublimis* (Taf. 13; 4d') bildet, zu welchem auch der oberflächliche Hohlhandast der Speichenpulsader, *ramus volaris arteriae radialis superficialis* (Taf. 13; 5c), hinzutritt, in einen
- tiefen Ast, *ramus volaris profundus* (Taf. 13; 4), welcher zum tiefen Hohlhandbogen tritt und diesen mit dem tiefen Hohlhandast der Speichenpulsader bildet, und in den
- Hohlhandast der Ulnarseite des kleinen Fingers, *arteria volaris ulnaris digiti minimi* (Taf. 13; 5i).

Aus dem oberflächlichen Hohlhandbogen, *arcus volaris sublimis* (Taf. 13; 4d'), entspringen die gemeinschaftlichen Hohlhandpulsadern der Finger, *arteriae digitales communes volares* (Taf. 13; 4e). Es sind deren drei Stück, welche zwischen den Sehnen der gemeinschaftlichen Fingerbeuger liegen und bis zum Köpfchen der Mittelhandknochen laufen, wo sich jede gabelförmig in die Hohlhandfingerpulsadern, *arteriae digitales volares*, spaltet, von welchen die eine am innern, die andere am äußern

Rande zweier nebeneinander liegender Finger bis zur Spitze sich verbreitet.

Aus dem tiefen Hohlhandbogen, *arcus volaris profundus*, gehen endlich die Hohlhandzwischenknochenpulsadern, *arteriae interosae volares* (Taf. 13; 5k), welche die innern Zwischenknochenmuskeln versorgen, hervor.

II. Blutadern.

Die Schlüsselbeinblutader, *vena subclavia*, welche wir bereits bei Tafel 6 und 7 betrachtet haben, setzt sich zusammen aus:

1. der Achselblutader, *vena axillaris*, welche in der Achselhöhle neben der Achspulsader liegt, und aus dem Zusammenfluß der beiden die Armpulsader begleitenden Armblutadern, *venae brachiales* (Taf. 13; 1m), sowie der übrigen tiefen und oberflächlichen Oberarmblutadern entsteht, und

2. der Speichenhautblutader, *vena cephalica* oder *cutanea radialis* (Taf. 13; 1k), welche am Daumen entsteht, am äußern Rande des Vorderarms und an der Volarfläche desselben, sowie am äußern Rande des zweitopfigen Arummuskels unmittelbar unter der Haut nach aufwärts geht und sich dann zwischen dem Deltamuskeln und großen Brustmuskeln unter dem Schlüsselbein weg zur Schlüsselbeinblutader begibt, an der Stelle, wo dieselbe aus der Achselblutader hervorgeht.

Noch ist zu nennen die Ellenbogenhautblutader, *vena basilica*, welche am innern Rande an der Volarfläche des Vorderarms nach aufwärts läuft und sich in die innere Armblutader (Taf. 13; 1n) ergießt.

Ferner die Mittelfarmblutader, *vena mediana* (Taf. 13; 1e, 3f), ein kurzer Verbindungsast, welcher unter der Haut des Ellenbogenbogens die Speichenhautvene mit der Ellenbogenhautvene in Verbindung setzt.

Wie die Oberarmpulsader werden auch die Pulsadern des Vorderarms von zwei Blutadern begleitet, welche im Gegensatz zu den Hautvenen die tiefen Blutadern des Vorderarms, *venae profundae antibrachii* (Taf. 13; 1n, 4g, 5e), heißen.

Besonders zu erwähnen sind noch die beiden die Speichenpulsader begleitenden Speichenblutadern, *venae radiales* (Taf. 13; 1o), sowie die beiden in gleicher Weise mit der Ellenbogenpulsader verlaufenden Ellenbogenblutadern, *venae ulnares* (Taf. 13; 1p).

Nerven der oberen Extremität.

Die Nerven der oberen Extremität gehen aus dem Armgesecht, *plexus brachialis*, das wir schon bei Tafel 6 und 7 betrachtet haben, hervor. Von denselben sind auf unserer Tafel dargestellt:

1. der äußere Hautnerv des Arms, *nervus cutaneus externus brachii*, auch Muskel-Hautnerv, *nervus musculo-cutaneus* oder *perforans Casseri* (Taf. 13; 1y, 5a) genannt, welcher die Muskeln an der Volarseite des Oberarms und die Haut an der Radialfläche des Vorderarms versorgt;

2. der mittlere Hautnerv des Arms, *nervus cutaneus medius brachii* oder *cutaneus internus major* (Taf. 13; 2d). Derselbe durchbohrt die Oberarmfaszie in der Mitte des Oberarms, worauf er in zwei Äste getheilt die Haut der Volarfläche und des Ulnarrandes des Vorderarms versorgt;

3. der Speichennerve, *nervus radialis* (Taf. 13; 2e, 5g). Es ist der stärkste der Armnerven und verläuft anfangs mit der tiefen Armpulsader, geht dann an der vordern innern Seite des äußern Gelenkfortsatzes des Oberarms zum Vorderarm, wo er sich entlang der Speiche zur Rückenfläche des Vorderarms und der Hand wendet. Er gibt ab:

- a) den äußern Hautnerv des Vorderarms, *nervus cutaneus antibrachii externus* (Taf. 13; 2e);
- b) den tiefen Ast, *ramus profundus nervi radialis*, auch äußerer Zwischenknochennerve, *nervus interosaeus externus*, genannt (Taf. 13; 2f);
- c) den oberflächlichen Ast, *ramus superficialis nervi radialis* (Taf. 13; 2f, 4a, 5f), welcher sich wiederum in zwei Zweige theilt, und zwar in den:

- a) vordern Ast, *ramus anterior* oder *marginalis* (Taf. 13; 4b, 5f), welcher die Haut des Daumenballens versorgt und den Rückenerv der Radialseite des Daumens, *nervus dorsalis radialis pollicis*, abgibt; und in den
- β) hintern oder Rückenast der Hand, *ramus posterior* oder *dorsalis manus* (Taf. 13; 4y, 5f'), welcher auf dem Rücken den Ulnarrand des Daumens versorgt und dem Zeigefinger für seine beiden, dem Mittelfinger aber nur für seinen Radialrand einen Ast gibt.

4. Der Ellenbogennerve, *nervus ulnaris* oder *cubitalis* (Taf. 13; 2p). Derselbe läuft am Oberarm dicht unter der Faszie mit der Oberarmpulsader, wendet sich dann nach hinten und läuft in der Mitte des innern Gelenkfortsatzes des Oberarmknochens zum Vorderarm, an dessen innerer Fläche er mit der Ellenbogenpulsader verläuft. Sein Hauptast ist der Hohlhand-Ellenbogennerve, *ramus volaris nervi ulnaris* (Taf. 13; 5e), welcher über dem eigenen Hohlhandbunde der Handwurzel in die Hohlhand gelangt und sich da in den

- a) oberflächlichen Ast, *ramus sublimis* oder *superficialis* (Taf. 13; 5g), und in den
- β) tiefen Ast, *ramus profundus* (Taf. 13; 5e') theilt.

5. Der Mittelfarmnerve, *nervus medianus* (Taf. 13; 2a, 5p). Derselbe steigt gleichfalls neben der Armpulsader am Oberarme herab, tritt mit dieser durch den Ellenbogenbogen und läuft dann in der Mitte der Volarfläche des Vorderarms unter dem eigenen Hohlhandbunde hinweg zur Hohlhand. Er gibt ab:

- a) Muskelzweige, *rami musculares* (Taf. 13; 5p), zu sämtlichen Muskeln der Beugehand des Unterarms mit Ausnahme des innern Ellenbogenmuskels, ferner:
- b) den innern Zwischenknochennerve, *nervus interosaeus internus* (Taf. 13; 5y), und
- c) die Hohlhandnerven der Finger, *nervi digitorum volares* (Taf. 13; 5d), von denen der erste die Ballenmuskeln des Daumens und die Haut am Radialrande desselben versorgt, während die drei folgenden die ersten drei Spulmuskeln und je zwei einander gegenüberstehende Seiten der ersten vier Finger versorgen.

Knochen und Bänder.

Die Erklärung der Knochen (Taf. 13; 1A bis 1F, 2A bis 2F, 3A bis 3H, 4A bis 4D, 5A bis 5H und 6A bis 6J), sowie der Bänder (Taf. 13; 1G bis 1J, 2G bis 2K, 3J bis 3L, 4G bis 4J, 5J und 6K bis 6M) dieser Tafel siehe Text zu Tafel 4 n. 5, S. 46 fg. und 60 fg.

Tafel 14.

Die untere Extremität zerfällt in die Hüfte, welche bereits auf den Tafeln 10, 11 und 12 dargestellt worden ist, sowie in den Oberschenkel, Unterschenkel

n Fuß, welche auf dieser sowie der folgenden zur Anschauung gelangt sind.

1. Der linke Oberschenkel von vorn sehen, nach Entfernung der Haut und der Fascie.

Patella, Kniegelenk.

Condylus internus femoris, innerer Gelenkknorren des Oberschenkelknochens.

Condylus externus femoris, äußerer Gelenkknorren des Oberschenkelknochens.

Condylus externus tibiae, äußerer Gelenkknorren des Schienbeins.

Tuberositas tibiae, Schienbeinhöcker.

Ligamentum patellae, Kniegelenksband.

Aponeurosis latae femoris pars, Theil der breiten Schenkelbinde.

Aponeurosis cruralis, Unterschenkel Fascie.

Musculus sartorius, Schneidermuskel.

Musculus rectus femoris, gerader Oberschenkelmuskel.

Musculus vastus internus, innerer großer Oberschenkelmuskel.

Musculus vastus externus, äußerer großer Oberschenkelmuskel.

Musculus pectineus, Kammmuskel.

Musculus adductor longus femoris, langer Zuziehender des Beins.

Musculus gracilis, schlanker Schenkelmuskel.

Vena saphena magna, große oder innere Knieader.

Vena subcutanea femoris, Unterhautblutader des Oberschenkels.

2. Der rechte Oberschenkel von vorn sehen, nach Entfernung der obersten Muskelschicht.

Patella, Kniegelenk.

Condylus internus femoris, innerer Gelenkknorren des Oberschenkelknochens.

Condylus externus femoris, äußerer Gelenkknorren des Oberschenkelknochens.

Condylus externus tibiae, äußerer Gelenkknorren des Schienbeins.

Tuberositas tibiae, Schienbeinhöcker.

Ligamentum patellae, Kniegelenksband.

Aponeurosis latae femoris pars, Theil der breiten Schenkelbinde.

Aponeurosis cruralis, Unterschenkel Fascie.

Musculus sartorius, Schneidermuskel.

Musculus rectus femoris, gerader Oberschenkelmuskel.

Musculus vastus internus, innerer großer Oberschenkelmuskel.

Musculus vastus externus, äußerer großer Oberschenkelmuskel.

Musculus cruralis, Schenkelbeinmuskel.

Musculus psoas major und iliacus internus, großer Hüftmuskel und innerer Hüftbeinmuskel.

Musculus pectineus, Kammmuskel.

Musculus adductor longus femoris, langer Zuziehender des Oberschenkels.

Musculus adductor magnus femoris, großer Zuziehender des Oberschenkelknochens.

Musculus gracilis, schlanker Schenkelmuskel.

Arteria cruralis, Schenkelpulsader.

Arteria profunda femoris, tiefe Schenkelpulsader.

Rami musculares arteriae cruralis et profundae femoris, Muskelzweige der Schenkelpulsader der tiefen Schenkelpulsader.

d. Arteria articularis genu superior externa, obere äußere Kniegelenkpulsader.

e. Vena saphena magna, große oder innere Knieader.

f. Vena subcutanea femoris, Unterhautblutader des Oberschenkels.

g. Nervus cutaneus femoris internus, innerer Hautnerv des Oberschenkels.

h. Nervus cutaneus femoris anterior medius, vorderer mittlerer Hautnerv des Oberschenkels.

i. Nervus saphenus major, großer Knieennerv.

j. Ramus minor nervi sapheni majoris, kleiner Zweig des großen Knieennervs.

k. Rami musculares nervi cruralis, Muskelzweige des Schenkelnervs.

l. Ramus musculocutaneus nervi cruralis, Muskelhautast des Schenkelnervs.

Figur 3. Linker Unterschenkel von vorn gesehen, nach Entfernung der Haut und der Fascie.

A. Tibia, Schienbein.

B. Malleolus internus, innerer Knöchel.

C. Fibula, Wadenbein.

D. Malleolus externus, äußerer Knöchel.

E. Os metatarsi hallucis, Mittelfußknochen der großen Zehe.

F. Phalanges digitorum pedis, Zehnknochen.

G. Ligamentum annulare anterius oder cruciatum anterius, vorderes Ring- oder Kreuzband.

1. Musculus tibialis anticus, vorderer Schienbeinmuskel.

2. Musculus extensor digitorum communis longus, langer gemeinschaftlicher Zehnstrecker.

3. Musculus peroneus tertius, dritter Wadenbeinmuskel.

4. Musculus extensor digitorum communis brevis, kurzer gemeinschaftlicher Zehnstrecker.

5. Musculus extensor hallucis longus, langer Strecker der großen Zehe.

6. Musculus extensor hallucis brevis, kurzer Strecker der großen Zehe.

7. Musculus peroneus longus, langer Wadenbeinmuskel.

8. Musculus peroneus brevis, kurzer Wadenbeinmuskel.

9. Musculus gastrocnemius, zweiköpfiger Wadenmuskel.

10. Musculus soleus, Schollenmuskel.

11. Musculus abductor hallucis, Abzieher der großen Zehe.

12. Musculi interossei dorsalis pedis, Zwischenknochenmuskeln des Fußrückens.

a. Arteria tibialis antica, vordere Schienbeinpulsader.

b. Arteria dorsalis pedis, Pulsader des Fußrückens.

c. Venae profundae cruris, tiefe Unterschenkelblutadern.

Figur 4. Rechter Unterschenkel von vorn gesehen, nach Entfernung der obersten Muskelschicht.

A. Tibia, Schienbein.

B. Malleolus internus, innerer Knöchel.

C. Fibula, Wadenbein.

D. Malleolus externus, äußerer Knöchel.

E. Os metatarsi hallucis, Mittelfußknochen der großen Zehe.

F. Phalanges digitorum pedis, Knochen der Zehnglieder.

G. Ligamentum cruciatum anterius, vorderes Kreuzband.

1. Tendo musculi tibialis antici, Sehne des vorderen Schienbeinmuskels.

2. Musculus extensor digitorum pedis communis longus, langer gemeinschaftlicher Streckmuskel der Zehen.

3. Musculus extensor digitorum pedis communis brevis, kurzer gemeinschaftlicher Streckmuskel der Zehen.

4. Musculus extensor hallucis longus, langer Strecker der großen Zehe.

5. Musculus extensor hallucis brevis, kurzer Strecker der großen Zehe.

6. Musculus peroneus longus, langer Wadenbeinmuskel.

7. Musculus peroneus brevis, kurzer Wadenbeinmuskel.

8. Musculus gastrocnemius, zweiköpfiger Wadenmuskel.

9. Musculus soleus, Schollenmuskel.

10. Musculus abductor hallucis, Abzieher der großen Zehe.

11. Musculus interossei dorsalis pedis, Zwischenknochenmuskeln des Fußrückens.

12. Musculus abductor digiti minimi, Abzieher der fünften Zehe.

α. Nervus saphenus major, großer Nosenerv.

β. Nervus peroneus superficialis, oberflächlicher Wadenbeinnerv.

γ. Ramus cutaneus anterior nervi peronei superficialis, vorderer Hautast des oberflächlichen Wadenbeinnerven.

δ. Nervus cutaneus dorsi pedis internus, innerer Hautnerv des Fußrückens.

ε. Nervus cutaneus dorsi pedis medius, mittlerer Hautnerv des Fußrückens.

ζ. Ramus nervi sacralis, Ast des Wadennerven.

η. Nervi digitales dorsales pedis, Zehennerven des Fußrückens.

θ. Nervus peroneus profundus, tiefer Wadenbeinnerv.

5' Ramus internus nervi peronei profundi, innerer Ast der tiefen Wadenbeinnerven.

5'' Ramus externus nervi peronei profundi, äußerer Ast des tiefen Wadenbeinnerven.

Die Erklärung dieser Tafel verbinden wir mit der der folgenden, da die Theile beider ineinander übergehen und zusammen ein Ganzes bilden, zu dem auch die auf den Tafeln 10, 11 und 12 dargestellte Hälfte gehört, weshalb wir diese gleichzeitig bei der Betrachtung der untern Extremität mit behandeln, siehe deshalb den Text zu Tafel 15, S. 124 fg.

Tafel 15.

Figur 1. Der rechte Oberschenkel von vorn gesehen, die Arterien und tiefste Muskelschicht zeigend.

A. Femur, Oberschenkelknochen.

B. Condylus femoris internus, innerer Gelenkknorren des Oberschenkelknochens.

C. Condylus femoris externus, äußerer Gelenkknorren des Oberschenkelknochens.

D. Patella, Knie Scheibe.

E. Tibia, Schienbein.

F. Fibula, Wadenbein.

G. Ligamentum patellae medium, mittleres Knie Scheibenband.

H. Ligamentum patellae internum, inneres Knie Scheibenband.

J. Ligamentum genu laterale internum, innerer Seitenband des Kniegelenkes.

K. Ligamentum genu laterale externum anterius, vorderes äußeres Seitenband des Kniegelenkes.

K' Ligamentum genu laterale externum posterius, hinteres äußeres Seitenband des Kniegelenkes.

L. Capsula synovialis articuli genu, Synovialkapsel des Kniegelenkes.

1. Musculus biceps femoris, zweiköpfiger Oberschenkelmuskel.

2. Musculus semimembranosus, halbhäutiger Muskel.

3. Musculus adductor magnus femoris, großer Zugzieher des Oberschenkels.

4. Insertio musculi pectinei, Ansatz des Knie muskels.

a. Arteria cruralis, Schenkel pulsader.

b. Arteria profunda femoris, tiefe Oberschenkel pulsader.

c. Ramus descendens arteriae circumflexae femoris externae, absteigender Ast der äußeren Knie muskelpulsader des Oberschenkels.

d. Arteria perforans prima, erste durchbohrende Pulsader.

e. Arteria perforans secunda, zweite durchbohrende Pulsader.

f. Arteria perforans tertia, dritte durchbohrende Pulsader.

g. Arteria nutritia femoris magna, große Nahrungspulsader des Oberschenkels.

h. Rami musculares arteriae cruralis, Muskeläste der Schenkel pulsader.

i. Arteria articularis genu superficialis, oberflächliche Kniegelenkpulsader.

k. Arteria poplitea, Kniekehlenpulsader.

l. Rami musculares arteriae popliteae, Muskeläste der Kniekehlenpulsader.

m. Arteria articularis genu superior externa, äußere obere Kniegelenkpulsader.

n. Arteria articularis genu superior interna, innere obere Kniegelenkpulsader.

o. Arteria articularis genu media, mittlere Kniegelenkpulsader.

p. Arteriae sacrales, Wadenpulsadern.

q. Arteria articularis genu inferior externa, äußere untere Kniegelenkpulsader.

r. Arteria articularis genu inferior interna, innere untere Kniegelenkpulsader.

s. Arteria tibialis antica, vordere Schienbeinpulsader.

t. Arteria recurrens tibiae, rücklaufende Schienbeinpulsader.

u. Arteria tibialis postica, hintere Schienbeinpulsader.

Figur 2. Linker Oberschenkel von hinten gesehen, nach Entfernung der Haut und der obersten Muskelschicht.

A. Tibia, Schienbein.

1. Insertio musculi glutaei maximi, Ansatz des großen Gesäßmuskels.

2. Musculus vastus externus, äußerer großer Oberschenkelmuskel.

3. Musculus biceps femoris, zweiköpfiger Oberschenkelmuskel.

3' Musculi bicipitis femoris caput longum, langer Kopf des zweiköpfigen Oberschenkelmuskels.

3'' Musculi bicipitis femoris caput breve, kurzer Kopf des zweiköpfigen Oberschenkelmuskels.

4. Musculus adductor femoris magnus, großer Zugzieher des Oberschenkels.

5. Musculi semitendinosi pars inferior, unterer Theil des halbsehnigen Muskels.

6. Musculus semimembranosus, halbhäutiger Muskel.
7. Musculus gracilis, schlanker Schenkelmuskel.
8. Capita musculi gastrocnemii, Köpfe des zweiföpfigen Wadenmuskels.
9. Musculi plantaris pars suprema, oberster Theil des langen Sohlenmuskels.
10. Musculus popliteus, Kniekehlenmuskel.
11. Musculus soleus, Schollenmuskel.
- a. Arteria perforans prima, erste durchbohrende Pulsader.
- b. Arteria perforans secunda, zweite durchbohrende Pulsader.
- c. Arteria perforans tertia, dritte durchbohrende Pulsader.
- d. Arteria nutritia femoris magna, große Nährpulsader des Oberschenkels.
- e. Arteria poplitea, Kniekehlenpulsader.
- f. Arteria articularis genu superior externa, obere äußere Kniegelenkpulsader.
- g. Arteria articularis genu superior interna, obere innere Kniegelenkpulsader.
- h. Arteria articularis genu inferior externa, untere äußere Kniegelenkpulsader.
- i. Arteria articularis genu inferior interna, untere innere Kniegelenkpulsader.
- k. Arteria tibialis antica, vordere Schienbeinpulsader.
- l. Arteria tibialis postica, hintere Schienbeinpulsader.
- m. Arteria peronea communis, gemeinschaftliche Wadenbeinpulsader.
- n. Nervus ischiadicus, Hüftnerv.
- o. Rami musculares nervi ischiadici, Muskeläste der Hüftnerven.
- p. Ramus ad nervum cutaneum femoris posterioriorem, Zweig zum hintern Hautnerven des Oberschenkels.
- q. Nervus peroneus, Wadenbeinnerv.
- r. Nervus cutaneus cruris posterior externus, hinterer äußerer Hautnerv des Unterschenkels.
- s. Nervus cutaneus cruris posterior medius, hinterer mittlerer Hautnerv des Unterschenkels.
- t. Nervus tibialis, Schienbeinnerv.
- u. Nervus suralis, Wadenerv.

1. Musculi peronei, Wadenbeinmuskeln.
2. Musculi interossei dorsales pedis, Zwischenknochenmuskeln des Fußrückens.
- a. Arteria tibialis antica, vordere Schienbeinpulsader.
- b. Arteria dorsalis pedis, Pulsader des Fußrückens.
- c. Arteria recurrens tibiae, rücklaufende Schienbeinpulsader.
- d. Arteria malleolaris anterior externa, vordere äußere Knöchelpulsader.
- e. Arteria malleolaris anterior interna, vordere innere Knöchelpulsader.
- f. Arteria tarsea externa, äußere Fußwurzelpulsader.
- g. Arteria tarsea interna, innere Fußwurzelpulsader.
- h. Arteria metatarsa externa, äußere Mittelfußpulsader.
- h' Arteria metatarsa interna, innere Mittelfußpulsader.
- i. Arcus dorsalis pedis, Fußrückendogen.
- k. Arteria interossea dorsalis pedis, Zwischenknochenpulsader des Fußrückens.
- k' Arteria interossea dorsalis pedis prima, erste Zwischenknochenpulsader des Fußrückens.
- k'' Arteria interossea dorsalis pedis prima ramus profundus, tiefer Zweig der ersten Zwischenknochenpulsader des Fußrückens.
- l. Arteria tibialis postica, hintere Schienbeinpulsader.
- m. Arteria peronea communis, gemeinschaftliche Wadenbeinpulsader.
- m' Arteria peronea anterior, vordere Wadenpulsader.
- m'' Arteria peronea posterior, hintere Wadenbeinpulsader.
- n. Arteria malleolaris posterior interna, hintere innere Knöchelpulsader.
- o. Arteria malleolaris posterior externa, hintere äußere Knöchelpulsader.
- p. Arteria plantaris pedis interna, innere Fußsohlenpulsader.
- q. Arteria plantaris pedis externa, äußere Fußsohlenpulsader.
- r. Arteria sacrales ex arteria poplitea, Wadenpulsader aus der Kniekehlenpulsader.

Figur 3. Rechter Unterschenkel von vorn gesehen, nach Entfernung sämtlicher vordern Muskeln.

- A. Tibia, Schienbein.
- B. Malleolus internus, innerer Knöchel.
- C. Fibula, Wadenbein.
- D. Malleolus externus, äußerer Knöchel.
- E. Ossa tarsi, Fußwurzelknochen.
- F. Ossa metatarsi, Mittelfußknochen.
- G. Phalanx prima digitorum pedis, erstes Glied der Zehnknochen.
- H. Phalanx secunda digitorum pedis, zweites Glied der Zehnknochen.
- I. Phalanx tertia digitorum pedis, drittes Glied der Zehnknochen.
- K. Ligamentum annulare anterius, vorderes Ringband.
- L. Ligamentum interosseum cruris, Zwischenknochenband des Unterschenkels.
- M. Ligamentum tibia-fibulare anticum, vorderes Schienbein-Wadenbeinband.
- N. Ligamenta tarsi et metatarsi, Bänder der Fußwurzel- und Mittelfußknochen.
- O. Ligamenta lateralia digitorum pedis, Seitenbänder der Zehnknochen.
- P. Ligamenta capsularia digitorum pedis, Kapselbänder der Zehnknochen.

Figur 4. Der linke Unterschenkel von hinten gesehen, nach Entfernung der Haut und der obersten Muskelschicht.

- A. Tibia, Schienbein.
- B. Malleolus internus, innerer Knöchel.
- C. Malleolus externus, äußerer Knöchel.
- E. Ligamentum annulare internum oder laciniatum, inneres Ringband.
1. Tendo Achillis, Achillessehne.
2. Musculus popliteus, Kniekehlenmuskel.
3. Musculus peroneus longus, langer Wadenbeinmuskel.
4. Musculus peroneus brevis, kurzer Wadenbeinmuskel.
5. Musculus flexor longus hallucis, langer Beuger der großen Zehe.
6. Musculus tibialis posticus, hinterer Schienbeinmuskel.
7. Musculus flexor communis longus digitorum pedis, gemeinschaftlicher langer Beuger der Zehe.
- a. Arteria tibialis postica, hintere Schienbeinpulsader.
- b. Arteria articularis genu inferior externa, untere äußere Kniegelenkpulsader.
- c. Arteria articularis genu inferior interna, untere innere Kniegelenkpulsader.
- d. Arteria nutritia tibiae superior, obere Nährpulsader des Schienbeins.

- e. Arteria malleolaris posterior interna, hintere innere Knöchelpulsader.
- e' Arteria malleolaris posterior externa, hintere äußere Knöchelpulsader.
- f. Rami calcanei interni arteriae tibialis posticae, innere Fersenbeinäste der hintern Schienbeinpulsader.
- g. Arteria peronea communis, gemeinschaftliche Wadenbeinpulsader.
- h. Arteria peronea postica, hintere Wadenbeinpulsader.
- a. Nervus tibialis, Schienbeinnerv.
- ß. Nervus cutaneus posterior externus cruris, hinterer äußerer Hautnerv des Unterschenkels.

Figur 5. Die Fußsohle nach Entfernung der Haut und des kurzen Zehenbeugers.

- A. Calcaneus, Fersenbein.
- B. Os metatarsi primum oder hallucis, erster Mittelfußknochen.
- C. Phalanx prima digitorum pedis, erstes Glied der Zehenknochen.
- D. Phalanx secunda digitorum pedis, zweites Glied der Zehenknochen.
- E. Phalanx tertia digitorum pedis, drittes Glied der Zehenknochen.
- F. Vagina tendinum musculorum flexorum, Sehnen Scheiden der Beugmuskeln.
- F' Vaginae tendinum appertae, geöffnete Sehnen Scheiden.
- 1. Flexor digitorum communis brevis insertio, Ansatz des gemeinschaftlichen kurzen Zehenbeugers.
- 1' Flexor digitorum communis brevis tendines, Sehne des gemeinschaftlichen kurzen Zehenbeugers.
- 2. Musculus abductor hallucis, Abzieher der großen Zehe.
- 3. Musculus flexor hallucis brevis, kurzer Beuger der großen Zehe.
- 4. Musculus flexor hallucis longus, tendo, Sehne des langen Beugers der großen Zehe.
- 5. Musculus flexor digitorum communis longus, tendo, Sehne des gemeinschaftlichen langen Zehenbeugers.
- 6. Musculi lumbricales pedis, Spulwurmmuskeln des Fußes.
- 7. Musculus quadratus plantae pedis, viereckiger Fußsohlenmuskel.
- 8. Musculus abductor digiti minimi, Abzieher der kleinen Zehe.
- 9. Musculus flexor brevis digiti minimi, kurzer Beuger der kleinen Zehe.
- 10. Musculus interosseus internus tertius, dritter innerer Zwischenknochenmuskel.
- 11. Musculus interosseus externus quartus, vierter äußerer Zwischenknochenmuskel.
- a. Arteria plantaris externa, äußere Fußsohlenpulsader.
- b. Rami musculares arteriae plantaris externae, Muskelzweige der äußern Fußsohlenpulsader.
- c. Ramus superficialis arteriae plantaris externae, oberflächlicher Zweig der äußern Fußsohlenpulsader.
- d. Ramus profundus arteriae plantaris externae, tiefer Zweig der äußern Fußsohlenpulsader.
- e. Arteriae digitales plantares communes, gemeinschaftliche Fußsohlenpulsadern der Zehen.
- e' Arteriae digitales plantares internae et externae, innere und äußere Fußsohlenpulsadern der Zehen.

- f. Arteria plantaris interna, innere Fußsohlenader.
- g. Arteria plantaris hallucis interna, innere Fußsohlenpulsader der großen Zehe.
- a. Nervus plantaris externus, äußerer Fußsohlennerv.
- ß. Ramus superficialis nervi plantaris externi, oberflächlicher Zweig der äußern Fußsohlennerven.
- γ. Ramus externus nervi plantaris externi, äußerer Zweig des äußern Fußsohlennerven.
- δ. Ramus internus nervi plantaris externi, innerer Zweig des äußern Fußsohlennerven.
- e. Nervus plantaris internus, innerer Fußsohlennerv.

Muskeln der untern Extremität.

I. Muskeln der Hüfte.

A. Muskeln an der vordern Fläche des Hüftgelenkes.

1. Innerer Hüftbeinmuskel, musculus iliacus internus (Taf. 10; 2₁₁. Taf. 11; 1₁₁, 2₁. Taf. 12; 1₁). Lage:

Auf der innern Fläche des Darmbeins.

Ansätze:

a) Der innere Rand des Darmbeinfammes, die innere Fläche des Darmbeins, sowie das Darmbeinfleischband.

b) Vereinigt mit dem großen Lendenmuskel gebildet der innere Hüftbeinmuskel (Taf. 14; 2₁) um den kleinen Rollhügel des Oberschenkelknochens.

Wirkung:

Beugt den Oberschenkel, wenn das Bein gestreckt ist, dreht dagegen, wenn die Beine gebeugt sind, den Rumpf auf den Schenkelhüften nach vorn.

2. Großer Lendenmuskel, musculus psoas major (Taf. 10; 2₁₂. Taf. 11; 1₁₂, 2₆. Taf. 12; 1₁₂). Lage:

An der vordern Fläche der hintern Wand der Bauchhöhle, zu beiden Seiten der Lendenwirbelsäule und am innern Rand des innern Hüftbeinmuskels.

Ansätze:

a) Die Seitenfläche des Körpers und die Fortsätze des zwölften Brust-, sowie des ersten bis vierten Lendenwirbels.

b) Seine Sehne vereinigt sich mit der des innern Hüftbeinmuskels und setzt sich an den kleinen Rollhügel des Oberschenkelknochens.

Wirkung:

Die Wirkung ist ganz die des innern Hüftbeinmuskels.

B. Muskeln an der hintern Fläche des Hüftgelenkes.

1. Großer Gefäßmuskel, musculus gluteus maximus (Taf. 11; 2₁. Taf. 12; 2₁. Taf. 15; 2₁). Lage:

Am Gefäß, unmittelbar unter der Haut.

Ansätze:

a) Der äußere Rand des hintern Theils des Hüftbeinfammes, die hintere Fläche des Heiligenbeins, der seitliche Rand des Steißbeins und das Sitzknorren-Heiligenbeinband.

b) Der äußere Schenkel der rauhen Linie des Oberschenkelknochens unter dem großen Rollhügel und die Oberschenkelbinde.

Wirkung:

Zieht den Oberschenkel nach rückwärts und aufwärts.

ttlerer Gefäßmuskel, *musculus glutaeus medius* (Taf. 11; 2_o. Taf. 12; 2_o).

der äußern Fläche des Darmbeins, theils von Haut, theils von dem großen Gefäßmuskel bedeckt.

Die äußere Fläche des Darmbeins, und zwar der vordere Theil des Muskels von dem äußern Rande des Darmbeinkammes, der hintere Theil von der Stelle der äußern Darmbeinfläche, welche zwischen dem Darmbeinkamm und der äußern halbkreisförmigen Linie liegt. Die äußere Fläche des großen Rollhügels des Oberschenkelknochens.

Die obere Fläche des großen Rollhügels des Oberschenkelknochens ab, der vordere Theil rollt auf denselben nach innen, wenn er zuvor nach außen rollt worden war.

Der kleine Gefäßmuskel, *musculus glutaeus minimus*.

Der Muskel hat in unsern Abbildungen nicht zur Anschauung gebracht werden können, man kann denselben, welcher sich unter dem mittlern Gefäßmuskel befindet, leicht aus seiner Lage vorstellen.

Die halbkreisförmige Linie der äußern Darmbeinfläche.

Die obere Fläche des großen Rollhügels des Oberschenkelknochens.

Der Muskel bedeckt den Oberschenkel und zieht ihn ab.

Pyramidenförmiger Muskel, *musculus pyriformis* (Taf. 12; 1_o, 2_o).

Unter dem großen Gefäßmuskel, in dem großen Schenkeleinschnitte.

Die vordere seitliche Fläche des Heiligenbeins. Der große Rollhügel des Oberschenkels unterhalb des kleinen Gefäßmuskels.

Der Muskel zieht den Schenkel nach außen.

Der obere Zwillingmuskel, *musculus gemellus superior* (Taf. 12; 2_o).

Der untere Rand des birnförmigen Muskels, vom kleinen Gefäßmuskel bedeckt.

Der Sitzbeinstachel.

Der Muskel vereinigt sich mit der Sehne des innern Hüftlochmuskels und setzt sich an die Rollhügelgrube.

Der Muskel zieht den Schenkel nach außen.

Der innere Hüftlochmuskel, *musculus obturator internus* (Taf. 12; 2_o).

Der hintere Rand der vordern Wand des kleinen Beckens.

Der innere Umfang des Hüftlochs und die innere Fläche des Hüftlochbandes.

Mit der Sehne des obern Zwillingmuskels vereinigt die Rollhügelgrube, indem der Muskel durch den kleinen Sitzbeineinschnitt aus dem Becken gelangt.

Der Muskel zieht den Schenkel nach außen.

7. Unterer Zwillingmuskel, *musculus gemellus inferior* (Taf. 12; 2_{io}).

Lage:

Am untern Rande der Sehne des innern Hüftlochmuskels.

Ansätze:

a) Die äußere Fläche des Sitzbeinnorrens.

b) Die Rollhügelgrube.

Wirkung:

Rollt den Schenkel nach außen.

8. Viereckiger Schenkelmuskel, *musculus quadratus femoris* (Taf. 12; 2_{ii}).

Lage:

Am untern Rande des untern Zwillingmuskels, zwischen Sitzbeinnorren und großem Rollhügel.

Ansätze:

a) Die äußere Fläche des Sitzbeinnorrens.

b) Die hintere Zwischenrollhügelinie.

Wirkung:

Rollt den Schenkel nach außen.

9. Neuerer Hüftlochmuskel, *musculus obturator externus* (Taf. 11; 2_{ii}).

Lage:

An der vordern Fläche der vordern Wand des kleinen Beckens.

Ansätze:

a) Der äußere Umfang des Hüftlochs.

b) Der unterste Theil der Rollhügelgrube

Wirkung:

Rollt den Schenkel nach außen.

C. Muskeln an der äußern Seite der Hüfte. Schenkelbindenspanner, *musculus tensor fasciae latae* (Taf. 10; 1_o, 2_o. Taf. 11; 1_o).

Lage:

An der obern äußern Seite des Oberschenkels.

Ansätze:

a) Der vordere obere Darmbeinstachel.

b) Befestigt sich an der breiten Schenkelbinde.

Wirkung:

Rollt den Schenkel nach innen, zieht ihn ab und spannt die Schenkelbinde.

Die breite Schenkelbinde, *fascia lata femoris* (Taf. 10; 1_o. Taf. 14; 1G, 2G), bildet eine sehnige Hülle für sämtliche Muskeln des Oberschenkels. Sie entspringt vom äußern Rande des Darmbeinkammes, geht am Kreuzbein in die Lendenrückenschädel über und setzt sich vorn und innen an die Nester des Scham- und Sitzbeins an. Sie bildet um die sämtlichen Muskeln des Oberschenkels eine Scheide und geht nach unten in die Unterschenkelbinde, *fascia cruris* (Taf. 14; 1H, 2H), über. Der vordere obere Abschnitt theilt sich in zwei Blätter. Das untere Blatt kleidet die Hüftkammgrube, *fossa iliopectinea*, aus und geht nach oben in die Hüftbeinmuskelfascie, *fascia iliaca* (Taf. 12; 2J) über. Das oberflächliche Blatt des vordern obern Theils der breiten Schenkelbinde legt sich über die großen Schenkelgefäße hinweg und hört unterhalb des Leistenbandes mit einem freien halbmondförmigen Rande, dem sichelförmigen Fortsatz der breiten Schenkelbinde, *processus falciformis fasciae latae*, auf, die halb-ovale Grube, *fossa semiovalis* (Taf. 10; 1P), umfassend, in deren Grunde man das tiefere Blatt des vordern obern Theils der breiten Schenkelbinde erblickt. Zwischen beiden Blättern verlaufen die großen Oberschenkelgefäße, die Schenkelpulsader und Schenkelblutader.

II. Muskeln am Oberschenkel.

A. Muskeln an der vordern Fläche des Oberschenkels.

1. Schneidermuskel, sartorius (Taf. 10; 1, 2, Taf. 11; 1, Taf. 14; 1, 2).

Lage:

Dicht unter der Haut, schräg von der äußern Seite der Hüfte zur innern Seite des Knies gehend. Der Muskel ist dabei in einer besondern Scheide der breiten Schenkelbinde eingehüllt (Taf. 10; 1).

Anfänge:

- a) Der vordere obere Darmbeinstachel.
- b) Die innere Fläche des obern Endes des Schienbeins, nach innen, neben dem Schienbeinhöcker.

Wirkung:

Beugt den Unterschenkel und dreht denselben, wenn er bereits gebogen ist, um seine Längsachse nach innen, auch kann er bei fixirter unterer Extremität das Becken gegen den Schenkel neigen.

2. Gemeinschaftlicher Unterschenkelstrecker, musculus extensor cruris quadriceps. Derselbe besteht aus vier Theilen, dem geraden Oberschenkelmuskel, musculus rectus femoris (Taf. 10; 2, Taf. 11; 1, 2, Taf. 14; 1, 2), dem äußern großen Schenkelmuskel, musculus vastus externus (Taf. 10; 2, Taf. 11; 1, 2, Taf. 12; 2, Taf. 14; 1, 2, Taf. 15; 2), dem innern großen Schenkelmuskel, musculus vastus internus (Taf. 11; 2, Taf. 14; 1, 2), und dem Schenkelbeinmuskel, musculus cruralis (Taf. 10; 1, Taf. 11; 1, Taf. 14; 2).

Lage:

Unter der Haut an der vordern äußern und innern Oberschenkelfläche, und zwar der gerade Oberschenkelmuskel an der vordern Seite zu oberst, der Schenkelbeinmuskel, an der vordern Seite des Oberschenkelknochens und etwas nach außen, unter dem geraden Oberschenkelmuskel der äußere große Schenkelmuskel an der äußern Seite des Schenkelbeinmuskels, und der innere große Schenkelmuskel an der innern Seite des Schenkelbeinmuskels. Sämmtliche vier Muskeln vereinigen sich in einer Sehne, welche sich an die Knie Scheibe ansetzt, und als Knie Scheibenband, ligamentum patellae (Taf. 14; 2), zum Schienbeinhöcker fortsetzt.

Anfänge:

1. des geraden Oberschenkelmuskels:
 - a) der vordere untere Darmbeinstachel,
 - b) die Knie Scheibe und der Schienbeinhöcker;
2. des Schenkelbeinmuskels:
 - a) die vordere Zwischenrollhügel Linie und die vordere Fläche des Oberschenkelknochens,
 - b) die Knie Scheibe und der Schienbeinhöcker;
3. des äußern großen Schenkelmuskels:
 - a) der äußere Schenkel der rauhen Linie des Oberschenkelknochens hinauf bis zum großen Rollhügel,
 - b) die Knie Scheibe und der Schienbeinhöcker;
4. des innern großen Schenkelmuskels:
 - a) der innere Schenkel der rauhen Linie des Oberschenkelknochens,
 - b) die Knie Scheibe und der Schienbeinhöcker.

Wirkung:

Sämmtliche vier Muskeln strecken den Unterschenkel, der gerade Schenkelmuskel allein kann aber auch den Oberschenkel und das Becken gegen einander bewegen.

B. Muskeln an der innern Seite des Schenkels.

1. Schlanter Schenkelmuskel, musculus adductor longus (Taf. 10; 2, Taf. 11; 1, 2, Taf. 12; 2, 1, 2, Taf. 15; 2).

Lage:

An der innern Seite des Oberschenkels, besondern Scheide der breiten Schenkelbinde.

Anfänge:

- a) Der absteigende Ast des Schambeins aufsteigende Ast des Sitzbeins.
- b) Die Sehne verläuft mit der des adductor longus und setzt sich an die innere Fläche des obern Endes des Schienbeins neben den Schienbeinhöcker.

Wirkung:

Beugt den Unterschenkel und nähert ihn einander, auch dreht er den Unterschenkel um seine Längsachse nach innen.

2. Langer Zuzieher des Beins, musculus adductor longus (Taf. 10; 2, Taf. 11; 2, Taf. 14; 1, 2).

Lage:

An der innern Seite des Oberschenkels, drei Zuziehern des Beins am weitesten.

Anfänge:

- a) Der absteigende Ast des Schambeins Schambeinsymphyse.
- b) Das mittlere Drittel der rauhen Linie des innern großen Schenkelmuskels.

Wirkung:

Abducirt den Schenkel und hebt denselben nach vorn in die Höhe.

3. Kurzer Zuzieher des Beins, musculus adductor brevis (Taf. 11; 2).

Lage:

Hinter dem langen Zuzieher des Beins.

Anfänge:

- a) Der absteigende Ast des Schambeins
- b) Der innere Schenkel der rauhen Linie des Oberschenkels über dem Ansatze des Zuziehers des Beins.

Wirkung:

Abducirt den Schenkel.

4. Großer Zuzieher des Beins, musculus adductor magnus (Taf. 11; 2, Taf. 12; 2, Taf. 15; 1, 2).

Lage:

An der innern Seite des Oberschenkels, Knie herabsteigend, hinter dem langen Zuzieher des Beins.

Anfänge:

- a) Der absteigende Ast des Schambeins aufsteigende Ast des Sitzbeins
- b) Die ganze Länge der rauhen Linie des Schenkelknochens vom kleinen Rollhügel innern Gelenkfortsatz des Oberschenkels.

Wirkung:

Abducirt den Schenkel.

5. Rammmuskel, musculus pectineus (Taf. 11; 1, 2, Taf. 14; 1, 2).

Lage:

Am obern innern Theile der vordern Fläche, zwischen Hüftbeinendenmuskel und Zuzieher des Beins.

Anfänge:

- a) Der Ramm des horizontalen Schambeins.

Der innere Schenkel der rauhen Oberschenkel-
linie, unmittelbar unter dem kleinen Kollhügel
(Taf. 15; 1₄).

g: Beugt den Schenkel und hebt ihn nach vorn
die Höhe.

steln an der hintern Fläche des Ober-
schenfels.

seitköpfiger Schenkelmuskel, *musculus*
s. femoris (Taf. 12; 2₁₀, Taf. 15; 1₁, 2₁).

äußern Rande der hintern Fläche des Ober-
schenfels.

g: Der lange Kopf, *caput longum musculi*
bicipitis femoris (Taf. 15; 2₁'), am Sitzbein-
knorren, der kurze Kopf, *caput breve*
(Taf. 15; 2₂'), am äußern Schenkel der rauhen
Oberschenkelinie.

Das Köpfchen des Wadenbeins.

g: Beugt den Unterschenkel und dreht ihn nach außen
seine Längsachse, wenn das Knie gebogen ist,
zieht den Oberschenkel nach rückwärts, auch
setzt er den gebogenen Rumpf auf den Schenkel-
füßen auf, wenn die untern Extremitäten un-
beglückt sind.

sehniger Muskel, *musculus semitendinosus*
(Taf. 12, 2₁₆, Taf. 15; 2₁).

der innern Seite der hintern Fläche des
Oberschenfels.

g: Der Sitzbeinknorren.

Die innere Fläche des obern Endes des Schien-
beins.

g: Beugt den Unterschenkel und dreht ihn etwas
nach innen, auch kann er den gebogenen Rumpf
den Schenkelköpfen aufrichten, wenn die untern
Extremitäten fixirt sind.

häutiger Muskel, *musculus semimem-
branosus* (Taf. 13; 2₁₇, Taf. 15; 1₂, 2₆).

der hintern innern Seite des Oberschenfels.

g: Der Sitzbeinknorren.

Der innere Gelenknorren des Schienbeins.

g: Beugt den Unterschenkel und richtet den gebogenen
Rumpf auf den Schenkelköpfen auf, wenn die
untern Extremitäten fixirt sind.

III. Muskeln am Unterschenkel.

steln an der vordern Fläche des Unter-
schenfels.

erer Schienbeinmuskel, *musculus tibialis*
anticus (Taf. 14; 1₁, 2₁).

der äußern Fläche des Schienbeins unter der
Haut.

g: Der obere Theil der äußern Fläche des Schien-
beins, das Unterschenkelknochenzwischenband und
der obere Theil der Unterschenkelhäute.

Der innere Rand des ersten Keilbeinknochens
der Fußwurzel und die Basis des ersten
Mittelfußknochens.

Wirkung:

Beugt den Fuß im Fußgelenk und dreht denselben
zugleich um dessen Längsachse, sodas die Fuß-
sohle auch einwärts gewendet wird. Steht der
Fuß fest, so kann er den Unterschenkel nach vor-
wärts und einwärts bewegen.

2. Gemeinshaftlicher langer Streckmuskel
der Zehen, *musculus extensor digitorum communis*
longus (Taf. 14; 3₂, 4₂).

Lage:

An der äußern Seite des vordern Schienbein-
muskels.

Ansätze:

- a) Der obere Theil der vordern äußern Fläche
des Schienbeins und das Zwischenknochen-
band des Unterschenfels, sowie das Köpfchen
und die vordere Kante des Wadenbeins und
der obere Theil der Unterschenkelhäute.
- b) Der Muskel theilt sich in vier Sehnen, von denen
jede in drei Schenkel endigt, von denen der mitt-
lere an die Rückenfläche der Basis des zweiten
Gliedes der vier letzten Zehen geht, während die
beiden seitlichen an die Rückenfläche der Basis
des dritten Gliedes derselben sich ansetzen.

Wirkung:

Streckt die zweite bis fünfte Zehe.

3. Dritter Wadenbeinmuskel, *musculus pe-
roneus tertius* (Taf. 14; 1₃).

Lage:

An der äußern Seite des gemeinschaftlichen langen
Zehenstreckers.

Ansätze:

- a) Die untere Hälfte der vordern innern Fläche
des Wadenbeins,
- b) Die Rückenfläche der Basis des fünften Mittel-
fußknochens.

Wirkung:

Beugt den Fuß, und dreht die Fußsohle, wenn
sie nach einwärts gewendet war, wieder nach unten.

4. Langer Streckmuskel der großen Zehe,
musculus extensor hallucis longus (Taf. 14; 3₂, 4₂).

Lage:

Unter und zwischen dem vordern Schienbeinmuskel
und dem gemeinschaftlichen langen Zehenstreckers.

Ansätze:

- a) Die vordere innere Fläche des Wadenbeins
und das Unterschenkelzwischenknochenband.
- b) Die Dorsalfläche des zweiten Gliedes der
großen Zehe.

Wirkung:

Streckt das zweite Glied der großen Zehe.

B. Muskeln an der äußern Fläche des Unter-
schenfels.

1. Langer Wadenbeinmuskel, *musculus pe-
roneus longus* (Taf. 14; 3₇, 4₆, Taf. 15; 3₁, 4₁).

Lage:

Am äußern Rande des Unterschenfels längs des
Wadenbeins.

Ansätze:

- a) Das Köpfchen und die obern drei Viertel des
Wadenbeins.
- b) Die Sehne läuft in einer Scheide um den
äußern Knöchel herum, durch die Rinne des
Würfelbeins und setzt sich an die Plantar-
fläche des ersten Mittelfußknochens und an
das erste Keilbein der Fußwurzel.

Wirkung:

Streckt den Fuß und dreht die Fußsohle, wenn
sie nach innen gekehrt war, nach außen.

2. Kurzer Wadenbeinmuskel, *musculus peroneus brevis* (Taf. 14; 3_o, 4_o. Taf. 15; 3_o, 4_o).

Lage:

Hinter dem langen Wadenbeinmuskel an der äußern Fläche des Wadenbeins.

Ansätze:

- a) Die zwei untern Drittel der äußern Fläche des Wadenbeins.
- b) Die äußere Fläche des Höders des fünften Mittelfußknochens.

Wirkung:

Streckt den Fuß und abducirt ihn.

C. Muskeln an der hintern Fläche des Unterschenkels.

a. Oberflächliche Lage.

1. Zweiköpfiger Wadenmuskel, *musculus gastrocnemius* (Taf. 14; 3_o, 4_o. Taf. 15; 2_o).

Lage:

Unmittelbar unter der Haut der Wade, mit seinen beiden Köpfen die Kniekehle nach unten begrenzend.

Ansätze:

- a) Der äußere Kopf, *caput externum*, am äußern Gelenkfortsatz des Oberschenkelknochens. Der innere Kopf, *caput internum*, am innern Gelenkfortsatz des Oberschenkelknochens.
- b) Beide Köpfe vereinigen sich zu einem gemeinschaftlichen Bauch, welcher in die Achillessehne, *tendo Achillis* (Taf. 15; 4_o), übergeht, welche sich an den Fersebeinhöcker ansetzt.

Wirkung:

Streckt den Fuß.

2. Schollenmuskel, *musculus soleus* (Taf. 14; 3_{io}, 4_o. Taf. 15; 2_{io}).

Lage:

An der Wade unter dem zweiköpfigen Wadenmuskel.

Ansätze:

- a) Das Köpfchen des Wadenbeins an seinem hintern Theile und die hintere Fläche des Schienbeins.
- b) Geht mit dem zweiköpfigen Wadenmuskel in die Achillessehne über und mit dieser zum Höcker des Fersebeins.

Wirkung:

Streckt den Fuß.

3. Langer Sohlenmuskel, *musculus plantaris* (Taf. 15; 2_o).

Lage:

Mit seinem kleinen schmalen Bauche zwischen dem zweiköpfigen Wadenmuskel und dem Schollenmuskel. Die lange Sehne geht an die innere Seite der Achillessehne.

Ansätze:

- a) Der innere Gelenkfortsatz des Oberschenkelknochens und die Kniegelenkapsel.
- b) Mit der Achillessehne an dem Fersebeinhöcker und an der Kapsel des Sprunggelenks.

Wirkung:

Hilft den Fuß mit strecken und spannt dabei die Kapselmembran des Sprunggelenks.

b. Tiefe Lage.

1. Kniekehlenmuskel, *musculus popliteus* (Taf. 15; 2_{io}, 4_o).

Lage:

Unter den Wadenmuskeln in der Kniekehle.

Ansätze:

- a) Der äußere Gelenkfortsatz des Oberschenkelknochens und der hintere Rand des äußern Zwischenknorpels des Kniegelenks.

- b) Die linea obliqua an der hintern Fläche des Schienbeins und die äußere, hintere Kante desselben.

Wirkung:

Hilft das Knie beugen und spannt dabei die Kniegelenkapsel.

2. Hinterer Schienbeinmuskel, *musculus tibialis posterior* (Taf. 15; 4_o).

Lage:

Schief hinter den Ausstreckmuskeln des Fußes.

Ansätze:

- a) Die hintere Fläche des Schienbeins, der innere Winkel des Wadenbeins und das Zwischenknorpelband des Unterschenkels.
- b) Geht in einer besondern Scheide um den innern Knöchel herum an den innern Rand des Kalkaneushöders und an das erste und zweite Mittelfußbein der Fußwurzel.

Wirkung:

Streckt den Fuß und kehrt die Fußsohle nach innen, hilft auch bei der Adduction des Fußes.

3. Gemeinschaftlicher langer, ober durchbohrender Beugemuskel der Zehen, *musculus flexor digitorum pedis communis longus* oder *perforans* (Taf. 15; 4_o).

Lage:

Bedeckt von dem Schollenmuskel und einem Theile des hintern Schienbeinmuskels.

Ansätze:

- a) Die hintere Fläche des Schienbeins und das Zwischenknorpelband des Unterschenkels.
- b) Die Sehne geht hinter dem innern Knöchel über die des hintern Schienbeinmuskels hinweg zur Fußsohle und spaltet sich dazwischen in vier Theile, welche an die Fußsohlen der vier ersten Zehen gehen, indem dieselben die Sehnen des gemeinschaftlichen kurzen Beugers der Zehen durchbohren (Taf. 15; 5_o). Die Sehnen dieser Beuger liegen in einer gemeinsamen Scheide (Taf. 15; 5_F und 5_F).

Wirkung:

Beugt das dritte Glied der zweiten bis fünften Zehe.

4. Langer Beuger der großen Zehe, *musculus flexor hallucis longus* (Taf. 15; 4_o).

Lage:

Zwischen den Wadenbeinmuskeln und den beiden vorigen Muskeln.

Ansätze:

- a) Die hintere Fläche und äußere Kante des Wadenbeins in deren zwei untern Dritteln.
- b) Die Sehne geht durch eine Furche an der hintern Fläche des Sprunggelenks zur Fußsohle und setzt sich an die Fußsohlenfläche der Basis des zweiten Gliedes der großen Zehe (Taf. 15; 5_o).

Wirkung:

Beugt das zweite Glied der großen Zehe.

IV. Muskeln am Fuße.

A. Muskeln auf dem Rücken des Fußes.

1. Gemeinschaftlicher kurzer Streckmuskel der Zehen, *musculus extensor digitorum pedis communis brevis* (Taf. 14; 3_o, 4_o).

Lage:

Auf dem Rücken des Fußes unter den Sehnen des gemeinschaftlichen langen Zehenstreckers.

Die äußere obere Fläche des vordern Fortsatzes des Ferseubeins.

Der Muskel spaltet sich in drei, seltener vier Theile, deren drei oder vier Sehnen sich an den äußern Rand der entsprechenden drei oder vier Sehnen des gemeinschaftlichen langen Zehenstreckers setzen und an das erste Glied der zweiten bis vierten Zehe und bei vier Sehnen auch der fünften Zehe gehen.

g: Erkt die zweite bis vierte und zuweilen auch fünfte Zehe.

er Strecker der großen Zehe, *musculus extensor hallucis brevis* (Taf. 14; 3₆, 4₆).

innern Rande des gemeinschaftlichen kurzen Streckers.

Der vordere untere Theil des Wadenbeins und das untere Schienbein-Wadenbeinband. Die Sehne setzt sich an den äußern Rand des langen Streckers der großen Zehe und geht zur Dorsalfläche derselben.

g: Erkt die große Zehe.

Äußere oder Rücken-Zwischenknochenmuskeln des Fußes, *musculi interossei pedis externi* (Taf. 14; 3₁₂, 4₁₁. Taf. 15; 3₂, 5₁₁), vier Stück.

den Zwischenräumen der sämmtlichen Mittelknochen nach dem Rücken des Fußes zu.

Die entspringen mit je zwei Köpfen von den einander zugekehrten Rändern des Mittelfußknochens.

Der erste und zweite äußere Zwischenknochenmuskeln setzen sich an die Tibial- und Fibularseite, d. h. an die innere und äußere Seite des ersten Gliedes der zweiten Zehe, der dritte und vierte äußere Zwischenknochenmuskel an die Fibularseite des ersten Gliedes der dritten und vierten Zehe.

g: Den sämmtliche äußere Zwischenknochenmuskeln gleichzeitig, so wird die zweite Zehe fixirt und dritte und vierte nach der Fibularseite abgelenkt, ein Gleiches geschieht auch mit der ersten Zehe, wenn der erste äußere Zwischenknochen nicht wirkt, wol aber der zweite.

Muskeln am innern Fußrande.

Beuger der großen Zehe, *musculus abductor hallucis* (Taf. 14; 3₁₁, 4₁₀. Taf. 15; 5₂).

Tibialrande der Fußsohle, neben dem kurzen Beuger der großen Zehe.

Die innere Fläche des Ferseubeinhöders und das Ferseubein-Kahnbeinband, sowie die innere Fläche des ersten Keilbeins der Fußwurzel.

Das innere Sesambeinchen und der innere Höder an der Basis des ersten Gliedes der großen Zehe.

g: Erkt die große Zehe von der zweiten ab.

Taf. 2. Aufl. — Anatomie.

2. Kurzer Beuger der großen Zehe, *musculus flexor brevis hallucis* (Taf. 15; 5₃).

Lage:

An der äußern Seite, das heißt an der Fibularseite des Abziehers der großen Zehe.

Ansätze:

a) Das erste und zweite Keilbein der Fußwurzel und die Bänder in deren Gegend.

b) Theilt sich in zwei Portionen, zwischen welchen die Sehne des langen Beugers der großen Zehe hindurchtritt und die sich an die beiden Sesambeine der großen Zehe ansetzen.

Wirkung:

Beugt das erste Glied der großen Zehe.

C. Muskeln am äußern Fußrande.

1. Abzieher der kleinen Zehe, *musculus abductor digiti minimi pedis* (Taf. 14; 4₁₂. Taf. 13; 5₄).

Lage:

Am äußern Fußsohlenrand.

Ansätze:

a) Die äußere Fläche des Ferseubeinhöders.

b) Der Höder der Basis des fünften Mittelfußknochens und die äußere Seite der Basis des ersten Gliedes der fünften Zehe.

Wirkung:

Zieht die kleine Zehe nach außen.

2. Kurzer Beuger der kleinen Zehe, *musculus flexor brevis digiti minimi pedis* (Taf. 15; 5₆).

Lage:

Am vordern Theile des äußern Fußsohlenrandes.

Ansätze:

a) Die untere innere Seite der Basis des fünften Mittelfußknochens und das Ferseubein-Würfelbeinband.

b) Die Fußsohlenfläche der Basis des ersten Gliedes der fünften Zehe.

Wirkung:

Beugt das erste Glied der fünften Zehe.

D. Muskeln in der Fußsohle.

1. Gemeinschaftlicher kurzer oder durchbohrter Beuger der Zehen, *musculus flexor digitorum pedis communis brevis oder perforatus* (Taf. 15; 5₁ und 5₁).

Lage:

In der Mitte der Fußsohle unmittelbar unter der Haut.

Ansätze:

a) Die untere Fläche des Ferseubeinhöders und die Fußsohlenaponeurose.

b) Der Muskel theilt sich in vier Portionen, deren vier Sehnen sich in der Gegend des ersten Zehengliedes einer jeden der vier letzten Zehen spaltet, um die betreffende Sehne des langen gemeinschaftlichen Beugers der Zehen hindurchzulassen, und sich dann an die Fußsohlenfläche des zweiten Gliedes derselben Zehen ansetzt.

Wirkung:

Beugt das zweite Glied der zweiten bis fünften Zehe.

2. Viereckiger Fußsohlenmuskel, *musculus quadratus plantae oder caro quadrata Sylvii* (Taf. 15; 5₇).

Lage:

Bedeckt vom gemeinschaftlichen kurzen Beuger der Zehen.

Ansätze:

a) Die untere Fläche des Ferseubeins und das Ferseubein-Würfelbeinband.

b) Der äußere Rand der Sehne des gemeinschaftlichen langen Zehenbeugers.

Wirkung:

Da die Sehne des gemeinschaftlichen langen Zehenbeugers wegen ihrer Lage die Zehen in schiefer Richtung nach innen beugen würde, so wird dieselbe vom dem viereckigen Fußhöhlenmuskel, der gleichsam ein zweiter Kopf des gemeinschaftlichen langen Zehenbeugers ist, nach außen gezogen, wobei die Zehen zugleich mit gebogen werden, und zwar wenn beide Muskeln gleichzeitig wirken in gerader Richtung.

3. Spulwurmmuskeln, *musculi lumbricales pedis* (Taf. 15; 5a), vier Stück.

Lage:

Bedeckt vom gemeinschaftlichen kurzen Benger der Zehen.

Anfänge:

- a) Die Tibialränder der vier Sehnen des gemeinschaftlichen langen Zehenbeugers.
- b) Die Tibialseite der Basis des ersten Gliedes der zweiten bis fünften Zehe.

Wirkung:

Beugen das erste Glied der zweiten bis fünften Zehe.

4. Zuzieher der großen Zehe, *musculus adductor hallucis*. Derselbe hat nicht sichtbar gemacht werden können, doch kann man sich ihn leicht aus der Lage vorstellen. Er besteht aus zwei Köpfen.

Lage:

Zu der Tiefe der Fußsohle, dicht an den Mittelfußknochen.

Anfänge:

- a) Der lange Kopf, *caput longum*, entspringt von der Fußsohlenfläche des zweiten und dritten Mittelbeins der Fußwurzel, vom dritten Mittelfußknochen und vom Ferseubein-Würfelbeinband. Der kurze Kopf, *caput breve*, auch transversalis pedis genannt, setzt sich an die Fußsohlenfläche des vierten Mittelfußknochens.
- b) Beide Köpfe gehen vereinigt an das gegen die zweite Zehe gelegene Schaambein und die Basis des ersten Gliedes der großen Zehe.

Wirkung:

Er zieht die große Zehe gegen die zweite hin.

5. Innere Zwischenknochenmuskeln des Fußes, *musculi interossei pedis interni* oder *plantares* (Taf. 15; 5₁₀), drei Stück.

Lage:

In den drei Zwischenräumen zwischen dem zweiten bis fünften Mittelfußknochen nach der Fußsohle zu.

Anfänge:

- a) Die Großzehenseite des dritten, vierten und fünften Mittelfußknochens.
- b) Dieselbe Seite des ersten Gliedes der drei letzten Zehen.

Wirkung:

Sie ziehen die drei letzten Zehen gegen die zweite Zehe hin.

Blutgefäße.

I. Pulsadern.

Die Schentelpulsader, *arteria cruralis* (Taf. 14; 2a, Taf. 15; 1a), ist die Fortsetzung der äußeren Hüftpulsader, *arteria iliaca externa*. Den Ursprung und ersten Verlauf haben wir bereits auf S. 109 betrachtet. Es erübrigt hier nur noch die Fortsetzung, soweit sie auf Taf. 14 und 15 zur Anschauung gelangt, zu erläutern.

So lange die Schentelpulsader am Oberknie verläuft, heißt sie auch Oberkniepulsader, *arteria femoralis* (Taf. 14; 2a, Taf. 15; 1a). Sie gelangt über die Mitte des horizontalen Schaambeinbogens hinweg aus der Beinhöhle zum Oberknie, an dem sie sich immer mehr nach innen wendet, und zu Anfang des letzten Viertels desselben die Sehne des großen Zuziehers des Beins durchbohrt, um in die Kniekehle zu gelangen. Auf unsern beiden Tafeln gibt sie folgende Zweige ab:

1. Die tiefe Schentelpulsader, *arteria profunda femoris* (Taf. 14; 2a, Taf. 15; 1a). Dieselbe gibt wieder ab:

a) die äußere Kranzpulsader des Oberkniegelenks, *arteria circumflexa femoris externa*, siehe S. 108, von welcher sich wiederum abzweigt:

der absteigende Ast, *ramus descendens arteriae circumflexae femoris externae* (Taf. 15; 1e),

b) die durchbohrenden Pulsadern, *rami perforantes arteriae profundae femoris*, und zwar eine

erste durchbohrende Pulsader, *arteria perforans prima* (Taf. 15; 1d, 2a),

zweite durchbohrende Pulsader, *arteria perforans secunda* (Taf. 15; 1e, 2b),

dritte durchbohrende Pulsader, *arteria perforans tertia* (Taf. 15; 1f, 2c), aus welcher

die große Nährpulsader des Oberkniegelenks, *arteria nutritia n. ossis femoris* (Taf. 15; 1g, 2o), entspringt.

2. Muskelzweige, *rami musculares* (Taf. 14; 2a, Taf. 15; 1h).

3. Die oberflächliche Kniegelenkpulsader, *arteria articularis genu superficialis* (Taf. 15; 1i), welche in das Kniegelenk knet, *rete articulare genu*, übergeht.

Die Kniekehlenpulsader, *arteria poplitea* (Taf. 15; 1k, 2e), wird die Fortsetzung der Schentelpulsader in der Kniekehle von deren Durchtritt durch den großen Zuzieher des Beins bis zum obern Ärmel des Unterarmes, wo sie sich unter dem Schollenmuskel in die vordere und hintere Schienbeinpulsader spaltet. Sie gibt folgende Zweige ab:

1. die obere äußere Kniegelenkpulsader, *arteria articularis genu superior externa* (Taf. 15; 2f, Taf. 15; 1m, 2f);

2. die obere innere Kniegelenkpulsader, *arteria articularis genu superior interna* (Taf. 15; 1n, 2g);

3. die untere äußere Kniegelenkpulsader, *arteria articularis genu inferior externa* (Taf. 15; 1q, 2h, 4b), welche sich um den äußern Gelenkstrich des Schienbeins nach außen und vorn oberhalb des Wadenbeinköpfchens herum schlägt und zur Bildung des Kniegelenkknies, *rete articulare genu*, beiträgt;

4. die untere innere Kniegelenkpulsader, *arteria articularis genu inferior interna* (Taf. 15; 1r, 2i, 4b);

5. die Muskelzweige der Kniekehle, *rami musculares popliteae* (Taf. 15; 1e);

6. die mittlere Kniegelenkpulsader, *arteria articularis genu media* oder *azyga* (Taf. 15; 1o), welche auch zuweilen als mittlere obere Kniegelenkpulsader, *arteria articularis genu superior media*, aus der obern äußern Kniegelenkpulsader oder als mittlere untere Kniegelenkpulsader

articularis genu inferior media, aus der untern Kniegelenkspulsader entspringt;

die Wadenmuskelpulsadern, arteriae surales rami gastrocnemii (Taf. 15; 1p, 3r), vier bis Stück, welche zum zweiföpfigen Wadenmuskel, Schollenmuskel und langen Sohlenmuskel gehen. Die Kniekehlenpulsader, arteria poplitea, theilt in die:

Vordere Schienbeinpulsader, arteria tibialis a (Taf. 14; 3a. Taf. 15; 1s, 2k, 3a, 4c). Dieselbe liegt zwischen dem obern Ende des Schienbeins und den Knöcheln über dem obern Rande des Zwischenbändes des Unterschenkels hindurch zur vordern Seite des Unterschenkels, an welchem sie zum Fuß hin herabläuft. Sie gibt folgende Zweige ab:

- a) die zurüchlaufende Schienbeinpulsader, arteria recurrens tibialis (Taf. 15; 1f, 3c);
- b) die vordere äußere Knöchelpulsader, arteria malleolaris anterior externa (Taf. 15; 3d);
- c) die vordere innere Knöchelpulsader, arteria malleolaris anterior interna (Taf. 15; 3e).

Der Stamm geht dann als Rückenpulsader des Fußes, arteria dorsalis pedis oder pedicaea (Taf. 14, 3b. 15; 3h), weiter und gibt die:

- a) äußere Fußwurzelpulsader, arteria tarsae externa (Taf. 15; 3f);
- b) innere Fußwurzelpulsader, arteria tarsae interna (Taf. 15; 3g);
- c) äußere Mittelfußpulsader, arteria metatarsae externa (Taf. 15; 3h);
- d) innere Mittelfußpulsader, arteria metatarsae interna (Taf. 15; 3i);

e) den Fußrückenbogen, arcus dorsalis pedis (Taf. 15; 3i), welcher auf dem Rahubein seinen Anfang nimmt, bogenförmig mit der Convergenz gegen die Zehe gerichtet nach außen läuft und durch einen Zweig mit der äußeren Fußwurzelpulsader in Verbindung tritt. Aus dem Bogen gehen die Zwischenknochenpulsadern des Fußrückens, arteriae interosae dorsales pedis (Taf. 15; 3k), hervor; drei Stück, welche auf dem Rücken in den Zwischenräumen der Mittelfußknochen der zweiten bis fünften Zehe verlaufen und am Körper der derselben sich gabelförmig in zwei Zweige spalten, die als Rückenpulsadern der Zehenglieder, arteriae digitales dorsales, sich an den einander zusehenden Rändern zweier Zehen bis zur Zehenspitze verbreitern. Die Fortsetzung der Fußrückenpulsadern bildet die Fußknöchelpulsader der großen Zehe, oder erste Zwischenknochenpulsader des Fußrückens, arteria dorsalis hallucis oder interosae dorsalis prima (Taf. 15; 3k'), welche einen

- a) innern Zweig, ramus internus dorsalis hallucis, für den innern oder Tibialrand des Rückens der großen Zehe, einen
- b) äußern Zweig, ramus dorsalis hallucis externus, für den äußern oder Fibularrand der großen Zehe, einen
- c) innern Rückenzweig für die zweite Zehe, ramus dorsalis digiti secundi internus, und einen
- d) tiefen oder Fußsohlenzweig, ramus profundus oder plantaris profundus (Taf. 15; 3k''), den Endast der Fußrückenpulsader, welcher zwischen dem ersten und zweiten Mittelfußknochen in die Fußsohle dringt und daselbst zum tiefen

Fußsohlenbogen, arcus plantaris profundus, tritt, abgibt.

2. Hintere Schienbeinpulsader, arteria tibialis postica (Taf. 15; 1u, 2b, 3b). Dieselbe ist die Fortsetzung der Kniekehlenpulsader. Sie steigt an der hintern Fläche des Unterschenkels herab zum innern Knöchel, um welchen sie sich herum biegt und an der innern Fläche des Ferseubeins zur Fußsohle gelangt, wo sie sich in die innere und äußere Fußsohlenpulsader spaltet. Sie gibt ab die:

- a) obere Nährpulsader des Schienbeins, arteria nutritia tibiae superior (Taf. 15; 4d);
- b) gemeinschaftliche Wadenbeinpulsader, arteria peronea oder fibularis communis (Taf. 15; 2m, 3m, 4g), welche an der innern hintern Fläche des Wadenbeins herabläuft und im untern Drittel des Unterschenkels sich in eine:
 - a) vordere oder durchbohrende Wadenbeinpulsader, arteria peronea anterior oder perforans (Taf. 15; 3m'), und in eine:
 - β) hintere Wadenbeinpulsader, arteria peronea posterior (Taf. 15; 3m'', 4h), spaltet, welche die hintere äußere Knöchelpulsader, arteria malleolaris posterior externa (Taf. 15; 3o, 4e'), abgibt;
- c) hintere innere Fußknöchelpulsader, arteria malleolaris posterior interna (Taf. 15; 3k, 4e);
- d) Zweige zur innern Seite des Ferseubeins, rami calcanei interni (Taf. 15; 4f).

Die hintere Schienbeinpulsader theilt sich endlich in der Fußsohle in die

- a) innere Fußsohlenpulsader, arteria plantaris interna (Taf. 15; 3p, 5f), welche am innern Rande der Fußsohle nach vorwärts läuft und als innere Fußsohlenpulsader der großen Zehe, arteria plantaris interna hallucis (Taf. 15; 5g), endigt, sowie in die
- b) äußere Fußsohlenpulsader, arteria plantaris externa (Taf. 15; 3q, 5a). Dieselbe begibt sich zum äußern Rande der Fußsohle, an welchem sie entlang nach vorn läuft, um sich dann bogenförmig nach innen zu biegen, wo sie, auf dem Mittelfußknochen aufliegend, mit dem tiefen Fußsohlenaste aus der Fußrückenpulsader den tiefen Fußsohlenbogen, arcus plantaris profundus, bildet. Sie gibt folgende Zweige ab:
 - a) Muskelläste, rami musculares (Taf. 15; 5h);
 - β) einen oberflächlichen Ast, ramus superficialis (Taf. 15; 5c), welcher mit Zweigen der innern Fußsohlenpulsader in Verbindung tritt und den oberflächlichen Fußsohlenbogen, arcus plantaris sublimis, welcher zwischen der Fußsohlenfaszie und den gemeinschaftlichen Beugern der Zehen liegt, bildet;
 - γ) einen tiefen Ast, ramus profundus (Taf. 15; 5d), welcher auf den Mittelfußknochen aufliegend, wie schon erwähnt den tiefen Fußsohlenbogen, arcus plantaris profundus, bildet, aus welchem vier Zwischenknochenpulsadern für die Fußsohle, arteriae interosae plantares oder digitales communes (Taf.

15; 5e), entspringen, welche auf der Fußsohlenseite in den Zwischenräumen zwischen den Mittelfußknöcheln verlaufen und am ersten Gliede der Zehen sich gabelförmig in zwei Zweige spalten, die an den einander zugekehrten Rändern der Zehen, als innere und äußere Pulsader der Fußsohlenseite der Zehen, *arteria digitalis plantaris interna* und *externa* (Taf. 15; 5e'), bis zur Zehenspitze verlaufen.

II. Blutadern.

Die Blutadern der untern Extremität begleiten zummeist die Pulsadern und nehmen den entsprechenden Namen an. Sie sind entweder tiefe Blutadern, *venae profundae*, wie die tiefen Unterschenkelblutadern, *venae profundae cruris* (Taf. 14; 3c), oder Hautvenen, *venae subcutaneae*, wie die Unterschenkelblutader des Oberschenkels, *vena subcutanea femoris* (Taf. 14; 1b, 2f), und die große Knieader, *vena saphena magna* oder *interna* (Taf. 14; 1a, 2e), welche am innern Fußrande beginnt und an der innern Seite des Unter- und Oberschenkels in die Höhe läuft, um sich in der halbovalen Grube, *fossa semiovalis*, in die Schenkelblutader zu ergießen.

Nerven.

Der Schenkelnerv, *nervus cruralis*, nimmt seinen Ursprung aus dem Lendengeflecht und gibt folgende Hauptzweige ab:

1. den kleinen Knieennerv, *nervus saphenus minor* oder *cutaneus femoris internus* (Taf. 14; 1z, 2z);
2. den mittlern vordern Hautnerv, *nervus cutaneus femoris anterior medius* (Taf. 14; 2β);
3. den großen Knieennerv, *nervus saphenus major* (Taf. 14; 2γ, 4z), welcher sich in einen
 - a) kleinen Zweig, *ramus minor nervi sapheni majoris* (Taf. 14; 2γ'), und in einen
 - b) großen Zweig, *ramus major*, die Fortsetzung des Stammes, theilt.
4. Muskelzweige, *rami musculares* (Taf. 14; 2δ), und den

5. Muskelhautast, *ramus musculo cutaneus* (Taf. 14; 2ε).

Der Hüftnerv, *nervus ischiadicus* (Taf. 15; 2x), auch innerer Kniekehlnerv, *nervus popliteus internus*, genannt, nimmt seinen Ursprung aus dem Kreuzbeingeflecht und läuft an der hintern Fläche des Oberschenkels herab, Zweige zu den benachbarten Muskeln, *rami musculares* (Taf. 15; 2β), abgebend, sowie einen Zweig zum hintern Hautnerven des Oberschenkels, *ramus ad nervum cutaneum femoris posteriorem* (Taf. 15; 2γ); in der Mitte des Oberschenkels spaltet er sich in zwei Zweige, in den

1. Schienbeinnerv, *nervus tibialis* (Taf. 15; 2η, 4z), welcher folgende Aeste abgibt:

- a) den Wadenerv oder untern Knieennerv, *nervus suralis* oder *saphenus inferior*, auch *nervus communicans tibialis* (Taf. 14; 4z, Taf. 15; 2θ),

- b) den innern Sohlennerv, *nervus plantaris internus* (Taf. 15; 5c), und den
- c) äußern Sohlennerv, *nervus plantaris externus* (Taf. 15; 5z). Diese zweigen sich wieder

- α) in einen oberflächlichen Ast, *superficialis* (Taf. 15; 5β), der abermals, in einen
 - αα) äußern Zweig, *ramus superficialis externus* (Taf. 15; 5γ), und in
 - ββ) innern Zweig, *ramus superficialis internus* (Taf. 15; 5δ), theilt,
- β) in einen tiefen Ast, *ramus profundus*

2. Wadenbeinnerv, *nervus peroneus*, der sich in einen äußern Kniekehlnerv, *nervus popliteus externus* (Taf. 15; 2δ), und in folgende Zweige ab:

- a) den hintern mittlern Unterhautnerv oder Hautnerv, *nervus cutaneus cruris* oder *suralis medius* (Taf. 15; 2γ);
- b) den hintern äußern Unterschenkelnerv, *nervus cutaneus cruris posterior*, auch *nervus communicans tibialis*, genannt (Taf. 15; 2ε);
- c) den oberflächlichen Wadenbeinnerv, *nervus peroneus superficialis* (Taf. 15; 4z), welcher den

- α) vordern Hautast, *ramus superficialis nervi peronei superficialis* (Taf. 14; 4γ), abgibt, und sich in beiden Endäste spaltet, den

- β) innern Hautnerv, *nervus cutaneus dorsalis pedis* (Taf. 14; 4δ), und

- γ) den mittlern Hautnerv, *nervus cutaneus medius* (Taf. 14; 4ε);

- d) den tiefen Wadenbeinnerv, *nervus peroneus profundus* oder *tibialis posterior* (Taf. 14; 4z), der folgende Zweige gibt:

- α) einen innern Zweig, *ramus profundus internus* (Taf. 14; 4z'), und

- β) einen äußern Zweig, *ramus profundus externus* (Taf. 14; 4z''), ab, welcher sich mit dem oberflächlichen Wadenbeinnerv verbindet und die Zehennerven des Fußes, *nervi digitales dorsales*, bildet (Taf. 14; 4n), zu den einwärts gerichteten Seiten der ersten Zehen entsendet.

Knöchel und Bänder.

Ueber die Knochen (Taf. 14; 1A bis 1F, 2A bis 3F, 4A bis 4F, Taf. 15; 1A bis 1F, 2A bis 3A, 4A bis 4F, 5A bis 5E), und die Bänder (Taf. 14; 1F, 3G, 4G, Taf. 15; 1L, 3K bis 3O und 4E, siehe den Taf. 4 und 5, S. 49 fig. und 62 fig.)

Geologie.

Bearbeitet

von

Dr. Carl Vogt,

Professor an der Universität in Gießen.

Inhalt.

	Seite		Seite
Einleitung	3	Klasse der Mantelthiere (Tafel 31, Figur 28 bis 29)	31
Kreis der Wirbelthiere	11	Klasse der Moosthiere (Tafel 31, Figur 30 bis 33)	30
Höhere Wirbelthiere	16	Kreis der Würmer	31
Warmblüter.		Klasse der Nübertiere (Tafel 29, Figur 6 bis 11)	29
Klasse der Säugethiere (Tafel 1 bis 11)	16	Klasse der Borstenwürmer (Tafel 29, Figur 12 bis 27)	29
Unterklasse der Monodelphen	20	Klasse der Sternwürmer (Tafel 29, Figur 32)	29
Unterklasse der Didelphen	38	Klasse der Rundwürmer (Tafel 29, Figur 31, 33 bis 38)	31
Klasse der Vögel (Tafel 12 bis 18)	41	Klasse der Plattwürmer (Tafel 29, Figur 38 bis 39, 39 bis 42 und Tafel 30, Figur 1 bis 22)	38
Unterklasse der Nesthoder	47	Unterklasse der Wimperwürmer	39
Unterklasse der Reißflüchter	54	Unterklasse der Napfwürmer	39
Kaltblüter.		Kreis und Klasse der Stachelhäuter (Tafel 31, Figur 34 bis 39 und Tafel 32, Figur 1 bis 10)	31
Klasse der Schleicher (Tafel 19 und 20)	60	Kreis der Darmgefäßler	31
Unterklasse der Panzerfische	65	Klasse der Rippenquallen (Tafel 32, Figur 13, 20 und 23)	32
Unterklasse der Schuppenfische	66	Klasse der Quallenpolypen (Tafel 32, Figur 21, 22 und Tafel 33, Figur 1 bis 12)	32
Niedere Wirbelthiere	72	Unterklasse der Armpolypen	32
Klasse der Fische (Tafel 21)	72	Unterklasse der Quallenpolypen	32
Klasse der Fische (Tafel 22 bis 24)	79	Klasse der Korallenthiere (Tafel 32, Figur 11 bis 18)	32
Unterklasse der Urfische	87	Klasse der Schwämme (Tafel 33, Figur 34)	33
Unterklasse der Knochenfische	93	Kreis der Urthiere	33
Klasse der Rundmäuler (Tafel 24)	104	Klasse der Infusionsthiere (Tafel 33, Figur 13, 14, 16 bis 21)	33
Klasse der Rohrherzen (Tafel 24)	105	Klasse der Wurzelfüßer (Tafel 33, Figur 15, 22 bis 30)	33
Kreis der Gliedertiere	105	Unterklasse der Meerqualker	33
Klasse der Insekten (Tafel 25 bis 27, Figur 44)	109	Unterklasse der eigentlichen Wurzelfüßer	33
Klasse der Tausendfüße (Tafel 27, Figur 45 bis 49)	149	Klasse der Moneren (Tafel 33, Figur 31, 33 und 34)	33
Klasse der Spinnenthiere (Tafel 27, Figur 50 bis Tafel 28, Figur 7)	150		
Klasse der Krustenthiere (Tafel 28, Figur 8 bis Tafel 29, Figur 5)	157		
Kreis der Weichthiere	167		
Klasse der Kopffüßer oder Kraken (Tafel 30, Figur 23 bis 30)	169		
Klasse der Bauchfüßer oder Schnecken (Tafel 30, Figur 31 bis 40 u. Tafel 31, Figur 1 bis 4)	174		
Unterklasse der Segelschnecken	177		
Unterklasse der Wimpernschnecken	182		
Klasse der Muschelthiere oder Blattkiemer (Tafel 31, Figur 10 bis 23)	183		
Klasse der Armfüßer (Tafel 31, Figur 5 bis 9)	190		

Einleitung.

Aufgabe der Zoologie ist die Erforschung

es sich hier vor allem, was ist ein Thier? Antwortung dieser Frage ist leicht, sobald man höherentwickelte Organismen handelt, und sobald wir auf die ersten Anfänge zurückgehen, so war um deswillen, weil beide Arten von Thieren, Thiere wie Pflanzen, von einem gemeinsamen Element, der Zelle, ausgehen, welches an sich ein in sich abgeschlossenes organisches Wesen, das alle Grundfunctionen eines solchen, Erzeugung und Fortpflanzung, besitzt.

bezeichnete die Grundverschiedenheit der drei folgenden Sätze: Die Steine wachsen; die Thiere wachsen und leben; die Thiere wachsen, leben und fühlen. Die Empfindung wurde also von Unterschied für die Thiere gesetzt. Da wir Empfindung nur durch die Bewegung erzeugen und messen können, indem eine nicht von der Empfindung, die andere haben für uns nicht in die Erscheinung tritt, so ist die einfache Sache einfach auch so ausgedrückt: Die Thiere wachsen, leben und bewegen sich. Es ist aber eine Menge von Keimformen niedriger Pflanzen, welche sich mittels eigener Fortpflanzungsorgane lebhaft umbertummeln, sobald man sie für wirkliche Thiere hielt, ehe man wußte, daß sie keimten und zu Pflanzen, z. B. zu Moosen, wurden; man kann also diese beweglichen Organismen (Zoozoen) nicht zu den Thieren rechnen, mit ihr auch die Bewegung kein unterscheidendes Merkmal. Auch die Contractilität des Zellens des Protoplasma, existiert in ungewissenhaften Thierzellen. Die Ausnahme von Pflanzen, besonders festerer Natur, durch specielle Organe (Mund) ist ebenfalls kein unterscheidendes Merkmal, da es unzweifelhaft und verhältnismäßig nicht alle Thiere gibt (z. B. Bandwürmer), durchaus keine Nahrungsöffnung besitzen und die Pflanzen, durch Aufsaugung flüssiger Nahrungsmittel. Ebenso wenig ist die chemische Zusammensetzung maßgebend; auch nicht die Functionen. Im allgemeinen ist es zwar richtig, Pflanzen Kohlensäure aus der Luft (oder dem Boden) aufzunehmen und Sauerstoff dafür abzugeben, die Thiere umgekehrt Sauerstoff aufzunehmen und Kohlensäure abzugeben; aber diese des Blattstehende Pflanzen, wie Schimmel und Pilze, verhalten sich in dieser Beziehung wie

so also die Organismen aus einfachen Protoplasten, aus Zellen oder aus indifferent bleibenden Anordnungen bestehen, ist eine genauere Angabe dessen, was dem einen oder andern Reiche, nicht möglich. Die Scheidung tritt erst in der Fortbildung ein, indem bei den Pflanzen die Zellen ihre Individualität behalten, bei den Thieren dagegen dieselbe mehr oder minder verlieren,

indem selbst ungleichartige Zellen sich miteinander zur Bildung von Organen und Organsystemen verbinden.

Das Gesetz des Fortschritts in der Thierwelt ist die Arbeitsteilung. Die Zelle mit ihrer organischen Inhalts-substanz und ihrer Wandung, wenn überhaupt eine solche vorhanden, repräsentirt das ganze Leben mit allen seinen Functionen; erst nach und nach scheiden sich dieselben, differenziren und specialisiren sich in bestimmten Organen und Organsystemen und je mehr die Arbeit sich theilt, die Functionen sich in kleinere Specialitäten spalten, desto höher steigt der Gesamtorganismus auf der Stufenleiter der Vervollkommenung.

Es ist kein Zweifel, daß diese Arbeitsteilung auf dem Kampfe um das Leben beruht, durch denselben erzeugt und weiter befördert wird. Der Vortheil, welchen die Specialisirung einer bestimmten Function bringt, ist zugleich die Bedingung zur Erhaltung der Arbeitsteilung und zu ihrer Weiterbildung.

Da alle Thiere sich in ihrer Eigenart fortpflanzen, so ist die Vererbung das conservative Element, welches die Ertragschaften der Aeltern den Nachkommen überträgt. Die Nachkommen sind den Aeltern ähnlich, aber nicht gleich, da schon das Zusammenwirken zweier Individuen (in den meisten Fällen) eine Mischung der Eigenschaften der Erzeuger in den Nachkommen, also eine Ungleichheit bedingt. Diese kann, wenn sie den Nachkommen im Kampfe um das Leben vorthellhaft ist, stets weiter und weiter im Laufe der Generationen ausgebildet werden, sobald schließlich ungemein große Unähnlichkeiten mit den ursprünglichen Erzeugern hergestellt werden.

Indem also die Thierwelt durch die verschiedenen Perioden der Erdgeschichte sich aufbaute, wurde zugleich die Erscheinungsweise ihrer Repräsentanten, der einzelnen Individuen, nach und nach verändert, und jeder thierische Organismus stellt sich demnach als das Resultat zweier, einander bekämpfenden Richtungen dar: der Erhaltung der ursprünglichen Eigenthümlichkeit durch die Vererbung, der Veränderung dieser Charaktere durch die Anpassung, d. h. durch den Kampf um das Leben mit der Umgebung.

Es ist klar, daß je nach dem Verweilen in denselben, nicht wechselnden Verhältnissen, oder im Gegentheil durch die Veränderung der Bedingungen des Lebenskampfes (durch Wanderungen, Auftreten neuer Concurrenten, Veränderungen der Erdoberfläche u. s. w.) bald die eine, bald die andere Richtung mehr die Oberhand gewinnen kann.

Bei der unendlichen Mannichfaltigkeit von Thieren, die sich in allen Zonen und Höhen, im Wasser, auf und in der Erde befinden, war es von jeher Bedürfnis, die ähnlichen zusammenzustellen, die unähnlichen voneinanderzuhalten. So wurde allmählich das System gebildet. Anfangs hielt man sich nur an äußere Charaktere: Größe, Farbe, Ähnlichkeit der äußeren Form u. s. w. Man suchte schärfer und schärfer, und zog auch den innern Bau in Betracht. Auch dieser genügte nicht mehr; es galt zu erforschen, wie dieser innere Bau geworden sei, und zu diesem

Zweck die Geschichte zu studiren; einestheils die Familiengeschichte, wenn ich mich so ausdrücken soll, den Stammbaum, andererseits die Geschichte eines jeden Individuums, wie sie sich bei dessen Entstehung aus dem Ei darstellt. Bei der Häufung des Stoffs hat man diese einzelnen Forschungsmethoden, die sich zu einem Ganzen einigen sollen, in verschiedene Wissenschaftszweige zerlegt. Die Zoologie begnügt sich nicht mehr mit jenen Kenntnissen, welche die systematische Zoologie bilden, sie bleibt nicht mehr bei Haaren und Zähnen, Klauen und Federn, Beinen und Flügeln stehen, zufrieden, Kennzeichen entdeckt zu haben, welche die Einreihung in das System möglich machen; sie verlangt von der vergleichenden Anatomie die Zerlegung des Thierleibes, die Kenntniß der einzelnen Organe und ihrer feinen Structur; von der vergleichenden Physiologie die Ergründung der Functionen, welche diese Organe ausüben, und der Art und Weise, wie diese verschiedenen Functionen in einem Ganzen zu der Erhaltung des Lebens zusammenwirken; sie will durch die vergleichende Entwicklungsgeschichte erfahren, welche Reihen von Umwandlungen jedes Thier durchlaufen muß, welche verschiedene Formen es nacheinander annimmt, bis es das Ziel seines Lebens erreicht hat; die Paläontologie oder Versteinerkunde endlich soll ebenfalls ihren Tribut bringen, indem sie aus den versteinten Resten ausgestorbener Thiergeschlechter die Gestalten zusammensetzt, welche früher die Oberfläche der Erde bevölkerten. Wenn so die Zoologie nach allen Richtungen hin die einzelnen Theile ihres Gebietes kennen gelernt hat, so fragt sie nach den Gesetzen, welche die Vertheilung der thierischen Organismen über die ganze Erde regeln; sie sucht die Wohnbezirke zu umgrenzen, welche jeder einzelnen Art eigenthümlich sind, und erfährt durch die zoologische Geographie, welche Bedingungen des Klimas, des Bodens u. s. w. erfüllt werden müssen, um dieser oder jener Art das Leben möglich zu machen.

Gehen wir kurz auf den allmählichen Aufbau der einzelnen Organe und Organismen ein, die den Thierleib zusammensetzen.

Eine äußere Haut fehlt den niedersten Organismen. Sie bestehen nur aus Sarkode oder Protoplasma, aus mehr oder minder körniger, organischer Substanz, welche keinerlei Begrenzung zeigt, sich trennen und verschmelzen kann. Erst allmählich gewinnt die äußerste Lage dieser Sarkode mehr Festigkeit, wird bei den Zellen Zellenmembran und sondert auch äußere Hartgebilde, aus Horn, Kalk oder Kiesel bestehend, ab. Sobald einmal eine Differenzirung der äußern Schicht als Hautschicht gegeben ist, so ist diese das gemeinschaftliche Organ für vegetative und animale Functionen. Sie nimmt Stoffe auf und gibt andere ab; sie vermittelt Empfindung und Bewegung. Die niedern Thiere tasten mit jedem Punkte ihrer Oberfläche, und jede Stelle derselben dient zugleich als Bewegungsorgan. Nach und nach aber treten besondere Tastorgane hervor, die an einzelnen Stellen nur besonders ausgebildet sind, während die übrige Hautoberfläche, mehr und mehr differenzirt, sich zum Schutzorgan des ganzen Körpers und zum Stützpunkt der Bewegung ausbildet. Dort entstehen Anhäufungen anorganischer Massen, die in mehr oder minder engem Zusammenhang mit dem Hautgewebe stehen und schützende Höhlen, Schalen, Schilde, Schuppen und Panzer bilden. In den niedern Stufen, wie bei den Korallen, den Polypen und den Schalen der Weichthiere zeigen diese anorganischen Schutzbildungen im Innern ihrer Massen mehr oder minder krystallinische Structur,

während da, wo sie als Knochen-, Zahn- oder Substanz austreten, eine organische Masse ihre Grundanlage bildet. Anderwärts sind es feste organische Bildungen, aus Holzfasern, Chitin oder Hornsubstanz, welche der äußern Haut ihre Festigkeit leihen und sie fast unzerstörbar für schwächere dem Agentien machen. Eigentümliche Angrifforgane, welche auch zur activen Vertheidigung bestimmt werden, bilden sich in Gestalt von Stacheln, Haken, bläschen u. s. w., kurz eine Mannichfaltigkeit äußern Bildungen tritt auf, welche besonders in der beschreibenden Zoologie mit großer Aufmerksamkeit den Bereich ihrer Betrachtungen gezogen werden. Die größere oder geringere Härte, welche die an vielen Stellen besitzt, befähigt sie, passiven Bewegungsorgan zu werden, indem die activen Theile, die Muskeln, sich an ihren innern Anheften und so feste Stützpunkte für ihre Thätigkeit finden. Wenn die Hautoberfläche noch wie bei den höhern Thieren mehreren Functionen zugleich, wie der Absonderung, dem Tastsinn, dem Essen gegen äußere Einflüsse, so sind diese stets auf verschiedene streng individualisirte Theile des Körpers gebunden.

Anfangs nimmt die Sarkode feste Stoffe an Punkte ihrer Oberfläche auf. Sie schmilzt sich zusammen und diese aufzunehmenden Stoffe hernachdem dieselben in das Innere gelangt zu zerlegt sind, wird der Ueberrest an irgendeiner Stelle wieder auf die Weise ausgeworfen, daß die Stoffe von dem eingeschnitzten Stoffe zurückbleiben, bald eine festeren Hautschicht gebildet ist, können dieselbe auch nur flüssige oder gasförmige Stoffe getauscht werden. Auch hier kann es vortheilhaft dieser Austausch genügt, aber nur in den Verhältnissen, wenn die Thiere, wie z. B. geweidewürmer, in solchen Flüssigkeiten leben, die zur Erhaltung ihres Körpers nöthigen Stoffe aufgelöst enthalten. Wo dies nicht der Fall wird durch Einstülpung der äußern Haut nach anfangs eine Vertiefung oder ein Blindfad, und eine im Innern des Thiers gelegene Höhle, welche zur Verarbeitung und Aufnahme der Nahrungstoffe dient.

Die Verdauungsorgane zeigen in ihrem Bau nach höherer Ausbildung eine unendliche Mannichfaltigkeit der Form; zuerst nur ein vorbreiter Gang, Mund, mit einem kurzen röhrenförmigen Schlund aus dessen hinterem unbestimmten Ende die angenommenen Nahrungsmittel in das weiche Gewebe des Körpers hineingedrückt werden; dann ein gekrümmter Schlauch, der die unverdaulichen Reste der Nahrung, Koth, durch dieselbe Oeffnung auswirft, und die Nahrungstoffe aufgenommen werden; endlich mehr oder minder gewundenes Rohr, welches aus zwei Oeffnungen, Mund und After, nach außen und wesentliche Complicationen in seinen einzelnen Theilen darbietet. Wenn die Wandungen dieses Rohres, welche mit den aufgenommenen Nahrungsmitteln in Verührung kommen, anfangs der äußern Hautoberfläche analog gebaut und nur als eine Einstülpung derselben nach innen zu betrachten sind, so entwickeln sich später zur Verwältigung und Auflösung der aufgenommenen Nahrungsmittel eine Menge von verdauenden Apparaten, welche die mannichfaltigste Structur annehmen. Absonderungsorgane, Drüsen aller Art, bald säuerliche, bald alkalische Stoffe in die Nahrung ergießend, treten an verschiedenen Stellen auf, entwickeln sich auf diese Weise die Leber, die verschiedenen Speicheldrüsen, die mannichfachen

Absonderungsorgane, welche theils in den Wunden selbst, theils in ihrer Nähe sich ausbilden. Die Umfassung der so verschiedenartig gebildeten und chemisch so mannichfaltig zusammengefügten Organe erzeugt Auswurfstoffe, welche durch Drüsen abgeleitet werden, die zum Theil, die Absonderungsorgane, anfänglich in Beziehung zu den Wunden stehen, dann aber sich von ihm trennen und selbstständig werden.

Verhältnisse des Darmrohrs zu dem Körper sind außerordentlich wichtig. In den meisten Fällen ist dasselbe in sich abgeschlossen und frei in der Höhle des Körpers, der Leibeshöhle, aufgehängt; in niederen Typen ist es gewissermaßen nur durch besondere Gewebe ausgekleidete Ausbuchtung im Körpermaße, des Peritonäums; in manchen Fällen ist es sich direct in Kanäle fort, welche die Wunden durchziehen und die verdauten Substanzen abführen.

Die Ernährung ist auf Ernährung angewiesen. Zwar kann eine längere Zeit hindurch ohne Aufnahme von Nahrung existiren, und dies um so eher, je niedriger die Organismen angehören; aber dennoch bleibt es ein allgemeines Gesetz, daß der thierische Organismus zu seiner Fortexistenz, wenn ihm nicht von Zeit zu Zeit Stoff zur Ernährung zugeführt wird; das materielle Leben besteht wesentlich in Verbrauch von Stoff, die verschiedenen Absonderungsorgane aus dem Körper ausgeschieden wird. Die Zufuhr, welche die verschiedenen Stoffe ersetzen soll, muß demnach in der Nahrung enthalten, welche den Körper selbst speisen. Die Ernährung des thierischen Körpers ist der unbrauchbar gewordenen Theile der Nahrung Nahrungstoff ist mithin nur dann dann derselbe in dem ganzen Körper überall, nach allen Organen hin verteilt werden. In diesem Zwecke entwickelt sich allmählich im Organismus der Kreislauf der allgemeinen Ernährungsflüssigkeit, des Blutes. Bei den niedrigsten Thierwelt durchdringen die von der Außenwelt von der Darmhaut aufgesogenen Stoffe die schwammige Grundsubstanz, aus welcher der Körper besteht. Bald genügt die einfache Imbibition, bald nicht mehr; ein contractiler blasenförmiger Saugapparat wird hergestellt, durch dessen Zusammenziehung die allgemeine Ernährungsflüssigkeit in eine gewisse Richtung vertheilt wird. Der contractile Raum bildet den inneren eigenen Schlauch, dessen muskulöse Wände in rhythmische Zusammenziehungen ausführen, welche die allgemeine Ernährungsflüssigkeit in die Wunden durch den Körper erhalten wird. In niederen Stufen ergießt sich das Blut, ohne feste Wände eingeschlossen zu sein, ohne bestimmte Richtung zu haben, schrankenlos zwischen den Räumen der Gewebe und Organe, durch dieselben überall und durchdringt die Körper. Bei den höhern Thieren kreist das Blut anfänglich unvollständig, später vollkommenen Systeme von Röhren, die man Gefäße, die Wechselwirkung mit dem Gewebe der Organe wird durch die äußerst zarten Wände der feinsten Endigungen dieser Gefäße, durch die Haargefäße bewerkstelligt, während die des Blutstroms, die bei den niederen Thieren nicht existirt, oft selbst periodisch wechselt, bei den höhern durch äußerst sinnreiche mechanische Klappen, in der Bewegungsrichtung des Herzens gerichtet wird. Auf diese Weise wird im Körper die Ernährungsflüssigkeit gebildet, das Blut, in welches alle Stoffe eingeführt werden, die von außen her ge-

nommen oder durch den Umsatz der Körperorgane abgeführt werden. Der stete Umschlag dieses Blutes durch die aufnehmenden Organe einerseits, durch die absondernden andererseits, die Durchbringung aller Theile mittels dieser Flüssigkeit vermittelt Ausscheidung und Aufnahme, und es ist somit das Blut gewissermaßen der aufgelöste Organismus, der seine eigene Zukunft (die aufgenommenen Nahrungsstoffe) und seine Vergangenheit (die verbrauchten Stoffe der Organe) in sich enthält.

Mit der Function des Kreislaufs steht in genauester Verbindung diejenige der Atmung. Ein tiefer, wenn auch nicht ganz durchgreifender Unterschied besteht in dem Verhalten der beiden organischen Reiche, des Pflanzenreichs und des Thierreichs zu der atmosphärischen Luft. Das Thier verbraucht den Sauerstoff derselben und haucht an seiner Statt Kohlenstoff aus; die Pflanze im Gegentheil saugt Kohlenstoff aus der Atmosphäre auf und scheidet Sauerstoff aus. Häufig bestehen gar keine besondern Athmungsorgane, jede Fläche des Thierkörpers, welche mit dem umgebenden Medium in Berührung kommt, theilhaftig sich an dem Austausch der Gase; die äußere Haut, der Darm, die durch Spalten nach außen geöffnete Leibeshöhle u. s. w., und selbst in vielen Fällen, wo schon besondere Athmungsorgane bestehen, nehmen die erwähnten Flächen an der Function theil. Die beiden Medien, in welchen Thiere leben, Luft und Wasser, bedingen auch verschiedene Formen der Athmungsorgane, obgleich die Gase, welchen sie zugeführt sind, in beiden dieselben sind, nur mit dem Unterschiede, daß die Gasarten, Sauerstoff und Kohlenstoff, um die es sich handelt, im Wasser aufgelöst sind. Bedingungen der Atmung, die um so strenger sind, je intensiver dieselbe selbst auftritt, sind Vergrößerung der zugänglichen Oberfläche einerseits und steter Wechsel des umgebenden Mediums andererseits. Erstere wird durch Bildung von Fortsätzen oder Einstülpungen, letztere durch Herstellung besonderer Bewegungsorgane (Strubelorgane, Blasebälge u. s. w.) erfüllt. Die Natur des Mediums bedingt aber verschiedene Organe: für die Wasserathmung Kiemen, d. h. mehr oder minder complicirte und verästelte Fortsätze und Ausstülpungen, in deren Innerem das Blut circulirt, während sie von außen vom Wasser umspült werden, oder Wassergefäße, welche sich im Körper verzweigen, meist in die Leibeshöhle münden und dieser Wasser zuführen. Die für die Luftathmung bestimmten Organe sind entweder Tracheen, welche sich als Röhren im Körper vertheilen, die von außen durch besondere Oeffnungen (Stigmen) aufgenommene Luft überall hinbringen und den Austausch dadurch vermitteln, daß sie vom Blute umspült werden, oder Lungen, nach innen eingestülpte, mehr oder minder verzweigte und zellige Stöcke, in deren Zellen die Luft von außen eindringt und von dem in den Wänden des Organs circulirenden Blute umspült wird. Durch ihre Zuführungsröhren (Asthma, Luftröhre und Bronchien) werden zuletzt Stimmorgane gebildet, in welchen die durchströmende Luft Vibrationen besonderer elastischer Häute (Stimmhäute) und dadurch den Ton erzeugt.

Die Absonderung und Ausscheidung unbrauchbarer Stoffe werden notwendig durch die Ernährung und Atmung bedingt. Anfangs nicht localisirt, wird diese Function allmählich in Organen, die wir Drüsen nennen und die von einer einfachen Einstülpung einer Oberfläche, möge sich dieselbe nun innen oder außen finden, zu Blindsäcken, verzweigten Röhren und endlich sehr verwickelten Structurverhältnissen sich erheben, bei welchen indessen immer als Princip gilt,

daß aus den Körperbestandtheilen, besonders aus den Flüssigkeiten, Stoffe abgeschieden werden, welche bei den höher organisirten, zusammengefügten Drüsen durch Ausführungsgänge und Kanäle fortgeführt werden. In vielen Fällen dienen diese Secrete wieder bestimmten Zwecken in der Oekonomie des Körpers, bei allen in innern Höhlungen des Körpers mündenden Drüsen sowohl (die Galle der Leber, der Bauchspeichel, der Mundspeichel u. s. w.), als auch bei vielen nach außen ergossenen Absonderungen, wie Hautschmiere, Thränen u. s. w. Nur wenige Drüsen sind, wie die Nieren, nur Organe zur Abscheidung von Ausswurfstoffen; bei den meisten ist die Function nicht geschieden und wird das Secret theilweise wieder verbraucht, theilweise entleert. Nicht minder ist auch die Function der Absonderung in ihren Anfängen noch nicht vollkommen differenzirt, so daß z. B. die Drüsen nebenbei zu andern Zwecken dienen können. Die Ausswurfstoffe selbst können flüssig oder mehr fest sein und Concretionen bilden; ersteres ist der häufigere Fall. Die Mannichfaltigkeit der einzelnen Ausbildungen ist ungemein groß und die physiologische Bedeutung der meisten Drüsensecretre durchaus noch nicht so ermittelt, wie es wünschbar wäre. Zugleich darf nicht vergessen werden, daß auf der Function der Absonderung als solcher, welche stets durch Zellen bewirkt wird, die geschlechtliche Fortpflanzung beruht.

Wenn die in den genannten Richtungen zur Vollbringung bestimmter, allmählich erst sich differenzirender Functionen aufgebauten Organe genügen, den Thierleib zu erhalten und zu ernähren, wodurch diese Functionen, nicht aber die Organe, sich denjenigen gleichstellen, die auch der Pflanze zukommen und deshalb als vegetative Organe und Functionen bezeichnet werden, so gehört auf der andern Seite dem Thiere speciell alles an, was auf die Uebermittlung und Verarbeitung von Sinnesindrücken sowie auf die Reaction auf dieselben durch Bewegung sich bezieht. Aber auch hier tritt uns das Gesetz der allmählichen Arbeitstheilung und Differenzirung in ausgeprägter Weise entgegen. Sinnesempfindungen, wenn auch der dunkelsten Art, müssen selbst der indifferenten Sarcode zukommen; wir können dies aus den entsprechenden Bewegungen entnehmen, welche die niedersten Organismen, bei Widerstand anderer Körper z. B. ausführen. Daß dann die ganze, als Haut ausgeschiedene Oberflächenschicht Sinnesorgan, und zwar vorzugsweise Tastorgan wird, ergibt sich ebenso aus der Beobachtung, wie auch das andere Sinnesempfindungen stattfinden müssen, auch ohne daß betreffende Organe entwickelt sind. So sehen wir Organismen, die absolut keine Spur von Sehorganen besitzen, sich dem Lichte zuwenden oder abwenden. Es gehen also alle differenzirten Sinnesorgane aus dem ursprünglich indifferenten Boden einer allgemeinen Empfindung hervor, und es ist wahrscheinlich, daß es manche Organe gibt, in welchen die verschiedenen Sinne, die wir als vollkommen unabhängig erkennen, noch miteinander verschmolzen sind, wie es andererseits bei Thieren Sinnesorgane geben mag, deren Function wir nicht enträthseln können, da wir keine analogen Organe und Functionen besitzen. Wie dem auch sei, die Sinnesorgane differenziren sich erst allmählich aus der Körpermaße hervor, und lassen auch deutliche Spuren allmählicher Ausbildung erkennen. Zuerst tritt in einfacher Blasenform, mit einem in diesem Säckchen eingeschlossenen krystallinischen Kerne, das Gehörorgan in der Erscheinung. Tief im Innern des Körpers verborgen und oft unmittelbar dem Centralnervensystem aufgesetzt, wurde diese primitive

Form des Ohrs erst neuerdings durch das Mikroskop entdeckt. Nach und nach hebt es sich an die Fläche empor, um die Schallwellen direct zu empfangen; es vorber nur durch Vermittelung der Körper erhielt. Die hinzutretenden Theile erhalten das Gewicht über das ursprüngliche Ohrbläschen, in der höchsten Stufe der Ausbildung zeigt sich ein solches äußeres Ohr, welches mit einem nur complicirten innern Organe in Zusammenhang steht. In ähnlicher Weise verhält sich das Auge, indem zugleich jenes Gesetz in den Vorderebenen nach welchem die vielfachen Wiederholungen ein desselben Organs mit denselben Functionen ein niedriger Ausbildung verrathen, während die zur Bildung eines zur speciellen Function bestimmten Organs, das in einfacher Zahl vorhanden ist, die Bildungsstufe andeutet. So sind im Anbau äußern Hüllen für das Auge in ihrer Größe nicht verschieden von der allgemeinen Körpergröße eine gewisse Durchsichtigkeit besitz; später differenziren sie sich mehr als durchsichtige Augenhäute; auf höhern Stufen werden eigentümliche Organe, Lider, für das Sehorgan nach und nach gebildet. In den ersten Rudimenten der Augen nur ein farbiger Pigmentfleck, zu dem später pfundender Nervenfasern, der Sehnerv, tritt, bilden sich besondere Endorgane, Sehtäbchen, lichtbrechend und empfindend zugleich sind, dann ein lichtbrechender Körper, die Linse, wachsend und nach und mehrere Organe gleicher Art, Körper, Augenflüssigkeit, hinzutreten. Ebenso differenziren sich nur nach und nach als selbständige diejenigen Bildungen, welche das Sehtäbchen halten, die Schärfe und Genauigkeit des Sehens erhöhen haben, und wozu namentlich die Augenhäute und die in Art eines Schirms dem Regenbogenhaut gehören. Anfangs ist das Auge unbeweglich in die Körpersubstanz eingefügt; wird es, selbst unbeweglich, von beweglichen Theilen getragen; auf der höchsten Stufe endlich das Organ willkürlich beweglich und kann nach Belieben selbstständig auf den zu betrachtenden Gegenstand gelenkt werden. Nur sehr spät treten besondere Organe für diejenigen Empfindungen, welche Geruch und Geschmack bezeichnen, hervor, der Zunge ist anfangs namentlich oft Tastorgan, greifungsorgan und Geschmacksorgan zugleich. Empfindungen und Organe hängen vom Nervensystem ab, welches in ausgedehnter Form aus Zellen besteht, von denen eigentümliche Fasern und Faserstränge, die Nerven, entstehen. Bei den niedersten Thieren hat auch die genaue Untersuchung keine Sonderung, weder ein Sehorgan, noch peripherische Nerven entdecken; später begegnet man einzelnen Knoten (Ganglien), sich nach bestimmten Regeln ordnen zu wollen und miteinander durch Commissuren oder Verbindungsstränge in Zusammenhang treten. Bei den gebauenen Thieren wiederholen sich die einzelnen scheidbaren Theile so oft, als Körperstrahlen vorhanden sind, die ein Ganglion vorstellen; bei unimpaired und symmetrisch gebauenen Thieren existirt oft nur ein einziges oder zwei nebeneinandergeräthete Ganglion; bei den meisten Wirbellosen wird ein förmlicher Sehting gebildet, indem besonders diejenigen Ganglien, welche die Sinnesorgane des Kopfes versorgen, dem Schlunde, diejenigen welche zu den Antennen u. s. w. führen, unter dem Schlunde sich einfach, bald mehrfach entwickeln und durch sich Commissuren sich zu einem förmlichen Ringe vereinigen.

nglien sind im allgemeinen um so bedeutender, je die Organe ausgebildet sind, zu welchen sich ihnen ausstrahlenden Nerven begeben; bei Insekten finden sich große Sehganglien, bei niedrigeren Thieren, der Mollusken z. B., ein hohes Ganglion. Der Schlundring ist sich mehr und mehr, sobald bei den Mollusken z. B. ein ringförmiges, in einer Masse eingeschlossenes Centralorgan existirt, das Gehirn nennen kann, ohne dabei an eine Verbindung mit dem Gehirn der Wirbelthiere denken zu

der Quergliederung des Körpers, der Bildung der genannten Metameren oder gleichwerthigen hinterliegenden Körperabschnitten, welche bei vielen vürmern z. B. in so hohem Grade ausgebildet ist, bildet sich auch für jeden Segment ein Organ, aus einem oder zwei symmetrischen bestehend, aus, die durch parallele Längsstränge verbunden sind und in ihrer Gesamtheit Bauchmark bilden, welches stets mit dem Ganglion des Schlundringes in Verbindung steht. Sobald sich, wie bei den Gliederthieren, einzelne Segmente durch Verschmelzung von Metameren zu folgt auch das Bauchmark dieser Thiere, es bis zu einem einzigen, ursprünglich aus Knoten verschmolzenen Ganglion sich concentriren

den Wirbelthieren endlich wird das Centralnervensystem concentrirter, als sich keine Zusammenfassung aus Ganglien und Verbindungssträngen mehr nachweisen läßt, sondern nur eine Nervenmasse, die freilich aus Fasern und an besonders gehäufteten Nervenzellen zusammengesetzt ist und daher unter allen Umständen paarige Nerven abgehen, welche am Rumpfe wenigstens reichlich den Wirbeln entsprechen. Zugleich tritt Verdrängung des im Kopfe gelegenen Theils des Gehirns von dem im Rückenmark liegenden verdrängt. Das Gehirn complicirt sich vorzugsweise und mehr durch Abgrenzung einzelner Theile, wie z. B. des Großhirns, Kleinhirns u. s. w.), endlich im Menschen die höchste Stufe seiner Entwicklung erreicht und auch an Masse vorwiegt. Dieser Ausbildung des Centralnervensystems hält diejenige der physischen Eigenschaften gleichen

Den niederen Thieren vertheilt die Centralorgane auf alle Theile des Körpers, später bildet sich ein besonderes Eingeweidenervensystem heraus, das steht mit dem Centralorgane zusammenhängend, doch eigenthümliche Modificationen in Bau und Function erkennen läßt.

der Anregung durch das Nervensystem hängt, dasselbe einmal differenzirt ist, die Bewegung ursprünglich ist die ganze den Körper bildende Masse contractil, später concentrirt sich diese Eigenschaft bestimmte Theile, aus Fasern, und endlich in höchsten Thieren auf ein bestimmtes Gewebe, Muskelgewebe. Die Fasern desselben treten zu neuen Massen zusammen, den Muskeln, deren Bewegung den zu leistenden Bewegungen und der der zu bewegendem Theile oder Hebel entspricht. In niederen Thieren sind die Muskelmassen mehr unter einander innig mit der äußeren Haut verschmolzen, bilden einen Hautmuskelschlauch, während sie bei höheren Thieren von der starren Haut die Hebel bilden,

welche sie bewegen sollen, in deren Innern sie sich also befinden; bei den Wirbelthieren im Gegentheil sind sie an den Außenseiten der starren Hebel angebracht.

Die bisher betrachteten Organe und Functionen beziehen sich nur auf die Erhaltung des Individuums. Zu dem thierischen Leben gehört indeß notwendigerweise noch eine zweite Bedingung, die Erhaltung der Art durch Fortpflanzung des Einzelwesens, und somit die Erhaltung der ganzen thierischen Schöpfung in ihrer Gesamtheit während des Laufs der Zeiten. Jedem thierischen Organismus ist nur eine gewisse Zeit der Existenz angewiesen; der Tod ist ein allgemeines Gesetz für alle, während die Fortdauer in der Art durch Erzeugung von Nachkommenchaft ebenso ein allgemeines Gesetz zu sein scheint. Auch für diese so äußerst wichtige Function begegnen wir dem allgemeinen Gesetze der Differenzirung. In mannichfach wechselnder Weise tritt uns zuerst die geschlechtslose Zeugung der Nachkommenchaft entgegen. Die organische Grundsubstanz, welche den Körper bildet, ist, wie wir schon oben erwähnten, befähigt, durch Theilung, durch Knospen, durch Sprossen, kurz in sehr mannichfach verschiedener Weise sich und damit die Art zu vervielfältigen. Nur langsam, fast wie im Kampfe, weicht diese geschlechtslose Zeugung zurück vor der Thätigkeit besonderer Organe, welche sich in dem Körper entwickeln. Die Producte dieser Fortpflanzungsorgane sind es, welche zur Erzeugung neuer Wesen nothwendig sind. Zwei Gegensätze, das männliche und weibliche Geschlecht, treten hervor. Anfangs noch auf denselben Individuen vereinigt, trennen sie sich bei den ausgebildeten Thieren, bei welchen dann jedes Individuum einem bestimmten Geschlechte angehört. Die Vereinigung beider Geschlechter, die Vereinigung der Producte der beiderseitigen Fortpflanzungsorgane, des Eies und des Samens, ist nun nöthig zur Bildung des werdenden Geschöpfes. Anfangs unterscheiden sich die Geschlechter nur durch den Inhalt der Organe, nicht durch die Form derselben; später zeigen die Geschlechtsorgane Verschiedenheit der äußeren Bildung, ohne daß die Individuen durch andere Kennzeichen ihr Geschlecht verriethen; endlich drückt die Geschlechtsverschiedenheit der ganzen Organisation ihren Stempel so tief auf, daß schon in dem Aeußern diese Verschiedenheit erkannt werden kann, und oft so bedeutend wird, daß die Individuen derselben Art, aber verschiedenen Geschlechts, nicht nur in ganz verschiedene Klassen, sondern sogar in verschiedene Organisationstypen eingereiht wurden.

Ob Thiere entstehen können, ohne von Aeltern erzeugt zu sein, ist eine Frage, mit der wir uns hier nicht zu beschäftigen haben, da noch kein thierisches Wesen mit Sicherheit beobachtet worden ist, welches nicht von Aeltern abstammte. Die verschiedenen Arten von geschlechtlicher und ungeschlechtlicher Zeugung und die Combination beider bei vielen Thieren ist aber in mehrfacher Beziehung wichtig. Zuerst in Bezug auf das Individuum. Da das Ei nichts anderes als eine Zelle mit allen ihr zukommenden Bestandtheilen, Protoplasma: Inhalt (Dotter), Zellhaut (Dotterhaut), Kern (Keimbläschen) und Kernkörperchen (Keimfleck) ist und alle der Zelle zukommenden Functionen besitzt, also einen selbständigen Organismus, ein Individuum darstellt, so wird auch bei weiterer Entwicklung dasselbe ein Individuum werden und bleiben. Nicht so verhält es sich bei der ungeschlechtlichen Zeugung, wo auch ein nicht individualisirter Theil des Körpers, ein Stück Sarkode oder ein Zellencomplex, sich zu einem neuen Wesen umgestalten kann. Hier ist nicht, wie bei der

Ei- und Keimbildung, die Individualisirung von Anfang an ausgesprochen und das Ei oder der Keim ein selbständiges Ding, und es wird daher einestheils die Trennung des Jungen von dem mütterlichen Organismus oft erst spät, oft gar nicht erfolgen oder das Junge selbst niemals die Dignität eines selbständigen Individuums mit Beibehaltung aller Functionen desselben erhalten.

Dies ist namentlich bei der Knospenbildung der Fall, die sich nur dadurch von der Theilung unterscheidet, daß bei dieser das ganze Thier in Mitleidenchaft gezogen wird, während bei der Knospen- oder Sprossenbildung nur ein Theil, sei es die äußere Oberfläche, sei es ein bestimmtes Organ (Keimstock, Stolon), die Jungen erzeugt. Hierbei beobachtet man, daß die Knospen oder Sprossen häufig sich niemals von dem Mutterthiere loslösen, sondern das ganze Leben hindurch mit demselben in organischem Zusammenhange bleiben, wodurch Thierstöcke (Colonien, Cormen) gebildet werden. Je nachdem die bleibenden Knospen sich regellos oder an bestimmten Stellen bilden, werden diese Thierstöcke auch bestimmte Formen annehmen.

Nicht immer aber werden diese Knospen vollständige, mit allen nöthigen Organen zur Erhaltung und Fortpflanzung ausgerüstete Individuen, sondern sie bilden sich zu unvollständigen Wesen aus, die wie bestimmte Organe zu bestimmten Functionen differenzirt sind, aber eine so hohe Ausbildung gewinnen, daß man sagen kann, das Organ sei ein Individuum geworden. Man hat diese Erscheinung den Polymorphismus genannt und kennt in der That Thierstöcke, die aus Ernährungs-, Bewegungs- und Geschlechtsindividuen zusammengesetzt sind, welche alle zwar von einem gemeinschaftlichen Stöcke abhängen, aber dennoch ein mehr oder minder individuelles, selbständiges Leben führen. Die Arbeitstheilung ist hier bis auf den höchsten Punkt geblieben, auf welchen sie bei einem Thierstöcke geblieben kann. Es darf indessen dieser Fall nicht mit demjenigen verwechselt werden, wo in einer Gesellschaft von getrennten Individuen durch besondere Verhältnisse eine gesellschaftliche, und zwar notwendig durch die Organisation bedingte Arbeitstheilung eingetreten ist. Polymorphe Thierstöcke sind z. B. die Schwimmpolypen; Gesellschaften mit verschiedenen gearteten Individuen, denen verschiedene Functionen in der Gesellschaft auferlegt sind, die der Bienen, Ameisen u. s. w.

In den häufigsten Fällen sind geschlechtliche und ungeschlechtliche Fortpflanzung in der Art miteinander combinirt, daß sie entweder unmittelbar, oder nach längern Generationsfolgen miteinander abwechseln. Man hat diese Erscheinung den Generationswechsel, und diejenigen Formen, welche die Jungen durch Knospung erzeugen, Ammen genannt. Ein Beispiel möge den einfachen, ich möchte sagen, normalen Fall erläutern. Die Salpen sind Mantelthiere (Tunicaten), welche frei im Meere schwimmen. Jede Salpenart hat eine Eingeisform A, ein einzelnes Thier, das an einem bestimmten Orte, in der Nähe des Herzens, einen Keimstock (Stolon) trägt. Auf diesem Stolon entwickeln sich Knospen, die allmählich zu Individuen (B) auswachsen, welche in Ketten zusammenhängen und eine von dem Einzelindividuum verschiedene, und zwar so sehr verschiedene Form haben, daß man sie früher, ehe man das Gesetz des Generationswechsels kannte, für eigene Arten hielt. Jedes dieser Kettenhiere erzeugt ein Ei, welches nach der Ausbildung und Ablösung ein Einzelthier ist, welches wieder einen Stolon bekommt und durch Knospung

Kettenhiere erzeugt. Es ist also A ähnlich C; B ähnlich D und so fort.

Es genügt hier darauf aufmerksam zu machen, dies die einfachste Combination der Geschlechter mit der ungeschlechtlichen Zeugung ist, daß aber mannichfachen Veränderungen dadurch stattfinden können, daß vielfache ungeschlechtliche Generationen eingelegt werden können; daß diese wieder vielfache Ammen erzeugen können; daß diese Knospung bald äußerlich bald innerlich stattfinden kann; daß die Knospen Keime, also sehr früh abgetrennte, mehr individuelle Sprossenbildungen erzeugt und dann schließlich zur Eibildung nicht mehr unterschieden werden können. Wenn der Keim eine Zelle mit allem Zubehör, wenn die Stätte, wo er entsteht, ein besonderes Organ ist, so läßt sich der Keim nicht von einem das Organ nicht von einem Eierstocke unterscheiden. Die Erscheinungen fließen dann um so mehr zusammen, als in der That bei vielen und selbst hochorganisirten Thieren eine Art der Fortpflanzung existirt, die man Jungfernzeugung (Parthenogenesis) genannt und welche darin besteht, daß in dem Eierstocke das Ei sich auch ohne Befruchtung entwickelt. Es ist hier also die geschlechtliche Zeugung in die ungeschlechtliche über und stellt sich nur als eine weitere Theilung dar, indem die Erzeugung der Jungen sich auf zwei Individuen oder zwei verschiedene Organe in demselben Individuum vertheilt ist. So gibt bei gewissen Krustenthiere und Insekten lange Generationsfolgen von weiblichen Thieren, welche unentwickelte Eier legen, während bei anderen Thieren die Eier bald befruchtet werden, bald und je nachdem verschiedene Individuen (Männchen und Weibchen z. B.) hervorgehen.

Hiermit hängt auch die Zwitterbildung (Herproditismus) auf das engste zusammen. Zwitterthiere ohne Zweifel den Anfang der geschlechtlichen Differenzirung. Dasselbe Organ liefert die Zeugungstoffe, wie z. B. bei unsern Schnecken, die gleichzeitig, vielleicht abwechselnd. Die Differenzirung schreitet fort, die beiden Organe sind getrennt, aber noch durch ihre Ausführungsgänge verbunden, so daß sie vollständig getrennt, aber auf demselben Individuum vereinigt. Zuletzt trennen sich die Individuen in männliche und weibliche. Alle diese Stufen sind in verschiedenen Thieren dargestellt.

Die genauere Betrachtung der Art und Weise, wie sich der Thierleib aus seinem Keime hervorbildet, Organe entwickelt und seine ersten Formgebungen weiter ausarbeitet, ist von der größten Wichtigkeit für die Auffassung des Thierreichs in seiner Gesamtheit wie in seinen einzelnen Typen. Wie bei dem Bau der formlose Stein nur nach und nach vollkommen Statue sich entgegenbildet, anfangs die groben Umrisse der Gruppen und Gestalten, dann erst die Einzelheiten der Formen sich entwickeln, treten auch bei der Entwicklung der Thiere ganz allgemeinen Grundlinien des Plans hervor, nach denen es gebaut ist, und erst bei fortgesetzter Differenzirung lassen sich die Einzelheiten der Gestalt erkennen. Die Betrachtung der ersten Entwicklungsstadien gibt am leichtesten und klarsten die leitenden Grundsätze an die Hand, nach welchen die großen Kreise und Gruppen des Thierreichs geschieden werden können, indem sie diese Grundsätze unmittelbar aus der Beobachtung ohne weiteren Zwang herausgehen läßt.

Jedes Thier durchläuft also von dem Augenblicke seiner ersten Bildung an bis zu seinem normalen weise eintretenden Tode eine Reihe von Bildungs-

deren genauere Betrachtung für die Naturum so wichtiger ist, als oft die größten Veränderungen durch dieselben erzeugt werden. Diese Bildungsstufen sind namentlich deshalb interessant, weil sie Bruchstücke einer Geschichte liefern, die bei dem einen Thiere weiter fortgeführt ist als bei dem andern.

Es geht schon aus dem Gesagten hervor, daß in jenen Familien und Gattungen, welche die besten oder größten Abtheilungen des Thierreichs zusammensetzen, eine allmähliche Evolution zur Vollkommenheit erkannt werden kann, deren Stadien auch in den verschiedenen vorübergehenden Bildungsmomenten der höherstehenden Emmerkannt werden können. Das Thierreich in Gesamtheit betrachtet wiederholt demnach in einzelnen Formen und Gestaltungen bleibend Bildungs Momente, welche in den Embryonen ununterbrechenden Wechsel vor unsern Augen geführt werden, und an denjenigen Organen, denen die Entwicklungs geschichte diese vorübergehenden Abtheilungen der Bildung nachweist, läßt sich die höhere oder geringere Vollkommenheit des Thiers nach dem Rang in der Bildungsrichtung, der es anerkennen. Wenn wir z. B. sehen, daß die Kieferhäute des Säugethiers bei ihrem ersten Ausgange aus einem einfachen Knorpelstabe besteht, keine Abtheilungen zeigt, so werden wir den Fischen, welche im erwachsenen Zustande nur einen Knorpelstab besitzen, einen sehr niedrigen Rang in der Bildungsreihe der Wirbelthiere überhaupt zuweisen müssen.

Die Gesetze, welches wir hier für die Ausbildung der lebenden Schöpfung aufgestellt haben, finden sich bei denjenigen Thiere seine Anwendung, deren Ursprung dem Schoße der Erde begraben liegt. Die Entstehung der Gesteinsfische, aus welchen die Thiere unserer Erde zusammengesetzt ist, weist nach, daß die Oberfläche unsers Erdbodens viele Geschichtsstadien durchlaufen hat, in welchen unter sich verschiedene Schöpfungen die Erde bevölkerten; eine allmähliche Vervollkommenung der Geschöpfe, welche nach und nach auf der Erde erschienen und wieder unterlag, läßt sich im großen nicht leugnen, wenngleich die einzelnen Grade dieser Vervollkommenung verschiedenen Ansichten herrschen können. Aus den vorliegenden Thatfachen aber läßt sich schon nachweisen, daß dieselben Typen, welche in unserer jetzigen Schöpfung zu finden sind, in ihren Anfängen schon in der ersten Zeit der organischen Entwicklung auf der Erde vorgefunden werden und daß sie durch analoge Stufen der Entwicklung hindurchgingen, wie diejenigen sind, welche der jetzigen Schöpfung und in den Metamorphosen der werdenden Thiere erkennen. Dasselbe Beispiel, welches wir soeben benutzten, können wir auch anwenden. Die ältesten Fische, welche in den untersten Schichten gefunden werden, besitzen noch keine Kiefer, sondern nur einen Knorpelstab, der in ähnlicher Weise gebildet ist wie der Knorpelstab der niederen Fische unserer jetzigen Schöpfung und der Knorpelstab der Wirbelthiere überhaupt in der ersten Zeit ihrer Bildung. Erkenntniß dieser dreifachen Richtung in der Entwicklung der Thierorganismen, nämlich der histologischen Entfaltung durch die verschiedenen Gezeiten der Erde hindurch, der Flächen ausbreitung durch die mannichfaltigen Formen ausgebreiteter Thiere, welche jetzt den Erdball bevölkern, und der systematischen Entwicklung in der Ausbildung der Embryonen, die Verfolgung dieser dreifachen Rich-

tung bis in ihre letzte Einzelheit ist es, welche der heutigen Wissenschaft die zu lösenden Aufgaben stellt.

Da jeder Organismus einer endlichen Auflösung, dem Tode, verfallen ist, so durchläuft auch jeder eine gewisse Stufenfolge von Veränderungen in aufsteigender und absteigender Linie. In den meisten Fällen wird der Höhepunkt mit der Geschlechtsreife eingeholt; sobald das Thier fähig ist, sich fortzupflanzen, also einen Ueberschuß seiner Körperbestandtheile zur Bildung von Nachkommen zu verwenden, ist es auch aus dem Stadium des Wachstums herausgetreten und in sich vollendet. Hört diese Fähigkeit auf, so tritt auch die Rückbildung der organischen Thätigkeit ein. Doch ist dies, wie wir sehen werden, nicht ausnahmslose Regel.

Der Eintritt in das selbständige Leben erfolgt zwar mit dem Ausritte aus dem Ei und dessen Hüllen; nicht immer aber ist damit auch die Fortführung des selbständigen Lebens ermöglicht und deshalb bei vielen, und namentlich bei höhern Thieren eine Brutpflege nöthig, die häufig durch besondere Organe (Taschen, Beutel, Drüsen mit ihren Secreten) vermittelt wird. Das geborene Säugethier könnte ohne die Ernährung durch die Milchdrüsen der Mutter sein Leben nicht fortsetzen und ähnliche Fälle finden sich in Menge in andern Kreisen des Thierreichs.

Häufig aber wird das selbständige Leben der Jungen dadurch ermöglicht, daß dieselben mit provisorischen vergänglichen Organen ausgerüstet sind, welche später zu Grunde gehen, abgeworfen werden oder sich zu definitiven Organen umwandeln. Wir nennen diesen Vorgang die Metamorphose und die mit provisorischen Organen ausgerüsteten Thiere Larven. Um ein bekanntes Beispiel zu geben, so haben die Kaulquappen, die Larven der Frösche, provisorische Organe in ihren Kiemen, in ihrem Schwänze, die später verloren gehen. Ob aber eine Larvenbildung stattfindet oder nicht, hängt von dem Zeitpunkte ab, wo das Junge das Ei verläßt. Die Kaulquappe der Geburtshäuser hat schon keine äußern Kiemen mehr, wenn sie das Ei verläßt, und andere Kaulquappen erscheinen gar nicht als solche außerhalb des mütterlichen Organismus, sondern durchlaufen die entsprechenden Stadien innerhalb desselben. Die Larvenbildung, so weit verbreitet sie auch vorkommen mag, ist deshalb nur eine äußerliche Erscheinung, eine Folge der Anpassung an bestimmte Lebensbedingungen; die Organismen, welche einem und demselben Typus angehören, durchlaufen dieselben Stadien, die einen in dem Ei, die andern in den Stätten der Brutpflege, die dritten als selbständige Individuen, in welcher letztem Falle freilich die provisorischen Organe auch zur Verwendung geeignet und ausgebildet sind, während sie in den erstern Fällen meistens nur rudimentär bleiben. Es beweist aber die durchgreifende Existenz solcher Organe und Anlagen, daß sie in dem ursprünglichen vererbten Typus des Thiers gelegen sind und demnach auch am sichersten zu den ursprünglichen Verwandtschaftsverhältnissen der Thiere führen können. So hat z. B. der Nachweis von Larven mit drei ursprünglichen Paaren von Bewegungsorganen allein die richtige Stellung der Rankenfischer (Cirripeden) zu den Krustenthiere ermöglicht.

Die Rückbildung der Larvenorgane, die in dem fernern Nichtgebrauch derselben begründet ist, stellt sich nur als eine weitere Ausführung des Satzes dar, daß jedes Organ durch Gebrauch sich ausbildet, durch Nichtgebrauch nach und nach verschwindet und zu Grunde geht. Sie ist eine Folge der Anpassung an bestimmte Lebensverhältnisse, und das auf diese Weise rückgebildete Organ vererbt sich dann in seiner Rück-

bildung auf die Nachkommen, bis es endlich zu Grunde geht. Deshalb ist auch die Berücksichtigung dieser rudimentären und schwindenden Organe so außerordentlich wichtig. Wir würden z. B. nicht wissen, daß die Varten tragenden Wale von Zahntragenden abstammen, wenn man nicht in der Schleimhaut der Kiefer bei den Jungen unentwickelte Zahnleime gefunden hätte. In großem Maßstabe tritt aber die Rückbildung durch besondere Lebensverhältnisse ein, die man namentlich in das Auge gefaßt hat, wenn man bei manchen Thieren von rückschreitender Metamorphose gesprochen hat. Im Grunde ist jede Entwidlung mit einer rückschreitenden Metamorphose verbunden; es gibt kein Thier, welches nicht, sei es im Ei, sei es außerhalb desselben, Anlagen oder ausgebildete Organe zeigte, die in der Folge zu Grunde gehen oder durch andere ersetzt werden. Die rückschreitende Metamorphose tritt uns aber namentlich lebhafter in die Erscheinung, wenn gewisse Lebensbedingungen von Grund aus geändert werden durch Anpassung an neue Verhältnisse. Zu diesen gehört im ersten Grade das Festsitzen an einem bestimmten Orte, im höhern Grade des Scharroperthums.

Jedes Thier hat zu einer gewissen Zeit seines Lebens die Fähigkeit des Ortswechsels; viele aber verlieren diese Fähigkeit während einer gewissen Zeit ihres Lebens. Meist ist der Fall der, daß die Thiere in der Jugend freie Bewegung haben, später aber sich festsetzen und dann erst geschlechtsreif werden, doch ist auch der umgekehrte Fall vorhanden. Das Festsitzen zieht den Verlust, die Rückbildung der zur Ortsbewegung bestimmten Organe, ihre Umbildung zu Ergreifungsorganen, Strudelorganen u. s. w. nach sich; ebenso den allmählichen Verlust der Sinnesorgane, namentlich des Sehorgans. So haben die umher schwärmenden Larven der feststehenden Krustenthiere Augen und Bewegungslieder; erstere gehen verloren, letztere werden umgewandelt.

Noch größern Einfluß übt das Scharroperthum (Parasitismus) aus. Hier tritt zu der relativen Bewegungslosigkeit noch der weitere Umstand, daß der Wirth des Scharrobers diesen von seinen Lebenssaften, von seiner Substanz nährt; daß also dem Scharroper die Arbeit erspart wird, welche zur Beschaffung der Nahrung geleistet werden muß. Bewegungsorgane schwinden oder werden zu Klammer- und Haftorganen umgewandelt; die Sinnesorgane, durchaus unbrauchbar, verschwinden gänzlich; zuletzt selbst, in den extremsten Fällen, die Verdauungsorgane, indem der Scharroper sich nur von dem durch Endosmose eingesaugten Lebenssaft des Wirthes ernährt.

Betrachtet man alle diese Vorgänge im ganzen, so zeigen sie sich als Resultate der Anpassung, die in allen größern Kreisen nach zwei Richtungen vor sich geht. Der Kampf um das Leben bedingt massenhafte Zerstörung einerseits, unablässigen Kampf gegen diese Vernichtung andererseits; die einen führen diesen Kampf durch Vermehrung ihrer Verteidigungsmittel, Schnelligkeit, Ausbildung von Waffen u. s. w., die andern durch Auffuchung von Schutzmitteln, Verbergen, Festsitzen am Boden, Verstecken in andern Thieren. Fortdauernde Anpassung bildet diese Richtungen stets einseitiger aus, und fortdauernde Vererbung pflanzt sie auf die Nachkommen fort.

Aus den kurzen hier gegebenen Andeutungen geht hervor, daß die Uebereinstimmung in der Organisation verschiedener Thiere auf der Vererbung, also auf gemeinsamer Abstammung beruht und daß demnach die Verwandtschaft um so näher sein müsse, je größer die Summe der übereinstimmenden Charaktere ist. Da

aber die Verschiedenheiten zwischen in einem Uebereinstimmenden Organismen durch äußere Lebensbedingungen und durch Ererungseigenschaften auf die Nachkommen betreffen, ferner die Entwicklungs Geschichte eines Organismus diese Ererungseigenschaften in der Reihenfolge der Erscheinung tretenden Charaktere auch in der Reihenfolge und allgemeinsten sind und einem um so früher sie angehören müssen, je früher sie auftreten, treten, um ein Beispiel anzuführen, bei den Thieren ohne Ausnahme zuerst die Anlagen des centralen Nervensystems und der Wirbelsäule (dorsalis) auf, erst später Kiemenspalten und Kiemenbogen, die nur bei den meisten Metemorgane werden, bei den andern nicht werden also überhaupt bestimmen, was zu der (Phylum) oder Kreis der Wirbelthiere gehört, die athmenden Kiemenstrahlen bestimmen, was ein Thier zu dem Unterkreis der niederen Thiere gehört oder nicht. Die Entwicklungs Geschichte also die Art und Weise an, wie der verschiedenen Kreise sich entfaltet und sich aus dem Complicirten, vom Niederen zum Höheren sich erhebt. Daß das Princip dieser Entwicklung durch Anpassung für den Kampf um das Leben mehr sich ausbildende Arbeitstheilung sei, schon gezeigt.

Die Mannichfaltigkeit der Thiere, die wir sehen, bedingt eine Ordnung derselben, eine Classification. Wenn dieselbe ihren Zweck erfüllt, die Verwandtschaftsgrade der Thiere zu bestimmen soll, so muß sie von dem ersten Ausgangspunkte, durch die allgemeinsten auftretenden Charaktere den Stamm zu definiren und innerhalb desselben durch Differenzirung und Anerkennung der nachfolgenden Unterschiede zu stets kleiner werdenden Theilungen fortschreiten, die wir Klassen, Familien, Gattungen, Arten und Varietäten nennen, wobei man indessen nicht vergessen darf, daß die Formen nur die letzten Ausläufer der Entwicklungsreihen sind, die oft so aneinander grenzen, daß die verbindenden Mittelglieder vollkommen sind.

Unsere von Linné zuerst durchgeführte Classification beruht auf dem Grundsatz, daß jedes Thier doppelten Namen erhält, den der Gattung und den bestimmenden der Art (Species). Die Art kein Unvergängliches, von Anfang an fest und Unveränderliches sei, wie früher behauptet wurde, haben die Untersuchungen der Neuzeit gezeigt, nur für eine gewisse Zeitdauer und für gewisse Bedingungen gegeben und verändert sich in der Zeit. Varietäten sind beginnende Arten, Formen, welche sich infolge der Anpassung an wechselnde Weise ausbilden und schließlich untergehen oder so lange bestehen, als sie dauern, welchen sie sich anpassen. Die Art kann deshalb praktisch in sehr verschiedener Weise gefaßt werden. So unterscheiden z. B. die Forscher den amerikanischen Fuchs (*Vulpes vulpes*) und den Brandfuchs (*Vulpes alopecurus*) von gewöhnlichen Füchsen (*Vulpes communis*), während andere nur Varietäten darin erkennen. Wenn es fast gewiß ist, daß alle drei von einem Stammart herkommen, so hat der Streich der Art, ob Varietät, gar keine Bedeutung.

Nicht minder schwankt die Fassung der Gattung (Genus). Um in dem Beispiel

nahm ein Genus an, *Canis*, und unterschied Arten den Fuchs (*Canis vulpus*) und den Wolf (*Canis lupus*). Jetzt nimmt man ziemlich allgemein Genus *Vulpes* an (mit senkrecht geschligter Pupille), wenn nicht ein besonderes Genus *Lupus*, so doch Gattung *Canis* (mit runder Pupille), beide eine nahe stehend in derselben Familie.

Es ist kurz zu sagen, die doppelte Namengebung equem, um einen nächsten Verwandtschaftsgrad geben; jeder sieht sogleich, daß europäischer Hirsch canadischer (*Waipiti*), Pferd und Esel und Dschig-u. s. w. eine größte Summe von Aehnlichkeiten u. aber ein festes Princip, um Art, Genus und weiter abstrahirten größern Abtheilungen, Familie, Gattung, Klasse, Kreis u. s. w. zu bestimmen zu begrenzen, gibt es nicht, da die Auffassung Verwandtschaftsgrades aus der Summe der ähnlichen Charaktere bei mangelnder Constatirung des Stammbaums mehr oder minder von individueller Eignung abhängt.

Wir nehmen, von oben nach unten gehend, folgende Namen oder Kreise an:

- Wirbelthiere (*Vertebrata*).
- Gliederthiere (*Arthropoda*).
- Weichthiere (*Mollusca*).
- Würmer (*Vermes*).
- Stachelhäuter (*Echinodermata*).
- Zoophyten (*Coolenterata*).
- Urtiere (*Protozoa*).

Die Charakteristiken geben wir bei den einzelnen Kreisen. Die Ordnung, in welche die Kreise gestellt sind, entspricht nicht den Beziehungen, welche zwischen ihnen existiren; so haben die Wirbelthiere gar keine Beziehung rückwärts, weder zu den Gliederthieren, noch zu den Weichthieren oder Stachelhäutern, stens zu den Würmern, an welche einerseits Gliederthiere, andererseits Weichthiere und nach dritter Seite Stachelhäuter sich wie an eine Muttergruppe ansetzen; aber da in Wäthern eine Seite auf die andere folgen muß und selbst ein Druck im Kreise nach beiden Seiten ausstrahlend der Darstellung der Verwandtschaftsverhältnisse nicht genügen würde, so ist die Ordnung der Kreise so gewählt, wie sie nach einer Abschätzung des Vollkommenheitsgrades, den jeder Kreis in seinen Spitzen erreicht, erhalten würde.

Kreis der Wirbelthiere. (*Vertebrata*.)

Symmetrisch gebaute Thiere mit innerm Skelet, um das sich gegliederte, außen ausgesprochene Ringe (Wirbel) lagern, mit dorsalem Centralnervensystem und auf der ventralen Seite des Achsenskelets gelagerte vegetative Organe. Die bewegenden Theile (Muskeln) sind an der Außenseite der gegliederten Hebel angebracht. Darmtrakt stets vorn und hinten offen. Höchstens ein Paar Extremitäten. Höhere Sinnesorgane höchstens einpaarig, meist an einem besonderen Körpertheile (Kopf) angebracht. Geschlossenes Blutgefäßsystem, mit meist durch die Körperperipherie gefärbtem Blut. Athemorgane

am Anfange des Darmrohrs. Dotterbauchständig.

Betrachten wir die Gesamtorganisation der Wirbelthiere, so stellt sich als erster wesentlicher Charakter die symmetrische Lagerung der Organe zu beiden Seiten einer senkrechten Mittelebene dar. Bei vielen Wirbelthieren ist diese Symmetrie so durchaus gewahrt, daß auch nicht die leiseste Andeutung einer Abweichung vorkommt; bei sehr vielen sind alle Organe symmetrisch gestellt, mit Ausnahme der Unterleibsbeingewebe, besonders des Darms und der Leber, welche eine unregelmäßige Lagerung darbieten. Nur sehr selten kommen die Beispiele vor, in welchen auch das Skelettsystem, und namentlich der Schädel mit in solche asymmetrische Bildung hineingezogen wird, da man sonst in diesem sowie in dem Nervensystem gerade die strengste Symmetrie ausgebildet findet. Bei dieser Lagerung der Theile zeigen sich also die einfachen Organe stets in der Mittelebene des Körpers, die andern paarig zu beiden Seiten.

In der äußern Form des Körpers beobachtet man ein fortwährendes Anstreben von Sonderung bestimmter Regionen mit bestimmten Beziehungen zu einzelnen Organgruppen; eines Kopfes, der die höhern Sinnesorgane, das Gehirn und den Eingang zu dem vegetativen System trägt, das in dem Rumpfe sich entfaltet, während die Körperachse meist über den Rumpf hinaus sich als Schwanz verlängert. Weitere Ausbildung dieser Abtheilungen führt zur Herstellung eines Verbindungstheils zwischen Kopf und Stamm, Hals genannt, und zur Theilung der Höhle des Rumpfes in eine Brust- und Bauchhöhle. Am Anfang und Ende des Rumpfes befinden sich die gegliederten Extremitäten, welche zwar ganz fehlen können, aber, wenn vollständig ausgebildet, aus einem Gürtel (Schulter- und Beckengürtel) und den eigentlichen Gliedmaßen bestehen.

Die äußere Haut besteht fast durchgängig aus zwei Schichten, der Oberhaut (Epidermis) und der Lederhaut (Corium). Von ersterer, die ursprünglich aus Zellen besteht, geben die verschiedenen Hartgebilde aus (Schilde, Hörner, Klauen, Hufe, Haare, Federn, Schuppen u. s. w.) welche den Körper im ganzen oder einzelne Theile desselben bedecken; ebenso verschiedene Drüsen, welche ihr Secret auf die Außenfläche ergießen. Die Lederhaut ist aus Fasern gewebt, gefäß- und nervenreich; sie vermittelt die Sinnesempfindungen der Haut und ist stets von dem Muskelsystem getrennt, während sie bei den Wirbellosen mehr oder minder mit dem Muskelschlauche verwachsen ist.

Von besonderer Wichtigkeit für die Betrachtung der Wirbelthiere erscheint die eigenthümliche Ausbildung der härteren Stützen, welche die Formen des Körpers bestimmen und theils zum Schutze besonderer Organe, theils zur Herstellung von Hebeln für die Bewegung dienen und unter der Gesamtbezeichnung des Skeletts bekannt sind. Bei allen übrigen Kreisen sehen wir bald nur einen durchaus weichen Körper oder ein Festwerden der äußeren Haut, wodurch diese zugleich als Schutzgebilde und als Stütze für die Bewegung auftritt, sobald wir bei den Gliederthieren als allgemeinen Charakter die Existenz von hohlen Ringen oder hohlen Cylindern erwähnen können, in deren Innern die bewegenden Stränge, die Muskeln, angebracht sind. Bei den Wirbelthieren findet gerade das entgegengesetzte Verhältniß statt, indem hier die Hebel, aus Knochen oder Knorpel gebildet, im Innern angebracht sind und die Muskeln sich auf ihrer Außenfläche ansetzen, was indessen nicht verhindert, daß zugleich der andere Zweck der härtern Theile, die Be-

schüpfung der Eingeweide, durch Bildung von Gewölben und Höhlen erreicht wird. Die festen Theile des Skelets erscheinen sämmtlich um eine Achse gelagert, welche in der Mittellinie des Körpers in der Weise sich hinzieht, daß zugleich eine obere oder Rückenhälfte, und eine untere oder Bauchhälfte des Thiers sich durch die Lagerung dieser Achse erkennen läßt, welche meistens von der Wirbelsäule, oder bei den niedern Typen von einem einfachen Fasernorpelstrang, der Wirbelsaite (Chorda dorsalis), gebildet wird. Von dieser Achse strahlen gegen die Rücken- und Bauchseite hin Bogenfortsätze aus, die sich bald mehr bald minder vollständig zu Ringen oder Gewölben vereinigen und welche zum Schutze der Eingeweide bestimmt sind. Die obern Bogenbildungen schließen sich meistens am vollständigsten und bilden so eine Kapfel für das Gehirn und die höhern Sinnesorgane, den Schädel, und für das Rückenmark eine aus Spigbogen zusammengewölbte Röhre, den Rückenkanal, jedoch demnach die ganze obere Bogenbildung hauptsächlich nur zum Schutze des centralen Nervensystems bestimmt ist. Bei weitem nicht so fest schließen sich die untern Bogenhälften, welche zur Umhüllung der Eingeweide und der großen Blutgefäße des Körpers dienen, und meistens muß der Schluß bei ihnen durch große Strecken dazwischen ausgebreiteter Häute ergänzt werden. So stellt sich demnach bei einem queren Durchschnitte des Körpers die Wirbelsäule als die factische Achse des Körpers in diesem Kreise dar, zugleich zwei in die Länge gestreckte Höhlen durch ihre Bogen bildend, den Rückenkanal für das über der Chorda und den auf ihr und um sie sich entwickelnden Wirbeln gelegene Centralnervensystem, und die unterhalb gelegene Eingeweidehöhle für die vegetativen Organe. So sehr auch die fernere Ausbildung der Eingeweide wechseln und ihre Lage verändern mag, so finden sich dieselben doch stets ursprünglich in derselben relativen Lage, nämlich der Wirbelsäule zunächst angeheftet in der Mittellinie die großen Körpergefäße (Aorta, Hohlvene, Lymphstamm), zu beiden Seiten die Nieren und innern Geschlechtsheile, in der Mitte der Rumpfhöhle der Darm und am weitesten gegen die Bauchfläche hin, unmittelbar an der Wandung ihrer betreffenden Höhlen, die Leber und das Herz. Diese Lagerung der Theile, und namentlich die Stellung, welche das Nervensystem einnimmt, ist außerordentlich charakteristisch für die Wirbelthiere, indem bei dem Kreise, welchem ebenfalls ein zusammenhängendes, in der Mittellinie des Körpers liegendes Nervensystem zukommt, bei den Gliedertieren, dieses gerade in umgekehrter Weise, nämlich auf der Bauchfläche unter allen Eingeweiden gelagert ist, während das Herz die höchste Stelle an der Rückenfläche einnimmt und keinerlei Trennung durch ein inneres Skelet, wie bei den Wirbelthieren, vorhanden ist.

Nicht minder charakteristisch erscheint die Bildung der Bewegungsorgane für den Kreis der Wirbelthiere. Dieselben können gänzlich fehlen, sodas gar keine Glieder vorhanden sind und der Körper selbst mit der Fortsetzung der Wirbelsäule, dem Schwanze, der Ortsbewegung vorsteht, die stets möglich ist, indem es kein einziges Wirbelthier gibt, welches zu irgendeiner Zeit seines Lebens an den Boden festgeheftet wäre. Bei den meisten sind indessen eigene Extremitäten entwickelt, welche, stets paarig vorhanden, niemals die Zahl von vier überschreiten, zwei vordere, die Brustglieder, unmittelbar hinter dem Halse angebracht, und zwei hintere, die Beckenlieder, welche gewöhnlich an dem Ende der Bauchhöhle befestigt sind und durch ihren Gürtel, das Becken, dieselbe abschließen. Die

Modificationen, welche diese Glieder theils in dem Medium, in welchem die Thiere leben, theils die verschiedene Bestimmung derselben einerseits, andererseits mannichfaltig und können in den verschiedenen Gruppen oft mit Vortheil benützt werden. So sind diese Bestimmungen auch bei den niedern Extremität als Flosse, als Flugorgane, oder als Greiforgan benützt wird, fast im selben Plan ihrer Bildung derselbe und auch für die paarige identisch. Beide zeigen eine gewisse Schulter oder Becken, welche die Extremität in Lage erhält und mehr oder minder fest an der Säule befestigt; beide zeigen dann dieselbe Anordnung, indem an den Gürtel zuerst ein Knoch, Oberarm oder Oberschenkel folgt, welcher meist zwei Knochen des Vorder- oder Vorderchenkels trägt; auch dann, wenn diese Knochen in einen verschmolzen sind, läßt sich doch ihre ursprüngliche Trennung nachweisbar schwankender sind die Verhältnisse in der Antheilung der Extremitäten, der Hand oder des Fußes, welche zwar bei den höhern Formen antheilungen, der Wurzel, dem Mittelhande, den Fingern zusammengefaßt erscheint, aber Abweichungen zeigt. Im allgemeinen scheint die Zahl die ursprüngliche zu sein, und von dieser Reductionen stattzufinden.

Das Centralnervensystem, welches die Leitung aller im Körper befindlichen peripherischen darstellt, kann mit Ausnahme der Wirbelthiere (Amphioxus) in zwei Abtheilungen verschieden werden, das im Kopfe gelegene Gehirn und das im Rückenkanale liegende Rückenmark.

Bei den meisten Wirbelthieren lassen sich im Gehirn drei Hauptabtheilungen unterscheiden: Hinterhirn oder Nachhirn, aus dem das Rückenmark hervorgeht, welches unmittelbar mit dem Rücken zusammenhängt, und dem kleinen Gehirn gegenüber das Mittelhirn, die sogenannten Vierhäuler, und das Vorderhirn, das zum größten Theile den Hemisphären des großen Gehirns gegenüber steht, es entsprechen diese Theile wesentlich den menschlichen Sinnesorganen des Kopfes, das Hinterhirn der Nase, das Mittelhirn den Augen, den Ohren, und wenn auch mannichfaltige Abtheilungen in dieser Hinsicht vorkommen, so man doch meist bei dem Embryo diese Theile mit Deutlichkeit in den ersten Stadien des Centralnervensystems unterscheiden. Auf sich je nach der Stufe der Ausbildung, aus der ein Wirbelthier erhebt, vielfache Modificationen der Bildung erkennen, indem das Mittelhirn, das geringste Gewölbebedeutung zeigt, stufenweise während bei zunehmender Intelligenz die Größe des kleinen Gehirns, vorzüglich aber die des großen Gehirns eine so bedeutende Ausdehnung erhalten, daß letztere das Mittelhirn gänzlich verdrängen und in sich aufnehmen.

Bei den meisten Wirbelthieren kommen Sinnesorgane in mehr oder minder ausgebildeter Ausbildung vor. Am weitesten verbreitet ist, indem man bis jetzt nur ein einziges Wirbelthier kennt, das das niedrigste von allen kennt, welches auch die Nase, wenn zwar nicht fehlt, so bestimmt als Sinnesorgan zuweilen vorkommt und nur einen Luftweg für die Athmung bewirkt, während der innern Ausbildung lassen sich Sinnesorganen, die gewöhnlich paarweise

verschiedene Stufen nachweisen. So bildet die bei den meisten auf Wasserathmung angewiesenen Thieren einen geschlossenen Blindfad, während bei den Luftathmern stets in den Gaumen geöffnet und somit auch bei geschlossenem Maule einen Faden für die Lungen herstellt; — während bei niedriger Ausbildung des Geruchs sie sich nur als eine Höhle oder Blindfad zeigt, entwickelt sie bei höherer Ausbildung dieses Sinnes vielfache Neben- und gewundene Räume, auf deren auskleidende Schleimhaut der Nerven sich ausbreitet. Von der Wichtigkeit erscheint es aber, ob die Nase, in einigen niedersten Wirbelthieren, nur als ein einfaches Organ erscheint, oder ob sie, wie bei den höheren, doppelt vorhanden und symmetrisch ausgebildet ist.

Das Auge ist zwar überall mit Muskeln versehen, aber bei den niederen Typen nur eine äußerst geringe Beweglichkeit zeigen, während zugleich die Schutzorgane, und namentlich die Lider gänzlich fehlen oder unentwickelt sind; erst bei den höchsten Thieren erscheint es als Augapfel in besonderer Hülle, durch bewegende Muskeln nach allen Seiten hin, mit besondern Drüsenorganen (Tränen- und Schutzwehren (Lidern) versehen. Es ist eine Ausnahme des Amphibius, stets nur paarig vorhanden und überall ursprünglich angelegt, kann aber nach dem Gebrauche (bei Höhlenthieren) gänzlich rudimentär werden und dann sogar nicht mehr zur Aufnahme des Lichtindrucks, geschweige denn zur Führung von Bildern fähig sein. Die Ohren zeigen verschiedene Stufen der Ausbildung. Mit Ausnahme des Amphibius liegen sie überall paarig, im Innern des Kopfes, anfangs nur aus dem unvollständigen Gehör mit einem Vagengange gebildet. Erst später entwickeln sich noch zwei andere Vagengänge, dann die äußere und das innere Ohr, während durch Umgestaltung äußerer Theile (Kiemenbogen) das mittlere Ohr, Außenohr mit Gehör, sich bildet und endlich die drei höchsten Formen ein äußeres Ohr mit Gehörgang die Ausbildung vervollständigt.

Die Verdauungsorgane sind sehr mannichfaltig ausgebildet. Stets finden sich zwei entgegengesetzte Oeffnungen, Mund und After. Die Mundöffnung ist stets in vordere Theile des Körpers, meist etwas auf der Bauchfläche angebracht und immer nur mit einem oder Unterkiefer bemannet, der aus zwei in der Mittellinie verbundenen Hälften besteht und hauptsächlich von unten nach oben wirkt, ein wesentlicher Unterschied von den Gliedthieren, bei welchen stets zwei Kieferpaare vorhanden sind, die von den Seiten her gegeneinander sich bewegen. Nur bei sehr niedrigen Wirbelthieren, die eine durchaus niedere Stufe der Entwicklung einnehmen, fehlen die Kiefer gänzlich und durch besondere Lippenbildungen ersetzt. Die Bedeutung der Mundhöhle wechselt außerordentlich, bietet gerade dadurch vielfache Charaktere zur Unterordnung größerer und kleinerer Gruppen. Meist sind sie vorhanden von äußerst mannichfaltiger Structur und Anordnung; ganze Ordnungen und Klassen aber, wie die Schildkröten und Vögel, entbehren derselben und besitzen statt ihrer mehr oder minder scharfzählige, gewöhnlich mit Hornplatten besetzte Kiefer. Bei Säugethieren beschränkt die Zahnbildung sich auf die eigentlichen Kieferknochen, während bei den Fischen, Amphibien und Reptilien nicht nur Theile an der Bildung der Mundhöhle theilnehmende Gesichtsknochen, sondern auch einige Knochen des Schädelbassins und die Zunge mit Zähnen besetzt sein können. Vespere bildet meist einen mehr oder

minder deutlichen Vorsprung, der in dem Raume zwischen beiden Unterkieferhälften gelegen ist, an dem oft bedeutend entwickelten Zungenbeine eine feste Stütze findet und zwar fast überall einen eigenen Geschmacksnerven, den Zungenschlundkopfnerven (Nervus glossopharyngeus) erhält, sich aber meist doch mehr als ein Zast- oder Greiforgan entwickelt. Bei niederen Thieren erscheint die Zunge durchaus unbeweglich und an den Boden der Mundhöhle festgeheftet, während sie bei höhern sich mehr und mehr befreit und oft eine außerordentliche Beweglichkeit erhält. Meist erscheint sie mit dicke, hornigem Ueberzuge versehen; seltener ist sie, wie bei dem Menschen, weich und nicht nur zur Aufnahme von Geschmackseindrücken, sondern auch zur Modulation der Stimme geeignet. Nur bei wenigen zerfällt das Darmrohr in keine weiteren Abtheilungen, sondern setzt sich gerade, gleiche Weite behauptend, von der Mundhöhle zum After fort; meistens unterscheidet man drei Abtheilungen, den Munddarm, der gewöhnlich einen Schlundkopf (Pharynx) bildet, dann einen engeren Theil, Schlund (Oesophagus) und einen weitem, Magen (Stomachus), welche wieder mehrere Ausstülpungen bilden können, die man an der Speiseröhre als Kropf bezeichnet (Ingluvies), am Magen mit verschiedenen, ihrer Bildung entnommenen Namen (Mastmagen der Vögel, Netzmagen der Wiederkäuher u. s. w.) belegt. Meist ist der Magen mehr oder minder in zwei Theile geschieden, den Cardialtheil an der Speiseröhre und den Pfortnertheil (Pylorus) am Eingange des Darms. Der Mitteldarm, oft ungemein lang und gewunden, empfängt die Einmündungen der Nebendrüsen, Leber und Bauchspeicheldrüse oder deren Homologe, in dem sogenannten Zwölffingerdarm (Duodenum), setzt sich in den langen und engen Dünndarm (Ileum) und in den Dickdarm (Colon) fort, an dessen Beginn meist Ausstülpungen und Blinddärme entwickelt sind. Der Enddarm (Mastdarm, Rectum), oft durch besondere Faltenbildungen ausgezeichnet, mündet entweder gesondert oder mit den Urogenitalorganen gemeinschaftlich in einer Kloake; aber in beiden Fällen stets auf der Bauchseite. Die Bauchhöhle selbst kann durch Oeffnungen, die zuweilen besondere Verrichtungen übernehmen (z. B. Leitung der Geschlechtsproducte nach außen), mit dem umliegenden Medium in Verbindung stehen. Der Darm der Fleischfresser ist im ganzen stets kürzer und weniger complicirt als der der Pflanzenfresser.

Außer den in der Darmwand selbst gelegenen mannichfaltigen Drüsen finden sich am Munddarm Speicheldrüsen, die zwar oft ganz fehlen (Wasserthiere), häufig sogar aber ganz besondern Zwecken dienen (Speicheldrüsen der Schlangen). Die Leber ist fast überall als compacte Drüse vorhanden und erhält häufig nicht nur das vom Darne, sondern auch von andern Körperorganen zurückkehrende Blut als Pfortader zugeführt. Die Bauchspeicheldrüse (Pancreas) fehlt bei manchen niederen Wirbelthieren, oder ist, wie es scheint, durch besondere Ausstülpungen des Mitteldarms (Pfortneranhänge der Fische) ersetzt. Die Blutdrüsen, wie Milz, Schilddrüse, Thymusdrüse und Nebennieren sind nicht überall entwickelt; die Thymus sogar nur im jugendlichen Zustande der höhern Wirbelthiere.

Die Athemorgane zerfallen in zwei große, morphologisch nicht vergleichbare Gruppen, je nach der Athmung im Wasser oder in freier Luft. Die Kiemen entwickeln sich am Anfange des Schlundkopfes auf den Schlund umfassenden Kiemenbogen, auf welchen direct vom Herzen kommende Gefäße verlaufen, die auf Fortsätzen in Gestalt von Bäumchen, Blättchen,

Rotten oder Kolben sich in Capillarneze auflösen, deren Blut mit dem umgebenden Wasser in Wechselwirkung tritt und Sauerstoff daraus aufnimmt, während es Kohlensäure abgibt. Meistens sind diese Gefäßbögen durch knöcherne oder knorpelige, dem Zungenbeine angehörige Bögen gestützt und durch Spalten, welche von außen her bis in den Schlund führen, voneinander getrennt. Mechanische Vorrichtungen verschiedener Art bewirken während des Lebens eine beständige Strömung des Wassers durch diese Kiemen-spalten und eine stete Erneuerung desselben im Umkreise der athmenden Blättchen.

Bei den höhern Wirbelthieren entwickeln sich die Kiemenbögen nicht als solche, sondern nur als Visceralsbögen im Embryonalzustande; sie dienen niemals der Athmung, bilden keine respiratorischen Capillarneze und werden später zu andern Bildungen (mittleres Ohr, Kehlkopf, Schlundkopf u. s. w.) verwendet. Dagegen entstehen Ausfaltungen des Munddarms, bei den niedern Thieren auf der Rücken- und bei den höhern Thieren auf der Bauchseite desselben und dann meist nicht zur Athmung verwendet (Schwimmblase der Fische); bei den höhern dagegen als Ausfaltungen auf der Bauchseite zu Lungen ausgebildet. Diese sind mehr oder minder zellige Säde, die stets so gebaut sind, daß die eingeathmete Luft durch denselben Weg, Luftröhre, Kehlkopf, Mund- oder Nasenhöhle, wieder ausgeathmet wird.

Die in den Lungen enthaltene Luft kann zuweilen (Vögel) durch dünnhäutige Kanäle mehr oder minder in den Körper vertheilt werden. Bei allen Luftathmenden Thieren bildet die Nase den normalen Luftweg, der in dem Schlundlopf den Nahrungsweg, welcher aus dem Mund in den Schlund geht, durchkreuzt. Hier bildet sich der Kehlkopf (Larynx) aus, der durch besondere Vorrichtungen (Stimmrinne, Stimmbänder u. s. w.) zugleich Stimmorgan wird. Das aus dem Herzen ausgetriebene Körperblut vertheilt sich in der Lunge in reiche Capillarneze, tritt mit der Luft in Wechselwirkung durch Abgabe von Kohlensäure und Aufnahme von Sauerstoff, und kehrt zum Herzen zurück.

Es begreift sich leicht, daß bei dem vielfachen Wechsel in der Structur der Athmorgane auch in den Organen des Kreislaufs mancherlei Verschiedenheiten vorkommen. Mit einer einzigen Ausnahme (bei dem Lanzettfischchen, Amphioxus) ist das Blut bei allen Wirbelthieren purpurroth gefärbt, und zwar hängt diese Färbung einzig von den Blutkörperchen ab, dünnen, scheibenförmigen Formelementen von runder oder elliptischer Gestalt, die sich nur mittels des Mikroskops erkennen lassen und in der farblosen Blutflüssigkeit suspendirt sind. Ein Herz als Centralpunkt für die mechanische Fortbewegung des Blutes fehlt nur einem einzigen der bekannten Wirbelthiere (Amphioxus), bei welchem seine Druckkraft durch die Contractilität der großen Gefäßstämme ersetzt ist; bei fast allen übrigen ist das Herz mit seinen verschiedenen Abtheilungen das einzige Organ, das durch die Zusammenziehung seiner Muskelfasern das Blut durch die Gefäße hindurch treibt. Bei den durch Kiemen athmenden Wirbelthieren ist diese muskulöse Druck- und Saugpumpe stets in dem Bereiche des venösen Kreislaufs so angebracht, daß das aus den Organen des Körpers zurückkehrende Blut zuerst in eine Vorlammer und dann in die eigentliche Herzkammer eingelassen wird, aus der es durch einen, häufig muskulösen Theil, den Vulsus, in die Gefäßbögen der Kiemen getrieben wird; bei den durch Lungen athmenden Wirbelthieren scheidet sich das Herz nach und nach in zwei Hälften, jede aus einer Vorlammer und

Kammer bestehend, und von denen die eine, dem Kiemenherzen der Fische entspricht, den venösen Ströme angebracht, das vom Körper zurückkehrende Blut aufnimmt und es in die Lungen während die linke Hälfte, als bewegender Theil des arteriellen Stroms, das Blut aus den Lungenorganen empfängt und es in den Körper abgibt. Die verschiedenen Stadien der allmählichen Entwicklung der beiden Herzhälften, welche sich bei Säugern und Vögeln vollkommen ausgeführt findet, sind besonders bei Amphibien und Reptilien in der Mannichfaltigkeit wahrnehmen, indem dort noch minder bedeutende Communicationsöffnungen: Herzen oder in der Nähe desselben vorhandene, wodurch sich die beiden Blutarten in größerem oder geringerem Maße miteinander vermischen können, bald die Scheidung der beiden Herzhälften durchgeföhrt ist, erscheint auch als äußeres Kennzeichen die constante eigene Temperatur der Thiere, die sich als warmblütige (Säugethiere und Vögel) von den kaltblütigen unterscheiden, deren Körper der äußern Temperatur wechselt. Bei allen Thieren sind übrigens die peripherischen Blutgefäße vollkommen geschlossen und überall gesondert vorhanden, in welchen das Blut strömt. Man hat noch solche Unterbrechungen der Continuität und Ersatz der mangelnden Gefäße durch Gefäßgefunden, wie dies bei den meisten wirbellosen Thieren vorkommen pflegt; namentlich findet sich zwischen den arteriellen und venösen Gefäßen ein Netz seiner Capillare oder Haargefäße, welche äußerst dünne Wandungen die Umgehung im Körper geschieht. Als ein den Wirbelthieren thümlicher Anhang des Gefäßsystems, der nicht bei allen nachgewiesen ist (Amphioxus), das Lymphgefäßsystem da, welches die circulirenden Flüssigkeiten in eigene Stämme, die schließlich in die vom Körper zum Herzen gehenden Blutbahnen münden. Meistens bildet dies System vielfach gestreute Drüsen; bei einigen Thieren sind noch besondere Druckkräfte (Lymphherzen) demselben angebracht.

Von besonderer Bedeutung erscheinen die Geschlechtsorgane, deren absondernde Drüsen, die zunächst an der Wirbelsäule liegen. Sie sind hauptsächlich zur Absonderung der stichtödtlichen Fortpflanzungsstoffe des Körpers bestimmt und stehen theils durch die Wolffschen Körper oder Utrikeln bei allen Embryonen vorkommen und bei den Wirbelthieren sich zum Theil bleibend erhalten durch deren Ausführungsgänge in enger Verbindung mit den Geschlechtsorganen, sodaß verschiedene derselben bei verschiedenen Thieren und verschiedenen Geschlechtern desselben Thiers verschiedene Funktionen erhalten, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann. Bei den niedern Wirbelthieren verlaufen die Nieren zu dem Blute, das aus der hinteren Hälfte zurückströmt, ähnlich wie die Leber zu dem Blute — es existiren Nieren-Vorträger. Die Nierenleiter münden häufig in eine Harnblase, welche der vordern Wand des Enddarmes als Anhang entsteht; ihre Öffnungen wandern übrigens nach der hintern Seite des Darms, wo sie oft eine besondere Ausmündung haben, auf die Atoate und die vordere Seite derselben, um schließlich in die Geschlechtsorgane gemeinschaftlich nach außen zu münden.

Was die Zeugung und Fortpflanzung betrifft, so findet niemals, wie bei den wirbellosen Thieren häufig, ungeschlechtliche Fortpflanzung, sondern

ammenbildung statt, sondern überall nur ge-
 die Fortpflanzung durch Befruchtung von weib-
 tern mittels des männlichen Samens. Mit-
 ne einiger weniger Fische (Serranus) sind stets
 schlechter auf verschiedene Individuen verteilt,
 Männchen und Weibchen häufig durch äußere
 hen unterschieden. Die leimbereitenden Ge-
 theile, Hoden und Eierstöcke, liegen stets, wie-
 en, ursprünglich unmittelbar zu beiden Seiten
 rchelsäule, wechseln aber oft die ursprüngliche
 g. Oft fehlen alle ausführenden Kanäle;
 chlechtsproducte, Samen und Eier, gelangen
 in die Bauchhöhle und werden von dort durch
 gen nach außen entleert. Bei den meisten
 en Wirbelthieren aber sammeln sich die Samen-
 des Hodens in die Nebenhoden und dann in
 Samenleiter, welche oft noch manche drüsige Neben-
 e (Samenbläschen, Prostata) am Ende besitzen.
 Samenleiter selbst öffnen sich bald selbständig
 dem After (viele Fische), bald mit Harnleitern
 arm in die Kloake, oder sie münden gemein-
 mit den Harnorganen, aber getrennt von dem
 nach außen. Begattungsorgane fehlen bei
 Wirbelthieren gänzlich, selbst bei solchen, bei
 die Eier innerhalb der weiblichen Geschlechts-
 entwickeln und mithin auch dort befruchtet wer-
 en. Da wo männliche Begattungsorgane
 en, sind dieselben meistens einfach, seltener
 und ihre Beziehungen zu den Samenleitern
 ihre sonstige Bildung äußerst mannichfaltig.
 vielfach wechseln die Formen der weiblichen
 Geschlechtsorgane, zumal da hier die Beziehungen zur
 ung der Jungen noch mannichfaltiger werden,
 namentlich diejenigen Gebilde, welche die
 rung der Eier bewerkstelligen, mannichfach
 ert werden. Sehr häufig finden sich in den
 en besonders ausgebildete Stellen vor, von
 die einen durch drüsige Wände zur Bildung
 rer Höhlen um das Ei, die andern zur Her-
 von Neststätten zur innern Verbrütung ge-
 erscheiden, und ebenso mannichfaltig wie diese
 und Erweiterungen erscheinen auch die weib-
 Begattungsorgane in ihrer Formgestaltung. Bei
 Wirbelthieren ohne Ausnahme herrscht eine ge-
 riobidität von längerer oder kürzerer Dauer
 Geschlechtsfunction, welche sich namentlich bei
 eibchen durch die Ausstoßung der Eier zu ge-
 eiten kundgibt. Die Heranbildung der Eier
 e, ihre successive Ausbildung bis zur end-
 rennung und ihre Ausstoßung durch die Ei-
 geschieht überall selbständig und selbst dann,
 eine Befruchtung stattfindet; die Befruchtung
 er kann in zwei verschiedenen Stadien der Ei-
 eintreten. Bei den einen nämlich, und
 gehören die meisten Fische und Amphibien,
 die Eier gänzlich ausgestoßen und ihre Be-
 g geschieht erst außerhalb, meistens in dem
 fische, wo sie aus der Geschlechtsöffnung des
 ens hervortreten; bei den andern wird durch
 sehr oder minder innige Begattung die be-
 de Flüssigkeit in das Innere des weiblichen
 smus eingeführt und die Eier kommen auf
 nem Punkte ihrer Wanderung bald ganz in
 che der Eierstöcke, bald weiter von denselben
 mit dem Samen in Berührung. Es versteht
 sich selbst, daß diese Weise der Befruchtung überall
 en muß, wo das Junge sich innerhalb des
 weiblichen Organismus bis zu einem gewissen Grade
 et, zuweilen findet indeß dieselbe auch da statt,
 e Entwicklung des Embryo erst nach der voll-

ständigen Ausstoßung des Eies beginnt. In der Be-
 ziehung der Frucht zu dem mütterlichen Organismus
 lassen sich ebenfalls mehrere Verschiedenheiten von
 großem Gewichte nachweisen. Bei den meisten Wir-
 belthieren erhält das Ei von dem Eierstocke so viel
 Dottersubstanz mit, daß der Embryo sich vollständig
 auf deren Kosten ausbilden kann und keiner weitem
 Stoffzufuhr, sei es von seiten des mütterlichen Or-
 ganismus oder von außen her, bedarf. In diesen
 Fällen wird das Ei gewöhnlich noch in dem Eileiter
 von verschiedenen Hüllen, von Eimeiß und Schalen-
 bildungen, eingeschlossen und dann nach der Aus-
 stoßung in solche Verhältnisse gebracht, welche zur
 Entwicklung des Embryos nothwendig sind, wozu
 namentlich ein gewisser Grad von Wärme und Feuchtig-
 keit und der Zutritt von Sauerstoff gehören; Be-
 dingungen, die sich bald von selbst finden, bald, wie
 bei den brütenden Thieren, von den sorgsamern Eltern
 beschafft werden. Bei dem andern extremen End-
 punkte dieser Beziehungen zwischen Mutter und Frucht
 findet sich bei dem ursprünglichen Ei nur eine kleine
 Dottermasse vor, ungenügend, die Ausbildung des
 Embryos zu bestreiten, der dann durch besondere Ge-
 fäße in innige Wechselwirkung mit den Gefäßen des
 mütterlichen Organismus tritt und aus dem Blute
 desselben die zu seiner Ausbildung nöthigen Stoffe
 bezieht. Zwischen diesen beiden Verhältnissen liegen
 mannichfache Zwischenstufen, indem bei den einen es
 nur auf äußere Zufälligkeiten ankommt, ob die losen
 Eier sich außerhalb oder innerhalb des mütterlichen
 Organismus entwickeln, während bei andern die
 Entwicklung im Innern zwar Regel ist, der Embryo
 oder das Ei aber deshalb in keine nähere Verbindung
 mit den Organen tritt, sondern frei in der Höhle des
 Eileiters liegt und nur durch Aufsaugung aus der
 Flüssigkeit, welche diese erfüllt, sich weitere Stoffe an-
 eignen kann.

Die Entwicklung des Embryo geschieht bei
 dem Kreise der Wirbelthiere allgemein nach einem ge-
 meinschaftlichen Grundplane, der sich indessen bei den
 verschiedenen Klassen und Ordnungen in mannichfacher
 Weise modificirt. Ueberall ist der Dotter von einer
 deutlichen Dotterhaut umgeben, die zuweilen sogar
 eine ziemlich bedeutende Dike erreicht und die all-
 mählich verschwindet, sobald der Embryo sich seine
 Hüllen aufgebaut hat.

Für die Entwicklung selbst sind manche Züge charak-
 teristisch. Vor allen Dingen die Bildung einer innern
 Achse, aus dem Centraltheile des Skelets, der Rücken-
 seite oder Chorda bestehend, welche sich überall bildet
 und bei vielen niedern Wirbelthieren das ganze Leben
 hindurch besteht, bei den andern allmählich durch die
 Wirbelsäule ersetzt wird. Mit dieser Bildung steht im
 innigsten Zusammenhange die Lagerung der Organe,
 und speciell des Dotters, d. h. des Bildungs- und
 Ernährungsmaterials, welches der Embryo in dem
 Ei mit erhält — auf der Rückenseite der Chorda findet
 sich stets das Centralnervensystem, welches sogar vor
 der Chorda angelegt wird; auf der Bauchseite die
 vegetativen Organe und mit ihnen der Dotter, der
 also bei allen Wirbelthieren bauchständig ist und häufig
 in einem besondern, innern oder äußern Sacke ab-
 geschnürt wird. Charakteristisch ist ferner das frühe
 Auftreten des Herzens und der Blutcirculation, wäh-
 rend bei den meisten Wirbellosen das Herz entweder
 gar nicht sich ausbildet oder sehr spät erscheint. Ebenso
 sind charakteristisch für alle Wirbelthier-Embryonen die
 am Munddarm sich bildenden Visceralspalten und
 Visceralbögen, welche bei den einen wirkliche Athem-
 organe, Kiemenpalten und Kiemenbögen werden, bei

den andern aber, ohne je Athemfunction zu erhalten, später zur Bildung anderer Organe verwendet werden. Von besonderer Bedeutung für die höhern Wirbelthiere ist endlich die Bildung zweier, vom Embryo selbst ausgehender Hüllen, von denen die eine eine Fortsetzung der äußersten Lage der Oberhaut bildet, während die andere aus den später dem Urinssysteme angehörigen Bildungen hervorgeht. In der That bildet sich die Schafshaut oder das Amnion in der Weise, daß die äußere Zellenlage der Haut sich an die Innenfläche der Eihaut anlegt und in dem ganzen Umkreise des Dotters mit derselben verwächst, da aber, wo der Embryonalkörper sich befindet, sich allmählich abzieht, zusammenwächst und gänzlich abschneidet, so daß ein vollkommen geschlossener Sack um den Embryo herum gebildet wird. Die andere, mehr minder ausgebildete Hülle, die Harnhaut oder Allantois, entsteht als Ausstülpung der vorderen Wand der Kloake und ist dazu bestimmt, die Gefäße des Embryo nach außen zu leiten und den Austausch zwischen dem Embryonalblute einerseits und den umgebenden Medien andererseits zu vermitteln. Dieser Austausch beschränkt sich bei den Eiern von Reptilien und Vögeln, wo der Dotter den Bildungsstoff des werdenden Embryo enthält, wesentlich nur auf Gase, also auf Athmung, während bei den Säugethieren, wo die Dottersubstanz nicht genügt, zugleich Ernährung und Athmung durch die Gefäße der Harnhaut und der aus ihr theilweise hervorgehenden Bildungen vermittelt wird.

Die Wirbelthiere stellen einen in sich abgeschlossenen Kreis dar, dessen eigenthümlicher Organisationsplan, nach den jetzigen Untersuchungen, nur zu einer einzigen Gruppe wirbelloser Thiere entfernter Beziehungen hat, nämlich zu den sogenannten Mantelthieren (Tunicaten) und auch hier nur zu der beschränkten Familie der Seecheiden. In der That erscheint bei diesen während der Embryonalentwickelung ebenfalls eine Chorda als Achsenstrang, auf deren einer Seite sich das centrale Nervensystem, auf der andern die Anlagen der vegetativen Organe ausbilden. Darauf beschränkt sich aber auch die ganze Gleichartigkeit der Bildung, indem von dieser ersten rudimentären Bildung an beide Typen sehr geordnete Wege wandeln, die Seecheiden den ursprünglichen Wirbelthiercharakter verlassen, und die Chorda als Schwanz wegwerfen, während im Gegentheile die Wirbelthiere das innere Skelet und die weiteren Bedingungen des Wirbelthiercharakters ausbilden. Da Wirbelthiere schon in den obern Stadien des stürischen Systems auftreten, so kann man nur sagen, daß der eigenthümliche Organisationsplan derselben schon in der frühesten Zeit hervorgetreten ist.

Wir theilen die Wirbelthiere ein, indem wir die schon früher durchgeführte und jetzt auch allgemein angenommene Trennung von Amphibien und Reptilien festhalten und zugleich mit Haeckel die Fische in drei Klassen zerlegen:

Stiel.	Hauptklasse.	Klasse.
Wirbelthiere (Vertebrata.)	Höhere Wirbelthiere. (Amniota oder Allantoidea.)	Säugethiere. (Mammalia.) Vögel. (Aves.) Eiseltier. (Reptilia.)
	Niedere Wirbelthiere. (Anamniota oder Anallantoidea.)	Fische. (Amphibia.) Fische. (Pisces.) Rundmäuler. (Cyclostomata.) Blutheizer. (Leptocardia.)

Höhere Wirbelthiere.

(Amniota oder Allantoidea.)

Bei dem Embryo wird eine Schafshaut (Amnion) und eine Harnhaut (Allantois) ge-

bildet. Die Visceralbogen tragen Kiemenblättchen. Athmung nur durch Lunge. Die Schädelbasis zeigt in der Mitte Beugung (Kopfbeuge) im embryonalen Stande. Keine Larvenbildungen. Ein Arterienstiel (Bulbus arteriosus) Herzen.

Die allgemeinen Charaktere wurden über Man kann aber unter den Klassen, welche diese Klasse bilden, noch zwei Gruppen unterscheiden, höhern, Säugethiere und Vögel, mit vollständigem Körper und Lungenkreislauf und auch mit warmem Blute, und die Reptilien, vollkommen geschiedenem Kreislauf und kaltem Blute.

Warmblüter.

Mit vollkommen getrenntem Lungen- und Blutkreislauf.

Klasse der Säugethiere (Mammalia).

(Tafel 1 bis 11.)

Warmblütige, mehr oder minder hoch entwickelte Wirbelthiere, welche Luft durch in der Lunge gelegene Lungen athmen, lebende Junge gebären und dieselben durch Lungenatmung der nach außen sich entleeren Milchdrüsen aufsaugen. Brust- und Bauchhöhle sind durch eine quere, muskulöse Scheidewand, das Zwerchfell, getrennt.

Die Körperformen sind sehr verschieden, meistens wenigstens drei Regionen unterscheidbar: Hals, Stamm, der die beiden Hauptglieder des Körpers enthält und sich nach hinten in den Schwanz übergeht. Die Achse des Stammes wird meist durch einen Wirbelstrang getragen und richtet sich nur in den menschlichen Affen auf, um endlich im Menschen die aufrechte Stellung zu erlangen. Von der spindeelförmigen Gestalt der Wale aus geben die Formen der Säugethiere zahlreiche Abweichungen ab, in denen jedoch meistens als Princip feststeht, daß die Extremitäten frei schwebend über dem Körper getragen werden.

Die Haut besteht aus einer zelligen Epidermis und einer Gefäße und Nerven enthaltenden Lederhaut (Cutis). In der ersten tritt eine mehr verhornte, äußere Schicht und eine schleimig-faschig unterseiden, in deren weichen häufiger Fasern abgelagert sind. Die Haut stellt zuweilen ein grobmäschiges, von drüsenreiches Gewebe dar, wird aber in andern Fällen sehr dicht und fest. Die Haare sind gemein und bedecken meist den ganzen Körper. In Ausnahmefällen (Wale) sind sie auf gewisse Stellen, z. B. die Lippen, beschränkt. Zuweilen tritt eine besondere Einsenkung der Haut (Haarbalg), die oft bis unter die Lederhaut reicht und sitzen mit einer zwiebelartig verdickten, einem gefäßreichen Warzen auf, von denen das Wachsthum des Haares forthreitet. Die Haare scheiden: Flaumenhaare, fein und gestreckt; fein und spiralförmig gebogen; Stachelhaare, minder grob und gerade; Vorsten und Stachelhaare aus den Stachelhaaren durch zunehmende Vergrößerung hervorgehen. Häufig, besonders an den Ohren u. s. w. entwickelt sich der Nervengefäßhaare bedeutend und bildet so die Schnurrhaare an den Lippen), welche die Empfindungen vermitteln. Außer diesen verbreiteten Haarbildungen entwickelt die Haut durch Verdickung und Verhornung, und die Wale ebenso allgemein an den

maßen Gebilde, welche mit der Lebensweise der in enger Beziehung stehen und die wir als *Daumen* (Unguis lamnaris), *Kuppennägel* (Unguis ris), *Krallen* (Fulcula) und *Hufen* (Ungula) bezeichnen. Weniger allgemein sind *Schwien* an den Ebenen, besonders *Drüsen* ausgefalten Körper, welche sich zu *Schuppen* oder zu *Hornbeigen* von Knochenauswüchsen oder selbständigen *Drüsen* entwickeln können. Stets finden sich in der *Haut* *Drüsen*, von welchen die einen (Salgdrüsen) meist in den *Haarbalg* selbst einmünden und *Drüsen* gewissermaßen einleiten, die andern (Schweißdrüsen) häufiger fehlen. Zu vielen Fällen entwickeln sich in besondern Körperstellen, oft in besondern Ausbuchtungen der *Haut*, *Drüsen*, die meist eine mehr oder minder *abstieghende* *Schmüre* absondern und in Verbindung mit der *Geschlechtsfunction* in Beziehung stehen.

Das *Skelet* besteht aus *Knochen*, welche eine festere *Substanz* und innere mit *Mark* gefüllte *Zellen* bezeichnen. Die letztern dehnen sich in den *Wirbelsäulen* gewöhnlich zu einer einzigen *Höhle*, der *Wirbelsäule*, aus. Der *Kopf* wird aus dem *Schädel* und dem *Unterkiefer*, der daran beweglich angehängt ist, von unten nach oben, freilich mit größerer oder geringerer seitlicher Abweichung, wirkt, gebildet. Der *Schädel*, dessen *Knochen* durch *Nähte* miteinander verbunden sind, die nur im *Alter* oder auch (beim *Wachsthum*) früher verwachsen, ist an dem *Hinterkopfe* durch zwei *Gelenkhöden*, die neben dem großen *Wirbelsäule* stehen, mit der *Wirbelsäule* eintritt. Er besteht aus zwei *Theilen*, der das *Gehirn* umschließenden *Hirnhöhle* und dem *Gesichtstheile*, welcher die *Sinnesorgane* und den *Eingang* der *Verdauungsorgane* umschließt. *Keilbein* und *Hinterbein* verschmelzen fast bei allen früh; die *Stirnhöhle*, welche oft *Zapfen* von *Hörnern* oder *Stacheln* von *Seiwischen* tragen, und die *Zwischenbeine* nur bei den höchsten Ordnungen oder erst im *Alter*. Das *Verhältnis* zwischen *Gehirn* und *Gesicht* ist sehr wichtig — je weiter vom *Ursprunge* abwärts, desto geringer wird erstere im *Verhältnis* zu letzterer. Die *Wirbelsäule* besteht aus *Wirbeln*, nur bei *Faultieren* vordere Abweichungen stets nur aus sieben *Wirbeln*. Auf dem ersten, *Atlas*, bewegt sich der *Kopf* aufwärts und *Niederwärts* mittels der beiden *Fortsätze* des *Hinterhauptes*; die seitliche Bewegung des *Kopfes* geschieht, indem der *Atlas* mit dem *Schädel* sich um einen vorpringenden *Zahn* des *Wirbels* dreht. Die *Zahl* der *rippentragenden* *Wirbel* wechselt zwischen 10—23; sie haben meist, besonders im *Nacken*, hohe *Dornfortsätze*; die *Rippen* sind nicht alle das *Brustbein*; nur die vordern mit demselben durch *Gelenke*, die hintern durch *Knochenstäbe* verbunden; die letzten, sogenannten *Rippen* sind nur an den *Wirbeln* eingelenkt. *Lendenwirbel* (2—9) haben breite *Querfortsätze*; die *Kreuzwirbel* (3—9) sind meist verwachsen; *Schwanzwirbel* wechseln außerordentlich an *Gestalt* und *Zahl*.

Zu Ausnahme der *Cetaceen* finden sich überall *Extremitäten*, deren *Bau* zwar einen allgemeinen *Plan* zeigt, der aber durch *Anpassung* an verschiedene *Lebensweisen* außerordentlich wechselnde *Aussehen* zeigt. Auch bei den *Cetaceen* finden sich *Extremitäten*, im *Fleische* verdeckt, sehr kleine *Knochen* als *rudimentäre* der *hintern Extremität*. *Weibliche* *Extremitäten* sind einander vollkommen homolog und unterscheiden sich dadurch, daß die obere mehr oder

minder um ihre *Längsachse* gerollt ist. Sie bestehen aus dem *Gürtel* (*Schultergürtel* oder *Beden*), *Mittelhaut* (*Oberarm* und *Unterarm*; *Oberschenkel* und *Unterschenkel*) und *Endtheil* (*Handwurzel*, *Mittelhand*, *Finger*; *Fußwurzel*, *Mittelfuß* und *Zehen*). Gegenüber den andern *Amnioten* zeigt der *Schultergürtel* eine bedeutende *Reduction*, indem er gewöhnlich nur aus einem *Knochen*, dem *Schulterblatte*, besteht, und zwar immer da, wo der *Vorfuß* nur als *Stütze* dient; sobald verwickeltere Bewegungen erzielt werden, welche die *Hand* als *Greiforgan* auftreten lassen, bildet sich das *Schulterbein* als eigener *Knochen* aus; ein *Knochen* (*coracoideum*) existiert nur bei den *Kloakenthiere* als *Ursprung* der *Reptilienbildung*. *Oberarm* (*humerus*) und *Oberschenkel* (*femur*) sind meist kurz und im *Fleische* verdeckt; der *Unterarm* und der *Unterschenkel* ursprünglich aus zwei *Knochen*: *Elle* (*Ulna*) und *Speiche* (*Radius*), *Schienbein* (*Tibia*) und *Wadenbein* (*Fibula*), gebildet, doch verschmelzen diese *Knochen* häufig, wenn die *Beinanzahl* abnimmt, so daß *Speiche* und *Wadenbein* nur als dünne *Griffelfortsätze* erscheinen. *Aehnliche*, mit der *Reduction* der *Beinanzahl* in Verbindung stehende *Reductionen* kommen bei *Hand- und Fußwurzel*, sowie bei *Mittelhand* und *Mittelfuß* vor. Die *Normalzahl* der *Bein* ist fünf, und es ist wahrscheinlich, daß dieselbe bei allen *Embryonen* wenigstens virtuell angelegt wird; in Wirklichkeit aber variiert die *Zahl* der *Bein* von 5 bis 1, und zwar geschieht diese *Reduction* nach zwei abweichenden Richtungen. Bei den einen, den *Paarfüßern* (*Artiodactyla*), geht die *Reduction* darauf hin, die zwei *mittlern Finger* allein übrig zu behalten und die andern nach und nach verschwinden zu lassen, wie bei den *Wiederkäuern*; bei den andern, den *Unpaarfüßern* (*Perissodactyla*), verschwinden nach und nach alle *seitlichen Finger*, so daß zuletzt nur die *Mittelfinger* den *Boden* berührt (*Pferde*). Die *Mittelzahlen* zwischen diesen beiden extremen *Reductionen* und der ursprünglichen *Fünffzahl* sind bald aus der einen, bald aus der andern *Richtung* hervorgegangen. Von besonderer Wichtigkeit erscheinen die *Umbildungen* der *Extremitäten* in Beziehung auf die *Lebensweise* und die *Arbeitstheilung*, die dadurch documentirt wird, daß nur das eine *Extremitätenpaar* zu bestimmten, das andere zu andern Zwecken benutzt wird, wie z. B. das vordere bei den *Fledermäusen* nur als *Flugorgan*, das hintere nur als *Klaamorgan*, oder das vordere beim *Menschen* nur als *Greiforgan*, das hintere nur als *Stütz- und Bewegungsorgan*. Auf die *Bildung* der *Extremitäten* stützt sich zu großem Theile die *Klassifikation* der *Säugethiere*, so daß bei den einzelnen Ordnungen näher darauf eingegangen werden muß.

Das *Centralnervensystem*, aus *Gehirn* und *Rückenmark* bestehend, ist ebenso wie das *peripherische System* der *Cerebrospinalnerven* und des *sympathischen Systems* hoch entwickelt. Bei den *niedersten Säugethieren* (*Monotremen* und *Beuteltiere*) ist das *Großhirn* glatt und ohne *Windungen*, der *Ballen* (*Corpus callosum*) rudimentär, *Vierhügel* und *kleines Gehirn* unbedeutend und letzteres namentlich in seinem *Mitteltheile* entwickelt, wie bei den *Vögeln*. Nach und nach treten die *Zurückungen* und *Windungen* des *Großhirns* in verschiedener *Richtung* entwickelt auf und werden in ihrer *Vermehrung* und *Ausbildung* theils von der *Ausbildung* des *Hirns* selbst, wie von den *Größenverhältnissen* bestimmt. Die letzte Stufe der *allmählichen Hirnentwicklung* wird bei dem *Menschen* erreicht, wo die *Hirnhemisphären* das *kleine Gehirn* vollständig bedecken und überragen, *Ballen* und *Varolsbrücke* wohl entwickelt, das *Kleinhirn* besonders in seinen *Seiten-*

theilen ausgebildet und die Windungen im höchsten Grade complicirt sind.

Die höhern Sinnesorgane sind stets paarig gebildet und am Kopfe gelegen; die Nasenhöhlen, die zugleich als Luftwege dienen, meist an der Spitze der Schnauze über den Lippen von knorpeligen und weichen Theilen beweglich umgeben, die innern Schleimhäute durch Faltungen complicirt. Nur bei den im Wasser lebenden Cetaceen ist die Nase nur Luftweg und nicht Geruchsorgan. Die Augen sind bei einigen unterirdischen Thieren gänzlich rudimentär und unter der Haut verborgen, bei andern nur klein, bei den Nachtthieren am größten; bei fast allen an den Seiten des Kopfes gelegen, so daß die Seehäsen nur bei den höchsten Typen (Mensch, Affe) auf einen Punkt gerichtet werden können und dadurch stereoskopische Bilder möglich sind. Außer den beiden menschlichen Augenlidern ist das dritte am innern Augenwinkel (Nidabaut) meist mehr entwickelt. Die Pupille ist meist rund, bei Grasfressern, die Ebenen bewohnen, oft quer länglich, bei Kletterthieren (Klagen) häufig senkrecht oval. Das äußere Ohr fehlt selten und ist meist mit einer sehr beweglichen, zuweilen ungemein großen Ohrmuschel versehen, die von Knorpeln gestützt wird. Die Paukenhöhle mit der Kette der Gehörknöchelchen und der in die Nasenhöhle mündenden Eustachischen Trompete, die Schnecke und die drei halbkugelförmigen Canäle erreichen ihre höchste Ausbildung.

Der Eingang der Verdauungswerkzeuge, der Mund, ist meistens von weichen Lippen und Backen umgeben, in welchen letztern sich zuweilen Taschen zum Aufspeichern der Nahrung befinden. Nach oben wird die Mundhöhle durch den knöchernen und häutigen Gaumen von der Nasenhöhle getrennt, nach unten in dem Zwischenraume zwischen den beiden Ästen des Unterkiefers von der an ihrer Spitze und den Rändern meist freien Zunge geschlossen, die zuweilen auch als Greiforgan entwickelt ist. Zähne finden sich ursprünglich wahrscheinlich bei allen Säugern angelegt, kommen aber bei manchen (Wale, Schnepptiere) nicht zur Entwicklung. Sie stehen fast immer in Zahnhöhlen (Alveolen) des Zwischen-, Ober- und Unterkiefers und sind mit geringer Ausnahme (Marwal) symmetrisch auf beiden Seiten und häufig auch oben und unten in gleicher Zahl und ähnlicher Gestalt ausgebildet. Nur bei den Säugethieren kommen zwei- und mehrwurzelige Zähne vor. Hinsichtlich des Alters gibt es, fast ohne Ausnahme, ein provisorisches Milchgebiß, das nach einiger Zeit abgeworfen und gegen ein definitives Gebiß umgetauscht wird. Das Milchgebiß ist gewissermaßen ererbtes Familieneigenthum und gleicht mehr dem definitiven Gebiß der Vorfahren; das definitive Gebiß ist der bestehenden Gattung eigenthümlich als Erwerb. Der Stellung und Form nach unterscheidet man: Gleiche Zähne, wo die ganze Zahnreihe dieselbe Form der Kronen zeigt (Delpnine), und ungleiche Zähne. Unter diesen letztern unterscheidet man: Schneidezähne (*Dentes incisivi*), meist meißelförmig; sie stehen oben im Zwischenkiefer, unten an dem entsprechenden Theile des Unterkiefers; Eck- oder Hundszähne (*Dentes canini*), von Keil-, Haken- oder Hauerform, die, wenn entwickelt, über die andern Zähne hervorragend und in Lücken derselben eingreifen. Schneide- und Eckzähne haben stets entweder gar keine oder nur einfache Wurzeln. Backenzähne (*Dentes molares*), meist zwei oder mehrwurzelig, mit flachen, stumpf- oder spitzhöckerigen oder schneidenden Kronen. Unter diesen unterscheidet man wieder die vordern, welche wie die Schneide- und Eckzähne gewechselt werden, als falsche Backenzähne oder Lückenzähne (*Dentes*

praemolares oder *spurii*) und die hintern Mahlzähne, die erst nach dem Milchgebisse treten und keinem Wechsel unterworfen sind. Die meisten Zähne sind aus wenigstens zwei Theilen der eigentlichen Zahnschubstanz oder Elfenbein (Dentine) und dem außen dieselbe überkleidenden Email (Dentegummi) zusammengesetzt, welcher nur auf der Innenseite und auch hier häufig nur auf der äußern Seite entwickelt ist. Bildet der Schmelz nur ein oder zwei Kruste, so heißen die Zähne einfach (*Dentes simpliciter*); werden die Krusten selbständig und die von ihnen eingeschlossenen Theile durch eine besondere feste Substanz, das Cement, zusammengehalten; in welcher Falle sind es zusammengesetzte Zähne (*Dentes complicati*). Nur bei dem Menschen in der heutigen Gattung und bei dem ausgestorbenen *Anoplotherium* sind sämtliche Zähne eine festgeschlossene Reihe, welche die in derselben Ebene bleiben, bei allen andern Säugern finden sich Lücken, die entweder die Aufnahme vorragender Zahnkronen, z. B. der durch Auseinanderweichen oder dadurch gebildet, daß einzelne Zähne gänzlich ausfallen, z. B. die Lückenzähne bei Nagern, die oberen Eckzähne bei Wiederkäuern. Nur selten tritt es (Monotremen, Ameisenfresser), die aus bittiger Substanz gebildet sind und mehr Bucherzahn Oberhaut als wirklichen Zähnen gleichen. Betrachtung der Zähne und besonders des Reliefs des Milchgebisses zu dem definitiven Gebisse ist von der äußerster Wichtigkeit sowohl für die Systematik als für die geschichtliche Entwicklung der Säugethierformen.

Durch das Gaumensegel ist die Mundhöhle mit der Nasenhöhle abgeschlossen, in welche von hinten Nasenöffnungen (Choanen) einmünden, während nach unten und vorn die Stimmritze den Zugang zu dem Kehlkopf und der Luftröhre mittelst und ganz nach hinten, der Wirbelsäule mittelbar anliegend, der Schlundkopf (Pharynx) der Speiseröhre (Oesophagus) die Nahrung nach dem Magen leitet, nachdem sie vorher in der Mundhöhle durch die Secrete verschiedener Drüsen durchseufert wurden. Nur selten findet tropfartige Erweiterungen der Speiseröhre statt, ist der Magen häufig in mehrere Abtheilungen getheilt, was bei den Wiederkäuern den höchsten Grad erreicht. In den Dünndarm münden die verschiedenartigsten großen Leber herkommende Gallengänge, entweder direct von der Leber ausgeht oder durch die Ansäufung, die Gallenblase, keigigt. Der Pfortnertheil des Magens (Pylorus) ist durch eine Klappe gegen den langen Dünndarm dieser wieder gegen den Dickdarm ebenso abgrenzt. Am Anfange des Dickdarms findet sich ein mehr oder minder langer Blinddarm, der bei Pflanzenfressern (Pferd) dem Magen an Größe kommt. Der Mastdarm öffnet sich bei allen Säugern mit Ausnahme der Kloakenthiere (Monotremen) besonders hinter der Öffnung des Urogenitalsystems.

Die Athmorgane beginnen mit dem Kehlkopf der Nasenhöhle, der sich durch die Stimmritze meist von einem Klappel (Epiglottis) getrennt in den Kehlkopf, die Luftröhre, die Bronchien und Lungen selbst fortsetzt. Diese letztern bilden den Kern der Brusthöhle aufhängende Organe, in welche die Luftröhren sich bis zu den letzten, zellenhaltigen

geschlossenen Enden verzweigen. Die Athemzugen werden durch die Zusammenziehungen des Hals und der Muskeln des Brustkorbes vertheilt. Die Stimme wird in dem obern Ende des Kehlkopfes durch die Stimmrinne und die daran angehängten Stimmbänder erzeugt und häufig durch Nebenhohlräume des Kehlkopfes, die als Resonanz-Apparate verstärkt.

Kreislauf ist stets vollkommen in seinen Theilen geschlossen und das Centralorgan der Verdauung, das Herz, der Länge nach durch eine Kammern in zwei Abtheilungen getrennt; das rechte Herz, welches das Blut vom Körper kommend in die Lungen zur Athmung strömt, das linke Herz für das Blut, welches von den Lungen zurückkehrt und in den Körper vertheilt wird. Jede Herzabtheilung besteht aus zwei Höhlen: den Vorhöfen, in welche das Blut einströmt, den Kammern, aus welchen es ausströmt. In der Jugend werden beide Blutbahnen durch Öffnungen in der Scheidewand der Vorhöfen (Foramen) und durch Verbindungswege zwischen den Lungenarterien (Botal'scher Gang) miteinander in Verbindung gesetzt; letzterer bleibt zuweilen tauchend den Säugethieren offen, bei allen aber schließen sich diese Öffnungen nach der Geburt und nach vollständiger Herstellung der Lungen. Die Blutkörperchen sind klein, scheibenförmig.

Nieren, nur selten in einzelne Lappen zertheilt, liegen zu beiden Seiten der Wirbelsäule im Becken als bohnenförmige Körper. Die Harnleiter durchdringen stets durch besondere Harnleiter in die Blase, welche die Harnröhre entsendet, die bei den Säugethieren in verschiedene Beziehung zu den Geschlechtsorganen tritt und nur bei den Kloakenthiere die Kloake selbst mündet.

Geschlechter sind überall getrennt und stets durch Begattungsorgane versehen, die sich in der Leiste innerhalb der weiblichen Organe befinden und lebendige Junge geboren werden. Die Geschlechter sind in der Tiefe der Leiste an der Seite der Nieren, befestigt aber diese Lage nur bei den Walen, Kloakenthiere, Affen, Elefant und Nashorn, bei den übrigen Säugethieren durch den Leistenkanal in die Weichen. Die Haut und erhalten bei Säugethieren, Affen und Mensch einen freihängenden Hoden, zu welchem sich (bei Carnivoren u. s. w.) verschiedene Uebergänge finden. Bei manchen Nagern ist der Hoden nur zur Brunstzeit in den Hodensack. Aus dem Hoden entwickelt sich durch den Nebenhoden der Samenleiter, der durch den Leistenkanal zurück in die Leiste steigt und am Grunde der Harnröhre mündet, nicht ohne häufig Nebenabzweigungen (Samenblasen) gebildet zu sein. Die Harnröhre selbst zeigt in Form und Lage bei den verschiedenen Säugethieren verschiedene Veränderungen. Schwellerkörper sind stets vorhanden; zuweilen liegt sie hoch im Geschlechtsorgan und ist un durchbohrt, so daß die Harnröhre an ihrem Grunde sich öffnet (Monotremata), in den meisten Fällen in einer Mittellinie des Bauches angehefteten Scheide vorhanden und durch einen innern Harnröhrenknospe nur bei Fledermäusen, Affen und Menschen frei herab.

Weiblichen Geschlechtsorgane bestehen, mit Ausnahme der Kloakenthiere, bei welchen, wie bei den Säugethieren, nur der linke Eierstock entwickelt und der primär ist, aus zwei in der Nähe der Nieren

gelegenen Eierstöcken, in welchen die winzig kleinen, mit bloßem Auge nicht mehr sichtbaren Eier in größeren, sackförmigen Kapseln, den Graaf'schen Follikeln, eingeschlossen und von Eizellen umhüllt sind. Die Eierleiter haben freie Öffnungen, in welche die durch den Follikel freigegebenen Eier eintreten, um weiter nach außen zu wandern. Am Ende der Eierleiter findet sich in den niedersten Formen je eine Erweiterung, eine Gebärmutter oder Uterus, welche bei den Kloakenthiere direct in die Kloake einmündet, bei den übrigen aber nach und nach von außen her zusammenschmilzt, so daß aus dem doppelten Uterus, der noch bei Beutlern und Nagern vorhanden ist, ein zweihörniger mit gemeinsamem Endtheile (Wiedertäuer, Raubthiere), und zuletzt (Affen, Mensch) ein einfacher Uterus mit pyramidalen Höhlen wird, in deren obere Spitze die Eierleiter einmünden. Die Gebärmutter öffnet sich in die meist einfache, nur bei den Beutlern doppelte und oft felsenförmig in Eierform ausgebildete Scheide (Vagina) die zwischen den äußeren, meist spaltförmigen und mit weichen Schamlippen umgebenen Geschlechtsöffnungen nach außen sich öffnet und zur Aufnahme des Begattungsorgans bestimmt ist. An der obern Ecke der Schamspalte befindet sich ein der Nuthröhre oft sehr ähnliches Wollustorgan, die Clitoris, an deren Basis die weibliche Harnröhre ausmündet. Das Ei wandert durch die Eierleiter in den Uterus, verweilt dort längere oder kürzere Zeit, indem es durch die Ausbildung eines Mutterkuchens (Placenta) entweder in organische Verbindung mit den Wänden des Uterus tritt oder nicht, und wird nach größerer oder geringerer Ausbildung des Jungen durch die Geburt ausgestoßen. Nach der Geburt wird das Junge während einiger Zeit durch die Absonderung der Milchdrüsen (Mammæ) mit Milch ernährt, die es aus den Zitzen saugt. Bei den Kloakenthiere fehlen die Zitzen ganz, bei den Walen sind sie äußerst kurz und in einer Rinne eingesenkt, bei den Beutlern am längsten und meist in einem Hautbeutel oder zwischen Hautfalten verborgen. Sie liegen symmetrisch bald ganz hinten in der Nähe der Schamspalte (Wale, Pferde), bei den meisten am Bauche, bei Fledermäusen, Seeläusen, Affen, Mensch, an der Brust und entsprechen im allgemeinen der Zahl der Jungen, so daß die geringste Zahl zwei, die höchste bis zwölf und mehr betragen kann.

Von besonderer Wichtigkeit erscheint die Ausbildung des Jungen im Verhältnis zu dem mütterlichen Organismus. Das Ei, welches nur bei den Kloakenthiere eine ziemlich große Größe erreicht, geht eine allgemeine Zerkleinerung ein und bildet durch dieselbe die Zellen, aus welchen sich der Embryo aufbaut. Dieser, in der bei Wirbelthieren gewöhnlichen Weise angelegt, bildet, wie bei allen höhern Wirbelthieren, ein Amnion oder Schafhaut, das ihn gänzlich einhüllt, und durch Ausstülpung eine Allantois oder Harnhaut, welche die Blutgefäße des Jungen nach außen leitet, bei Beutlern und Kloakenthiere aber die Wandung des Uterus nicht erreicht, so daß hier gar keine Verbindung mit den mütterlichen Organen stattfindet und das werdende Junge nur aus der im Uterus ergossenen Eizellen zum Wachsthum aufnehmen kann. Diese niedersten aller Säugethiere kann man demnach unter dem Namen der Säger ohne Mutterkuchen (Aplacentaria) zusammenfassen. Bei allen übrigen aber erreicht die Allantois die Außenfläche des Eies und die Gebärmutterwandung und bringt dorthin Gefäßzweige der Nabelarterien, welche durch Zotten auf der Oberfläche des Eies mit den Gefäßen der Gebärmutter derart in Verbindung treten, daß zwar der Kreislauf des Jungen

gänzlich von dem der Mutter getrennt ist, aber durch die feinen Gefäßwandungen hindurch ein beständiger Austausch der flüssigen und gasförmigen, im Blute aufgelösten Bestandtheile stattfinden kann. Auf diese Weise dienen die von der Allantois aus mit Gefäßen versehenen Zotten der Eihaut (Chorion) sowohl zur Ernährung als zur Athmung, der Frucht.

Hinsichtlich der Anordnung dieser Zotten findet nun eine große Verschiedenheit statt. Bei den einen, den Zottentuchlern (Villi-placentaria) stehen überall die Zotten bald einzeln, bald in kleine Büschel (Kotyledonen) vertheilt, auf der ganzen Oberfläche des Eies, was zugleich die Ausbildung einer von den Uteruswänden aus gebildeten Hülle, der hinfälligen Haut (Decidua), hindert, so daß man diese Gruppe auch als Adeciduaten von den übrigen Säugern abtrennen kann. Bei diesen letztern erhalten sich die ursprünglich gefäßlosen, über das ganze Ei verbreiteten Zotten nur an einzelnen Stellen, nehmen dort die Gefäße der Allantois auf und bilden nun einen zusammenhängenden Mutterkuchen. Dieser selbst aber kann eine sehr verschiedene Gestalt annehmen. In einer großen Gruppe bildet er einen Quergürtel um das Ei, welches dadurch rundum an den Wänden des Uterus befestigt erscheint, so daß nur die beiden, der Längsachse der Gebärmutter entsprechenden Pole freibleiben: Gürtel-

sackler (Zonoplacentaria); bei einer hinfälligen ständigen Gruppe bildet der Mutterkuchen eine Haube oder Glode auf dem einen Pole des Eies. Glodentuchler (Campanoplacentaria); endlich die zahlreichen Gruppe bildet die Placenta eine scheibenförmige Scheibe, die nur einen Theil der Eihaut einnimmt, Scheibentuchler (Discoplacentaria). In allen diesen Gruppen findet die mehr oder weniger ausgedehnte Bildung einer vom Uterus umgebenen Hülle statt, so daß man diese Gruppen in drei Klassen duaten den übrigen entgegenstellen kann.

Wenn so zur Einteilung größerer Gruppen das Verhältniß zwischen Mutter und Frucht maßgebend ist, so muß man zu weiterer Umgrenzung der Familien, Gattungen und Arten andere Merkmale zu Hilfe nehmen, welche bei diesen letztern näher besprochen werden sollen. Je mehr sich eine Gruppe ausbildet, desto mehr wird die Gruppierung die genetische Ausbildung der Arten zu Hilfe genommen werden können. Der Gesichtspunkt, der bis jetzt wegen mangelhafter Kenntnisse nur in wenigen Gruppen berücksichtigt werden kann.

Die dem jetzigen Stande der Wissenschaft entsprechende Klassifikation der Säugethiere soll folgende sein:

Klasse der Säugethiere (Mammalia).

Unterklassen.	Regionen.	Unterregionen.	Gruppen.	Ordnungen.
Monodelphia oder Placentalia.	(Deciduata.)	{ Scheibentuchler (Discoplacentaria). Glodentuchler (Campanoplacentaria). Gürteltuchler (Zonoplacentaria). }	{ Vorderhänder (Primates). 2 Affen 3 Platterthiere 4 Insektenfresser 5 Nagetier 6 Faltaffen 7 Raubthiere 8 Robben 9 Rüsseltiere 10 Scheinbiber }	{ (Bimana) (Quadrupedia) (Chiroptera) (Insectivora) (Rodentia) (Prosimia) (Carnivora) (Pinnipedia) (Proboscidea) (Lamini) }
	(Adeciduata.)	{ Zottentuchler (Villi-placentaria). }	{ Ungleichhänder (Perissodactyla). Gleichhänder (Artiodactyla). Fischsäuger (Natantia). 11 Einhufer 12 Vielhänder 13 Schweinefüßer 14 Wiederkäuer 15 Seefische 16 Wale 17 Zahnarme 18 Beuteltiere 19 Kloakentiere }	{ (Soliman) (Polydactyla) (Chaerophylla) (Ruminantia) (Sirenia) (Cetacea) (Edentata) (Marsupialia) (Monotremata) }
Didelphia oder Implacentalia.				

Unterklasse der Monodelphen.

Die Frucht tritt durch Ausbildung von gefäßreichen Mutterkuchenzotten in organische Verbindung mit den Gebärmutterwandungen und wird während längerer Zeit des Verweilens im Uterus durch Austausch mit dem Blute der Mutter ernährt. Der Balken des Gehirns ist vollständig entwickelt. Keine Beuteltiere am Becken.

Legion der Deciduaten.

Die gefäßhaltigen Zotten sind zu einem zusammenhängenden Mutterkuchen zusammengeschmolzen und eine hinfällige Haut vom Uterus aus gebildet.

Unterlegion der Scheibentuchler (Discoplacentaria).

Der Mutterkuchen bildet eine Scheibe, die an bestimmten Orte auf der Oberfläche des Eies befestigt ist und durch den Nabelstrang mit der Frucht hängt.

Gruppe der Vorderhänder (Primates).

Der wesentlichste Charakter dieser Gruppe der Säugethiertypus besteht in der Ausbildung wirklicher Hände mit gegenständlichen Endgliedern an den vordern Extremitäten, der Entwicklung des Gehirns, voluminösen Gebirns, in dem von der Sylvischen Spalte umgeben eine besondere Gegend, die sogenannte Frontallap- weitet.

Erste Ordnung.

Zweihänder (Bimana).

Ordnung wird nur von einer einzigen Familie, dem Menschen (*Homo*) hergestellt. Die charakteristischen Hauptcharaktere sind: Ueberwiegende Entwicklung des Gehirns und der Gehirnhäute, unter das Gesicht fast gänzlich geborgen ist; Zähne aus den drei Zahnarten zusammengesetzt, ohne und mit auf gleicher Fläche sich haltenden; vollkommen durchgeführte Arbeitstheilung in den Extremitäten, sodaß die hintern nur Organe (Füße), die vordern nur Hände, d. h. Organe sind; aufrechter Gang; artikulierte Sprache. Sie gehen auf diese Ordnung nicht näher ein, da die physiologische Betrachtung des Menschen einer andern Ordnung zugetheilt ist.

Zweite Ordnung.

Vierhänder oder Affen (Quadrumana).

Ordnung der Affen. Vierhänder oder Affen (Quadrumana). Alle Affen haben vier Hände, die nur zuweilen an den Vorderextremitäten nicht ganz ausgebildet sind. Die Vorderextremitäten sind mit kleiner Lücke für hervorragenden Eckzähne; Backenzähne sind schwach. Augenhöhlenring geschlossen. Die Augen sind nach vorn gerichtet. Zwei Zehen an jeder Hand.

Körperbau im allgemeinen menschenähnlich, d. h. Dichtes Haarkleid mit Ausnahme einzelner Stellen bei einigen. Die Arme meist länger als die Beine. Der Daumen an den Hinterhänden vollständig entwickelt; an den Vorderhänden rudimentär oder ganz fehlend. Der Daumen hat stets einen menschenähnlichen Kuppen Nagel; die Finger meistens. Der Schwanz ist sehr verschieden entwickelt, bald sehr lang und als Greiforgan mit nackter unterer Endfläche versehen, bald oder ganz rudimentär. In der Jugend ist in der geringeren Entwicklung der Kiefer und des Gehirns. Gegen das Gehirn ist der Kopf sehr menschenähnlich gefaltet; mit zunehmendem Alter treten die Kiefer mehr hervor und auf dem Schädel entwickeln sich vorzugsweise bei den Männchen, hohe Knospen zum Ansatze der kräftigen Backenmuskeln, wodurch das ganze Aussehen stets thierähnlicher wird. Manche, als Beleg hierzu, die Schädel des jungen Orang (Zaf. 1, Fig. 1), des jungen Schimpansen (Fig. 3) und Gorilla (Fig. 5) mit dem Schädel des Menschen (Fig. 4). Das Gehirn, ganz nach dem Plane des menschlichen gebaut, in demselben im Verhältniß seines Volumens zu dem des Körpers, sowie in der Ausbildung der Windungen weit hinter dem menschlichen zurück; bei den meisten zeichnet es sich noch durch einen eigentümlichen, am Hinterhirne befindlichen Klappenkel. Die Hemisphären decken bei senkrechter Ansicht das Gehirn vollständig. Selbst die menschenähnlichen Affen sind, wie ihr Skeletbau (Fig. 1) nicht zum aufrechten Gange befähigt; sie beschränken sich in dieser Stellung nur schwerfällig am Boden fort, indem sie sich auf den äußern Rand der Fußknochen stützen. Alle Affen sind in beiden Hemisphären die Palmenregion beschränkt; in Europa lebt der Affe in Trüpp Magots auf dem Felsen von Gibraltar. Die Affen sind Kletterthiere, die einen im Walde, die andern in felsigen Gegenden; nähren sich von Früchten, Samen, kleinen Thieren, Vögeln, Eiern, Insekten und halten sich in Trüppen oder in einzelnen Familien

zusammen, die von den ältesten Individuen geführt werden. Meist nur ein Junges, das jährling gepflegt wird. Die meisten sind in der Jugend gelehrt in Folge des außerordentlich entwickelten Nachahmungstriebes, werden aber mit zunehmendem Alter tödlich, boshaft und jählich. Die Mütter pflegen ihre Jungen mit großer Liebe, und die Alten sind zur Vertheidigung derselben stets bereit. Während die zum Sprichwort gewordenen boshaften und niederlichen Eigenschaften den meisten gemein sind, zeigen indeß einige menschenähnliche Affen in der Jugend mehr Ernsthaftigkeit und gemüthvolle Seiten des Charakters. Es ist noch zweifelhaft, ob die ältesten Reste ausgestorbener Affen der ältesten Tertiärzeit angehören; in der Molassezeit kommen sie häufig auch in Europa vor.

Erste Unterordnung.

Schmalnasen (Catarrhini). Affen der Alten Welt.

Zahnformel wie beim Menschen: $D \frac{2}{2}; C \frac{1}{2}; P \frac{2}{2}; M \frac{3}{3}$. 32 Zähne im ganzen. Schmale Nasenheubwand. Niemals Greifschwänze. Alle Finger mit Kuppen Nageln. Familie der Menschenaffen (*Anthropomorpha*). Kein Schwanz, keine Badentafeln, keine Gesichtsschwielen. Wir kennen drei Gattungen, welche durch verschiedene Charaktere dem Menschen sich nähern. Der Gorilla (*Gorilla*) neuerdings in Guinea entdeckt, der größte Affe, über 2 Meter hoch, schwarz behaart mit menschenähnlichsten Extremitäten, aber am weitesten vom Menschen entfernter Schädel und Hirnbildung. Der Schädel in der Jugend rundlich, glatt (Zaf. 1, Fig. 3 und 5); im Alter, namentlich beim Männchen, mit ungeheuren Leisten und Eckzähnen ausgerüstet, wodurch er pavianähnlich wird (Fig. 4). Wildestes Thier von Kriegerstärke, noch nicht lebend nach Europa gebracht. Aus derselben Gegend der kleinere Schimpanse (*Troglodytes niger*, Fig. 2), ebenfalls schwarz, mit großen Ohren und Lippen, längern Armen, häufig jung nach Europa gebracht, von sanfterm Naturell, im Schädel- und Zahnbau dem Menschen am nächsten, da die Knochenleisten auf der Mitte des Schädels kaum zusammenkommen (Fig. 3). Der Orang-Utang (*Simia satyrus*, s. das Skelet, Fig. 1), 1½ Meter hoch, mit ungemein langen Armen, die bei aufrechter Stellung zur Erde reichen, von rothrother Farbe, mit nackten Badentafeln im Alter und menschenähnlichem Gehirn, auf Borneo und Sumatra beschränkt, jung ebenfalls oft nach Europa gebracht. Alle sind Waldthiere und bedächtig in ihren Bewegungen.

Familie der Gibbons (*Hylobatides*). Im übrigen den Menschenaffen ähnlich, aber mit kleinen nackten Gesichtsschwielen am Hintern und ungeheuer langen Armen. Außerordentlich flink im Klettern und Springen, leben in den dichtesten Wäldern Ostindiens und der Sunda-Inseln.

Familie der Schlangaffen (*Semnopithecii*). Langer, sehr schlanker Körper, Glieder und Schwanz; kleine Gesichtsschwielen, keine Badentafeln. Der Daumen zuweilen verkürzt oder rudimentär, besonders bei den afrikanischen Mitgliefern der Familie (*Colobus*), bei den Asiaten meist gut entwickelt. Der Magen ist dreitheilig, fast ähnlich demjenigen der Wiederläufer. Der Rahau (*Semnopithecus Nasua*, Fig. 6) merkwürdig durch seine nur durch Knorpel gestützte, verlängerte Nase.

Familie der Meerlappen (*Cercopitheci*). Meist schlank Formen mit langem Schwanz und Gesichtsschwielen, wie die vorigen, aber mit Badentafeln. Die echten Meerlappen nur in Afrika; in Afrika und

Erste Unterordnung.

Fledermäuse (Insectivora).

Kopf ist rund, das Maul weit gespalten, die Ohren kurz, die Augen klein, zuweilen fast verdeckt, astförmig dagegen sehr entwickelt und meist auch vergrößerte Ohren, blattförmige Auslässe auf und unter der Nase unmittelbar verstärkt. Die Bezahnung (Fig. 13, 14) ist ganz diejenige der Insektenfresser, mit der Ausnahme, daß gewöhnlich hinter den schneidenden Schneidezähnen, die indessen bei manchem in der Oberkiefer leicht ausfallen, spärliche, hakenförmig gekrümmte Eckzähne stehen; bei einigen, z. B. den Vampyren, so weit nach hinten, daß sie den Platz von Schneidezähnen einnehmen. Die Lücken- und Backenzähne sind stets mit einem spitzen Zaden besetzt, welche etwa wie die kleinen geschnittenen Zähne einer Säge sich ausnehmen von oben nach unten ineinander greifen. In der Entwicklung und Zahl dieser Zähne herrscht manche Uebereinstimmung, wie aus den beiden gegebenen Figuren ersicht. Die Augenhöhlen am Schädel sind nicht offen, sondern nach hinten gegen die Schläfen geschlossen, selbst wenn sie ringförmig begrenzt sind. Bei manchen ist die Ohrschuppe (tragus) zu einer eigentümlichen Klappe entwickelt und ebenso die Gegenschuppe (antitragus) in mannichfacher und oft bizarrer Weise ausgebildet. Die häutigen Fortsätze auf der Nase nehmen sonderbare Gestalten an, und wenn auch diese nach den neuesten Untersuchungen keine speciellen Organe ausgebildet haben, so beweist doch ihr Reichthum, sowie die Versuche Spallanzani's, daß sie ein feines Tastgefühl besitzen. Eine gebländete Fledermaus vermeidet ebenso geschnittene Fäden und andere launige befindliche Gegenstände beim Fluge, als solche, die noch ihre Augen hat, während lebende Fledermäuse, welchen Ohren und Nasenfortsätze gestutzt leicht anrennen.

Nur wenige Fledermäuse tropischer Gegenden saugen Blut, aber nähren sich, und die hiesigen ausschließlich von Insekten, welche sie im Fluge wegfangen. europäische Arten sind deshalb ohne Ausnahme nützliche Thiere, welche ununterbrochen während Sommers der Jagd nach den schädlichen Nachtfliegern obliegen und also denselben Dienst thun, wie Schwärmer am Tage.

Die Fledermaus (Histiorhina). Die Nase ist blattförmigen Anhängen gegliedert, die meist aus drei hintern, größern, leier- oder lanzettförmigen, durch gestellten Blatte, seitlichen Anhängen und vordern Quersattel bestehen. Der Zwischenkiefer ist sehr klein, in der Mitte besetzt, nicht mit dem Oberkiefer verwachsen, der Unterrand der Ohren vom Vorderrand durch einen Einschnitt getrennt, die Ohrschuppe nicht immer entwickelt. Hierher gehören die charakteristischen blutsaugenden Formen, bei welchen die Lücken- und Backenzähne, womit sie die Haut der Thiere schneiden, stark nach vorn gerückt sind, der Vampyr (*Histiotus* spectrum, Kopf desselben, Fig. 9) mit einem Nasenaussatz, der einem Hellebartenreißer gleicht, einem halben Meter Flugweite und platter Zunge, die blutsaugend (Glossophaga), deren lange wurmige Zunge sich zu einer Art Saugröhre umwinden kann. In unsern Gegenden gehören die Fledermäuse zu den in Wäldern fliegenden und nur Insekten fressenden Fledermäusen (Rhinolophus, Schädel desselben, Fig. 13) dazu.

Die Fledermaus (Gymnorhina). Die Nase ist, ohne Auslässe, das Gesicht mausähnlich. Ohren und Ohrklappen sehr veränderlich, bald sehr groß, bald

gewöhnlich entwickelt. Der Zwischenkiefer in der Mitte tief ausgebuchtet, mit dem Oberkiefer verwachsen. Die Ohrfledermaus (*Plecotus auritus*, hängend Fig. 10, fliegend Fig. 11) geht unter allen europäischen Arten am weitesten nördlich; die große Spedmaus (*Vesperugo noctula*, Skelet, Fig. 8) erreicht über 1 Fuß Flugweite; die gemeine Spedmaus (*Vespertilio murinus*) siedelt sich besonders gern in Kaminen an und wird fälschlich deshalb beschuldigt, den Sped anzuschneiden; die Wopsele der Maus (*Synotis barbastellus*, Fig. 12, Schädel Fig. 14), die wir friedlich abbilden, fliegt vorzugsweise an Sämpfen und stehenden Gewässern.

Zweite Unterordnung.

Fruchtfresser (Frugivora).

Die Einrichtung für den Flug ist dieselbe, sonst aber der Bau gänzlich verschieden. Der lange isolirte Daumen trägt eine Krallen, der in den Flügel eingeschlossene Zeigefinger ebenfalls. Der Kopf ist hundeartig in der Form (daher auch der Name Fledermaus); keine Spur von Auslässen an Nase oder den hundeartig gebildeten Ohren ohne Klappe und Gegenschuppe. Der Schwanz nur rudimentär. Das Gebiß gänzlich verschieden. Die Schneidezähne fallen leicht aus, die Eckzähne sind nicht sehr bedeutend, stumpf, die Backenzähne stumpfhöckerig, eher denjenigen kleiner Affen oder Dicksäuler, als denen der Fledermäuse ähnlich. Es sind verhältnismäßig große Thiere, die bis zu 1 Meter und mehr Flugweite erreichen, rauen Pelz haben und nur in den Tropenwäldern Afrikas, Ostindiens und Neuhollands vorkommen, wo sie von Früchten leben. Sie versammeln sich in großen Scharen zum Tageschlasse auf besondern Lieblingsbäumen, richten oft großen Schaden in Pflanzungen an, werden ihres schmackhaften Fleisches wegen geschätzt und sogar in besondern Behältern gemästet. Die bekannteste Art ist der fliegende Hund oder Kalong (*Pteropus edulis*, Taf. 2, Fig. 7), der im Indischen Archipel zu Hause ist und neuerdings öfter lebend nach Europa gebracht wurde.

Vierte Ordnung.

Insektenfresser (Insectivora).

Scheidenthler mit langer spitzer Schnauze, allen drei Arten von Zähnen, kleinen Eckzähnen, einspitzigen Lückenzähnen, mehrspitzigen Backenzähnen und bauchständigen Fingern. Ausgebildete Schlüsselbeine, Beine mit Krallen bewaffnet. Söhlengänger. Windungsloses Gehirn, Augen stets klein, oft verkrüppelt.

Die kleinen Raubthiere, welche diese Ordnung zusammensetzen und fast alle ein nächtliches Leben, zum Theil unter der Erde führen, haben alle einen langgestreckten Kopf, dessen Schnauze oft noch durch einen Küssel verlängert wird, gedrunghenen Körperbau, meist kurze, kräftige Füße, die platt auf den Boden mit der ganzen Sohle aufgesetzt werden. Die Zähne sind oft sehr zahlreich, wodurch sich das Gebiß manchen Beutethieren nähert, und sehr verschieden gebildet im einzelnen, während im ganzen die Spitzhakenform vorherrscht. Die Schneidezähne bald sehr klein, bald einer derselben sehr groß, so daß die Stelle des stets unbedeutenden Eckzahns vertritt, häufig in der Unterkinnlade fast wagerecht nach vorn gestreckt (Spitzmäuse); die Lückenzähne klein, einfache Spitzen, die Backenzähne mit drei bis fünf Spitzen, meist in zwei Reihen geschnitten und von oben nach unten ineinander greifend. Die Vorderbeine meist frei beweglich und

das Schultergelenk durch ein vollständig ausgebildetes Schlüsselbein gestützt, wie bei den höhern Nagern, welchen die Thiere auch durch das windungslose, glatte, das kleine Gehirn nicht bedeckende Großhirn sich anschließen. Einzig der Tastsinn bedeutender entwickelt; die Augen bei den unterirdischen Arten fast ganz verkümmert oder sehr klein; die Ohrmuscheln zuweilen ganz fehlend. Die Geschlechtstheile nagerartig, mit sehr großen Samenblasen beim Männchen. Hierdurch, sowie durch den Bau des Mutterkuchens, des Gehirns, die Anwesenheit der Schlüsselbeine, die freiere Beweglichkeit des Kiefergelenks und die Anordnung der Zähne, unterscheiden sich die Insektenfresser scharf von den Raubthieren, mit denen man sie früher zusammenstellte. Es sind nächtliche oder doch versteckt lebende Thiere beider Hemisphären, die paarweise sich halten, außerordentlich gefräßig sind und vorzugsweise von Würmern und Insekten, aber auch von Eiern und kleinen Vögeln leben.

Familie der Maulwürfe (Talpida). Körper cylindrisch zum Graben und Wühlen unter der Erde eingerichtet. Vorderbeine kurz, did, die breite Hand, deren Zehen theilweise verwachsen sind, nach außen gestellt und häufig noch mit einem besondern Sichelknochen auf der Außenseite versehen, der ihre Fläche ver mehrt; Brustmuskeln sehr kräftig an einem Ramm des Brustbeins sich ansetzend; im Nackenbando und im Rüssel ein eigener Knochen oder Knorpel, der die Kraft des Kopfes (Taf. 2, Fig. 18) beim Wühlen vermehrt. Zähne sehr zahlreich (44 bei unserm Maulwurf, dessen Zahnformel: $D \frac{2}{2}; C \frac{1}{1}; M \frac{7}{7}$); Hinterfüße schwach, fänzigelig; Schwanz kurz oder länger; Haar seidenartig weich. Unser Maulwurf (Talpa europaea, Fig. 17) mit kleinen, im Pelz versteckten Augen, grauem Seidenhaar und kurzem Schwanz, legt sich eine künstlich construierte Wohnung in einiger Entfernung von seinem Jagdrevier, zu dem er durch eine Lauföhre gelangt, einige Fuß unter der Erde an und jagt besonders nach Engerlingen und Regenwürmern, durch Auswühlen von Jagdröhren, die mittels ausgenorfener Erdbäusen bezeichnet sind. Dadurch kann er an einigen Orten un bequem werden; durch Vertilgung der Insektenlarven, Würmer und Schnecken ist er aber stets nützlich. Wir bilden außerdem den canadischen Maulwurf ab (Condylura cristata, Fig. 23) der durch längern Schwanz und die Sternscheibe an dem Rüssel sich auszeichnet.

Familie der Spitzmäuse (Soricida). Kleine, mausartige Thiere mit nacktem oder wenig behaartem Schwanz, riechenden Wisamdrüsen auf der Seite des Körpers oder an der Schwanzwurzel; rauhem Haar, das zuweilen mit stachelähnlichen Borsten unter mengt ist. Zahnsystem sehr verschieden; bei fast allen die Schneidezähne des Untertiefers groß und fast wa gerecht, diejenigen des Overtiefers dagegen fallen bei den einen früh aus, während sie bei den andern durch Größe und Form die Eckzähne ersetzen und bei andern diese letztern scharf und spitz sind; die Backzähne verschmelzen oft in eine Masse, die wie eine Mauer mit Zinnen auf dem Kiefer aufricht; die scharfen Spizen nutzen sich bei andern so ab, daß Pflanzen nahrung angedeutet ist. Die Thierchen leben in Löchern, sind besonders bei Nacht thätig, fallen nicht in Winterschlaf, nähren sich vorzugsweise von Insekten und deren Larven, sind also sehr nützlich; werden von den Nagern todtgebeissen, aber nicht gefressen. Einige haben Schwimmbälte an den Hinterfüßen (Desman, Myogale), die meisten nicht. Unsere Wasser spitzmaus (Crossopus fodiens, deren Schädel wir abbilden, Fig. 20), gehört, obgleich meist in und an dem Wasser lebend,

doch der zahlreichern Gruppe ohne Schwimmbälte an. Sie ist den Fischeiten sehr schädlich, da sie selbst größere Fische angreift. Zu ihnen gehört auch der gewöhnlichen Spitzmaus (Sorex araneus, Fig. 19) auch das am höchsten in den Alpen erhebende Säugethier, die Alpen spitzmaus (Sorex alpinus, Schädel, Fig. 22), die noch über die Schneegrenze hinausgeht, und das kleinste bekannte Säugethier, die Zwergspitzmaus (Sorex pinnaeus, s. minutus, mehr im südlichen Europa).

Familie der Zegel (Erinacei). Borsten und Stacheln zwischen dem groben Stachelhaar. Kräftiger Körper, meist mittels eines mächtigen, eine förmliche Hand darstellenden Hautmuskels gänzlich eingetröckelt werden kann, kurze Schnauze und Kopf. An dem Schädel (Fig. 16) fällt besonders auf, daß die mittleren Schneidezähne so wie Eckzähne entwickelt sind, während die Eckzähne sich nicht von den Vorderzähnen unterscheiden. Die Backzähne mehr stumpfzähne. Unsere Zegel (Erinaceus europaeus, Fig. 15) halten sich geschäftig und selbstgegrabenen Höhlen Winterquartier, nähren sich von Insekten, Schnecken, Räusen, die auch kleinen Vögeln, deren Nester sie zerören. Abweichende Arten in allen Welttheilen, die sich nicht einrollen können.

Familie der Springer (Saltatoria). Afrikanische Spitzmäuse (der Rohrrüssler, Macroscelides typus, Fig. 21), deren lange und kräftige Hinterbeine zum Springen eingerichtet, doch nicht so aus schließlich ausgebildet sind, wie bei manchen springenden Nagern. Ihnen nahe steht die Familie der Kletterigel (Scandentia), ebenfalls südliche Thiere, die wie Eichhörnchen in den Wäldern umher treiben.

Fünfte Ordnung.

Nager (Rodentia).

Scheibentkühler mit meißelförmigen Schneidezähnen und schmelzfaltigen Backzähnen. Zähne mit freien Zehen und Krallen.

Die zahlreichste aller jetzt lebenden Säugethiergruppen, sowohl was die Zahl der Individuen, als was die Menge von verschiedenen Gattungen und Arten betrifft. Bei aller äußern Mannichfaltigkeit aber ist der Plan ihrer Organisation sehr ein facher und in seinen Einzelheiten so sehr übereinstimmend, daß es schwer hält, größere Abtheilungen von Familien herzustellen. Der Kopf ist meist rundlich mit dem gewöhnlichen Stirnabfall, spitzer Schnauze, breiten Backen, deren Maß sehr häufig durch bedeutende Vordentzähne vermehrt wird, in welchen die Thiere ihre gesammelten Vorräthe nach Hause tragen. Die kleine Mundöffnung befindet sich unter der spitzigen, gewöhnlich mit Schwimborsten gezierten Schnauze und zeigt sehr häufig die vorstehenden, scharfen Schneidezähne. Der Schädel ist mehr oder minder cylindrisch, gegen die Schnauze zugespitzt (Schädel des Siebenschläfers, Glis vulgaris, oben, Taf. 3, Fig. 6) ohne besondere hervorsteckende ausgeworfne Keulen, die Zochbeine breit und flach, die Augenhöhle niemals gegen die übrigens sehr schmale Schlängengrube abgesehen. Am auffallendsten ist die Bezahnung (Schädel des Bibers, Fig. 8); oben wie unten haben sich im ganzen nur zwei lange, nach außen getrimmte einfache Schneidezähne, deren hinterer Theil außerordentlich weit in die Kiefer hineinragt, sodaß oft die tiefe Wurzel dieser Schneidezähne unter den Backzähnen durchgreift; die nicht sehr harte Substanz dieser Zähne ist auf ihrer Außenfläche und nur auf dieser mit einer außerordentlich festen, oft gelblich gefärbten Schmelz

überzogen, so daß die hintere Fläche durch das bei weitem stärker abgenutzt wird und hierdurch thuen, welche aus dem Kiefer beständig nach-
 1, eine meißelartige Zuschärfung stets erhalten.
 Hinter diesen außerordentlich charakteristischen
 bezähnen stehen weder Eck- noch Lidenzähne,
 es folgt eine lange Zahnlücke und dann die
 geschlossene Reihe der hart aneinandergebräng-
 idenzähne, welche ebenfalls in ihrer Structur viel
 ähnliches bezeugen. Diese Backzähne, deren Zahl
 sechs ansteigt und nicht unter zwei herabsinkt,
 eine prismatische Gestalt und ermangeln meist
 eigentlichen Wurzel. Bei manchen Gattungen
 sie nur einen einfachen Schmelzcyliner, dessen
 mit Zahnschubstanz erfüllt ist, bei andern bildet
 Schmelz einfache Falten nach innen, die stets in
 gerichtet sind und so harte Rippen dar-
 die bei der vor- und rückwärtsgelenden Be-
 der Kiefer, beim Nagel, zum Zermahlen der
 Futtergegenstände sehr förderlich sind; zuweilen
 diese Schmelzfalten äußerst complicirt und außer
 einfach gewundenen äußern Schmelzlage steht
 auch noch innerlich auf der abgenutzten Mahl-
 die stets horizontal ist, einzelne abgeordnete
 einzeln stehen (Backzähne der Ratte von oben,
). So groß die Einförmigkeit des Zahn-
 im allgemeinen ist, so äußerst verschieden
 ese Faltungen der Schmelzsubstanz bei den
 n Gattungen und Familien der Nagel-
 them Zahnbau steht in Zusammenhang die
 des Gelenkhöders, mittels dessen der Unter-
 der Schlafengrube eingelenkt ist. Während
 fleischfressenden Thieren, wo die Bewegung
 nach unten die wesentlichste ist, dieser Ge-
 eine quere Walze darstellt, bildet er im Gegen-
 den Nagern eine Längswalze mit bogen-
 Krümmung, welche hauptsächlich nur die er-
 Bewegung von vorn nach hinten gestattet.
 idet stets vier oder fünf Zehen, alle mit Krallen
 bewaffnet; die Beine selbst aber sehr verschieden
 je nachdem die Thiere graben, schwimmen,
 klettern oder springen. Die dicke Behaarung
 e Zwischenstufen von dem feinsten Wollhaar
 denmaus bis zu den Stacheln des Stachel-
 Die Schließelbeine bleiben bei den laufen-
 tungen rudimentär, sind aber wohl ausgebildet
 denen die Vorderfüße zum Halten des Futters
 klettern oder sonst complicirten Bewegungen
 Alle leben von Pflanzennahrung, doch die
 die wie die Ratte stumpfe Höder auf den
 en haben, nicht ausschließlich; die meisten
 arch Venagen, Bohren von Gängen und Ein-
 von Vorräthen großen Schaden an. Im
 sind es meist stupide und dumme Thiere,
 ehren auch nur einen geringen Grad von
 rig zeigt, indem es fast gar keine Windungen
 das kleine Gehirn meist vollständig unbedekt

der Siebenschläfer oder Bilche (Myoxida).
 flinte Thiere, mit kräftigem Körper, stark
 Schwanz, die in Bäumen und Gebüschen
 r aus Nüssen, harten Früchten, Insekten
 stehenden Nahrung umherklettern, sich vogel-
 Nester bauen und in diesen einen langen
 laß halten. Der Schädel (Fig. 6) von oben
 ist langgestreckt vorn, hinten mehr kugelig;
 Darm fehlt; die Backzähne sind wenig zahl-
 Querleisten versehen; an den Vorderfüßen
 loses Daumenrudiment, an den Hinterfüßen
 ein deutlich abgesetzter Daumen mit plattem

Nagel. Durch diese Charaktere schließen sie sich eng an
 die Halbaffen an. Der große Siebenschläfer (Glis
 vulgaris, Fig. 5) erreicht die Größe einer Ratte; die
 röthlichgelbe Haselmaus (Muscardinus avellanarius)
 kaum die einer Maus. Beide lassen sich leicht zähmen.

Familie der Eichhörchen (Sciurida). Schöne,
 aber recht schädliche Baumthiere (wenigstens die unserer
 Gegenden), die von harten Sämereien, Vögeln, Eiern,
 Insekten leben. Buschiger Schwanz, Ohrringel, scharfe
 Krallen an allen Zehen, mit Ausnahme der Vorder-
 füße, die nur ein Daumenrudiment besitzen. Stumpfe
 Querhöder auf den Backzähnen; vor den vier Mahl-
 zähnen ein kleiner Lidenzahn. Schädel (Fig. 1) ge-
 drungen; Vudentaschen. Außer den besonders in Nord-
 amerika zahlreichen Arten, die wie unsere Eichhörchen
 (Sciurus vulgaris, Fig. 2) auf Bäumen leben, finden sich
 andere, in Erdhöhlen wohnende Arten, von gebirgsreichem
 Körperbau, mit Vudentaschen, Erdhörchen (Tamias)
 und Flughörchen (Peromys), bei welchen die Körperhaut
 eine zwischen den Beinen und den Körperseiten aus-
 gespannte Flughaut bildet, die als Fallschirm dient.

Familie der Murmeltiere (Arctomyda). Erd-
 thiere der nördlichen und gemäßigten Zonen, die in
 tiefen Löchern wohnen und sich von Samen, Wurzeln
 und Pflanzensprossen nähren. Sie haben oben fünf
 Backzähne, alle mit in Querreihen gestellten Hödern
 besetzt und mehr rundliche Schneidezähne, plumpen
 Körperbau und kurzen Schwanz, gleichen aber sonst
 den Eichhörchen, zu welchen die Ziesel (Spermophilus)
 den Uebergang bilden. Das Alpenmurmeltier
 (Arctomys marmota, Fig. 3) hält sich in der
 waldlosen Gegend bis zur Schneegrenze und über
 dieselbe hinaus auf, pfeift in Gefahr und füttert
 seine Winterhöhle, in der es einen langen Win-
 terschlaf hält, mit Heu aus. Der kleinere Bobac
 (Arctomys Bobac) erseht es im Osten, der Prairieduck
 (Cynomys), mit klaffender Hundestimme, in den Prairien
 Nordamerikas.

Familie der Wühlmäuse (Arvicola). Drei
 wurzellose Backzähne in allen Kiefern, die aus drei-
 seitigen Prismen zusammengesetzt sind und bei der
 Abnutzung winkelige Schmelzfalten zeigen. Breite,
 plumpe Gestalten mit meist kurzen Schwänzen, dicken
 Köpfen, stumpfer Schwanz, alle ungemein schädlich.
 Hierher gehört unsere Wasserratte (Hypodacus am-
 phibius), mit behaartem Schwanz, die vortrefflich
 schwimmt und gern Fische und Krebse in Teichen
 und Rasten angreift; die verschiedenen Schermäuse (Arvicola,
 Schädel der Feldmaus, A. arvensis, Fig. 15),
 die durch Ansammlung von Wintervorräthen und
 Wühlen ähnlich dem Maulwurf in den Feldern
 große Verwüstungen anrichten; die im Norden ver-
 breiteten Lemmings (Myodes Lemmus, Fig. 16), die
 überall häufig sind, zuweilen sich aber so sehr ver-
 mehren, daß ungeheuerer, von Raubthieren aller Art
 verfolgte Massen auswandern müssen, die alles auf
 ihrem Wege vernichten.

Familie der Mäuse (Murida). Vorderfüße vier-
 zehig mit einem Daumenrudiment, durch entwickelte
 Schlüsselbeine zum Halten der Nahrung beim Fressen
 geeignet. Schädel langgestreckt; wenig zahlreiche Back-
 zähne (Fig. 17, Backzähne der Ratte), zwei bis vier oben,
 zwei bis drei unten, bewurzelt und häufig mit stumpfen
 Hödern besetzt, die denen der Allesfresser gleichen. Auch sind
 gerade diese Arten am wenigsten auf Pflanzenkost an-
 gewiesen. Die untern Schneidezähne sind spitz, nicht
 meißelartig. Eine äußerst zahlreiche Familie, die man
 als eine Art Stammfamilie ansehen kann, welche durch
 ihre verschiedenen Gruppen sich an andere Familien
 anschließt; durch die Nennmäuse (Meriones) mit langen

nen und große Zehe entgegenstellbar, vierte Finger stets der längste, Augen nach hinten offen; Brust- und Bauch-

schädel gestreckt, die Augenhöhle zuweilen ringumgeben, aber nicht nach hinten gegen die enge geschlossene (Schädel des Lori, Taf. 2, 3), oder auch ganz offen nach hinten (Schädel des Maki, Fig. 5). Thränenöffnungen, wie bei den Thieren vor der Augenhöhle auf der Gesichtslinie. Unterkieferäste in der Mitte getrennt. Die sind vorstehend, oft sehr groß, die Augen oft nur, der Schwanz stets lang, mehr oder minder. Der Daumen ist an allen vier Extremitäten entsetzbar, mehr hinten und trägt einen platten; der Zeigefinger oft rudimentär und mit einer versehen (Fig. 2, Note des Lori); der vierte Finger der längste; die übrigen Finger bald beträchtlich, bald kleinen Nageln versehen. Das Gehirn glatt; die Gehirnhäute das Kleinhirn nicht bedeckend; die Splachnische kaum vorhanden; die Blase sehr klein. Uterus meist, sogar zuweilen mit getrennten Öffnungen. Scheide. Hodenack und frei herabhängender Haare wollig, das Gesicht behaart. Nächstliche Thiere, die sich in Wäldern von Insekten und Früchten nähren; die meisten auf Madagaskar, andere in Afrika und auf den ostindischen Inseln.

Familie der Dünnpfinger (Leptodactyla) ist bisher durch die einzige Gattung *Chiromys* repräsentiert (erthier oder Aye-Aye, *Chiromys madagascariensis*, Fig. 6), die nur äußerst selten auf Madagaskar gefunden ist und die ein so natürliches Uebergangsglied zwischen den Nagern und den Halbaffen darstellt, daß sie je nach der Wichtigkeit, welche man ihnen oder dem andern Charakter beilegte, von verschiedenen Forschern bald zu der einen, bald andern Ordnung gerechnet wurde. Der Schädel ist gewölbt, die Augenhöhlen vollkommen geschlossen, ein kleiner Nagel vorkommt, der Schnauzenthail sehr sehr kurz, das Gesicht im ganzen dem eines Menschen ähnlich, mit welchem das Thier auch häufig im Gebisse übereinstimmt; es finden sich bei dem erwachsenen Thiere oben und unten große meißelartige Kagezähne, auf welche eine Lücke folgt. Die Badzähne, deren sich drei in Hälfte des Unterkiefers, vier in jeder des Oberkiefers befinden, haben rundliche Querschnitte, die ziemlich sind. Im Milchgebiss finden sich dagegen oben und unten vier Schneidezähne, oben ein Eckzahn oben und unten zwei spitzhöckerige Lückenzähne, so als Milchgebiss den Insektenfressern ähnlicher ist. Ohren sind groß und nackt, der Körper wollig, der Schwanz buschig. An den vordern Extremitäten finden sich fünf sehr lange und dünne Fingerallennageln, die fast auf gleicher Linie stehen, der Daumen nur etwas abgetrennt, nicht aber entsetzbar ist, der Mittelfinger ist der längste; an Hinterfüßen befinden sich drei gleiche äußere Zehen, eine Zeigehaut mit einem Priemennagel, an allen Halbaffen, und ein entgegensetzbarer Nagel mit plattem Nagel. Es ist ein träges, nächtliches Thier, das auf Bäumen umherklettert und sich von Insekten nährt, die es mit den langen Klauen aus den Ritzen der Rinde herportoht.

Familie der Flug-Maki (Galeopithecidae). Eine behaarte Hautfalte, die als Fallschirm dient, die Glieder bis zu den Zehen ein und vertheilt sie mit den Seitentheilen des Körpers und Schwanzes. Alle Zehen mit Krallen. Schneidezähne gespalten und lammartig eingeschnitten, oben nur

ein seitlicher, unten die mittlern schaufelartig nach vorn geneigt. Badzähne breit, lappig (Fig. 5, Schädel des Flug-Maki, *Galeopithecus volans*).

Familie der Langfüßer (Tarsidae). Nächstliche Thiere mit ungemein großen Augen, großen nackten Ohren, langem dünnbehaarten Schwanz, der am Ende eine Art Pinzel trägt. Zähne entschieden vom Insektenfressertypus. An Vorder- und Hinterfüßen finden sich entgegensetzbare Daumen und die Hinterfüße zeichnen sich besonders dadurch aus, daß die Fußwurzel außerordentlich lang ist und die Zehen oft in einem merkwürdigen Misverhältnisse zueinander stehen. Die nächstlichen Thiere jagen auf Bäumen nach Insekten.

Familie der Fuchsaffen (Lemuridae). Schädel rund, bei den meisten die Schnauze fuchsartig vorgezogen; Schwanz sehr verschieden entwickelt; Haarkleid dicht; Ohren mächtig; Bezahnung zur Früchtenahrung neigend. Eigenthümlich ist in dieser Familie besonders die Bildung der Hinterhände, an welchen der Daumen und die drei letzten Zehen platte Nägel tragen, während der Zeigefinger mit einer scharfen, pfriemelförmigen Krallen bewaffnet ist (Fig. 2, Note des Lori). Die Thiere leben gesellig und halten sich tags über ruhig, klettern aber besonders in der Dämmerung nach Früchten und Insekten umher.

Man unterscheidet in der Familie zwei Hauptgruppen, die Nachtfächer (Nycticebina) in Afrika und Asien (der Lori, *Stenops gracilis*, Fig. 1), ganz oder fast schwanzlos, mit langen dünnen Extremitäten, kleinen Schneidezähnen und meist großen Augen, und die nur in Madagaskar vorkommenden Maki (Maki, *Lemur mongoz*, Fig. 4), mit langem Schwanz, gewöhnlich großen Augen und mächtig großen Extremitäten, welche, mit Ausnahme der Hände, im Habitus mehr einem kleinen Raubthiere gleichen.

Unterlegion der Gürteltkautler (Zonoplacentaria).

Der allgemeine Charakter dieser Thiere besteht nur in der Existenz einer das Gürtelförmig umgebenden Placenta, welche den oben und unten Pol des Eies, das mit den Seiten an die Wand des röhrenförmigen Uterus angewachsen ist, frei läßt. Im übrigen stehen in dieser Unterlegion sehr disparate Gruppen, indem die Raubthiere und Amphibien festgeschlossene Charaktere tragen (Kallennagel, Bezahnung u. s. w.), während die beiden andern Gruppen, Rüsselthiere und Klippspringer, durch Hufe, Zähne und innere Organisation durchaus abweichen.

Siebente Ordnung.

Raubthiere (Carnivora).

Oben und unten sechs kleine, meißelartige Schneidezähne, ein großer Eckzahn in jedem Kiefer, der in eine Lücke des entgegenstehenden Kiefers eingreift; ein großer, schneidender Reißzahn unter den Badzähnen, von welchen nur die hintersten zuweilen stumpfe Höcker tragen. Augenhöhlen niemals geschlossen. Niemals entwickelte Schlüsselbeine. Zehen mit Krallen, meist frei, nur selten durch Schwimmhäute verbunden.

Der Körper verbindet in ausgezeichneter Weise die Bedingungen der Kraft, der Schnelligkeit und der Leichtigkeit. Der Schädel ist kurz gedrungen, kräftig (Schädel des Luchses, Taf. 4, Fig. 11); die Gehirnhäute meist mehr oder minder rundlich, die Schlafgruben tief, die Leisten zum Ansätze der Weisknochen meist so stark entwickelt, daß sie einen hohen Kamm bilden, der sich über den ganzen Raum des Mittel-

Fuchs (*Lynx europaeus*, Fig. 10). Unsere Art im Norden und den Hochgebirgen; die Art in Canada. Noch mehr weichen ab die rde (*Cynailurus jubatus*, Fig. 14), mit vollen langen Schwanz, mehr hundeartigem Körper, krallen, wie bei den Hunden, nicht zurückgezogen werden können. Sie werden in Afrika und nur Jagd auf Gazellen abgerichtet. Familie der Hyänen (*Hyaenidae*) kommt den im Zahnbau und der Kürze und Kräftigkeit stigen Kiefer nahe (Schädel der Hyäne, Fig. 13), eidet sich aber wesentlich durch die Bildung der täten; sie haben in beiden Kiefern drei Lüdendzähne Reißzahn und dahinter im Oberkiefer einen Störzahn, die sich aber durch das Benagen der schnell abnutzen und stumpf werden. Sie besitzen r ausgebildete Zehen an den Vorderfüßen und Strallen, die nicht zurückgezogen werden können. r ersüße sind bedeutend länger als die Hinter- r ob ab der Körper nach hinten abschüßlig er- r

Am Alter befindet sich eine Drüsentasche, stinliche Schmiere absondert. Die eigentlichen, r afrikanischen Continent beschränkten Hyänen r *crocuta*, Fig. 12) jagen meistens in Haufen des r umher und nähren sich auch von Aas und ähnr r essen, wie denn das Ausgraben der Leichen be- r

Tags über schlafen sie in Höhlen, welche sie r gegraben haben. Im Körperbau sehr über- r end, aber in der Bildung der Zähne, die sich r Hobben durch Zehlen des Reißzahns und r abderiger Backzähne annähern, sehr abweichend r südafrikanische Erdwolf (*Proteles laund*, Fig. 1), der sich besonders von Strandthieren, u. s. w. nährt.

Familie der Hunde (*Canidae*) hat eine gewisse r im Körperbau mit den Hyänen, besitzt r vier gleichmäßig ausgebildete Füße, die r mßbeig, hinten nur vierbeig und mit fest- r Krallen bewaffnet sind; die Kiefer sind r der Kopf (Schädel des Wolfs, Fig. 4) deshalb r reich mit zugespitzter Schnauze, der Eckzahn r die drei Lüdendzähne scharf zugespitzt; der Flei- r chend; hinter ihm stehen zwei Backzähne mit r hockern, die Zunge ist sammtartig weich, nicht r ig, wie bei den vorübergehenden Familien, die r nicht groß, der Geruchssinn vorzugsweise ent- r Drüsentaschen fehlen durchaus.

Den eigentlichen Hunden, die keine Höhlen r Trupps oder Familien laufend jagen und r die Pupille besitzen, zeichnen wir aus: den r n Hund (*Lycaon pictus*, Fig. 2) aus Südafrika, r gestrecktem Balle, hyänenartigem Habitus, großen r den Wolf (*Canis lupus*, Fig. 3), über die r ördliche Hälfte beider Hemisphären ver- r hier und da (England) vollständig ange- r Kolon (*Canis Dalmatensis*, Fig. 5) in r n, unserm Schäferhunde sehr ähnlich; den r l (*Canis aureus*, Fig. 6), mit fuchsähnlichem r, im Umkreise des Mittelmeers. Die Her- r isers, in so vielen und merkwürdigen Ab- r existirenden Haushundes, ist noch nicht voll- r aufgestellt; die ältesten europäischen Hunde r iten aus der Steinzeit stammen höchst wahr- r vom Schafal, zu dem in der Bronzezeit ein r, aus Afrika eingeführt, von Abyssinien r der Hund kam; die übrigen Varietäten wurden r durch Züchtung, theils durch Mischung mit r wilden Hunden erzeugt. Die Füße (*Vulpes*) r durch die senkrechte lagenartige Pupille und r ern Beine ab, sie graben Höhlen und geben

nur allein oder paarweise auf Raub aus. Herber unser ruchs (*Vulpes vulgaris*, Fig. 8) und der größere süd- r amerikanische (*Vulpes Azarae*, Fig. 7), dessen Schädel r mehr dem Wolfe gleicht. Eine besondere Gruppe bilden r die Zennet (*Megalotis Zarda*, Fig. 9), kleine Thierchen r mit ungeheuern Ohren aus den afrikanischen Wästen.

Die Familie der Stintraßen (*Viverridae*), besteht r aus langgestreckten, spißschnauzigen Thieren, mit laugem r Schwanz und kurzen Füßen, welche vorn und hinten r eine gleiche Anzahl von Zehen, vier oder fünf, besitzen r und in ähnlicher Weise, wie die Hyänen, in der r Gegend des Afteres oder der Geschlechtstheile eine r Drüsentasche haben, welche eine stark riechende Schmiere r absondert, die bei einigen zum Arzneigebrachte ver- r wendet wird. Oben finden sich drei, unten vier spiß- r legelförmige Lüdendzähne, auf welche der schneidende r Reißzahn folgt, der insofern nach innen einen stumpf- r höckerigen Fortsatz zeigt; hinter den Reißzähnen r stehen oben zwei, unten nur ein stumpfhöckeriger Back- r zahn; die Eckzähne sind drehend, spißlegelförmig; r nicht zusammengebrückt und schneidend, wie bei den r vorigen; die Zunge ist scharf, seilenartig, der Pelz r meist grobhaarig und wenig geschäft. Es sind näd- r liche Raubthiere der südlichen Zonen, die besonders r kleinern Thieren nachstellen und im ganzen äußerst r blutgierig scheinen.

Die eigentlichen Stintraßen, welche mit Ausnahme r einer einzigen in Mexico vorkommenden Art alle die r Alte Welt bewohnen, können wie die Krallen r zurückziehen und sind reine Zehengänger. Hierher gehören r die afrikanische Civette (*Viverra Civetta*, Fig. 10) mit r sträubbarer Mähne; die Ginstelröße (*Genetta vulgaris*, Fig. 11), die in Algerien und Südspanien zum Mäuse- r fang in den Häusern gehalten wird; die Klasse (*Viverra r indica*, Fig. 14) in Indien; die *Palmenum* (*Paradoxurus typus*, Fig. 12) in Südafrika, die einen roll- r schwanzz besitzen und auch Früchte nicht verschmähen; r die echte Zibethkatze (*Viverra zibetha*), ursprünglich r auf den Molukken heimisch, dann über Südafrika und r Südamerika als Hausthier verbreitet. Man nimmt r den Zibeth, der im Orient noch als Parfüm gebraucht r wird, mittels eines Kessels aus der Drüsentasche. — Zu den Stintraßen mit nicht zurückziehbaren Krallen r gehört die Pharaonstratte oder *Scorpaenon* (*Herpestes r leucneumon*, Fig. 13), früher von den Aegyptern gött- r lich verehrt als Verteilger der Eier des Krokodils, der r kleinern Schlangen u. s. w. Sie wird noch als Mäuse- r vertilgerin im Hause gehalten.

Die Familie der Marder (*Mustelidae*) hat einen r noch länger gestreckten Körper als die vorigen, und r sehr kurze niedrige Füße, so daß der Körper sich kaum r über den Boden erhebt. An Vorder- und Hinterfüßen r sind fünf Zehen vorhanden; der Kopf (Schädel des r Marders, Fig. 16) ist meist kurz, dick, die Eckzähne r schlant, hatig, die Lüdendzähne gewöhnlich nur in ge- r ringer Anzahl vorhanden, der Reißzahn breit, scharf r und stets mit ein einziger Höckerzahn hinter demselben r entwickelt. Es sind schlane, nädliche, blutgierige Thiere, r welche oft sich damit begnügen, nur das Blut ihrer r Opfer zu saugen und im Verhältnisse zu ihrer Größe r ungemeine Verwüstungen in Höfen und Hühnerställen r anrichten können. Der Pelz der meisten Gattungen, r besonders der im Norden lebenden, sehr geschäft. Die r echten Marder sind Zehengänger und haben halb zurück- r ziehbare kurze Krallen. Hierher gehören der Edelmar- r der (*Mustela martes*, Fig. 15), mit gelbem Halsfled, in Wä- r dern; der Steinmarder (*Mustela foina*), mit weniger r geschäftem Pelz und weißem Halsfled, in der Nähe der r Wohnungen; der Zobel (*Mustela zibellina*), im höchsten r Norden, besonders Sibirien. Eine andere Gruppe hat einen

sehr breiten Höderzahn im Oberkiefer; hierherder Zitiß oder Raß (Putorius foetorius, Fig. 18), ebenso berücksichtigt als Geflügelieb wie die Marder; nebst seinem Albino, dem weißen Frettchen (Mustela saro), das zur Raßnischenjagd benutzt wird; das große Wiesel oder Hermelin (Mustela erminea, Taf. 6, Fig. 1), im Sommer braun, im Winter weiß mit schwarzer Schwanzspitze; das kleine Wiesel (Mustela vulgaris, Taf. 5, Fig. 17), besonders gern in Steinhausen und an Rainen. Halbsohllengänger ist schon der Vielfraß (Gulo borealis, Taf. 6, Fig. 2), ein großer plumper Erdmarder des Nordens, dessen Name durch das missverstandene norwegische Wort „Jäfflraß“ (Vergräubthier) aufgefaßt wurde.

Halbsohllengänger.

Familie der Ottern (Lutrida). Der letzte obere Backzahn groß, quadratisch. Zehen durch Schwimmhäute verbunden, Schwanz platt. Den Uebergang zu den Mardern bildet die kleine Sumpftotter, der Nörz (Lutrota vulgaris), in Europa und Asien, und der ihm sehr nahe stehende Bizon aus Nordamerika (Lutrota vison), beide hochgeschätzt als Pelzthiere. Die eigentlichen Ottern (Lutra vulgaris, Taf. 5, Fig. 19) haben einen platten breiten Schädel, höchst scharfes Gebiß, verschließbare Nasenlöcher, kurze Ohren (Schädel der Fischotter, Lutra vulgaris, Fig. 20). Die Seeotter (Enhydria), jetzt nur noch im höchsten Norden vorkommend, hat robbenähnliche, nach hinten gerichtete, flossenähnliche Hinterfüße, langen, cylindrischen Leib, fast Robbengestalt. Ihr Pelz wird zu ungeheuren Preisen geschätzt. Alle Ottern nähren sich von Wasserthieren, Fischen, Krebsen u. s. w., sind im Schwimmen und Tauchen äußerst geschickt und sehr schlau.

Familie der Dachse (Mephitidae). Oben wenigstens ein Backzahn mehr als unten (Schädel des Dachses, Taf. 6, Fig. 7). Fleischzahn mit innerem Höder. Oberer hinterer Höderzahn quadratisch quer oder dreieckig. Sohlen nackt. Vorderkrallen scharf, groß, zum Graben. Meist Aferdrüsen, die ein sehr stinkendes Secret liefern. Hierher der Honigdachs (Baleus capensis, Fig. 4) Südafrikas, der zum Aufspüren der wilden Bienennester dient; das über alles Raß stinkende Stinkthier (Mephitis mephitis, Fig. 8) in Amerika und die Zorilla (Rhabdogale) in Südafrika; der weniger stinkend, aber immer noch arg riechende Stinkdachs (Mydaus meliceps, Fig. 5) in Java; unser Dachs (Meles taxus, Fig. 6), mit wenig entwickelter Aferdrüse. Alle diese Thiere leben in Höhlen, gehen in der Dämmerung nach Nahrung und verschmähen saftige Früchte und Wurzeln nicht. Die Stinkthiere spritzen ihr Secret zur Vertheidigung aus.

Sohllengänger.

Familie der Kleinbären (Subursida). Der Reißzahn nicht mehr scharf schneidend; die Backzähne mit stumpfen Hödern; gerade Zehen, stumpfe Krallen; Beine kurz; gedrungenen Körper, langer, meist buschiger Schwanz. Hierher der Waschbär (Procyon lotor, Taf. 6, Fig. 9) aus Nordamerika, der den bekannten, sogenannten Schuppenpelz liefert und die sonderbare Gewohnheit hat, seine Nahrung zwischen den Vorderpfoten, am liebsten in Wasser, zu reiben, ein gefasster Hühnerdieb; die Nasenbären oder Coati (Nasua socialis, Fig. 10), mit langer Schnüßnase, aus Südamerika.

Familie der Bären (Ursida). Große plumpe Thiere, mit langem Schädel (Schädel des Bären, Fig. 13), gewaltig didem, aber kurzem, rundem Eckzahn, aus-

fallenden Lidenzähnen, ohne Reißzahn, mit höderigen Backenzähnen. Sohlen nackt, kurz. Krallen stumpf. Die meisten Arten leben außer von Fleisch, auch von Früchten und Beeren. Hierher unser brauner Bär (Ursus arctos), über die ganze nördliche Hälfte des alten Continents verbreitet, und eine Menge Arten mit pelz aus allen Weltgegenden, von denen einige Beweglichkeit der Vorderextremitäten besitzen. Der Polarbär (Ursus polaris, Fig. 14) unterscheidet sich von den übrigen durch den weißen Pelz und die Sohlen, er lebt nur von Fischen und Robben im nördlichen Polarmeere.

Familie der Widelbären (Cercopithecidae). Kleinen niedlichen Thiere, die einen dicken Pelz, kurzgestülpten Kopf und einen langen Schwanz besitzen, klettern nachts auf Bäumen, nähren sich besonders von Früchten, kleinen Thieren und führen die Nahrung in Vorderfüße, ganz in ähnlicher Weise wie die Menschen in den Mund. Die Eckzähne sind nur kurz, stehend, die beiden Lidenzähne klein, die Backzähne mit stumpfen Hödern versehen, der eigentliche Reißzahn fehlt; Vorder- und Hinterfüße haben eine vollständige fleischige Schwärze fünf Zehen, die ganz vollkommen getrennt voneinander etwas entfernt werden können, der Fuß namentlich gleicht in seiner Gestalt sehr dem Menschen, unterscheidet sich indessen, begreiflich, durch die scharfen Krallenmängel, die allen Zehen entwickelt sind und mehr zurückgezogen werden können. Hierher der Affe (Ateles tigris, Fig. 15) aus den Tropen und der Kinkajou oder Widelbär (Cercopithecus volvulus, Fig. 16) aus Centralamerika.

Achte Ordnung.

Robben (Pinnipedia).

Gürteltierchen mit wenig entwickelten Back- und Eckzähnen, einformigen kurzen flossenartigen Extremitäten, hinteres Paar in die Nähe des Schwanzes rückt ist. Wasserbewohner.

Die Robben zeichnen sich durch den fast von vorn nach hinten kegelförmig verschmälerten Hals, die flossenförmigen Hinterfüße aus, der starke Hals übergeht, auf welcher kleiner, fast runder Kopf sitzt. Alle kräftigen Muskeln sind durch eine dicke Haut verhüllt, über welche eine mit platt anliegenden besetzte dicke Haut gezogen ist. Die ganze Thiere hat etwas außerordentlich Plumpes, fülliges, und nähert sich derjenigen der Walrösse (Schädel des Seehundes, Taf. 6, Fig. 19), die Kiefer gedrungen, die Leisten für der Schläfenmuskeln stark entwickelt, sechs Gattungen ein hoher Kamm über die Schädel sich hinzieht; die Augenhöhle ist nach hinten in die Schläfengrube geöffnet; starken Kiefer tragen vorn einen Vogen Kiefergelenk, meißelartige Schneidezähne, deren Dauer sehr unbeständig ist, da sie bei manchen schon sehr bald ausfallen, ohne später ersetzt zu werden. Die Eckzähne sind selten groß, bald ganz gespißt, zuweilen in Form von Hauern. Die Backzähne bis auf den letzten gewöhnlich in ihrer Form nicht verschieden, mit stark gereihten Kronen versehen, die oben oft zu

und, so daß bei manchen Gattungen jede Zahn-
 mlich die Gestalt eines mehr oder minder tief
 itten Dreiecks erhält. Das weite Maul
 iden, aufgewulsteten Lippen bedeckt, in denen
 ebr dicke und lange, spiralförmig gedrehte Schnurr-
 leden; die Nasenlöcher finden sich am Ende
 auge und bilden meist Rängspalten, welche
 ondere Muskeln hermetisch geschlossen werden
 die Augen sind groß, klar, meist hellbraun
 und von ausnehmend klugem Ausdruck, die
 Augen im ganzen Thierreich; die Ohröffnung
 ein und ein äußeres Ohr entweder gar nicht vor-
 er sehr rudimentär (Steleet des Seehundes,
 atulina, Fig. 18: a Schulterblatt, b Brust-
 e, c Oberarm, d Vorderarm, e Handwurzel,
 f, g Finger, h Hinterfuß, i Schenkelbein,
 hantel, l Knie, m Becken). Die Vorderfüße
 mittelbar unter der Brust, wo der Körper
 en ist, und stellen breite kurzgestielte Ruden-
 or, an denen man zwar die Zehen und die
 sprechenden gekrümmten scharfen Palentrallen
 unterschieden kann, die aber durch eine dicke,
 Schwimmhaut miteinander zu Schwimmfloßen
 sind; die Hinterfüße sind durchaus nach-
 haben, in gleicher Flucht mit dem Körper
 nd so zu beiden Seiten des kurzen Schwanzes
 is sie eine mächtige, doppelte senkrechte End-
 ne, welche das wesentliche Bewegungswerk-
 Thiers ist. Die Rippen liegen weit nach
 der Nähe dieser mißgestalteten Ruherfüße.
 isten Hobben leben im Meere, einige auch
 Landseen (Baital, Aral, Kaspißches Meer),
 in der Nähe der Küsten, wo sie sich be-
 Flußmündungen an felsigen, unbewohnten
 in der Nähe der Eisbänke gefallen. Auf
 rtigen Vorderfüße gestützt, kriechen sie müß-
 schweren Körper auf dem Boden schleifend,
 ehlingsplätzen aus Trodene, wo sie meistens
 tlich in der Sonne schlafen und beim Nahen
 r sich sogleich in das Wasser stürzen. Man
 s Specks und der Häute wegen, indem
 if dem Eise oder dem Lande überrascht und
 blagen auf die Nase betäubt.
 der Seehunde (Phocida). Kein äußeres
 beiden Hemisphären, aber vorwiegend im
 ierher der gemeine Seehund (Phoca vitu-
 7) in den nördlichen Meeren, und ebenda-
 pp müße (Stenmatopos cristatus, Fig. 20),
 das Männchen auf der Nase eine mähnen-
 der Mitte geliebte Haut besitzt, die aufge-
 en kann. Der Klappmüße entspricht im
 See-Elefant (C. proboscidea), dessen Nase
 rzen Rüssel verlängert ist. Diese größte
 bis 30 Fuß lang.
 der Ohrrobben (Otaria). Eine außer-
 kleine Ohrmuschel. Im Süden und im
 n bis hoch in den Norden hinaus. Dort
 der Seebär (Arctocephalus salcandicus,
 . 1), der zuweilen sogar durch die Inseln
 nach Grönland sich verirrt.
 der Walrosse (Trichechida). Sehr ab-
 1 den übrigen; Eckzähne ungeheuer, hauer-
 end, Schneidezähne meist im Alter aus-
 einfachen platten Backzähne nach innen ge-
 l des Walrosses, Fig. 3). Nähren sich
 1, die sie mit den Hauern aus dem Sande
 Die Eckzähne sehr geschäpft als Eisenbein.
 15 Fuß lang. Früher bis nach Norwegen
 gt nur noch in der Höhe von Spitzbergen.
 t (Trichechus rosmarus, Fig. 2).

Neunte Ordnung.

Rüsselthiere (Proboscidea).

Zwei lange Stoßzähne im Zwischenkiefer;
 keine Schneidezähne im Unterkiefer; aus queren
 Schmelzfalten zusammenge setzte, platte Back-
 zähne. Nase in einen Rüssel verwandelt.
 Zehen verwachsen, mit platten Dedhufen.

Der Schädel (Schädel des jungen Elefanten, Taf. 8,
 Fig. 3) der Rüsselthiere ist verhältnißmäßig groß, hoch
 und schwer, die Stirn fast steil abfallend, was indeß nicht
 in der Ausbildung der Gehirnmasse seinen Grund hat;
 die Hirnhäute sind im Gegentheil im Verhältniß zu dem
 großen Schädel auffallend klein, das äußere und innere
 Blatt der Schädelknochen aber durch blasig aufgetriebene
 Knochenzellen, welche mit Fett gefüllt sind, voneinander
 getrennt. Der Raum, den diese Zellen einnehmen, ist
 ebenso bedeutend, als derjenige für das Gehirn. Die
 Bezahnung ist höchst eigenthümlich. Gewöhnlich sitzen
 in jedem Kiefer nur zwei ungemein große, länglich-
 vierseitige, platte Mahlzähne, die nur unbedeutende
 Wurzeln haben, deren Oberfläche aber bei den eigent-
 lichen Elefanten mit innern durch Cement verbun-
 denen Schmelzfalten besetzt ist, die meistens verschiedene
 Rhombenfiguren zeigen.

In dem Maße als sich diese breiten Mahlzähne
 abnutzen, bilden sich hinter ihnen in der Kieferrinne
 neue, die sich allmählich nach vorn schieben und die
 Stelle der abgenutzten Zähne einnehmen, welche nach
 und nach zerbröckeln und verloren gehen. Durch dieses
 beständige Abnutzen und Ersetzen, das sich bis in das
 hohe Alter der Thiere ununterbrochen fortsetzt, wird
 ein ziemlicher Wechsel in der Bezahnung, je nach den
 verschiedenen Altersperioden des Thiers herbeigeführt.
 Die Rüsselthiere schließen sich durch diesen Zahnwechsel
 äußerst nahe an die Seetische an, bei welchen ein ähn-
 licher Ersatz der abgenutzten Zähne beobachtet wird.
 Außer diesen Backenzähnen, die bei den alten Thieren
 in dem Unterkiefer einzig vorhanden sind (bei den
 Mastodonten allein existiren in der Jugend zwei kurze
 Milchstoßzähne im Unterkiefer), finden sich in dem
 Oberkiefer zwei Stoßzähne, welche lang, tonisch zu-
 gespitzt, leicht gekrümmt und bei dem Männchen weit
 mehr entwickelt sind als bei dem Weibchen. Diese
 Stoßzähne, die oft eine gewaltige Länge und ein Ge-
 wicht von einem Centner erreichen, stehen zu beiden
 Seiten aus dem Maule, den Rüssel umfassend, hervor
 und liefern das bekannte Eisenbein. Der Rüssel selbst
 ist die Verlängerung der Nase, deshalb in der Mitte
 durch eine senkrechte Längsscheidewand in zwei Röhren
 getheilt und vorn mit einem zum Ergreifen geeigneten,
 fingerartigen Fortsatz versehen. Gewaltige Muskel-
 massen bedingen seine freie Beweglichkeit. Das äußere
 Ohr der Rüsselthiere ist bedeutend, die Füße plump,
 säulenförmig und mit fünf kleinen platten Hufen ver-
 sehen, die den fünf wohl ausgebildeten Zehen ent-
 sprechen, welche aber ganz in Sebnengewebe eingebettet
 und von der Haut umschlossen sind. Der Fuß stellt
 so einen mit dicker Schwielenmasse gefüllten Ballen
 vor, auf dessen oberer Fläche die Hufe aufliegen. Das
 Weibchen hat nur zwei Rippen, welche an der Brust
 liegen, der Schwanz ist kurz, mit steifen Borsten besetzt.

Wir kennen jetzt nur zwei Arten, den indischen Ele-
 fanten (Elephas indicus, Fig. 2), größer von Statur,
 mit kleineren Stoßzähnen, kleineren Ohren und fast senk-
 recht abfallender Stirn, der im tropischen Asien als
 Hausthier gezähmt wird, und den afrikanischen, mit
 ungeheuern Schlappohren, rhomboidalen Schmelzfigu-
 ren der Zähne, der jetzt nur noch wild vorkommt, des Eisen-
 beins wegen gejagt wird, im Alterthum aber gezähmt

wurde. Die wilden Elefanten leben besonders in sumpfigen Wäldern truppweise unter Anführung eines alten Männchens. In der Gefangenschaft pflanzen sie sich nur ausnahmsweise fort.

Neunte Ordnung.

Klippschliefer (Lamungia).

Kleine Gürteltuchler von nagethierähnlichem Habitus, dicht behaart, mit höderigen Backzähnen und flachen Hufen an den Beinen.

Es gibt nur eine Gattung mit zwei Varietäten oder Arten; der Damau, in felsigen Gegenden Syriens und am Rothen Meere (Bajan der Bibel, Hyrax syriacus), und der Klippschliefer, vom Cap bis nach Abyssinien hinaus (Hyrax capensis, Taf. 7, Fig. 4). Niedliche Thiere von der Größe eines Kaninchens, mit weichem Fell, kurzen Ohren und Schwanz, gespaltener Oberlippe, vorn vier, hinten drei Zehen, bis an das Ende mit Haut verbunden; die hintere freie Innenzehe trägt eine Krallen, alle andern Hufe. Die mittlern Schneidezähne des Oberkiefers des Milchgebisses fallen aus; die äußern bleibenden nagerartig, die untern horizontal gestellt; keine Eckzähne; die zahlreichen Backzähne (sieben jederseits) oben wie unten mit queren Höckern. Sie nähren sich von Pflanzen und graben sich Erdböhlen.

Legion der Abcuduanen oder Zottenkuchler.

Die Placenta wird durch mehr oder minder gehäufte Zotten vertreten, die auf der ganzen Oberfläche des Eies zerstreut und nur locker in die Schleimhaut des Uterus eingefügt sind, so daß sie sich bei der Geburt davon trennen.

Gruppe der Ungleichzeher (Perissodactyla).

Von den ältesten Tertiärschichten an, wo zuerst Zottenkuchler auftreten, lassen sich zwei wesentliche Reihen von Säugethieren unterscheiden, die man früher einer Ordnung, den Dickhäutern oder Pachydermen zuzählte und die außerdem bei weiterer Entwicklung einestheils in die Einhufer, andernteils in die Wiederkäuer auslaufen. Die charakteristischen Unterschiede dieser Reihen liegen in der allmählichen Reduction der Zehen. Wahrscheinlich überall von der ursprünglichen Fünfzahl ausgehend, äußert sich diese Reduction bei der einen Reihe dahin, daß die Mittelzehe das Uebergewicht gewinnt und die beiden andern Paare der Zehen, inneres wie äußeres, nach und nach verkümmern, den Boden nicht mehr berühren oder ganz, bis in die Mittelfußknochen hinein, mit der Mittelzehe verschmelzen, so daß diese zuletzt allein den Boden berührt und allein den ganzen Fuß bildet. Bei der andern Reihe bleiben die beiden mittlern Zehen im Vorsprunge (die dritte und vierte) so daß die beiden innern und die äußern nach und nach in ähnlicher Weise verschwinden und dann der Fuß aus zwei Zehen besteht. Da mit diesen auffallenden Fußbildungen auch noch andere Eigentümlichkeiten in Verbindung stehen und die Affiliation der ausgestorbenen, mit mehr Zehen versehenen Typen mit den jetzt lebenden bei den meisten deutlich nachgewiesen werden kann, so muß die frühere Ordnung der Dickhäuter gänzlich aufgehoben und in diese beiden Gruppen der Ungleichzeher und der Gleichzeher zerlegt werden. Die erste dieser Reihen gipfelt dann mit den Einhufern, die andere mit den Wiederkäuern. Die Zehen der Thiere in beiden Reihen sind mit Hufen versehen, in welchen weist das Zehenende wie in einem Schuh steckt, weshalb man sie auch als Hufthiere (Ungulata) bezeichnet hat.

Elfte Ordnung.

Einhufer (Solidungula).

Zottenkuchler mit einem einzigen allen drei Zahnarten.

Der Schädel (Schädel des Pferdes, Taf. 8) langgestreckt, pyramidal, die Stirn flach, nach vorne gezogen und der Unterkiefer namhaft in der Entwicklung bemerklich; der Mund ist oben mit sechs Schneidezähnen besetzt, mit einer bohnenförmigen braunen Vertiefung an der Innenseite zeigen, die später durch die Abnutzung eine lange Zahnlücke, die bei der Reife des Thieres benützt wird, wird nur von rudimentären Eckzähnen unterbrochen, die nicht zur Entwicklung kommt; die sechs in jeder Kieferhälfte stehen, sind vier, die erste und letzte dreieckig, seitlich zusammen auf der ebenen Kaufläche mit vier unregelmäßigen Schmelzleisten gezeichnet. Die vier Füße sind die obren Knochen der Hand nur kurz, die der Mittelhand oder mittlern angehörigen aber bedeutend verlängert, es nur die mittlere Zehe, welche an die Mittelfußknochen und den Stützknöchel des Fußes bildet. Die Knochen der Hand oder des Fußes nur kurz und in zwei Reihen gestellt, die Mittelfuß folgt der starke Mittelfußknochen der Hand zu dessen beiden Seiten oben noch kleine Knochen, Rudimente der äußern Zehen, sind; es wird dieser Knochen gewöhnlich bein genannt. Auf ihn folgen die kleinen beweglich verbundenen Zehenglieder, welche bilden, und als letzte Endigung das Abknöchel, umgeben von dem Hufe, dessen eine mehr oder minder halbmondförmige Die Haut aller Einhufer ist kurz und an der Hals mit einer Mähne gesiert und der Schwanz meist mit einem Büschel behaftet.

Die Einhufer sind gesellige Thiere, sie zusammen besonders gern die Hochgebirge Plateaux bewohnen, wo sie grasen selbst und ihre Zungen gegen die Angestrichen verteidigen. Wir haben bekannt, das Pferd und den Esel, zu Gattung. Die erste Art ist in unzähligen Varietäten über die ganze Erde verbreitet, läßt sich in Klimate mit Ausnahme der heißesten wohnen und ist in den Steppengegenden und Neuen Welt nach der Zählung wild, so daß das ursprüngliche wilde Pferd mehr vorhanden ist; der wilde Esel das als äußerst behendes, schlaues und auf den Gebirgsebenen Persiens und wo er Onager oder Kulan genannt zuhause im Zustande läßt sich der Esel so hoch nach Norden verpflanzen, als seine Entwicklung leidet sehr unter kälteren Klimate. Die Bastarde zwischen Maulthier und Maultesel, sind in der Natur unfruchtbar, pflanzen sich aber in der Natur fort und werden dort ihrer Ausbreitung ordentlich geschäft.

In Beziehung auf die Färbung sind springlich asiatischen (oder vielleicht indischen) und die afrikanischen Thiere sonderbar gegenüber. Die erstern sind höchstens mit dunklern Rückenstreifen, seitlich auf die Schultern fortsetzt (Arenipha)

ist unser in unzählige Rassen aufgelöstes Pferd (*caballus*, Fig. 9), das ursprünglich von leinen, dickköpfigen, den jetzigen Carpanas der eihähnlichen wilden Thiere abstammen, aber eilweise mit afrikanischen Arten gekreuzt wor- uag; der Esel (*Equus asinus*, Fig. 11), der al (Equus hemione), isabelfarbig. Die den Pferde, die niemals zu Hausthieren ge- wurden, sind alle quergebteist, an den Füßen; hierher das ganz gestreifte Zebra (*Hippo- ebra*, Fig. 12), das vorn gestreifte Quagga auw; das hinten gestreifte, am Körper ein- Burchell's Pferd (*Hippotigris Burchelli*), alle n Thiergärten.

Zwölfte Ordnung.

Vielzeher (*Polydactyla*).

Leicheher mit drei oder vier Zehen, Haut und schmelzfaltigen Zehen auf adzähnen. Plumpe Thiere. lie der Naschörner (*Nasicornia*). Der plumpe ruht auf kurzen Beinen; die Haut ist fast nadt, rig, in Falten gelegt, der Schädel dreieckig efer Stirnfläche, welche vorn gegen die Schnauze oder zwei spitze, trumm gebogene, faserige Hörner schädel des indischen Naschorns, Taf. 7, Fig. 6). örner, welche nur mit der Haut zusammenhängen, udeß auf den gewölbten Nasenbeinen, welche er die Kiefer vortragen und zuweilen selbst bei fossilen Arten von einer indhernen Nasen- and gestützt werden. Die Schneidezähne wech- i den verschiedenen Arten sehr, indem bald e oder vier kleine und unentwickelte oben orbanden sind; die Eckzähne fehlen stets; die ne Lücke getrennten Backzähne sind vierseitig, o erscheinen je nach dem Grade ihrer Abnutzung verschiedener Gestalt. Doch sieht man stets er weniger, besonders an den Unterkieferzähnen er zwei halbmondförmige Leisten, deren Con- nach außen gewendet ist. Die Füße haben vorn iten drei wenig getrennte, mit kleinen Hufen Zehen. Die Thiere leben gesellig in den n Tropenwäldern der Alten Welt.

bt nur eine Gattung (*Rhinoceros*); die Arten iden sich hauptsächlich durch die Zahl der und die Falten der Haut. Einhornige: das ebildete indische Naschorn (*Rhinoceros indicus*, auf dem Festlande Indiens; das javanische ros javanus); mit zwei Hörnern das suma- und afrikanische. Die Lebensart aller ist die- i Borne sind sie fürchterlich.

ie der Tapire (*Tapirida*). Thiere von schweins- Habitus, mit kurzem Stummelschwanz, dünn er Haut und einem kurzen, sehr beweglichen, torgan benutzten Rüssel, der die Unterlippe . Der Schädel (Schädel des Tapirs, Fig. 8) ist r schmal; die kurzen Nasenbeine springen dach- über die weit ausgeschnittene Nasenöffnung. Es ch eben und unten in den Kiefern sechs Schneide- nd dann ein kurzer, nicht sehr bedeutend ent- Eckzahn, welchem in der Oberinnlade sieben, ntern sechs Backzähne folgen, die mit einfachen pelten Querschnitten versehen sind. Die Füße der sind schlank, die Zehen, deren sich vier an den üßen, drei an den Hinterfüßen befinden, wohl und mit platten Hufslanen versehen. Die leben in sumpfigen Wäldern, an Moräften ussern in Heerden und flüchten sich bei Ge- rn ins Wasser, da sie vortrefflich schwimmen chen.

r-Atlas. 2. Aufl. — Zoologie.

Ein längsten bekannt ist die in ganz Südamerika, besonders in den Niederungen verbreitete einfarbig graubraune Art, der Anta (*Tapirus americanus*, Fig. 7), von der Größe des Esels; erst später wurde in Hinterindien, Sumatra, der Schabradentapir, Maiba (*Tapirus indicus*), mit weißem Kreuze, sonst schwarz und noch später eine kleinere Art mit Zottelhaaren (*Tapirus villosus*) in den Cordillieren entdeckt.

Gruppe der Gleichzeher (*Artiodactyla*).

Alle dieser Gruppe angehörigen Thiere gehen ent- weder wesentlich oder ausschließlich auf den beiden mittlern Zehen, der dritten und vierten. Selbst da, wo vier Zehen vorhanden, sind die beiden mittlern die stärksten, und wo sich nur drei finden, ist die Ab- weichung von der Gleichzahl dadurch bedingt, daß die eine äußere Zehe ganz rudimentär geworden, die andere aber noch in reducirtem Zustande erhalten ist. Am Unterarm und Unterschenkel verwachsen die beiden Knochen mehr oder minder, während die Mittelfuß- knochen sich nach der Zahl der Zehen reduciren und schließlich, bei den Wiederkäuern, ebenfalls zu einem einzigen Knochen verwachsen.

Dreizehnte Ordnung.

Schweinsthiere (*Chaeromorpha*).

Plumpe Thiere mit allen drei Arten von Zähnen, mehr als zwei Zehen, nackter oder borstiger Haut, ohne Hörner und zusammen- gesetztem Magen.

Familie der Flußpferde (*Obesa*). Höchste plumpe, große Thiere mit niedern Beinen, ungeheuern Kopf, breiten Lippen, oben auf der Stirnfläche stehenden Augen, kurzen nackten Ohren und auf der Oberfläche der Lippen stehenden, verschließbaren Nasenlöchern. Der Schädel (Schädel des Flußpferdes, Taf. 7, Fig. 15) ist flach, mit fast röhrenförmig vortretenden, ganz ge- schlossenen Augenhöhlen, ungeheuern Kiefern und höchst kleinem Hirnraum. Die Kiefer sind oben und unten mit vier kegelförmigen, fast wagerecht stehenden Schneide- zähnen bewaffnet, auf welche die gewaltigen Eckzähne folgen, die im Unterkiefer ungemein massiv und säbel- förmig nach außen gekrümmt sind, während die des Oberkiefers nur kurz erscheinen und stets gegen die innere Fläche der untern sich abnutzen; die Backzähne sind fast viereckig und die hintern mit doppelten, in Längsreihen gestellten, dreiseitigen Kegelhörnern ver- sehen, welche bei der Abnutzung fleckblattähnliche Zeich- nungen bilden. Vor den eigentlichen Backzähnen stehen kleine unentwickelte Lückenzähne, welche nur einen Hader zeigen. Die fast haarlose Haut ist ungeheuer dick, der Schwanz kurz, die Schnauze außerordentlich breit und aufgewulstet, die plumpen Füße mit vier nur wenig getheilten, fast gleichen Zehen versehen. Die jetzt lebende Art (*Hippopotamus amphibius*, Taf. 8, Fig. 1), welche die Familie bildet, hält sich nur in den großen Flüssen und Seen Afrikas auf, deren Ufer sie abweidet. Das Thier schwimmt und taucht vortrefflich. Ist der Behemoth der Bibel.

Familie der Schweine (*Suida*). Der Körper, der zwar immer noch plump, aber doch auf höhern und schlankern Beinen als beim Flußpferde getragen ist, wird von Vorsten bedeckt, die zuweilen auf dem Rücken Vorstensäume und Mähnen bilden. Die Nase bildet mit der Oberlippe einen kurzen Rüssel, der zum Wühlen in der Erde geschikt ist. Die Schneidezähne (Schädel des Babi russia, Fig. 5) sind bei allen Schweinen vorhanden, aber nur wenig entwickelt; die Eckzähne hingegen sind sowohl in dem Ober- als in dem Unter-

sondern an diesem und dem Netzmagen vor dem dritten Magen. Die Speiseröhre setzt sich nach rechts hin in Gestalt einer muskulos-jen, welche durch zwei lippenartige Falten ge- wird, deren Ränder sich fest aneinanderlegen die Kinnre zur Röhre umgestalten können. zweiten Hinab schluden nach dem Acte des wuens gleitet das Futter in dieser Schlun- mittelbar in den dritten Magen, der eine Form hat und auf der Oberfläche mit einer längsgestellter Blätter gegliedert ist, welche ihm nen des Buches, des Psalters oder Blätter- s (b); Omasus, Psalterium) verschafft haben; jen führt eine Oeffnung in die letzte, darm- Portion, den Pfortnertheil des Magens, wel- pfsächlich die Stätte für die Absonderung des Magenflusses ist und wegen seiner die Milch- machenben Eigenschaft der Lab- oder Käse- (e); Abomasus) genannt wird. Die große ation der Magenbildung steht ohne Zweifel : Umfange in Zusammenhang, daß alle Thiere rdnung auf Gräser und Kräuter zur Nahrung gen sind, d. h. auf Pflanzentheile, die sehr sthstanzen enthalten, aus denen Fleisch und bildet werden können; jedoch eine bedeutende von Futter in dem Extractionsapparate des behandelt und der Proceß der Ausziehung vollständig als möglich durchgeführt werden ogu das öftere Durchweichen mit verschiede- ngefesten Magenflüssen und die bedeutende rung und Verarbeitung der Futtermasse die sten Hülfsmittel sind. Der Darmanal der uer, welcher im übrigen keine wesentlichen itlichkeiten zeigt, macht sich durch seine außer- ge Länge bemerkbar, indem er wenigstens ef- fimal, manchmal vierundzwanzigmal so lang Körper ist. Die Zigen liegen bei allen weit ten zwischen den Hinterextremitäten.

Ordnung der Wiederkäuer ist diejenige, welche ntlichste Fleischnahrung des Menschen liefert; re dieser Ordnung werden gegessen und die iger Arten bildet die wesentlichste Grundlage, Abbedingung für die Möglichkeit einer größern ng des Menschen an gewissen Orten und der hervorgehenden Civilisation. Alle diese Thiere sellig in Heerden und zwar meistens in der- s ein einziges älteres Männchen als Haupt Weibchen und Jungen zusammengefaßt eheint.

Die Kamele (Tylopoda). Weder Hörner eibe. Im Oberliefer (Schädel des Kamels, Fig. 1) ein äußerer Schneidezahn, der neben hn rückt. In der Zahnfläche ein edzahnartiger n, der oft ausfällt. Die Thiere treten nicht Behen, sondern mit einer unter denselben ent- schwielensoble auf. Man unterscheidet zwei : die Kamele der Alten Welt (Camelus), dybeinig, langhalsig, mit ganzer Schwielen- chwielen an Knien und Brust zum Nieder- o Niederlegen, straffem Haar und einem oder affen Fethöckern auf dem Rücken. Sind seit klcher Zeit gedähmt und wild nicht mehr vor- Das Dromedar (Camelus dromedarius) haupt- on den Arabern gezüchtet und mit diesen ver- nit einem Höder, darunter die sehr schlanken, ellen Rennkamele (Mehari); und das Trampel- melus bactrianus, Taf. 9, Fig. 12), von der nraße gezüchtet und mit dieser verkreuzt, mit zwei

Die Kamele der Neuen Welt (Auchenia), Verggegenden Südamerikas, haben geraden

Rücken, langes feines Wollhaar und eine gespaltene Schwielensohle, so daß jede Zehe mit ihrem Oberhuf isolirt ist. Das als Lastthier in den Cordilleren ge- zähmte Lama (Auchenia Lama, Taf. 10, Fig. 2), stammt von dem wilden Guanaco; das Alpaca (Auchenia paca) und Vicunia (Auchenia Vicuina) werden wie unsere Schafe, der Woll und des Fleisches wegen gezüchtet.

Die Familie der Giraffen (Deveza) wird nur von der einzigen bekannten jetzt lebenden Art gebildet. Die Giraffe (Camelopardalis Girafa, Taf. 10, Fig. 3) zeichnet sich durch den auffallend langen Hals, den kurzen Körper mit abhüftiger Rückenlinie und den kleinen Kopf mit doppelten vom Zelle überzogenen, höckernen Horn- zapfen vor den übrigen Wiederkäuern aus. Das Ge- biß ist vollkommen dem der Hirsche analog, oben und unten mit sechs Backzähnen, nur fehlen ihm die Ed- zähne durchaus. Die Zunge ist sehr lang, fast wurm- förmig, und dient zum Ergreifen und Abbrechen der Zweige. Auf dem Stirnbeine stehen vorn zwei kurze, senkrechte Hornzapfen, und beim Männchen hinter den- selben noch ein kleinerer mittlerer, die alle von be- haarter Haut überzogen sind. Die ungemeine Höhe des Widerristes ist weniger durch die Länge der Vorder- beine, als vielmehr durch die ungemeine Entwidlung der Dornfortsätze der Rückenwirbel bedingt. Den Füßen fehlt die Afterklaue und die Schwiele. Die jetzt lebende Gattung, die eine Höhe von 18 Fuß erreicht, ist auf die Tropenzone des afrikanischen Continents beschränkt.

Die Familie der Moschusthiere (Moschida) wird aus netten, zierlichen, rebartigen Thieren gebildet, die aber keine Geweihe tragen, während die Männchen (Schädel des Moschusthiers, Taf. 9, Fig. 11) große Edzähne besitzen, welche wie etwas gekrümmte Dolch- klingen aus dem Maule hervorragen. Bei dem echten Moschusthiere (Moschus moschiferus, Fig. 10), das die Größe eines Rehes erreicht und in Central- asien vorkommt, findet sich nur bei dem Männchen zwischen Nabel und Penis ein großer platter Drüsen- sack in der Bauchhaut, der den bekannten Moschus liefert. Bei den Zwergmoschusthieren (Tragulida) fehlt der Moschusbeutel und der Blättermagen; das Gebiß ist wie das der andern; einige Arten erreichen nur die Größe des Hais.

Die zahlreiche Familie der Hirsche (Cervida), überall als Wild geküßt, charakterisirt sich einerseits durch die Afterklauen und die großen Thränengruben unter den Augen, welche eine schmierige Flüssigkeit absondern, andernteils durch die eigenthümliche Art zäher Hörner, die man als Geweihe bezeichnet, die fast überall nur den Männchen zufließen und zu bestimm- ten Zeiten gewechselt werden. Nur bei der Unter- gruppe der Rennthiere besitzt auch das Weibchen Geweihe, die aber weit kleiner und schwächer sind, als diejenigen der Männchen. Der Wechsel der Geweihe steht mit der Geschlechtsfunction in enger Beziehung; castrirte Hirsche setzen keine neuen auf, werfen aber auch die vorhandenen nicht ab. Als Basis dieser Ge- weihe findet sich auf dem Stirnbeine ein Knochenzapfen, der nach oben einen Kranz bildet, auf welchem das neue Horn sich aufsetzt; dieses bildet sich ganz in ähn- licher Weise, wie die neue Knochenmasse oder der Callus nach Verletzungen von Knochen, indem eine Entzündung entsteht, welche Knorpelmasse absondert, die von der Haut überzogen ist; der ältige Knorpel- stab wächst sehr schnell heran, vergrößert sich immer mehr und verdrängt endlich gänzlich in aufsteigender Richtung von dem Stirnbeine her. Sobald die Ver- stärkung vollständig geworden ist, so fängt die um- hüllende Haut, der sogenannte Wast, an zu vertrocknen und wird dann meistens von den Thieren selbst durch

Reiben und Schlagen an Bäumen entfernt. Die Männchen haben oft Eckzähne, die aber stets klein bleiben.

Das Rennthier (*Tarandus rangifer*, Fig. 7), das Haushier des hohen Nordens, hat in beiden Geschlechtern Geweihe. Eine Augenzinnte stellt sich meist unsymmetrisch senkrecht über die Nase. Hufe sehr breit und tief gespalten. Mähne am Halse. Stangen der Geweihe am Ende verbreitert. Das Elenthier (*Alces jubata*, Fig. 6) in den kalten Gebieten beider Welttheile, mit sehr hohen Beinen, breiter Oberschnauze, die wie eine kurze Schürze über das Maul hängt, und fast unmittelbar verbreiterten Geweihen; unser Edelhirch (*Cervus elaphus*, Fig. 8) mit vielfach verästelttem Geweih, dem in Amerika der Wapiti (*Cervus canadensis*), weit größer an Gestalt und Geweih, entspricht; das Reh (*Cervus capreolus*, Fig. 9), und bis in die Tropen eine Menge verschiedener Arten.

Familie der Hohlhörner (*Cavicornia*). Ohne Zweifel die wichtigsten unter allen Thierfamilien für die Oekonomie des Menschen. Das Stirnbein trägt bei diesen Thieren in beiden Geschlechtern kurze, solide, zugespitzte Knochenzapfen, über welchen sich eine hohle Hornscheide ausbildet, die beständig bleibt, durch Ansaß neuer Schichten an der Haut nach außen fortwächst und so die hohlen Hörner bildet, welche bei einigen Gattungen nur bei den Männchen, bei den meisten in beiden Geschlechtern vorkommen. Allen Hornthieren fehlen die Eckzähne; die zweizehigen, mit großen, tiefgespaltenen Hufen versehenen Fäße zeigen stets noch zwei hintere Afterklauen. Man kann unter ihnen mehrere Gruppen unterscheiden: Die Antilopen mit vollen, festen Knochenzapfen, die zuweilen selbst den Geweihen der Hirche ähnlich werden und in der That auch bei einer Gattung, der Gabelgemse der amerikanischen Felsengebirge (*Oreamnos furcifer*), auf einem Rosenfode stehen und abgeworfen werden, sodas hierdurch ein Uebergang zu den Hirchen vermittelt wird, mit schlankem, meist hirschähnlichem Körper und oft mit Thränengruben unter den Augen; theils in den Wüsten und Ebenen der süßlichen Zone des alten Continents, theils auch, wie die Gemsen und Gabelgemsen, auf den höchsten Gebirgen, an der Grenze des ewigen Schnees in Europa, Asien und Amerika einheimisch. Wir bilden aus dieser Gruppe ab: die Gemse (*Capra rupicapra*, Fig. 2) auf den europäischen Hochgebirgen, Nard in den Pyrenäen genannt, mit ziegenähnlichem Habitus; die Canna (*Oreamnos Canina*, Fig. 3) oder Elen-Antilope, großes schweres Thier aus Südafrika; die zierliche leichtfüßige Gazelle (*Gazella Dorcas*, Fig. 4), einem Reh im Habitus ähnlich, in Nordafrika und Arabien; das mehr pferdeartige Gnu (*Catoblepas Gnu*, Fig. 5), ein wildes unzähmbares Thier aus Südafrika, mit seltsam gekrümmten, auf der Stirn zusammenstoßenden Hörnern. — Eine zweite Gruppe würde die Schafe und Ziegen umfassen, mit mehr oder minder zusammengedrückten, nach der Seite gebogenen Hörnern, häufig mit Thränendrüsen und Klauendrüsen und meist behaarter Muffel, deren Charaktere aber so ineinanderlaufen, daß keine feste Grenze zu ziehen ist und auch die Thiere untereinander fruchtbare Bastarde erzeugen. Hierher die Schafe mit spiralig nach der Seite gedrehten Hörnern, bartlosem Kinn, behaarter Schnauzenspitze, Thränengruben und Klauendrüsen, und unter diesen unser Hausschaf (*Ovis aries*, Taf. 8, Fig. 12), mit unendlichen, durch Zucht gebildeten Varietäten, vielleicht von dem noch in den Mittelmeergegenden wildlebenden Muffel (*Ovis musimon*, Fig. 13) hergehend. Zu den Ziegen mit kantigen Hörnern und

Bart, ohne Thränengruben und Klauendrüsen gehört unsere gemeine Ziege (*Capra hircus*, Fig. 14), theils in zahllosen Varietäten von alters her gezeuget und der jetzt fast in den Alpen ausgezottete Steinbock (*Capra ibex*, Taf. 9, Fig. 1), welcher in andern Gebirgen (Sierra Nevada, Kaukasus, Pyrenäen, Sinai u. s. w.) nahe verwandte Arten aufzuweisen hat. — Die Gruppe ist diejenige der Nidder, mit schwerem, plumosem Körper, nach außen gewandten Hörnern, vordien Knochenzapfen, nackter Muffel, ohne Thränengruben und Klauendrüsen. Hierher unser Hausrind (der Stier, Bos, Taf. 8, Fig. 7), das wahrscheinlich, zum Theil wenigstens vom Ur (*Bos primigenius*) abstammt, der noch im Mittelalter in Centralearopa wild lebte und gezüchtet wurde. Eine andere wilde Art, der Auerochse (*Bos wislizeni* europaeus, Fig. 9), der nie gezüchtet wurde, lebt noch im Kaukasus und dem Balas-Bialowiß und ist dem nordamerikanischen Bison (*Bos americanus*, Fig. 10) nahe verwandt. Höchst eigentümlich ist endlich der Moschusochse (*Ovis moschatus*, Fig. 11) in den nordamerikanischen Berggegenden, der den Uebergang zu den Schafen bildet und jetzt zur Eiszeit bis nach Mitteleuropa verbreitet war.

Gruppe der Fischsäuger (*Natantia*).

Der wesentliche Charakter dieser Gruppe besteht in der fischähnlichen Gestalt, der nackten Haut, die nur einige Laßhaare an den Lippen zeigt, dem Fehlen der Hintergliedmaßen, der Umwandlung der Vordergliedmaßen in Flossen, innerhalb welcher die durch articulirte Stüde repräsentirten Zehen dicht von der Haut umflossen stehen, und im Vorhandensein einer waggericht gestellten, von Sehnenhaut gestützten Schwanzflosse. Die meist geselligen und oft ungemein großen Thiere bewohnen nur das Meer oder die Ufer der großen Ströme, in welche sie hinaufsteigen.

Tunfische Ordnung.

Seetühe (*Sirenia*).

Kopf vom Rumpfe durch einen Hals verschieden. Weiche Lippen mit großen Laßhaaren. Nasenlöcher am Vorderrande der Schnauze, nicht zu Spitzbüchern umgewandelt. Verschiedene Arten von Zähnen; Eckzähne mit breiter Krone. Ziegen an der Seepflanzennahrung.

Die Seetühe schließen sich durch ihre innere Organisation, abgesehen von der Anpassung an den Aufenthalt im Wasser, am nächsten an der Lurche an. Der verhältnismäßig kleine Kopf ist nur wenig vom Körper abgesetzt, aber mit did aufgeworfenen fleischigen Lippen versehen, die mit starken Barthaaren besetzt sind. Die getrennten Nasenlöcher stehen weit auf der Spitze der Schnauze und die Nasengänge zeigen keine Spur jenes Sprigapparates, der die Walther so auszeichnet; die beiden Hälften des Herzens liegen so tief voneinander getrennt, daß dasselbe fast aus zwei nur an einer Stelle miteinander verflochtenen Herzen zu bestehen scheint. Die Bezahnung ist sehr verschieden, namentlich in Bezug auf die Vorder- und Eckzähne; überall sind aber Mahlzähne vorhanden, welche auf das deutlichste auf Pflanzennahrung hinweisen. Die beiden Zitzen liegen vorn an der Brust, nicht hinten am After; die Haut ist meistens mit einem sam stehenden Borsten besetzt; der Geschlechtstheil des Kopfes ist bedeutend kürzer im Verhältniß zum Schwanz als bei den Walen, der Unterleib meist trümpf und hoch und mit einem wohlentwidelten aufsteigenden After versehen. Die Thiere dieser Unterordnung leben

an den Risten, und namentlich in den en großer Flüsse, an deren Ufern sie sich von n nähren.

milie der Vorkenthiere (Rhytina) lebte in die Mitte des vorigen Jahrhunderts etwa Risten Kamtschatkas und der Kurilen, ist aber änzlich ausgestorben. Die einzige Art, von ur wenige Fragmente und eine sehr genaue Be- eines Augenzeugen (Steller's) übrig sind, der onate lang beobachtete, war ein plumptes Thier zwanzig Fuß Länge, dessen Haut eine Art iger Borste darstellte, welche aus miteinander nen, senkrechten Hornröhren oder Haaren ge- In jeder Kieferhälfte fand sich oben und e eine einzige breite Zahnplatte ohne Wurzel, zungenförmige Gestalt besaß und aus senk- chmelzschlinbern oder Zahnröhren zusammen-, welche miteinander verschmolzen sind.

gentlichen Seethiere (Manatide) besitzen stets ne behaarte Haut und unterscheiden sich wesent- ihre Bezahnung von der vorigen Familie. Oberkinnlade besitzen sie zwei Schneidezähne, ei der einen Gattung (Manatus) frühzeitig , bei der andern aber, wo Ober- und r plötzlich sich nach unten biegen, sich zu nigen Stoszhähnen entwickeln; im Unterkiefer ese Vorderzähne stets; immer finden sich bei en Thieren wenigstens fünf Mahlzähne in efer, die eine elliptische Gestalt und quer- Kronen besitzen, deren Leisten sich nach und ngen (Schädel des Dugong, Taf. 10, Fig. 6).

alten Dugong bleiben in jedem Kiefer nur her Zähne übrig, während bei dem Manati oder sehr erhalten und an den Flossen auch von Nägeln vorkommen. Leptere, hier ab- Art, der Manati (Manatus australis, Fig. 5), ungemein häufig im Unterlaufe der großen bes östlichen Südamerika an einzelnen Orten, im Amazonenstrom; eine andere (Manatus asis) im westlichen Afrika; der Dugong (Halicore) n Meere.

Sechzehnte Ordnung.

Wale (Cetacea).

löcher in Spritzlöcher umgewandelt, f dem Kopfe, der ungeheuer groß ist. ohne Vorsten. Niemals verschieden- Zähne. Zehen am After. Häufig eine losse.

opf ist ungemein groß, so daß er bei man- Drittel der ganzen Länge des Thiers ein- und der Schädel (Schädel des Delphinus, Fig. 8) meist in der Art unsymmetrisch et, daß die der rechten Seite angehörigen größer und länger, die Oeffnungen der linken (Nasenloch u.) größer sind. Eine besondere mlichkeit des Schädelbaues liegt noch in der des Jochenbeins, welches von elfenbeinerne r mit den übrigen Theilen des Schläfenbeins wachen, sondern nur durch Bandmasse und verbunden ist, so daß es bei der Fäulniß der ose wird; eine Bildung, die übrigens auch üben eigen ist. Der Rachen ungeheuer weit a, die Kiefer bei den Embryonen stets, bei den icht immer mit einer oft großen Anzahl spitzer, niger Zähne besammet, die in der ganzen des Kiefers keinen Unterschied zeigen und mit nsachen Wurzel in den Zahnhöhlen der Kinn- leden. Das Gehirn der Wale ist auffallend

in die Breite entwickelt — seine Windungen meist tief und zahlreich. Das Auge der Walthiere ist verhält- nißmäßig sehr klein und liegt tief unten an der Seite des Kopfes, meist unmittelbar über dem Winkel der Mundspalte. Sehr ausgezeichnet ist die Bildung der Nase, welche ganz die Bedeutung eines Geruchsorgans verloren hat und nur noch Luftweg ist, womit der gänzliche Mangel eines Riechnervs zusammenhängt. Das einfache oder doppelte Nasenloch steht oben auf der Fläche des Kopfes und führt senkrecht hinab in die meist zellig verzweigten Nasengänge, die sich senkrecht nach dem Rachen zu fortsetzen. Das Gaumen- segel ist fast horizontal gestellt und umfaßt nach hinten zu die auf der Spitze eines vorragenden Kegels ange- brachte Stimmröhre so genau, daß der Luftweg gänzlich von der Rachenhöhle und dem Schlunde abgeschieden werden kann. Die mit Wasserdampf geschwängerte Luft, die von Zeit zu Zeit nach langen Intervallen mit großem Geräusche ausgestoßen wird, bildet in der kältern Luft einen Dampfschlauch, der wie ein Spring- brunnen aus diesen senkrecht gestellten Spritzlöchern hervorbricht.

Die Haut der Walthiere ist vollkommen haarlos, die Spedlage verhältnißmäßig sehr dick; sie haben nur zwei Zehen, welche in Hautfalten verborgen un- mittelbar neben dem After weit nach hinten liegen, und werfen gewöhnlich nur ein einziges Junges, welches von der Mutter mit großer Zärtlichkeit geschützt wird. Auch die Bildung der Verdauungsorgane ist eigenthümlich; weiche Lippen, welche sonst fast allen Säugethieren mit Ausnahme der Schnabelthiere zu- kommen, fehlen den eigentlichen Walthieren durchaus, der Schlund ist meistens nur eng, der Magen dagegen aus mehreren Abtheilungen zusammengefaßt, die oft wieder in untergeordnete Höhlen zerfallen, so daß kaum bei den Wiederläufern eine zusammengekehrte Magenbildung gefunden werden dürfte.

Familie der Delphine (Delphinida). Schlaufe Thiere mit langen Kiefern, die oben und unten mit spitzen, kegelförmigen Zähnen besetzt sind, welche keine Unter- siede zeigen. Meist nur ein einziges, halbmond- förmiges Spritzloch. Man unterscheidet die Meer- schweine (Phocaenida) mit vorn abgerundetem Kopfe, worunter die furchtbaren Buktöpfe (Orca), die selbst den Walfisch angreifen; die Grinde (Globiceps) im Nordmeere; die Tümmler (Phocaena) im Mittelmeere, und die Schnabeldelphine mit sehr langen Kiefern, darunter der eigentliche Delphin (Delphinus delphis, Fig. 7) im Nordmeere, die Botten (Inia) im Amazonen- strome, der Sufal (Matania) im Ganges. Arge Fischevertilger.

Familie der Narwale (Monodontia). Im Overtiefer entwickelt sich, meist links, nur ein einziger spiralförmiger Stoszhahn, der dem fabelhaften Einhorn aufgesetzt wurde. Die typische Art, der Narwal (Monodon monoceros, Fig. 9), im nördlichen Polarmeere, bis 20 Fuß lang.

Familie der Potwale (Physeterida). Kopf ungeheuer, am Vorderende steil abgestutzt, am Schädel der Kiefer sehr lang vorgezogen (Schädel des Potwal, Fig. 10); der Raum zwischen dem Hirnraume und der Schnauzen- spitze mit Zellen erfüllt, in welchen sich der Walrath (Spermaceti) ansammelt, dicke konische Zähne nur im Unterkiefer. Nähren sich hauptsächlich von Tiefseefischen. Der Cachalot, Spermakel (Physeter macrocephalus) im Nordmeere; ähnliche Arten im Südmeere.

Familie der Walfische (Balaenida). Keine Zähne; im Overtiefer, der stark aufgebogen ist, senkrecht und quergestellte unten zerfaserte Hornplatten (Barten) (Schädel des Walfisches, Fig. 12). Im Embryo kleine

Zähne, die sich nicht entwiceln. Schlund sehr eng. Zwei Gruppen: Glattnale (Leiohalaeus) ohne Rückenfloße. Hierher der grönländische Walfisch (Balaena mysticetus, Fig. 11), bis 60 Fuß lang, mit sehr dicker Spedlage. Früher im ganzen Nordmeere, jetzt bis zum Polargebiet verjagt. Entsprechende Art im Südpolargebiet. Nahrung hauptsächlich von kleinen Molusken. Zweite Gruppe: Finnenfische (Balaenopteridae) mit einer Rückenfloße (Finne) und weit dünnerer Spedlage. Hierher der bis 100 Fuß Länge erreichende nordische Finnfisch (Balaenoptera boops, Fig. 13).

Siebzehnte Ordnung.

Zahnarme (Edentata).

Tottentuchler mit vier Füßen, wenig freien Zehen, vorn seitlich zusammengebrückten Krallen, wurzel- und schmelzlosen Zähnen, die nicht gewechselt werden und zuweilen ganz fehlen oder nur in geringer Zahl vorhanden sind. Einfacher Uterus.

Der Schädel dieser Thiere ist bei den insektenfressenden Gattungen langgestreckt, fast cylindrisch, der Hirntheil sehr klein, die Kiefer sehr lang, aber schwach und wenig entwickelt; bei den pflanzenfressenden Säugethieren ist der Schädel rund, die Kiefer kurz, hoch und stark. Einigen Gattungen fehlen alle Zähne durchaus, bei andern existiren nur wenige, schlecht entwickelte Backenzähne aus einem einzigen Schmelzprisma gebildet, das vollkommen wurzellos ist und eine weichere Zahnschubstanz umschließt; bei andern treten hierzu noch kleine, stumpf kegelförmige Eckzähne und nur eine einzige Art besitzt zwei kleine unausgebildete Vorderzähne, die in ihrer Structur ganz den Backenzähnen ähnlich sind. Die Wirbelsäule dieser Thiere ist stets sehr kräftig, die Halswirbelsäule einiger Arten dadurch ausgezeichnet, daß bis zu neun Wirbeln darin vorkommen; der Schwanz gewöhnlich lang; die Extremitäten meist kurz, did, in ihrer ganzen Structur plump und ihre Knochen oft in feltamer Weise miteinander verwachsen. Die Zehen der Thiere sind selten vollständig getrennt, meist nur gegen die Spitze hin geschieden, hier aber mit ungeheurer langen, gebogenen Sichelkrallen bewaffnet, welche besonders zum Aufgraben der Erde oder zum Umsaffen von Bäumen geschickt erscheinen. Das Gehirn ist klein, ohne Windungen oder nur mit sehr flachen Furchen versehen; die Hemisphären des großen Gehirns decken das kleine Gehirn nicht. Das äußere Ohr fehlt vielen Arten, ist aber bei andern sehr entwickelt; die Zunge ist meist sehr lang, wurm- oder riemenförmig. Die Verdauungsorgane je nach der Nahrung verschieden gebildet. Die Hoden liegen stets in der Bauchhöhle. Bei den Weibchen mündet die Harnröhre in die Scheide und bildet einen Sinus urogenitalis. Hierdurch, sowie durch das mangelhaft ausgebildete Gehirn, die bei einigen gelpaltene Ruthe, schließen sich die Zahnarmen am nächsten an die Beuteltiere an, von welchen sie sich freilich durch viele Eigenthümlichkeiten unterscheiden. Es sind träge, meist nächtliche Thiere von äußerst stumpfen Sinnen, die theils in Erdlöchern, theils auf Bäumen vereinzelt leben und höchstens die Größe eines mäßigen Hundes erreichen.

Familie der Faultiere (Tardigrada). Der Körper ist schwanzlos, mit langen, trodnen Haaren bedeckt, der Kopf (Schädel des Faultiers, Taf. 10, Fig. 19) rundlich, die Kiefer kurz, nur mit einwurzeligen, schmelzlosen Backenzähnen besetzt, ohne Schneidez- und Eckzähne, das Jochbein nicht geschlossen, der Jochbogen des Oberkiefers mit einem

langen Fortsatz versehen, der nach unten über den Unterkiefer herübergreift, die Gliedmaßen sehr lang, besonders die vordern, an denen Elle und Speiche umeinander gerollt werden können, wie bei den Affen, und mit langen, scharfen Sichelkrallen bewaffnet; der Magen aus drei Theilen zusammengefaßt. Südamerikanische Kletterthiere, die sich äußerst träge bewegen und von Blättern leben. Sie hängen meist still in der abgebildeten Stellung (Zweizebiges Säugethier, Choloepus didactylus, Taf. 11, Fig. 1) an den Bäumen. Der Ai (Bradypus) hat drei, der Sloth (Choloepus) zwei Zehen an den Vorderfüßen.

Familie der Gürteltiere (Cingulata). Der Körper ist mit Knöchern, mit Horn überzogenen Platten bedeckt, die vorn und hinten einen zusammenhängenden Panzer, in der Mitte aber Ringe bilden, so daß das Thier sich zusammenkugeln kann. Sonst nach Borstenhaare. Einfache cylindrische Zähne (Schädel des Gürteltiers, Taf. 10, Fig. 18), die nicht wechseln werden. Keine eigentlichen Schneidez- und Eckzähne. Mundspalte mäßig groß, Zunge spitz, nicht weit vorstreckbar. Äußere Ohren groß, meist nach Füsse kurz, meist fünfzig, mit großen Grabetallen bewaffnet. Die Thiere leben in Erdhöhlen, graben sich äußerst schnell ein und fressen alles: Wurmfleisch, selbst Aas. Alle Südamerikaner. Das Gürteltier (Prionodon gigas) bis 5 Fuß lang, hat bis hundert kleine, gleiche Zähne; das hier abgebildete Gürteltier (Dasypus novemcinctus, Fig. 17) bis vierzig.

Familie der Wurmzäugler (Vermilingua). Kopf und Schädel sehr langgestreckt. Kiefer sehr lang und dünn, entweder wie bei den Schuppenthieren an Ameisenfressern zahlos, oder wie beim Erdferkel, nur mit einigen gleichhöckerigen Zähnen ganz hinten (Schädel des Ameisenfressers, Fig. 16); Mundspalte sehr klein. Zunge ungemein lang, mit hornigem, zuweilen fadenartig entwickeltem Ueberzuge, meist fünfzig, mit langen Grabetallen bewaffnete Füße (Fig. 15, der Ameisenfresser, Myrmecophaga jubata). Die Thiere leben von Ameisen und Termiten, deren Baue sie aufgraben und dann in das Loch die mit fleberigem Speichel überzogene Zunge stecken, die sie mit Insekten sich bespeisen lassen. Das Schuppenthier (Manis pentadactyla, Fig. 14) mit langem, kräftigem Schwanz und dachziegelartig übereinanderliegenden Schuppen, in der Alten Welt, besonders den Suaba-Inseln; die Erdferkel (Schädel des Erdferkels, Orxetopus capensis, Taf. 11, Fig. 2), mit borstigem dünnem Haar, langen nackten Ohren, in Süd- und Mittelafrika; die Ameisenfresser (Myrmecophaga), mit langem Borstenhaar und langem Schwanz in Südamerika.

Unterklasse der Didelphen (Aplacentalia).

Die Frucht tritt in keine enge Verbindung mit der Gebärmutter, es wird keine Placenta gebildet. Das Junge wird in sehr unvollständigem Zustande geboren. Vorn am Becken finden sich besondere Beutelnöthen.

Die ganze Unterklasse, welche offenbar die niederrsten Säugethiere enthält, zeichnet sich durch höchst auffallende Charaktere aus, die theilweise mit den Reptilien und Reptilien übereinstimmen. Das Gehirn ist sehr unvollständig entwickelt; das Großhirn klein, besteht meist kaum die Vierhägel, niemals das Kleinhirn in seinem Mitteltheile entwickelte kleine Gehirn; der Schwielentkörper (Corpus callosum) mit dem Gemelle fehlt ganz; Windungen sind stets nur schwach entwickelt, wenn sie nicht ganz fehlen. Das Skelet aller

zeichnet sich bei allen, Weibchen wie Männchen die sogenannten Beuteln Knochen aus, zwei Knochen, die vorn auf dem Becken aufsteigen in der Muskulatur der Bauchwandungen. Der Name ist insofern schlecht gewählt, als bei den Kloakenthiere vorkommen, die keinen haben. Das Junge tritt nie in nähere Verbindung mit der Gebärmutter; seine erste Nahrung auf Kosten des verhältnißmäßig sehr großen und wächst dann weiter, indem es wahrscheinlich der Milch, welche die Gebärmutter erfüllt, seine Nahrung zieht; es wird in allen bis jetzt bekannten Fällen in höchst unvollständiger Ausbildung geboren und weiterhin während des Säugens erzogen.

Ung der Beuteltiere (Marsupialia).

Zunächst die Oeffnungen für den Darm und Harnkanal. Die Jungen werden in der Regel vollständig oder unvollständig aus dem Mutterleib (Beutel) gesaugt. Keine Ausbildung. Winkel des Unterleibes nach unten gebogen.

Der Kopf der Beuteltiere hat gewöhnlich eine mehr oder weniger pyramidale Form mit zugespitzter Spitze und stark hervortretendem Gesichtstheil; die Nase ist je nach den Familien außerordentlich verschieden und derjenigen der verschiedenen Ordnungen entsprechend, doch mit dem Unterleib nach vorne, besonders Insekten fressende, eine große Anzahl von Zähnen haben; die Augen sind gewöhnlich nach hinten offen und durch eine mit der Schläfenrinne verbundene; der Unterleib hat eine eigenthümliche Gestalt, indem sich sein Ende nach innen einbiegt und einen mehr oder weniger blattartigen Fortsatz bildet, welcher zum Theil den ganzen Raum zwischen den beiden Seiten des Körpers einnimmt; die Beuteln Knochen sind bei allen Arten ohne Ausnahme und bei beiden Geschlechtern in vollkommen gleicher Größe entwickelt; die Extremitäten erscheinen äußerlich sehr verschieden, gewöhnlich findet man die Vorderfüße mit freien Zehen versehen und mit langen Nagelbewaffnet, so daß sie zum Gehen sowie zum Klettern der Beute geschickt erscheinen; bei den Insekten sind sie gewöhnlich sehr kurz, verkümmert, desto weniger mit wohl ausgebildeten Schließel versehen. Sehr verschiedenartig ist die Bildung der Hinterfüße. Bei den einen sind die Zehen frei, klammern sich an und der Fuß zum Laufen; bei andern die mittlern Zehen miteinander verbunden und mit dem Mittelfuß enorm verlängert, in mächtiges Instrument zum Sprunge geeignet; bei noch andern endlich sind die Hinterfüße ohne Hände, indem neben vier nagellosen Zehen ein absehbare nagelloser Daumen ist.

Das Gehirn zeigt bei den meisten Beuteltieren eine ganz kleine oder nur sehr wenig flache Windung. Der Schwielenkörper (Corpus callosum) und die Hemisphären sind kaum angedeutet, die Pyramiden sind klein; die Hemisphären so klein, daß sie die Hirnhäute nicht bedecken, geschweige denn das Gehirn. Die äußere Ohrmuschel ist bei den meisten Beuteltieren sehr klein, bei vielen sogar von sehr geringer Größe. Den wesentlichsten auszeichnenden Charakter bietet die Bildung der Geschlechtstheile dar; bei den Männchen liegen die Hoden in einem Sacke, dem Bauche weit vor der meist mehr oder minder

gespaltenen Ruthe, die zum Theil in einem langen scheidenartigen Kanale versteckt ist; bei den Weibchen führt die weibliche Geschlechtsöffnung (weibliche Ovarien der Beuteltiere, Taf. 11, Fig. 7): a Eierstöcke; b Eileiter; c Uterus; d Einmündung in den Scheidenkanal; e Leier; f Harnblase; g Harnblase; h Oeffnung der Scheidenkanäle in die gemeinschaftliche Scheide, welche vollkommen von dem After getrennt ist, in einen mehr oder minder langen Kanal, der sich bald in zwei Röhren theilt, welche sich in Form einer Yra nach oben gegeneinander krümmen. Diese beiden Scheidenkanäle, welche man früher für die beiden Gebärmutterhälften ansah, öffnen sich in einen Sack, der mehr oder minder vollständig durch eine mittlere Scheidewand in zwei Hälften getheilt und dessen Ausbildung bei den verschiedenen Gattungen sehr verschiedene Grenzen zeigt. In diesen Sack mündet jederseits eine schlauchförmige Gebärmutter, die sich nach vorn in einen kurzen Eileiter fortsetzt, dessen weite Oeffnung den Eierstock mit zahlreichen Fransen umfaßt. Zu dieser eigenthümlichen Bildung der innern Geschlechtstheile tritt noch die Ausbildung des Beutels hinzu. Die Jungen liegen nämlich an dem hintern Theile des Bauches zu beiden Seiten der Mittellinie in mehr oder minder großer Anzahl und besitzen eine verhältnißmäßig außerordentliche Länge; sie sind in ihrem Umfange entweder nur von einer einfachen Hautfalte (Beuteltiere mit Zungen, Fig. 6) oder von einer förmlichen Tasche umgeben, die eine schlitzenartige Oeffnung besitzt und in welcher die Jungen lange Zeit an den Zehen der Mutter hängend herumgetragen werden.

Man hat über die früher so zweifelhafte Frage der Fortpflanzung der Beuteltiere in den europäischen Menagerien vielfache Beobachtungen anstellen können, aus welchen sich ergeben hat, daß der Embryo innerhalb der Gebärmutter sich insofern vollständig ausgebildet, als zum Leben in freier Luft nothwendig ist, daß er aber dann noch eine nur sehr unbedeutende Größe besitzt. Man findet alle Theile des Säugethiereies, Chorion, Nabelblase, Schafhaut und Harnhaut vollkommen ausgebildet, nur mit dem Unterleibe, daß letztere nicht bis zur Oberfläche des Chorion herankommt und auf diese Weise kein Mutterkuchen gebildet wird. Die Geburt des kleinen, aber in seinen Theilen vollständig ausgebildeten Jungen geht ganz in gewöhnlicher Weise vor sich; die Mutter empfängt es mit dem Munde, bringt es in den Beutel und hängt es dort an eine Zitze an, zu deren enger Umfassung Mund- und Rachenhöhle des Jungen in eigenthümlicher Weise kanalartig ausgebildet sind; der Beutel bleibt noch sehr lange, selbst nach der vollständigen Ausbildung des Jungen der Luftzutritt für dasselbe, so daß es sich bei drohender Gefahr hineinschlüpfet. Bei denjenigen Gattungen, bei welchen der Beutel durch eine Hautfalte ersetzt ist, hängt das Junge nur im Anfang an den Zitzen, wird aber später von der Mutter auf dem Rücken mit herumgetragen.

Mit Ausnahme der in Amerika vorkommenden Beuteltiere ist die ganze Ordnung auf Australien und die umliegenden Inseln (Tasmanien u. s. w.) sowie auf die Molukken und Neuguinea beschränkt. Die Organisation ist in jeder Beziehung eine niedere, und da auch die ältesten Säugethiere im Jura den Beuteltieren angehört haben, da einzelne Repräsentanten derselben früher auch in Europa vorkamen, so sind die Beuteltiere als die Stammsgruppe anzusehen, aus welcher sich die übrigen Säugethiere entwickelten. In der That entspricht auch die Ordnung nicht einer Ordnung der Monophylethen, sondern der ganzen Unter-

Klasse derselben, und die Familien den Ordnungen, die Bombats z. B. den Nagern, die Beutelmäuse den Fleischfressern u. s. w.

Familie der Beutelnager (Phascolomida). Nagerartige Schneidezähne, keine Eckzähne, große Lücke vor den fünf platten Backzähnen. Plumpere dicke Thiere mit dicke, breitem Kopf, kurzen Ohren, stummelförmigem Schwanz, fünf mit starken Grabkrallen bewaffneten Zehen an den Vorderfüßen; an den Hinterfüßen ein stummelartiger Daumen ohne Krallen. Der Bombat (Phascolomys fossor, Fig. 8) lebt in Neusüdwaales in tiefen Erdbhöhlen.

Familie der Kängurus (Macropodida). Der Körper wiederholt in vieler Beziehung die Organisation der Springratten durch die Verlängerung der Hinterfüße (Skelet des Känguru, Fig. 4: a Beutelsknochen, b Mittelfuß), Verkürzung der Vorderfüße und den mächtigen Steuerfchwanz. Der Kopf der Thiere, die in ihrer größten Art sitzend Manneshöhe erreichen, ist verhältnismäßig klein, der Schädel langgestreckt und in der Form wie in der Anordnung des übrigen eigenthümlichen Zahnbaues einigermassen dem der Pferde ähnlich (Schädel des Känguru, Fig. 5). Die eigentlichen Kängurus haben sechs bis acht Vorderzähne in der Oberkinnlade, von denen der hintere bei einer Gattung abgerückt ist, zwei meißelartig horizontal gestellte Vorderzähne in der Unterkinnlade, und nach einer Zahnfläche vier bis fünf würfelförmige Backzähne mit stumpfhöckerigen Kronen, während die Känguru-Ratten (Hypsiprymnus) und die Baum-Kängurus (Dendrolagus) schon mehr abweichende Verhältnisse zeigen. Die Vorderfüße mit fünf freien Zehen sind sehr kurz, die Hinterfüße ungemein lang und kräftig, der Schwanz sehr dick und lang; von den vier Zehen des Hinterfußes sind die beiden mittlern bis zum Nagelgliede miteinander verwachsen, die beiden äußern frei, alle sehr bedeutend verlängert. Sie springen in ungeheuren Sätzen, indem sie den langen Schwanz als Balancierstange gebrauchen, und stützen sich auf denselben beim Sitzen; sie nähren sich nur von Kräutern, worauf auch der Bau ihres Verdauungsapparats hinweist, indem der Magen in mehrfache Höhlen getheilt ist und der Blinddarm eine bedeutende Länge erreicht. Sie sind die eigentlichen Steppenthier des künftigen Welttheils, die in Herden leben. Das Junge bleibt sehr lange im Beutel. Die abgebildete Art (Macropus major, Fig. 3) von Menschengröße; die Känguru-Ratten (Hypsiprymnus) wie Hasen und Kaninchen groß.

Den Kängurus nahe stehen hinsichtlich des Gebisses die Früchtefresser (Frugivora), indem sie ebenfalls zwei lange meißelartige Schneidezähne im Unterkiefer und mehrere im Oberkiefer besitzen. Dagegen ist die Zahnfläche bei diesen Thieren nie vollständig ausgebildet und es finden sich meist in beiden Kinnladen oder wenigstens in der obern bald mehr, bald minder ausgebildete Eckzähne; die Backzähne gleichen denen der vorigen Familie; da die Thiere aber sämmtlich auf Bäumen herumklettern und einige sogar eine Art von Flughaut (Flugbeutel, Phalangista sciureus, Fig. 12) besitzen, welche ihnen als Fallschirm dient, so sind die Extremitäten gleichmäßig entwickelt und die vordern mit fünf freien Krallen, die hintern dagegen, an denen Zeige- und Mittelfinger miteinander verwachsen sind, mit einem entgegenstellbaren Daumen versehen, der fast nach hinten gerichtet scheint und zum Umfassen der Zweige äußerst geschickt ist. Die meisten Thiere dieser Familie besitzen einen langen Greifschwanz und treiben sich in ähnlicher Weise wie unsere Eichhörnchen auf den Bäumen umher; eine

Gattung (Phascolarctus s. Lipurus) stimmt durch den fehlenden Schwanz und den plumpen Körperbau mehr mit den Bombats überein. Ihr Magen ist einfach, der Blinddarm dagegen sehr entwickelt. Die Familie kommt außer in Australien auch auf den Sundainseln vor.

Die Familie der Beuteltaschen oder Opfium (Didelphida), die auf America beschränkt ist, hat zwischen Insektenfressern und Fleischfressern schwankendes Gebiß (Schädel der Beuteltasche, Fig. 10), mit sehr vielen (oben fünf, unten vier jederseits) Schneidezähnen, krummen, scharfen, vorstehenden Eckzähnen und scharfhöckerigen Backzähnen (oben und unten jederseits sieben), also im ganzen 50 Zähne, langen, nackten Schwanz, nackte Ohren, fünfzehige, mit ganz Sohle auftretende Füße und hinten wohlentwickelte gegenüberstellbare Daumen. Hierher das bekannte Opfium, die große Beuteltasche (Didelphys virginiana, Fig. 9), im Süden der Vereinigten Staaten der gewöhnliche Feind des dortigen Geflügels, außerordentlich zählebige, mit wohlentwickeltem Beutel, und die Känguru-Ratte (Didelphys dorsigera, Fig. 6), im Süden, bei welcher die Zehen nur von einer schmalen Hautfläche umgeben sind und die Zungen sich auf den Rücken der Mutter schlängeln, an deren Schwanz sie sich mit ihren Schwänzen anklammern.

Die Familie der Raubbeutler (Dasyurida), mit stark vorstehenden Eckzähnen, schneidenden Backzähnen, vierzehigen Hinterfüßen, an denen zuweilen eine kleine Daumen repräsentirt. So bei den Raubbeutlern oder Beutelmardern (Dasyurus Manglei, Fig. 13), die einen sehr langen Schwanz und spitzmausartigen Kopf haben, während bei den Beuteltären oder Teufeln (Diabolus ursinus, Fig. 11) der Schwanz kürzer, der Kopf und Körper gedrungenere ist und die Daumenwarze fehlt. Das größte Raubthier ist der Beutelmarder (Thylacinus cynocephalus, Fig. 14), von Größe und Gestalt eines Wölfs, der unter den Schafzähnen Verheerungen anrichtet.

Ordnung der Kloakenthier (Monotremata).

After, Ei- und Harnleiter münden, wie bei den Vögeln, in eine einzige gemeinsame Kloake.

Diese nur in zwei Typen vertretene Ordnung begreift die niedersten Säugethiere, die man sogar als eine eigenthümliche Klasse zwischen den Säugethiern und den Vögeln hat hinstellen wollen. Der Schädel dieser Thiere ist flach, der Raum für das Gehirn nur gering im Vergleich zu der bedeutenden Ausbildung des Gesichtstheils (Schädel des Schnabelthiers, Fig. 16, von unten, um die Backzähne und den sonderbaren Vorberkiefer-Apparat zu zeigen, der den platten Hornschnabel stützt); die Schnauze ist sehr lang, die Kiefer entweder vollkommen zahnlos oder mit hornigen Zähnen versehen, die eine Art von Platte bilden und aus senkrechten Hornfasern gebildet sind. Weiche Lippen fehlen durchaus. Die Schädelknochen verwachsen sehr früh, in ähnlicher Weise wie bei den Vögeln, zu einer nahtlosen Kapselform. Die äußere Ohr dieser Thiere durchaus und die Augen sind sehr klein, sonst aber vollständig entwickelt; der Schultergürtel nähert sich in seiner Bildung einestheils dem der Reptilien, andernteils dem der Vögel; die Handhabe des Brustbeins ist T-förmig und die beiden Schlüsselbeine so miteinander verwachsen, daß sie einen festen Gabelknochen wie bei den Vögeln bilden. Die Halsbeine sind außerordentlich groß und die Schulterblätter über die Gelenkgrube des

maß nach vorn hin verlängert, sodaß sie mit Brustbeine zusammenstoßen. Die Füße haben Zehen, welche überall mit langen Krallennägeln enden; die Männchen tragen außerdem an den Hinterfüßen noch einen eigenthümlichen Sporn, der ganzen Länge nach durchbohrt ist und mit Ausführungsgang einer Drüse in Verbindung steht nach der Behauptung der Eingeborenen einen Saft absondern soll. Die weiblichen Geschlechtsorgane und denjenigen der Vögel analog gebildet, in der rechten Eierstock verlämmert, der linke traubenförmig dagegen fast einzig entwickelt ist. Dieser liegt unmittelbar neben der spaltenförmigen Oeffnung der Trompete, welche in einen kurzen Gileiter führt, der jederseits zu einem schlauchförmigen Uterus führt. Die beiden Uteri öffnen sich getrennt voneinander auf zwei warzenartigen Erhöhungen, auf zugleich die Oeffnungen der Harnleiter sich befinden in einen weiten Kanal, der nach vorn in die Harnröhre, nach hinten in das erweiterte Ende des Darmes, in die Kloake sich fortsetzt. Die Milchdrüsen haben keine Zitzen, sondern öffnen sich einfach in der spaltenförmigen Oeffnung jederseits am Bauche; die Schnabelgelenke in einer tiefen Grube, in welche die Junge mit ihrem Vorderförer eingesenkt ist. Die Weibchen und Jungen des Schnabeligels, Echidna, (Fig. 18). Es gibt nur eine auf jeder Seite. Die Weibchen haben aus diesen wurmförmigen Blindgängen, die Ausbildung je nach dem Zustande der Trächtigkeit verschieden ist.

Schnabelthiere (Ornithorhynchida) haben einen breiten, plattgerühten, einem Entenschnabel ähnlichen Oberkiefer, der vorn die Nasenlöcher trägt und dessen untere Rinne der schmale Unterkiefer (Schnabelthier, Ornithorhynchus paradoxus, Fig. 15); an der Seite zeigt dieser Schnabel eine Rinne und im Hintergrunde des Mauls eine kleine Hornplatte ohne Wurzel, die aus senkrechten Zähen besteht. Der walzenförmige Körper ist mit groben Fellhaaren besetzt, der Schwanz plattgerüht, behaart. Die fünf Zehen der Füße sind durch eine Schwimmhaut verbunden, welche an den Vorderfüßen die Krallen weit überragt. Die Thiere leben in Neuholland in Teichen und Flüssen, ernähren sich von Insekten und kleinen Fischen. Die Eingeborenen behaupten, daß sie Eier legen, doch hat man nie neben zolllangen, kaum geborenen Jungen die Schalen beobachtet.

Die Ameisenigel (Echidna), die in dem Inneren der Erde leben, ist die Schnauze lang und dünn, der Schnabel ausgezogen; die Füße sind sehr zähelos; der Gaumen ist mit kleinen gerichteten Hornwarzen besetzt; die Zunge ist lang, sehr beweglich; die Füße mit starken, gebogenen Krallen bewaffnet; zwischen den Zehen stehen auf dem Rücken, ähnlich wie bei den Igel, kurze Hornstacheln, die dem Thiere zur Abwehr von Feinden dienen, obgleich es sich nicht zusammenrollen kann (Schnabeligel, Monotrix, Fig. 17).

Klasse der Vögel (Aves).

(Tafel 12 bis 18).

Jedern bedekte Warmblüter, deren Extremitäten zu Flügeln umgewandelt sind. Keine Zähne, Kiefer mit Hornschmelze bedeckt und einen Schnabel bildend. Die Eier mit Kalkschalen.

Körperform der Vögel ist höchst eigenthümlich. Kopf und Bauch bilden eine einzige, innen nicht

durch ein Zwerchfell getrennte, eiförmige Masse, die im Gleichgewicht auf zwei Stützen, den Beinen ruht, und zwar gewöhnlich so, daß die Längsachse der Gestalt horizontal von vorn nach hinten läuft (Skelet des Bartgeiers, Gypaetus, Taf. 15, Fig. 2), obgleich auch bei vielen (Skelet des Pinguins, Aptenodytes, Taf. 18, Fig. 9), z. B. den Pinguinen, der Körper fast senkrecht auf den weit nach hinten gerückten Beinen getragen wird. Der rundliche Kopf, der in einen mehr oder minder langen Schnabel ausgezogen ist, ruht immer auf einem langen Halse, der wenigstens neun, oft aber über zwanzig Wirbel enthält und eine große Freiheit der Bewegungen besitzt; dagegen ist der Schwanz stets durchaus rudimentär, wenigstens was das Skelet und die Muskeln betrifft; denn der Theil, welchen man gewöhnlich den Schwanz nennt, wird bei den Vögeln nur von langen und steifen Federn gebildet. In dieser bedeutenden Verlängerung des oft schlangenförmigen Halses und der Verlängerung des Schwanzes finden wir einen directen Gegensatz gegen die Reptilien, bei welchen meist das umgekehrte Verhältniß der genannten Körpertheile stattfindet. Hierzu kommt noch die Höhe der Beine, welche stets auch bei den kurzbeinigen Vögeln den Körper vollkommen schwebend tragen, während dieser bei den Reptilien fast immer auf der Erde geschleift wird.

Das Skelet der Vögel zeichnet sich vor dem aller übrigen Wirbelthiere durch eine besondere Eigenthümlichkeit aus, welche sich auf das Flugvermögen bezieht und mit dem Namen der Pneumaticität bezeichnet wird. Die pneumatischen Knochen enthalten kein Mark, sondern mit Haut ausgekleidete Höhlen, welche durch Oeffnungen mit den Lungenzellen und Luftsäcken des Körpers in Verbindung stehen und mit Luft gefüllt werden. Die Ausbreitung der Pneumaticität richtet sich nach dem Flugvermögen. Die Nashornvögel, Sturmvögel, Pelitane, die groß und schwer sind und doch leicht fliegen, haben fast nur hohle Knochen. Die Luftknochen erstrecken sich bei den angeführten Vögeln durch alle Schädel- und Wirbelknochen bis in die letzten Spitzen der Zehenglieder hinein. Das umgekehrte Verhältniß findet bei den Straußen und den verwandten Laufvögeln statt, wo die Pneumaticität auf nur wenige Knochen der Hirschknochen beschränkt ist. Am häufigsten sind einige Schädelknochen pneumatisch, die unmittelbar von der Mund- und Nasenhöhle aus mit Luft gefüllt werden, nach ihnen das Oberarmbein, welches wie die übrigen Knochen des Körperstels mit den von den Lungen ausgehenden Luftsäcken im Zusammenhang steht. Die äußere Rindenschicht dieser pneumatischen Knochen ist stets außerordentlich fest und dicht, eine Einrichtung, wodurch Festigkeit mit Leichtigkeit verbunden wird.

Die Schädelknochen der Vögel verwachsen sehr frühzeitig in eine einzige Hirntafel, an der auch nicht eine Spur von Nähten übrig bleibt, die sich nur in der ersten Zeit bei ganz jungen Individuen noch finden (Schädel eines Papagais, Psittacus, Taf. 12, Fig. 1). Es ist deshalb auch schwierig, die Gestalt der einzelnen Knochen, welche in diesen Schädel eingehen, näher zu bestimmen und ihre Grenzen anzugeben. Im allgemeinen ist der Vogelschädel rundlich und die Hirntafel im Verhältnisse zu dem Gesichtstheile bei weitem größer als bei den Reptilien. Ja es erscheint diese Größe oft weit bedeutender als sie wirklich ist, da große Luftzellen zwischen der innern und äußern Lage der Schädelknochen entwickelt sind und so der äußere Umfang des Schädels in keinem Verhältnisse zu der geringen innern Höhle für das Gehirn steht. Der Gehirnkopf, mit welchem der Schädel auf dem ersten

Halzwinkel aufliegt, ist stets einfach, knopfförmig, oft vollkommen kugelig, sodas er eine bedeutende Beweglichkeit besitzt. Die zu beiden Seiten des Schädels liegenden Augenhöhlen sind gewöhnlich sehr groß, nicht immer vollständig geschlossen und auch ihre Scheidewand sehr oft nicht durchaus verknöchert. In dem nach vorn ausgezogenen Schnabel liegen die an Umfang sehr wechselnden Nasenhöhlen, deren Scheidewand ebenfalls sehr oft unvollständig ist, sodas man quer durch die Nasenlöcher hindurchsehen kann. Der ganze Oberkiefergarnamentapparat ist an der Schädelkapsel beweglich in der Weise eingelenkt, das zwei Drehpunkte gegeben sind, der eine vorn an der Stirn, der andere hinten an der Einlenkung des den Unterkiefer tragenden Quadratsbeins mit dem Schädel. Der Zwischenkiefer ist meist groß, unpaar und bestimmt wesentlich die Schnabelform.

Das Oberkieferbein ist jederseits durch einen stabförmigen Knochen, der unter dem Augenhöhlenrande herläuft, mit dem Quadratsbeine verbunden. Es ist dieser Verbindungsstab immer aus zwei Knochen zusammengesetzt, vorn aus dem eigentlichen Jochbeine, hinten aus dem sogenannten Quadratsjochbeine. Das Gaumengewölbe des Schnabels ist aus zwei großen Gaumenbeinen und einem mittlern Flügelhaarbeine zusammengesetzt, an welche sich noch zu beiden Seiten lange, stabförmige Flügelbeine anschließen, welche vorn an die Gaumenbeine, hinten an die Quadratsbeine oder das Keilbein eingelenkt sind. Alle diese verschiedenen Verbindungen bezwecken eine Complicität der Bewegungen, indem der Oberkiefer sich nothwendig heben muß, wenn der Unterkiefer herabgezogen und hierdurch der Schnabel geöffnet wird. Der Unterkiefer, dessen Form je nach der Schnabelform überhaupt sehr wechselt, der aber immer hinten an dem Quadratsbeine eingelenkt ist, besteht aus einem mittlern, unpaaren, dem Zahnstüde entsprechenden Knochen und aus fünf seitlichen, paarigen Stüden, die inessen sehr bald miteinander verwachsen und so einen einzigen Winkelknochen darstellen.

Zähne kommen bei den Vögeln überhaupt gar nicht vor, und die einzige Bewaffnung ihres Mundes besteht in den Hornscheiden, welche die schneidenden Ränder der Kieferknochen überziehen. Diese Hornscheiden sind gewöhnlich scharf, wie die Schneide eines Messers, nur sehr selten lammartig ausgezackt. Bei den Raubvögeln und Kernbeißern ist ihre Substanz am härtesten, während sie bei den hauptsächlich von Weichthieren lebenden Enten und Schnepfen in eine sehr zarte Haut übergeht, die zahlreiche Nerven enthält und ein feines Tastorgan darstellt. Desteß erstrecken sich diese Hornscheiden nicht über den ganzen Schnabel hinweg, sondern werden nach hinten zu von einer eigentümlichen nackten Haut, der sogenannten Wachshaut (Ceroma) ersetzt. Bei seiner engen Beziehung zu der Nahrung und Lebensweise der Vögel ist der Schnabel ein vorzüglicher Gegenstand der Aufmerksamkeit für die Zoologen geworden, die für die Beschreibung seiner vielfach wechselnden Formen besondere Kunstausdrücke erfunden haben. Die Rückenlante des Oberschnabels heißt der Schnabelrücken oder die Fiste; meist erscheint dieselbe mehr oder minder nach vorn gebogen oder selbst hakenförmig gekrümmt. Der untere Rand des Unterkiefers wird die Füllkante, der Winkel, in welchem beide Aeste des Unterkiefers zusammenstoßen, der Kinnwinkel, und der vereinigte Theil der beiden Unterkieferäste die Fille (Myxa) genannt. Die Gegend zwischen dem Auge und der Schnabelwurzel heißt die Flügelgegend, und die hintere Wangengegend, wo sich bei dem

Säugethier die äußere Ohröffnung finden würde, die Ohrgegend. Die Form der Schnabel und ihr Verhältniß zum Körper ist sehr verschieden. Die einfachste Gestalt ist diejenige eines Kegels oder einer Pyramide mit mehr oder minder scharfer Spitze, zuweilen etwas wenig nach vorn gebogen ist. Bei der Länge des Storchschnabel bis zu dem der Kegelschnabel eines Kernbeißers und der Dünne des Kolibrischnabels finden sich alle möglichen Uebergänge dieser Kegelform in zahlreichen im Wechsel der Durch stärkere Biegung der Fiste, Aufspitzung, vordem Halsen am Oberschnabel und Schärfung Seitentheile geht diese Schnabelform allmählich in Raubschnabel über, der bei den echten Falken und Eulen den Gipfel seiner Ausbildung erreicht. Zuweilen findet sich an diesen Raubschnäbeln noch seitliche, vorstehende, scharfe Ede, die man mit dem Namen eines Zahnes belegt. In andern Fällen plattet sich der Kegelschnabel mehr ab, die Seitentheile verbreitern sich, die Rante der Fiste schwinde oft gänzlich und es werden so jene Hornberge stellt, die von den Gänsen und Vögelträn kannt sind. Sehr häufig dient auch der Schnabel Unterstüßung des Kletterns, wie bei den Papageien und während hier der Oberschnabel sehr stark gebogen wird, sodas das Ganze etwa die Form einer Kanne hat, wie man sie in der Gärtnerei benutzt, wird zugleich seine Substanz poröser und leichter; die Bildung, die bei den Nashornvögeln ihr höchstes erreicht, bei welchen die ungeheuern Schnäbel aus großjeller Knochenmasse bestehen, die zum Theil sogar luftführend ist. Einige Vögel, wie die Tauben und die Sturmvögel, zeichnen sich noch durch eine besondere Bildung des Schnabels aus, der zum Theil gefest erscheint, indem die Nasenlöcher von kleinen Knorpelschuppen überwölbt sind, die auf den Schnabel aufgesetzt und mit demselben verwachsen sind.

Die Wirbelsäule der Vögel läßt stets die verschiedenen Abtheilungen in Hals-, Rücken-, Kreuz- und Schwanzwirbel erkennen. Der Hals gewöhnlich elf bis zwölf, selten neun, zuweilen auch über zwanzig Wirbel, welche alle sehr klein vorn ausgehöhlt und hinten gewölbt sind. Die Halswirbel sind sehr kurz und besitzen vorn gabelte Fortsätze, um welche herum die Lungen sich einlagern. Sie tragen platte Rippen, die mit platten, von der Brustbein ausgehenden Brustrippen in einem Bogen zusammenstoßen und etwa in der Mitte ihrer Länge einen platten Fortsatz nach hinten schicken, der auf die nächste Rippe aufliegt und mit dieser in der Bandmasse verbunden ist, sodas dadurch, bei der Beweglichkeit, die Festigkeit des Brustkorbes erhöht wird. Am Halse kommen gewöhnlich falsche, dornartige Rippen vor. Die letzten Kreuzbeinwirbel verwachsen untereinander zu einer meist dreieckigen, länglichen und platten Knochen, dessen Seiten die Darmbeine des Beckens anwachsen. Der Schwanz besteht aus einigen wenigen kleinen Wirbeln mit starken Quersfortsätzen, auf deren letzten eine von den Seiten her zusammengedrückte, kegelförmige Platte senkrecht steht, an welche sich die Muskeln der Steuerfedern des Schwanzes ansetzen.

Das Brustbein bildet mit dem Schultergürtel zusammen einen mächtigen Stützapparat für die Muskeln der Flügel. Es stellt gewöhnlich eine breite, schalenförmig nach außen gewölbte Platte dar, die sich bis in die Nähe des Beckens erstreckt. Bei den fränkartigen (Skelet des *Aluarius*, *Casuarus galapagos*, Taf. 16, Fig. 4) Vögeln allein ist diese Platte gleich-

gemöbzt, ohne einen mittlern Kamm; bei allen ist ein solcher Kamm um so stärker entwickelt, je deutender das Flugvermögen, am stärksten z. B. den schwirrenden Kolibris (Stele des *Colinus*, Trochilus, Taf. 13, Fig. 1), den Schwalben, u. s. w. Auch die Ausbildung der Brustplatte steht mit dem Flugvermögen in Beziehung. Guten Fliegern ist sie ganz, bei schlechten Fliegern (zum Beispiel) tief ausgehöhlet und immer der Form charakteristisch. Das Schultergerüste aus einem säbelförmigen, langen Schulterblatte, an beiden Seiten der Rückenwirbelsäule auf den ausfließt; aus einem starken dicken Nabenbein (*oracoidaeum*), welches schief nach unten zur Spitze brustwärts sich gebiegt, wo es durch Faserknorpel mit dem Brustbein verbunden ist, und aus dem Schlüsselbein, das vorn bogenförmig nach der Spitze des Brustbeins geht, wo beide in der Mittellinie zusammentreffen, so wie einen einzigen Knochen, das sogenannte Gabelbein (*furcula*) bilden. Die Gabelbeine der Enten und sind selbst den Kindern bekannt genug, indem aus ihnen die sogenannten Springfrösche vert. Das Schultergerüste selbst bietet bei dieser eine große Festigkeit und fast völlige Unverwundbarkeit dar. Auf dem von ihm hergestellten Gespielt das Oberarmbein, das meistens nur kurz dick, zuweilen aber sehr breit ist. Der Vorderarm besteht wie gewöhnlich aus der Elle und der Ulna, ist aber meist weit länger als der Oberarm von zwei kleinen, runden Knochen gefolgt, die die Handwurzel darstellen. Die Mittelhand ist ziemlich lang und aus zwei Hakenknochen gebildet, die an ihren beiden Enden miteinander verbunden, so daß sie nur einen einzigen Knochen darstellen, welcher in der Mitte durch einen länglichen durchbrochen ist. Dieser Knochen trägt an dem hintern Ende, wo er der Handwurzel angeheftet ist, auf einem besondern Vorsprunge das kleine Mittelgelenk, welches dem sogenannten Afterflügel Stützpunkt dient. Auf dem vordern Ende der Mittelhand stehen gewöhnlich zwei kurze Finger, von denen der eine, dem Mittelfinger entsprechende, zwei, der kleine Finger immer nur ein einzelnes Glied zeigt. Diese oft stark verlängerten Knochen sehr eng miteinander verbunden und tragen die Sehnen der Flügel. Die Gelenkverbindung mit der Handwurzel ist so, daß im Zustande der Ruhe der Flügel eine förmliche Hakenlinie bildet, indem der Oberarm längs der Wirbelsäule nach hinten liegt, der Vorderarm ihm parallel nach vorn sich erstreckt, und das Handwurzelgelenk vorn an dem Brustbein anliegt, und die Hand wieder nach hinten einhängen wird.

Mit alleiniger Ausnahme der Strauße ist das den aller Vögel in der Mittellinie auf der Bauchseite geöffnet, so daß es aus zwei seitlichen Hälften besteht, die einander nicht berühren. Hüftbein, Sitzbein und Schambein sind alle drei unbeweglich miteinander verbunden und das erstere in der ganzen Länge seines innern Randes mit dem Kreuzbein verbunden, so daß dieses einen säbelförmigen Knochen stellt, der seitliche nach hinten gerichtete Flügel bildet. Zwischen dem Darne und dem Sitzbein finden sich meist mehr oder minder große Löcher und Ausbuchtungen. Der Oberknochen (Stele des Flamingo, *oenicopterus roseus*, in der Stellung, wie er abgebildet, Taf. 17, Fig. 12), welcher mit einem kleinen Gelenkknorpel, der unter rechtem Winkel von ihm abgeht, in die Schenkelschuppe eingesenkt ist, erscheint gewöhnlich als ein kurzer, aber starker cylindrischer

Knochen, der ganz in der Fleischmasse des Leibes geborgen ist. Die Kniekehle bildet eine runde Platte, welche das Kniegelenk vorn bedeckt, in welcher das Kniegelenk, die, den Oberknochen an Masse weit übertreffende Schienbein eingelenkt ist. Das Wadenbein existirt nur in Form eines spießförmigen Griffelfortsatzes, welcher an der äußern Seite des Schienbeins angelegt ist und niemals bis zu dem Fußwurzelgelenk reicht. Dieses Wadenbein ist den meisten Vögeln wohl bekannt, da es gewöhnlich als Weisenschnäbel benützt wird. Die Fußwurzel wird durch einen einzigen langen, cylindrischen Knochen gebildet, welcher meistens völlig nackt, unbefiedert und nur von hornigen Schildern begleitet ist und den man den Lauf (*Tarsus*) nennt. Die Länge der Beine wird hauptsächlich durch die Länge dieses Laufknochens bedingt und das zwischen ihm und dem Unterschenkel hergestellte nach hinten gerichtete Gelenk in der beschreibenden Zoologie gewöhnlich die Fußbeuge genannt. Der eigentliche Fuß wird aus zwei, drei oder vier Zehen gebildet, in deren Anordnung eine große Mannichfaltigkeit herrscht. Jede Zehe besteht aus mehreren Gliedern, und zwar nimmt die Zahl derselben so zu, daß sie von innen nach außen gewöhnlich von zwei bis auf fünf steigt. Sehr häufig steht der Daumen mit den übrigen Zehen nicht auf gleicher Höhe. Oft berührt er den Boden gar nicht, wo man ihn abgerückt nennt, in andern Fällen reicht er nur mit der Nagelspitze auf, bei noch andern nennt man ihn aufsteigend, indem er seiner ganzen Länge nach auf dem Boden ruht. Gewöhnlich ist dieser Daumen nach hinten gerichtet, bei den Klammerfüßen aber, wie z. B. bei den Mauerfalken, steht er wie die übrigen Zehen nach vorn. Nach der Richtung der Zehen unterscheidet man ferner noch Kletterfüße, bei welchen auch die äußere Zehe nach hinten gerichtet ist, so daß der Fuß eine Zange darstellt (*Papagaien*, *Spechte*); zuweilen wird die äußere Zehe beweglich und kann beliebig nach vorn oder hinten gerichtet werden (*Anas*) — Wendezehen. Lauffüße hat man solche Füße genannt, bei welchen, wie beim Strauß, nur wenige, nach vorn gerichtete, zum Theil verwachsene Zehen vorkommen. Da die Zahl der Füße, wo drei freie, nach vorn gerichtete Zehen mit einer freien Hinterzehe vorkommen, ungemein groß ist, so hat man hier wieder mehrere Unterabtheilungen gemacht. Watsfüße nennt man lange Beine, bei welchen das Schienbein nicht bis zur Fußbeuge gesiedert, sondern unten nackt ist, wie der Lauf. Die meisten Stelzvögel, wie die Reiher und Störche, gehören in diese Kategorie. Gangbeine dagegen nennt man diejenigen Füße, bei welchen das Schienbein bis zur Fußbeuge gesiedert ist. Bei diesen Gangbeinen unterscheidet man wieder: Spaltfüße, wenn die Zehen durchaus getrennt sind; Sitzfüße, wenn sie nur durch eine kurze Haut an ihrem Grunde verbunden werden; Wandelfüße, wenn Mittel- und Außenseite am Grunde miteinander verwachsen sind, wie bei unsern Hühnern; und Schreitfüße, wenn diese Verwachsung sich über die Mitte der Zehen hinaus erstreckt, wie dies z. B. bei dem Eisvogel der Fall ist. Bei den Wasservögeln, wo die Füße als hauptsächlichste Rudervergelenke dienen, wird ihre Wirkung besonders dadurch vermehrt, daß die Zehen durch Schwimmhäute miteinander verbunden werden. Man unterscheidet hier hauptsächlich: Lappenfüße, wenn die Zehen nur von breiten, seitlich eingeschnittenen Hautlappen umgeben sind, wie dies bei den Wasservögeln der Fall ist; Schwimmfüße, wenn nur die drei nach vorn gerichteten Zehen durch eine Schwimmhaut verbunden sind, die Hinterzehe aber frei ist oder

selbst gänzlich fehlt; und endlich Ruderfüße, wie bei den Scharben und Pelikanen, wo auch der Daumen nach vorn gewandt und mit den übrigen durch eine gemeinschaftliche Schwimnhaut verbunden ist.

Die Muskulatur bietet besonders die ungemein starken Flugmuskeln der Brust, die auf der Fläche des Brustbeins und seines Kammes angeheftet sind, und sodann die Muskelmassen des Beins, in welche der Schenkel ganz eingebüllt ist. Die Sehnen der Beugemuskeln der Zehen, sehr lang und dünn, in welchen sich oft Verdickungen bilden, laufen am hintern Rande der Fußbeuge über eine Rolle, in welcher sie durch Bänder festgehalten sind. Diese Einrichtung hat zur Folge, daß die Zehen beim Niederhoden des Vogels eingezogen werden und also auch im Schlaf die Zweige untrifften.

Federn finden sich bei allen Vögeln ohne Ausnahme. An einer vollkommen ausgebildeten Feder unterscheidet man den Kiel (scapus), unten hohl und hart, der nach oben in den soliden Schaft (rachis) ausläuft, an welchen sich der Bart oder die Fahne ansetzt. Der Schaft ist auf der Hinterseite meist rinnenförmig ausgehöhlt, und da wo die Rinne in der Nähe des Kiels aufhört, setzt sich sehr häufig noch ein zweiter kleinerer Schaft an, welchen man den Asterschaft genannt hat, der aber bei allen Schwung- und Steuerfedern, welche wir einzig als Schreibfedern benutzen, gänzlich fehlt. Die Fahne der Feder wird von mehr oder minder dicht gedrängten, langen Blättchen gebildet, welche wieder bald auf beiden Seiten, bald nur an einem Rande mit Wimpeln, Häkchen oder Strahlen besetzt sind, die dann oft noch secundär neue Wimpeln und Häkchen tragen. Die Häkchen zweier benachbarter Strahlen greifen namentlich bei den Steuer- und Schwungfedern innig ineinander, so daß die Fahne eine breite Platte bildet, mit welcher die Luft geschlagen werden kann. Hinsichtlich der Structur unterscheidet man Contoureffedern (pennae) mit vollkommen ausgebildetem, steifem Kieler, der eine ziemlich feste, zusammenhängende Fahne trägt; die Deck- und Schwungfedern, wie z. B. unsere gewöhnlichen Schreibfedern, liefern die besten Beispiele. Zuweilen sind diese Contoureffedern zerklüftet, zuweilen fehlt die Fahne ganz und es existirt nur der Schaft, wie beim Kasnar. Die Dauen- oder Flaumfedern haben nur einen sehr dünnen oder gar keinen Schaft, so daß die Fahne aus einer Menge elastischer Fasern zusammengefaßt ist. Sie finden sich besonders am Leibe unter den Deckfedern und bilden die erste Befiederung des Jungen im Ei. Endlich unterscheidet man noch Fadenfedern (Filoplumae), deren Schaft lang, aber so zart und dünn ist, daß er einem Haare gleicht. Die Stellung der Federn ist wichtig, da sie auf dem Körper eigene Federsuren (Pterylae) bilden, zwischen welchen leere Raine (Apteria) sich hinziehen. Die Vertheilung dieser Federsuren ist charakteristisch für viele Gruppen. Die beschreibende Zoologie befaßt sich noch besonders mit den Federn der Flügel und des Schwanzes, die man im allgemeinen in Schwungfedern, Steuerfedern und Deckfedern theilt. An einem ausgestreckten Vogel- flügel unterscheidet man zuerst die Hauptsteuerfedern oder die Handschwingen, gewöhnlich zehn, seltener neun oder elf lange Federn, mit breiten Fahnen, welche sich an der ganzen Länge der Handknochen vom Flügelgelenk bis zur Spitze festsetzen, dann die Armschwingen, welche den Raum vom Ellbogen bis zum Armgelenk einnehmen, und die Deckfedern des Schultergürtels (Parapterum), welche an dem Oberarme eingefügt sind. Der Daumen trägt an dem

Handgelenke eine Sammlung kleiner Schwungfedern, welche man den falschen Flügel (Alula) nennt. Von allen Seiten sind die Kieler der Schwungfedern von kürzern Deckfedern umgeben, wodurch aus dem ganzen Flügel eine breite Platte gebildet wird, an der die Schwungfedern so angelagert sind, daß beim Heben des Flügels die Luft zwischen ihnen durchstreicht, beim Senken darunter gefangen wird. Die Steuerfedern des Schwanzes stehen gewöhnlich fächerartig und dienen hauptsächlich zum Balanciren des Vogelleibes in horizontaler Stellung, sowie zum seitlichen Steuern desselben, was man namentlich deutlich bei den Raubvögeln beobachten kann, wenn sie mit unbeweglich ausgepannten Flügeln ihre langsamen Kreise in der Luft beschreiben. An denjenigen Stellen, wo die Haut nicht mit Federn bedeckt ist, zeigt sie sich bald nackt und weich und ziemlich dünn, wie an dem Halse mancher Geier, bald ist die Oberhaut hornartig verdickt, wie dies namentlich an den Läusen und den Zehen der Fall ist. Hier zeigt sich diese Hornmasse bald einfach körnig, bald durch Zuthun in mehr oder minder bedeutende Schilde gebildet, welche, wenn sie in größerer Länge zusammenhängen, Schienen oder Stiefel genannt werden und dann in der Anordnung für die Systematik von Bedeutung sind. Zu diesen Hornbildungen der Oberhaut gehören ebenfalls auch die Nägel der Zehen, die schon früher beschriebenen Schnabelfedern und die Sporen, scharf, nagelartige Hornspitzen, die gewöhnlich auf der inneren Seite der Füße, wie bei den Hähnen, oft aber auch wie bei den Wassertropfeln, dem Kajakar und dem Seestur, an der vordern Flügeldecke angebracht sind und den Thieren als Waffe dienen, womit sie beim Schlagen mittels des Flügels verwunden. Endlich kommen noch bei manchen Vögeln, besonders stark entwickelt bei dem Truthahn und bei manchen Geiern, Fleischwüchse auf der Haut des Kopfes und Halses vor, welche durch das Andrängen des Blutes geschwellt werden können.

Das Rückenmark der Vögel zeigt zwei Anschwellungen, den Austrittsstellen der großen Extremitätennerven entsprechend, an der hintern Weiche seine Stränge auseinander. Das Gehirn füllt den Schädel ganz aus, ist bedeutend in die Breite entwickelt und besteht aus den platten Hemisphären, welche die Vierhügel gänzlich decken und an das hintere hintere, quergeführte Mittelhirn und kleine Seitenhirn bestehende Kleinhirn unmittelbar ansetzen. Unter den Sinnesorganen ist die Nase verhältnismäßig am wenigsten ausgebildet und das Geruchvermögen nur sehr schwach entwickelt. Versuche haben nachgewiesen, daß man nur irrtümlich von einem scharfen Geruche bei vielen Wasservögeln, wie namentlich den Geiern sprach, und daß diese im Gegentheil nur durch die Schärfe ihres Gesichtes ihren feinsten Sinn entdecken. Bei einigen Wasservögeln fehlen die äußeren Nasenöffnungen ganz oder sind auf nur höchst unbedeutende Schlitze reducirt. Bei den übrigen Vögeln stehen sie bald an der Schnabelfurzel, bald nicht gegen die Mitte desselben hin. Nur bei dem Kaiman, dem flügellosen Vogel Neuseelands, finden sie sich ganz vorn an der Spitze des langen dünnen Schnabels und sind mit weicher, sehr nervenreicher Tasthaut umgeben. Die innern Nasenöffnungen bilden zwei schiefen Spalten in dem hintern Gaumengewölbe, welche zuweilen zusammenfließen. Die innern Windungen, die von knorpeligen Muscheln getragen werden, sind unbedeutend. Um so ausgebildeter sind gewöhnlich die Augen, welche stets vorhanden sind und oft eine ungemeine Größe erreichen. Sie sind wenig dem

Mangel, der durch die große Freibeweglichkeit des Kropfes ersetzt wird. Die Form des Kropfes ist sehr verschieden, doch ist die Form des Kropfes durch einen verengten, kegelförmigen oder fast kugelförmigen Theil in den flachen, schalenförmigen Abschnitt übergeht. Dieser halsförmige Theil (Larynx) wird durch einen Knochenring gestützt, in das Gewebe der Sklerotika eingelenkt ist und sich in Knöcheln, dachziegelförmig übereinanderliegenden Platten gebildet wird. Die Linse ist rund und liegt in den Falten vorn stark abgeplattet, bei den meisten Vögeln sehr convex und wird durch einen Kamm oder Fächer, der schräg von dem Kropfe gegen die Linsenlappeln hinläuft, in seiner Stellung erhalten. Die Sehorgane des Auges sind sehr verschieden, indem sich stets zwei freibewegliche Lider über dem Auge befinden, die aus zwei verschiedenen Muskeln von dem innern Augwinkel ausgehen, die über die Hälfte des Augapfels hinübergehen können. Das Gehörorgan gleicht in der Organisation demjenigen der Krokodile. Ein äußeres Gehörorgan ist nicht vorhanden, wird aber bei vielen Vögeln durch eine eigenthümliche Stellung der Federn und des Trommelfells durch eine häutige Klappe ersetzt. Das Trommelfell liegt an dem Grunde eines kurzen weiten Rohres, in einem gewöhnlich unvollständigen Knochengehäuse und schließt nach außen die weite Paukenhöhle ab. In der Paukenhöhle befindet sich eine kleine, meist aus einem einzigen Fortsatz bestehende Trompete in den Nasen mündet. Die Verbindung zwischen dem Paukenfelle und dem Knochengehäuse wird durch eine einzige lange Columella hergestellt. Das Labyrinth selbst besteht aus einem Vestibulum, drei halbkreisförmigen Kanälen und schalenförmigen, nicht gewundenen Schnecken (Cochlea). Die Zunge ist nur selten weich und fleischig (Papageien), dagegen meist mit einem dicken, hornigen Fortsatze versehen, der oft Warzen, Stacheln, oder auch u. f. w. entwickelt und dadurch die Zunge in einen Nadel und Greifen der Nahrung befähigt. Die Verdauungswerkzeuge (Eingeweide des Vögels) (Taf. 15, Fig. 9: a Schlund, k Kropf, f Leber, m Muskelmagen, c Muskelmagen, i Leber, d Zwölffingerdarm mit der Bauchspeicheldrüse, h Darm, e Blinddarm, f Dünndarm, g Einmündung des Eies in die Kloake, sind ziemlich übereinstimmend. Der Schlund ist meist weit, stark muskulös und führt häufig am Halse einen oft drüsenreichen Kropf, der hauptsächlich den Tagraubvögeln, Farnvögeln, Tauben und Laufvögeln zukommt. In der Kropf erhält das Futter eine vorläufige Verwitterung und geht dann durch eine engere Abtheilung in den Drüsenmagen über, der in der Bauchhöhle liegt, sackartig ist und meistens eine doppelte Wandung hat, in welcher eine Menge abwechselnder Drüsen bald gleichmäßig vertheilt, bald in gewissen Normen gruppiert liegen. Nach hinten in der Bauchhöhle liegt eine zweite Magenabtheilung, die man der Stärke ihrer Wandungen gewöhnlich als den Muskelmagen bezeichnet. Die Stärke der Muskulatur dieser Abtheilung hängt von der Nahrung ab. Am schlaffesten sind die Abtheilungen des Muskelmagens bei den Fleischfressern, wo er nur einen weiten Sack bildet, am stärksten bei den Körnerfressern, wie unsern Hühnern und Enten, wo er eigentlich aus zwei dicken, muskulösen Leibescheiden besteht, deren jede in der Mitte eine rundliche Sehnenansbreitung hat, an welcher die Muskelfasern festsetzen. Diese Leibescheiden sind mit einer dicken, hornigen Oberhaut überzogen und dienen in der That dazu, das in dem

Kropfe und Drüsenmagen erweichte Futter mechanisch zu zermahlen. Der Dünndarm bildet stets eine Schlinge, in welcher die Bauchspeicheldrüse liegt, und zeigt häufig einen Ueberrest des Dotterganges in Gestalt eines wurmförmigen Anhangs. Der Dickdarm besteht meistens aus zwei Blinddärmen, und öffnet sich mit einer klappenartigen Kreisfalte in die Kloake, die zugleich den Harn- und Geschlechtsorganen als Ausgang dient und an welcher sich außerdem noch ein eigenthümlicher Blinddarm befindet, welcher bei allen Vögeln an der hintern Wand der Kloake vorkommt, drüsige Wände hat und die Bursa Fabricii genannt worden ist. Die Leber ist groß, meist mit einer Gallenblase versehen, und das Zwerchfell nicht zwischen ihr und dem Herzen, sondern hinter und über ihr ausgebreitet, doch so, daß die Lungen nur theilweise von der Bauchhöhle abgeschnitten sind.

Die Anwesenheit zweier Kehlköpfe, sowie die Lagerung und Structur der Lungen, welche durch große Oeffnungen mit den im Körper verbreiteten Luftzellen und Säden communiciren, zeichnet die Vögel vor allen andern Wirbeltieren wesentlich aus. Hinter der Zungenwurzel findet sich eine Längsfalte, selten von einem Kehldede bedeckt, welche unmittelbar in den obern Kehlkopf führt, der aus mehreren Knorpeln zusammengesetzt ist, durch besondere Muskeln bewegt werden kann, aber keine Stimmblätter besitzt. Die Muskeln dieses Kehlkopfes gehen von dem Zungenbein aus, dessen Hörner bei denjenigen Vögeln, welche die Zunge zum Anspießen von Insekten verwenden, wie z. B. bei den Spechten, oft sich bogenförmig über den Kopf hinaus bis zur Schnabelfurzel erstrecken. Von dem Kehlkopfe aus steigt die lange Luftröhre an dem Halse hinab, meistens von vollständigen Knorpelringen gebildet. Bei den meisten Vögeln verläuft die Luftröhre ganz gerade bis zu ihrem Eintritt in die Lunge; bei einigen Hühnern, Sumpfvögeln und Wasservögeln aber, die sich durch eine weit schallende Trompetenstimme auszeichnen, wie beim Auerhahn, dem Schwan und dem Kranich, macht die Luftröhre an ihrem Brustende schlangenförmige Biegungen, die bald nur unter der Haut, zuweilen aber auch in dem hohlen Brustbeinkamme liegen und besonders bei den Männchen stark ausgebildet sind. Mit Ausnahme einiger Geier, der Störche und der Laufvögel findet sich bei allen Vögeln an der Theilungsstelle der Luftröhre in die beiden Bronchien der untere Kehlkopf als wesentlicher Stimmapparat. Nur in sehr seltenen Fällen hat jeder Luftröhrenast seinen eigenen, getrennten Kehlkopf, oder nehmen die Luftröhrenäste gar keinen Antheil daran; gewöhnlich bildet das Ende der Luftröhre eine Trommel, aus welcher die beiden Nester unmittelbar hervorgehen. Bei den Singvögeln besitzt dieser untere Kehlkopf besondere Singmuskeln, die den andern abgeben.

Die Lungen selbst hängen nicht frei, wie bei den Säugethieren, in einem geschlossenen Brustfelle, sondern sind an der obern Fläche der Bauchhöhle in den Zwischenräumen der Rippen zu beiden Seiten der Wirbelsäule in Gestalt hellrother, schwammiger Massen abgelagert. Die Bronchien lassen auf eigenthümliche Weise die Luftzellen dieses schwammigen Gewebes entstehen und zeigen zahlreiche Oeffnungen auf der Oberflache der Lungen, welche in häutige Säcke führen, die mit den Luftgängen der Knochen in Verbindung stehen. Gewöhnlich finden sich vier Paar von solchen Oeffnungen, die in hintereinanderliegende, voneinander getrennte Luftsäcke führen, welche theilweise sogar die Eingeweide umhüllen.

Das Herz der Vögel liegt unmittelbar hinter dem

Gabeln, nur von einem dünnen Herzbeutel umgeben, frei in der Bauchhöhle.

Die Nieren liegen in dem hintern Theile der Bauchhöhle in den vordern Gruben des Kreuzbeins, sind sehr häufig miteinander verschmolzen und senden aus ihrer vordern Fläche die beiden Harnleiter nach der Kloake hin, in deren hintere Wand sie sich neben den Geschlechtskanälen öffnen. Außer ihnen müssen wir noch eines besondern Absonderungsorgans gedenken, der sogenannten Würzeldrüse, welche in der äußern Haut auf dem Rücken des Schwanzes unmittelbar an den Steuerfedern desselben liegt und eine fettige Schmiere absondert, womit die Vögel ihre Federn einzuölen pflegen. Sie ist bei den Wasservögeln, deren fettes Gefieder von dem Wasser gar nicht genezt wird, am bedeutendsten und sehr namentlich den Laufvögeln durchaus. Enten und Gänse sieht man oft stundenlang beschäftigt, mit dem Schnabel zuerst etwas Schmiere aus dieser Würzeldrüse auszupressen und dann die einzelnen Federn gleichsam durchzulassen und sie so einzuölen.

Die männlichen Geschlechtsorgane bestehen immer aus zwei Hoden, von welchen der linke meist etwas größer ist und die zur Begattungszeit bedeutend anschwellen, nachher aber auf ein sehr geringes Maß zurücksinken. Die Samenleiter gehen ohne Bildung eines Nebenhodens von dem Hoden geschlängelt nach der Kloake zu und endigen sich an der Hinterwand derselben bei den meisten Vögeln auf zwei kleinen, gefäßreichen Würzchen. Nur bei den Laufvögeln und einigen Wasservögeln und Fährnern kommt eine einfache männliche Ruthe vor, die aus einem vordern ausstülpbarem Schlauche und einem hintern, erectilen Gewebe besteht und eine Rinne zur Fortleitung des Samens zeigt. Die weiblichen Geschlechtstheile sind bei den meisten Vögeln merkwürdigerweise nur einfach, indem der ursprünglich angelegte rechte Eierstock später vollkommen rudimentär wird und nebst seinem Eileiter entweder gänzlich schwindet oder aber nur in Gestalt unförmlicher Bläschen überbleibt. Der linke Eierstock, der über und vor der Niere liegt, erzeugt allein Eier in häutigen Blatten, die durch ihre Entfaltung ihm ein traubiges Ansehen geben. Der Eileiter ist stets sehr lang, beträchtlich gewunden und zeigt oben einen weiten Trichter mit schifförmiger Oeffnung zur Aufnahme der Dotter, seine Fortsetzung ist röhrenförmig eng, mit vielen Drüsen besetzt, welche das Eiweiß absondern, das sich in Schichten ablagert und bei der Drehung des Eies während seines Durchgangs durch diesen Theil die festen Windungen bildet, die man mit dem Namen der Hagelschnüre bezeichnet. Vor der Kloake zeigt der Eileiter eine erweiterte Stelle, die ebenfalls mit reichlichen Drüsen besetzt ist und in welcher die Kalkschale abgelagert wird. Zur Bildung derselben sieht man häufig die Hausvögel Kalk an den Mauern piden, und es ist bekannt, daß man in der Gefangenenschaft gehaltenen Vögeln gegen die Paarungszeit hin Kalk liefern muß, um ihnen die Bildung der Eischale zu ermöglichen. Der Eileiter mündet in die Kloake auf der äußern Seite des linken Harnleiters.

Die Paarungszeit tritt bei den meisten Vögeln nur periodisch einmal im Jahre, im Frühling oder Sommer, ein und ist mit einer außerordentlichen Erhöhung aller Lebensthätigkeiten verbunden. Die meisten Vögel leben paarweise, nur wenige, wie unsere Fährner, in Polygamie, und bei den meisten beschäftigen sich beide Gatten gleichmäßig mit dem Baue des Nestes und der spätern Sorge für die Jungen. Sehr oft ändert namentlich das Männchen zur Paarungszeit

sein Gefieder und legt das sogenannte Hochzeitskleid an, welches meist glänzendere, lebhaftere Farben zeigt. Viele Gattungen, die sonst stumm sind, lassen zu dieser Zeit eine besondere Luststimme hören; andere verändern ihren Gesang in eigenthümlicher Weise. Der Bau der Brutstätte, des Nestes, zeigt sehr auffallende Verschiedenheiten und für jede Art einen ganz andern Typus, der sich stets wiederholt. Am einfachsten ist im allgemeinen der Nestbau der Lauf- und Sumpfvögel: viele hohlen sich nur Fledern oder Strohstränge aus, die sie mit den Dunen ihres Nestes auskleiden. Die Raubvögel bauen meist nur kunstlossten Horst, ebenso die Reiher, Störche u. s. w. Die größte Kunstfertigkeit zeigen die kleinen Enten- und Schrei- und Singvögel, die bald offene, bald zugedachte gewölbte Nester bauen. Einige neuholländische Vögel schneiden selbst das Nest und seine Zugänge, oft sehr absichtlich, mit schüsselförmigen und glänzenden Gespinnsten. Den merkwürdigsten Instinct zeigen die ausländischen Vögel, wie z. B. die Schneidergänse, welche ihr leichtes Nestchen auf einem Blatte aufhängen, vor welches sie ein anderes Blatt festgenäht hat, zu welchem Behufe sie das Blatt mittels ihres Schnabels und ihrer Füße zusammenzieht, oder die Republikaner (*Ploceus*), welche in großen Gesellschaften zusammenleben und ein gemeinschaftliches Nest bauen, das mit breiten Blättern gedeckt ist und unter dem Dache eine Menge von Eingängen hat, die alle in die getrennten Gemächer der einzelnen Paare führen. Der Zweck der Bebrillung ist, die Eier beständig in einer der Blutwärme nachkommenden Temperatur zu erhalten. Je früher der Vogel brütet (und der Krebsschnabel thut es in unsern Gegenden mitten im Winter, im December und Januar), desto weniger verläßt er die Eier, und meistens wird in diesen Fällen das brütende Weibchen von den Männchen gefüttert. Bei andern Gattungen brüten beide Gatten abwechselnd und der abgelassene hält stets in geringer Entfernung vom Neste auf, um Gefahr abzuwehren oder auch durch List die Verfolger auf falschen Weg zu lenken. Bei vielen Vögeln namentlich bei Wasservögeln fallen an bestimmten Stellen des Unterleibes die Federn aus, sodas nackte runde Fleck, sogenannte Brütstrecke entstehen und die Haut beim Brüten unmittelbar die Eier berührt. Die Zahl der Eier ist sehr verschieden. Viele Wasservögel wie die Lurche und Aale, legen nur ein einziges Ei, während bei denjenigen Vögeln, wo die Jungen unmittelbar nach dem Auskriechen sich selbst die Nahrung suchen können, die Zahl bis auf tausend und mehr steigt. Bekanntlich kann die Brutwärme auch künstlich ersetzt werden, und in der That legen auch einige Vögel (*Talegalla*) ihre Eier in grobe Thonhaufen, wo die durch die Gärung erzeugte Wärme genügt, sie auszubrüten.

Die jungen Vögel zeigen bei dem Auskriechen aus dem Ei zwei wesentlich verschiedene Typen. Bei den einen, den sogenannten Nesthockern, sind die Jungen nur mit spärlichem Flaume bedeckt und unfähig, ihre Nahrung nachzugeben; sie werden von den Eltern mit großer Sorgfalt und Ausdauer gefüttert und gewohnlich mit besondern Stoffen, welche sie selber verschmähen. So füttern die weissen Krämerhühner ihre Jungen anfangs mit Würmern, Raupen u. s. w. Es dauert oft geraume Zeit, bis die Jungen flügge werden, und das Zutrauen der Nahrung beschaffte die Eltern von früh morgens bis in die Nacht hinein. Bei den andern, den Nestflüchtern, sind die Jungen fast mit dem Verlassen der Eischale fähig, ihre Nahrung zu suchen und stehen dann nur noch unter der

er Nestern, welche ihnen die nöthige An-
 eridicität des Lebens ist nirgendwo
 als gerade in der Klasse der Vögel, bei
 zu mancherlei Erscheinungen Veranlassung
 s Federkleid wird namentlich in den ge-
 und kalten Zonen regelmäßig zweimal im
 wechselt, und gewöhnlich sind die Farben,
 der Mauser erscheinen, verschieden, sodas
 Sommerkleid und ein Winterkleid unter-
 nimmt man hierzu die Thatfache, daß bei
 n Vögeln die Verschiedenheit des Gefieders
 Verschlechtern ziemlich bedeutend ist, daß das
 größere und stärkere Männchen wenigstens
 re und lebhaftere Farben, oft aber auch
 rschiedenheiten zeigt, wie z. B. bei den
 Fasanen u. s. w., daß die jungen Vögel
 ou den alten durchaus verschiedenes Kleid
 o sieht man hieraus, daß Irrthümer hiner
 Bestimmung der Arten leicht geschehen
 In anderer Hinsicht gibt sich die Periodicität
 ist in der Lebensweise kund. Nur wenige
 d vollkommen stationär, sodas sie zu allen
 an denselben Orte vorhanden sind und
 , wo sie den Winter zubringen. Man hat
 dieser Art Standvögel genannt. Die
 gel machen beschränkte Wanderungen in
 t, bleiben aber etwa in demselben Klima,
 auch im Winter mehr südlich ziehen. Die
 l endlich, wozu Störche, Schwalben, Wach-
 w. gehören, unternehmen jährlich zweimal
 e Reise, indem sie im Frühjahr nördlich
 rt brüten und im Herbst mit den Jungen
 , um in südlichen Standorten den Winter
 n. Unsere gemäßigten Gegenden bilden für
 r im Norden brütende Vögel, wie für die
 nse, die Seidenschwänze u. s. w. die süd-
 iterquartiere, während die Zugvögel unserer
 n Küsten des Mittelmeers und nament-
 er afrikanischen Küste den Winter zubringen.
 und Reise geschehen meistens in der Nacht;
 her sieht man die Vögel aus einer ganzen
 n bestimmten Sammelplätzen sich vereinigen,
 ch in einer Nacht die ganze Gesellschaft auf-
 Diejenigen, welche über das Meer setzen,
 sich im Herbst an den südlichen Landspitzen
 sie einige Tage verweilen, um Kräfte zu
 und im Frühjahrre findet man namentlich
 en Vögeln, welche schlecht fliegen, wie z.
 teln, an denselben Orten ganze Scharen
 de höchster Ermattung, sodas sie sich mit
 greifen lassen. Im allgemeinen gilt von
 en Wanderungen die Regel, daß die Vögel
 am weitesten nach dem Pole zu liegenden
 en und von dort abziehen, sobald die nah-
 kalte Zeit beginnt, um sich in wärmere
 u begeben.
 er großen Uebereinstimmung im Bau der
 rop der so mannichfachen äußern Formge-
 hält es schwer, allgemeine Charaktere für
 Gruppen der Klasse zu finden. Wir theilen
 dermaßen ein:
 asse der Nesthoder (Insessores). — Ordnun-
 apageien, Klettervögel, Haftzeher, Sperlings-
 aubvögel, Girrovögel.
 lasse der Nestflüchter (Autophagi). — Ordnun-
 übnervögel, Laufvögel, Stelzvögel, Wasser-

das viele ausländische Familien bieten, können wir
 nur die besonders vorstehenden berücksichtigen. Ebenso
 müssen wir darauf aufmerksam machen, daß die
 Scheidungsgrenzen sowohl der Unterlassen als auch
 der Ordnungen und Familien durchaus nicht so fest
 sind als bei andern Klassen. So gibt es unter den
 Nestflüchern manche, deren Junge dennoch lange im
 Neste aufgepöppelt werden u. s. w.

Unterklasse der Nesthoder (Insessores).

Die Jungen verlassen das Ei mit unvollständiger
 Entwicklung selbst des Dunenkleides, sind unfähig, ihr
 Futter sich zu verschaffen, und müssen von den Aeltern
 im Neste während kürzerer oder längerer Zeit auf-
 gezüchtet werden.

Ordnung der Papagaien (Psittaci).

Oberschnabel sehr hoch und stark gekrümmt,
 am Grunde mit Wachshaut versehen, sehr
 beweglich in einem queren Einschnitt an den
 Schädel eingelenkt und über den abgestuften
 Unterkiefer übergreifend. Zunge meist dick,
 weich und fleischig. Kletterfüße, die beiden
 Mittelzehen nach vorn, die innern und
 äußern nach hinten gerichtet und etwa gleich
 stark.

Südliche Vögel, im Durchschnitt auf die Gegenden
 beschränkt, wo Palmen wachsen. Sie klettern mit Hilfe
 des Schnabels auf Bäumen, nähren sich besonders
 von Früchten, Samereien und fastigen Schossen, bauen
 ihre kunstlosen Nester in Baumlöcher, leben monogamisch,
 vereinigen sich aber zu großen Scharen, um Pflanzungen
 zu überfallen, denen sie durch ihre List und Zerstörung-
 sucht sehr schädlich werden. Bekannt ist die Gelebrig-
 keit, Nachahmungssucht und Intelligenz der meisten,
 von denen viele nicht nur sprechen, sondern auch die
 gelernten Sätze am richtigen Orte anzuwenden ver-
 stehen. Die natürliche Stimme ist ein häßliches Ge-
 schrei. Doch lernen nur die mit fleischiger Zunge
 sprechen; die Vögel mit Binselfüßer nicht. Auch leben
 einige nicht auf Bäumen, sondern in Erdlöchern. Alle
 fliegen ziemlich schlecht, die Flügel sind meist kurz und
 abgerundet. Alle Knochen pneumatisch.

Familie der Kakadus (Ptilotophida). Schnabel
 kurz, sehr hoch; Oberschnabel hinter der Spitze mit
 Ausschnitt, Schwanz kurz, auf dem Kopfe ein auf-
 richtbarer Federbusch. Meist schön weiß, rosa oder
 hellgelb gemischte Farben, selten schwarz. In Austra-
 lien und dem Indischen Archipel. Die abgebildete Art
 mit gelbem Federbusch von den Sunda-Inseln (Gelber
 Kakadu, *Cacatua galerita*, Taf. 12, Fig. 3).

Familie der Ara's (Sittacida). Schwanz lang,
 keilsförmig, Schnabel kräftig; Flügel spiz. Amerikaner
 und Australier. Ungelebrig. Ist sehr auffallende,
 grelle Farben, blau, roth, gelb u. s. w. Wangen
 nackt. Die abgebildete Art (*Ara, Makao*, Fig. 4)
 amerikanisch. Hierher auch der zierliche Wellenfittich
 (Wellenfittich, *Melopsittacus undulatus*, Fig. 5),
 jetzt in Thiergärten häufig, aus Australien.

Familie der Papagaien (Psittacida). Die typische
 Familie, Schwanz kurz, Schnabel mäsig, Flügel lang
 und spiz, Wangen befiedert. In Amerika und Indien,
 nicht in Australien. Hierher der gewöhnliche grüne
 Papagai (Kopf des grünen Papagais, *Chrysotis*
aestivus, Fig. 2) aus Brasilien, wol der gelebrigste
 von allen, der niedliche grüne Zwerppapagai (*Psitta-
 culus passerinus*), bekannt unter dem Namen des
 Zuseparablen.

in ungemein großen Anzahl von bekannten
 n (3—10000) und dem geringen Interesse,

Familie der Eulenpapagaien (Strigopida). Schnabel, Flügel und Schwanz kurz, keine Schlüsselbeine (Eulenpapagai, *Strigops habroptilus*, Fig. 6), eulenartiges Ansehen und Gefieder. Leben auf Neuseeland in Erdböhlen, jagen hauptsächlich nach kleinen Säugethieren. Fast ausgestorben.

Familie der Loriz (Trichoglossida). Junge pinselförmig, von hornigen Papillen starrend. Saugen Honig. Wie die vorigen ungeliebt. Eine Art auf der Philippinsel (*Nestor productus*), neuerdings ausgestorben.

Ordnung der Klettervögel (Scansores).

Kletterfüße in verschiedener Ausbildung. Schnabel ohne Wachsheit, meist stark und grob. Zunge hornig, oft mit Widerhaken. Straffes Gefieder. Flügel kurz.

Die südamerikanische Familie der Tukan's (Rhamphastida) oder Pseffersfresser (Pseffersfresser, *Rhamphastus toco*, Taf. 12, Fig. 7) ist ihres ungeheuer großen, mit Hornzellen gefüllten, gebogenen und seitlich gezähnten Schnabels wegen seit alter Zeit bekannt; die Zunge dieser Vogel entspricht indessen dem ungeheuren Schnabel durchaus nicht, da sie nur dünn, hornig, an der Spitze aber gefiedert und gespalten ist; die Füße sind stark, kräftig, vorn getäfelt, das Flugvermögen nur schwach. Die großen Vögel leben hauptsächlich von Insekten, die sie mit der Federzunge aus Baumrinden herausholen, genießen aber auch Früchte und verschmähen selbst Eier und Zunge anderer Vögel nicht. Die abgebildete Art hat die Größe einer Krähe, Kehle und Wurzeln weiß, Stirn und Rücken roth, Schnabel orange, sonst schwarz. Aus Brasilien.

Die Familie der Glanzvögel (*Galbulida*) wird von kleinen, lebhaft gefärbten (*Galbula viridis*, Fig. 8), grün metallisch glänzenden Vögeln gebildet, die einen langen, spizen, bald geraden, bald gebogenen Schnabel besitzen und schwache Füße haben, deren Vorderbein meist gänzlich miteinander verwachsen sind. Südamerikaner.

Die Familie der Hartvögel (*Bucconida*) hat einen meist starken, kurzen, kräftigen Schnabel, der an der Wurzel von fünf Bündeln steifer Vorsten umgeben ist (*Trogon viridis*, Fig. 9), von denen je eins vor jedem Nasenloch, eines zur Seite und ein unpaars unter dem Kinn steht. Die Füße sind kurz, schwach, getäfelt, von den Beinen die innern nach hinten, die äußern nach vorn gerichtet; die Farben des Gefieders gewöhnlich sehr lebhaft und metallglänzend. Die tragen Vögel bewohnen nur die heiße Zone und nähren sich besonders von Insekten oder Früchten.

Die Familie der Spechte (*Picida*) zeichnet sich durch den geraden starken, konischen Schnabel aus, in dem eine sehr lange, spize, hornige Zunge liegt, die pfeilartig hervorgeknickt werden kann. Die Füße sind kurz, stark, die Hinterbeine sehr kräftig, die innere zuweilen nur rudimentär oder gänzlich fehlend, sodas nur drei Zehen vorhanden sind. Der Schwanz ist bei einigen Gattungen weich, bei andern mit steifen, spizen Schwanzfedern versehen, die den Körper beim Klettern an den Stämmen stützen. Sie haben mit dem starken Schnabel tiefe Löcher in das Holz und ziehen die Insekten theilweise mit ihrer hornigen Zunge hervor.

Bei uns haben wir den großen Schwarzspecht (Kopf des Schwarzspechts, *Picus martius*, Fig. 20), ganz schwarz mit feuerrother Haube, nur in großen Wäldern, widerlich riechend, bekannt durch die Sagen von der Springwurzel; den Grünspecht (*Picus viridis*), grün mit rothem Scheitel, und verschiedene Buntspechte

(Buntspecht, *Picus major* Fig. 19), alle weißlich schwarz und weiß mit rothem Scheitel. Wästen in hohlen Bäumen. Hierher gehört auch der Wendehals (*Yunx torquilla*, Fig. 17), mit kurzem Schnabel, kurzen Flügeln, mäßigen, gerundetem Schwanz, weitem, ledernem Schnabel, gelbgrau geprenkelt, bekannt durch die große Leichtigkeit seines Halses. Er bat nicht, wie die Spechte, aber, wie diese, von 30 Arten.

Familie der Kukule (*Cuculida*). Schnabel lang, Mundspalte sehr weit (Kukul, *Cuculus canorus*, Fig. 10), äußere Zehen ineinander verflochten, können nicht, fliegen scheu in Wäldern, nähren von Insekten, kleinen Nestvögeln und Eiern. Uns nur der Kukul (Kopf des Kukul, *Cuculus*, Fig. 11), dessen Gesang allgemein bekannt. Nach vorzugsweise von haarigen Raupen, deren sie in seinem Magen eine Art Pelz bilden, legt sie Eier in Nester kleinerer Vögel, die das Nest aufziehen. Die ausländischer Kukule machen die einzigen (*Crotophaga*) lesen in Südamerika dem die Schmarogerinsekten ab.

Ordnung der Fastzeker (Syndactyli).

Füße schwach und kurz, zwei oder drei Zehen nach vorn gerichtet und durch Haut miteinander verbunden, sodas der Fuß einen schwachen Klammerfuß darstellt. Schnabel groß, bei der Familie der Bienenfresser (*Meropida*) sehr lang, spiz, etwas gekrümmt, an dem Grunde sehr scharf getastet, Flügel lang, spiz; Nasenklammer Theil mit Vorsten bedekt, Füße sehr kurz und die der Bienenwolf (*Bienenfresser*, *Merops*, Taf. 12, Fig. 14) schwärzt in Oberitalien, sehr besonders Bienen, Wespen u. s. w. Kommt bis nach Deutschland. Alle meist schön und gefärbt.

Die Familie der Eisvögel (*Alcedida*) zeichnet sich im allgemeinen durch das große Mißverhältnis zwischen dem Körper und dem Schnabel aus, der sehr lang, spiz, kegelförmig und meist ganz gerade oder leicht gebogen ist. Die kurzen und dicken Vögel haben sehr kurzen Schwanz, kurze, runde Flügel und schwache Füße (Eisvogel, *Alcedo hispidus*, Fig. 12), an denen die beiden Außenbeine meist in ihrer Länge verwachsen sind und die Innenbeine nur ganz kurz und schwach ist, bald gänzlich fehlend (des Eisvogels, Fig. 13). Die meist mit leuchtenden Metallfarben geziereten Vögel halten sich meistens gern am Ufer stehender Gewässer auf, wo sie sehr lang, ruhig auf Zweigen sitzen und dann plötzlich kleine Fische und Wasserinsekten stoßen.

Unser Eisvogel nistet in Uferlöchern und zeichnet sich durch die metallblauen Deckfedern des Rückens aus. Viele zum Theil große Arten in den südlichen Theilen der Alten Welt, Australiens und Polynesiens.

Die Familie der Nashornvögel (*Bucerotida*) schließt meist große, rabeartige Vögel, mit sehr großem, seitlich zusammengedrücktem Schnabel, der gezähnte Ränder übergreifen und auf welchen noch ein besonderer Aufsatz steht, der einem Horn nicht unähnlich ist und hohle Knochenzellen enthält. Bei dieser Familie kommt die größte Zahl von Vögeln in der ganzen Ordnung der Fastzeker nämlich sieben vor. Die Zunge ist kurz und dick, die Beine nur durch eine kurze Haut am Grunde miteinander verbunden. Die großen Vögel, die ziemlich träge sind, leben in den südlichen Theilen der östlichen Hemisphäre, hauptsächlich von

ichten, verschmähen aber auch kleinere Am-
ht.

g der Sperlingsvögel (Passeres).
ihlreichste Ordnung. Meist kleine
t sehr verschieden gestalteten Schna-
Wachshaut, mit Gang- oder Schreite-

er betrachtet sind die Charaktere rein
Was nicht zu andern Ordnungen
werden muß, gehört zu dieser. Man
h der Bildung des untern Kehls
rei Unterordnungen unterscheiden.

terordnung der Schreivögel
(Clamatores).

gmuskelapparat fehlt. An den Flügeln sehn
von welchen die erste die längste ist.
ien entsprechen häufig solchen der Singvögel.
ilie der Rallen (Coracida) entspricht der:
Raben; der Schnabel ist bald kegelförmig,
rade mit übergebogener Gabelspitze, bald
und dick und der Rachen sehr weit ge-
daß die Vögel befähigt sind, in ähnlicher
Schwalben nach fliegenden Insekten um-
men. Bei einer Gruppe der Familie, die
eise in den Wäldungen Neuholands nach
überherrscht, ist der Schnabel sogar sehr
ewölbt und das Gefieder dabei, ähnlich wie
der Ziegenmeller, weich und seidenglän-
der Rallen haben gänzlich getrennte Zehen
luse zeigen vorn Tasteln, hinten und auf
der ein großes Netzwerk. Unsere Mandel-
c Ralle (Coracias garrulus, Taf. 12, Fig. 16)
äner Farbe mit braunem Rücken findet sich
n Sandgegenden. Lebt wie Krähen.
der Wiedehopfe (Upupida). Schnabel
dünn, gebogen. Unser Wiedehopf, Upupa
ig. 15), grauröthlich mit weißen und
Binden und sehr beweglicher Feder-
dem Kopfe. Sehr possirlicher Vogel, der
nen Insekten in die Höhe wirft, um sie zu
. Wird im südlichen Europa gegessen. Die
ben einen fürchterlichen Aasgestank, der
an den Wälgern haften bleibt. Nistet in
men.

der Kolibri (Trochilida) (Tropisko-
za pella, Fig. 24), bekannt wegen der
hres Körpers und dem mannichfaltigen
ihres bunten, oft metallglänzenden Ge-
r Schnabel dieser niedlichen, ausschließlich
rn Theilen Amerikas angehörigen Vögel:
3, dünn, schmal, gerade oder schwach ge-
die Ränder des Oberschnabels so über-
er den rinnenförmigen Untertiefer, daß
ne förmliche Röhre gebildet wird, in wel-
e zur Wurzel gespaltene Zunge wie ein
umpfenstengel spielt. Die Hörner des langen
legen sich in ähnlicher Weise wie bei
n um den Kopf herum und gestalten so
iges Hervorschießen der langen Zunge,
n diese kleinen Bewohner der heißen Zone
schwebend, kleine Insekten oder Honig-
n Nektar hervorholen. Ihre Flügel sind
säbelförmig spitz, die Handschwingen aus-
rig, stark und steif, das Brustbein sehr
Kamm außerordentlich entwickelt und das
en ungemein bedeutend. Die Füße sind
an, die Zehen durchaus frei. Man kennt
rten.

Die Familie der Mauerschwalben (Cypselida)
unterscheidet sich von den echten Schwalben, mit wel-
chen sie bisher gewöhnlich zusammengestellt wurde,
durch den Mangel des Singmuskelapparates. Der
Schnabel ist kurz, flach, breit, der Rachen außer-
ordentlich weit gespalten, die Flügel ganz gebaut wie
diejenigen der Kolibri, lang, säbelförmig, sehr steif,
die Füße sehr kurz und wahre Klammerfüße, alle
Zehen nach vorn gerichtet. Sie benutzen beim Nest-
bau einen fleberigen Speichel, mit dem sie entweder
die Materialien zusammenleimen, oder den sie auch
allein zum Bau des dünnen, halbkugelförmigen Nestes
benutzen. Die Nester der Salanganen (Collocalia
esculenta) werden bekanntlich zur Herstellung von
Kraftbrühe benutzt und theuer bezahlt. Die Salan-
ganen nisten im Indischen Archipel an senkrechten
Felswänden. Unsere Mauerschwalbe oder Spyr
(Mauerschwalbe, Cypselus apus, Fig. 23) nistet
besonders gern in Mauerlöchern hoher Thürme. Nah-
rung wie die Schwalben.

Familie der Ziegenmeller (Caprimulgida). Kurzer,
platter, dreieckiger, an der Spitze etwas haliger Schnabel
(Kopf des Ziegenmellers, Caprimulgus, Fig. 22),
mit Schnurrörren. Ungeheuer weite Mundpalte.
Eulenartig weiches Gefieder. Nächtlche Vögel, die
geräuschlos nach Nachtfalsten umherfliegen. Unser
Ziegenmeller (Caprimulgus punctatus, Fig. 21)
hat den Namen von seiner Gewohnheit, sich in
dunkeln Ställen zu bergen und dort seine Eier auf
den Boden ohne Nest zu legen. Eine in Südamerika
lebende Art, der Guacharo (Steatornis caripensis),
nistet in Höhlen, soll von Früchten sich nähren und
hat ungemein fette Junge, die nebst den Eiern zur
Gewinnung von Del dienen.

Familie der Luftröhrenschreier (Tracheophona).
Der Kehlkopf wird von dem untern Ende der Luftröhre
ohne Beihülfe der Bronchien gebildet. Eine
Gruppe, nur aus amerikanischen Formen bestehend,
leben etwa wie Spechte (Baumbader, Anabatida); zu
ihnen gehören die brasilianischen Baumläufer (Synal-
axis albescens, Taf. 13, Fig. 4), und die Köpfer-
vögel (Furnarius), welche ein Nest aus Erde bauen,
das einem Vadoßen ähnlich sieht. Zu der andern
Gruppe, den Wolltrüden (Eriodorida), mit wolligen
Häutenfedern, gehört der australische Leirvogel
(Menura superba, Fig. 5), ein stolzer Vogel, fast
von Hühnergröße, mit schönem Leirschwanz, guter
Läufer, schlechter Flieger, der wie Hühner nach In-
sekten scharrt und im Nachahmen aller Arten von
Tönen sehr gewandt sein soll.

Familie der Tyrannen (Tyrannida). Ersehen in
Südamerika etwa unsere Finken (Tyrann, Tyrannus
intrepidus, Fig. 3). Schnabel stark, breit, Flügel
mittellang. Vöge Jänter, die sich gegen Raubvögel
muthig zur Wehre setzen.

Familie der Schmutzvögel (Ampelida). Schnabel
kurz, breit, Nasenlöcher unter den Federn verdeckt.
Flügel ziemlich lang. Gefieder meist weich, schön ge-
färbt. Hierher bei uns nur der Seidenschwanz
(Bombycilla garrula, Fig. 21), der im hohen
Norden lebt und nur in strengen Wintern in
Scharen zu uns kommt, röthlich-grau, ausgezeichnet
durch die prachtvollen scharlachrothen Blättchen am
goldgesäumten Schwänze. Hierher auch das Felsen-
huhn von Cayenne (Alippenhuhn, Rupicola crocea,
Fig. 2), prachtvoll rothgelb mit über den Schnabel
herübergezogener Helle beim Männchen. Weibchen
braun. Geberdet sich etwa wie die Wirtshühner zur
Paarungszeit.

n leben. Die große Nachtigall (*Luscinia* Taf. 13, Fig. 17), oder der Sprosser, mehr n; die weiter verbreitete kleine Nachtigall (*ulgaris*), beide in Gebüsch nistend, Nachtigall; Roth- und Blauehlchen (*Sylvia rubecula*), letzteres im Norden, alle mehr langbeinig; nigern Grassmäden (*Carruca cinerea*), die Rethschwänzen (*Ruticilla*), die Kobrylamohorpe) und Steinschmäger (*Saxicola*) de; die kleinen Goldhähnchen (*Regulus*, Fig. 16), mit feuerrothem Scheitel; die n Raunkönige (*Troglodytes parvulus*, Fig. 1), beide in Gebüsch, emsig nach eften suchend.

der Wachsstelzen (*Motacillida*). Schlant, mit langem Schwanz, den sie eigenthüm- b bewegen. Laufen gut, fliegen schlecht, besonders gern an Bächen auf, wo sie In- suchen.

der Sturzfänger oder Braunellen (*Ac- Schnabel, Beine und Behen länger. Nisten de. Im Hochgebirge der Alpensturvogel alpinus*), ein vorzüglicher Sänger.

mit sehr langem dünnen Schnabel (*Tenuirostra*).

der Baumläufer (*Certhida*). Schnabel und dünn, gebogen, Zunge hornig, kurz- ümmt, zusammengebrückt. Klettern mit icklichkeit an Bäumen, Felsen und Mauern bwärts nach Insekten. Hierher der schöne fer (*Tichodroma muraria*, Taf. 14, Fig. 4) ven, mit karminrothen Fleden auf den er Baumläufer (*Certhia familiaris*), häufig kurz, dick, graubraun; die Baumpsechte Blaspschicht, *Sitta caesia*, Fig. 5) mit hnabel.

ie ausländischen, durch Farbenpracht (meist auszeichneten Familien der Honigvögel und Honigfresser (*Meliphagida*), welche d Honig aus großen Blüten saugen.

it ausgeschnittenem Oberschnabel, ten Zahn bildet (*Dentirostra*).

er Drosseln (*Turdida*). Schnabel krumm ht gelebt; Beine kräftig, hoch; Laufe ge- ieder meist dunkel gefärbt, grau geprenkelt.

Säuger, nähren sich von Insekten und zugeweise von letztern im Herbst, und als Braten sehr geschätzt. Hierher die asel (*Merula vulgaris*, Taf. 13, Fig. 19), er besten Sänger, sehr geschickt im anderer Vögel; der Krammetsvogel ris, Fig. 18), vorzugsweise als Nahrung eine Menge anderer. Hierher auch die ottrossel (*Mimus polyglottus*) in Nord-

ilie der Würger (*Lanius*) zeichnet sich ndern Singvögeln durch das grauame s, welches sie einigermaßen den Raub- rt. Die starken und kräftigen Vögel nähr- sächlich von Insekten, greifen aber auch el und Säugethiere mit großem Muth- en von der Gewohnheit, die im Vorrath ute auf Dornen aufzuspießen, den Volks- tädter erhalten. Der Schnabel ist kräftig, nmengebrückt, baldig umgebogen, scharf zu- hinter der Spitze mit einem vorpringen-

den Zahne oder einer scharfen Ede versehen; an der Basis stehen starke, lange Bartborsten. Die Würger haben zehn Handschwingen, von denen die erste zwar immer kürzer ist als die übrigen, aber dennoch oft eine bedeutendere Länge erreicht als dies bei den übrigen Singvögeln der Fall ist. Der Lauf ist vorn ge- täfelt, seitlich mit Stiefelschienen versehen, die Stimme nicht unangenehm, das Nachahmungstalent bedeutend. Wir haben den großen Würger (*Neutöddter*, *Lanius excubitor*, Taf. 14, Fig. 3), schädlich durch Zerstörung von Nestern, die kleinern Arten nährlich durch Ver- tilgung von Insekten.

Die Familie der Fliegen Schnapper (*Muscicapida*) umfaßt kleine Singvögel mit breitem, niedergebrücktem Schnabel, dessen Spitze meist halenförmig umgebogen und hinter dieser Halsenspitze mit einer Kerbe versehen ist. An der Basis des Schnabels stehen gewöhnlich starke, vorwärtsgerichtete Borsten, welche zuweilen zu einer Art Federbusch vereinigt sind. An den Flügeln finden sich stets zehn Handschwingen, von denen die erste bedeutend kürzer, die dritte oder fünfte gewöhn- lich die längste ist. Der Lauf zeigt vorn Schuppen- tafeln, auf der Seite Stiefelschienen. Das Gefieder ist meist seidenartig, selten reich gefärbt. Die kleinen muntern Vögel leben in Heden und Gebüsch und schnappen meist fliegende Insekten im Stöße weg, ohne sie indeß in ähnlicher Weise zu jagen, wie dies die Schwalben thun. Die Arten der nördlichen und gemäßigten Gegenden ziehen im Winter gegen Süden.

Gruppe der Spaltschnäbler (*Fissirostra*).

Die Familie der Schwalben (*Hirundinida*) hat einen breiten, flachen, sehr tief gespaltenen, an der Spitze etwas gekrümmten Schnabel und einen un- gemein weiten Nachen, der sich bis hinter die Augen öfnet. Die Nasenlöcher sind länglich, die Bartborsten, welche sich am Grunde des Schnabels befinden, kurz und schwach; die Flügel sehr lang, zugespitzt, mit neun Handschwingen versehen, von welchen die vorderste die längste ist. Die Zahl der Armschwingen beträgt eben- falls neun. Die Füße sind kurz, kräftig, die mittlere Zehe bedeutend länger, die Hinterzehe zum Un- terschiede von den Mauer-Schwalben, die der Ordnung der Schrei- vögel angehören, wirklich nach hinten gedreht. Bei einigen Arten sind Läufe und Behen bis zu den Krallen befiedert, bei andern nackt und dann vorn getäfelt, während die Seiten gestieft sind. Das Brustbein hat zwei doppelte seitliche Ausschnitte, ist aber wie der ganze Schulterapparat den langen Flügeln und ihren kräftigen Muskeln entsprechend stark ent- wickelt. Der schnelle und geschickte Flug der Schwalben, die Sicherheit, mit welcher sie in der Luft schwärmende Insekten schnappen, ist bekannt genug, ebenso ihre Wanderungen nach Süden beim Beginne der kaltern Jahreszeit und ihre Rückkehr im Frühjahr, wo das Värchen sein altes Nest mit großer Sicherheit nieder- zufinden weiß. Sie bauen ihre Nester, die meistens aus Erde bestehen, deren Klumpen mittels des Saftes der Kopfdrüsen zusammengelebt werden, gern an Mauern, Häusern oder in Felsritzen, wobei sie ein seitliches Flugloch lassen.

Unsere Haus-Schwalbe (*Chelidon urbana*, Taf. 13, Fig. 20), unten weiß, und die Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*), an der Kehle rothbraun, bauen an und in Häusern, die Uferschwalbe (*Hirundo riparia*) an Flüssen in Uferlöchern.

Ordnung der Raubvögel (*Rapacia*).

Kurzer, starker, an der Spitze hakig gebogener, an der Basis mit Wachshaut versehener Ober-

schnabel, der über den Unterkiefer hinübergreift. Wenigstens bis zur Kniebeuge befiederte starke Füße mit langen, unten schwieligen Zehen und scharfen krummen Krallen (Fänge), Flügel lang.

Der Kopf der Raubvögel ist stets kurz, oft auf fallend in die Breite gezogen durch die Entwidlung der großen Augenhöhlen; die Hirnkapfel rundlich; der Schnabel stets sehr stark und mit schneidenden, scharfen Rändern. Im allgemeinen ist er um so mehr von der Basis an gekrümmt, je raubgieriger das Naturell ist, deshalb bei den Aasfressenden (Adler, und besonders Geier) an der Wurzel zuerst gerade, bei Eulen und Jagdfalken dagegen unmittelbar gekrümmt. Hinter der scharfen Spitze ist die Schneide mit einem mehr oder minder tiefen Einschnitt und einem Zahne versehen; die Gabelspitze des Oberkiefers greift stets über den gewöhnlich geraden, kurzen Unterkiefer hinüber; an seiner Basis ist der Oberschnabel mit einer Wachshaut bekleidet, in welcher sich die nur selten verdeckten, meist offenen, rundlichen oder ovalen Nasenlöcher befinden. An der Basis des Schnabels stehen außerdem manchmal starke Bartborsten, während in andern Fällen dieselbe ganz nackt ist. Der Hals ist kräftig, oft nur sehr kurz, in andern Fällen länger und dann oft nackt oder nur mit Flaumfedern bekleidet, während bei kurzem Halse die Befiederung gewöhnlich über den ganzen Kopf hinweggeht. Die Flügel sind lang, spitz und heißen durchaus zehn Handschwingen, deren relative Länge bei den einzelnen Familien sehr variiert. Die Armschwingen sind durchschnittlich sehr zahlreich im Verhältniß zu den vorigen Familien, indem man wenigstens 12, gewöhnlich 13 bis 18 und im Maximum sogar 27 findet. Der Schwanz ist breit, gewöhnlich lang, oft ausgezackt und enthält meistens 12, seltener 14 breite, steife Steuerfedern. Die Füße sind außerordentlich kräftig, die Zehen kurz und stark, die langen, gebogenen Krallen sehr scharf und spitz; immer sind drei Zehen nach vorn, eine nach hinten gerichtet und gewöhnlich die drei vordern Zehen oder wenigstens die beiden innern durch eine kurze Haut miteinander verbunden. Bei einer Familie, den Eulen, ist die äußere Zehe eine Wendezehne und kann vollständig nach hinten geschlagen werden, so daß ein Klatterfuß gebildet wird. Die Läufe sind nur selten vorn mit Tasteln, gewöhnlich in ihrer ganzen Länge mit neßförmigen Schildern bedeckt. Hinsichtlich der innern Eingeweide ist zu bemerken, daß der Schlund sehr weit, faltig, mit starker Muskelhaut und einem weiten Kropfe versehen, der Magen dagegen groß und dünn ist und jener Muskelmassen und dicken Hornlagen entbehrt, die bei den Körnerfressern existiren. Die unverbäulichen Theile der Nahrung (Haare, Federn u. s. w.) werden in Form eines Klumpens (Gewölle) wieder ausgebrochen. Sämmtliche Vögel dieser Ordnung leben vom Raube, die meisten fangen lebende Wirbelthiere oder begnügen sich auch mit Aas, und nur die kleinern Arten suchen zuweilen in der Noth ihren Hunger mit Insekten zu stillen. Das kunstlose, flache Nest, welches diese Vögel meist auf Bäumen, Felsen oder in Mauerschlern anbringen, enthält gewöhnlich nur zwei, höchstens vier Eier, aus welchen die Jungen in ziemlich unvollendeter Entwidlung nackt und blind auskriechen und von den Alten lange Zeit gefüttert werden. Die Raubvögel leben stets paarweise und meistens vereinzelt, so daß jedes Paar einen bestimmten Jagdbezirk hat, eine Regel, wovon nur einige, gewöhnlich von Aas lebende Gattungen eine Ausnahme machen. Das Gesicht der Raubvögel ist ganz außerordentlich scharf; hoch

in den Lüften schwebend entdecken sie ihre Beute, die sie meistens mit rasender Schnelligkeit herbeistürzen oder stoßen; nur wenige Arten jagen stumm die Beute im Fluge nach.

Unterordnung der Nachtraubvögel oder Strigida.

Der Kopf ist verhältnismäßig breit und erscheint bei den lebenden um so größer, als einfacher Feder Schmuck ihn umgibt und der Hals kurz und ebenfalls dick befiedert ist. Die Augen sind runden, mit ungemein beweglicher, vollständiger Haut, die in positiver Weise über das schwarze, gefärbte Auge gezogen werden kann, welches sich ganz nach vorn gerichtet und häufig aneinandergedrückt, daß sie nur durch eine Scheidewand getrennt erscheinen. Ist noch ein sonderbares Ansehen dadurch erhöht, daß einem Kranze von Federn umgeben werden, eine Art Trichter bildet. Der Schnabel ist aber stark und seiner ganzen Länge nach gebogen. Die Wachshaut wird von den Federn gänzlich verdeckt, so daß man nur den Schnabelhaken sieht. Der Kranz von Federn, die Schnabelwurzel bedeckt, die Augen nach hinten sich über die Ohröffnung bedecken, der Schleier genannt; die Ohröffnung selbst ist von einer nackten Haut umgeben und kann durch eine häutige Klappe geschlossen werden, so daß das Rudiment eines äußern Ohrs gebildet wird, noch durch einen Bündel von Federn verdeckt, die hinter demselben stehen und gewiss zum Theil der Schallwellen bestimmt sind. Das Gesicht ist äußerst weich, wollig und aufgedunsen, der Hals durchaus geräuschlos. Die starken, fingerkralligen Füße sind bis zu den Krallen beinahe vordern Schwungfedern am äußern Rande, die äußere Zehe, wie schon erwähnt, eine Zehe, die nach hinten gedreht werden kann. Die Vögel jagen in der Dämmerung und nachts; hängen dem Lichte zu, wie alle Nachtthiere; haben ein unheimliche, tief dröhnende oder gelende Stöhnen zu den Sagen vom wilden Jäger Vernehmen geben hat; nisten kunstlos an dunkeln Orten, in Mauerspalten und Höhlen; sind die intelligentesten Raubvögel und lassen sich zahmen. Bei Tage werden sie, da sie geflügelt sind, von allen andern Vögeln gemieden und plagt, was auch zur Jagd in der Kränzhaut wird, indem man einen gefesselten Vogel freien, von Bäumen umgebenen Platz bringt, die Krallen und Raben sich zur Verfolgung. Mit Ausnahme des Uhu, der der Jagd schuldig ist, sind alle Eulen höchst nützliche Thiere, besonders durch Vertilgung von Mäusen und nachts in den Gärten vor Schaden warnend.

Familie der Ohreulen (Bubonidae). Der Uhu mit großen Federbüscheln, dahinter anhängender Schleier. Hierher unsere größte Eule, der Uhu maximus, Taf. 14, Fig. 14) oder Auf, selbst ein Adler, selten, in großen Wäldern, selbst Hasen und junge Rehe an. Mehrere Arten der Größe durch die Waldbrehle (Strix ous), Sumpfbrehle (Strix brachyotis), bis zur Zwergohreule (Ephialtes scops) in den Wäldern.

Familie der Nachtaulen (Syrnidae). Schleier gebildet, keine Ohrbüschel. Hierher unter Nachtaul (Syrnium aluco, Fig. 15), reißerisch, grau, in Wäldern, und die schöne nachtschöne

Schleiereule (*Strix flammea*) in Gebäuden

der Tagfäule (*Surnida*). Kein äußeres ausgebildeter Schleier, schlankere Gestalt. eniger das Tageslicht, jagen schon in früher und selbst an trübten Tagen. Hierher rdische Harfang (*Surnia nyctea*), von der Uhu, weiß mit dunkeln Flecken; die eben- ische, häufiger zu uns in kalten Wintern Sperbereule (*Surnia nisoria*), dem Sperber die Zwerg-eule (*Surnia passerina*), kletternd Schnabel; bei uns, häufiger im Süden, das en (*Athene noctua*), der Vogel der Minerva, ers gern erleuchteten Fenstern zusliegt, des- envogel, da der Bauer nur bei tödlicher oder bei der Leichenwacht nachts Licht

nung der Tagraubvögel (*Diurna*).

esieder ist straff, der Flug sogar scharf; die Augen mehr zur Seite gestellt, aber nackt, nicht in den Federn ver- Weder Schleier noch Ohrbüschel. ist länger. Weit zahlreicher als die Weibchen stets größer als die Männ- meist dunkler gefärbt sind.

milie der Falken (*Falconida*) begreift die und kräftigsten Raubvögel, die allein von Thieren sich nähren. Der bide Kopf und als sind durchaus befiedert, der Schnabel, fast immer von der Wurzel an getrümmt, seitlich gestellt, von einer vorspringenden e überwölbt, so daß das Auge tief im liegen scheint. Die Bügelgegend mit kurzen oder Borsten besetzt, die Flügel lang, spit, un ziemlich lang, die Krallen der Füße stark und sehr scharf. In der äußerst zahlreichen, ganze Erde verbreiteten Familie kann man besondere Gruppen unterscheiden: die Edel- Falco), mit gedrunenem Körper, langen, ügel, an dem die zweite Handschwinge die, während die erste ihr wenig nachgibt, und aus getrümmtem, starkem Gelenkschnabel, en scharfer Spitze ein Zahn sich befindet; es diese Gruppe die Falken, welche man früher abtrichtete, wie der abgebildete Jagdfalke o candicans, Taf. 15, Fig. 4), der im 1 Haufe, weiß mit braunen Flecken; der mehr nördliche Würgfalle (*Falco lanarius*); utschland heimische Wanderfalle (*Falco pere- and Baumsfalle (*Falco subbuteo*) oder Lerchen- alle in Emangelung isländischer Falken r Weize abgerichtet wurden. Ferner die Rößhelfalle (*Falco cenchris*), Thurm-falle nunculus), die im Nothfalle sich auch mit fsekten (Heuschrecken u. s. w.) sättigen, meist ie Vögel jagen und deshalb schädlich sind. ichte (*Astur*), mit stark getrümmtem, an reitem, sehr scharfhaligem Schnabel, längern d sehr spitzen Krallen, wozu der Pfänderer dühnerhöfe, der Taubenhabicht (*Astur ius*, Fig. 3) und der Sperber (*Nisus s*) gehört; die Gabelweihen (*Milvus*), mit n, langhaligem Schnabel, kurzen Krallen und en und langem Gabelschwanz; hierher die he Gabelweibe (*Milvus regalis*), die schön auch auf Fische stößt, und der schlante grau- despenbussard (*Pernis apivorus*), der sich vor- von Insekten, Eidechsen u. s. w. nährt und igen mit den aus den zerstörten Nestern der*

Hummeln, Wespen und Bienen genommenen Jungen füttert. Die Weihen (*Circus*), mit kleinem, schwachem Schnabel, langen dünnen Beinen und Zehen, schlankem Körper, hauptsächlich Mäuse- und Froschvertilger, wie die blaue Weiße (*Circus cyaneus*), während die Mohr- weihen (*Circus rufus*) auch Fische und Wasservögel jagen. Die Bussarde (*Buteo*), Körper plump, did; Kopf breit; Schnabel ohne Zahn; Flügel spit; Schwanz kurz; Läufe hoch; Zehen kurz und schwach; Krallen meist abgeschliffen. Meist träge Vögel, die besonders auf Baumstumpfen, Wegeteinen u. s. w. auf Mäuse lauern, die sie aus der Erde heraushehlen. Die Adler (*Aquila*), meist große Vögel mit hohem, aber an der Wurzel geradem Schnabel, der den Uebergang zum Geierschnabel macht und keinen Zahn besitzt; mit stumpfen abgerundeten Flügeln, deren vierte oder fünfte Schwinge die längste ist; Lauf meistens von Hosen (lodern Schenkelgefieder) bedeckt. Der Flug nicht gewandt in Wendungen, aber schön schwebend in Kreisen und laufend im Stof. Die meisten Adler nähren sich ebenso viel von Aas, als von lebender Beute. Hierher die Fischadler (*Haliaetus fluvialis*) auf Flüssen und Seen, und die See-adler (*Haliaetus albicilla*, Taf. 14, Fig. 20), mit weißem Schwanz, im Norden von Europa; *Haliaetus leucocephalus*, mit weißem Kopf, in Nordamerika; der Schlangen- adler (*Circus chrysolæus*, Fig. 21), ohne Hosen; unter den Felsenadlern der kleinere Schrei- adler (*Aquila naevius*), der größere Kaiseradler (*Aquila imperialis*), im Süden, besonders im Atlas, und bei uns die größte Art, der Steinadler (*Aquila fulva*, Fig. 19), der bis 3 Fuß und mehr mißt.

Familie der Stelzfalken (*Gypogeranida*). Körper und Hals schlank und lang; Kopf breit; der Schnabel stark, von Grund aus gebogen, ohne Zahn, mit sehr großer Wachsheit; Flügel und Schwanz lang, an erstern die fünf ersten Schwingen gleich lang, und am Handgelenk stumpfe, vorstehende Hornsporen; Beine und besonders Läufe sehr lang, nackt, wie bei Stelz- vögeln, mit kurzen Zehen und kaum getrümmten Krallen. Nur eine Gattung und Art, der afrikanische Kranich- geier oder Secretär (*Gypogeranus serpentarius*, Taf. 15, Fig. 5), ein unerwähllicher Schlangen- vertilger, mit einem Federbusch im Nacken, als habe er eine Feder hinter das Ohr gestekt. Den giftigen Schlangen hält er den spornbewaffneten Flügel wie ein Schild vor und greift sie mit seltsamen Geberden und Sprüngen an, bis er ihnen den Kopf zerhackt. Jetzt auch auf den Antillen acclimatisirt.

Den Uebergang von den Adlern zu den Geiern bilden die Lämmergeier (*Gypaetida*), Bewohner der europäischen und asiatischen Hochgebirge, die mit dem an der Basis geraden, dann lappig getrümmten Schnabel der Geier, mit den hochliegenden Augen und den wenig getrümmten Krallen derselben die Befiederung des Kopfes und Halses verbinden, welche man bei den Falken wahrnimmt, denen sich diese Vögel auch durch ihre Lebensart nähern, indem sie hauptsächlich nur auf lebende Thiere Jagd machen. Der Lämmergeier oder Bartgeier (*Gypaetus barbatus*, Fig. 1) ist der größte Raubvogel der gemäßigten Zonen, der dem Condor nur sehr wenig an Größe nachgibt, Lämmer und Zidlein von Ziegen und Gemsen raubt und große Knochen hinabschlingt, die er auch verdaut. Aas verz- schmächt er sowenig als der Adler.

Familie der Geier (*Vulturida*). Meist große, selbst sehr große Vögel mit langem Hals, der ebenso wie der Kopf nackt oder mit kurzem Flaum bedeckt ist. Häufig fleischige Auswüchse am Kopfe oder Flaumen- tragen am Nacken. Schnabel lang, erst gerade, nur

an der Spitze gebogen und dort auch meist als Kuppe erhoben. Die Flügel sind groß und breit, abgerundet, die Füße lang, die Zehen schwach und lang, aber die Krallen nicht so trumm und scharf als bei den Falken. Die echten Geier mit nadtem Kopf und Hals und schliegenden Augen leben meistens in Scharen zusammen, nähren sich hauptsächlich von Aas und werden dadurch in heißen Ländern sehr nützlich. Es sind träge Vögel, die stundenlang mit hängendem Kopfe ruhig sitzen, bis sie eine Beute gewahren, von der sie mit unersättlicher Gier oft so viel verschlingen, daß sie zum Fluge fast unfähig werden. Sie schweben und freisen noch schöner und höher als die Adler. Hierher der größte jetzt lebende fliegende Vogel, der Condor (*Sarcorhamphus gryphus*, Taf. 14, Fig. 16), mit stark tuppigen Schnabel, Fleischauswüchsen und einer weißen Dumentraufe am Anfange des langen, fast nackten Halses, der in den höchsten Gebirgen Südamerikas ähnlich lebt wie der Lämmergeier in den Alpen. Der schön gezeichnete Geierkönig (*Sarcorhamphus Papa*) in Brasilien und Mexico; die amerikanischen Aasgeier mit nadtem Gesicht (*Cathartes*); ferner die Geier der Alten Welt, der graue, die Adler weit an Größe übertreffende Wüstengeier (Grauer Geier, *Vultur cinereus*, Fig. 17), mit zerklüftener Halskrause, in Afrika, und der kleine Aasgeier (*Neophron percnopterus*, Fig. 18), der auch in Südeuropa nistet.

Ordnung der Girtvögel (*Gyrantes*).

Schnabel gerade, weich, nur an der Kuppe hornig, mit aufgetriebenen Klappen an den im weichen Theile liegenden Nasenlöchern. Starke drüsiger Kropf, der eine milchige Flüssigkeit absondert, womit die Jungen im Neste, die keine Dunen haben, ernährt werden.

Familie der Zwergdronen (*Didunculidae*). Schnabel einem Geierschnabel ähnlich, aber am Grunde weich, mit starker Kuppe und stumpfer Spitze über den Unterschnabel übergreifend (*Didunculus strigirostris*, Taf. 15, Fig. 6), der zwei starke Zähne hat; die Nasenlöcher schräg im weichen Theile; Flügel mäßig; Schwanz kurz; Lauf stark, Zehen lang, Krallen trumm. Ein sehr seltener Vogel, auf den Navigator-Inseln, der aber mit dem auf Isle de France seit zweihundert Jahren ausgestorbenen Dronite oder Dodo (*Didus inoptus*), der nicht fliegen konnte und von Truthahngröße war, die meiste Ähnlichkeit hat.

Die Familie der Tauben (*Columbidae*) ist scharf begrenzt durch die ausgezeichnete Bildung des Schnabels, welcher ziemlich lang und schwach ist, eine vordere Kuppe hat, dann abgeseigt und sich mit einer neuen kuppenförmigen Wölbung erhebt, die durch eine Knorpelschuppe bedingt ist, welche die Nasenlöcher bedeckt und selbst wieder von einer nackten, weichen, meist warzigen Haut überzogen wird. Die Flügel sind lang, spitzig und haben durchgreifend 10 Handschwingen und 11 bis 15 Armschwingen, während der Schwanz fast allgemein 12, sehr selten 16 Steuerfedern zeigt. Die Füße sind kurz, die Zehen lang, gänzlich gespalten, ohne Spannhaut, die Außenzehe zuweilen mit der mittlern an ihrer Wurzel verwachsen, die Hinterzehe lang, vollkommen ausgebildet, berührt mit der ganzen Unterfläche den Boden beim Austritt. Der Lauf ist nur selten gekrümmt oder mit neßförmiger Hornhaut begleitet, gewöhnlich finden sich deutliche schuppige Schilder auf der Vorderseite, die indessen nie zu förmlichen Stiefelblättern verschmelzen. Die Tauben leben bekanntlich in Monogamie, aber zugleich in größeren Gesellschaften, vorzugsweise in Wäldern,

wo sie ihre kunstlosen Nester auf Zweigen bauen. Einige Arten, die sich durch die Färbung ihrer Füße den Hühnervögeln nähern, sind oft die Tauben als besondere Gattung betrachtet worden, leben mehr auf der Erde und bauen Sträucher. Die meisten Arten legen auf einmal, brüten aber mehrmals, wozu welchem Geschäfte Männchen und Weibchen Theil nehmen. Fast alle fliegen äußerst geschickt und wandern zuweilen in ungeheurer Anzahl, doch nur auf beschränkte Entfernungen. Sie sind hauptsächlich von Sämereien und Früchten und füttern die anfangs blinden und hilflosen Jungen mit dem im Kropfe aufbereiteten Nahrungsmittel. Sie sind über die ganze Erde verbreitet, hühnerähnlichen Arten mehr in Südamerika.

Bei uns finden sich in der gemeinen Ringeltaube (*Palumbus*) die größte der einheimischen Tauben, die kleinere Holztaube (*Columba palumbus*, Taf. 8). Unsere Haustauben sind in eine große Anzahl von ordentlich vielen Varietäten stammesmäßig unterteilt, nachgewiesen hat, alle von der Felsentaube (*Columba livia*) ab, welche an steinigten, felsigen Orten siedelt und vom Norden Europas her heimisch ist. Sie wurde im Laufe der Jahrhunderte von Tausenden von Jahren gezüchtet und in unzähligen Varietäten sind schon in den ältesten Zeiten erwähnt. Bekannt ist auch die Wandertaube (*Ectopistes migratoria*), die in den Wäldungen in ungeheurer Anzahl vorkommt und die schönen, großen Kropf hat, aus Neuguinea, jetzt eine Zierde ist. Man kennt über 200 Arten von Tauben.

Unterklasse der Nestflüchter.

Die Jungen verlassen das Nest dem Ausfliegen und suchen ihre Nahrung allein.

Ordnung der Hühnervögel.

Meist schwere Vögel mit abgerundeten, kurzem Schnabel mit einem kuppenförmig abgesetzten Unterschnabel übergreifend. Zehen lang und stark, Nägel kräftig.

Die meisten großen und schweren Vögel bilden, besitzen einen starken Schnabel, der stets kürzer als der Kopf und die ganze Länge, bald nur vorn ist. Die Ränder und die Spitze des Schnabels über den Unterschnabel herüber, werden erstern wird meist noch dadurch verstärkt, daß die Nasenlöcher mit einer hornigen oder knorpeligen Schuppe überwölbt, theilweise bedeckt oder von einer Wachs- oder Hornhaut umgeben sind. Die Nasenlöcher sind verschoben gelegen, die Nasenknäuel und Fleischgewebe gebildet sind und mit Blut stark angefüllt. Die Flügel sind verhältnismäßig kurz, der Schwanz ist selten anhaltend, gewöhnlich sehr niedrig; das Gefieder ist straff, oft farbig und lebhaftem Metallglanze oder ungemein entwickelt und fähig, sich zusammenzufalten zu werden. Die Weibchen sind sehr stark und kräftig, zuweilen selbst bis zu den Zehen hin, stets finden sich drei kräftige Vorderfüße, meist platten Nägeln, die entweder

de durch eine kurze Haut verbunden sind; Bebe ist stets nach hinten gerichtet, meist ach und rudimentär und in ähnlicher Weise strecklaue mancher Säugethiere in einiger dem Boden angeheftet. Nur bei denjenigen, welche vorzugsweise gern auf Bäumen, seltener auf die Erde kommen, steht eine vierte Bebe im gleichen Niveau mit den Bei den Männchen der meisten Gattungen außerdem noch in einiger Höhe über dem stärker, oft sehr spitzer und scharfer Sporn nach innen und hinten gewendet ist und den vorzugsweise als Waffe dient. Die meisten der Ordnung halten sich stets auf der Erde, Heiden und in niedern Holzbeständen auf, kunstloses Nest gewöhnlich auf flacher Erde. Die Hahn hat eine größere Anzahl von m sich, welche einzig das Brutgeschäft voll- Die Jungen nähren sich anfangs mehr von und Wärmern, während sie später härtere n vorziehen, die meistens mit den starken us der Erde hervorgeharrt werden. Fast sind äußerst leicht zähmbaar und werden so wohl schmeckendes Fleisch als der Eier wegen als Hausgeflügel gezüchtet, während andere geschäftes Wild und noch andere Schmü- erer Hühnerhöfe und Thiergärten sind.

der Steppenhühner (Pteroclidia). Körper i, Schnabel kurz, schwach gekrümmt; Flügel hwanz lang, leifförmig; Beben kurz, Hinter- mentär. Leicht fliegende Steppenvögel, die aufen und zuweisen, wie die abgebildete Art enhuhn, *Syrhaptes paradoxus*, Taf. 15, bis nach Europa aus Asien herüberkommen. Arten in Afrika.

ie der Raufußhühner (Tetraonida). Körper schwer; Kopf klein, vollständig besiedet, mit ae zuweisen einer kleinen Stelle über dem Schnabel kurz, stark gekrümmt; Flügel kurz, ; Füße spornlos, meist bis zur Fußwurzel und zu den Beben besiedet; Hinterbeine schwach, höher gestellt als die andern. Scheue, gezähmte Vögel, die in Wäldern und Feldern leben, von einem alten Männchen geführt. st geschäft als Wildpret.

e der Waldhühner, mit kurzem, am Grunde Schnabel, die Nasenlöcher mit kleinen Federn t. Hierher unser Auerhahn, das Männchen (Auerhahn, *Tetrao urogallus*, Fig. 12), adchen (Auerhuhn, *Tetrao urogallus*,) braungelb gesprenkelt, in dichten Wäl- hrt sich von Beeren und Sprossen, balst hahre; der Virehahn (*Tetrao tetrax*,) oder Spielhahn, mit ausgedehntem Ga- iz, auf lichten Waldstellen und Heiden; selbuhn (*Bonasia sylvestris*, Taf. 16, auf buschigen Berggehängen; die Schnee- *Lagopus alpinus*, *scoticus*) im Norden und n Gebirgen über der Waldgrenze, im Winter edend. Gruppe der Feldhühner, mit nackter be, kurzem Schwanz, wozu unser graues Feld- lebuhn, *Perdix cinerea*, Taf. 15, Fig. 15) s rothe (*Perdix rubra*) im südlichen Europa, ern, nur ausnahmsweise im Walde, und die ren Schlag bekannte Wachtel (*Coturnix nis*, Fig. 11), die trotz ihres schlechten im Herbst über das Mittelmeer zieht und im r zu den Feldern zurückkehrt, wobei Millionen ren, besonders durch die Jagd in den Mittel- enen.

Familie der Hühner (Phasianida). Kopf und Wangen mit nackten Hautstellen, Fleischauswüchsen, Kammern, Federbüschen; Schnabel und Füße mittellang; Sporen an den Füßen des Männchens, das durch den Glanz und die Farbenpracht seines Gefieders und durch die Entwicklung der Schwanzfedern sich besonders auszeichnet. Das Magazin, aus welchem sich unsere Hühnerhöfe ergänzen. Unser Haushuhn mit seinen unendlichen, durch Züchtung hervorgebrachten Varietäten stammt wahrscheinlich von einer indischen Art (*Gallus bankiva*); der Truthahn von einer noch in Nordamerika wild in Wäldern lebenden Art (Truthahn, *Meleagris gallopavo*, Fig. 16). Hierher ferner die Fasanen (*Phasianus*) mit langem Schwanz, dessen Federn am Ende zugespitzt sind, der gemeine Fasan aus Kleasien stammend, der Goldfasan (*Thaumalea picta*, Fig. 17) aus dem nördlichen, der Silberfasan (*Gallophasianus nycthemerus*) aus dem südlichen China. Hierher ferner die Pfauen (*Pavo*) mit an der Spitze verbreiterten Federn des langen Schwanzes, der gespreizt wird; unser gewöhnlicher Pfau (*Pavo cristatus*), aus Indien, der Argusfasan (*Argus gigas*), aus Südamerika; dann die Perlhühner (Perlhuhn, *Numida meleagris*, Taf. 16, Fig. 1), alle aus Afrika, mit kurzem Schwanz und getupftem Gefieder.

Familie der Großfüßer (Megapodida). Beine hoch, mit großen, langen und starken Beben. Neuholländer. Sie legen sehr große Eier in Dünghaufen und lassen sie dort ausbrüten (*Talegalla*).

Familie der Hockhühner (Cracida). Große Hühner ohne Sporn, welche durch die Entwicklung eines einfachen, langen, ausstülpbaren Penis sich mehr den strauchartigen Vögeln nähern. Die etwa die Größe eines Truthahns erreichenden Vögel (Hock, *Crax alector*, Fig. 3) leben und nisten auf Bäumen und haben in Uebereinstimmung mit dieser Lebensart eine lange, starke Hinterbeine, die mit den Vorderbeinen in gleicher Höhe steht. Der Schnabel ist sehr stark, krumm gewölbt, mit scharfer Spitze; Augen gegen und Oberseite meist nackt und oft mit Federbüschen oder Auswüchsen geziert; der Sporn fehlt ihnen ganz allgemein; ihr Schwanz ist lang und abgerundet, die Flügel zum Unterschieben von den Riesenvögeln durchaus wohlgebildet und mit kräftigen Schwungfedern versehen. Die Familie ist nur auf Südamerika beschränkt. Derselbe Bildung der Begattungsorgane zeigen die südamerikanischen Steißhühner (*Crypturida*), langbalsige Thiere mit langem Schnabel, die den Kallen ähnlich sind und auf Heiden leben.

Ordnung der Laufvögel (*Brevipennes*).

Flügel verkümmert; Brustbein ohne Kamm; Gabelknochen rudimentär; starke, hohe Lauf- füße mit wenigen dicken Beben und platten Nägeln. Können nicht fliegen.

Der wesentlichste Charakter dieser Ordnung, welcher die größten Vögel angehört, besteht in der Verkümmern der Flügel, deren Knochen zwar nicht fehlen, aber entweder ganz unter dem übrigen Feder- leide versteckt oder mit fadenlosen Schwungfedern versehen sind, welche der Luft durchaus keinen Wider- stand leisten können. Die meist sehr großen Vögel sind deshalb gänzlich unfähig zu fliegen und einzig auf ihre Füße als Bewegungsorgane angewiesen. Ihre Knochen unterscheiden sich deshalb auch von denen der meisten übrigen Vögel durch den fast gänzlichen Mangel der Luftzellen, sowie ihr Brustbein in Uebereinstimmung mit der rudimentären Ausbildung der Flügelmuskeln eines Kammes gänzlich entbehrt

und nur eine breite, gewölbte Platte bildet. Der Schnabel der Laufvögel (Kopf des Straußes, *Struthio*, Taf. 16, Fig. 8) ist meist kurz, abgeplattet, dreieckig mit stumpfer Spitze, oder sehr lang und dünn; die Nasenlöcher in der Mitte oder ganz vorn an der Spitze desselben gelegen, Kopf und Hals gewöhnlich nackt oder mit kurzem Flaum bedeckt. Der Schwanz hat entweder gar keine Steuerfedern, oder nur einen Busch zerklüftener, mehr haarartiger Federn; die Füße sind lang, hoch, außerordentlich kräftig, die Schenkel dick, ihre Muskeln sehr stark, die Zehen kurz, breit, mit schwieliger Sohle (Fuß des Straußes, Fig. 9) und platten Nägeln versehen, die Hinterzehe fehlt entweder ganz oder zeigt nur einen ganz kleinen, unbedeutenden Stummel, bei den meisten sind drei, bei dem afrikanischen Strauß, dem größten Vogel überhaupt, nur zwei Zehen entwickelt. An dem Schädel bleiben die einzelnen Knochen lange getrennt; das unbeweglich verschmolzene Kreuzbein umfaßt eine sehr große Anzahl von Wirbeln und das Becken ist sehr verlängert. Der Urin wird gesondert abgelassen, nicht wie bei den andern Vögeln mit dem Kothe. Die Männchen haben entweder eine Ruthe, wie die Hottentotten, oder sogar, wie beim afrikanischen Strauß, einen Schwellkörper in derselben. Die Lebensart ist sehr verschieden.

Familie der Strauße (*Struthionida*). Der Kopf ist klein, der Hals sehr lang, die Beine sehr hoch. Der Kopf wenigstens, zuweilen auch der Hals, ist nackt oder mit kurzem Flaum bedeckt, die Ohröffnung steht vor. Laufvögel der Ebenen und Wästen, die in kleinen Trupps zusammenleben, ihre großen und schweren Eier in ein gemeinschaftliches Nest, meist nur eine Höhlung im Sande, legen und dasselbe so bebrüten, daß die Hennen bei Tage abwechseln, der Hahn aber bei Nacht brütet und das Nest verteidigt. Der afrikanische Strauß (*Struthio camelus*, Fig. 7) hat nur zwei Zehen, von welchen die innere die längste ist, breiten, platten Schnabel, besaumten Hals und eigenthümlich zerklüftene, lange weiche Federn an den rudimentären Flügeln und dem Schwanz. Er ist auf die Ebenen und Wästen Afrikas beschränkt, wird mit untergelegten Pferden müde gehetzt und der Federn wegen sehr auch am Cap gezüchtet. Der südamerikanische Strauß oder Randu (*Rhea americana*, Fig. 10), dem vorigen in allem andern ähnlich, aber mit drei Zehen und ohne die zerklüfteten Federn an Flügeln und Schwanz, weit kleiner, lebt in den Pampas Südamerikas durchaus so wie der Strauß. Eine dritte Gruppe, in Oceanien und Australien heimisch, hat ebenfalls drei Zehen, keinen Schwanz, aber einen seitlich etwas comprimierten Schnabel, im Flügel fünf steife fahnenlose Kiele und Federn mit einem langen Afterfahne und langer loser Fahne, die doppelt erscheinen und wie ein grobhaariges Wiesel über den Körper hängen. Hierher gehört der Emu aus Neuholland (*Dromaius Novae Hollandiae*), der äußerlich dem Randu sehr ähnlich sieht, und die Kasuare aus den Sunda-Inseln (Kopf des Kasuars, *Casuarus galeatus*, Fig. 5), mit nacktem Kopf und Hals, an dem Fleischlappen angebracht sind, und einem helmartigen Aufsatz auf dem Schnabel, der sich über den Kopf hinaufzieht.

Familie der Kiwi-Kiwi (*Apterygida*). Der ganze Körper dieser Vögel, von denen man jetzt drei Arten kennt, ist mit langen, haarartigen Federn bedeckt, ähnlich denjenigen des Kasuars (*Kiwi-Kiwi*, *Apteryx australis*, Fig. 11), welche die kurzen, stummelartigen Flügel gänzlich verstellen. Der Vogel hat einen langen,

runden, weichen Schnabel, aber an dessen vordern Ende die schließbaren Nasenlöcher stehen drei Vorderzehen und einer ringerichteten Hinterzehe. Der Größe eines Huhns erreicht Wäldern Neuseelands in der Nacht seiner aus Wärmern bei man jagt ihn bei Fackelschein nicht entgehen kann, da er leicht beifällt. Er legt nur ein heuer großes Ei, das etwa des ganzen Vogels beträgt.

Zu dieser Gruppe gehören Riesenvögel Neuseelands, von genannt (*Dinornis*).

Ordnung der Stelzvögel

Hals und Beine lang, meist nur bis zur Hälfte fiedert. Flügel gut entwickelt.

Im allgemeinen Habitus unterscheiden sich die Stelzvögel durch die kräftige, die meist einen raschen und falls aber sehr ausdauernden Vögel nehmen dabei eine eigene Stellung ein, sie den langen Hals nach hinten wagrecht ausstrecken, sehr verschiedene Formen, die der Kopf, selten abgeplattet, die Länge des Halses steht denjenigen der Beine; derselbe selten nackt, meist befiedert. Der Strauß an, ähnlich dem der Wälder, selten hellere Farben, wiegt, aber fast nie Metall, einzelne Arten mit schönen Zierfedern und ähnlicher unverbältnismäßig lang, bei grobem Netzwerk überzogen, Unterfahnen gewöhnlich zur Seite sich bei kürzeren Füßen manchen beuge, aber nicht darüber hinaus, meist sehr lang, gerade, dünn versehen, selten ringsum mit säumt, meist aber entweder äußern an ihrem Grunde mit samengeheftet. In der Enten herrscht eine sehr große Verschiedenheit, ganz fehlt, bald eine ziemlich, aber doch nur rudimentär Sporn trägt. Die meisten Vögel sich an flachen Ufern der Gemorastigen Gegenden auf, wo umherwaten und ihre aus Wasserthieren bestehende Nahrung die Gewohnheit, stundenlang eingezogenem Gasse still zu stehen sich in Gefahr, indem sie sich trauen, einige indeß sind auf fliegen nur selten, so daß man kann. Die meisten sind Strichvögel im Sommer an ihren nordischen im Winter aber in wärmeren leben meist paarweise, vereinigen größeren Gesellschaften. Nester an der Erde. Bei denjenigen Bäumen oder Häusern nisten (

noch lange im Neste und werden von den

der Hühnerstelzen (Mecrotoria). Schnabel
so lang als der Kopf, stark, kuppig ge-
baltiger, über den Unterschnabel herüber-
Kuppe, Flügel kurz; Schwanz verschieden;
das Aussehen von schweren Hühneradlern.
beiden sich aber dadurch, daß die Unter-
bis zur Hälfte unbefiedert sind. Die Läufe
und stark, die Beine ganz frei oder nur
e geheset, kräftig, lang, die Hinterzehe
g entwickelt und zuweilen mit einem schar-
versehen. Die meisten Vögel dieser Fa-
theils in Gehölzen, theils in trockenen,
enden vorzugsweise von Sämereien, weniger
en oder andern Thieren und sind äußerst
äuser, welche nur selten und schwerfällig
die Trappen repräsentiren die Familie in
Welt. Die große Trappe (Olis tarda), über
r hoch, der Körper von der Größe eines
die Zwergrappen (Olis tetrax, Taf. 16,
leben besonders im Südosten Europas in
nd Ebenen, halten sich truppweise, werden
n gejagt, früher mit Falken gebajzt, nähren
zweiße von Sämereien.

südamerikanische Gattungen werden ihres
regen gegähmt und den Hühnerheerden bei-
sche sie mit Schnabelheben und Schlägen
nten Flügel gegen Angriffe des Raubge-
sch zu vertheidigen wissen. Zu diesen Hirten-
vort der Agami (Psophia crepitans, Taf. 17,
nit kurzem, von den Federn überragtem
und eigenthümlich trompetender Stimme,
Anima (Palamedea cornuta, Fig. 2),
irrigem Auswuchs am Schnabelgrunde und
sen Sporen am Flügel. Ferner kann man
Ceriema (Nicholophus cristatus, Taf. 16,
rechnen, mit starkem, an der Spitze etwas
umtem Schnabel und einem Schoppe darauf,
er, den Boden nicht berührender Hinterzehe,
er, eigenthümlich gestalltem, kurzem Schna-
lungen Beinen ohne Hinterzehe versehenen
vögel (Chionis alba, Fig. 16) der süd-
lichen Küsten.

der Kraniche (Gruidae). Nestboder. Schnabel
3, um die Nasenlöcher verengt, oben einge-
nem Schädel abgesetzt, Hals und Flügel lang;
ngen und Dedn zuweilen zerklüftet, lang
gend, Läufe sehr lang; Schwanz kurz; Beine
erher der gewöhnliche Kranich, der hoch in
oft nur durch die Trompeterstimme bemerkt
frühjahr nach Norden, im Herbst nach Süden
siele prachtvolle, sehr große Arten, zum Theil
la und Südasiens, die eine Zierde unserer
ind, einige mit Federbüschen auf dem Kopfe
s Kranichs, Grus cinerea, Taf. 17, Fig. 5).
ie der Reiher (Ardeidae). Der Schnabel
vögel ist lang, hart, meist did und stark an
s, gewöhnlich kegelförmig zugespitzt, zuweilen
st abgeplattet, mehr oder minder lössel-
s sonst von selbstam abweichender Gestalt.
gend, Flügel, zuweilen der ganze Kopf und ein
s Halses nackt oder mit eigenthümlichen Federn
t. Der Hals ist lang, oft schlangenartig, ge-
dünn, zuweilen ziemlich verdickt, die Flügel
die Füße sehr hoch, dünn, felsenartig, die
be meist vorhanden, aber kurz, die Vorder-
urt, gewöhnlich mit breiter Bindhaut versehen.
stboder. Hierher die eigentlichen Reiher (Ar-
nit spitz kegelförmigem, scharfandigem Schnabel,

durchaus befiedertem Halse und meist verlängerten
Schopffedern im Nacken; arge Fiskräuter. Hierher
unser gemeiner Reiher (Kopf des Reiher, Ardea
cinerea, Fig. 7), der gemeinschaftlich auf hohen
Bäumen nistet; die schönen Silberreiher (Ardea
Egretta, garzetta), welche die prachtvollen weißen
Nigretten aus steifen, zerklüfften Federn an Kopf,
Brust und Rücken tragen; die dicken, plumpen Rohr-
dommeln (Botaurus stellaris, Fig. 6) mit ihrer
dröhnenden Stimme, vorzugsweise im Sumpfbrot;
die Nachtreiher (Nycticorax); ferner die Störche
(Ciconia) mit diderem, geradem Schnabel, geheseten
Beinen, ohne Schoppe und häufig mit nackten Stellen
an Kopf und Hals, besonders Frosch- und Reptilien-
vertilger; hierher unser Storch (Ciconia alba,
Fig. 9), und die scheußlichen Marabustörche mit
langem Kehlsack (Leptopilius), aber schön zerklüfften
Federn am Steiße; die als Reptilienvertilger in Aegypten
sogar göttlich verehrten Ibisarten (Ibis religiosa,
Fig. 11), mit dünnem, gekrümmtem Schnabel; die
Rohrreiher (Carcinoma), mit breitem, labnförmigem
Schnabel, worunter der gewaltige Rohrnschnabel (Ba-
laeniceps rex) am obern Nil; die Schattenreiher
(Schattenvogel, Scopus umbretta, Fig. 8),
von dunkler Farbe, mit hohem, gesteltem Schnabel;
die Löffelreiher (Platalea) mit plattem, vorn lössel-
artig ausgemeitem Schnabel; die schönen Sonnen-
reiher (Eurypyga helias, Fig. 4) aus Südamerika,
mit langem, schlankem, geradem Schnabel.

Familie der Strandläufer (Charadriidae). Der
Schnabel ist stets hart, mit festem Horne bekleidet,
meist ziemlich lang, dünn und gebogen oder gerade,
in andern Fällen aber auch kurz, kegelförmig und
auf der Spitze gekuppt. Die Beine der meisten
Gattungen sind äußerst lang, schwach, die Unter-
schenkel ihrem größten Theile nach nackt, nur bei
einigen kurzbeinigen Gattungen bis zur Fußenge ge-
fiedert; die Hinterzehe fehlt entweder ganz oder ist
nur durch einen unbedeutenden Anhang repräsentirt.
Die langen, dünnen Vorderbeine sind ganz frei oder
geheset, zuweilen auch durch eine Schwimmhaut mit
einander verbunden. Die Vögel dieser Familie leben
besonders gern an sandigen Ufern oder selbst in
trockenen Gegenden von Mollusken, Würmern und
Insekten.

Zu ihnen gehört unser auf Mooren nistender Ibis
(Kopf des Ibis, Vanellus cristatus, Taf. 16, Fig. 15),
dessen Eier so sehr geschäpft und überschäpft sind; die
Regenpfeifer (Charadrius), die durch ihr Pfeifen den
Regen ankündigen sollen, an unsern Küsten; die roth-
fäbigen und rothschnäbeligen Austernfischer (Haema-
topus ostralegus, Fig. 14), stets nach Nabrung am
Strande suchend; die Säbler (Kopf des Säblers,
Recurvirostra Avocatta, Taf. 17, Fig. 10), mit seinem,
nach oben gekrümmtem Schnabel u. s. w.

Familie der Schnepfen (Scolopacidae). Der
Schnabel ist oft sehr lang, stets dünn, weich, biegsam,
vollkommen gerade oder etwas nach oben oder unten
gekrümmt und meist an der Spitze etwas verdickt.
Dieser Endknopf ist ein sehr nervenreiches Tastwerk-
zeug, an den Seiten aber hart. Kopf rund, voll-
kommen befiedert, Hals kurz und did; Nasenlöcher
schmal, am Grunde des Schnabels. Füße kurz, dünn,
schwach, oft bis zur Beuge befiedert; Hinterzehe klein,
Vorderzehe lang. Die Thiere leben am Strande, an
Flussufern, auf feuchten Mooren und Waldlichtungen
und suchen, mit dem Schnabel im feuchten Boden
bohrend, Insektenlarven und Würmer. Meist vortref-
liches Fleisch.

Hierher die eigentlichen Schnepfen (Scolopax), mit

sehr langem, geradem Schnabel; Zugvögel, die im Frühjahr durchziehen, um im Norden zu brüten und im Herbst zurückzukehren; die große Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*, Taf. 16, Fig. 12), in Wäldern und feuchten Waldlichtungen; die Moorschnepfen oder Heerziegen (Kopf der Moorschnepfe, *Gallinago scolopacina*, Fig. 13), in Mooren, weit kleiner, mit miederer Stimme; an unsern Küsten, die im Gefieder außerordentlich wechselnden Kampfhähne (*Macchotes pugnax*), mit sträubbarer Federhülle um den Hals, die Männchen stets kämpfend, mit kürzern, geradem Schnabel; die Brachvögel (*Numenius*) mit nach unten, und die Lorfvögel (*Limosa*) mit nach oben gebogenem Schnabel.

Die Familie der Wasserhühner (*Macroductylia*) hat einen kurzen Schnabel, der nur selten länger als der Kopf ist, aber gewöhnlich die Form eines spitzen Keils besitzt, der stark von der Seite zusammengebrückt ist. An der Seite des Oberschnabels findet sich meist eine Längsrinne oder auch nur eine Vertiefung, in welcher die durchgehenden Nasenlöcher liegen. Der Hals ist verhältnismäßig kurz, dick, die Flügel nicht sehr entwickelt, die Beine kurz, aber dick und kräftig, und der Unterschenkel entweder ganz oder zum größten Theile befiedert, so daß der ganze Habitus des Vogels ziemlich dem eines Hühnervogels gleicht. Die Beine sind lang, kräftig, mit scharfen Nägeln versehen, die Hinterzehe gehörig ausgebildet und oft mit einem starken Sporn bewaffnet, der zuweilen selbst unverhältnismäßig lang und dünn ist. Der Flügel ist bei einigen Gattungen an der Arme mit einem starken spitzen Dorne bewaffnet, die Beine bei andern in ihrem ganzen Umfange mit Hautlappen gesäumt. Viele von ihnen leben wie Wasservögel, schwimmen und tauchen geschickt, andere laufen mit großer Geschwindigkeit über die Wasserpflanzen und schlaumigen Stellen. Leben von Würmern. Hierher die Wasserhühner (*Fulica atra*, Taf. 17, Fig. 18), mit Lappenzüßeln, schwimmen meist, fressen auch Pflanzen; die Leichbühner (*Gallinula*), mit schmalen gesäumten Beinen; die Sultanshühner (*Porphyrio*), schön gezeichnet; die gelbgrauen Rallen (*Rallus*), mit langem Schnabel, auf feuchten Wiesen (Ralle, *Rallus aquaticus*, Fig. 3); ebenfalls der Wachtelkönig oder Wiesen-schnarher (*Crex pratensis*), mit harter Stimme; in Guiana der Chirurg oder die Jassana (*Parra Jassana*, Taf. 15, Fig. 18), ausgezeichnet durch einen Sporn am Flügel und die ungeheuer langen und dünnen, mit geraden langen Nägeln versehenen Füße, mit denen er auf den Blättern der Victoria und anderer großer Wasserpflanzen umherläuft.

Ordnung der Schwimmvögel (Natatores).

Strassens, aus großer Würzeldrüse eingedicktes Federkleid, unter welchem dicke Dunen. Füße meist kurz, weit nach hinten gerückt. Beine gelappt oder durch Schwimmhäute verbunden.

Der Schnabel ist von sehr verschiedener Gestalt, bald breit und flach, bald hoch, schneidend und kurz, bald lang und spitz, meist sehr hart, zuweilen aber auch weich und häufig mit besondern Vorrichtungen zum Festhalten und Durchseihen der Nahrung versehen. Das Gefieder ist stets straff, bei den meisten enggeschlossen und so gut aus der großen Würzeldrüse eingedickt, daß das Wasser nicht darauf haftet. Die Flügel sehr verschieden ausgebildet: bald zu flachen, beschuppten Rudern umgestaltet; bald nur kurz und nur zu kurzem, schwerem Fluge dienend, in andern Fällen aber auf der höchsten Stufe der Ausbildung,

die kein Landvogel erreicht. gatten, Seeschwalben u. s. f. und ausdauernden Flieger. Die Zahl der Handflügel der Armschwinger ist weit kleiner als bei einer andern Ordnung, indem in der Regel etwa zwanzig bis zu vierzig finden. Der kurz, aber kräftig und hat in mehr Steuerfedern, deren anheben kann. Die meisten sind stets bis zur Fußwurzel, von den Beinen stets richtete vollständig ausgebildet bald gänzlich fehlt, bald nur kleinen Krallen bewaffneter selteneren Fällen wird die Hinterhand quer nach innen und Beine durch eine breite Schwimmhäute. Die drei Vorderbeine sind durch breite Schwimmhäute zuweilen sind diese Schwimmhäute in seltenen Ausnahmefällen durchaus frei, aber auf beinahe hundert Schwimmhäuten gänzlich bilden das hauptsächlichste Schwimm- und Tauchen nach hinten gerückt, je mehr und das Schwimmtauchen an Flossen nimmt auch der Körper freitragende Stellung an, wie Pinguinen der Fall ist, wo unter dem Hintertheile stehen kommen aufrecht getragen wie Wasservögeln, wo das Flugvermögen ist, der Körper beim Gehen wird. Alle Wasservögel schwimmen auf der Oberfläche des Wassers, als die Hälfte des Körpers gehalten wird; die meisten unmittelbar untertauchen und hinabrudern, wie denn z. B. die wöhnliche Nahrung, die aus mehreren hundert Faden bestehenden Gattungen mit ausgebildeten nur stoßend tauchen, indem sie seit aus bedeutender Höhe an die meisten Wasservögel leichten geübten Schwärmen am Meeresufer vor, an denen sie bauen. Einige höhnen sogar andere wissen ihr Nest so zu Wasserspiegel an Pflanzen fest zu machen, in denen sie Fleisches wegen, theils auch Federn willen gejagt oder ge-

Unterordnung der Schwimmvögel

Schnabel seitlich zusammengeklappt; Nasenlöcher oft beschuppt umgeben; Flügel la-chen durch Schwimmhäute klein oder fehlend.

Familie der Sturmvögel dem Schnabel sitzen die Nüstern umgeben, so daß die Schnabel etwas ähnlich ist; der Schnabel, comprimirt, häufig aber stielartig oder gar nicht ent-

aber zu kurzem Fluge dienend, in andern Fällen aber auf der höchsten Stufe der Ausbildung,

aber zu kurzem Fluge dienend, in andern Fällen aber auf der höchsten Stufe der Ausbildung,

en oder schwarzen Vögel fliegen äußerst ge- dem Meere zwischen den Wellenbergen hin und schnappen das dort Treibende auf. Lassen die blattartige Flüssigkeit aus dem Kropfe Hierher der Albatros oder das Kapschaf (Diomedea exulans, Taf. 18, Fig. 7), großschwan, weiß, in den südlichen Meeren; die turmbögel (Procellaria glacialis, Taf. 18, n den Nordmeeren; die kleinen Petersvögel (Larus), die noch kleinern Sturmtaucher (Mergulus), von kleinen Krustenthiere lebend. milie der Möven (Larida) gleicht durch die n und das Gefieder den Tauben oder den t, mit denen sie das außerordentlich ausge- ugsvermögen theilen. Der Schnabel ist ge- zusammengedrückt, bald lang, schmal und ald kürzer und an der Spitze kuppelförmig ur in Ausnahmefällen breiter oder auch mit Niederhaken versehen. Die Füße sind nur Schwimmfüße mit einer freien Hinterzehe, sie sich wesentlich von der vorigen Familie en; die Flügel sind lang, spitz, oft fächer- der Schwanz zuweilen schwalbenartig aus- . Alle Möven sind Stochaucher, ihr Flug schicht und zierlich, die meisten weiß mit gelblich-bräunlich (Heringsmöve, Larus Fig. 8), noch geschickter sind die klei- schmalen (Hauheeschwalbe, Sylochelidon Fig. 18), welche in der That wie Schwal- briswärmen. Einige von diesen Vögeln (Larus catarractes, Fig. 17), die (Hau- zestrir), leben selbst hauptsächlich davon, andere Stochaucher so lange verfolgen, bis erhaschte Beute fallen lassen, welche sie dann an Flüge wegschnappen, ehe sie noch den egel erreicht. Die Möven leben besonders en Meeren, kommen aber auch, besonders r, auf die süßen Gewässer der gemäßigten

Unterordnung der Ruderfüßler (Steganopoda).

Die Hinterzehe des Fußes ist nach vorn und mit den andern Zehen durch Schwimm- vunden (Fuß des Pelikans, Pelecanus, Fig. 1). Sind Nesthoder.

der Scharben (Carbonida). Schnabel von der Seite zusammengedrückt, bald gestreckt, vordern haben. Flügel lang. Bei vielen Flugvermögen nicht weniger ausgebildet als vorigen. Alles arge Fischräuber, die zum trefflich tauchen. Hierher der Tropikvogel (Larus, Fig. 19), aus den südlichen der ebenso wie die Fregatte (Tachy- nia, Fig. 3) den Schiffen schon auf von Meilen in offener See, hoch wie end, entgegenkommt; die Scharben (Phala- Carbo, Fig. 4), von verschiedener Größe, schwarz, zu Hunderten auf den Felsen schen Meere, die Flügel in der Sonne die weißen Adelpel (Sula alba, Fig. 2), Nordmeeren mit Geräusch in das Wasser um nach einem Fische zu tauchen; der enhalß (Plutus Levaillant, Fig. 5), aus sa, an den großen Flüssen auf Beute

der Pelikane (Pelecanida). Große, schwere n heller Farbe, mit langem Halse, kleinem sehr langem, schwachem Schnabel. Der bel ist gerade, dünn, mit kuppiger Gelen-

spitze und langer Nasenfurche; der Untertiefer, weit gespalten, trägt einen langen und weiten Hautfack (Kopf des Pelikans, Pelecanus onocrotalus, Taf. 17, Fig. 22), in welchem der Vogel die gefangenen Fische birgt. Sie leben zu Tausenden besonders in den Mittelmeergegenden an Seen und Lagunen und stellen förmliche Treibjagden auf die Fische an. Werden wie die Scharben zum Fischfang benutzt, indem man ihnen einen Ring um den Hals legt.

Unterordnung der Zahnschnäbler (Lamellirostres).

Der weichhäutige Schnabel ist an dem Rande mit quer vorspringenden Hornplättchen besetzt, die Zähnelungen am Rande der fleischigen Zunge entsprechen. Nestflüchter.

Familie der Flamingos (Phoenicopterida). Hals und Beine lang, wie bei den Stelzvögeln, und letztere auch ebenso besetzt. Dagegen ist der Kopf (Kopf des Flamingo, Phoenicopterus, Taf. 17, Fig. 13) der eines entenartigen Vogels, in der Mitte gekniet, breit, flach, mit dichten, niedrigen Lamellen besetzt, die Zunge am Rande gezahnt und die Füße (Fuß des Flamingo, Fig. 14) echte Schwimmfüße mit vollkommener Schwimmhaut und unvollständiger Hinterzehe. Die schöne mittelländische Art (Phoenicopterus ruber) gründelt in seichten Gewässern in der Stellung, welche dem Skelet gegeben wurde (Fig. 12) und läßt so den Schlamm durch den Schnabel laufen.

Die Familie der Enten (Anatida) enthält eine große Anzahl lebhaft gefärbter Arten mit didem, breitem und flachem Schnabel, der vorn kuppelförmig herabgebogen ist und auf den Seiten von einer weichen, empfindlichen Haut bedeckt wird, welche vorstehende quere Falten oder Faden zeigt und wie es scheint wesentlich zum Durchtauchen des Schlammes dient, in welchem die Enten vorzugsweise ihre aus Wärmern und Mollusken wie aus faulenden Stoffen bestehende Nahrung suchen. Das Gefieder der Entenvögel ist weich, flaumig, von einigen, wie von der Eiderente, außerordentlich geschäft, die Flügel mittelmäßig groß und durch die starken fleissen Schwungfedern zum Fluge äußerst geschickt. Die wilden Enten und Gänse sind äußerst schlaue, vorsichtige und scheue Vögel, von denen die meisten Arten süße Gewässer vorziehen, die leicht genug sind, um gründeln zu können, eine eigenthümliche Art des Tauchens, wobei die Thiere mit senkrecht nach unten gestelltem Leibe den Grund mit dem Schnabel durchsuchen, während sie den Bürgel über die Wasseroberfläche erheben. Die Füße der Enten haben drei lange, durch ganze Schwimmhaut verbundene Zehen und eine rudimentäre Hinterzehe, die bald ganz nackt, bald häutig gekäumt ist. Hierher die Gruppen der Schwäne (Cygnus) mit sehr langem Schlangenhalse und bis an das Auge reichender Wachshaut des Schnabels. Die abgebildete Art (Häderschwan, Cygnus olor, Fig. 15) wild im Norden von Europa; der eigentlichen Enten mit kürzerem Hals, überall verbreitet; von der Wild- oder Stodente (Wildente, Anas boschas, Fig. 16) stammt unsere Hausente ab; der Tauchenten mit besäumter Hinterzehe, wohin die im Norden halb gekäumte Eiderente (Somateria mollissima, Fig. 17) gehört, welche die geschäftigsten Duen liefert, die sie sich selbst ausrupft, um das Nest auszufüttern; die kleinen Schmudenten u. s. w.

Familie der Sägetaucher (Mergida). Sonst wie Enten, aber der Schnabel (Kopf des Zwergsäger, Mergus albellus, Fig. 20) lang, seitlich zusammengedrückt, schmal, mit starker Kuppe und säge-

artigen Zähnelungen. Die Füße (Fuß des Zwerger, Fig. 21) ganz wie Enten. Der große Sägetaucher (Mergus merganser, Fig. 19) von der Größe einer Gans, mit leicht rötlich-gelber Tinte der weißen Brust, wie die andern Arten auf den süßen Gewässern bei uns. Fleisch zanjig.

Unterordnung der Taucher (Urinatores).

Schnabel seitlich zusammengedrückt, hart, spitz und scharf; Flügel kurz, fischelförmig, zuweilen gar nicht befiedert; Beine sehr weit nach hinten gestellt, sodas der Körper aufrecht getragen wird. Legen oft nur ein Ei. Nisten meist in Erdschötern. Nesthoder.

Familie der Stoßtaucher (Colymbida). Schnabel lang, gerade, kantig und spitz. Kopf rundlich, oft mit Federbüschen und Halsstrahlen geziert; Hals lang und dünn; Flug schnell, aber ungeschickt; Füße mit kleiner, gesäumter Hinterzehe und die Vorderzehe entweder mit Schwimmbaut verbunden oder mit breiten Schwimmlappen säumt; Gefieder oft seidenglänzend. Sie leben paarweise, nicht in Scharen, hauptsächlich auf süßen Gewässern im Norden, schwimmen und tauchen äußerst geschickt nach Fischen und machen trotz ihrer kurzen Flügel weite Reisen gen Süden, wenn die nördlichen Gewässer zufrieren. Hierher der Haubensteiße (Podiceps cristatus, Taf. 18, Fig. 10), mit Halskrause und Ohrbüscheln, dessen Brust ein sehr geschätztes silberglänzendes Pelzwerk liefert.

Familie der Alten (Alcida). Tauchvögel, deren Flügel zwar sehr kurz, aber nur selten zum Fliegen untauglich sind und meist Federbelleidung und, wenn auch kleine, Schwungfedern zeigen; die Füße stehen ebenso wie bei den Pinguinen sehr stark nach hinten, doch nicht ganz so weit, und der Körper wird in etwas schiefer Stellung getragen. Die Schwimmlüfte sind ganz; die vierte Zehe fehlt durchaus; der Schnabel ist kurz, seitlich zusammengedrückt, sehr schneidend und scharf. Alle diese Vögel leben in großen Scharen in den nördlichen Polarländern, auf sogenannten Vogelbergen, meist fentrecht Klippen, in welche sie die Nesthöler eingraben, werden ungeheuer fett und deshal und ihrer Eier und Dunen wegen verfolgt. Hierher die Alle (Alca) mit hohem, gefurctem, vorn kuppig abgobogenem Schnabel; der Fockball (Alca torda, Fig. 11) kann noch fliegen; der seit 1842 ausgeforbene Riesenfalk (Plautus impennis, Fig. 12), der früher über das ganze Nordmeer verbreitet war, nicht; die kleinen Krabbentaucher (Mergulus alle, Fig. 13), mit kurzem, didem Schnabel, von Krustenthieren lebend; die Larventaucher (Mormon fratercula, Fig. 14) oder Seepapagen, mit sonderbar hohem, gefurctem Schnabel; die Lumen (Uria troile, Fig. 15), mit langem, spitzem Schnabel in vielen Arten.

Familie der Pinguine (Aptenodytida) entsprechen in den südlichen kalten Meeren den Alten der Nordmeere. Der Körper dieser seltsamen Vögel erscheint meistens fast cylindrisch, der Hals ziemlich dünn, der Kopf klein, der Schnabel lang, scharf kantig, seitlich zusammengedrückt, vorn gebogen und seine scharfe Spitze meist durch eine Furche von den Seitentheilen abgeschieden. Der Federpelz ist sehr dicht, glatt anliegend, straff, die Füße sehr kurz, ganz nach hinten gestellt, sodas der Körper vollkommen aufrecht getragen wird; die kleine rudimentäre Hinterzehe ist frei und nach vorn gebogen, die übrigen drei Zehen, die lang und dick sind, bis an die Krallen durch Schwimmbaut verbunden. Am ausgezeichnetsten ist die Bildung der Flügel, die einen langen, fast säbel-

förmigen Lappen darstellen, welcher auf der Seite des Leibes herabhängt und mit jeder kurzen Federchen bedekt ist, die wie Schuppen liegen. Die zum Fliegen vollkommen untauglichen bewohnen vorzugsweise die kalten Küsten der See, wo sie sich in Scharen finden und gen Norden Reihen aufrecht am Ufer stehen, in welchen sie sich zugleich auf die Fußwurzel stützen; zuweilen und tauchen sehr geschickt und die Weibchen Eier zwischen den Schenkeln aus, nehmen auch wol bei Gefahr in dieser Lagerung auf der Schwimmen mit sich fort. Die Flügel des Ruder. Die abgebildete Art (Riesenfalk, tenodytes patagonica, Fig. 16) wird manchmal

Kaltblüter.

Lungen- und Körperkreislauf unvollständig.

Klasse der Schleiher (Reptilia).

(Tafel 19 und 20).

Vorkammern des Herzens vollständig getrennt. Haut mern unvollständig getrennt. Haut Schuppen oder Knochen Schildern. Hinterhaupt mit einfachem Gelenk. Ausströmische Lungenathmung, Riemen. Kein Zwerchfell. Meist eier-

Der ganze Körper erscheint langgestreckt, vollkommen fußlos, wie bei den Schlangen, bald mit kurzen Füßen versehen, die gewöhnlich untauglich den Leib vollkommen zu tragen. In der That bei den Eidechsen, bei welchen die Füße meistens entwidelt sind, die ganze Unterseite des pers fast beständig auf der Erde hin und die Beine sind so sehr seitlich gestellt, das sie mehr nach außen gerichtete Hebel zum Fortschreiten schlangenartig sich windenden Körpers, den Stützen desselben wirken können. Bei einer Ordnung der Reptilien, bei den Schildkröten, im Gegenfaze zu den Schlangen, Eidechsen und Kröten die Dreiecksdimension des Körpers mehr hervor, dieser in Form einer platten Scheibe erscheint, weil sie eine fast runde Gestalt hat. Bei den Reptilien ohne Ausnahme ist der Schwanz bedeutend widelt, bei vielen sogar übertrifft er weit die Länge des Körpers, während dagegen der Hals ganz fehlt oder nur kurz ist und höchstens in den Schildkröten eine bedeutende Beweglichkeit erhält.

Die Hautbedeckungen sind nach verschiedenen Typen gestaltet. Bei einigen Familien der Eidechsen und zwar namentlich bei den Skinken kommt eine wahre Schuppen, ähnlich denen der Fische vor, die Knochenblättchen, die eine Hornschicht als Unterlage haben, einander dachziegelförmig decken und in Zwischen den verdünnten Hautgebilde eingeschlossen sind. Bei den übrigen Eidechsen und Schlangen findet man zwar auch von Schuppen, darf indes unter diesen Ausdrücke nicht dieselbe Bildung verstehen. Die Haut sondert sich hier deutlich in zwei Schichten, die in Falten gebildete Lederhaut und die einem erdigen, Firnis ähnliche Oberhaut, welche von Zeit zu Zeit im ganzen abgestreift wird. Die Lederhaut bildet nun bald einfache körnige Erhabenheiten, bald Schuppen, bald auch nach hinten freie Erhebungen von schuppenähnlicher Gestalt, über welche die Oberhaut sich eng anliegend wegzieht und mit dünnem Einsenkungen in die Falten der Wangen und Erhebungen sich einbiegt. In diesen Erhebungen entstehen bei den Kröten echte Knochenhöler, die in die Lederhaut selbst eingesenkt sind, deren Fäden sich in die

Wöcher der Knochenschilder fortsetzen; bei rötten ver wachsen diese Knochenproductionen sogar sehr frühzeitig mit denjenigen des n Rücken- und Bauchschilde, während die uf diesem Schilde sich stark hornig verbirbt Schildplatt bildet. Besondere Drüsen der ren häufig vor, wenn auch nur auf einzelne schränkt; so findet sich bei den Schild- rseits eine kleine Drüse unmittelbar unter schilde, die sich gewöhnlich in dem seitlichen außen öffnet. Bei den Krokodilen liegen moschusartigen Geruch verbreitende Drüsen streut in der Haut und am Unterkiefer, und eisten Eidechsen kommt eine Querreihe solcher, welche quer über das Deckschild des Afters ft, an der Innenseite des Schenkels gegen hinab sich erstreckt und unter dem Namen kelporen bekannt ist.

Skelet der Reptilien zeigt stets in seinen n Theilen eine vollständige Verknöcherung. vonalen Formen, die Wirbelsäule wie der ürkschädel, sind bei den erwachsenen Thieren verschwunden und kommen nur noch bei yo in frühester Zeit der Skelettbildung vor. umensetzung der einzelnen Theile des Skelets essen sehr bei den verschiedenen Ordnungen, schwierig hält, ein allgemeines Bild zu

hüdel der Reptilien zeigt gewöhnlich eine : minder abgeplattete Gestalt und ein be- Ueberwiegen der Kiefergrüste und der Ge- en gegen die nur kleine Schädelkapsel. Das tsbein ist immer vollständig in Wirbelform : und zerfällt in den unpaaren Körper, die Schuppe und die beiden gewöhnlich stark in e verlängerten Seitentheile; es trägt stets : einzigen, gewöhnlich stark vortretenden, ge- Gelenkspitz, der in die Pfanne des ersten paßt, und unterscheidet sich durch diesen durc- : Charakter, sowie durch die starke Aus- : der Schuppe wesentlich von dem Hinterhaupts- : Furche, die unter allen Umständen doppelte : fe besitzt. Zuweilen freilich erscheint der : aus zwei Hälften zusammengesetzt, die durch : ale Furche eingeschnitten sind, wie bei den : en; bei den meisten andern aber zeigt er : rund in Knospenform. Nach vorn zu wird : elbasis vor dem Hinterhauptskörper durch : ein vervollständigt, welches gewöhnlich nur : ale Platte bildet und bei den Krokodilen und : ten gewöhnlich gänzlich unsichtbar ist, indem : Gaumengewölbe sich in der Mittellinie zu- : hließt und die nach hinten sich fortsetzenden : ge zwischen Keilbein nach oben und Gaumen- : unten eingeschlossen sind. Die ursprüngliche : nage des Embryo, welche bei allen höhern : ieren vorhanden, bei den niederen aber niemals : ist, bringt es mit sich, daß auf der Ober- : Keilbeins ein förmlicher Türkensattel zur : ung des Hirnanhangs ausgebildet ist. Seit- : gel kommen nur selten bei dem Keilbeine : Beweis, daß die seitlichen Schädelballen bei : ten Gattungen nicht verknöchern; dagegen be- : Keilbeinkörper selbst bei denjenigen Arten, w : Gaumengewölbe beweglich bleibt, wie namentlich : Schlangen und Eidechsen, starke Fortsätze, an : ie Flügelbeine eingelenkt sind. Die obere Be- : des Gehirns wird fast nur von den Scheitel- : gebildet, die gewöhnlich zu einer einzigen un- : knochenplatte verschmolzen, seltener paarig sind.

Oft bildet dieses Scheitelbein einen hohen Knochen- lamm, und stets finden sich in ihm beiderseits tiefe Gruben, die Schlafenrücken, deren Lagerung und Ausdehnung besonders für die Bestimmung der fossilen Gattungen von Wichtigkeit ist. Bei den Schlangen greift das Scheitelbein gürtelartig nach unten herum, setzt sich auf den Keilbeinkörper fest und bildet so die seitlichen Wandungen der Schädelkapsel, die durch das Felsenbein vervollständigt werden. Nach vorn schließt sich an das Scheitelbein das bald paarige, bald un- paare Stirnbein an, welches die Augenhöhlen deckt und von dem Gehirn abschließt. Die Nasenbeine, welche nur selten fehlen, bilden nach vorn die äußerste Spitze des unbeweglichen, knöchernen Schädelbogens und bedecken meist besondere Muschelbeine, welche in den Knorpeln der Nasenhöhle entwickelt sind. Die Seitentheile des Schädels werden in der Augengegend vervollständigt durch vordere und hintere Stirnbeine, sowie oft noch durch ein eigenes Thränenbein, welches in der innern Ecke der Augenhöhle liegt. Die Augen- höhle selbst wird gewöhnlich nach außen vollständig durch den Bogen des Jochbeins geschlossen, der freilich den Schlangen und einigen Eidechsen fehlt und bei andern nur unvollständig vorhanden ist. Die Schuppe des Schlafenbeins nimmt ebenfalls gewöhnlich an der Bildung dieses Bogens in seinem hintern Theile Antheil und trägt zugleich zur Befestigung ober Einlenkung des Unterkieferbogens bei. Die übrigen Theile des Schlafenbeins zeigen sehr verschiedene Beziehungen zu dem Schädel, indem sie bald unbeweglich durch Knochennähte verbunden, bald durch mehr oder minder lose Gelenke angeheftet sind und so in die Bildung des Unterkieferbogens mit eingehen, der durch diese bewegliche Verlängerung das Maul einer bedeutenden Erweiterung fähig macht. So ist das Jigenbein bei den Krokodilen und Schildkröten mit dem Schädel an seinem äußern Rande verwachsen, bei den meisten Eidechsen rubimentär, bei den meisten Schlangen da- gegen in Form einer langen Knochenleiste ausgebildet, welche durch Sehnenfäden halb beweglich mit dem Schädel verbunden ist. So bildet das Quadratbein, welches unter allen Umständen den Gelenkfortsatz trägt, auf dem der Unterkiefer spielt, bei den Schlangen einen langen stiel förmigen, frei beweglichen Knochen, während es bei den Eidechsen weit kürzer ist, nur ge- ringe Beweglichkeit hat und bei den Krokodilen und Schildkröten durchaus fest mit dem Schädel ver- bunden ist.

Der Kiefergaumenapparat zeigt denselben Wechsel in der Befestigung. Bei den Schlangen ist er in allen seinen Theilen beweglich und überall durch lose Gelenkverbindungen mit dem festen Schädel ver- bunden, während bei den Krokodilen und Schildkröten alle Theile desselben unbeweglich mit dem Schädel verbunden sind und nur der Unterkiefer ein Gelenk besitzt. So ist der Zwischentiefer, der bald einfach, bald paarig erscheint, bei den Schlangen durch ein Gelenk mit den Nasenbeinen und der Flügelbeine ver- bunden, während er bei allen übrigen zwischen die Oberkiefer eingelenkt ist, und gleicherweise sind die bei den Schlangen bald längern, bald verkürzten Ober- kieferbeine hier mit dem vordern Stirnbeine einge- lenkt, während sie bei den übrigen fest mit dem Schädel verbunden sind. Die Gaumenbeine bilden jederseits knochenplatten, welche den Boden der Augenhöhle und das Gaumengewölbe selbst mehr oder minder vervoll- ständigen; auch sie sind bei den Schlangen beweglich, bei allen übrigen fest. Die Flügelbeine sind meistens beweglich, berühren sich aber in der Mitte durch Naht bei den Krokodilen und Schildkröten und enthalten

hier die hintern Nasengänge, welche hinter ihnen in den Rachen münden; sie sind durch das Querbein, welches nur den Schildkröten fehlt, einerseits mit dem Oberkiefer, andererseits mit dem Gaumenbeine verbunden und stellen so eine feste Stütze für das Quadratbein und für das Unterkiefergelenk her. Die beiden Aeste des Unterkiefers selbst sind bei den Schlangen nur durch Sehnen und gekreuzte Muskeln miteinander verbunden, sodas sie nach Willkür einander genähert oder auch weit entfernt werden können. Bei den Eidechsen geschieht die Verbindung durch Faserknorpel, bei den Krokodilen durch eine Naht, die oft eine bedeutende Ausdehnung hat, sodas zum Beispiel der lange Schnabel der Gaviale von den in der Mittellinie verbundenen Unterkieferhälften gebildet wird, und bei den Schildkröten endlich sind beide Hälften so sehr zu einem einzigen Stücke verwachsen, das man auch bei sehr jungen Individuen keine Spur einer ursprünglichen Trennung mehr bemerkt. Jede Unterkieferhälfte ist wenigstens aus vier Stücken, wie bei den Grubenottern, bei den andern Schlangen aus fünf, bei den Eidechsen und Krokodilen sogar aus sechs Stücken zusammengesetzt.

Die Bewaffnung des Mundes ist bei den Reptilien äußerst verschieden. Eine ganze Ordnung, diejenige der Schildkröten, besitzt gar keine Zähne, sondern lediglich scharfe Hornleisten, welche die schneidenden Kieferränder überziehen und so einen Schnabel bilden, der indeß keine verächtliche Waffe ist. Alle übrigen haben Zähne, die alle mehr oder minder dem Typus der einfachen Fangzähne sich nähern und bald nur in den Kieferknochen, bald auch auf sämtlichen Gaumenbeinen und auf dem Flügelharbeine angebracht sind. Die Hakenform ist durchaus die gewöhnliche, zuweilen aber sind auch die Zähne seitlich zusammengedrückt und ihre Kronen gerelert oder gezähnel, in andern Fällen gestreift, was zuweilen nur auf einer Cannelirung des Schmelzes, in andern Fällen auch auf einer Faltung der Zahnschubstanz selbst beruht. Mit Ausnahme dieser nie sehr complicirten Faltungen sind alle Zähne der Reptilien sehr einfach gebaut und zeigen nur eine mittlere Zahnhöhle, welche der äußern Contour des Zahnes entspricht, dessen Spitze mit einer Schmelzlappe bedeckt ist. Hinsichtlich der Anheftung kann man verschiedene Modificationen unterscheiden, die auf den Ersatz der Zähne von Einfluß sind. Meistens findet sich in dem zahntragenden Knochen eine leichte Zahnrinne, in welcher die Zähne durch verdicktes flehniges Zahnfleisch eingebettet sind. Die äußere Leiste dieser Zahnrinne erhebt sich höher als die innere und die Zähne wachsen dann mit ihrem äußern Rande an diese erhabene Leiste an, während sie oft noch an der Basis durch lücherne Sodel gestützt werden, in welche die Blutgefäße eindringen. Die Ersatzzähne entstehen dann meist auf der Seite der alten Zähne und verdrängen diese, indem sie sich nach und nach auf den Sodel aufsetzen. Im Gegensatz zu der beschriebenen Zahnanheftung, die bei den Pleurodonten vorkommt, stehen die Acrodonen, bei welchen die Zähne so auf den Kieferrand aufgesetzt und mit demselben verwachsen sind, das sie nur gleichsam einen emailirten Kamm desselben bilden. Bei den Krokodilen endlich stehen die tegelförmigen Fangzähne in ringsum geschlossenen Zahnhöhlen eingeteilt, wie bei dem Menschen, und werden auf die Weise ersetzt, das der junge Zahn von unten her in die Höhle des alten eindringt und diesen gleichsam aus der Zahnhöhle hinausstößt, sodas er ihm eine Zeit lang wie eine Kappe aufsteht.

Die Wirbelsäule ist bei allen Reptilien stets ver-

lindert und in Wirbel abgetheilte Grade der Entwicklung. Krokodilen ist bald die vorhergehende, bald die nachfolgende, bei den Schildkröten sind die nachfolgenden durch dazwischenliegende Zwischenwirbel mit den vorhergehenden verbunden; bei den Schlangen hingegen quert conver, und bei den Schlangen endlich bilden die Körper eines kugelförmigen Gelenks, die Pannae des nächsten Wirbels, die zum Unterschiede von den vorhergehenden nicht erweitert, und bei den Schlangen beweglich, sodas sie hier die Verbindung zwischen sich meist bis zum Beden festhalten, bei den Eidechsen gewöhnlich mit den vorhergehenden verbunden, das bei der Halsfreie Rippen trägt, bis zum Beden zieht. Bei den Schildkröten bilden die Rippen größtentheils das hintere Ende der Wirbelsäule, die übrigen Fortsätze der Wirbelsäule sind aber, auf deren hier nicht eingehen können.

Was die Extremitäten anbelangt, so sind bei den meisten Schlangen durch die tragenden Gürtel, und nur die Hinterextremitäten kurze Stummel stabförmigen Knöchelchen getrennt, kaum mit den gewöhnlichen Gliedmaßen in Parallele bringen kann. Bei den Eidechsen sind alle möglichen Stufen der Entwicklung aus rudimentären Vorder- und Hinterextremitäten vollständig ausgebildeten Extremitäten zu sehen, welche an den Füßen mit Nägeln bewaffnet sind. Gewöhnlich sind die Glieder meist fünf von verschieden, auf demselben Plane, der Chamaeleons eine Ausnahme, die Glieder so gegeneinander so merzange gebildet wird. Bei den Schlangen durch Schwimmhäute miteinander verbunden, die Glieder bieten die Schildkröten die Knochen der einzelnen Glieder sind, diese aber bald durch Sehnen und Knorpel verbunden, bald auch durch Sehnen und Knorpel verbunden.

Das Centralnervensystem in vieler Beziehung demjenigen der Säuger, scheidet sich aber von demselben durch die Bildung des kleinen Gehirns, an durch die Eidechsen und bei den Krokodilen ihre Klasse erreicht, indem hier das kleine Gehirn werden und außerdem eine Mittelhirnblase. Das Mittelhirn sinkt mehr zu einem bedeutend überwogen von den Seitenhirnen, welche eine beträchtliche Mittelhirntheilweise bilden, zeigen sich im allgemeinen deutlich, während der sympathische Nervengang ausgebildet ist und eine innige Verbindung mit dem Centralnervensystem sowie des Gehirns mit den selbstständigen Zungen.

Die Nasenhöhlen der Reptilien sind knorpelige Nasenmuskeln gestützt, stehen in den Rachen, bald ganz weit nach hinten, wie bei den Säugern, ist diese hinten Oeffnungen von den Nasenhöhlen häufig sind auch an der

richtungen angebracht, durch welche die-
m Untertauchen vollständig geschlossen werden

ugen sind gewöhnlich klein, zuweilen gänzlich
: Haut geborgen; die Augenlidbildungen oft
rakteristisch für verschiedene Familien und

Am einfachsten ist diese Bildung bei den
n, wo alle Augenlider fehlen und die Schichten
t, da wo sie über den Augapfel weggehen,
ig werden, sich wölben und eine Kapfel bilden,
ie ein Uhrglas in den umgebenden Falz der
gechliffen ist und so den beweglichen Apfel
n schützt. Die Thränenflüssigkeit fällt den

wischen dieser Kapfel und dem Augapfel aus
st durch einen weiten Kanal an dem innern
mel in die Nasenhöhle ab. Das obere Augen-
ei allen übrigen Reptilien meist nur sehr wenig
et und besteht gewöhnlich nur in einer steifen,
rpeligen Hautfalte, während das untere weit
und beweglicher ist, den ganzen Augapfel über-

ann, oft von einem besondern Knochenblättchen
ist und in andern Fällen dem Sehlöche gegen-
ie durchsichtig gefärbte Stelle, einer Vornette
besitzt. Bei den meisten Eidechsen, den Schild-
und Krokodilen tritt hierzu noch die Nidhaut,
nfallt eine Knorpelplatte enthält und von dem
Augenwinkel her mehr oder minder weit, zu-

ganz vollständig über das Auge herübergezogen
kann. Ihre Existenz ist stets mit derjenigen
besonderu gelappten Drüse, der Harder'schen
verbunden. Vollkommen isolirt stehen die Cha-
s, bei welchen ein kreisförmiges, dem groben
uollenen Augapfel eng anliegendes Augenlid

, welches nur eine schmale Spalte offen läßt,
mern Theile des Auges unterscheiden sich wenig
men der höhern Thiere, und nur bei den Eidechsen
ein innerer faltloser Vorsprung der Aderhaut
er sich an die Vinsinapfel ansetzt und dem Kamm
begelagtes entspricht

u Gehörorgan wird die Schnecke mehr und
rwaht, indem sie bald einen rundlichen, häutigen
t, wie bei den Schildkröten, bald einen kurzen
al mit einer unvollständigen Spiralscheidewand
einem kassettensörmigen Anhang darstellt. Hin-

ich des mittlern Ohres oder der Paukenhöhle
den vielfache Verschiedenheiten; bei den Schlangen
sie durchaus, es ist kein Trommelfell und keine
schliche Trompete vorhanden und die Oeffnung
knöchernen Labyrinthes, das ovale Fenster, durch
stabsförmigen, frei vorstehenden Knochen, die Co-

lla, verschlossen. Bei allen übrigen Ordnungen
t sich eine Paukenhöhle, die durch eine kurze und
Trompete in den Rachen mündet und nach außen
ein Trommelfell geschlossen ist, welches bald frei

, bald durch eine Hautfalte verdeckt, bald gänzlich
Haut überzogen ist. Zwischen dem Trommelfelle
dem ovalen Fenster ist die Verbindung durch die
sehr lange Columella hergestellt, an welche sich
ellen noch andere Knöchelchen anschließen, sodas

förmliche Kette gebildet wird. Bei den Krokodilen
ich findet sich die erste Andeutung eines äußern
es in Form einer beweglichen Klappe, welche das
mmelfell deden kann.

Die Verdauungsorgane zeigen, wie schon aus
früher beschriebenen mannichfaltigen Bewaffnung
Rachens hervorgeht, vielfache Verschiedenheiten.
alle Reptilien sind auf Raub angewiesen und nur
ge wenige Schildkröten nähren sich von Pflanz-

jen, alle übrigen einig von lebenden Thieren,
sich sie ganz verschlucken, da ihre Zähne nur zum

Verwunden und Festhalten, nicht aber zum Zerstückeln
geeignet sind. Die Zunge bildet bei den Krokodilen
nur einen vorspringenden flachen Wulst auf dem
Boden der Mundhöhle, der überall angewachsen und

vollkommen unbeweglich ist, sodas man früher oft be-
hauptete, die Krokodile besäßen gar keine Zunge. Bei
den Schildkröten ist sie stark fleischig, kurz und did,
oft mit Fotten bedekt. Bei den Eidechsen gewöhnlich

oval, platt und sehr verschieden in der Beschaffenheit
ihres Ueberzugs; sie zeigt hier eine unverkennbare
Tendenz zur Zweitheilung, die von der Spitze aus
nach hinten fortschreitet und endlich bei den wahren

Eidechsen und den Schlangen den höchsten Grad er-
reicht, indem hier die Zunge in zwei lange saden-
förmige Spitzen ausgezogen ist, welche mit horniger
Haut überzogen sind, in eine eigene Scheide zurück-

gezogen werden können und als Lastwerkzeuge dienen.
Der Schlund ist meistens in Uebereinstimmung mit
der Ernährungsweise sehr weit längsgestaltet oder auch
mit langen Fotten besetzt und einer ungeheuern Aus-
dehnung fähig, sodas namentlich die weitmäuligen

Schlangen Thiere verschlucken können, die ihnen an
Umfang überlegen sind. Sehr oft geht die Speise-
röhre unmittelbar in den weiten Magen über, der ge-
wöhnlich durch eine Falte oder Klappe gegen den
Darm hin abgegrenzt ist. Der Darm ist meist weit,

wenig gewunden, kurz, der Afterdarm oft durch einen
Blindsack und eine starke, erweiterte Kloake ausge-
zeichnet. Leber, Bauchspeicheldrüse und Milz sind stets
vorhanden, erstere zuweilen in mehrfache Lappen ge-
trennt und in ihrer Gestalt von derjenigen des Körpers

abhängig.
Die Athemorgane sind stets nur in Form von
Lungen entwickelt, und wie schon früher angeführt wurde,
unterscheiden sich die Reptilien sowie alle andern

höhern Wirbeltiere hauptsächlich dadurch von den
niedern, das zu keiner Zeit ihres Lebens, selbst im
Embryonalzustande nicht, wirklich athmende Kiemen
vorkommen. Ein gesonderter Kehlkopf tritt deutlich

hervor, die Stimmrinne ist spaltenförmig und bei einigen
Eidechsen sind sogar vollständig spannbare Stimm-
bänder ausgebildet. Die Grenze zwischen Luftröhre
und deren Aesten, sowie den Lungen selbst, ist oft
sehr schwierig zu bestimmen, da die Knorpelringe,

welche erstere umgeben, zuweilen sich weit in die
Lunge hinein fortsetzen und andererseits die Zellen,
welche die Lungen auszeichnen, oft über einen großen
Theil der Luftröhre sich hinziehen und hier sogar tiefer
und ausgebildeter sind als in den eigentlichen Lungen.

Gewöhnlich sind zwei sadartige Lungen vorhanden,
welche durch die ganze Bauchhöhle sich erstrecken und
auf ihrer innern Fläche zellige Vorsprünge der Schleim-

haut besitzen, die bald einfach sind, bald sich mehr
compliciren und dann einem schwammigen, von Hohlräumen durchzogenen Gewebe ähnlich werden. Zu-

weilen fehlen diese Zellen in der hintern Abtheilung
der Lunge, die dann als ein wenig gefäßreicher Luft-

sack sich darstellt und wahrscheinlich als Reservoir
dient. Bei den Schlangen und schlangenähnlichen

Eidechsen sind die Lungen ausnahmsweise nicht von
gleicher Größe, sondern nur die eine entwickelt, die

andere aber rudimentär oder selbst gar nicht vor-

handen.
Das Herz aller Reptilien besteht aus vier Abthei-

lungen, zwei vollständig geschiedenen Vorhöfen, deren
Trennung auch äußerlich sichtbar ist, und zwei Kam-

mern, deren Scheidewand indessen erst bei den Krokodi-

len vollständig wird, während bei allen übrigen

mehr oder minder große Lücken in denselben vor-

kommen, durch welche das Blut aus der linken Kam-

mer in die rechte übergeführt wird. Bei den Schildkröten, den Schlangen und den meisten Eidechsen, wo die Scheidewand unvollständig ist, entspringen deshalb sowohl die Lungen- als auch die Körpergefäße aus der rechten Herzkammer, während bei den Krokodilen die Lungenarterie und eine linke Aorta aus der rechten Kammer, die größere rechte Aorta dagegen aus der linken Kammer entspringt. Wenn nun auch durch besondere Klappenvorrichtungen im Innern des Herzens das aus dem Körper zurückkehrende Blut, auch bei unvollständiger Scheidewand, hauptsächlich nach der Lungenarterie, das aus den Lungen kommende wesentlich nach den Aorten hingeleitet wird, so ist doch auf der andern Seite sowohl hier wie bei den Krokodilen die Mischung der beiden Blutarten wieder dadurch ermöglicht, daß von den ursprünglichen Kiemenbogen des Embryo stammende weite Verbindungsäste zwischen den großen Gefäßstämmen hergestellt sind. Die Aorta wird meist aus einem, zwei oder selbst drei Bogen zusammengelegt, die sich unter der Wirbelsäule vereinigen und vorher oft noch die Kopfgefäße abgeben. In dem venösen Kreislauf ist stets außer dem Pfortadersysteme der Leber auch noch ein solches für die Nieren eingeschoben. Das Lymphsystem ist außerordentlich entwickelt und läßt außer großen Cisternen, die gewöhnlich in der Umgegend des Magens entwickelt sind, noch besondere rhythmisch-pulsirende Lymphherzen gewahren, von welchen stets zwei in der Lendengegend unmittelbar unter der Haut oder tiefer nach innen dem Kreuzbeine aufliegen und ihren Inhalt in die zunächst gelegenen Venen abtreiben.

Die Nieren sind gewöhnlich sehr groß, oft vielfach gelappt, zuweilen in der Mitte miteinander verschmolzen. Die von ihnen ausgehenden Harnleiter münden gewöhnlich neben den Leittapparaten der Geschlechtstheile in die hintere Wand der Kloake ein, welcher gegenüber sich bei den Eidechsen und Schildkröten eine Harnblase findet.

Die Hoden der Reptilien liegen stets im Innern der Bauchhöhle zu beiden Seiten der Wirbelsäule, und ihre Ausführungsgänge sammeln sich gewöhnlich in einem Nebenhoden, aus welchem dann die Samenleiter nach unten laufen, um in der hintern Wand der Kloake sehr nahe an der Afterspalte sich in dieselbe auszumünden. Begattungsorgane kommen bei allen Reptilien in sehr ausgebildetem Grade, und zwar nach zwei durchaus verschiedenen Typen entwickelt vor. Alle Schlangen und Eidechsen haben nämlich zwei paarige Begattungsorgane, welche in der Wurzel des Schwanzes verborgen liegen und denen zwei rudimentäre Analoga bei den Weibchen entsprechen. Jede dieser Ruthe besteht aus einem mit Zotten oder selbst Stacheln und Haaren ausgekleideten Hautschlauche, der wie ein Handschuhfinger an dem After hervorgestülpt werden kann, sodas die innere Fläche zur äußern wird. An die Spitze jedes Schlauchs, die oft gabelförmig getheilt ist, setzt sich ein Muskel an, der ihn in ähnlicher Weise wie das Fühlhorn einer Schnecke zurückziehen kann. Eine ganz entgegengesetzte Bildung findet bei den Schildkröten und den Krokodilen statt, die sich außerdem auch noch durch die Längsrichtung der Afterspalte von den Eidechsen und Schlangen unterscheiden, bei welchen der After immer eine quere Spalte bildet. Bei jenen Ordnungen ist die Ruthe einfach, an der Vorderwand der Kloake befestigt und mit erectilem Gewebe versehen aber undurchbohrt; auf der äußern Fläche zeigt sich eine Längsrinne zur Fortleitung der Samenflüssigkeit. Die Eierstöcke bilden bald Schläuche, bald Platten und sind stets vollkommen von den Eileitern geschieden, die eine gefrauste, trichter-

förmige Oeffnung in der Bauchhöhle gegen das Ende hin, wo sie in etwas erweitert sind. Die Eier des im wesentlichen denen der Vögel großen, meist gelben, sehr dicken, einer mehr oder minder bedeutend weiß umgeben und in einer ledersehr elastischen Schale eingeschlossenen Fasern dieser Schale wird oft trotz aber stets nur in geringer Menge Entwickelung der Eier beginnt im des mütterlichen Organismus, im weiteren Stelle des Eileiters längs. Bei einigen Arten geschieht dies bis zu dem Ende des Embryonalen. Die Zunge noch in dem Eileiter die und mithin lebendig geboren wird. wie unsere gewöhnlichen Rattern, dazu bringen, die Eier bis zur Bildung der Jungen zu behalten die Gelegenheit benimmt, sie anzulegen. Die meisten Reptilien im Sande oder in feuchter Erde sich selbst. Die Krokodile und man in der Nähe wachen und nach Menagerien wideln sich die groß über ihren Eiern kegelförmig zusammen sich förmlich aus.

Viele Reptilien, wie die meisten Seeschlangen, sind vermöge der Bewegungswerkzeuge lediglich auf wiesen und verlassen dasselbe nur dem festen Lande abzulegen. Es den Schildkröten bekannt, daß ihnen zum allgemeinen Nahrungszweck das Einsammeln der Millionen im Erwerbszweig für die Anwohner. Andere, worunter namentlich viele sich gern an feuchten Orten und Wassers auf, oder lauern auch in ihre Beute. Die meisten Eidechsen hingegen ziehen trockenes Land und Erdschnecken und jagen theils auf auch auf den Bäumen. Die klein sich vorzugsweise von Insekten, giftige Raubthiere sind und den Menschen anfallen. Man in Amerika die Beobachtung gemacht Art von Krokodilen, die in den großen Lagunen wimmeln, in dem unschädlich ist, ja sogar den Menschen in dem andern ihn mit Hartnäckigkeit verfolgt. Die Reptilien sind vorzugsweise heißer Länder. Die Zahl ihrer vielfältig ihrer Formen sowie die nimmt mit schnellen Schritten zu, dem Äquator nähert. Die Krokodile die heiße Zone eingeschränkt; Verbreitungsbezirk ist auf unserm Continente amerikanischen Florida und Schildkröten geht nur eine Art, die Schildkröte, bis zu den Ufern des während sonst das Mittelmeer der steht. Am weitesten nach Norden Schlangen und schlangenhähnliche Eidechsen, welche bis nach Südamerika ausdehnen. Die letzteren Arten Eidechsen sind lediglich auf die beschränkt.

Wir zerfallen die Klasse der Schlangen

vier Ordnungen, von welchen freilich die näher zusammengehörenden, sodaß die Unterordnung der andern Unterklasse gleich:

Die Panzer Schleier haben Knochenhaut, die entweder isolirt bleiben oder, ein Skelet mehr oder minder zusammenhängend wirklichen Panzer bilden; sie besitzen, in der Kloake verborgene männliche runde oder längsgefiederte Afteröffnung: den Schildkröten und Krotobilen gebildet; der Schuppenschleier hat Schuppenartige Tafeln, eine doppelte, außer der Ruhe und eine quergespaltene After-

unterklasse der Panzer Schleier.

g der Schildkröten (Chelonia). und Brustpanzer, aus Inöchernen, bedekten, durch Naht verbundenen (sammengesetzt, in welchen Theile es (Kopf, Schwanz und Füße) ganz weise zurückgezogen werden können; tiefer, mit Hornscheiden bekleidet. it, mehr oder minder abgeplattet (Skelet röte, Taf. 19, Fig. 1: a Schulterblatt; n; c Unterarm; d Oberarm; e Rückenwir- g Beden; h Unterschenkel; i Oberschenkel). der Schildkröten ist im allgemeinen oval, abgestuht, die Kiefer sehr kurz, hoch, it scharfem, schneidendem Rande versehen nplatten überkleidet. Die Schädelknochen aneinander und bilden ein breites Dach ltkommen geschlossenen Augenhöhlen, in wolausgebildete, mit Augenlidern ver- n befinden. Die Zunge ist fleischig, kurz, dbar, aber vollkommen beweglich; der kurz und dick, die einzelnen Wirbel des ommen frei beweglich und ohne ausge- äge. An der Rückenwirbelsäule zeichnen s die breiten plattenförmigen Rippen aus, lang und breit werden, durch jauchte Räte der verbinden und so einen einzigen breiten ellen, der den ganzen Rücken deckt und noch mit besondern Hornstücken belegt ist. die Rippen in gleicher Breite bis zu dem e des Schildes fort, zuweilen aber sind nur in der Nähe der Wirbelsäule ent- nach außen hin stehen dann die Rippen ie Radialpeichen an dem Skelet hervor, dem lebenden Thiere ihre Zwischenräume Haut- und Hornschilder gedeckt sind; ge- set sich an dem Rückenschild ein Saum nochenplatten, Randstücke, in welche die pent eingesetzt sind, sodaß auch bei speichen- jerten Rippen ein ganzer Rand hergestellt ishneider Weise wie auf dem Rücken wird chseite ein Knochenschild hergestellt, welches ermäßig verbreiterten, in Stücke zerfallenen ebildet wird und gewöhnlich an den Seiten Rückenschilder durch Räte sich verbindet, Schilder eine Kapsel bilden, die nur vorn zum Durchlassen des Kopfes, der Füße chwanzes geöffnet ist. Auf der äußeren Rücken- und Bauchschild beide mit Horn- edt, welche aneinanderstoßende Schilder aus denen bei einigen Arten das bekannte jetwonnen wird. Diese Schilder entsprechen btheilung niemals den Abtheilungen der

Rippen und der Knochenstücke des Brustbeins und lassen meistens auf dem Rücken eine mittlere Reihe, die Rückenschilder, zwei Reihen von Seitenschildern und einen Kranz von Randchildern unterscheiden, welche letztere den ganzen Panzer umgeben. Die Lagerung dieser Hornstücken und ihr Verhältniß zu einander erscheint immer von Wichtigkeit für die Untercheidung der verschiedenen Gattungen und Arten. Die sämtlichen Organe des Körpers sowie auch namentlich der Schulter- und Bedengürtel sind innerhalb des Schildes angebracht und letztere unbeweglich an die innere Fläche des Rückenschildes angeheftet. Alle Schildkröten haben vier Füße, die stets nur kurz und stummelförmig sind, in ihrer Ausbildung aber bei den verschiedenen Familien sehr wesentliche Verschiedenheiten zeigen. Der Schwanz ist gewöhnlich nur kurz, rundlich, zugespitzt, die an seiner Basis gelegene Oeffnung der Kloake von einem Längsschilde gebildet, in ähnlicher Weise wie bei den Krotobilen, und die Männchen ebenso mit einer einfachen Ruthe versehen. Im allgemeinen träge, sind doch viele in ihrem Elemente, dem Wasser, äußerst flink und gewandte Schwimmer. Die meisten leben von Pflanzenstoffen, einige sind Raubthiere und sogar von Badenden gefürchtet.

Familie der Land Schildkröten (Chersida). Zehen unbeweglich zu einem säulenartigen Fuße verwachsen, an dem nur die stumpfen Nägel hervorstecken, Rücken- und Brustschild fest verwachsen und mit Hornschildern bedeckt; ersteres hoch gewölbt, letzteres zuweilen in der Mitte mit einem queren Gelenke, sodaß bald die vordere, bald die hintere Hälfte beweglich ist. Kiefer mit schneidenden Hornrändern; ganz in den Panzer zurückziehbar. Der Kopf so, daß der Hals eine S-förmige Krümmung zur Seite macht. Hierher die der griechischen Schildkröte nahe verwandte Art (Land Schildkröte, Testudo mauritanica, Taf. 19, Fig. 2) aus dem nördlichen Afrika, mit schöner Randzeichnung.

Familie der Sumpfschildkröten (Emyda). Vorderfüße meist mit fünf, Hinterfüße mit fünf scharftralligen Zehen, an den ersten frei, an den letztern durch Schwimmhaut verbunden. Brustschild aus zwei oder drei Stücken, mehr oder minder beweglich. Schneiden der Hornschnabel. Kopf und die Halshaut mit S-förmiger Krümmung von oben nach unten, wie in eine Scheide zurückziehbar. Rückenschild flach. Hierher unsere über ganz Mittel-Europa bis an die Ostsee verbreitete Sumpfschildkröte (Emys europaea, Fig. 3), schwarz mit gelben Punkten; die Schnapp- schildkröte (Chelydra serpentina, Fig. 4), mit langem, gekieltem Schwanz, in den Gewässern des westlichen Nordamerica; die Matamata (Chelys sim-briata, Fig. 5) mit sonderbaren Hautanhängeln, verlängerter Nase und weicher Haut auf dem Schnabel, in Cayenne zu Hause.

Familie der Flußschildkröten (Potamida). Rücken- und Bauchschild unvollständig verknöchert, mit Lederhaut überzogen und gesäumt, ohne Hornplatten. Kopf und Füße nicht zurückziehbar. Weiche Rippen über dem scharfen Schnabel, die Nase rüsselförmig verlängert; Füße mit drei Krallen, die über die breiten Schwimmhäute hervorstehen. Fischfresser, die den langen Hals blitzschnell vorstrecken und den Badenden große Stücke Fleisch aus dem Körper reißen. In den großen Flüssen der warmen Zone der Alten und Neuen Welt. Die abgebildete Art (Bissige Schildkröte, Trionyx ferox, Fig. 6) im Mississippi.

Familie der Seeschildkröten (Chelonida). Kopf und Gliedmaßen nicht rückziehbar, letztere zu breiten Flossen umgewandelt, in welchen die Zehen von Faser-

zwei kleine, seitliche Gruppen an dem umengetwölbe; dagegen ist die Form, die und die Erneuerung der Zähne bei den mannichfaltiger als bei den Schlangen. freilich sind die Zähne mehr oder minder spitz, häufig nach hinten gebogen, oft aber auch mehr oder minder schneidend, seltig über dem Zahnfleisch herausstehende Zahnstange und in anderer Weise geformt, zuweilen mehrspitzig, flache, meißel- oder säge- te vor. Hinsichtlich der Befestigung finden wichtige Unterschiede. Niemals trifft man Alveolen und Zähne, welche in denselben stecken, dagegen bildet sich oft in beiden eine zusammenhängende Zahnrinne aus, ußen hin von einem Knochenblatte gestützt, der Kiefer an seinem obern Rande aus- heint; in dieser Rinne nun liegen die Zähne so, daß sie mit der hohlen Wurzel auf dem Kiefer aufliegen, wo sich zuweilen noch be- deckte Sockel für sie zeigen, und daß sie außen an dem Knochenblatte ange- setzt, welches die äußere Wand der Zahnrinne an hat die Eidechsen, welche diese Zahn- rinnen, mit dem Namen der Seitenzähner (lateralia) besetzt. Bei andern Gattungen zeigt keine solche Zahnrinne, und die im Zahn- bilden die Zähne wachsen unmittelbar auf dem Rande auf, oft in solcher Weise, daß mit Mühe die Grenze zwischen dem Zahne und dem Kiefer selbst an seinem Rande scharf- geschnitten und emailirt wäre. Die solche Zähne tragenden Eidechsen hat man dem gemeinsamen Namen der Acrodonten

mannichfaltig; gewöhnlich zeigt sie sich in ähnlicher Weise beschuppt, wie bei den Schlangen, indem die Lederhaut Erhöhungen und Duplikaturen bildet, welche von der stellenweise verdickten Oberhaut, die ein zusammenhängendes Ganzes bildet, überzogen werden. Auf diese Weise entsteht die scheinbare Schuppen- bekleidung, welche den Körper der meisten Eidechsen be- deckt; oft, wie bei den Chamäleon und den Gekko, legen sich indeß diese Erhöhungen der Haut nicht dachziegelförmig übereinander, sondern bilden nur einzelne aneinandergereihte förmige oder warzenförmige Erhöhungen. In andern Fällen rücken diese Er- höhungen so aneinander, daß sie Tafeln bilden, die nur durch neßförmige vertiefte Linien voneinander getrennt sind; oft wachsen sie aber auch aus und bilden lang gestirnte, mehr oder minder steife Stacheln, die in Linien oder Wirbeln gestellt sind, oder ver- längern sich auch zu oft seltsam ausgezackten Haut- lappen und Rämmen. Auf dem Kopfe finden sich meist größere Schilde, auch auf dem Bauche.

Hinsichtlich der Füße herrscht eine große Mannich- faltigkeit. Bei den meisten finden sich vier wohlau- gebildete, mit fünf bekrallten freien Zehen versehene Füße, an denen gewöhnlich die vierte Zehe die längste ist und die nur bei dem Chamäleon den Körper schwebend tragen. Sie dienen stets nur als Geh- und Kletterwerkzeuge, niemals zum Halten der Beute. Von diesen Füßen aus finden sich aber alle erdlichen Uebergänge; vier kleine, rudimentäre Füßchen, fast ohne Bedeutung für die Locomotion; zwei stummel- artige Vorberfüße oder plattenförmige Hinterfüße ohne äußere Zehenbedeutung, und endlich Schlangengestalt ohne irgendwelche Andeutung äußerer Füße. Aber auch in diesem letztern Falle finden sich stets unter der Haut im Fleische versteckt Andeutungen der Vorder- extremitäten mit Schultergürtel und Brustbein, welche den Schlangen unter allen Umständen fehlen, so daß also hier ein wichtiger Unterschied gegeben ist. Der Schwanz ist von sehr verschiedener Länge, gewöhnlich aber mindestens ebenso lang als der Körper, und oft mit ausgezeichneten, stacheligen Wirbelschuppen bedeckt.

Die meisten Eidechsen sind Bewohner südlicher und tropischer Gegenden, wo sie sich entweder auf der Erde, oder auf Bäumen und Gesträuchen kletternd umhertreiben, Insekten, kleine Säugethiere und Vögel im Sprunge fassen. Die größten Arten erreichen höchstens eine Länge von 4—6 Fuß, und keine einzige wird dem Menschen gefährlich. Manche größere Gattungen werden sogar ihres zarten Fleisches willen als Wild gejagt. In den gemäßigten Zonen ver- fallen sie in Winterschlaf und werden bei kältern Wetter sehr träge und langsam, während sie bei leb- hafterm Sonnenschein außerordentlich agil und munter werden und sogar sich insofern zähmen lassen, daß sie auf bekannte Zeichen aus ihren Schlupfwinkeln her- vorkommen und das ihnen bestimmte Futter in Em- pfang nehmen.

Gruppe der Spaltzüngler (Fissilingua).

Zunge lang, vorn in zwei dünne, hornige Spitzen ausgezogen, in eine Scheide zurückziehbar. Voll- kommene Augenlider. Freies Paukenfell. Schwanz lang mit Wirbelschuppen.

Familie der Araneidechsen (Monitores). Große Eidechsen der Alten Welt, deren Herz durch die fast vollständige Kammercheidwand sich am meisten dem der Krottille nähert, mit beschupptem Kopf, ange- wachsenen Zähnen, ohne Gaumenzähne und Schenkel- poren. Die abgebildete Art (Varanus niloticus, Taf. 19, Fig. 15) lebt an den Ufern des Nils, soll

Bestimmung der lebenden Gattungen hat na der Zunge eine ganz besondere Be- deutung. Bei den einen ist dieses Organ dünn, sehr narbig und vorn in zwei längere Spitzen, die fadenförmig auslaufen; diese einer jungen ganz ähnliche Spaltzunge, um deren auch diese Eidechsen die Spaltzüngler (guia) genannt hat, ist in einer eigenen Kieferhöhle eingeschlossen und kann auch bei ge- öffneter Kiefer durch einen vordern Ausschnitt der- selben hervorgestreckt werden. Bei einer Gruppe, welche man Kurzzüngler (Bre- via) genannt hat, ist die Zunge dick fleischig, an der Mundhöhle festgewachsen, aber nach hinten beweglich, ohne besondere Hautscheide bei geöffnetem Maule zwischen den Kiefern. Bei den einen ist diese fleischige Zunge rundet oder nur unmerklich ausgebüchelt, aber verdrängt sie sich nach vorn ziemlich und läuft dann oft in zwei kurze, faden- spitzige aus oder zeigt auch nur einen mehr oder tiefen, halbmondförmigen Ausschnitt. Die eigenthümliche Bildung zeigt das Cha- rakteristische der Gruppe. Auf dessen Beschreibung wir verweisen.

Die meisten Eidechsen schließen sich vor den Schlangen Entzogen von zwei häutigen Augenlidern aus, oben und unten her den Augenapfel bedecken nur bei einigen wenigen Gattungen zeigt sich Bildung der Augenbedeckung ähnlich derjenigen der Schlangen. Die äußere Öffnung ist nicht wie bei den Schlangen mit der äußeren Schuppenhaut bedeckt, sondern meistens frei, und zeigt das in ihnen ausgepannte dünne Paukenfell nackt liegend. Die Bildung der äußern Haut ist

vor der Annäherung der Krokodile durch lautes Fischen warnen, frisst übrigens gern die Eier des Krokodils, und wird bis 6 Fuß lang.

Familie der Teju-Schlangen (Ameivida) entspricht in der Neuen Welt den Monitoren. Sie haben Schenkelporen und schief nach außen gerichtete solide Zähne und Schilder auf dem Kopf. Die abgebildete Art (Teju, *Podinema Teguxin*, Taf. 20, Fig. 2) gilt in Brasilien, wo sie in Erbschächern lebt, für einen Liederbissen.

Familie der Echten (Lacertida). Zähne angewachsen, am Grunde hohl, Schenkelporen. Schilder auf dem Kopfe. Hierher unsere gewöhnliche graue Zauneidechse (*Lacerta agilis*, Taf. 19, Fig. 16), die schlante grüne Eidechse, die in den Mittelmeergegenden häufige, größere, aber kürzere Echte mit blauen Augenflecken (*Lacerta ocellata*), die lebendig gebärende kleine Mauereidechse (*Zootoca vivipara*) u. s. w.

Gruppe der Dickzungler (Crassilingua).

Zunge dick, fleischig, kaum ausstreckbar, an der Spitze abgerundet. Baufell fein.

Familie der Agamen (Agamida). Leib dick, oft flach. Beine kurz. Haut oft bestachel. Schwanz meist kurz, mit Wirtelschuppen. Leben auf der Erde, besonders in sandigen Gegenden. Die der Neuen Welt sind Pleurodonten, die der Alten Welt Acrodonen. Dieselbe Gruppierung findet sich auch bei der folgenden Familie. Der *Harbun* aus Nordafrika und Arabien (*Stellio vulgaris*, Taf. 20, Fig. 1) war früher officinell, seine Excremente wurden als Schminke benutzt.

Familie der Leguane (Iguanida). Leib schlant, häufig höchst sonderbare Kämme, Kehlsäcke und Anhängen. Beine lang, dünn, Schwanz lang. Leben auf Bäumen. In der Alten Welt der fliegende Drache (*Draco volitans*), kleine Thierchen, deren fleischig hervorstehende dünne Rippen, durch eine dünne Haut verbunden, einen Fallschirm bilden. In der Neuen Welt die Leguane (*Iguana*), pflanzenfressend, als Wildpret geschätzt; die mit sonderbaren Kammern versehenen Basilisken (*Haubenbasilisk*, *Basiliscus mitratus*, Fig. 4), Insektenfresser.

Familie der Gekkos (Ascalabotida). Plump Thiere mit flachem Kopf, höckeriger oder warziger Haut, pleurodonten Zähnen, ohne Augenlider. An den verbreiterten Beinen aus hornigen Stachelplatten gebildete Haftorgane, mittels deren sie wie Fliegen an den Wänden umherklettern können. Nächtliche Thiere, sehr nützlich durch ihre Insektenjagd, aber fälschlich für giftig gehalten. In den Mittelmeergegenden eine Art, viele in den Tropenländern beider Hemisphären. Die abgebildete Art (*Gattengedo*, *Ptychozoon homalcephalum*, Fig. 3), ausgezeichnet durch ihre Hautlappen, auf den Sunda-Inseln.

Gruppe der Wurmzüngler (Vermilingua).

Wurmförmige, weit vorschnellbare Zunge.

Enthält die einzige Familie der Chamäleoniden (Chamaeleonida). Die plumpen, kleinen Eidechsen, welche der einzigen Gattung angehören, die diese Familie bildet, haben einen breiten edigen Kopf, der meist höher als lang ist und nach hinten in einen stumpfen Kamm ausläuft, der den Nacken überragt; die Mundspalte ist sehr groß, die Kiefer mit angewachsenen Zähnen bewaffnet; das Baufell gänzlich unter der Haut verborgen (Chamäleon, *Chamaeleo vulgaris*, Taf. 20, Fig. 5). Das Auge ist bedeutend, vollkommen kreisförmig, vorgequollen und durch ein

einziges, etwas warziges Augenlid bedeckt, welches nur der Pupille gegenüber eine runde Oeffnung zeigt. Der Hals ist ausnehmend kurz und eigentlich nur eine tiefe Falte hinter dem jochartigen Kopfe, die an der Unterseite durch die getriebene Kette verwirrt wird. Der Körper ist sehr zusammengedrückt, höher als dick, der Kopf meist mit einem vorspringenden Kamm besetzt, der sich über den Schwanz fortsetzt. Dieser ist von mäßiger Länge, deutlich abgesetzt, kräftig, in der gewöhnlich spiralförmig gebogen, ein förmliches und Wideschwanz, der dem Thiere beim Klettern und Wachsen der Zweige dient. Die Beine sind meist länger und höher als bei irgendeiner andern Eidechse, endigen in fünf Zehen, die aber gegeneinander abstehen und so miteinander verwachsen sind, daß der Fuß eine zweifelhafte Klammergange darstellt, bestehend aus drei, das andere zwei zehnmäßigen. Diese Ausbildung der Füße zu Klammern, welche Analogie mit den Füßen der Klettervögel zeigt, ist in Uebereinstimmung mit der Lebensart, indem die Chamäleoniden stets nur auf Bäumen und Gesträuch in den Zweigen umherklettern, um dort ihre kleinen Insekten bestechende Nahrung zu suchen.

Höchst eigenthümlich ist der Bau der Haut, welcher von alters her bekannte Farbenwechsel begünstigt liegt. Es zeigen sich auf der Oberseite dieser Haut weber Schuppen, noch Tafeln, nur größere und kleinere Körner, jedoch ihr Ansehen mit demjenigen des Hagrin Ähnlichkeit hat. Unter der durchscheinenden Oberhaut befindet sich eine entwickelte Lage weicher Würzchen, welche verschiedene Farben tragen und je nach dem Zustande des Thiers sich stärker aufrichten und ausdehnen; der Farbenwechsel wird demnach vorzüglich durch das Zurücktreten des Blutes in diese Hautwürzchen bedingt, und in der That kann man durch Reizung oder Erstickung des Thiers seine Farbe von einem einfachen Gelben durch grünlische, gelbe und schmutzig rothe Töne bis zu einem gesättigten, schmutzigen Schwarz steigern, welches fast schwarz erscheint.

Träge Thierchen der Alten Welt, welche auf den Sträuchern Insekten beschleichen und, in deren Klettergängen, plötzlich eine colubriforme Zunge von beträchtlicher Länge hervorwerfen, welche an ihrem Ende Insekten angeheftet ist und hier einen vertieften, mit Schleime erfüllten Raps trägt, in welchem die Insekten kleben bleiben und nach Zurückziehung der Zunge schluckt werden.

Gruppe der Kurzzüngler (Brevilingua).

Kurze, nicht ausstreckbare, an der Spitze abgerundete Zunge ohne Scheide. Durch die vollständige Reduktion der Füße und der Augenlider tritt die Gruppe den Uebergang zu den Schlangen.

Familie der Schleichen (Scincoida). Füße kurz, stummelförmig, mit wenigen oder gar keine Zehen, wie Flossen, bald vier, bald nur zwei, und wie die von unserer Blindschleiche, auf den Schultern reducirt. Körper gedrungen, Schwanz kurz, wie bei Schlangenähnlicher, je mehr die Füße reducirt sind. Glatte, oft silberglänzende, barte Schindelschuppen. Das untere Augenlid meist entwickelt, das obere nicht. Hierher der Skink (*Scincus officinalis*, Taf. 20, Fig. 6), mit vier kurzen Beinen, in Ägypten, war früher officinell und gilt noch in seinem Heimatland als Abwehrmittel. Bei uns die Blindschleiche (*Anguis fragilis*), eine Extremitäten, nur der Schultergürtel entwickelt, barloses Thier, sehr nützlich, besonders von Schnecken und

ermern Leben, durch eine Unmasse grundloser als giftig verleumbet.

ie der Wirtelschleichen (Chalcidide). Unterschied von der vorigen nur durch eine lange ste, von einem Hautumschlage gebildet. Sonst Modificationen der Fähe. Hierher der in häufige Scheltopustil (Pseudopus Pallasi), flossendähnlichen Fußstummeln neben dem After, in Vaterlande ebenso verleumbet, wie bei uns die Schleiche.

ie der Doppelschleichen (Amphisbaenida). blangenähnlich; Augen klein, ohne Lider, von t bedeckt. Keine Schuppen, sondern nur ringel-falten, von weniger tiefen Längsfalten durch- . Meist Amerikaner. Einige mit kurzen Vorber- Die abgebildete Art (Doppelschleiche, Am- na alba, Fig. 7) in Termitenhäufen des n Amerika wählend.

rdnung der Schlangen (Ophidia).

per langgestreckt, ohne äußere Ex- äten. Untertieferäste in der Mitte ge- und zu seitlichem Auseinanderweichen gt. Kein Schultergürtel, noch Brust-

Körper der Schlangen ist bekanntlich lang-, wurmförmig, meist ohne deutlich abgesetzten z und Hals, der Kopf jedoch in der Regel als der übrige Körper und deutlich in seiner nung erkennbar. Dieser langgestreckte Körper den Schlangen ganz allgemein in eine feste, eingehüllt, der man gewissermaßen mit Unrecht men einer Schuppenhaut gegeben hat, während der That diese Haut ein durchaus zusammen- des Ganzes bildet, die deutlich aus einer Leder- nd einer darüberliegenden Epidermis besteht. verhaut ist nicht gleichförmig dick und eben, an einzelnen Stellen verdickt und der Rand Stellen frei umgeschlagen, sodas Falten gebildet , welche das Ansehen von dachziegelförmig anderliegenden Schuppen haben; indem nun erhalt ebenfalls diesen Duplikaturen der Leber- lgt und sich an den freiliegenden Stellen ver- während sie da dünner wird, wo sie in die- eingeht, treten diese Schuppen noch deutlicher

Man unterscheidet der Gestalt nach Schuppen, ger als breit sind, oft auf ihrer Mitte einen agen und vorzugsweise auf der Rückenfläche iers entwickelt erscheinen, und Schilder von chs- oder viereckiger Gestalt, gewöhnlich länger it, die vorzugsweise auf der Bauchseite und n Kopfe sich ausbilden. Die Oberhaut wird on den Schlangen im ganzen abgestreift und h dann als eine vollkommen farblose, scheinbar lose Haut, welche alle Sculpturen der Ober- erhalten zeigt. Dieser Hautwechsel geschieht meh- n Jahre nach kurzem Unwohlsein des Thiers, iher gern frist und glänzendere Farben zeigt. opf der Schlangen ist im allgemeinen abge-, mehr oder minder dreieckig und der Rücken uer weit gespalten, so selbst das diese Spalte r die hintere Grenze des Kopfes hinauszu- gehen

Die Nasenlöcher liegen stets vorn am Kopfe, n an der Spitze der Schnauze, die gewöhnlich i oder längs ovalen Augen etwa in der Mitte schnauzenpalte ganz auf der Seite und dem rande sehr genähert. Der bewegliche Augapfel, Pupille bei den nächtlichen Gattungen meist ht gespalten, bei den übrigen rund ist, zeigt Augenlider, sondern wird von der durchsichtigen

Haut überzogen, die in ähnlicher Weise wie ein Uhr- glas in einem Falze der runden Augenhöhle eingeseht ist und eine Kapsel bildet, welche durch einen weiten Gang, den Thränenanal, nach innen mit der Nasen- höhle in Verbindung steht. Das Auge der Schlangen hat hierdurch ein gläsernes unheimliches Ansehen.

Einen wesentlichen Charakter für die ganze Ord- nung der Schlangen findet man in der Structur des knöchernen Gerüsts, welches den Antlitztheil des Schädels bildet. Bei den meisten Schlangen nämlich ist das Obertiefergerüste durchaus beweglich geworden; der Zwischenkiefer freilich hängt fest mit den Nasen- beinen zusammen; dagegen sind die Obertiefer-, die Flügel- und Gaumenbeine durchaus beweglich und können sowohl nach den Seiten als auch nach vorn und hinten geschoben werden (Schädel der Natter, Tropi- donotus natix, Taf. 20, Fig. 10). Eine ebenso große Beweglichkeit ist in dem Untertieferapparate hergestelt; das lange schuppenförmige Zitzenbein hängt nur durch Bänder und Muskeln mit dem Schädel zusammen und trägt an seinem Ende das lange, stabförmige, meist schief nach hinten gerichtete Quadratbein, an welchem der Untertiefer eingelenkt ist. Dieser selbst besteht aus zwei völlig getrennten, stabförmigen, nur wenig ge- bogenen Hälften, die vorn entweder gar nicht oder nur durch lare Sehnenfasern miteinander verbunden sind und deren Trennung auch gewöhnlich durch die sogenannte Kinnfurche an der Unterfläche des Kopfes ausgedrückt ist. Durch diese Einrichtung ist der ganze Untertieferapparat einer enormen Erweiterung fähig, indem jeder Untertieferast aus drei durch lare Gelenke verbundenen, stabförmigen Knochen besteht, die selbst wieder nach beiden Seiten hin auseinanderweichen können.

Die Bezahnung der Schlangen ist je nach den verschiedenen Familien sehr verschieden. Niemals kommen andere als echte Palenzähne vor, die zu- weilen sehr groß, immer aber spiz, nach hinten ge- krümmt und nur zum Festhalten der Beute, nicht ein- mal zum Zerreißen und noch weniger zum Rau- derselben dienen. Gewöhnlich bilden diese Zähne einen scheinbar soliden Regel aus harter Zahnhsubstanz mit dünnem Email bekleidet; bei den verdächtigen und giftigen Schlangen aber kommen theils rinnensförmige, theils hohle Zähne vor, welche zur Ableitung des Secretes eigenthümlicher Speicheldrüsen dienen (Schädel der Klapperschlange, Crotalus horridus, Fig. 15: a Schädel, b beweglicher Obertiefer, c Giftzähne, d Untertiefer). Manchmal erscheinen diese Zähne nur auf der Fläche gesurht, in andern Fällen aber ver- tieft sich diese Hohlkehle bedeutend und die beiden Ränder der Furche wölben sich so zusammen, das ein Kanal entsteht, der sich an der Spitze des Zahns öffnet und seiner ganzen Länge nach durch einen feinen Schliz geöffnet ist; bei den echten Giftschlangen end- lich, bei den Ottern, schließt sich dieser Schliz völlig und der Giftzahn stellt nun einen spizen, hohlen, säbelförmig gekrümmten Regel dar, an dessen Spitze sich eine feine Spaltöffnung zeigt, durch welche das Gift beim Bisse ergieht. Nach dieser Beschaffen- heit der Zähne richtet sich auch der Bau des Ober- tieferapparates. Bei den ungefährlichen Schlangen mit ganzen soliden Zähnen sind die Obertiefer sehr lang und mit einer ununterbrochenen Reihe von Zähnen besetzt, aus welche ein zweiter Zahnbogen nach innen folgt, der von den in den Gaumenbeinen eingepflan- zten Zähnen gebildet wird, da die Gaumenbeine fast bei allen Schlangen zahntragend sind; bei den Trug- schlangen mit gesurhten Zähnen ist der Obertiefer schon kürzer, in seinem vordern Theile mit kleinen

Halenzähnen und hinten mit den großen Rinnenzähnen bewaffnet; bei den unechten Giftschlangen oder den Rattern ist der Oberkiefer nur kurz und trägt hinter den großen geschlitzten Giftzähnen einige kleine solide Halenzähne; bei den Ottern endlich ist der Oberkiefer auf ein ganz kurzes Knöchelchen reducirt und nur mit hohlen, ungeschlitzten Giftzähnen besetzt.

Alle Schlangen nähren sich nur von lebenden Thieren, und die eben geschilderte Einrichtung ihres Kieferapparates bringt es mit sich, daß sie ihre Beute nur in einem Stülde binabschlingen können; sie überfallen dieselbe im Schusse und die giftigen versetzen ihr nur einen Biß, nachher ruhig die Wirkung des Giftes erwartend, während die andern ihre Beute umschlingen und durch Umwickelungen ersticken; lebensfähige Thiere werden sogar noch lebend verschluckt. Die Arbeit des Schlüpfens ist bei größern Thieren eine ungemein mühsame; der Rachen der Schlange erweitert sich nach und nach in ungeheuern Maße, die Unterkieferäste spreizen sich auseinander, soweit es nur irgend möglich ist, zwischen ihnen schiebt sich, da die Arbeit oft stundenlang dauert, der stielartige Kehlkopf hervor, um die Athmung zu unterhalten; die bedeutend entwickelten Speicheldrüsen ergießen ihr Secret, das den ganzen Vissen schlüpfrig macht, und so zieht sich nach und nach der Kopf der Schlange über den Leichnam des Thieres weg, bis dieser ganzlich in dem weiten Rachen und in der Speiseröhre verschwunden ist. Die Verdauung geht äußerst langsam vor sich, ist aber so activ, daß nur höchstens einige Hornreste des Thiers durch den After entleert werden. Das was man gewöhnlich Schlangenthos nennt, ist der als halbweiche Masse entleerte Urin, der fast nur aus Harnsäure besteht. Die meisten Schlangen brauchen ein bis zwei Monate, bevor sie nach einer vollständig sättigenden Mahlzeit eine andere einnehmen.

Eigentliche Bewegungsorgane fehlen den Schlangen ganz; von vordern Extremitäten, von einem Schultergürtel und einem Brustbeine zeigt sich keine Spur; bei einigen Familien dagegen kommen Spuren der hintern Extremitäten vor, die indeß durchaus rudimentär sind, aus einem oder mehreren kleinen Knöchelchen bestehen, von denen die innern dem Becken, die äußern, wenn sie vorhanden sind, den Extremitätenknochen entsprechen und die zuweilen einen klauenförmigen Nagel tragen, der zur Seite des Afters kaum vorstehend sich zeigt. Zum Ersatz für diesen Mangel der Extremitäten ist dagegen die Beweglichkeit der Wirbelsäule außerordentlich groß; die Wirbel sind durch förmliche Kugelgelenke miteinander verbunden, indem stets der Gelenkkopf des vorhergehenden Wirbels in einer runden Pfanne des folgenden spielt; die Rippen (Skelet der Ratter, *Tropidonotus natrix*, Taf. 20, Fig. 9) sind ebenso durch Kugelgelenke mit den Wirbelkörpern verbunden und bilden ebenso viele stabförmige Bewegungshebel, deren jeder einen äußerst entwickelten Muskelapparat besitzt, wodurch jede Rippe leicht nach allen Seiten hin bewegt werden kann. Die Schlange läuft gewissermaßen, indem sie vorwärts gleitet, auf den unter der Haut verborgenen Spitzen ihrer zahlreichen Rippen. Auch tragen alle Wirbel, von dem ersten an bis zu denen des Schwanzes, ausgebildete Rippen, die nur vorn etwas kleiner sind, jedoch in Wahrheit keine Halswirbel existiren. Ein Brustbein fehlt unter allen Umständen, da die Enden aller Rippen vollständig frei sind.

Bei der langgestreckten Form des Körpers kann es nicht verwundern, daß alle Eingeweide dieselbe Gestalt

annehmen. Die Zunge ist sehr lang, keilförmig, in einer eigenen Scheide verborgen, ihrer Spitze in zwei Hälften gespalten, und wirkt als Tastorgan zu dienen. Sie ist auch bei ganz geschlossenem Munde im Oberkiefer, durch welchen die Zunge stets lebhaft bewegt, hervorgestreckt wird. Sie ist lang, äußerst muskulös; der Rachen ist artig, bedeutender Erweiterung fähig; der Kehlkopf ist nur eine, und zwar die gewöhnliche Form eines langen, innen zelligen Sackes, die rechte dagegen ganz rudimentär; die Lungen sind sehr lang und oft schon in ihrer ganzen Länge in Zellen besetzt; sehr lang gestreckt sind die Eierstöcke oder Hoden; die beiden in der Wurzel verborgenen Ruthen lassen meist bei des Männchens etwas wider erscheinen.

Gruppe der Engmäuler (Angiocephali)

Schließt sich sehr eng an die seltsamen Schlangen an, indem die Unterkieferäste nach hinten verbunden und der Oberkiefer nicht da. Dagegen fehlt allgemein der Schultergürtel, Brustbein, während meist ein Becken mit kleinen Klauen neben dem After vorhanden ist. Die äußeren sind nicht entwickelt; die äußeren sind durchsichtig werdend über die Augen weg, wie bei den echten Schlangen, in ein Uhrsglas abzustehen. Alle haben solide, einen nur im Ober- oder Unterkiefer, in beiden Kiefern. Es sind kleine, harnulose Tropfen, die unter Gebäßen oder in Gebäßen und sich von Kleinzug (Insekten, Radkriechern) nähren. Neben andern Familien sind die Widelschlangen (*Tortricidae*). Kopf, gefest, Schwanz kurz, Unterkieferäste aber nicht dehnbar; Mundspalte klein. Kaartige Halenzähne in beiden Kiefern. Gebäße lebende Thiere. Die abgebildeten (*Tortrix scytale*, Taf. 20, Fig. 21) hat schwarzen Querringen, in Südamerika.

Gruppe der Giftlosen (Aglyphini)

Rachen sehr weit und sehr dehnbar. Zähne, sondern nur solide Halenzähne.

Familie der Riesenschlangen oder Eupodier (*Peropoda*). Der Kopf dieser dreieckig, abgeplattet, meist vorn zugespitzt, breit und gewöhnlich deutlich von dem Rachen. Der Rachen weit gespalten, die beiden Kiefer und die Gaumenbeine, zuweilen selbst der Kiefer mit Zähnen besetzt, die alle der Größe nach so geordnet sind, daß der dritte Zahn in der Reihe der größte ist, die übrigen successiv nach hinten abnehmen. Die Beine sind S-förmig gekrümmt und nur an den Enden mit Zähnen besetzt. Zu beiden Seiten des Afters finden sich zwei hornige Klauen, welche das Rudiment der hintern Extremitäten sind. Der Kopf ist meistens mit Schildern besetzt, die Kehlen dagegen mit Schuppen, ein wesentlicher Unterschied von der vorigen Familie. Die Schilder, die gewöhnlich einfach sind, zeigen gewöhnlich doppelte, ziemlich kleine. Man kann in dieser Familie einige unter unterscheiden: Die Kollischlangen (*Colubridae*), nicht abgesetztem Kopfe, sehr rundlichen, sehr kurzem, stumpfem

; wenig ausdehnbarer Mundspalte; letztere eine unbedeutende Größe und finden sich in den türkischen Besitzungen am Mittel-Schlinger (Pythonida), welche halenzähne im Zwischenkiefer und auf der der Kieferschilder tiefe dreieckige Gruben finden sich nur in der Alten Welt; die abgebildete Riesenschlange, *Python tigris*, Taf. 20, f. Java; die Königschlange (Boida) im Zwischenkiefer, ohne äußere Gruben auf, aber wie die vorigen mit weitgetachten, scharf abgesetztem Kopfe, kurzem der zuweilen halenzähneförmig getrümmert und isten der Aeste geeignet ist. Die Arten in Familien lauern theilweise im Wasser, auf Bäumen oder in Gebüsch; manche ne Länge von 40 Fuß und darüber und des kräftigen Mannschenkels. Die Familie der Wölfschlangen (Lycodontida) t sich von der vorigen durch den Mangel an häufligen der Ringelnatter (Tropidix, Fig. 8), graublau, mit schwarzem, dem Halsfled und gelichten Rücken schuppen. In Wäsen, an Bächen, geht gern in das ob vorzugsweise von Fröschen; legt ihre ngshäuten. Im südlichen Deutschland die late Natter (*Coronella laevis*), auf Ge- elbst Bäumen, und die Aesculapnatter (*Navescon*), mit gelbem Bauche, auch in ab. Alle Nattern sind höchst unschädliche Vertilgung von Mäusen u. s. w. sogar hiere.

Der Trugschlangen (Opisthoglypha). Ntern Ende des langen Oberkiefers stehen here Furchenzähne, welche den Speichel der rüse ableiten. Sie gleichen im übrigen r durch Gestalt und Beschuldung des Kopfes, r nur einfache Schilder unter dem Schwanz. r geringen Ausnahmen tropischen Thiere all für sehr giftig, es ist indessen noch ob sie wirklich diese Eigenschaft besitzen. r könnte das Gift nur bei besonders tief- Bissen oder nur auf eine Beute wirken, in Nachen ist. Verdächtig aber sind sie und im Zweifelsfalle ist es besser, sie zu sich von ihnen beißen zu lassen. der Baumschlangen (Dryophida). Körper oft abgeplattet, peitschenförmig, Schwanz dünn, Kopf lang und spitz, oft mit sonder- rängen. Ein Furchenzahn hinten im Ober- rängen, behend, fast alle von grüner Farbe. r auf Bäumen der Tropenzone von Ciern, getn u. s. w. Die Art, deren Kopf (Kopf der a nasuta, Taf. 20, Fig. 17) wir des sonder- ngenanhangs wegen abbilden, auf Java. le Familien, die wir nicht weiter erwähnen, r die einen mehr im Wasser, die anderen auf de in Erdlöchern leben.

Der Vorzähler (Proteroglypha).

Der Kopf kurz, vorn mit mehreren gesuchten Gift- anten mit soliden Halenzähnen besetzt. Halenz-

zähne am Unterkiefer, an Gaumen und Flügelbeinen. Kopf geschildet.

Hier ist kein Zweifel möglich, alle Vorzähler sind furchtbar giftig, und bei einigen reichen die Giftdrüsen sogar weit in die Bauchhöhle hinab. Die Giftzähne sind bald nur gefurcht, bald gänzlich zum Kanal geschlossen, sehr groß; dahinter stehen solide Halenzähne. Nur südliche Formen.

Familie der Seeschlangen (Hydrophida). Körper schwach, Kopf wenig abgesetzt, Nasenlöcher durch Klappen verschließbar. Bauch beschuppt. Gebären lebendige Junge. Giftzähne klein. Schwanz seitlich zusammenge- gedrückt, oben und unten gefielt, Ruderschwanz. Leben in den tropischen Meeren, nähren sich vorzugsweise von Fischen, schwimmen und tauchen sehr gut. Höchstens 6 Fuß lang. Die abgebildete Art (Plättchen- schlange, *Pelamis bicolor*, Taf. 20, Fig. 19) bei den Sunda-Inseln.

Familie der Bruntschlangen (Elapida). Gestalt der Nattern, meist lebhaft gefärbt. Doppelreihen von Schwanzschildern. Schwanz kurz, spitz. Hierher die höchst gefährliche Korallenschlange (*Elaps corallinus*) in Brasilien, der unschuldigen Widenschlange ähnlich gefärbt, nur zwei Fuß lang, und besonders die Brillen- schlangen der Alten Welt, deren Halsrippen, lang und sehr beweglich, seitlich aufgerichtet werden können, sodaß der kleine Kopf fast zwischen dem Halsstragen verschwindet. Die abgebildete Art, *Cobra di capello* (Brillenschlange, *Naja tripudians*, Fig. 18), in Ostindien, mit der Brillenzeichnung; eine ähnliche, einfarbig braun auf dem Rücken, ohne Zeichnung, die Haje, in Aegypten (*Naja haje*). Letztere ist die Natter der Kleopatras. Beide Arten dienen vorzugsweise den Pyßlen oder Schlangenbeschwörern zu ihren Gaukeleien.

Gruppe der Ottern (Solenoglypha).

Oberkiefer sehr klein, nur mit Giftzähnen besetzt. Halenzähne im Gaumen und Unterkiefer.

Der Charakter der Giftschlangen in höchster Ent- wicklung. Der Oberkiefer (Taf. 20, Fig. 15b) ist sehr kurz, quadratisch, sehr beweglich und nur mit den ge- waltigen, meist zur Röhre geschlossenen Giftzähnen be- setzt, die durch die Bewegung des Kiefers nach vorn gerichtet und wieder in die Schleimhaut zurückgezogen werden können. Der Kopf ist dreieckig, hinten breit, insolge der bedeutenden Entwicklung der Giftdrüse, die von einem besondern Muskel zusammengeedrückt wird, sodaß beim Bisse das Gift in die Wunde spritzt. In dem abgebildeten Präparat (Giftpararat der Klapper- schlange, Fig. 16) des Kopfes der Klapperschlange sieht man bei a das Nasenloch, darunter die charak- teristische Grube der Klapperschlange (s. Gruben- ottern), bei b die Halenzähne, in welche der S-förmig gewundene Ausführungsgang der Giftdrüse c führt, die von dem Muskel umhüllt ist. Der Schläfenmuskel d drückt ebenfalls noch beim Bisse auf den hintern Theil der Drüse c, die nicht giftige Speicheldrüse des Unterkiefers. Die Schlange haut mehr als sie beißt, und rißt die Haut, wobei das dickste Gift in die Wunde gespritzt wird, welche im ersten Augen- blick wie zwei feine mit der Nadel gerissene parallele Linien sich darstellt. Das Gift wirkt nur durch un- mittelbaren Uebergang in das Blut, dasselbe zerlegend. Man kann es ohne Schaden verschlucken. Erste In- dication ist also bei einem Bisse, das Gift nicht in den Kreislauf übergehen zu lassen. Augenblickliche Unterbindung des Gliedes, sehr fest, über der Biß- stelle; Erweiterung der Wunden mit dem Messer, um das Blut herausströmen zu lassen, Auswaschen und Ausaugen. Wenn das Blut vergiftet ist, Behandlung

des anschwellenden Gliedes und der allgemeinen Krankheit durch den Arzt, wie bei jeder plötzlichen Blutvergiftung.

Familie der Ottern (Viperida). Kopf breit, abgesetzt. Keine blinde Grube am Obertiefer. Meist träge Thiere. Hierher unsere Viper, *Vipera aspis* (Kopf der Viper, *Vipera Redii*, Taf. 20, Fig. 13), mit ganz beschupptem Kopfe, und die größere Kreuzotter oder Kuppertotter (*Pelias herus*, Fig. 11), mit beschildertem Kopfe (Kopf der Otter, *Pelias herus*, Fig. 12), bis nach Schweden hinausgehend. Beide besonders gern an sonnigen Rainen und Waldlichtungen, nicht im Sumpfe, da wo Erdbeeren und Himbeeren wachsen. Gebären lebendige Junge, nähren sich von Mäusen, kleinen Vögeln; erwarten die Wirtung des Bisses, der in heißen Tagen selbst lebensgefährlich wird. Hierher auch die Hornvipere (Kopf der Hornvipere, *Cerastes aegyptiacus*, Fig. 14) der Wüste, mit sonderbaren Auswüchsen über den Augen (Teufelsbömer).

Familie der Grubenottern (Crotalida). Zwischen Auge und Nase eine blinde Grube in der Haut des Obertiefers. Furchtbar durch ihre Größe. Hierher die Klapperschlangen (Crotalus), die Schwauspe in einer Hornscheide, welche beim Abstreifen der Haut hängen bleibt und so die Klapper bildet. In den Vereinigten Staaten. Träge. Ferner die Längenschlangen (Trigonocephalus) auf den Antillen, noch gefährlicher, weil sie zornig und sehr beweglich sind. Dem berücktigten Fer-de-lance (*Bothrops lanceolatus*), dem sogar ein Reiter zu Pferde nur schwer enttrinnen soll, fallen auf Martinique zahlreiche Opfer. In Brasilien die Surucucu (*Lachesis*) ohne Klapper, aber sonst den Klapperschlangen ähnlich, bis 4 Meter lang.

Niedere Wirbelthiere.

(Anamniota oder Anallantoidea).

Bei dem Embryo weder Schutzhaut (Amnios), noch Hornhaut (Allantois), noch Kopfbeuge. Alle athmen entweder zeitweilig oder zu einer gewissen Zeit in ihrer Jugend durch Kiemen. Alle haben einen Bulbus arteriosus am Herzen. Die Rippen vereinigen sich niemals in einem Brustbeine.

Die der Entwicklungsgeschichte entnommenen Charaktere sind so scharf und durchgreifend, daß sie keine weitere Discussion zulassen. Die meisten athmen nur durch Kiemen, sind also Wasserthiere; nur bei der höchsten Klasse, den Lurchen, treten Lungen ganz allgemein auf, erst neben den Kiemen, sodas die Thiere bald durch die Kiemen, bald durch die Lungen athmen können und schließlich bei den ausgewachsenen Thieren die Kiemen ganz verdrängen, die dann nur bei den Jungen (Larven) thätig sind. Innerhalb der Hauptklasse lassen sich wieder zwei große Gruppen unterscheiden: bei der einen, die sich hierin den höhern Wirbelthieren anschließen und die Lurche und Fische umfaßt, existirt ein doppeltes, bald nach hinten geschlossenes, bald in die Mundhöhle geöffnetes Nasenrohr, ein ausgebildetes Kieferskelet mit an dem Schädel befestigtem Obertieferapparat und freibeweglichem Untertiefer; ebenso besitzt diese höhere Gruppe paarige Gliedmaßen, eine Milz, eine Bauchspeicheldrüse und ein sympathisches Nervensystem. Die niedere Gruppe (Rundmäuler und Lanzettfischchen) haben entweder nur ein einfaches Nasenrohr oder gar keins, und alle übrigen Bildungen fehlen ihnen durchaus. Bei dem Lanzettfischchen fehlt sogar ein eigentlicher Kopf mit Schädel und Gehirn und ein Centralherz, sodas wir

hier den Wirbelthierplan so reducirt als möglich blicken.

Gruppe der niedern Wirbelthiere mit doppeltem Nasenrohr und Kiefern.

Klasse der Lurche (Amphibia).

(Tafel 21).

Lungen- und Kiemenathmung, letztere ständig oder vorübergehend (Larven); Doppelter, durchgehende, in die Mundgeöffnete Nasenlöcher. Einfache Herz; Doppelter Gelenkhöcker am Hinterbein. Haut nackt, nur selten mit Schuppen. Vollständige Dotterzerklüftung.

Die Körperform der Thiere, welche in kleinen Klasse gehören, wechselt ausnehmend einerseits gänzlicher Mangel an Gliedmaßen oder rudimentäre Entwicklung derselben mit der Würmform, andererseits breite abgeplattete Gestalt, welche sich der Scheibenform nähert, in entwickelten Gehörzeugen vorhanden sind. Auf dem Lande lebenden gliedmaßenlosen Thiere gleicht der ganze Körper, der nur Leib und schwanzlos ist, vollkommen einem Regenwurm, während bei den im Wasser lebenden Altmolchen langstreckter Körperform doch ein seitlich gedrückter Schwanz, oft mit einer seitlichen als Schwimmschwanz versehen, die Schwimmbewegung vermittelt. Hierzu gesellen sich nur allmählich Füße in allen Stufen der Ausbildung, und durchaus unsäbig, den Körper zu stützen und in kleinen rudimentären Beinen in geringer Zahl rüsten. Zuweilen sind nur die Vorderfüße vorhanden, die als unbedeutende Stummelfüße am Halse in andern Fällen nur die Hinterfüße. Je mehr die Füße entwickeln, desto mehr schiebt sich der Kopf zusammen und plattet sich zugleich ab. Bei frostartigen Thieren schwindet der Schwanz nach wachsendem Alter vollständig, sodas keine Spur davon vorhanden ist und der After sich unmittelbar wie bei den Blindwühlen, an dem hinteren Ende des breiten, scheibenförmigen Körpers befindet. Die Füße bekommen bei diesen Thieren ein gewaltiges Gewicht über die kleinen, kurzen, stämmigen, nachwärts gebogenen Vorderfüße, die gewöhnlich nur Beine haben, während die hintern meist nur Füße besitzen. Die Bewegung auf dem Lande ist meistens nur sprunghaft, indem die kräftigen Hinterfüße den Körper oft auf ziemlich bedeutende Sprünge durch plötzliche Spannung fortjagen.

Die Hautbedeckung der Amphibien ist sehr verschiedener Weise ausgebildet. Bei den Fischen und Molchen ist die Haut glatt, schlürftig, meist sadartig weicht, aus elastischen Sehnenstrahlen weicht und ziemlich dünn, sodas bei denen, wo sie an dem Körper anliegt, die Muskeln durch sie durchschimmern. Eine farblose, aus Mucosin gebildete Oberhaut deckt diese Lederhaut, in welcher verschiedene Pigmente von grüner, blauer, gelber, brauner Farbe abgelagert sind. Die Haut ist ein Athmorgane und kann durch ihre Thätigkeit auch der Kiemen und Lungen oft ganz ersetzen. Bei diesen nackten, frostartigen Thiere finden sich keine Drüsenbälge in der Haut, welche einen scharfen, wässrigen mehr oder minder nach Knoblauch riechenden Milchsaft absondern, der stark sauer reagirt und der That beim Einbringen in Wunden kleinerer Thiere giftige Eigenschaften entwickelt. Gewöhnlich sind die Drüsen, wie z. B. bei Kröten und Salamandern, den ganzen Körper zerstreut, oft aber noch beson-

ungen zu beiden Seiten des Halses anhe man dann Ohrdrüsen oder Parodont hat. Wenn indeß die meisten Amphibien nicht bezeichnet werden können, in einzelnen Familien besondere Schuppen, welche denen der Knochenfische sich anlehnen. In der That besitzen die Blindwurmhornschuppen, welche sowohl die Linien, als auch die Fächerfurchen der Fische zeigen und in den übrigen schleimigen Haut versteckt

Die Bildung des Skelets zeigt sich auf niederer als bei den Schleichenlurche sowie bei den Fischen finden sich Wirbel, welche in ihrer von Fischwirbeln nicht unterscheiden lassen wie diese Höhlungen in Doppeltegeform, welchen die Ueberreste der Wirbelsäule als Rassen eingeschlossen liegen. Bei den Molchen finden sich vollständig ausgebildet vor, welche vorn einen runden Gelenk eine Platte tragen, wodurch die verschiedenen Wirbel miteinander eingelenkt sind. Bei Amphibien mit langgestrecktem Körper ist die Zahl der Wirbel sehr bedeutend, während hartigen Thieren nur sehr wenige (Amdenen bis neun) vorkommen, dagegen ein ungeheures vorhanden ist, das aus der Vermehrung der Wirbel entstanden scheint und langen, säbelförmigen Knochen in Verbindung, der die Wirbelsäule bis zum After in die Querschnittsform der Wirbel findet bei allen wohl ausgebildet, zuweilen ungemein lang auf diese Weise die Rippen, welche nur ganz ausgebildet und zuweilen nur durch Knorpelanhänge vertreten sind. Auch hinsichtlich der Bildung des Kopfskelets zeigen sich Stufen in der Reihe der Amphibien, die schließlich auf das allmähliche Verschwinden der knorpeligen Gebilde beziehen.

Das charakteristische Kennzeichen für die im Gegensatz zu den Reptilien stellt sich die Bildung zweier seitlicher Gelenkköpfe an dem dar, die von den stets verknöcherten Seitenhauptbeinen hergestellt werden und in den Lungen des ersten ringförmigen Halswirbels ein zweites Kennzeichen ist die Ausbildung der ersten Deckplatte, die sich wie bei den Fischen auf der Fläche des ursprünglich knorpeligen auflegt und sich als besonderes Stück erhält, der, wie häufig, zum Theil knorpelig bleibt und Verknöchigung mit dem Schädel verknüpft. nicht nur, sondern auch die Gaumenbeine mit einfachen, meist halben, wurzellosen, setzt, die indeß auch ganz fehlen können. Dieser selbst ist stets in der Mitte verknüpft am Tragebogen aufgehängt, welcher niemals verknöchert und aus dem Quadratbeine Trommelbeine besteht. Das flachförmige Gebilde, welches auf diese Weise zusammengebaut, ist fest mit dem Schädel verbunden und schief nach hinten gerichtet, so daß die Mundöffnung ziemlich weit hinter den Schädel sich erd der Kasse einer großen Erweiterung

unter dem Unterlieferbogen liegenden Hartgewebe der Zunge und den Kiemengerüste anstellen sich äußerst verschieden dar, je nachdem noch vorhanden oder Lungen ausgebildet sei dem mit Kiemen versehenen finden sich

Kiemenbogen ähnlich denjenigen der Fische; bei den Fröschen und Kröten sind dieselben in das Zungenbein und benachbarte Gebilde übergegangen.

Die Extremitäten bestehen, insofern sie vorhanden sind, stets aus dem Schulter- oder Bedengürtel und den eigentlichen Extremitäten, nur den Blindwühlen fehlen dieselben gänzlich, während bei manchen Kiemenmolchen nur Vorderfüße vorhanden sind und die Hinterfüße gänzlich fehlen. Bei den Molchen ist der Schultergürtel stets nur theilweise verknöchert und besteht aus einem Schulterblatte, einem breiten Schlüsselbein und dahinterliegendem Rabenbein, zwischen welche sich oft noch ein unpaariges Brustbein einschleibt. Bei den Fröschen wird ein breiter Brustkorb von dem Schultergürtel gebildet, der aus vielen Stücken besteht, welche oft nur theilweise verknöchern und in ihrer Deutung manche Schwierigkeiten machen. Der Vorderfuß selbst besteht immer aus einem einfachen Oberarme, zwei zuweilen verschmolzenen Vorderarmknochen, einer oft knorpelig bleibenden Handwurzel und aus Zehen, deren Zahl meist vier, selten drei beträgt. Der Bedengürtel ist bei den Molchen nur unbedeutend und die Kreuzbeinwirbel taum in ihrer Structur von den übrigen Wirbeln verschieden. Das Becken bleibt bei diesen Thieren außerdem meist knorpelig und besteht nur aus zwei Darmbeinen, welche durch einen Mittelknochen miteinander verbunden sind. Um so ausgezeichneter ist die Bildung des Beckens bei den Fröschen, wo dasselbe den starken Sprungbeinen als Stützpunkt und ihren Muskeln zum Ansatze dienen muß. Die langen, stabförmigen Darmbeine sind an die breiten Griffelfortsätze des schwertförmigen Kreuzbeins geheftet und krümmen sich nach hinten gegen den After zusammen, wo sie mit dem Säbelknochen des Kreuzbeins und den Sitzbeinen sich verbinden, während zugleich noch die Schambeine diese Verbindung vervollständigen und alle drei Knochen die Gelenkpfanne für den langen und starken Oberschenkelknochen bilden. Die Zusammensetzung der Fußknochen ist dieselbe wie an der vorderen Extremität, obgleich größerer Wechsel vorkommt, indem bei einigen Kiemenmolchen nur zwei, drei oder vier, bei den eigentlichen Molchen und den Fröschen aber stets fünf Zehen an den Hinterfüßen sich vorfinden, von welchen die vierte gewöhnlich die längste ist. Nur bei sehr wenigen Gattungen kommen kleine, hufartige Nägel vor, in welchen die Zehenenden wie in einem Hingebute steden. Bei weitem bei der großen Mehrzahl der Lurche sind die Zehen vollkommen nackt, dagegen sehr häufig durch Schwimmhäute miteinander verbunden und oft auf der Unterseite mit Haftorganen versehen. Die Muskeln folgen der Anordnung des Skelets, bei den Molchen mit rudimentären Beinen sind die Rumpfmuskeln, ähnlich wie bei den Fischen, mit Wirbelringen angeordnet.

Das Gehirn ist an Masse klein, langgestreckt, flach, die einzelnen Knoten hintereinandergereiht; das verlängerte Mark ist breit, von oben her kahnförmig ausgehöhlt, und das kleine Gehirn nur durch eine schmale Querbrücke vertreten. Vor dem kleinen Gehirn liegen die Vierhügel, gewöhnlich aus zwei durch eine Längsfurche getrennten Anschwellungen bestehend und innerlich ausgehöhlt, von hinten her die Zirkelbrücke umfassend. Vor dieser liegen die paarigen Anschwellungen des Vorderhirns, die innerlich hohl sind, gewöhnlich die größte Masse des Gehirns ausmachen und meist unmittelbar in die Nerven sich fortsetzen. Von den Gehirnnerven sind öfters die Augenmuskelnerven mit dem fünften Paare mehr oder minder innig verschmolzen, ebenso der Zungen- und Schlundkopfnerv gänzlich in den herumstreichenden Nerven übergegangen,

während der Zungenfleischwurz gewöhnlich aus den ersten Halsnerven hervorgeht, wodurch die Zahl der Hirnnerven zuweilen um ein Bedeutendes verringert wird.

Die drei hauptsächlichsten Sinnesorgane fehlen keinem einzigen Amphibium, wenngleich die Augen bei einigen ziemlich rudimentär sind. Die Nasenhöhlen sind stets doppelt, durch eine Scheidewand voneinander getrennt und unter allen Umständen doppelt in die Mundhöhle geöffnet, so daß sich stets an dem Gaumengewölbe, bald mehr nach vorn, unmittelbar hinter den Lippen, bald weiter nach hinten hin, die beiden innern Nasenöffnungen zeigen. Die Existenz solcher durchgehender Nasenöffnungen ist eng verbunden mit dem Vorhandensein echter Lungen. Bei den Kiemenlurchen durchbohren diese Nasenöffnungen freilich nur die Lippe und öffnen sich nach innen von den Zahnbogen des Gaumens, während sie bei den froschartigen Thieren mehr nach innen und hinten stehen, durch die Knochen des Gaumens durchtreten und eine bedeutende Weite besitzen. Bei den meisten Lurchen ist die Nasenhöhle sehr einfach und ihr Eingang klappenartig verschließbar. Die Augen sind zuweilen nur ganz rudimentär und, wie bei dem Olm (*Proteus anguinus*), unter der Haut verborgen, die nicht einmal über ihnen durchsichtig wird, während bei den übrigen Kiemenmolchen zwar die Augenlider fehlen, dagegen die Haut da, wo sie über den Apfel weggeht, eine glasartige Durchsichtigkeit erhält. Bei den froschartigen Thieren ist der gewöhnlich große Augapfel sehr beweglich und kann namentlich durch einen trichterförmigen Muskel tief in die Mundhöhle zurückgezogen werden. Er wird hier gewöhnlich von zwei Augenlidern bedeckt, einem harten, wenig beweglichen obern und einem großen untern Augenlide, das dünn und durchsichtig ist. Am innern Augenwinkel zeigt sich noch die Nidhaut als einfache, kleine, unbewegliche Hautfalte. Auch die Fortbildung des Gehörorgans thut innerhalb der Klasse einen bedeutenden Schritt vorwärts, indem bei den meisten geschwängten Amphibien ein mittleres Ohr fehlt und nur das Labyrinth vorhanden ist, während fast bei allen froschartigen Thieren eine Paukenhöhle mit Trommelfell und kurzer Eustachischer Trompete vorkommt, welche sich mit weiter Mündung in den hintern Theil des Rachens öffnet. Das Labyrinth selbst besteht aus drei halbcirculärförmigen Kanälen und einem Sack, der mit mikroskopischen Kalkkrystallen erfüllt ist. Seine theils knorpelige, theils von dem Felsenbein gebildete knöcherne Umhüllung zeigt eine ovale Oeffnung, welche bald durch einen Dedel, bald durch eine dünne Haut verschlossen und bei fehlender Trommelföhle von Muskeln und Haut bedeckt wird. Bei ausgebildeter Trommelföhle sieht man auf der Außenfläche des Kopfes gewöhnlich fast unmittelbar hinter dem Auge das runde Trommelfell, welches in einem kreisförmigen Ringe ausgespannt ist und an der innern Fläche mit drei Gehörknöchelchen in Verbindung steht. Die Wände der Trommelföhle sind gewöhnlich knorpelig, nur bei wenigen knöchern und bei den letztern auch die Kette der Gehörknöchelchen bis zu dem ovalen Fenster des Labyrinthes fortgesetzt.

Die Mundhöhle, welche den Anfang des Verdauungs- und Luftwegs bildet, ist gewöhnlich ungemein weit und tief gespalten und meist mit Zähnen bewaffnet, die in den Zwischentiefer und Obertiefer, in den Gaumenbeinen und in dem Untertiefer stehen. Hinsichtlich der Bezahnung selbst finden sich vielfache Verschiedenheiten. Einige Lurche, wie viele Kröten, sind vollkommen zahnlos, andern, wie den meisten Fröschen, gehen die Zähne im Untertiefer ab, während

die Obertiefer eine Zahnreihe und die Gaumenbeinen einen kleinen Haufen zeigen. Bei den meisten sind zwei vollkommene obere Zahnbogen vorhanden, der Obertiefer, der andere von den Gaumenbeinen getragen, hergestell, zwischen welcher der Zahnbogen eingreift. Gewöhnlich sind die Zähne einfach, spitz, nach hinten getrennt, in einer einfachen Zahnhöhle und ohne weitere äußere äußern Gestalt oder des innern Baues. Es fehlt nur bei einer eigenthümlichen froschartigen Thiere, ist aber bei allen andern vorhanden und in ihrer Form oft äußerst charakteristisch. Gewöhnlich ist gewöhnlich sehr breit und fällt ganz zwischen den beiden Untertieferzähnen ein. Bei den Molchen ist diese Zunge gänzlich auf der Mundhöhle festgesetzt, bei den andern ist sie mehr oder minder frei, und zwar in der Form wie bei den Säugethieren und dem Fische. Die Zunge hinten angewachsen, mit ihrer Basis ist, sondern im Gegentheil sie vom hinteren Rand dagegen frei ist und bildet eine Klappe aus dem Munde herausgezogen, kann, welche Art der Bewegung namentlich der Insekten äußerst förderlich scheint. Die Zunge sogar ganz frei auf allen Seiten der Mundhöhle, während sie nur durch einen untern Saugnapf in der Mundhöhle befestigt, so daß sie einen nicht unähnlich sieht. Der Darmtraktus, die Rachenhöhle nach hinten fortgesetzt, ist sehr kurz, wenig gewunden, der Schlund und der Magen einfach, längsgefaltet, sehr dick, der Afterdarm zuweilen blasenartig aufgetrieben. Er ist groß, meist in zwei Lappen getrennt, eine Blase allgemein vorhanden, Bauchspeicheldrüse überall ausgebildet.

Hinsichtlich der Athemorgane stellen sich als das unerkennbare Uebergangsglied zwischen den Kiemenathmung der Fische und der Lungenathmung der übrigen Wirbelthiere dar, indem zwar die Kiemenlurche Lungen besitzen, zu welchen aber nicht wirklich athmende Kiemen treten, die bei den Lurchen das ganze Leben über neben den Kiemen stehen bleiben. Bei diesen letztern sind zwei, bald drei, bald auch vier äußere Kiemenblätter, welche eine baumsförmige oder fächerförmige Gestalt haben und aus ästigen Fäden bestehen, an welchen die lebhafte Blutcirculation stattfindet. Zwischen den Kiemenbüscheln sind Kiemenspalten vorhanden, welche bei den Larven stets ausgebreitet sind und die bei den Lurchen trotz des Verschwindens der Kiemen während des ganzen Lebens bleiben. Von der Haut des Halses bedeckt, zu welcher äußere Kiemenpalte führt, finden sich bei den Lurchen und zwar gewöhnlich auf drei Kiemenbögen die Lungen bestehen aus rundlichen oder eiförmigen Säcken, welche in der Bauchhöhle gewöhnlich mit Ausnahme der Blinddarmtaschen sind und nur selten inwendig vollständig geschlossen sind. Bei den meisten Lurchen zeigen die Lungen einen zelligen Bau, indem auf der innern Oberfläche oder minder hohle Falten der Schleimhaut, welche viele kleine Räume und Zellen bilden, sich erst die Lungengefäße vorfinden, dann geben diese Lungen nur selten in die Lufttröhnen über; meistens öffnen sie sich in die sogenannte Stimmlade, einen sackförmigen Sack, welcher durch verschieden geformte Stimmritze gestützt wird und durch eine bald enge, bald weite Längspalte hinter der Zungenwurzel

öffnet. Die frohgartigen Thiere haben sehr löthende Stimme, deren Schall oft ders bei den Männchen, durch seitliche genannte Kehlblasen, verstärkt wird, die wie beim Schreien hervorgerufen werden.

der Lurche besteht immer aus zwei dünnklammern und einer einfachen dickwandigen, welche das Blut in die Arterien treibt. Bei it die auch sonst nur sehr zarthäutige Scheidvorlammer nicht vollständig, zuweilen netzrothen, sodas zwischen beiden Herzhalbkammern des Blutes stattfinden kann. liegt vor der Leber, bald weiter nach vorn bald mehr nach hinten, und die Kammer vorn in einen Arterienstiel fort, welcher den Muskelbeleg hat und selbständige Pulswellen ausstrahlt.

Aus diesem Arterienstiele treten nach den Kiemenlurchen die verschiedenen, welche sich an den Kiemenbüscheln vertheilen, dann in ähnlicher Weise, wie bei den Fischen, in die Kiemen zusammenfließen. Von den Kiemen nach den Lungen, und nach den Lungen mit der Ausbildung der Lungen die mehr und mehr, indem sich die Lungen ausbilden, die vordern Kiemenbögen der Arterien des Kopfes sich umwandeln. Fortaderesystem der Leber ist bei allen Nierenfortaderesystem entwickelt in ähnlicher Weise, wie dies bei den Fischen der Fall ist, der Hauptunterschied, den das Gefäßsystem, in der Scheidewand der Vorlammer besteht.

Die Lurche liegen stets außerhalb des Bauchfells, die Seiten der Wirbelsäule und zeigen meist Befestigung, welche in die Nierenanlässe und. Diese bilden ein Geflecht und vertheilen in die Harnleiter, welche auf der innern Seite und bei den Männchen zugleich als Samenleiter dienen; sie öffnen sich mit warzenförmigen in die hintere Wand des blasenartigen Afterdarms gegenüber einer weiten, festsitzenden Harnblase, die eine vollkommen klare, Flüssigkeit enthält. Die Geschlechtsorgane liegen in der Wand der Bauchhöhle, meist auf der Seite der Nieren, und sind gewöhnlich von einer Hülle umgeben. Die Hoden bestehen aus mehreren, zerfallen zuweilen in einzelne, und gehen in sehr feine Samenkanälchen über, durch eine Falte des Bauchfells nach außen geleitet werden, in dieser sich netzartig zeigen und dann in den Harnleiter übergehen meistens noch sich röhrenförmige Seitenkanäle, Rudimente von Samenbläschen, befinden sich und traubensförmig und vollkommen abgerundet.

Bei den Schwanzlurchen bilden sie einen oder einzigen Öffnung, durch welche die Samen in die Bauchhöhle fallen, während bei den Fingern jedes reife Ei für sich seine Hülle bildet. Die Eileiter sind stets vollkommen getrennt, sehr lang, darmartig, und mit einem weiten Trichter, der sich nach einwärts, in die Bauchhöhle geöffnet, sich ebenfalls in die Kloake und unmittelbar vor dieser Öffnung eine uterusartige, in welcher sich auch bei den Salamandern Jungen entwickeln. Der After, welcher bei Schwanzlurchen eine Längspalte, bei Fingern ein rundliches Loch darstellt, dient somit zur Ausführung der Excremente, des

Harzes und der Geschlechtsproducte. Eigentliche Begattungsorgane existiren nirgends, obgleich eine wahre Begattung und Befruchtung der Eier im Leibe der Mutter bei den lebendig gebärenden Erbsalamandern vorkommt, während bei allen übrigen die Eier von dem Männchen erst in dem Augenblicke befruchtet werden, wo sie den Leib der Mutter verlassen. Diese Befruchtung geschieht stets im Wasser, und der in Klumpen oder Schnüren abgelegte Laich wird bei den meisten Gattungen einfach den Elementen zur Brutung überlassen. Nur bei einigen Arten hat man bis jetzt eine geringe Fürsorge für die Jungen entdeckt. Bei der in unsern Gegenden vorkommenden Geburtshelferkröte (*Alytes obstetricans*, Taf. 21, Fig. 5) wickelt sich das Männchen die befruchtete Eierschnur in achterförmigen Touren um die Schenkel und gräbt sich damit in die feuchte Erde ein, wo es bis zur vollständigen Entwicklung der Larven verbleibt; bei der in Südamerika vorkommenden Pipa (Fig. 9) streicht das Männchen die Eier in Hautzellen auf dem Rücken des Weibchens, in welchen die Larven bis zur vollständigen Ausbildung der Gliedmaßen und dem Verluste des Schwanzes verbleiben, und bei dem Rüdenschwanz (Notodermys) ist gar ein vollständiger, durch einen Längsschnitt nach hinten geöffneter Beutel zu demselben Zwecke angebracht.

Die Entwicklung der Lurche ist bei der Leichtigkeit, womit man sich ihren Laich verschaffen kann, Gegenstand vielfacher Untersuchungen gewesen. Die reifen Eier bilden eine kugelförmige Dottermasse, welche bei den meisten eine Ablagerung dunkelgefärbter Pigmente in ihrer Rinde zeigt, die besonders um die eine Hälfte so stark ist, daß das Ei hier oft vollkommen schwarz erscheint. Die Dottermasse selbst besteht aus einer dicken, eimäßigen, zähen Flüssigkeit, in welcher ungemein viele feitere Dotterkörperchen von talgähnlicher Consistenz und meist vieredig abgeplatteter Gestalt sich befinden; eine sehr zarte Dotterhaut umschließt das Ganze. Bei dem Durchtritte durch den langen, gewundenen Eileiter werden die Eier mit gallertartiger Masse umhüllt, die nur bei wenigen Arten fester wird und dann eine elastische Schale darstellt, bei den meisten dagegen im Wasser ungemein anschwillt und so die gewaltigen Massen und Klumpen von Laich bildet, welche wir im Frühjahr in Teichen und Gräben finden. Bei der Entwicklung spielt diese Gallertmasse keine weitere Rolle, als die einer schützenden Umhüllung, welche stets wie ein Schwamm mit Wasser vollgesogen ist. Sobald die Larve ihren ersten Entwicklungscyclus vollendet hat, so durchbricht sie diese Hülle, indem sie sie zum Theil aufricht, um dann frei im Wasser zu leben. Die Furchung des Eies ist meist durchaus vollständig, sodas der ganze Dotter sich in zwei kugelförmige Hälften theilt und diese Theilung sich ebenso durchgreifend fortsetzt, bis die definitive Bildung der Embryonalzellen vorhanden ist. Die Larven selbst sind unter dem Namen der Kaulquappen, Aolnagel oder Molkenköpfe allgemein bekannt und die Aenderungen ihrer Gestalt im allgemeinen so auffallend, daß sie von jeder die allgemeine Aufmerksamkeit erregen. Die erste Entwicklung geht ziemlich rasch vor sich, sodas schon wenige Tage nach der Befruchtung die ganze Dottertugel in eine Larve umgewandelt ist, deren platter, niedergedrückter, mit kleinem, endständigem Maule versehenen Kopf unmittelbar in den sackförmigen Bauch übergeht, an dem sich hinten ein plattgebrückter Ruderschwanz befindet, der ringsum von einem breiten Hautsaume, von einer fentrechtigen Flosse umgeben ist. Dieser Schwanz zeigt dieselbe zickzackförmige Anordnung der

Muskelbündel, wie sie auch bei den Fischen vorkommt. An dem Halse sprossen die äußeren Kiemen in Gestalt warziger Bäumchen hervor, verschwinden aber bei den Froschlurven bald wieder, indem sie durch innere Kiemen ersetzt werden, während sie bei den Larven der Molche weit längere Zeit hindurch bestehen bleiben. Die weitere Ausbildung der Larve, welche sich nach dem Durchbruch der Gallertsubstanz nur von Pflanzstoffen, namentlich von Algen und Wasserfäden nährt, ist nun wesentlich auf die Entwicklung des Schwanzes und die allmähliche Verarbeitung des Dotters gerichtet. Der Hautsaum der Schwanzflosse wird sehr hoch, der Körper schlanker, und nach und nach bilden sich die Gliedmaßen, welche anfangs unter der Haut verborgen sind und sich bei den Fröschen und Molchen in umgekehrter Ordnung zeigen, indem bei letztern die Vorderbeine vor den Hinterbeinen, bei erstern die Hinterbeine lange Zeit vor den Vorderbeinen die Haut durchbrechen. Bei den Froschlurven sind die Hinterbeine geraume Zeit allein vorhanden und der Schwanz bleibt auch noch eine Zeit lang nach dem Erscheinen der Vorderfüße das hauptsächlichste Bewegungsorgan; dann aber beginnt die Umwandlung der schwimmenden, pflanzenfressenden Larve zu einem kriechenden, insektenfressenden Thiere. Die Kiefer waren bisher mit Hornscheiden oder eigenthümlichen Hornzähnen bewaffnet, die jetzt abfallen. Der Schwanz verkümmert nach und nach, vertrocknet und verschwindet endlich gänzlich. Bei einem surinamischen Frosche hingegen, dem *Fati* (*Pseudoe*), fällt der stark fleischige, dicke Schwanz erst sehr spät nach dem Erscheinen der Gliedmaßen ab, so daß die ausgebildete Larve weit voluminöser erscheint, als der daraus hervorgehende Frosch. Die jungen Frösche, denen ein Stummel des Schwanzes noch längere Zeit anhängt, verlassen in Scharen das Wasser, um sich auf dem festen Lande zu verbreiten. Es geschieht zuweilen, daß Schwärme solcher junger Frösche bei heftigen Gewittern von dem Wirbelwinde meilenweit durch die Luft entführt werden, wo dann ihr Niederfall zu den abenteuerlichen Sagen vom Froschregen Veranlassung war.

Die Lurche sind in ihrer Lebensart entweder gänzlich auf das süße Wasser angewiesen oder doch wenigstens während ihrer Larvenzeit darauf beschränkt. Bei der schleimigen Beschaffenheit ihrer Haut, der starken Ausdünstung derselben, ist ihnen auch im ausgebildeten Zustande Feuchtigkeit ein nothwendiges Lebensbedürfnis, so daß man sie nur in sumpfigen Gegenden, auf nassem Wiesen oder an schattigen, feuchten, dunkeln Orten findet. Ihre Zahl ist in den tropischen Gegenden bedeutender als in den gemäßigten und nimmt nach dem hohen Norden hin mehr und mehr ab, so daß in der Polarregion gar keine Thiere dieser Klasse mehr vorkommen. Die Larven leben, wie schon bemerkt, nur von Wasserpflanzen, die erwachsenen Thiere dagegen wesentlich nur von Insekten, kleinen Würmern u. s. w. Sie können außerordentlich lange, selbst Jahre hindurch ohne Nahrung existiren, wenn ihnen nur der Zutritt von hinlänglicher Luft und Feuchtigkeit gesichert ist. Hieraus erklärt sich auch das Vorkommen lebender Kröten in verwachsenen Baumhöhlen oder fast verschlossenen Steinhöhlen, von denen man freilich übertrieben sagte, daß sie bei dem Abfalle der Steinmasse von derselben umschlossen sein müßten. Angestellte Versuche haben nachgewiesen, daß vollkommen eingeschlossene Kröten sehr bald starben, daß sie aber in porösen Massen, wo der Zutritt von Luft und Feuchtigkeit ihnen gesichert war, lange Zeit hindurch existiren konnten. Die bei uns vorkommenden Lurche überwintern in Sümpfen und Gräben, wo sie sich in den

Schlamm einsinken und schlafen die Wintermonate. Einige Molche, wie namentlich die Krain, kommen nur in unterirdischen Höhlen vor, andere, wie die Schleichenmolche, ähnlich denen der Regenwürmer, leben in den verborgenen lebenden Gängen der Erde. Nur dürftige Notizen über ihre Lebensweise über die Entwicklung.

Wir zerfallen die übrigen Lurche in drei Ordnungen: Die Schleichen (Amphibien) (Urodela oder *Prosalpurgae*) (*Anura* oder *Ecaudata*)

Ordnung der Froschlurche

Kurzer, schwanzloser, breiter Körper, converconcave Wirbel. Der breite, flache, meist zugrunde seiner vorderen Spitze die Nasenlöcher durch Hautklappen vollkommen und fast senkrecht nach unten in dem Bogen des Oberkiefers sich öffnend sind mit wenigen Ausnahmen unbedeckt, oben auf die Stirnfläche gestellt, ihre Höhlen zurückziehbar, mit einem und einem sehr großen untern Nasenloch, welches sich fast über den ganzen Körper ziehen kann. Hinter den Augen das große, runde Paukenfell, welches in die weite Paukenhöhle führt, sehr deutlichen Trompeten meist selten nur in der Mitte des Rachens. Der Rachen selbst ist ungemein weit, der Oberkiefer gewöhnlich, Unterkiefer dagegen nur selten mit kleinen Zähnen bewaffnet. Öffnet man den Rachen des Baumgewölbes vorn die Zehen weiter nach hinten die in die Mundhöhle führen und ganz hinten die Ohrtrompeten, während der weite Unterkiefer gewöhnlich von der Zunge ausgefüllt wird. Diese fehlt ganz, ist aber gewöhnlich nicht an ihrem hinteren Theile, sondern in dem Winkel des Unterkiefers zwischen hinteren Hande frei, so daß sie nach außen gezogen werden kann. Die Haut ist voll von warzigen Poren, die in vielen Arten mit warzigen Fortsätzen besetzt, die oft eine unangenehme Flüssigkeit absondern. Die Zehen sind meist aber stämmigen Vertiefungen besetzt, von denen meist die der auf gleiche Linie gestellte Daumen ist. Gewöhnlich sind die Zehen der Hinterfüße in ihrer ganzen Länge oder durch Schwimmhäute miteinander verbunden, kommen nur äußerst selten vor, ist die Zehen frei, oft dagegen finden sich Schwimmhäute sowohl, wie an der Innenseite der Vorderfüße, die zu besonderen Ballen und Warzen, die zuweilen bei der Begattung zum Fortziehen dienen, dann sich nur periodisch bei der Entwicklung, oder auch permanent vorhanden sind und dann zum Klettern dienen. Die auffallendste Eigenschaft des Skelets (Skelet des Frosch) besteht in der außerordentlichen Stärke der Knochen, die meist nur acht ausgebildete, auf welche dann als Kreuzbein ein

, an den zu beiden Seiten sich die Stabknochen anlehnen, sowie in dem ganzen aller Rippen oder rippenartigen Gestalt die Bauchwandungen stützen können, in ihrer Ausdehnung außerordentlich weiche. Die meisten Froschlurche haben sehr große, lebhafte Zungen, eine wohlgebildete, weite und eine lautstimmende Stimme, deren Reichthum durch besondere Resonanzhöhlen und verstärkt wird.

Im jugendlichen Zustande fehlt allen Froschlurchen durchaus, während sie, wie wir schon im jugendlichen Zustande stets einen en und bei manchen Gattungen dieser: sehr spät und lange nach vollständiger der Reife abfällt, jedoch zuweilen selbst die Larve eine bedeutendere Körpermasse als erwachsene schwanzlose Thier. Viele unter ihnen im süßen Wasser, namentlich in ist, andere suchen das Wasser nur zur Gasseit, um ihre Eier und die daraus entstehenden Elementen anzuvertrauen, halten ist auf ebener Erde, an feuchten Orten andere endlich verfolgen ihre Beute, die istften und ähnlichen kleinen Thieren beschaffen und in schattigen Wäldern.

Der Laubfrosch (Hylid). Die Unterarten mit oft sehr breiten Hautscheiben beschaffen sie sich an senkrechten Wänden festhalten und vorn ganz frei, hinten mit halber, oft sehr lang. Körper glatt, Reine schlant, Oberkiefer bezahnt, Unterkiefer mit südlichen Gegenden ungemein stark verans nur durch den grünen Laubfrosch (Taf. 21, Fig. 2), der im Wasser laicht, übernachtet und als Wetterprophet gilt. Sie jagen auf Büschen und in Wäldern. Unerträgliche Schreier, meist mit großen

der Frösche (Ranida). Körper gedrungen, kleine Hautscheiben, aber ganze Schwimmhäuten hinten Zehen, sonst wie die vorigen. Der Graufrosch (Rana temporaria), auf sumpfigen Wiesen, sucht nur zur Laichzeit auf; der grüne Wasserfrosch (Rana) vorzugsweise im Wasser. Beide haften Sprünge. Hierher auch der Hornfrosch (Stabfrosch) aus Brasilien, mit sonderlichen über den Augen (Buchstaben) ophrys Boiei, Fig. 8).

der Unken (Bombinator). Haut warzig wie bei den Kröten, dagegen der Ober-, wie bei den Fröschen. Leben meist in Mergel oder Schlamm, und suchen nur in das Wasser auf. Hierher die Geburtshülfe (Alytes obstetricans, Fig. 5), an thörichten Rainen. Das Männchen widelt eine um die Hinterfüße und vergräbt sich dergestalt, bis die Kiemen der Jungen verand. Hierher auch die Unke (Bombinator, 6), oben grau, unten blau und gelb kumpeln, bekannt durch ihre glodenähnlichen.

der Kröten (Bufonida). Körper plump, kaum zum Springen geeignet, Haut warzig, zahlos. Nächstliche Thiere, die besonders ung von Landschnecken sehr nützlich werden, in Gängen leben und das Wasser nur zum es in Schnüren geordneten Laich auf: Hautabsonderung ist giftig. Außer der

gemeinen Kröte (Bufo vulgaris, Fig. 7), die faustgroß wird und graubraun ist, haben wir noch die kleinere grüne (Bufo viridis) und die Kreuzkröte (Bufo calamita).

Die Familie der zungenlosen Froschlurche (Aglossa) zeigt einen dreieckigen, flachen, niedergedrückten Kopf mit verhältnismäßig kleinen runden Augen, breiten, krötenartigen Körper, sehr kräftige Hinterfüße mit fünf Zehen, welche in ihrer ganzen Länge durch eine Schwimmhaut verbunden und von denen die drei vordern bei der Capkröte (Dactylethra) mit busartigen Klauen am Ende versehen sind. Das Paukenfell ist gänzlich verdeckt, die Zunge fehlt durchaus, die eustachischen Trompeten münden im Grunde des Rachens in einer einzigen mittleren Oeffnung aus. Die Begattung ist bei beiden Gattungen, welche diese Familie zusammensetzen, verschieden, indem bei der Capkröte der Oberkiefer kleine, spitze Zähne, wie bei den Fröschen, trägt, während bei der surinamischen Kröte oder Pipa (Asterodactylus Pipa, Fig. 9), beide Kiefer vollkommen zahlos sind. Letztere ist zudem von langer Zeit her durch ihre eigenthümliche Fortpflanzungsweise bekannt. Die Rückenbaut des Weibchens zeigt nämlich grubenartige Vertiefungen, in welche das Männchen bei der Begattung die befruchteten Eier einstreicht. Mit dem Wachsen der Larven dehnen sich auch diese Hautzellen aus, so daß die Jungen ihre ganze Entwicklung bis zur vollständigen Ausbildung der Füße und bis zum Verluste des Schwanzes in diesen Zellen durchmachen.

Ordnung der Schwanzlurche (Urodela oder Caudata).

Körper langgestreckt, Reine niedrig, oft unvollkommen entwickelt, zuweilen Kiemen im erwachsenen Zustand. Langer Schwanz während des ganzen Lebens.

Der Körper dieser Thiere ist mehr oder minder langgestreckt, die Extremitäten, wenn solche vorhanden, klein, kurz, weit voneinandergestellt, so daß sie den Körper kaum zu tragen vermögen, der Schwanz von mittlerer Länge, meist seitlich zusammengedrückt, eine directe Fortsetzung des Rumpfes. Die ganze Gestalt gleicht in vieler Beziehung derjenigen der Eidechsen, so daß man auch früher die Molche in der That zu den Eidechsen zählte, bis eine genauere Bekanntschaft mit ihrer innern Organisation ihnen die richtige Stelle anwies. Der Kopf dieser Thiere ist stets sehr niedergedrückt, breit, vorn mehr oder minder abgerundet, die Nasenlöcher an der Spitze der Schnauze befindlich, sehr klein und unmittelbar durchgehend, so daß die innern Nasenöffnungen sich vorn in dem Rachen unmittelbar hinter oder selbst vor der Reihe der Kieferzähne befinden. Die Augen sind sehr verschieden entwickelt, bald sehr klein, rudimentär und gänzlich von der undurchsichtigen Haut überzogen, in andern Fällen größer, deutlich, aber durchaus ohne Augenhäute, in die durchsichtige Haut eingesenkt: bei den noch höher entwickelten Familien halbbugelförmig vortretend, zurückziehbar wie bei den Fröschen und mit vollständigen Augenhäuten versehen. Eine äußere Ohröffnung fehlt stets und an dem innern Ohr existirt keine Paukenhöhle, sondern nur das Labyrinth mit seinen verschiedenen Bildungen. Hinsichtlich der Entwicklung der Füße beobachtet man bei den ausgebildeten Gattungen alle Stadien, welche sich bei den Larven der höchststehenden Familie, der Salamander, zeigen. So wie aus dem langgestreckten, fischähnlichen Körper der letztern zuerst die Vorderbeine hervorbrechen in Gestalt kleiner unbedeutender An-

hängel mit kaum getrennten unförmlichen Zehen, wie dann nach einiger Zeit die Hinterfüße hervorkommen, ebenfalls anfangs in rudimentärer Ausbildung, so sehen wir auch hier in aufsteigender Linie Gattungen mit zwei Vorderfüßchen, die nicht einmal die Größe eines Kiemenbüschels erreichen und nur drei unförmliche Zehen haben, andere mit ebenso rudimentären Hinterfüßen, und können so eine stete Stufenfolge bis zur Ausbildung zweier fast gleicher Fußpaare mit wohlentwickelten Zehen, die in seltenen Fällen Nägel tragen, verfolgen. Hinsichtlich des Schwanzes zeigen sich ähnliche Entwicklungsstufen; anfangs erscheint er breit, plattgedrückt, mit seitlichen, in Hitzad angelegten Muskelstreifen, wie derjenige eines Fisches mit häutiger Stoffe gekäumt, später mehr abgerundet ohne Flossensaum mit trichterförmig ineinanderstehenden runden Muskeln besetzt. Denselben Gang der Ausbildung zeigen die Athmorgane; bei den niedersten Formen stehen Kiemen und Lungen in gleicher Bedeutung für die Athmung da, ja die erstern überwiegen bedeutend; wie bei den Froschlurven, so finden sich hier quastförmige ober baumartig verzweigte Kiemenbüschel, welche mit der äußern Haut zusammenhängen und mit ihrer Wurzel auf den sonst freien Kiemenbögen aufliegen. In andern Fällen sind zwar äußere Kiemen nicht mehr vorhanden, dagegen existirt eine Kiemenpalte auf jeder Seite des Halses, die zu den freien, durch Spalten getrennten Kiemenbögen führt, welche auf ihrer convergen Seite mit Athemfransen besetzt sind; bei den höhern Familien endlich schließt sich die im spätern Larvenzustand vorhandene Kiemenpalte völlig, die innern Kiemenfransen verschwinden, die Kiemenbögen bilden sich zurück und die großzellige, sackförmigen Lungen dienen einzig und allein der Athmung. Alle Molche haben in dem Obertier so wol wie in den Gaumenbeinen Zähne, die gewöhnlich zwei vollkommen parallele Bogen bilden, zwischen welche der Zahnbogen des Untertieres eingreift; die Zähne selbst sind stets nur einfache spitzige Gabelzähne, oft so klein und im Zahnfleisch verborgen, daß man sich von ihrer Anwesenheit eher durch das Gefühl als durch das Gesicht überzeugen kann. Der Raum zwischen den bogenförmigen Untertierzähnen ist von der runden Zunge ausgefüllt, die meist mit ihrem ganzen Grunde festgewachsen und nur an dem Rande frei ist, deren Anheftung aber sich oft sehr verengert, so daß sie dann die Gestalt eines Hutpilzes hat, der mit einem dünnen Stiele auf dem Grunde der Mundhöhle fest sitzt.

Fast alle Molche halten sich zeitlebens im Wasser auf, meistens in seichten, schlammigen Sümpfen, seltener in größern Seen, niemals im Meere; nur die am höchsten ausgebildeten Gattungen leben auf festem Lande, aber auch hier nur an feuchten, schattigen Orten, und verlassen ihre Schlupfwinkel nur nach Regen und starkem Thau, um ihrer aus Insekten und Würmern bestehenden Nahrung nachzuschleichen. Die größern in Seen und Sümpfen lebenden Arten nähren sich ebenfalls von Insekten und Fischen. Die auf der Erde lebenden sondern einen äßenden, giftigen Milchsaft aus.

Gruppe der Molche.

Ohne Kiemen und Kiemenlöcher.

Familie der Salamander (Salamandridae). Wirbel conves, concav, Augen mit Lidern; große Ohr- und Seitendrüsen, die Milchsaft absondern; alle Füße wohl ausgebildet, ohne Schwimnhäute, Schwanz lang und rund. Nächtliche Erdthiere, die an feuchten Orten sich verstecken und lebendige Junge gebären. Die Gattung geschieht durch Andrücken der Geschlechts-

spalten, innerhalb welcher beim Paarung der Erdsalamander (Salamandra atra, Fig. 10), der im Wasser 30–40 Zentimeter Kiemenbüscheln abseht, während der Erdsalamander der Hochregionen nur paarige Zehen zur Welt bringt. Hierbei mexicanischen, gelb gestreiften Erdstoma punctatum, (Fig. 16), die in diesen Vereinigten Staaten verbreitet. Larven zuerst aus dem See, wie der Name Axolotl (Siredon punctatus) bekannt wurden, große grau gefleckte Thiere, die wie Fische gehen. Paar äußere Kiemenbüschel tragen in ihrem Baue Molchlurven gleichen. unterscheiden sie sich dadurch, daß gebrochenen Generationsfolgen sich anpassen, weshalb man sie früher als Thiere hielt. Nichtsdestoweniger sind aber fortpflanzungsfähig in diesem manche von diesen Larven verlieren die Kiemenlöcher und werden (Ambystoma punctatum, Fig. 16). der spanische Rippenmolch (Rippen Pleurodeles Waktli, Fig. 12), mit den Rippen, und der winzige Brillen Salamandrina perspicillata, Fig. 14. Familie der Wassermolche (Triton) vorigen, aber mit seitlich zusammengelegten Flossen umförmigen Ruderschwanz. In Tümpeln und kleinen Bächen und einzeln an Wasserpflanzen ab. Die Kiemen, die sie auch oft den Boden halten. Bei unserm Flossmolch (Triton cristatus, Fig. 14). Männchen einen gezackten Kamm zur Paarungszeit.

Familie der Riesmolche (Cryptobranchus) breit, platt, Augen sehr klein, kurze platten Zehen, zusammengedrückter Kiemenbogen erhalten aber weder Kiemenlöcher. Hierher der japanische Riesmolch (Megalobatrachus maximus, Fig. 14) lang, träge aber tüchtiges Thier.

Gruppe der Lochmolche (Dermatophrynidae) ohne Kiemen, aber mit bleibenden Löchern am Halse.

Familie der Aalmolche (Amphyrina) gestreckt, aalförmiger Körper, drei Zehen an den kleinen, weit auslaufenden Füßen. Die abgebildete Art (Ammoloch tridactylum, Taf. 21, Fig. 17), ist von Carolina, bis 3 Fuß lang.

Familie der Fischmolche (Menopoma) kurz, molchartig, vorn fünf, hinten zwei Zehen.

Gruppe der Kiemenmolche (Ichthyophrynidae) bleibende Kiemenbüschel.

Familie der Armmolche (Sirenidae) aalförmig, keine Hinterfüße, stummelartige Füße, drei Kiemenpalten mit seitlichen Kiemenbögen. Die abgebildete Art (Armmolch, Sirena lucasii, Fig. 19) in Carolina, dreizehlig.

Familie der Olme (Proteidae) vorn drei, hinten zwei Zehenstummel, drei Kiemenpalten. Die abgebildete Art (Olme, Proteus, Fig. 18) in den Höhlengebirgen.

tien, hat rudimentäre, unter der Haut ver-
tgen, einen sehr langen Körper von Fleisch;
eine breite Flosse am Schwanz.

ng der Schleichenlurche (Apoda).

wurmförmig, ohne Füße und
Biconcave Fischwirbel.
nur die Familie der Blindwühlen (Coe-

rper dieser Thiere, welche man früher zu
ngen zählte, hat etwa die Gestalt eines
enourms, der nach vorn und hinten fast
3 zugespitzt erscheint. Die ganze Haut ist
weich, schleimig, wurmförmig geringelt
und gelegt und in diesen Falten stecken ver-
d in besondern Taschen kleine durchsichtige
e, welche durchaus den Schuppen der Fische
nd wie diese mit concentrischen Linien besetzt
zeigt sich keine Spur von Gliedmaßen, weder
a, noch an dem Skelet. Der Kopf ist legel-
e Schnauze etwas vorgezogen, die mittel-
undspalte auf der untern Seite dieses Kegels
Der Schädel hat zwei seitliche Gelenk-
der After befindet sich ganz hinten am Ende
ers, etwas auf der Unterfläche, und zeigt
iche, gleichförmig zusammengezogene Gestalt;
tlicher Schwanz existirt mitbin gar nicht.
ischer liegen vorn an der Schnauze, hinter
ihnen findet sich bei den meisten Gattungen
eine blinde Grube, deren Bedeutung nicht
kannt ist. Die Augen sind bei allen nur
c, bei einigen Arten deutlich sichtbar, bei
inglich von der darübergespannten Haut ge-
ffnet man das Maul, so sieht man in der
andung zwei concentrische Reihen starker,
ch hinten gekrümmter Halszähne, von wel-
äußere Reihe dem Oberkiefer, die innere den
einen angehört; der Unterkiefer zeigt nur
e; zwischen seinen Keilen liegt die vollkommen
fene, rundum angeheftete Zunge. Die Lar-
ein Kiemenloch und äußere Kiemenfransen.
re Leben wie Regenwürmer in Südamerika
1.

Klasse der Fische (Pisces).

(Tafel 22 bis 24).

nathmende Kaltblüter mit einfachem
aus Kammer, Vorkammer und Vor-
bestehend, mit paarigen Kiemen und
aßen, die zu Flossen umgewandelt
aarigen Sinnesorganen und un-
in der Mittellinie aufgestellten
Die Haut meistens mit Schuppen
Leben im Wasser.
rpergestalt der Fische ist meist gestreckt, spindel-
st aber auch nach verschiedenen Richtungen
ndert. Es gibt fast runde oder elliptische
andere wieder sind so sehr von den Seiten
mmengebrückt, daß der Körper einem Bänder
er senkrecht gestellten Scheibe gleicht, deren
ante von dem Rücken, die untere von dem
gebildet wird. Bei manchen Familien findet
ch Gegenheil statt, indem, wie z. B. bei den
der ganze Körper von oben nach unten ab-
erscheint und so eine horizontale Scheibe
deren Ranten von den Rändern der Brust-
ebildet werden. Die Eintheilung des Körpers
onen unterliegt besondern Schwierigkeiten;
f ist niemals von dem Rumpfe durch einen
rennt, sondern im Gegenbeile so in einer
mit den Contouren desselben fortgesetzt, daß

keine Trennung nachgewiesen werden kann. Bei den
meisten Knochenfischen zeigt sich zwar eine solche
Trennung äußerlich durch die Kiemenöffnung, welche
auch im gemeinen Leben das Ohr der Fische genannt
wird; allein da bei diesen die sonst am Halse ange-
brachten Kiemen unter den Kopf selbst gehoben sind,
so ist dieser Spalt vielmehr die Grenze zwischen Hals
und Rumpf. Ein Schwanz kommt allen Fischen ohne
Ausnahme zu, d. h. eine hintere Fortsetzung des
Körpers, welche das wesentlichste Bewegungsorgan
bildet und keine Eingeweide mehr birgt; allein auch
hier läßt sich die Grenze des Schwanzes meist nur
durch die Lage des Afters von außen bestimmen, da
der Rumpf ganz allmählich in denselben übergeht und
die Stellung der hintern Gliedmaßen seine Grenze
durchaus nicht angibt.

Da die Fische lediglich nur zum Aufenthalt im
Wasser bestimmt sind, so ist auch ihr ganzer Körper-
bau, und namentlich die Bewegungsorgane diesem
gemäß eingerichtet. Mächtige Muskeln liegen zu beiden
Seiten der Wirbelsäule vom Kopfe bis zur Schwanz-
spitze hin und bilden eigentlich nur zwei Hauptmassen,
die indessen meistens noch seitlich so getheilt sind, daß
man vier Muskelzüge unterscheiden kann, zwei obere
zu beiden Seiten der Dornfortsätze gelegen und den
Rücken bildend, und zwei untere unter der Wirbel-
säule auf den Rippen und den untern Dornfortsätzen
sich hinziehend, welche die Bauchwandungen und die
untere Seite des Schwanzes bilden. Diese Haupt-
muskelmassen dienen wesentlich nur zur kräftigen Seit-
wärtsbewegung des Rumpfes und Schwanzes und
zeigen eine eigenthümliche Bildung, indem sie gewisser-
maßen in eine Menge von Ringen zerfallen, welche
durch Sehnenblätter voneinander getrennt sind, deren
je eines einem Wirbel mit seinen Dornfortsätzen und
Rippen entspricht. Diese Sehnenblätter sind der Stellung
der Fortsätze gemäß gebogen, so daß man nach dem
Abziehen der Haut auf der Oberfläche parallele Zickzack-
linien sieht, welche diesen Sehnenblättern entsprechen
und auf einem queren Durchschnitte gewahrt, daß diese
Muskelsblätter tutenartig ineinanderstehen.

Zur Vergrößerung der Oberfläche, welche der Körper
beim Schwimmen bietet, dienen die senkrechten
Flossen, welche keinem Fische fehlen und beim Em-
bryo aus einem Hautsaume hervorgehen, der sich um
den ganzen hintern Theil des Körpers, vom Anfange
des Rückens bis zum After hin erstreckt und zuweilen
in seiner ganzen Länge bestehen bleibt (Aale). In
den meisten Fällen aber schwindet der Hautsaum an
einzelnen Stellen, entwidelt sich dagegen an andern
und wird dann meistens durch Strahlen verschiedener
Natur (hornig, knöchern u. s. w.) gestützt. Meist ge-
schieht die Trennung so, daß drei Abtheilungen her-
vortreten; eine, welche den Rücken einnimmt, Rücken-
flosse (Pinna dorsalis), eine andere, das Ende des
Schwanzes behauptende, Schwanzflosse (Pinna cau-
dalis), und eine dritte, die an dem untern Rande, meist
unmittelbar hinter dem After angebracht ist und die
Afterflosse (Pinna analis) genannt wird. Rücken-
und Afterflossen können in mehrfacher Zahl vorkommen,
wie denn überhaupt in Gestalt, Bildung, Erstreckung
und Vorhandensein dieser Flossen die größte Mannich-
faltigkeit herrscht. Es sind diese Flossen stets von
Strahlen gestützt, zwischen welchen eine dünne, aber
feste Haut ausgespannt werden kann; nur bei einigen
Familien findet sich auf dem Rücken eine kleine Flosse,
die keine Strahlen besitzt und die Fettflosse (Pinna
adiposa) genannt wird. Die Strahlen selbst aber,
welche sowohl in diesen als in den paarigen Flossen
vorhanden sind, zeigen sehr verschiedene Natur. Bei

den Knorpelfischen finden sich hornige, ungegliederte, weiche, biegsame Strahlen in ungemeiner Anzahl, die sich zerfasern und gewöhnlich auf Querreihen cylindrischer Knorpelstücke aufgesetzt sind, welche meist, besonders an den Brust- und Bauchfloßen, die Basis des Theils der Floße bilden, der die Strahlen zeigt. Außer diesen Strahlen findet man bei den Knorpelfischen noch große Stacheln, höchstens aber nur einen in einer Floße, die aus Zahnschubstanz bestehen, innen hohl sind und oft auf einem Knorpelzapfen aufliegen. Bei den Knochenfischen trifft man zwei Arten von Strahlen in den Floßen; in dem einen Falle sind diese Strahlen einfache Knochenstacheln, die spitz zulaufen und an ihrem untern, etwas verdickten Ende die Gelenkfläche tragen, mit der sie auf dem Floßenträger befestigt sind. Meist sind diese Stachelstrahlen hart und spröde, so daß sie selbst empfindlich verwunden können, und nur bei wenigen Familien erscheinen sie so dünn und zart, daß sie weich und biegsam werden. Sie können sich mit Ausnahme der Schwanzfloße in allen übrigen Floßen finden, bilden aber immer nur die vordere Partie der Floßen und werden stets nach hinten von weichen Strahlen gefolgt. Diese weichen oder gegliederten Strahlen bestehen zwar meist ebenfalls aus Knochensubstanz, sind aber der Quere nach in einzelne Abtheilungen zerlegt und zertheilen sich zugleich der Länge nach dichotomisch, so daß sie, je länger sie werden, desto mehr sich fächerartig ausbreiten, während sie zugleich dünner und biegsamer werden. Alle diese Strahlen sind auf besondern Knochen eingelenkt, welche in der Mittellinie zwischen den großen Muskelmassen stehen und meistens die Gestalt einer mit der Spitze nach innen gerichteten Dolchklunge zeigen. An diesen Floßenträgern setzen sich kleine Muskeln fest, welche die Strahlen aufrichten und niederlegen, also die zwischen ihnen liegende Floßenhaut spannen und erschlaffen können.

Die paarigen Floßen entsprechen, wie schon bemerkt, den Gliedmaßen der übrigen Wirbelthiere und zeigen als solche eine von den seitlichen Floßen durchaus verschiedene Structur, wieweil die Bildung ihrer Strahlen mit der bei jenen vorkommenden übereinstimmt; die Brustfloße (*Pinna pectoralis*) fehlt zuweilen ganz, meistens ist sie vorhanden und steht dann immer unmittelbar hinter den Kiemen am Beginne des Rumpfes; sie besteht ursprünglich aus drei Theilen, aus dem Schultergürtel, welcher eine bogenförmige Gestalt hat und anfangs aus einem einzigen Knorpelstücke besteht, welches bei der Verknöcherung in mehrere Stücke zerfällt, die man als Schulterblatt, Schlüsselbein und Rippenbein unterschieden hat; aus einem mittlern, kurzen, aus kleinen Knöchelchen bestehenden Stücke und dann aus den Strahlen, welche zuweilen eine so bedeutende Länge erreichen, daß die Floßen als unvollkommene Lufruder (bei den fliegenden Fischen) dienen können. Selbst wenn, was selten, die Brustfloßen fehlen, ist doch der Schultergürtel entwickelt. Die Bauchfloßen (*Pinnae abdominales*) fehlen oft gänzlich; man nennt solche Fische fußlose (Apodes); sie sind sehr einfach gestaltet, kaum in Verbindung mit dem übrigen Skelet, und können eine verschiedene Stellung einnehmen. Bei den meisten stehen sie unter dem Bauche, dem After etwas näher als der Kelle; dieß sind die Bauchfloßer (*Pisces abdominales*). Zu diesen gehören z. B. die Karpfen und Forellen.

Bei den Brustfloßern (*Pisces thoracici*), zu denen unser Varich zählt, stehen die Bauchfloßen entweder unmittelbar unter oder dicht hinter den Brustfloßen, so daß ihre Träger innen meist an dem Schultergürtel

befestigt sind. Bei den Kehlfloßern endlich, von denen in unsern Fischen die Alaquappe oder Träfsche (*Lota*) zu nennen ist, stehen die Bauchfloßen noch vor den Brustfloßen in dem dreieckigen Kehlraume, und diese sind gewöhnlich an dem Vereinigungspunkte mit dem Schultergürtel befestigt. Diese verschiedene Stellung der Bauchfloßen und viele Naturforscher nach der wesentlichen Grundlage der Eintheilung der Fische benutzt werden darf, so kann man auf der andern Seite nicht verkennen, daß in andern Eigentümlichkeiten der Organe Zusammenhang steht und deshalb eine Berücksichtigung verdient.

Die Haut der Fische und die Deckungen, welche ihr angehören, verdienen eine besondere Aufmerksamkeit wegen einer ganz besondern Eigenschaft. Allgemein findet man dieselbe aus mehreren Schichten zusammengesetzt, einer tiefer verschlungenen Zellgewebsfasern gebildet, die verschiedene Schuppen und Dornen im Innern trägt, über welche eine Oberhaut gebreitet ist, die meist sich in zähen Schleim auf der Außenseite auflöst. Die verschiedenen Arten der Fische die oft so lebhaft glänzend leuchten, bestehen meistens aus fetten Schuppen, die theils in der Dicke der Haut zwischen ihr und der Oberhaut abgesetzt, theils die Silberfarbe, die fast bei allen Fischen und bei vielen sich auch über innere Theile ausbreitet, und die Schwimmblase z. B. durch eine eigenthümliche, dünnen mitroskopisch vorgebrachte, die abgeplattete Hornschuppe gebildet.

Bei manchen Fischen findet sich eine zweite Haut; bei den meisten aber Schuppen. Diese bestehen aus Plättchen von horniger Consistenz, welche in Taschen der Haut sich bilden und auf eine Weise dachziegelförmig übereinander gelagert sind, die einen völligen Panzer um den Körper bildet. Uebereinanderlagerung, welche indes selbst z. B. bei den Aalen, gänzlich fehlt. Jeder Theil der Schuppen auf der Oberseite während der vorbereit, tiefer in der Haut verankert. Die von der vorbereitenden Schuppe. Die gewöhnlichen Schuppen zeigen eine runde Fläche eine große Anzahl concentrischer Ringe, bald mehr, bald minder vollständige. Der Mittelpunkt beschreiben, der bald in der Mitte, bald mehr nach hinten liegt, und diese Linien meist unregelmäßig werden. In concentrischen Linien sieht man auf den Schuppen Streifen, welche von dem Centrum her nach außen gehen, manchmal sehr zahlreich, die als Ringe oder Spalten darstellen, die die förmlichen Netze bilden. Der hintere Rand kann entweder glatt abgerundet, oder leicht gezackt, oder selbst mit Stacheln besetzt. Man hat die ersten Rumpfschuppen (Cyclopterygii) genannt. Die Bildung eine größere Bedeutung für die Fische zugeschrieben, als ihr wirklich zukommt. Die Schuppen dicker, so bilden sich aus der Knochenkörperchen und endlich wahre Knochen, die dann wie von einer Schmelzlage überzogen, indem die äußere Lage seine Ausläufer in Körperchen zeigt, ähnlich der Zahnschmelz. Die Fische, welche solche dicke Knochen haben, die bald vieredig, bald rund sind, werden (Ganoidei) genannt; später aber den Knochenfische.

iedener Bedeutung auf eine besondere Ordnung verwendet. Endlich kann die Zahnsubstanz so werden (bei Rochen und Haien), daß man den Hautzähnen sprechen kann, welche ebenso harte Haut steden, wie die Kieferzähne in der Haut. Nach anderer Richtung hin entwickeln sich die Knochenplatten zu Knochenplatten, welche neben den und einen förmlichen Panzer bilden (offersche), und solche Hautknochen treten Körper in innige Verbindung mit dem innern werden auf solche Weise Schädelknochen. heile der Schuppen oder Knochenplatten können acheln, Gelen u. s. w. entwickeln.

den angeführten Dedgebilden findet man noch allen Fischen besondere Kanäle in der Haut e mit der Schleimabsonderung im Zusammenen sollen und deshalb die Schleimgänge werden, wahrscheinlich aber eine ganz andere haben. Der Schleim, welcher die Oberische schlüpfrig macht, ist in Wahrheit nur: Schicht ihrer im Wasser aufgeweichten Oberische sich ganz so verhält, wie die Oberhauterer Zunge oder der innern Darmhaut. Die e Schleimgänge selbst bestehen aus einem kanale, der meistens in der ganzen Länge s sich hinzieht, von einer faserigen, sehr leimhaut ausgekleidet ist und eine Menge mälchen absondet, welche durch besondere nach außen münden. Die aufeinander: heile dieser Schuppen bildet die sogenannten, die sich bei den meisten Fischen außen e erkennen läßt und vielfachen, zur Charactertungen und Arten sehr brauchbaren abheiten unterliegt. Gegen den Kopf hin steht denkanal meistens mit besondern Röhren in ig, die gewöhnlich in den äußern Schädel: der in eigenen Knochenröhren eingeschlossen mehr oder minder weit an dem ganzen Körper iten. Es gehen diese Röhren von besondern n aus, die an ihrem Grunde stets Nerven welche sehr eigenthümliche Gefäße bilden, Abbreitungen der Hörner in den Am: halbkegelförmigen Kanäle gleichen und so Vermuthung leiten, daß man es hier eher eigenthümlichen Sinnesorgane zu thun habe. uermuthungen Knochenfischen sind diese Kanäle: und ihre knospenartigen, nervenreichen An: anders stark entwickelt und mit einer gallert: alze erfüllt, welche auch nicht die mindeste t mit dem Schleime hat, der die Oberfläche überzieht.

Skelet läßt sich die allmähliche Ausbildung jederseits bei den Embryonen und den letzten Klassen ausgeprägten Anfängen an verfolgen. st die Wirbelsäule betrifft, so läßt sich bei n und einigen Canoiden noch keine Spur Körpern entdecken; es existirt nur eine Rücken: rda dorsalis), auf welcher obere und untere te aufliegen, die sich zum Rücken- und Blut: ammenzuschließen und nach oben Dornfortsätze, en Rippen ausstrahlen. Bei den Seelapen a) beginnt die Bildung der Wirbelkörper in n Ringen, welche in der Scheide der Chorda Bei allen übrigen Fischen endlich tritt eine r minder vollständige Verknöcherung ein, so: einer Wirbelsäule eine Reihe von Wirbel: hintereinander liegt, die gewöhnlich eine e Gestalt haben und häufig in der Mitte zu: drückt sind. In diese Wirbelkörper, die bei pelschen nur neßförmig verknöchern, erscheinen

meistens die oberen und unteren Bogenfortsätze zapfen: artig eingesenkt, sodas sie sich nicht selten mit Leichtig: keit trennen lassen. Die Wirbelkörper selbst sind bei den meisten Fischen vorn wie hinten in der Weise kegelförmig ausgehöhlt, daß die Spitzen dieser Höhl: lungen in der Mitte der Wirbelachse zusammentreffen und hier durch ein kleines Loch miteinander verbunden sind. Die Wirbelkörper berühren einander demnach nur mit ihrem äußern Rande und lassen doppelkegel: förmige Höhlungen übrig, welche mit einer gallert: artigen Substanz, dem Reste der ursprünglichen Wirbel: saite, ausgefüllt sind. Nur ein einziger von allen bis: jetzt bekannten Fischen, der Knochenhecht (*Lepidosteus*), erhebt sich über diese Bildung, indem bei ihm Wirbel: körper vorkommen, die vorn einen Gelenkkopf und hinten eine runde Gelenkhöhle besitzen. Auf diesen Wirbelkörpern, die bald knorpelig, bald mehr oder minder verknöchert sind, stehen die oberen oder Nerven: bogen, welche meistens über dem Rückenmark zu einem einfachen Dornfortsätze verschmelzen, dessen Basis zuweilen noch einmal auseinanderweicht, um ein faseriges Längsband zu bilden. Meist gehen von der Basis dieser oberen Bogen noch eigene schiefe Fortsätze oder Gelenkfortsätze aus, welche nach hinten und vorn mit den entsprechenden Fortsätzen der anstoßenden Wirbel articuliren. Die unteren Bogenstücke sind in der Bauchgegend gewöhnlich nach außen gerichtet und stoßen in dieser Gegend in der Mittellinie nur selten zusammen, um einen Kanal für die Nerven und die Hohlvene zu bilden; dagegen tragen diese mehr nach außen gerichteten unteren Bogen, welche man auch die Blutbogen nennen könnte, die die Bauchhöhle um: fassenden Rippen. Weiter nach hinten, gegen die Schwanzgegend hin, treten diese Bogenstücke in der Mitte zu einem Kanale für die Gefäße zusammen, ob: gleich sie dort noch häufig Rippen tragen, und in dem Schwanz selbst vereinigen sie sich meistens zu einem langen Dornfortsätze, sodas hier ihre Bildung voll: kommen derjenigen der oberen Bogen entspricht. Die Rippen, welche zuweilen sehr stark sind, in andern Fällen gänzlich fehlen, vereinigen sich niemals in ein eigentliches Brustbein, sondern endigen stets frei im Fleische. Zuweilen, wie bei den Seringen, ist freilich das Brustbein durch eine starke Reihe scharfer gefiederter Schuppen angebeutet, mit denen die Rippen durch Sehnenbänder verbunden sind. Außer diesen auch sonst bei den übrigen Wirbelthieren vorkommenden Bildungen finden sich bei vielen Fischen noch besondere knochige Stacheln oder Fleischgräten, welche sich in den Sehnenblättern bilden, die man an den Massen der Seitenmuskeln beobachtet. Zuweilen werden diese Fleischgräten so ausnehmend stark, daß man sie selbst mit den Rippen verwechseln kann, mit denen sie gewöhnlich in mehr oder minder genauer Verbindung stehen.

Die Bildung der Schwanzflosse ist nicht ohne Wichtig: keit. Bei den Embryonen krümmt sich zu einer gewis: sen Zeit das Ende der Chorda mit den darum entstehenden Wirbelkörpern nach oben und die Strab: len der Flosse setzen sich unter diesem emporgebogenen Ende an, sodas dasselbe in den oberen Lappen der Schwanzflosse sich fortsetzt. Man hat diese Flossen, die z. B. bei vielen Haien vorkommen, heterocercle genannt. Bei den meisten Knochenfischen werden die Strahlen der Schwanzflossen von einer zusammen: gesetzten Knochenplatte getragen, welche das Ende der Wirbelsäule und der Wirbelkörper enthält. Solche Flossen heißen homocercle. Weibe Flossenarten, in ihren äußersten Formen wol geschieden, gehen durch so allmähliche Uebergänge zusammen, daß keine Grenze bestimmt werden kann.

An dem Schädel zeigt sich deutlich die allmähliche Ausbildung von einem knorpeligen Ur Schädel, Primordialschädel aus, der anfangs eine knorpelige, ungetheilte Hülle um das Gehirn und die Sinnesorgane bildet. So zeigt sich der Schädel der Quermäuler (Plagiostomen) als eine mehr oder minder vollständige Knorpelkapsel um das Gehirn, mit becherförmigen Ausbreitungen zum Schutze der Augen und der Nase und innern Räumen für das Gehörorgan, und einem Geleite gegen den Hals hin, ohne eine Spur von Deckplatten oder eigentlichen Knochenbildungen. Bei den Störern zeigt sich dieselbe Knorpelmasse, in welcher das vordere Ende der Wirbelsäule steht, ohne daß eine Spur eines Gelenkes vorhanden wäre; aber dieser knorpelige Ur Schädel ist von oben wie von unten mit knöchernen Deckplatten belegt, die nur seitliche Lücken für die Anheftung des Kiefergarnapparates lassen. Indessen gehören die obere Deckplatten nicht jenem scharf bestimmten Systeme an, das bei den übrigen Knochenfischen ausgebildet ist und den Schädel bildet, sondern es sind bloße Hautknoten, vollkommen ähnlich denjenigen, welche auch auf dem Rumpfe entwickelt sind, deren Zahl und Gestalt sogar von einer und der andern Art wechselt. Auf der Unterseite des Schädels findet sich nur eine einzige knöcherne Platte, die sich sogar nach hinten über den Raum erstreckt, welcher den ersten Halswirbeln entspricht.

Bei den sämtlichen Knochenfischen nun lassen sich deutlich die allmählichen Fortschritte der Verknöcherung des Schädels darthun. Fast bei allen erstirt unter den Knochen, die sich zu einer mehr oder minder vollständigen Kapsel zusammenlegen, eine knorpelige Grundlage, die ebenfalls eine Hülle um das Gehirn bildet und als die ursprüngliche Schädelkapsel, als der Ur- oder Primordialschädel angesehen werden muß. Unter unsern gewöhnlichen Schwammschädeln sind es vorzüglich die Forellen und der Hecht, bei welchen diese knorpelige Schädelgrundlage in größter Ausbildung während des ganzen Lebens entwickelt bleibt, so daß man an einem gefochten Kopfe die größte Zahl der Schädelknochen abnehmen kann, ohne das Gehirn anders als stellenweise bloßzulegen, indem es fast überall von der innern knorpeligen Kapsel des Ur Schädel umschlossen bleibt. Es ist sehr wohl in das Auge zu fassen, daß diejenigen Schädelknochen, welche wir mit dem Namen der Deckplatten bezeichnen, sich durchaus nicht aus diesem ursprünglichen Knorpel entwickeln, sondern aus häutigen Grundlagen, die niemals vorher in Knorpel übergehen, und daß die Deckplatten nur durch ihr Wachsthum die ursprüngliche Knorpelkapsel verdrängen; bei den Barschen ist dies schon mehr der Fall als bei den Hechten; bei den Weißfischen erhalten die Knochenbildungen durchaus das Uebergewicht, und bei den Aalen ist die ursprüngliche Knorpelkapsel durchaus verschwunden im erwachsenen Zustande und gänzlich durch die Knochen verdrängt. Die Knochen aber, welche den Schädel sowie das sonstige Kopskelett zusammensetzen, sind trotz äußerst verschiedener Formen stets nach demselben Grundplane gebaut und entsprechen den Schädelknochen der höhern Wirbelthiere, bei denen sie sich auf analoge Art bilden, wenigstens die knorpelige Schädelgrundlage bei diesen stets nur im embryonalen Zustande vorhanden ist.

Der durch die Vereinigung seiner verschiedenen Knochen gebildete Schädel zeigt sich nun als eine vollständige Kapsel, die das Gehirn und die Ohren gänzlich einschließt, für Augen und Nase dagegen mehr oder minder tiefe Gruben zeigt. Gewöhnlich sind die Nasengruben vollständig getrennt und setzen sich nach hinten

durch die knorpelige Masse, welche den Kiemenschwanz bildet, in zwei nur von den Geruchsorganen durchzogene Kanäle fort, welche sich in die meist gegen Augenhöhlen öffnen. Diese sind meist in der Mitte nur durch eine häutige Scheidewand getrennt, wie bei dem knöchernen Schädel sie in ein durchgehendes Loch zusammenfließen, welches oben von den Nasenbeinen, unten von dem Keilbeine gedeckt ist. Die Höhlen für die Gehörgänge sind theils in knöchernen Knochen, theils in den Knorpeln angedeutet und zwar in der Weise, daß ein Theil davon mit der Hirnhöhle zusammenfließt. Auf der Unterseite des Schädels zeigen sich sehr wechselnde Kieferkämme und Keiten, deren Bildung sei für die einzelnen Gruppen und Familien sehr charakteristisch. Namentlich erhebt sich gewöhnlich auf der Unterseite des Hinterkopfs ein mehr oder minder hoher, aus dem obern Hinterkopfsbeine gebildeter Kamm, der sich zuweilen über den ganzen Schädel erstreckt, oft noch von zwei seitlichen Kammern begleitet, die durch tiefe Gruben getrennt sind.

Als besondere Anhänge des Schädels zeigen sich noch zwei verschiedene Gruppen fester Theile, der Lippenknorpel bei den meisten Knorpelfischen und die Knochen der Schleimkanäle bei den meisten Knochenfischen. Erstere sind bei den Knochen nur schwach, bei den Haien dagegen oft so stark entwickelt, daß sie den Kiefer an Größe übertreffen. Als Schleimkanäle stellen sich bei den meisten Knochenfischen, besonders diejenigen Gebilde hin, welche sich in den vollständigen Galtstreifen um den untern Rand der Augenhöhle herumziehen, ja bei einigen, den Haien, sogar sich so weit ausdehnen, daß sie sich hinten mit dem Vorderbedel vermaachen und so eine förmliche Panzer für die Wange bilden.

Von besonderer Wichtigkeit, auch für die Systematik, erscheinen die beweglichen Knochen, welche die Kieferkapsel und den Kiemerapparat umgeben. Der eigentliche Oberkiefer fehlt nur den Seelägen (Cyprinodontes), wo die breiten Zahnplatten unmittelbar auf der Unterseite des Schädels angewachsen sind, die auch der Unterkiefer sich mit seinem durch den Schädelfortsatz getragenen Gelenk anheftet. Bei den Haien und Knochen ist der vom Schädel getrennte Oberkiefer durch ein Gelenk mit dem Unterkiefer verbunden, dieses wieder an dem Schädel durch den ersten Zahnbeinbogen befestigt. Bei den Störern ist der Oberkiefer so aufgehängt, daß er weit nach unten vorgestreckt werden kann. Bei den Knochenfischen ist gewöhnlich der vordere Rand des Maules von dem Oberkieferbogen gebildet, der aus zwei Paaren von Knochen besteht, mehr nach innen aus den Zwischenkiefern, Taf. 24, Fig. 7 (22), nach außen und hinten dagegen von den eigentlichen Oberkiefern (21). In selten sind die Zwischenkiefer miteinander oder mit dem Schädel verwachsen, meistens haben sie die Form eines Winkels, dessen äußerer Ast den Mundrand bildet und Zähne trägt, während der innere in einer Rinne der Schnauzenspitze eingelenkt ist. Bei den Fischen mit vorstreichbarem Maule, wie bei den Wänden und Sonnenfischen, ist dieser innere Ast des Zwischenkiefers sehr lang und gleitet dann in seiner Rinne mit Leichtigkeit auf und nieder, wodurch das Maul widerstandsfähig vorgeschoben werden kann. Der äußere Ast bildet meist für sich ganz allein den Rand der Mundspalte, so daß der eigentliche Oberkiefer hinter dem im Fleische verborgen liegt und deshalb auch von ältern Anatomen als Schnurrbartbein (Os mystacicus) bezeichnet wurde. Bei vielen Fischen, wie beim Hechte zum Beispiel, bildet der Oberkiefer zwar den hinteren

Rundrandes, trägt aber keine Zähne, und nur wenigen ist das Verhältniß so wie bei den Forellen, wo der zahntragende Oberkiefer den Zwischenkiefer anfügt und die Mundhöhle hinten so fortsetzt. Zuweilen fehlt der letztere, in andern Fällen ist er sogar in zwei Stücke zerfallen.

Die Mundhöhle finden sich die Gaumenbeine, und in der Mitte, als Deckplatte, das Kiefergelenk, die alle mit Zähnen besetzt sind.

Die Unterlieferhälften, deren jede aus mehreren Stücken (Fig. 7 [29, 30, 32]), sind nur selten in einem Winkel miteinander verwachsen, aber die Fasermasse unbeweglich verbunden. Das hintere Winkel bildende Zahnstück trägt allein

das Kiefergelenk gestaltet fast immer nur eine Hebelbewegung von unten nach oben und einer Art Flügelthür unter sich unbeweglich getragen, die mit dem Gaumenbogen fest verbunden, von beiden Seiten her die Mundhöhle begrenzen und deren Erweiterung möglich machen. Diese ist durch, auf deren Außenseite sich die Kiefergelenke, ist gewöhnlich an drei Stellen eng mit dem Schädel eingelenkt.

Im gewöhnlichen Knochenfische findet sich an der Seite des Kopfes auf diese Weise von den angestrichelten gebildeten Flügeln ein gewöhnlich dreieckiger Knochen, welcher meistens oben von der Mitte des Zitzenbeins an dem Schädel bis zum Kiefergelenk sich hin erstreckt und mit dem vorderen Rand des Zitzenbeins, des Hammbogens und des Quadratbeins eingelenkt ist. Dieser ist das Praeoperculum (34), ein Systematist sehr bedeutender Knochen, weil er einem freien Rande meist hinten an der vorderen und hier oft besondere Vorsprünge, die bei Familien und Arten eine große Beständigkeit wahrnehmen.

Der Vorderdel ist meist in seiner ganzen Länge ein Hauptarm des Schleimkanals durchgezogen, nach unten weiter auf den Unterkiefer fortsetzt seinen vortretenden Rand bergen sich die Kieferbeine, welche den Kiemendeckel zusammenfügen und eine Klappe auf der Kiemenspalte sich aufheben. Gewöhnlich ist dieser Kiemendeckel bei den übrigen Wirbelthieren kein Anhang und zu den Hauptknochen gezählt werden drei Stücke gebildet, dem Kiemendeckel (35), welcher auf seiner innern Seite eine Vertiefung trägt, mittels der er an einem Orte des Zitzenbeins eingelenkt ist; dem Kiefer (Suboperculum [36]), meistens durch den unteren Rand des Kiemendeckels verbunden dem Zwischenadel (Interoperculum [37]), ein Raum vor dem Unterdel gegen den Vorderdel anfüllt. Die gegenseitigen Verhältnisse dieser Knochen, ihre Gestalt, ihre äußeren Verzierungen in mannichfaltiger Weise und bieten vortreffliche zur Unterscheidung der Gattungen an.

Der Apparat, den wir soeben beschrieben, so zeigt sich die Mundhöhle der Fische durch vielfache Bogen beschränkt, von den meisten Kiementrägen tragen, der vordere Zungenbogen, niemals deren besteht. Die Knochen dieses Bogens laufen vorn in den Zungen-

beine (Os hyoideum [40—42]) zusammen, welches aus einer Reihe unpaarer, in der Mittellinie hintereinanderfolgender Knochenstücke besteht, die zwischen den beiden Unterkieferhälften den Kiel der Kehle bilden und an welchen auch die übrigen Kiemensbogen angeheftet sind. Nach vorn setzt sich der Zungenbein meist in einen eigentümlichen Knochen, den Zungenknochen fort, welcher die vordere Spitze der Zunge bildet und sehr häufig mit Zähnen besetzt ist. Jeder Arm des Zungenbeinbogens besteht aus mehreren Stücken und setzt sich durch einen Griffelknochen innen an den Vorderdel an. An dem äußeren unteren Rande dieses Bogens sind fast bei allen Knochenfischen platte, säbelförmige Knochen eingelenkt, die zur Spannung der Kiemenhaut (Membrana branchiostega) dienen, welche den Kiemenspalte unter der Kehle schließt. Die Zahl dieser Kiemenhautstrahlen (44) ist äußerst beständig und wichtig für die Systematik. Bei einigen Ganoiden (Häufigkeits) werden sie durch zwei dreieckige Knochenplatten ersetzt, die den Kehldraum zwischen den Unterkieferhälften von unten her decken. Bei den Knorpelfischen finden sich meist noch knorpelige Kiemenhautstrahlen, während der Kiemendeckelapparat ihnen gänzlich fehlt.

Hinter dem Zungenbeinbogen folgen einerseits an dem unpaaren Zungenbeine, andererseits an dem Schädel eingelenkt bei allen Quermäulern, Ganoiden und übrigen Knochenfischen vier harte Bogen, welche bei den meisten Knorpelfischen aus nur zwei Stücken zusammengesetzt sind, bei den Knochenfischen dagegen gewöhnlich vier besitzen und auf ihrer hintern Seite mit Kiemensblättern besetzt sind, während sie vorn gewöhnlich Stacheln oder selbst Zähne tragen, die eine Art von Keufe am vorderen Eingange des Schlundes bilden. Diese Kiemensbogen nehmen von vorn nach hinten an Größe ab und sind nach oben durch besondere Knöchelchen, die oberen Schlundknochen (Ossa pharyngea superiora) an den Schädel befestigt. Gewöhnlich sind diese oberen Schlundknochen nur klein und oft mit Zähnen besetzt, bei der Familie der Labrynthfische aber werden sie ungeheuer groß, blattförmig gewunden und dienen als Reservoir für das Wasser, welches zur Anfeuchtung der Kiemen bestimmt ist.

Als letzter Schluß der mit dem Zungenbein in Zusammenhang stehenden Knochen verdient ein unvollständiger Bogen Erwähnung, welcher bei dem Embryo zwar Kiemen trägt, die sich aber später verlieren und der bei dem erwachsenen Fische niemals den Schädel erreicht, sondern nur den Eingang des Schlundes von unten umfaßt. Gewöhnlich besteht dieser Bogen nur aus je einem seitlichen Knochenstücke, das, auf seiner Innenseite häufig mit Zähnen besetzt ist und das man die unteren Schlundknochen (Pharyngea inferiora) genannt hat. Bei einer ganzen Unterordnung von Knochenfischen sind diese Schlundknochen in der Mittellinie zu einem einzigen unpaaren Stücke verwachsen.

Das Centralnervensystem besteht aus dem Rückenmark und dem Gehirn, welches im Verhältniß zum Körper stets nur sehr klein ist, aus mehreren paarigen und einem dahinterliegenden unpaaren Theile zusammengesetzt ist und die Höhle des Schädels niemals vollständig ausfüllt. Die Nerven sind meist sehr groß und zeigen an ihrem Ursprunge oft mehrfache Ganglien; die Sehnerven bilden nur bei Knorpelfischen und Ganoiden ein Chiasma, wie bei den höheren Wirbelthieren, tauschen sich dagegen bei den Knochenfischen vollständig aus.

Die Sinnesorgane sind stets paarig und meistens vorhanden. Die Nase ist stets doppelt

und nur bei einigen, zugleich mit Zungen versehenen Fischen (Lepidosiren) mit hintern Oeffnungen in die Mundhöhle versehen. Bei allen übrigen ist die Nasenhöhle jederseits hinten blind geschlossen und liegt die gewöhnlich zierliche Sternfalten bildende Nasenschleimhaut jederseits in einer Grube, welche vorn an der Schnauze in dem Kopfnorpel angebracht ist und bald mit einer Klappe geschlossen werden kann, bei den Knochenfischen aber meistens zwei hintereinanderliegende Oeffnungen hat, von denen die vordere zuweilen eine durch eine Knochenplatte gestützte Klappe besitz. Das Auge ist meistens sehr groß, vorn abgeplattet und scheint niemals zu fehlen, ist aber bei den blinden Fischen mit undurchsichtiger Körperhaut überzogen und entbehrt dann auch der Augenmuskeln, die sonst fast stets in der Sechzahl, vier gerade und zwei schiefe, vorhanden sind. Augenlider kommen nur selten vor und erscheinen dann gewöhnlich nur als Falten, die unbeweglich sind.

Das Gehörorgan ist stets ganz im Innern des Schädels vergraben und nur aus dem innern Labyrinth zusammenge setzt, mittleres und äußeres Ohr fehlen gänzlich. Das Labyrinth besteht aus drei halbkreisförmigen Kaulen und einem centralen Theile, in welchem sich oft in einem besondern Sacke ein ungemein großer Gehörstein befindet. Der Klasse der Fische, aber sehr verschiedenen Ordnungen derselben, sind ganz eigenthümlich die elektrischen Organe, welche eine sehr verschiedene Disposition haben können.

Die Verdauungsorgane der Fische sind in mannichfacher Weise entwickelt und erreichen zuweilen einen hohen Grad von Complication. Von besonderer Wichtigkeit für die Systematik ist besonders der Eingang in die Verdauungswege, die Mund- und Rachenhöhle, deren Zusammensetzung durch verschiedene Knorpel- oder Knochenstücke wir schon vorher angaben. Es gibt in der That fast keinen Knochen unter der Zahl derjenigen, die an der Bildung der Mund- und Rachenhöhle Antheil nehmen, welcher nicht in diesen oder jenen Fällen mit Zähnen besetzt sein könnte. Einigen, wie den Stören und den Büschelkiemern, fehlen freilich die Zähne durchaus. Bei andern kommen sie nur an einzelnen Knochen vor, wie z. B. bei den Karpfen nur an den Schlundknochen; nur sehr selten sehen wir sie an allen zahntragenden Knochen entwickelt. Gewöhnlich findet man beim Dessin des Rachens eines Fisches auf dem Gaumengewölbe zwei parallele Zahnbogen, von denen der äußere den Zwischenkiefern, der innere den Gaumenbeinen angehört und einen mittlern, dem Pflugscharbeine zukommenden Streifen, während unten ein einziger Zahnbogen vom Unterkiefer und eine mittlere Reihe vom Zungenbeine getragen wird. Nach hinten zu sind gewöhnlich sämtliche Kiemenbogen und die obern und untern Schlundknochen mit Zähnen und Spitzen besetzt und bilden so einen stacheligen Eingangstrichter in den Schlund. In seltenern Fällen nehmen auch die Oberkieferknochen, die Flügelbeine und das Keilbein an der Bezahnung Antheil und vervollständigen so die an dem Gaumengewölbe sichtbaren Zahnlinien.

Form, Structur und Einsetzung der Zähne sind äußerst mannichfaltig, sodaß sich alle möglichen Uebergänge von höchst feinen und dünnen, borstenähnlichen Zähnen, bis zu ungeheuern Fangzähnen, von schneidenden und spitzen Kronen zu breiten Mahlplatten, von fast schwammigen Gebilden zu steinharten, von eingetheilten und angewachsenen bis zu ganz lose in der Schleimhaut stehenden Zähnen finden.

Die Mund- und Rachenhöhle der Fische ist gewöhnlich trichterförmig nach hinten verengt, seitlich

von den Kiemenpalten durchbrochen und ist unmittelbar in den Schlund fort. Dieser Schlund ist gewöhnlich äußerst muskulos, zuweilen trichterförmig erweitert, gewöhnlich mit Längsfalten besetzt und seiner Structur oft so wenig von dem Kiemenapparat des Magens verschieden, daß man seine Trennung nachweisen kann. Der Magen selbst ist sich gewöhnlich ziemlich scharf in einen Schlund- und Pfortnertheil, indem er meist halbkreisförmig gebogen ist. Oft findet sich an der Stelle der Pfortner ein mehr oder minder bedeutender Blinddarm, zuweilen so groß wird, daß der Pfortneranhang wie ein Darm erscheint, welcher aus diesem Sacke springt. Am dem Ende des Pfortners findet sich gewöhnlich ein häutige Klappe und ein harter Darmmuskul, welcher zur Schließung desselben bestimmt. Unmittelbar hinter dem Pfortner finden sich bei den meisten Knochenfischen mehr oder minder zahlreiche darmartige Ausstülpungen, die Pfortneranhänge (Appendices pyloricae), deren Zahl von einem zigen bis zu 60 und mehr ansteigen kann, bei einzelnen Arten aber sehr fix und bestimmt ist. Sind diese Blinddärme, welche ganz dieselbe Beschaffenheit besitzen, wie der übrige Darmkanal, einfach oder verzweigt, zuweilen aber verzweigen sie sich so, wie mehr das Aussehen einer Drüse bekommen. Die Einmündungsstelle der Pfortneranhänge verläuft Darmkanal meist in gleicher Weite, bald mehr, bald minder gebogen, in der Bauchhöhle fort und bald weiter ist. Die vordere Hälfte des Magens enthält bei allen Quermäulern und Ganoiden spiralförmig gebundene Klappe, deren freier, trichterförmiger Rand frei in die Darmhöhle hineinragt, die Oberfläche derselben vergrößert, oder eine im Innern des Darms gerollte Klappe. In den fischen Knochenfischen fehlt diese Spiralklappe. Hinsichtlich der Länge des Darms finden wir manche Verschiedenheiten statt. Bei den Raubfischen zeigt derselbe keine Windungen und läuft in gerader Linie durch die Bauchhöhle vom Munde zum After, bei den gefräßigen Raubfischen ist er nur wenig gewunden, bei den Pflanzenerfressern am längsten. Im After findet sich gewöhnlich ziemlich weit nach hinten eine Klappe, die bei manchen Fischen auch in der Nähe des Magens; die Leber ist gewöhnlich ungemein groß, von bräunlicher Farbe, fettreich und zeigt fast überall eine Gallenblase, mit lebhaft grüner Galle.

Die Athemorgane der Fische bestehen aus Kiemen, und zwar meist aus weichen, vorwiegend häutigen, durch Knochen oder Knorpel gestützten Kiemen, auf welchen sich die Athemgefäße vertheilen und in deren Umtreis das Wasser durch den Rhythmus der rhythmischen Bewegungen des Kiemenbedeckels und die Zusammenziehungen der häutigen und lösen Umgebungen der Kiemen erneuert wird. Die Kiemenblätter selbst sind immer auf Bogen gebracht, welche die Rachenhöhle umfassen und in die Spalten voneinander getrennt werden. In der Ausbildung dieses Kiemenapparates finden wir mancherlei Verschiedenheiten statt. Bei den Quermäulern finden sich an den Seiten des Halses fünf, selten sechs oder sieben Kiemenpalten, vor den Zwischenbräcken häutige Lamellen nach innen gebogen, auf welchen beiderseits die Kiemenblätter angewachsen sind. Bei den Seelägen finden sich dieselben Lamellen

Spalten, aber durch einen Kiemendeckel bedeckt, von außen nur ein Spalt nach innen führt. In Ganoiden und echten Knochenfischen endlich die Kiemenpalten nach außen durch den knöchernen Apparat geschützt, welchen wir bei dem Skelet leben, und wird auf diese Weise an jeder Seite als eine weite Kiemenhöhle gebildet, in welcher Kiemenblättern frei flottiren und die nach außen eine mehr oder minder enge Spalte geöffnet ist, indem der Kiemendeckel ganz frei ist oder durch eine Haut an den Schultergürtel befestigt wird. Die Weite der Kiemenöffnung zwischen den Kiemen, indem sie bald auf ein ganz kleines, bald wie bei den Aalen oder den Störchen, bald wie bei den Seringen und Leuchtsternen bis gegen die Spitze des Unterkiefers fortsetzt. Auf dem Kiemenbogen stehen zwei Reihen lanzettförmiger Blättchen, durch ein dünnes Knorpelnetz oder knorpeliges Gewebe geschützt werden, auf dem hintern Rande der Kiemenbogen sind durch kleine Muskeln beweglich und abgezogen werden können. Gewöhnlich besteht der Kiemenbogen aus einer Doppelreihe von Blättchen, jedoch man vier vollständige findet; viele Knochenfische aber, wie namentlich die Lippfische und Sonnenfische, besitzen nur drei, die Froschfische nur drei, die Gattung *Amphipnous* nur zwei und eine halbe, und *Amphipnous* gar nur zwei Kiemen, während einige Haie (z. B. *Sphyrna tiburo*) sechs und sieben Kiemen besitzen. Bei Fischen mit mangelhaften Kiemen finden sich dann, wie namentlich bei *Amphipnous*, eigentümliche Vorrichtungen, welche von der hintern oberen Kehle ausgehen, sich längs der Wirbelsäule nach unten erstrecken und auf deren Wänden sich kleine Fortsätze verzweigen.

Einrichtung führt auf die Luftathmung, die bei einigen Fischen hergestellt ist, welche durchgehende Nasenlöcher besitzen und die man zu den Fischen oder Amphibien, oder auch zu einer Klasse zwischen beide stellen kann (*Lepidopterus*). Bei diesen existirt allerdings, d. h. ein Athemsack, in den Schlund gewelcher venöses Blut empfängt und arterielles. Alle übrigen Fische besitzen dagegen nur eine (überhaupt existirt) eine aus der Rückenfläche des Schlundes entspringende Ausstülpung, die mit abgemessenem Gase erfüllt ist, arterielles Blut erhält und abgibt und gewöhnlich in der Mittellinie, in Eingeweiden der Bauchhöhle, jedoch unter der Leber liegt. Diese Schwimmblase besteht bei Fischen aus einer hintern und vordern zeigt zuweilen seltsame Anhangs und Verknüpfungen, tritt bei einigen Familien, wie namentlich bei Karpfen und Welsen, durch besondere Knochen Verbindung mit dem Gehörorgan und ist vollständig abgeschlossen, bald durch einen offenen Kanal sich gewöhnlich in die hintere, sehr selten in die vordere Wand des Schlundes mit diesem in Verbindung. Daß diese Schwimmblase ein hydrostatischer Apparat ist, läßt sich leicht beweisen; doch ist die volle Bedeutung um so unbekannt, als sie sehr unbeständig ist und von verwandten Arten die eine sie besitzen kann, die andere nicht.

Das Herz besteht bei allen Fischen aus einer weiten Vor- und einer muskulösen Kammer und einem Arterienstiel. Es liegt unter der Kehle, durch Sehnen befestigt, in einem Sack, der Knorpelfische unvollständig, bei den Knochen-

fischen aber vollständig gegen die Bauchhöhle hin abgeschlossen ist und so eine Art Zwerchfell darstellt. Das Herz selbst liegt nur in dem Bereich des venösen Blutlaufs und nimmt in einer einzigen, meist dünnhäutigen, ungetheilten Vorkammer das aus der Leber und dem Körper zurückströmende venöse Blut auf. Die Vorkammer mündet durch eine mittlere, mit halbmondförmigen Klappen versehene Oeffnung in die stark muskulöse Kammer, welche gewöhnlich eine dreieckige Gestalt hat und auf ihrer innern Fläche viele Muskelsäckchen zeigt. Nach vorn setzt sich die Kammer mittels einer einzigen Oeffnung in die meist zweibellartig angeordnete Kiemenarterie fort, an welcher sich zwei wesentlich verschiedene Typen des Baues wahrnehmen lassen. Bei den Rundmäulern und den Knochenfischen finden sich nämlich an der Ausmündungsoeffnung der Kammer nur zwei halbmondförmige Klappen, und der Stiel der Kiemenarterie wird nur durch eine Verdickung des Fasergewebes gebildet, aus welchem die ganze übrige Arterie gewebt ist. Bei den Ganoiden und den Quersmäulern dagegen bildet der Arterienstiel wirklich eine Fortsetzung der Kammer und ist auf seiner äußern Fläche mit scharf abgegrenzten, selbständig contractilen Muskelfasern belegt, während auf der innern Fläche sich eine bedeutende Anzahl übereinander gestellter Klappen befindet, die in mehrfachen Querreihen, von welchen jede eine bedeutendere Anzahl von Klappen enthält, übereinander stehen. Eine Uebergangsform zwischen beiden Typen wird durch einige Fische hergestellt, bei welchen die Zahl dieser innern Klappen mehr oder mehr zurückfällt.

Der Kreislauf des Blutes, welches bei allen Fischen roth ist und meist rundliche, scheibenförmige Blutkörperchen enthält, geht in folgender Weise vor sich. Von dem Herzen aus strömt das Blut durch die große Kiemenarterie und vertheilt sich zu beiden Seiten in die Gefäßbogen, welche die Kiemenblättchen speisen. Die zahlreichen Netze, welche von den Haargefäßen auf der Fläche dieser Kiemenblättchen gebildet werden, gehen in die Kiemenvenen über, deren sich je eine auf jedem Kiemenbogen sammelt, und diese Venen treten dann wieder über dem Kiemengerüste zu einem einzigen Hauptstamme, der Aorta, zusammen, welcher unmittelbar unter der Wirbelsäule nach hinten verläuft und meistens in den untern Bogen der Dornfortsätze eingeschlossen ist. Bei denjenigen Fischen, bei welchen die hintern Kiemenbogen keine Blättchen tragen, läuft nur ein einfacher Gefäßbogen über den Kiemenbogen weg, um unmittelbar in die Körperarterie überzugehen. Die Arterien des Kopfes entstehen gewöhnlich schon vor der Bildung der Aorta aus der Kiemenvene des ersten Bogens und die Aorta selbst speist auf ihrem Wege nach hinten die Muskelmassen sowohl durch regelmäßig abgehende Zweige, welche sich um die Wirbelsäule herum schlagen, als auch die Eingeweide durch einige größere Stämme. Das Körperblut tritt durch eine am Schwanz einfache, nach vorn gewöhnlich gabelig sich theilende Hohlvene in das Herz zurück, nachdem vorher ein Theil desselben das sogenannte Nierenportadersystem gebildet hat. Viele Venen des Schwanzes und Rumpfes treten nämlich in die Niere und verzweigen sich innerhalb derselben ganz in der Weise wie Arterien, um sich dann wieder auf neue in die Körpervenen neben der Aorta zu sammeln. Das in die Eingeweide strömende Blut sammelt sich in Venen, welche ebenfalls wieder in der Leber sich in die Haargefäßnetze des Portadersystems auflösen und dann zu den Lebervenen zusammen treten, die fast unmittelbar in die Vorkammer des Herzens übergehen. So treibt demnach das einzige Herz bei

den Fischen das Blut regelmäßig durch zwei, meistens aber durch drei Systeme von Haargefäßen, durch das respiratorische Haargefäßnetz der Kiemen, durch das Capillarnetz zwischen Arterien und Venen, und endlich durch das Capillarnetz der an Niere und Leber hergestellten Fortadern, ohne daß auf diesem langen Wege irgendeine bewegende Kraft angebracht wäre, welche eine zweite Zimpulsion geben könnte. Die unverhältnismäßige Stärke der Herzkammer erklärt sich leicht durch den Hinblick auf diese Verhältnisse.

Die Nieren liegen unmittelbar unter der Wirbelsäule, in alle Zwischenräume zwischen den Wirbelkörpern und den Rippen eingebrängt, und erstrecken sich gewöhnlich durch die ganze Länge der Bauchhöhle bis vorn zum Herzen hin. Die Harnleiter vereinigen sich meist in der Mittellinie, nahe am After, bilden eine Art Harnblase und münden dann auf einer besonderen Warze hinter dem After oder, wie bei den Knorpelfischen, in die hintere Wand des Mastdarms.

Die Geschlechtstheile sind ziemlich nach demselben Typus angeordnet, so daß sie auch in ihrer äußern Form sich oft sehr gleichen und bei einzelnen Fischen nur durch mikroskopische Untersuchung ihre spezifische Natur festgestellt werden kann. Die keimbereitenden Geschlechtstheile, Eierstöcke und Hoden, liegen stets innerhalb der Bauchhöhle unmittelbar unter den Nieren und über den Darmwindungen, und wechseln sehr in ihrem Volumen je nach der Jahreszeit, indem sie gegen die Fortpflanzungsperiode hin durch die Ausbildung ihres Inhalts ungemein anschwellen, nachher aber zusammenfallen. Die Eierstöcke und Eileiter zeigen verschiedenes Verhalten. Bei den Aalen und den Lachsen besteht der Eierstock aus zwei seitlichen häutigen Blättern, die mit keinem Ausführungsgange in Verbindung stehen, sondern überall vom Bauchfell umkleidet sind und in deren Dide sich die Eier entwickeln. Die reifen Eier durchbrechen die Wandung des Eierstocks, fallen in die Bauchhöhle und werden aus dieser durch eine mittlere oder zwei seitliche Spaltöffnungen nach außen entleert. Bei der großen Mehrzahl der Fische, und zwar wesentlich bei den eigentlichen Knochenfischen, bildet der Eierstock einen Sad, auf dessen innerer Fläche bald Falten, bald vielseitig gefaltete häutige Vorprünge sich zeigen, in denen die Eier sich so entwickeln, daß sie bei dem Durchbruche nach ihrer Ausbildung in die Höhle des Eierstockfades fallen. Gewöhnlich sind die Eierstöcke paarig, zuweilen aber auch in der Mitte verschmolzen. Nach hinten verlängert sich der Eierstock unmittelbar in den Eileiter, der bald früher, bald später sich mit demjenigen der andern Seite vereinigt und unmittelbar hinter dem After auf einer zwischen diesem und der Harnöffnung gelegenen Warze sich nach außen mündet. Bei einigen Knochenfischen, welche lebendige Junge gebären, ist das hintere Ende des Eileiters erweitert, so daß es die sich entwickelnden Eier aufnehmen kann. Bei mehreren Ganoiden bildet der Eierstock eine für sich abgeschlossene Masse und der Eileiter, der gewöhnlich lang und gewunden ist, hat jederseits eine weite trompetenförmige Öffnung in der Bauchhöhle, in welche die Eier nach dem Austritte aus dem Eierstock gelangen und so nach außen geführt werden. Bei den Quermäulern endlich findet sich bald ein unpaariger, bald ein paariger Eierstock, der stets eine abgeschlossene Masse bildet und mit den paarigen Eileitern in keiner directen Verbindung steht. Die Eileiter selbst treten bei diesen Fischen in der Mittellinie unmittelbar an der Leber zusammen und haben hier eine gemeinschaftliche Öffnung, von der aus sie nach beiden Seiten in die Bauchhöhle herabsteigen. Nach kurzem Verlaufe zeigt

sich an jedem Eileiter eine dicke, weiche Drüse, deren Absonderung ohne Zweifel die Massen der Eier bildet. Nach dem Durchgange dieser Drüsen erweitert sich jeder Eileiter und bildet eine Art Gebärmutter, in welcher die Jungen weiter entwickeln; die beiden Lagen gemeinschaftlich durch einen weiten Kanal in die hintere Wand des Mastdarms ein, wodurch eine Kloake gebildet wird. Die männlichen Geschlechtstheile sind etwa nach demselben Typus angeordnet. Hoden (Milche) nehmen zur Zeit der Laichzeit die Bauchhöhle fast in ihrer ganzen Länge ein und hängen bei den Knochenfischen unmittelbar mit den Samenleitern zusammen, die ähnlich wie die Eileiter verlaufen. Bei den Rochen und Haien sind einzelne kugelförmige Hodenblasen, aus welchen Ausführungsgänge zu einem verschlungenen hohen gehen, aus dem der Samenleiter besteht, der von drüsenartigen Gebilden umgeben ist. Bei den barbaren Anhängen neben dem After sind die männlichen Quermäuler bei der Begattung. Bei den Ganoiden gelangt der Samen in die Bauchhöhle und wird von einem dem Eileiter ähnlichen Samenleiter nach außen geführt.

Bei allen Fischen tritt die Laichzeit während des Jahres ein; sie halten sich Scharen zusammen und viele kommen aus an die Oberfläche um die befruchteten Eier abzulegen. Die größten Wanderungen, welche Flußfische, wie Lachse und Aale, zu gewöhnlichen unternehmen, sowie die großen Züge vieler wie der Sardellen, Serrinen und Auntern, man früher eine weit größere Ausdehnung finden ihre Erklärung hauptsächlich in der Fortpflanzungstrieb. Gewöhnlich geschieht die Laichzeit in der Weise, daß Eier wie Samen von einander schwimmenden Fischen dem Wasser übergeben werden und dieses die Befruchtung vermittelt, denn auch nichts leichter ist als durch Befruchtung zahlreiche Fischbrut zu erzielen. In neuerer Zeit in industrieller Hinsicht ist worden ist. Die Zucht der Forellen und Aale an vielen Orten durch dieses Verfahren ist bedeutenden Aufschwung genommen. Es bedarf einfach darin, daß man den zur Laichzeit an Weibchen die Eier, welche beim Leisten der Genitalöffnung hervortreten, in eine Schale Wasser abstreift, dann ein Männchen auf diese Weise ausdrückt und die milchige Samenmasse wohl in dem ganzen Wasser über die Eier gießt. Diese sind nach kurzer Zeit vollständig befruchtet und brauchen nur in einem geeigneten Wasser für die Forellen klar und kießend sein muß, abgedeckt gehalten zu werden, um ihre vollständige Entwicklung durchzumachen und nach vier bis fünf Tagen die Forellen auskriechen zu lassen. Man wählt während der ersten zwei Jahre in einem vor Raubzeug geschützten Weider, der fließend, zufließt, hat, halten, und kann sie erst nach dieser Zeit sich selbst überlassen, wenn man bedeutende Einbuße an der Zahl der Brut zu vermeiden will. Die meisten Fische zeigen durchaus kein Interesse für ihre Brut und begnügen sich mit dem einen gebeten Ort für die Ablage ihrer Eier zu finden; von einigen dagegen, wie von den Aalen, ist es bekannt, daß die Männchen ein Nest bauen, welches sie gegen Angriffe zu schützen und so lange hüten, bis die Jungen sich entwickelt sind. Andere, wie die Meerperlen, haben eine außen am Rande

stätte (Tasche, Wabenzellen), die das Männchen und in der sich die Jungen entwickeln; viele lebendige Junge, indem das Ei in einer Erzeugung des Eierstocks sich ausbildet, und bei einem (*Mustelus laevis*) hat man sogar eine innigere Verbindung der Frucht mit dem Eileiter, eine Art Placenta entdeckt.

Die meisten Fische sind Raubfische und nähren sich von Thieren derselben Klasse oder von anderen Geschöpfen, Krebsen, Muscheln, Insektenlarven u., die sich im Wasser aufhalten. Nur wenige fressen sich mit Pflanzennahrung. Die meisten leben in der Meere, und zwar wird die Zahl der Familien Arten im ganzen um so ansehnlicher, je weiter gegen die tropische Zone vordringt.

Nur wenige Ordnungen, wie die Quermäuler, sind durchgehends auf das Meer, andere Familien, wie Karpfen, Hechte, auf das süße Wasser eingeschränkt; doch gibt es manche Familien und selbst Gattungen, in denen die einen Arten das süße Wasser, die andern das Meer bewohnen, und viele Arten existiren, welche theilweise in dem Meere sich aufhalten, zur Laichzeit oft ziemlich weit in die Flußmündungen hinauszugehen, um sich dort ihrer Eier zu entledigen. Die Fische, Lachse u. s. w. sind in diesem Falle.

Unterklasse der Urfische (Palaeichthyes).

Beginnt mit einem muskulösen Arterienstiel; darin mit einer Spiralklappe; Sehnerven, welche ein wahres Chiasma bildend.

Die übrigen Charaktere sind in dieser Unterklasse verschieden. Das Skelet entwickelt sich von den ersten Stufen mit bleibender Chorda und knorpeligen Primordialskädel bis zu eingelenkten Wirbeln, denen mancher Reptilien nicht nachstehen, und es ist fast als existire eine Art von Antagonismus zwischen der Ausbildung der innern Organe und der des Skelets. Die Zusammengehörigkeit derer, welche diese Unterklasse zusammenheben, ist erst durch die Entdeckung einiger neuer Typen, die durch die Verwandtschaft mit den ältesten Fischen (Günther nachgewiesen worden.

Ordnung der Ganoiden (Ganoidei).

Kiemens frei, mit einem Kiemendeckel. Stets Schwimmblase mit offenem Luftgang und Lungen.

Ordnung der Lurdfische (Dipnoi).

Die Fische, welche dieser Ordnung angehören, wurden den süßen Gewässern des tropischen Südamerika, Afrika's und ganz neuerdings Australiens entdeckt. Der Körper ist durchaus fischähnlich, die Augen klein, Nasenlöcher an der Spitze der Schnauze gelegen. Die Kiemen runden, dachziegelförmig übereinanderliegenden Schuppen, mosaikähnlich zusammengefügten, noch bis über die Kiemenpalten, die von einem Kiemendeckel bedeckt ist, nach vorn. Die Extremitäten sind lang, bei den einen fast ganz auf die Achse reduziert, bei den andern mit zu beiden Seiten auslaufenden Strahlen, die aber stets von Haut umhüllt

sind, sodaß die Flossen eine große Ähnlichkeit mit denen der ausgestorbenen Seedrahen (*Ichthyosaurus*) zeigen. Um den Hinterkörper zieht sich eine homocerte, nach hinten zugespitzte, senkrechte, durch innere Knorpel- und äußere Hornstrahlen gestützte Flosse. Die Wirbelsäule der Lurdfische wird von einem ungeheilten Knorpelstabe, einer Chorda, repräsentirt, den eine Faserröhre umgibt, von welcher nach oben und nach unten inöcherne Wirbelbogen abgehen, welche das Rückenmark und die Aorta umschließen; nach vorn setzt sich die Wirbelsäule unmittelbar in den aus einer einzigen Knorpelplatte bestehenden Schädel fort, an welchem einige mehr oder minder unzusammenhängende Deckplatten verknöchert sind. Sehr eigentümlich ist die Bezeichnung, indem vorn unter dem Schädel an dem Theil, welcher den Oberkiefer darstellen soll, entweder hohe, senkrechte, schneidende oder breite, nach außen gefaltete Zahnplatten festgewachsen sind, denen ähnliche Platten im Unterkiefer entsprechen. Die Flossen sind verschieden gefaltet, ebenso die Kiemen und Lungen. Die Nasenlöcher führen in den Mund, vor den an der Gaumendecke angebrachten Zähnen.

Familie der Lurdfische (*Sirenida*). Extremitäten griffelförmig, nur die Achse vollständig ausgebildet, sehr kleine Strahlen an der innern Seite, von Haut umhüllt. Hintere Extremitäten sehr weit nach hinten gestellt. Die Nasenlöcher führen in eine weite Nasenklappe, deren beide Gänge nach unten in die Mundhöhle kurz hinter der Schnauzenspitze geöffnet sind. Hinter den Kiemenpalten findet sich in der vorderen Wand des Schlundes eine Stimmrinne, welche in eine weite, von Knorpeln gestützte Stimmrinne und in zwei wohl ausgebildete zellige Lungenäste führt, die durch rein venöses Blut vom Herzen aus gespeist werden und arterielles Blut in den Strom der Aorta abgeben. Mundspalte ziemlich weit; Zähne senkrechte, schneidende Platten. Kiemenpalte klein. Hinter der Kiemenpalte drei wohl ausgebildete Bogen von Kiemenblättchenreihen, zwischen welchen ganz in derselben Weise wie bei den Fischen die Kiemenpalten in den Schlund durchgehen; außerdem finden sich noch zwei Kiemenbögen, welche keine Blättchen enthalten und deren Arterien unmittelbar ohne Verzweigung in die Aorta übergeben, sodaß also das aus dem Herzen kommende Blut entweder in die Kiemenblättchen eingeht, oder, wenn diese ihre Function versagen, unmittelbar durch die Arterien der blättchenlosen Kiemenbögen in die Lungenarterie gelangen kann. Im Arterienstiel des Herzens zwei große Längsklappen. Die Eierstöcke bilden geschlossene Säcke; die Eileiter beginnen mit einer erweiterten Oeffnung in der Bauchhöhle. Die Thiere leben in süßen Gewässern der Tropenzone, graben sich beim Verrotten derselben in den Schlamm ein und machen sich ein innen geglättetes, kugeliges Nest aus hartem Thon, mit einem Loch, durch welches sie athmen können. *Lepidosiren paradoxa*, bis 1 Meter lang, in dem untern Gebiet des Amazonenstroms; *Protopterus annectens* (Taf. 22, Fig. 1) am Senegal und Gambia, mit drei büchselförmigen äußeren Kiemen, ähnlich denen der Salamandlarven.

Familie der Hornzähner (*Ceratodontida*). Unterscheidet sich von den vorigen durch doppelte Nasenlöcher im Gaumen, platte, außen gefaltete und in Spitzen auslaufende Platten von Zähnen hornartiger Structur; durch die rudersförmigen, verlängerten, abgeplatteten und mit Schuppen bedeckten paarigen Flossen, von welchen die hintere weiter nach vorn unter dem Bauche stehen; durch vier ausgebildete Kiemenbögen und eine Nebentieme am Kiemendeckel; durch eine einfache, zellige Lunge; durch den mit mehreren queren

Klappenreihen besetzten Aortenstiel und die aus Blättern zusammengesetzten Eierstöcke. *Ceratodus Forsteri* in Queensland (Australien), bis 6 Fuß lang.

Ordnung der Kiemenathmer (Branchiospiri).

Weder durchgehende Nasenlöcher noch Lungen. Athmen nur durch Kiemen. Brust- und Bauchfloßen stets vorhanden, ebenso eine Kiemenhaut mit Strahlen oder Dedeln.

Das Skelet dieser Fische beginnt mit Formen, welche denjenigen der Lurdfische analog sind. Eine ungetheilte Wirbelsäule mit fibröser Scheide und von dieser ausgehenden, zu Höhlen sich ausbildenden häutigen Fortsetzungen, in denen sich obere und untere Inöcherne Bogenstücke zur Umfassung des Rückenmarks und der Aorta bilden und eine ungetheilte, vollkommen knorpelige Schädelkapsel zur Umschließung des Gehirns und der wesentlichen Sinnesorgane bezeichnen diesen ersten Bildungsgrad des Skelets, wie er zum Beispiel beim Stör vorhanden ist. Indes finden sich bei diesem Zustande des innern Skelets doch stets äußere Dedplatten, die bald nur der Haut, bald dem gewöhnlichen Systeme des Skelets angehören und die sich namentlich in dem Gesichtsantheile entwickeln, so daß es wol keinen Kiemenathmenden Ganoiden gibt, welchem festere Platten auf dem Kopfe und der Stirne oder gar die Kieferknochen, der Hängegürtel des Unterkiefers und der Kiemenbedeckel fehlten. Bei weiterer Ausbildung des Skelets zeigen sich förmliche Dedknochen des Schädels vollständig nach dem oben auseinandergesetzten Plane der Inöcherne Kopfbildung entwickelt, und ihre Ausbildung nimmt nach und nach in der Art zu, daß die ursprüngliche Schädelkapsel gänzlich verschwindet und nur ein Inöcherne Schädel vorhanden ist, der sämtliche Knochen besitzt, welche überhaupt an dem Fischeschädel vorkommen, ja bei einigen Apparaten, wie namentlich beim Unterkiefer, zuweilen eine Zusammenfügung zeigt, welche sonst nur bei den Reptilien vorkommt. In gleicher Weise geht die Ausbildung der Wirbelsäule vor sich. Inöcherne Wirbelkörper entstehen, nehmen an Umfang zu, verdrängen nach und nach die zellige Knorpelsubstanz der Chorda und es zeigen sich alle Zwischenformen von dem zellig verknöcherten Wirbelkörper der Haie durch die doppelt gehöhlten Wirbel der gewöhnlichen Knochenfische hindurch bis zu den Wirbeln der höhern Thiere, indem bei dem Knochenbechte (*Lepidosteus*) jeder Wirbel an seiner vordern Fläche mit einem vorspringenden Gelenkkopfe versehen ist, der in eine Pfanne des vorhergehenden Wirbelkörpers paßt, eine Bildung, welche sogar nur bei diesem einzigen Fische, sonst nur bei Amphibien und Reptilien vorkommt.

Hinsichtlich der Flossen bemerkt man einen ähnlichen fortschreitenden Wechsel der Formen. Brustfloßen finden sich stets, meist sehr vollständig entwickelt, ebenso Bauchfloßen, immer abdominal, gewöhnlich weit nach hinten gerückt, niemals unter der Kehle.

Die seitlichen Flossen sind wohlentwickelt und stets abgetheilt; die Schwanzflosse bei einigen heterocerc, so daß die Wirbelsäule sich in den obern Lappen fortsetzt, bei andern homocerc und fast immer nur durch weiche Strahlen gestützt. Auf der Firste der Schwanzflosse finden sich zuweilen spitze Knorpelschindeln, die Flossenschindeln (*Fulcra*) genannt werden und diesem Rande ein gezähneltes Ansehen geben.

Allen kommen als Angehörigen der Hauptordnung der Ganoiden eine Spirallappe im untern Theile des Darms, taschenförmige Klappen in dem muskulösen und selbständig pulsirenden Arterienstiele des Herzens

zu. Dagegen sind die Nasenlöcher nach hinten geschlossen und haben keine Communication in der Haut. Alle haben lamellenförmige, freie, auf Bogen durch Spalten in den Knochen getrennte Kiemen, nur eine äußere Kiemenpalte, welche von einem Kiemenbedeckel geschlossen werden kann, und eine Kiemenhaut in welcher bald Strahlen, bald nur ein einziger thürartiger dreieckiger Knochen jederseits vorkommt, der mit dem Knochen der andern Seite der Kiemen zwischen den Kieferastern ausfällt. Bei allen ist eine Schwimmblase vorhanden, die mit einem offenen Ende gewöhnlich in die obere, in einem Falle auch in die seitliche untere Wand des Schlundes einmündet, die gewöhnlich glatt, zuweilen aber von starken Bündeln zellig durchzogen ist, so daß sie viele Ähnlichkeit im äußern Ansehen mit einer Amphioxus zeigt. Außer den gewöhnlichen Kiemen kommen dem Kiemenbedeckel oft eine besondere halbe Kieme (Pseudobranchie) im Grunde der Kiemenhöhle und ein Loch auf der obern Fläche des Kopfes hinzugefügt, Kiemenbedeckelkiele, Pseudobranchie und Spritzloch, indem in so vielfachen wechselseitigen Combinationen vor, daß diese Charaktere nicht als constante betrachtet werden können. Dagegen findet sich ein festes Merkmal der Ordnung in dem Umfange, daß sie sich nicht, wie bei den Knochenfischen, in der Weise kreuzen, daß jeder in das Auge der gegenüberliegenden Seite geht, sondern daß, wie bei den Lurdfischen, beide Scherren in der Mittellinie verlaufen, dort mit den zugewandten Kiemen schmelzen und so ein wahres Chiasma bilden, an jeder zu dem Auge seiner Seite tritt. Eine Uebereinstimmung mit den Knorpelfischen findet sich in der Bildung der Geschlechtsheile bei den Fischen, indem die Eierstöcke vollkommen abgetheilt, die langen, gewundenen Eileiter aber sich in offenen Trichter frei in die Unterleibshöhle in der Nähe des Eierstockgefäßes einmünden.

Die Hautbekleidung der Ganoiden unterscheidet sich durch ihren Unterschied von den gewöhnlichen Knochenfischen bei Betrachtung der Fossilien. Wir finden in derselben eine dreifache Vertheilung, die, da sie auch mit andern Organisationsmerkmalen zusammenstimmt, zum wesentlichen Merkmale der Ordnung dienen kann. Bei den Panzerganoiden (*Loricati*) ist die Haut entweder ganz oder in großen Knochenplatten gepanzert, welche einzeln in der Haut eingegraben liegen; bei den Schildfischen (*Rhombiferi*) finden sich viereckige, dicke, rhombförmig in Reihen gestellte Knochenplatten, die über ihrer Außenfläche mit einer Schmelzlage versehen sind; bei den Rundschuppigen (*Cycales*) zeigen sich runde, dachziegelförmig gestellte Knochen in ähnlicher Weise gebildet, wie bei den Knochenfischen.

Unterordnung der Panzerganoiden (*Loricati*).

Haut nackt oder mit Knochenplatten gepanzert. Wirbelsäule persistirend.

Die Haut ist nackt oder mit Knochenplatten gepanzert, die in der Lederhaut vergraben sind, auf dem Schädel immer zusammenhängend und dort mit dem innern Schädelstele sich verknöchern, aber niemals übereinandergreifen. Das Skelet ist demjenigen der Lurdfische am nächsten. Es besteht stets eine ungetheilte Wirbelsäule (*Skelet des Stör* *Acipenser sturio*, Taf. 22, Fig. 12), aus welcher obere und untere Dornfortsätze ausragen, die bei den Fischen. Die Schädelkapsel ist durchaus Inöcherne

platten überkleidet, die dem Hautskelet angehört. Das Kiefergerüste ist knöchern und in seinen getrennten Stücken erkennbar, doch zeigt sich eine niedrigere Bildung in dem Umfande, daß der gebogene des Unterkiefers und des Zungenbeins nicht getrennt, sondern in einem einzigen verbunden sind, so daß derselbe Knochen die des Unterkiefers und des Zungenbeins trägt. Der Mund dieser Fische liegt auf der Seite des Schädels, mehr oder minder entfernt von der Schnauzenspitze, er ist gewöhnlich zahnlos, nur in der Jugend mit kleinen Zähnen, die später ausfallen.

Die der Större (Acipenseridae). Der Körper ist langgestreckt, walzenförmig, der Kopf ist, die Schnauze weit nach vorn verlängert, der Mund in bedeutender Entfernung von der Schnauzenspitze auf der Bauchfläche angebracht ist. Die Kiemen sind klein, rund, der Riemendeckelapparat besteht aus zwei, das Flossensystem mächtig ausgebildet. Die große Brust- und Bauchflossen, gewöhnlich hinter gestellte Rücken- oder Afterflossen und die schwärzliche heterocercle Schwanzflosse finden, deren Körper meist mit spitzen Schindeln bedeckt ist. Der beschilderte Kopf mit schmaler, dreieckiger, Schnauze, an deren Unterseite sich besondere befinden, mit zahnlosem Mause, das trichterförmig vorstreckbar ist und nur eine geringe Spalte einer Nebenhaut auf dem Riemendeckel, bald ohne Spritzloch und mit knochenbeschalteter die Knochenbilder bilden hier meist rhomboidale, deren Mitte halben- oder nagelförmig aufsteht; gewöhnlich stehen diese Platten in Reihen, aber nicht berühren; doch finden sich an dem kleineren Tafeln oder auch in Reihen gestellte kleine Schuppen, welche die ganze aufgebogene des Schwanzes in dem oberen Flossenlappen.

Die großen Fische (der Haufen, Acipenser) sind bis 25 Fuß lang) sind über die nördlichen beider Erbhälften verbreitet, wesentlich aber auch in den Meeren. Ihre Fischeerei ist in den nördlichen Gegenden des Continents besonders in Rußland, außerordentlich wichtig. Die Fische, welcher die großen Fische einen der Nahrungszweig und in den eingesalzenen (Laviar) sowie in den getrockneten Schwimmhäuten (Blase) wichtige Handelsartikel liefern. Die beschilderte Art, der Sterlet (Acipenser ruthenus), ist besonders seines Fleisches wegen

der Familie der Löffelstörre (Spatularidae) ist die ganze Haut bis auf die Schindeln der Flosse vollkommen nackt, die Schnauze in ein dünnes, spatelförmiges Blatt ausgezogen, das Länge des ganzen Körpers erreicht, das Maul halten, in der Jugend mit kleinen Zähnen, die sich später verlieren, und der Riemendeckel lange, häutige Spitze ausgezogen; ein kleines befindet sich hinter dem Auge. (Spatularia). Die Löffelstörre kommen nur in den großen Nordamerikas vor.

Ordnung der Eelchupper (Rhombiferi). Der Körper ist mit dicken rhombischen Schuppen gepanzert, die dachziegelartig übereinanderliegen und eine äußere Lage haben.

aus feinstöhriger Zahnsubstanz bestehende ist durchaus glatt bei den lebenden Familien. Die Fische liegen in schiefen Reihen von oben und

vorn nach unten und hinten so übereinander, daß der untere scharfe Rand der obenliegenden Schuppe einen Theil der untenliegenden bedeckt. Meist schiden sie noch Knochenfortsätze nach hinten fort. So wird ein äußerst fester und zugleich solider Panzer um den ganzen Körper gebildet. Auf dem Kopfe finden sich keine Hautknochen, wie bei den vorigen; die Deckplatten gehören dem knöchernen Schädel an. Die Flossen sind wohl ausgebildet; die Bauchflossen unter allen Umständen weit nach hinten gerückt. Die Ausbildung des Skelets ist verschieden: bei den Löffelstörren sieht man die Bildung der gewöhnlichen Knochenfische mit Doppelkegelwirbeln, während bei der andern lebenden Gattung (Lepidosteus) jener höchste Grad der Entwidlung des Fischwirbels, welcher überhaupt erreicht wird, vorkommt, wo die Wirbel durch Gelenkfüße und Bänder miteinander verbunden sind. Eine gleiche successive Ausbildung findet sich in der Structur der Schwanzflosse, indem dieselbe bei den Knochenbechten heterocerc, bei den Löffelstörren homocerc ist. Das Maul ist stets mit Zähnen bewaffnet.

Die Familie der Löffelstörre (Polypteridae (Löffelstör, Polypterus bicir, Taf. 22, Fig. 10) erscheint nur durch eine einzige, jetzt in den großen Flüssen Afrikas, namentlich im Nil und im Senegal lebende Gattung repräsentirt. Der Kopf dieser Fische ist stark abgeplattet, vorn rundlich, die Mundspalte weit, mit kleinen Gabelzähnen bewaffnet, zwischen welchen ganz kleine Bürstenzähnen stehen. Hinter den kleinen Augen, die fast auf der oberen Fläche des Kopfes angebracht sind, findet sich in der Mitte des Schädels etwa auf jeder Seite ein Spritzloch, welches mit einer knöchernen Klappe verschlossen werden kann. Der Leib ist langgestreckt, cylindrisch, die Eelchuppen, welche ihn bedecken, klein, aber doch deutlich, die Brustflossen rundlich, von einer breiten, gestielten, abgerundeten, beschuppten Auberplatte getragen. Die Rückenflosse ist in eine Menge einzelner Stacheln zerlegt, die vollkommen voneinander getrennt, den ganzen Rücken behaupten und deren jeder an der hintern Fläche ein Zähnen von mehreren gegliederten Strahlen mit ausgepanneter Flossenhaut trägt. Der After liegt sehr weit nach hinten, so daß der Schwanz nur kurz ist; die Schwanzflosse selbst ist homocerc und von rundlicher Gestalt. Die Kopfknochen sind an ihrer äußern Fläche von einer granulirten Schicht spröder, glasartiger Schmelzmasse überzogen. Eine Deckhülle fehlt durchaus, ebenso eine Pseudobranchie. Die Schwanzflosse hat keine Schindeln; statt Strahlen findet sich in der Riemenhaut nur eine große dreieckige Knochenplatte auf jeder Seite; die Nasenhöhlen sind äußerst complicirt aus gewundenen Höhlen gebildet; die Schwimmblase aus zwei ungleichen Säcken zusammengesetzt, die sich in einen gemeinschaftlichen kurzen Luftgang vereinigen, welcher sich auf der Seite nahe der untern Mittellinie in den Schlund öffnet.

Die Familie der Knochenbechten (Lepidosteidae) oder Kaimanfische (Knochenbecht, Lepidosteus osseus, Fig. 9) besteht aus gewaltigen Raubfischen, welche die großen Flüsse Nordamerikas bewohnen. Der Kopf dieser Fische ist kegelförmig, oft in eine lange, spitze Schnauze ausgezogen, welche gänzlich, oben wie unten, mit doppelten Reihen von Zähnen besetzt ist. Es finden sich nämlich in den ungemein langen Kiefern einzelne große, spitze, kegelförmige Fangzähne, die auf besondern Sockeln stehen und zwischen welchen zahlreiche kleine Bürstenzähne zerstreut sind. Die großen Zähne sind der Länge nach gestreift, und untersucht man ihre Structur genauer, so findet man, daß diese Streifen durch Faltungen

der Zahnhautsubstanz entstehen, welche wie ein grobes Tuch im Umriss der Zahnhöhle ein- und ausgebogen ist. Die Nasenlöcher befinden sich ganz vorn an der Spitze der Schnauze, die kleinen runden Augen auf der Seite in geringer Höhe über dem Mundwinkel. Ein Sprigloch fehlt durchaus, die Kiemenhaut enthält drei getrennte Strahlen auf jeder Seite, der Oberkiefer ist in viele einzelne zahntragende Stüde getheilt; an dem langen, gestreckten Leibe stehen die Flossen weit nach hinten, sodas eine gewisse Aehnlichkeit mit der Schwanzform unser gewöhnlichen Hecht existirt. Die Rückenwirbel sind miteinander durch Gelenkköpfe und Pfannen eingelenkt, die Schwimmblase einfach, aber stark zellig und auf ihrem ganzen Umfange mit Muskelbälgen versehen; sie öffnet sich in die hintere Wand des Schlundes.

Unterordnung der Rundschupper (Cycliferi).

Runde, dachziegelförmig übereinander liegende, dünne Schuppen.

So wie in der Beschuppung, so schließen auch in mancher andern Beziehung die Fische dieser Unterordnung sich am nächsten an die Knochenfische an, sodas es schwer hält, die Grenze zwischen wirklichen Ganoiden und einigen Gattungen zu finden, die bisher namentlich der Familie der Heringe angereicht wurden. Die so scharf ausgeprägten anatomischen Kennzeichen der Ganoiden gehen allmählich zu Grunde; während die ganze Structur des Schädels, der Wirbelsäule, der Flossen sich aufs engste an die Knochenfische anschließt, sieht man den Muskelbeleg am Vortentstiele allmählich geringer werden und die Zahl der Klappen im Innern abnehmen, sodas bei der einen lebenden Gattung (Amia) nur noch zwei Reihen kleiner tafelförmiger Klappen existiren, vor denen sich zwei große Segelklappen befinden.

Ebenso nimmt die Ausbildung der Spiralklappe in dem Darne außerordentlich ab, sodas sie kaum noch zwei und eine halbe Schraubenvindung in demselben bei den Kahlhechten zeigt. Eine Dedellieme oder statt deren wenigstens ein aus der Kiemenarterie unmittelbar entspringender Ast zu dem Kiemenedel fehlt in dieser Unterordnung durchaus, während eine Augondrüse, der Rehhautpalt und der Seihelfortsatz im Auge, die sonst allen bisher aufgezählten jetztlebenden Ganoiden fehlen, bei dieser Unterordnung vorhanden sind. Ebenso fehlen allgemein die Schindeln oder Stacheln an den Flossen, die stets nur weiche Strahlen besitzen; dagegen zeigen sich die Sehnerven in derselben Weise angeordnet, wie in den Knochenfischen.

In der Familie der Kahlhechte (Amida), welche einzig die Unterordnung in der heutigen Schöpfung in den Flüssen Carolinas repräsentirt, finden sich glatte Schuppen mit deutlichen Anwachsstreifen, die zuweilen zellig in der Mitte sind, meist aber dieselbe Hornsubstanz zeigen, wie die Schuppen der gewöhnlichen Knochenfische, wenn auch eine dünne Schmelzlage darüber hingebreitet ist. Der Körper dieser Fische ist schlant, gestreckt, spindelförmig; die Knochen des Kopfes meist auf ihrer Oberfläche mit Schmelz überzogen und die darüber ausgespannte Haut so dünn, das sie vollkommen nackt erscheinen. Die Schwanzflosse homocert, die Kieme mit kleinen legethörnigen Zähnen, zwischen denen zuweilen noch winzige Bürstenzähne stehen, bewaffnet.

Hauptordnung der Knorpelfische (Selachii oder Chondropterygii).

Stele knorpelig, aber das Rückgrat in Wirbel getheilt. Paarige Flossen stets vorhanden. Spiralklappe im Darne, muskelförmig

Mortentstiel, Chiasma der Sehnerven, Schwimmblase. Äußere Begattungsorgane beim Männchen.

Der Schädel (Stele vom Stachel, acanthias, Taf. 22, Fig. 5: a Schädel, b Kieferbogen, c Zungenbogen, d Unterkiefer, e Oberkiefer, f Kieferknorpel, 1, 2, 3, 4, 5 Kiemenbogen, 51, 52 Schultergürtel, k 1 Brustflosse, n Wirbelbogen, 1 Nadel, p 1 Querfortsatz der Wirbel) besteht nur aus einem einzigen Knorpelkapsel, die das Gehirn und die Sinnesorgane umschließt. Die Unterkieferkapsel bildet zugleich das Gaumengewölbe, bei einer Ordnung, den Seelachen, die unmittelbar aufsteigen, wie bei den Lurche, bei der andern ein beweglicher Oberkiefer ist. Der Schädel selbst ist nur von Haut überzogen, die Vertiefungen aber oft so mit Fett und Sehnen, das die Kopfform des lebenden Thiers oft von der Form des Schädels abweicht. Die Ausbildung der Wirbelsäule beruht auf Verschiedenheit. Bei den Seelachen existirt noch die stielte Chorda, die sich ohne Oefent in die Kapsel fortsetzt, deren Scheide der Neuralkanal bildet und auf welcher sich knöchern die erste Andeutung der Wirbelsäule auszeichnet; bei einigen Haien hat die Chorda im Innern Wände zur Andeutung der Wirbelsäule, die übrigen bilden die Wirbelsäule Doppelsäule, nur nebartig verbunden sind. Ueberall kommen obere und untere Fortsätze und Bogen vor, oft in Stücken. Die paarigen Flossen sind stets, verschieden Weise entwickelt. Bei Seelachen entspricht der Schultergürtel demjenigen der Knochenfische; bei den Rochen aber (Stele des Glattkopfs [Raja batis] von oben, Fig. 2: 19 Schulterbogen, 8, 9, 10 vorderer, 11 hinterer Tragelast der Brustflosse; 12 Strahlen der Brustflosse; 7 Kiemenbogen, 52, 55 Schultergürtel, theilweise vermauert, 56 Wirbelsäule; 63 Bedengürtel; 7 Bauchflosse; 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000).

chsubstanz gebildet, innen hohl und nach einer Seite hin zugespitzt. Mit diesem harten Basal ist der Stachel auf einem beweglichen Knorpelsapfen auf, in ähnlicher Weise das hohle Horn eines Ochsen auf dem Kopfe, der es trägt. Bei vielen Knochen stehen diese in Form gerader, pfeilähnlicher Waffen erhalten an dem Schwanz isolirt und bilden die gefährliche Waffe, die gerissene Wunden schlägt, oder heilen.

Die Haut der Knorpelfische ist entweder ganz nackt oder mit einer eigenthümlichen Art harter Gebilde bedeckt, welche sie von allen übrigen Fischen unterscheiden. In einzelnen Fällen sind diese Hautbedeckungen aus gekrümmten Dornen, die aus echter Zahnhaut entstehen und in eine Unterlage von schwammigem Gewebe eingesenkt sind, welches mit netzförmigen Ästen durchzogener Knorpel ist. Diese Nagelkommen namentlich bei den Knochen vor und sind einzeln auf der Haut des Körpers oder in am Schwanz angebracht. Bei den übrigen Knochen ist die Ordnung, besonders aber bei den Haien, ganz anders mit verschiedenartig gezackten und Stücken von Zahnhaut über und über die dann die eigenthümliche Rauigkeit der Hautrinne zeigt und auch zum Poliren und industriellen Zwecken benutzt wird.

Die Zähne des Mauls ist außerordentlich stark, doch stellen sich bei noch so sehr weichen Fischen die Zähne stets als Hautgebilde dar, die in die Knorpelsubstanz des Kiefers selbst, nur mit einer meist schwammigen Wurzel in faserige Schleimhaut des Zahnfleisches eingebettet. Es entstehen sich diese Zähne in der Art nach außen, daß stets der äußere Zahn im Vordere ist, und sobald er sich abgenutzt hat, von dahinterliegenden ersetzt wird, der allmählich an Stelle tritt. Die Kiefer der meisten Knochen und Haien bilden an ihrem innern Rande eine Reihe von Zähnen, um welche die Zähne so herum, daß die alten, abgenutzten Zähne nach außen, die neuen, stehenden festsitzen, die jungen mehr nach innen gerichtet und hier in einer Reihe geborgen sind, so daß auf einem festsitzenden Kiefer die Zähne um seinen Rand herum erscheinen, wie die Zähne eines Kamrades um den Kopf. Structur und Gestalt der Zahnkronen sind verschieden. Bei den großen Raubfischen, wie z. B. den meisten Haien, finden sich die Zähne zusammengedrückt, bald spitz, bald breit, oder breite scharfe, oft sägeförmig ausgezackte bei den Knochen kommen meist plattenförmig mit kegelförmigen Spitzen versehene Kronen, oder breite scharfe, oft sägeförmig ausgezackte bei den Knochen kommen meist plattenförmig mit kegelförmigen Spitzen versehene Kronen, oder andern sogar breite Zahnplatten mit ganz glatter Oberfläche. Alle Thiere der Ordnung nähren sich nur von Raub, die meisten von andern Fischen, wenige von Weich- oder Krustenthieren, gar von vegetabilischen Stoffen, und in Uebereinstimmung hiermit ist ihr Magen gewöhnlich weit, aber nur kurz und kaum gewunden. In dem hinteren Theile des Darms ist als eigenthümliches Merkmal, welches die Ordnung mit der folgenden gemein hat, die Entwicklung einer Spirale zu erwähnen, welche mit ihrem Rande an den Windungen angeheftet, nach innen hin aber so daß ein Schraubengang in dem Darme entsteht, dem die Nahrungsmittel bei ihrem Durchgange folgen müssen. Die Athemwerkzeuge weichen in der Bildung sehr von denen der übrigen Fische ab, auf dem Kiemerbogen stehen Kiemerblätter,

welche auf diesem mit ihrer Basis, aber auch ihrer ganzen Länge nach an Zwischenwände und oben an die Haut festgewachsen sind, so daß nur der gegen die Kiemerspalte gewendete Rand frei ist. So wird eine Reihe von Säcken gebildet, die innen eine Spalte in die Rachenhöhle und meist auch eine besondere Spalte nach außen haben, so daß man bei allen Querschnitten auf der Seite des Halses jederseits fünf, zuweilen auch sechs oder sieben Kiemerspalten sieht, die wie Knopflöcher aussehen. Nur bei den Seeläusen münden die Säcke in eine äußere, von einem rudimentären Kiemendeckel beschützte Spalte.

Bei allen Seeläusen findet eine förmliche Begattung statt, zu welcher die Männchen mit knorpeligen, verlängerten Anhängen versehen sind, die sich an der Innenseite der Bauchflossen finden und bedeutende Drüsen enthalten. Die wenigsten legen Eier (so genannte Eiemäuse) mit harten Schalen, welche in lange Fäden an den vier Zipfeln auslaufen und Spalten zum Durchgange des Wassers besitzen. Die meisten gebären lebendige Junge, die sich in einer besondern Erweiterung des Eileiters ausbilden und einen langgestielten Dottersack haben. Meist liegen die Embryonen frei in einer Art Sack, bei einer Art aber bildet sich eine Art Dottersack, indem Zotten auf der Oberfläche des Dottersackes in entgegenkommende Zotten des Eileiters eingreifen. Auch haben die Embryonen sowohl an den Kiemerlöchern als an den Spritzlöchern sehr lange, fadenförmige äußere Kiemen, die aber vor der Geburt verschwinden.

Ordnung der Kleinmäuler (Holocephala).

Eine Kiemerspalte, unvollständiger Kiemendeckel, kein Hinterhauptsgelenk, kein Oberkiefer.

Einzige Familie der Seeläusen (Chimaerida). Die Fische besitzen nur eine ungetheilte Rückenleiste mit oberem knorpeligen Bogen und Schallstücken dazwischen und mit unterem knorpeligen Ansatze, welche den Querschnitten der Fischwirbel entsprechen. Diese Rückenleiste setzt sich nach vorn unmittelbar in die dicke, fast kugelförmige Schädelkapsel fort, deren vorderer Rand die fehlenden Oberkiefer ersetzt, so daß die oberen Zahnplatten unmittelbar auf der unteren Fläche dieses vorderen Randes der Schädelkapsel aufliegen. Die Augenhöhlen sind ungemein groß, ebenso die Augen, die Lider dagegen fehlen. Die große, vielfach gewundene Nasenkapsel öffnet sich auf der unteren Seite der von vielfachen Schleimgängen durchzogenen Schnauze vor dem kleinen, querspaltenen Munde, der mit einfachen Zahnplatten bewaffnet ist, welche schnabelförmig vortreten, hinten platt, vorn schneidenartig zugespitzt sind; oben liegen zwei, unten nur eine solcher Platten auf jeder Seite. Der Kopf ist dick, kegelförmig; am Halse findet sich nur eine einzige Kiemerspalte von einem fingerförmigen Deckknorpel bedeckt, welche zu den in der Tiefe überall an die Zwischenwände der Kiemersäcke angewachsenen Kiementränen und zu den Spalten zwischen denselben führt. Die Brustflossen sind ungeheuer groß, die vordere Rückenflosse durch einen säbelförmig gekrümmten, starken Stachel gestützt, der auf einem Knorpelsapfen aufliegt. Die Schwanzflosse ist auf der unteren Seite des Schwanzes angebracht, der sich nach hinten in einen langen Knorpelsack auszieht. Die Haut ist nackt, ohne Spur von Chagrin, nur an den zahlreichen Schleimgängen mit Knorpelsäckchen um dieselben versehen. Mit Ausnahme der angeführten Eigenthümlichkeiten stimmt die Anatomie der Eingeweide namentlich hinsichtlich der vielen Klappen des Aortenstieles, der

schraubenförmigen Spiralplatte des Darms u. s. w., durch-
 aus mit der folgenden Unterordnung überein. Die See-
 kazen legen Eier mit dicker, horniger Schale. Die Spöde
 (*Chimaera monstrosa*, Taf. 22, Fig. 8) in der Nordsee.

Ordnung der Quermäuler (*Plagiostomata*).

Getrennte Kiemenspalten; ein Hinter-
 hauptsgelenk; das Maul quer gestellt auf
 der Bauchfläche; getrennter Oberkiefer.

Die Wirbelsäule zeigt immer Wirbelkörper und ist
 mit dem knorpeligen Schädel durch ein Gelenk ver-
 bunden. Die weite Rachenspalte bildet einen quer
 zur Körperachse gestellten Bogen auf der Unterseite des
 Kopfes, oft weit hinter der Schnauzenspitze. Ober-
 und Unterkiefer sind stets mit vielfachen Reihen von
 Zähnen bewaffnet. Die Nasenlöcher finden sich auf
 der untern Seite des Kopfes, auf der obern, meist
 hinter den Augen, Spritzlöcher, die in die Rachen-
 höhle münden. Stets getrennte Kiemenspalten, bei
 den Haien an der Seite des Halses, bei den Rochen
 auf der Bauchfläche. Meist fünf Kiemenspalten, nur
 bei einigen Haien (*Notidanus*) finden sich sechs ober-
 sieben Kiemenspalten. Haut bald mit Nägeln und
 Dornen, bald mit Chagrin ausgerüstet.

Die Familie der Rochen (*Rajida*) besteht aus breiten,
 platten, scheibenförmigen Fischen, deren eigenthümliche
 Körpergestalt durch die sonderbare Entwidlung der
 Brustfloßen bedingt ist. (Taf. 22, Fig. 2 Skelet des
 Glattrochen von oben: 19 Nasentafel; 8—11 Flossen-
 träger; 12 Strahlen der Brustfloße; 7 Artnorpel;
 52, 55 Schultergürtel; 63 Beckengürtel; 68 Träger
 der Bauchfloße V C; Begattungsanhang des Männ-
 chens.) Der Halswirbeltheil dieser Thiere ist stets
 zu einem einzigen Knochencylinder verwachsen. Der
 Schultergürtel bildet einen vollständigen Ring, wel-
 cher oben mit dem hintern Theile des Schädels
 verwachsen ist, unter der Rückenhaut über der Wirbel-
 säule zusammenstößt und nach unten zusammenkommend
 eine fast vollständige Kapfel für das Herz bildet.
 Dieser Ring trägt bogenförmig gekrümmte Flossen-
 knorpel, von denen die einen nach hinten, die andern
 nach vorn sich erstrecken und dort sich mit eigenen
 Flossenknorpeln verbinden, welche an der vordern
 Schnauzenspitze des Schädels angewachsen sind. Diese
 Schädelflossenknorpel kommen einzig nur den Rochen
 zu, und durch sie, wie durch ihre Verbindung mit den
 Brustfloßen wird jene breite Scheibe gebildet, die durch
 eine Menge knorpeliger Strahlen gestützt wird, welche
 aus einzelnen kleinen Knorpelgliedern zusamen-
 gesetzt sind, die rings von Muskeln und Haut um-
 geben werden.

Auf der obern Fläche dieses scheibenartigen Körpers
 finden sich nun die großen klobigen Augen und hinter
 ihnen die weiten Spritzlöcher; auf der untern Seite
 dagegen die Nasenlöcher, das breitgeschlitzte Maul und
 die fünf Kiemenspalten auf jeder Seite des Halses.
 Der Körper läuft nach hinten in einen meist dünnen
 Schwanz aus, auf dem sich die unbedeutenden, senk-
 rechten Flossen finden und der zuweilen noch als
 Waffe, deren Wunden für gefährlich gelten, eine oder
 zwei lange, sägeartig gezähnte Stacheln trägt. Die
 kurzen biden Kiefer sind entweder mit kleinen, pflaster-
 förmig in Reihen gestellten spitzen Zähnen oder mit
 breiten Mahlplatten bewaffnet, und in der Bildung
 der Zähne zeigt sich oft die auffallende Verschiedenheit,
 daß bei den Männchen dieselben zugespitzt, bei den
 Weibchen hingegen flach sind. Manche Rochen er-
 reichen eine ungemeine Größe und ein Gewicht von
 20 Centnern und mehr, so die Ägäisrochen (*Cepha-
 loptera*) in südlichen Meeren. Man unterscheidet viele

(Gruppen: die Maltrochen (*Myliobolida*) mit gekrü-
 tem Kopfe zwischen den Brustfloßen, einem Stachel
 am Schwanz und breiten platten Mahlzähnen; die
 Rastfalten (*Trygonida*) mit langem Stachel, den
 Pflasterzähnen; die eigentlichen Rochen (*Rajida*) mit
 Schwanzstachel mit spitzen Pflasterzähnen; die Zitter-
 rochen (*Torpedo marmorata*, Fig. 3) mit
 der Scheibe und eigenthümlichem elektrischen
 parate, welcher in dem Raume zwischen den
 floßen und dem Schädel liegt und aus sechs
 stellten Zellen Säulen besteht, mit dem sie stark
 ertheilen können; die abgebildete Art im Ringe
 und endlich die Hairochen (*Squalinorida*),
 spindelförmigen Körper, didem, fleischigen
 und kleinen Brustfloßen, welche den Kopf
 reichen; der bekannte Sägesfisch (*Pristis*
 Fig. 4), an dessen langer Schnauze seitlich
 Zähne stehen, die eine Säge bilden, gebört
 schlanken Gestalt zu dieser Abtheilung der

Die Familie der Haien (*Squalida*) zeigt
 langen, spindelförmigen Körper, senkrecht gehalte-
 floßen und einen starken fleischigen Schwanz,
 seinem Ende sich aufwärts biegt und eine
 Endfloße trägt. Die Kiemenspalten (Fig. 5)
 theil des Skelets vom Stachel: a
 b Nasentnorpel, c Zungenbogen, d
 e Oberkiefer, f g Lippentnorpel, 1—5 Kiemen-
 51, 52 Schultergürtel, k Arm, l Mittelhand, m
 belsäule, p l Rippenfortsätze) stehen seitlich an
 die Augen haben ausgebildete Lider, die
 ist spitz und Schädelfloßen fehlen durchaus; hinter
 auf der untern Fläche der Schnauze angebrachte
 löchern steht das breite bogenförmige Maul an
 Unterfläche, gewöhnlich mit mehreren Reihen
 verhältnißmäßig großer, spitzer oder schneiden-
 versehen. Gewöhnlich finden sich zwei Rücken-
 zuweilen durch Stacheln gestützt; die Spritzlöcher
 bald vorhanden, bald fehlen sie gänzlich. Zu
 Familie gehören die gefährlichsten Raubfische von
 gemeiner Gefährlichkeit, von denen einige Arten
 eine Länge von 30 Fuß erreichen und viele
 Menschen gefährlich werden.

Auch hier hat man wieder viele Gruppen
 schieden: die Mahlhaie (*Cestracion*) in
 mit breitem Kopf und Mahlzähnen hinten
 Kiefern, nähren sich von Muscheln; die
 (*Spinacida*) mit spitzen, durch große Stacheln
 Rückenfloßen, ohne Afterfloße, mit spitzen
 die Glatthaie (*Galeida*) ohne Stacheln,
 haut, sehr kleinen Spritzlöchern und dreieckig
 oder platten gepflasterten Zähnen. Durch die
 und Stellung der Flossen kommen die
 haie (*Carcharida*) den vorigen nahe, unter-
 sich aber durch den Mangel der Spritzlöcher
 stets sehr scharfen, spitz dreieckigen oder zugespitzten
 Zähne. Hierher der gemeine graue Hai (*Carcha-
 glaucus*, Fig. 6) im Ocean und Nordmeer, der
 8 Meter lang wird, und der durch die selbst
 die Breite gezogene Form des Kopfes aus-
 Hammerhai (*Zygaena malleus*, Fig. 7).
 Kiejenhaie (*Lamnida*) mit zwei stachellosen
 floßen, einer Afterfloße und großen Spritzlö-
 deren Augen aber die Rückhaut fehlt. Die Kiemen-
 spalten sind sehr groß, so daß sie zuweilen fast um
 ganzen Hals herumreichen, alle vor den Brustflo-
 gelegen; die Schnauze meist lang, das Maul
 weit, die Zähne gewöhnlich zungenförmig, un-
 zuweilen mit Nebenzipfen versehen. Die Grauhai-
 (*Notidanida*) mit nur einer Rücken- und Afterfloße,
 aber sechs bis sieben Kiemenspalten, und endlich der

ten Hundsbaie (Scyllida), welche unter ein einzig Eier legen, während die andern eine Junge gebären.

Unterklasse der Knochenfische (Teleostei).

Ein skelet mit biconcaven Wirbeln. Kein muskulöser Arterienstiel.

In diesen Fischen findet sich stets ein aus Knochen bestehendes Skelet (Taf. 23, Fig. 4 und 16). Die Wirbeln, welche die Form hohler Röhren haben. Unter keinen Umständen sieht man eine unvollständige Ausbildung des Skelets, noch bei den vorigen Ordnungen beobachtet. Es gibt es manche Gattungen, bei welchen die Wirbel insofern nicht ganz vollständig, als sich ein zelliges Gewebe findet von Knochenballen, dessen Zwischenräume noch mit Knorpelsubstanz erfüllt sind; allein auch dann lassen sich die einzelnen Wirbel sehr deutlich erkennen. Ebenfalls ist dem Schädel (Taf. 24, Fig. 7) Schädel des Fisches, die einzelnen Knochen wohl ausgebildet, während des erwachsenen Zustandes fast Meist der ursprünglichen Knorpelkapsel zurückbleibt, dem die übrigen Schädelknochen als Decke gebracht sind. Die Verhältnisse der Schädelkapsel unter sich und die daraus hervorgehenden Verhältnisse der Schädelkapsel, und namentlich die Ausbildung der Kieferknochen, ihre mehr oder große Beweglichkeit, ihre Bewaffnung so verschieden, daß hieraus sich viele Charaktere zur Bestimmung der einzelnen Familien lassen. Die Bezahnung (Taf. 23, Fig. 9) ist mannichfaltig und zuweilen auf alle Knochen, irgend an der Begrenzung der Mundhöhle Anhängen, ausgebreitet; ganz fehlen die Zähne nie, und dann, wenn sie den Kiefern abgehen, wie bei den Knorpelfischen, finden sich welche an den unteren Kiefern. Ein Kiemenbedeckungsapparat ist stets vorhanden. Gewöhnlich tritt der Kiemenbedeckel, nur von unten bedeckt, frei an der Seite des Halses, und bedeckt die bald mehr, bald minder weite Öffnung, die stets nur einfach ist und in höchst selten Fällen mit derjenigen der andern Seite in einer Linie zusammenfließt. Meist tritt auch an der Seite des Halses die freie Kiemenhaut hervor, deren Strahlen gestützt durch die Kiemenstrahlen, deren Zahl und Beständigkeit bei den verschiedenen Familien sehr verschieden sind. Kiemenbedeckel sind bei wenigen Familien sehr unähnlich und vollständig durch die Kiemen, zuweilen selbst durch bedeutende Muskelbedeckung. Das Flossensystem ist meistens unvollständig; die Brustflossen fehlen fast nie. Haben manchmal eine so bedeutende Größe, wie bei den Fischen beim Springen aus dem Wasser erhalten kann. Zu den meisten Fällen sind Bauchflossen vorhanden und je nach den Umständen bald unter dem Bauche, bald an der Brust, bald an der Brustflossen an der Kehle angeheftet; in einigen Gattungen fehlen sie gänzlich oder zur Unkenntlichkeit verkümmert. In den meisten Flossen zeigt sich eine große Mannichfaltigkeit, indem der Körper in seiner ganzen Länge mit Flossen umsäumt, die in dem Rücken sich um den Schwanz herum und auf der Unterseite bis zum After fortsetzt; in andern Fällen eine Abtheilung in Rücken-, Schwanz- und Brustflossen, wobei die Brustflossen in drei Abtheilungen, wobei noch als allgemeinere Regel die Existenz der Rücken- und Afterflossen bleibt, obgleich

alle seitlichen Flossen, in einem Falle diese, in einem andern jene, fehlen können. Die Schwanzflosse ist bei allen Knochenfischen homocert, obgleich sie bei dem Embryo eine heterocerte Bildungsperiode durchmacht, von welcher zuweilen in dem Skelet, nicht aber in der äußeren Bildung noch Spuren zurückbleiben. In der Natur der Flossenstrahlen zeigen sich mehrfache Unterschiede; oft sind die Strahlen aller Flossen vollkommen weich, biegsam und gegliedert, in andern Fällen findet sich als Stütze vor der Flosse ein einfacher Knochenstrahl, der oft gezähnt oder in sonstiger Weise verzweigt ist. Dann gibt es aber auch eine ganze Gruppe von Knochenfischen, bei welchen mehrere Stachelstrahlen in der Rückenflosse, der Afterflosse und einer in den Bauchflossen vorhanden sind, ja wo sich oft zwei Rückenflossen finden, von denen dann die vordere nur von harten Stachelstrahlen, die hintere von weichen Strahlen gestützt wird.

Die Bedeutung der Haut erscheint bei den Knochenfischen in mannichfacher verschiedener Ausbildung. Viele sind ganz nackt, ihre Oberhaut schleimig, die Leberhaut darunter ziemlich fest und nirgends eine Spur von Schuppen zu sehen; bei andern liegen in einer solchen Haut knöchernen Schilde und Tafeln, deren äußere Fläche oft mit Zahnschubstanz überzogen ist und die sich namentlich gern auf und hinter dem Kopfe zu schildförmigen Panzern vereinigen; zuweilen stoßen diese Tafeln im ganzen Umfange des Körpers zu einem Knochenpanzer zusammen, an dem die Ränder der einzelnen Tafeln oft wie die Schienen eines Karasses übereinander greifen. In den meisten Fällen finden sich indeß eigentliche Schuppen von verschiedener Größe, die sich vorzüglich nach zwei Richtungen hin ausbilden; bald nämlich ist ihr hinterer Rand vollkommen abgerundet, glatt und die Anwachsstreifen auf der ganzen Oberfläche deutlich hervortretend; in andern Fällen aber finden sich an dem hinteren Rande entweder Zählungen oder kleine aufgesetzte stachelige Stümpfen, durch die der ganze hintere Rand der Schuppe rauh wird. Rundschuppen (Cycloidei) mit ganz randigen, und Kammschuppen (Ctenoidei) mit säggenartig gezähnten Schuppen.

Hinsichtlich der innern Anatomie haben wir schon in der Einleitung das Nähere bemerkt, und es genügt hier, auf diejenigen Charaktere aufmerksam zu machen, welche zur Unterscheidung der Knochenfische, namentlich von den Ganoiden, dienen können. Der Arterienstiel des Herzens wird bei allen Knochenfischen nur von der verdickten gewöhnlichen Faserlage der Arterie gebildet und es geht ihm gänzlich jene äußere Muskelschicht ab, welche dem Herzen der Ganoiden und der Knorpelfische eine dritte pulsirende Abtheilung zuführt; an seinem Grunde finden sich stets nur zwei Klappen, die den Eingang in die Kammer schließen. Eine Spiralklappe des Darms ist niemals vorhanden und die Sehnerven kreuzen sich vollständig übereinander, so daß sie nach dem Auge der entgegengesetzten Seite gehen. Hinsichtlich der Schwimmblase, die bei allen Ganoiden vorliegt und sich in den Schlund öffnet, findet sich bei den Knochenfischen große Mannichfaltigkeit, indem sie bei den einen ganz fehlt, bei andern mit offenem Gange in den Schlund mündet, während bei noch andern dieser Lustgang vollständig verschlossen ist. Im allgemeinen scheint die Gegenwart der Schwimmblase nicht von so außerordentlicher Bedeutung, da selbst in derselben Gattung sie zuweilen der einen Art zukommt, der andern fehlt oder bei ganz nahe verwandten Familien ähnliche Unterschiede sich vorfinden.

Die Unterklasse ist außerordentlich zahlreich an Formen, die zum großen Theil nur sehr untergeordnetes

Interesse gewähren, wir erwähnen nur die hauptsächlichsten Familien.

Ordnung der Luftgänger (Physostomi).

Die Schwimmblase ist mit dem Schlunde durch einen offenen Luftgang verbunden.

Unterordnung der Bauchfloßer (Abdominales).

Weiche, gegliederte Strahlen in allen Flossen (Malacopterygii). Die Bauchfloßen in normaler Stellung unter dem Bauche.

Die Fische, welche dieser Unterordnung angehören, zeigen meist eine spinelförmige Gestalt und im allgemeinen eine große Regelmäßigkeit der Körperform, sowie eine gleichmäßige Ausbildung sämtlicher Organe. Bei allen kommen sämtliche Arten von Flossen vor, die stets nur von weichen Strahlen gestützt sind, mit alleiniger Ausnahme einiger Familien, bei welchen zuweilen der erste Strahl der Rücken-, Brust- oder Afterflosse eine knöcherne Consistenz besitzt und sich als starker, gewöhnlich gezählter Stachel darstellt. Es findet sich stets nur eine von Strahlen gestützte Rückenflosse, hinter welcher zuweilen eine zweite strahlenlose nur von einer Hautduplicatur gebildete Flosse steht, die man mit dem Namen der Fettflosse bezeichnet hat; manchmal, jedoch nur selten, ersetzt diese Fettflosse auch die wirkliche Rückenflosse. Die Bauchfloßen sind stets vorhanden und stehen unter allen Umständen unter dem Leibe, niemals an der Kehle oder an der Brust. Diese abdominale Stellung der Bauchfloßen bildet in Verbindung mit dem durchgängigen Charakter der weichen gegliederten Flossenstrahlen das wesentlichste Merkmal dieser Unterordnung. Fast ebenso allgemein findet sich eine Schwimmblase, welche stets, wenn sie vorhanden ist, durch einen offenen Gang in die Rückenwand des Schlundes einmündet. Eine Familie, welche sich durch ihre übrigen Charaktere dieser Unterordnung so nahe anschließt, daß manche Forscher sie sogar nur für eine Gruppe halten, entbehrt freilich der Schwimmblase durchaus. Die Schuppen fehlen zuweilen gänzlich oder sind in seltenen Fällen durch Knochenfäulen ersetzt, meist bedecken sie aber den ganzen Körper und haben unter allen Umständen einen ganzen hintern Rand, ohne Einschnitte, Kerben oder Spigen, so daß also alle hiergehörigen Fische zu den Cycloidschuppen gehören. Von andern Unterordnungen der Knochenfische unterscheiden sich die Weichfloßer außerdem noch durch die stets getrennten unteren Schlundknochen. Die verschiedenen Familien sind äußerst zahlreich und meistens als Nahrungsmittel geschätzt; sie sind vorzugsweise Bewohner der süßen Gewässer.

Die Familie der Welse (Silurida) hat entweder eine ganz nackte lederartige Haut ohne jede Spur von Schuppen oder Knochenfäulen, welche sich hauptsächlich in der Nähe des Kopfes entwickeln und zuweilen sogar den ganzen Körper einhüllen. Der Kopf ist plattgedrückt, breit, der Maßen entweder an der Spitze der Schnauze oder etwas mehr nach hinten auf der Unterfläche gelegen und die Mundspalte einzig von dem Zwischenkiefer gebildet, indem die Oberkiefer zu Bartfäden verlängert sind. Die Schwimmblase ist stets vorhanden und durch einen offenen Gang mit dem Schlunde verbunden; an ihrem vordern Ende befinden sich einige kleine, ineinander gefasste Knöchelchen, von denen das hintere in die Sehnenhaut der Schwimmblase eingefügt ist, das vordere aber an das Labyrinth heranreicht, so daß Schwimmblase und Ohr durch eine Kette von Gehörknöchelchen miteinander verbunden sind. Zu den Brustfloßen ist oft der erste Strahl ein starker

Stachel, der durch ein eigenthümliches Gelenk gestellt werden kann, daß er als Vertheidigungsdienst. Die Ausbildung der Rückenflosse ist verschieden; bald ist sie sehr lang, in andern Fällen oder vollkommen verschwunden und dann ist die Fettflosse ersetzt, welche sich oft auch hinter der tragenden Rückenflosse findet; gleichermaßen findet sich in der Ausbildung der Afterflosse. In verschiedenen Gattungen finden sich eigenthümliche Flossen, die sich längs der Wirbelsäule nach hinten und in die Kiemenhöhle ausmünden und die Aufnahme von Luft oder Wasser bestimmen. Die Zähne der Welse sind stets aus echter Knochensubstanz gebildet, hechel- oder büschelförmig, zum Theil zweispitzig, und die Kiemenspalten bald mehr bald nur eng und klein. Eine im Nil lebende Art, die nur eine Fettflosse auf dem Rücken besitzt (Pylodictyon), zeichnet sich durch den Besitz mächtiger Organe aus, die zu beiden Seiten des Kopfes unter der Haut liegen, gefaltete Längsklappen und kräftige Schläge erteilen. Die meisten finden sich in den süßen Gewässern vor; in den europäischen Flüssen kommt nur ein Art vor, der gewöhnliche Wels (Silurus asotus, Taf. 24, Fig. 19), die aber zuweilen von mehreren Centnern erreicht.

Die Familie der Karpfen (Cyprinidae) der vorigen in der Bildung der quergebundenen Gehörknöchelchen mit dem Labyrinth; die Schwimmblase überein, unterscheidet sich von allen übrigen Familien durch die kleine, die durchaus zahnlos ist und deren Rand dem Zwischenkiefer gebildet wird, über den tiefer als sogenanntes Schnurrbartchen ein Körper ist meist hoch, plattgedrückt, der die Schuppen bald sehr groß, bald unordentlich klein und unscheinbar und bald insofern in ihrer Structur verschieden, als kleinere Schuppen, zum Beispiel der Schleien (Cottidae), vielfache concentrische und radiale Streifen kommen, welche die Schuppe zellenartig während bei den großen Schuppen der Karpfen die radiale Streifenlinie fast verläßt, so daß die concentrischen Streifen übrigbleiben. Die Karpfen haben eine Rückenflosse und eine Afterflosse. Die Karpfen nähren sich von Wasserpflanzen und Würmern, zu deren Nahrung sonst das Maul zahnlos ist, auf den Knochen einige große und mächtige Zähne sind, welche gegen eine vorspringende Schädelschuppe, die mit Horn bedeckt ist, geschützt sind. Der Magen hat keinen Blinddarm, keine Pfortneranhänge, die Kiemenhaut ist ohne Strahlen. Bei einigen Gattungen kommt die Brust- und Afterflosse ein starker gezählter Stachel. Angehörigen dieser Familie hat man verschiedene Gruppen zerteilt: die echten Karpfen mit vier Bartfäden, Rücken- und Afterflosse gezählten, starken Knochenstrahl besitzen; die ungeraden Karpfen (Cyprinus carpio) mit seinen Varietäten Spiegelskarpfen, Schleien, die Schleien (Tinca chrysolata) mit zwei Bartfäden; die Gründlinge (Carrasius auratus) u. s. w.

Die Familie der Schmerlen (Acanthopoma) schuppenlos, Augen klein. Suborbitaldornen, möglichen Dornen. Schlundzähne (ichth.)

ne Knochenkapsel eingeschlossen. Die Fische kassir und Luft durch den After ein und den Kiemen auf diese Weise. Graben schlamm ein. Hierher der größere Schlammschüssel (Cobitis fossilis) mit zehn Bartfäden; die (Cobitis barbatula, Taf. 24, Fig. 18) mit Fäden; die Grundel (C. taenia); beide letztere Fische.

Die Familie der Hechte (Esocida) erreicht der Hecht, welcher bei der vorigen Familie wie der Aal ganz allein den Mundrand bildet, des Rachens nicht, so daß die hintere Hälfte des Kopfes noch mit vom Oberkiefer gebildet und dessen über dem Zwischenkiefer liegt. Die Fische nur im süßen Wasser gemäßigter Zonen, sind durchaus mit großen runden Schuppen bedeckt, welche viele dichte concentrische Linien und einige Fächerlinien zeigen, die in Spalten liegen, so daß der vordere Rand in mehrere Lappen zerfällt. Ihr Mund ist sehr stark bewaffnet, nicht nur auf dem Kiemenknochen, sondern auch auf dem Vorderrücken, dem Flugknochen und der Kehlknochen vorhanden. Der Magen hat keinen After, der kurze Darm keine Pfortneranhänge; die Leber liegt tief unter der Haut der Kehlknochen, die Schwimmblase ist einfach. Der Hecht (Esoc lucius, Fig. 9), der der schlimmste Raubfisch unserer Gewässer ist, bewohnt die Heringe (Clupeida) bewohnt mit Ausnahme nur das Meer und ist eine von den Fischfamilien, welche wesentlich für unsere Nahrung betrachtet werden.

Die Heringe sind über den ganzen Leib mit kleinen, runden, dünnen, biegsamen, leicht abblätternden Schuppen, deren concentrische Linien nur den Rand parallel laufen und dort gerade verlaufen. Ihre Fächerlinien neigen sich in Winkeln hinten zusammen. Die Fische haben ein kleines Maul, das vorn vom Zwischenkiefer, der Oberkiefer eingefaßt wird, welcher durch den vorderen verbunden ist und so seine Wirkung bildet. Der Schädel zeigt einen kleinen Kiefer mit zwei Seitenlappen, die nach oben lange, dicke, Stacheln auslaufen, sowie starke Verlängerungen des Keilbeins, die sich nach hinten ausbreiten die ersten Halswirbel von der Seite her umfassen. Eine Fettflosse ist bei einigen Gattungen die Schwimmflosse bei andern vorhanden ist; dagegen haben die Pfortneranhänge und die meisten eine Nebenflosse aber bei andern sehr klein wird und allmählich verschwindet. Die Schwimmblase zeigt eine seitliche nach vorn gerichtete Blindfächer, selbst häutige Kanäle, welche sich mit dem vorderen verbinden, denen aber die Knöchelchen bei andern Gattungen finden sich große, gläserne, durchsichtige Augenlider, die von vorn und hinten das Auge bedecken und in der Mitte nur einen rechten Spalt lassen. Am bekanntesten von ihnen ist der echte Hering (Clupea harengus), zu dessen Fischerei in der Nordsee ganze Flotten von Fahrzeugen ausgerüstet werden. Zur Vornahme der Heringe in ungeheurer Scharen auf der Oberfläche und gegen die Küsten hin, um die Eier abzugeben; sie schwimmen dann so dicht an der Oberfläche, daß man von weitem her den glänzenden Schuppen sieht. Man weiß, daß diese Heringsscharen hoch aus dem Meeresspiegel ragen und sich an der Spitze von Bergen in zwei Züge theilen, von welchen der

eine östlich längs der norwegischen Küste bis in die Ostsee und an die jütische Küste sich ergießt, während der andere an der westlichen Küste Englands und Irlands herum bis in den Kanal und an die Bretagne gelangt. Die Wahrheit liegt darin, daß die Fische das ganze Nordmeer bewohnen und zu verschiedenen Epochen vom Juli bis gegen den November hin an das Ufer herantommen.

Hierher ferner die Sardellen (Alausa pilchardus, Fig. 3), im Nordmeere, Alausa sardina im Ocean; der Maifisch oder die Alose (Alausa vulgaris), die in den Rhein in Scharen aufsteigt; die Anchovise (Engraulis encrasicolus, Fig. 4) im Mittel- und Nordmeere.

Die Familie der Lachse (Salmonida) wird von äußerst wohlgeschmachten, besonders den nördlichen Zonen angehörnden Fischen gebildet, die meistens nur in klaren Flüssen, Seen und Gebirgsbächen wohnen, von denen einige aber auch abwechselnd in das Meer hinabsteigen und nur zur Laichzeit in das süße Wasser kommen. Es sind meist schlaffe, spindelförmige, lebhaft gefärbte oder gefleckte Fische mit deutlichen, großen, regelmäßigen Schuppen, ohne Fächerlinien, auf deren Oberfläche sich nur wenige concentrische Linien zeigen, die um die Schuppe herumlaufen. Sie besitzen stets eine hintere Fettflosse. Ihr Maul wird vorn vom Zwischenkiefer, hinten vom dem durch Haut damit verbundenen Oberkiefer begrenzt. Die Zahnung ist je nach den verschiedenen Gattungen außerordentlich verschieden, indem einige gar keine Zähne haben, während bei andern sämmtliche Knochen des Rachens damit besetzt sind. Sie haben lammartige Nebenkien, eine große einfache Schwimmblase, viele Pfortneranhänge an dem Darmsack und eine sehr eigenthümliche Bildung der Eierstöcke, die vollkommen abgeschlossen sind und mit keinem Ausführungsgange in Verbindung stehen. Die reifen Eier sprengen die zarten Kapseln, von welchen sie umgeben sind und fallen in die Bauchhöhle, aus der sie durch eine mittlere, hinter dem After gelegene Oeffnung ausgeführt werden. Es gehören hierher die verschiedenen Lachse, Forellen, die man in den klaren Gebirgsbächen antrifft und die jetzt wesentlich Gegenstand der künstlichen Fischzucht geworden sind: die Lachse (Salmo salar, Taf. 24, Fig. 10), mit großen Zähnen und aufwärtsgebogenem Unterkiefer beim alten Männchen, mit langem Flugknochen, aus dem Meere in die Flüsse aufsteigend, bis 25 Kilo schwer; der Salmling (Salmo umbla, Fig. 12) in den Alpenseen, mit kurzem Flugknochen; die Bachforelle (Salmo fario, Fig. 11), mit farbigen Flecken, in klaren Bächen; die durchaus zahllosen Maränen oder Felsen (Coregonus maraena, Fig. 13), nur in Seen.

Die Familie der Blindfische (Heteropogon) ist nur durch eine einzige kleine Art bekannt, welche in Nordamerica lebt und durch die Stellung der Flossen sich den Stodfischen nähert. Das Fischchen ist nackt, länglich, der Kopf abgerundet, das vordere Nasenloch weit von dem hintern entfernt und in eine Röhre ausgezogen; die sehr kleinen Augen von undurchsichtiger Haut überzogen. Der After befindet sich vor den Bauchflossen unter der Kehle, der Darm besitzt Pfortneranhänge und der Magen einen Blinddarm. Nebenkien und Fettflosse fehlen, die Schwimmblase ist einfach. Der Fisch gebiert lebendige Junge. Amblyopsis spelaeus.

Wir erwähnen nur die Familien der Panzerfische (Goniodont), der Zahnlarven (Cyprinodont), der Rilsche (Mormyrida), der Leuchtfische (Scopelida), ohne uns weiter damit zu beschäftigen.

Unterordnung der Kahlhäute (Apodes).

Luftgang der Schwimmblase offen; keine Bauchflossen.

Der Körper dieser Fische, von welchen der Aal den bei uns bekanntesten Typus darstellt, ist schlangenförmig langgestreckt, mit natter, weicher, schleimiger Haut überzogen, in deren Dide zuweilen fast mikroskopisch kleine Schuppchen versteckt sind, welche einander niemals berühren und so regelmäßige Fächerstreifen und concentrische Linien zeigen, daß sie aus einzelnen nach der Peripherie hin wachsenden Zellen zusammengesetzt scheinen. Die meisten dieser Fische haben eine lange sadartige Schwimmblase mit einem Luftgange, der ebenso wie bei der vorigen Unterordnung in die obere Wand des Schlundes mündet; ihre Flossen sind stets von weichen Strahlen gestützt, aber im ganzen äußerst rudimentär; die Bauchflossen fehlen immer; von den Brustflossen sind sehr häufig nur die rudimentären Schultergürtel vorhanden, während die äußere Flosse gänzlich fehlt. Auch die senkrechten Flossen sind entweder nur in der Form einer durchgehenden Embryonalflosse vorhanden oder mehr oder minder abortiv. Der Schädel aller kahlhäutigen Fische ist lang, schmal, die obere Fläche platt, eben, ohne Spur von Kammern und Gruben, die Hinterhauptsfläche wie senkrecht abgebrochen. Kopf und Hals sind von dicker Haut überzogen, welche den Kiemenbedel und die Kiemenhaut so sehr einhüllt, daß sie von außen nicht gewahrt werden können und meist nur eine kleine unbedeutende Kiemenpalte übrigbleibt, während zugleich hiedurch ein weiter Kiemenad gebildet wird, an den sich zuweilen noch ein accessorischer, längs der Rückenwirbelsäule ausgebreiteter Athemsack anschließt, was die Fische dieser Ordnung meistens befähigt, das Wasser zu verlassen und längere Zeit auf trockenem Lande auszuhalten. Alle sind gefräßige Raubfische, die theils im Meere, theils im süßen Wasser leben.

Die Aale (Muraenida) haben einen spitzen Kopf mit lang vorgezogener Schnauze, die mit starken Patenzähnen bewaffnet ist. Die Mundspalte wird einzig vom Zwischenkiefer begrenzt; der Oberkiefer liegt über demselben, zu einem ganz kleinen Knöchelchen geschrumpfen, im Fleische. Die Brustflossen fehlen oft gänzlich; vor ihnen findet sich die fast horizontal gestellte, spaltförmige kleine Kiemenöffnung; auch die senkrechten Flossen sind zuweilen so verkümmert, daß eine ober die andere, zuweilen selbst alle gänzlich fehlen. Der Schultergürtel ist nicht, wie bei den übrigen Knochenfischen, an dem Hinterhaupte, sondern weiter nach hinten an der Wirbelsäule aufgehängt. Die Bauchhöhle ist ziemlich kurz, der After fast in der Mitte des Körpers, der Magen mit einem Blindfack versehen, der Darm dagegen ohne Pfortneranhänge; Eierstöcke und Hoden entbehren gänzlich aller Ausführungsgänge und ihre Producte werden durch zwei sehr kleine Oeffnungen zu beiden Seiten des Afters aus der Bauchhöhle, in die sie sich entleeren, ausgeführt. Der ziemlich allgemein verbreitete Glaube, daß die Aale lebendige Junge gebären, ist falsch und wurde durch die Entleerung von Eingeweiden wärmern aus dem After bezeugt, die man ihrer Gestalt wegen für junge Aale hielt.

Hierher gehört unser gewöhnlicher Aal (*Anguilla vulgaris*, Taf. 24, Fig. 2), der zur Ablegung seiner Eier in das Meer wandert, aus welchem die junge Brut in Scharen wieder aufsteigt und der in den brasilischen Lagunen von Comacchio besonders in Massen gesichtet wird; der Meeraal (Conger), bis zu 6 Fuß lang, schlechtes Fleisch; die Muräne (*Gymnothorax*

muraena, Taf. 23, Fig. 19), schwarzbraun marmirt, ohne Brustflossen, im Alterthum außerordentlich geschätzt und von den Römern mit Elaren gekostet.

In der Familie der Bcheraale (*Symphoricarid*) sind die beiden Kiemenöffnungen unter der Haut in einem einzigen Loche vereinigt, welches durch eine mittlere Scheidewand in zwei Theile theilt ist. Der Zwischenkiefer begrenzt wie bei den vorigen das ganze Maul, aber der Oberkiefer ist rudimentär und im Fleische versteckt, sondern den Zwischenkiefer in seiner ganzen Länge; der Schultergürtel ist weit hinter dem Kopfe an der Haut aufgehängt; die Brustflossen fehlen gänzlich; den senkrechten Flossen lassen sich meistens die Seitenflossen erkennen. Die Schwimmblase, der Fundus des Magens und die Pfortneranhänge fehlen aus, der Darm ist ganz gerade und die Leber ist unordentlich lang; hinsichtlich der Bildung der Geschlechtstheile unterscheiden sich diese Thiere ebenfalls von den Aalen, indem sowohl Hoden wie Eierstöcke unmittelbar in Ausführungsgänge fortgehen, an dem After öffnen. Bei einigen Gattungen ist die Zahl der Kiemen verringert und dagegen die Athemsäcke ausgebildet, welche von der Kiemen ausgehen. Sie leben in den süßen Gewässern und pischen Länder.

Die Zitteraale (*Gymnotida*) kommen in den vorigen in der Anatomie der Geschlechtsorgane unterscheiden sich aber von ihnen dadurch, daß die Kiemenöffnungen wie bei den gewöhnlichen Aalen über den sehr kleinen Brustflossen sich öffnen. Das Maul wird nur vorn von dem Zwischenkiefer weiter nach hinten dagegen von dem Oberkiefer begrenzt, ein wesentlicher Unterschied von den vorigen Familien; die Bauchhöhle ist nur sehr klein, der Darm, welcher Pfortneranhänge besitzt, öffnet sich nach hinten in Bindungen unter der Kehle, wo die ungenutzten Afterflossen beginnt; die Rückenflosse fehlt gänzlich. Der bekannteste Fisch aus dieser Familie, der Zitteraal (*Gymnotus electricus*), der in den jumpigen wässern der Savannen Südamerikas lebt, wird bis zu 6 Fuß lang und kann so heftige Schläge aussetzen, daß Menschen und Pferde davon für einige Zeit gelähmt werden. Das elektrische Organ erstreckt sich über die ganze Länge des Schwanzes unter der Kehle an zu beiden Seiten unter der Rückenflosse besteht aus Platten, die zu Säulen aufgestellt sind, welche quer gegen die Hautfläche stehen. Verschiedene Gattungen entbehren dieses mächtigen elektrischen Organs durchaus.

Ordnung der Blindgänger (Physoclisti).

Der Luftgang der Schwimmblase geschlossen; die Kiemen lamellenförmig; der Zwischenkieferapparat beweglich.

Unterordnung der Ohnedornen (Acanthina).

Nur weiche Strahlen in den Flossen; untere Schlundknochen getrennt; Bauchflossen fehlend oder nach vorn gerückt.

Die Fische, welche diese Unterordnung bilden, kommen mit den Weichflossern insofern überein, als sie ganz allgemein nur weiche gegliederte Strahlen in den senkrechten Flossen besitzen und ihnen sogar auch der Stachelstrahl ganz allgemein fehlt, welcher bei einigen Gattungen der Weichflosser vorkommt; sie unterscheiden sich aber von den Weichflossern wie von den kahlhäutigen durch den Bau der Schwimmblase, an welcher der Luftgang stets vollkommen geschlossen ist, so daß

Communication zwischen der Schwimmblase und Schlunde stattfindet. Meist ist sogar der ursprüngliche Luftgang, der beim Embryo existierte, so verschwunden, daß man nicht einmal eine Anheftung des vorderen Endes der Schwimmblase an den Darm mehr findet. Ein fernerer Unterschied ist der, daß die Bauchfloßen entweder fehlen, was sehr selten ist, oder aber sich an der Kehle unmittelbar unter den Brustfloßen oder vor denselben befinden. Die unteren Schlundknochen sind stets vollkommen gegenwärtig, was sie von der folgenden Unterordnung unterscheidet. In den übrigen Charakteren herrscht eine große Verschiedenheit zwischen den verschiedenen Familien, deren Vereinigung allerdings auf ersten Blick etwas sehr Ungewöhnliches hat.

Die Sandaale (*Ammodytidae*) kommen in der langgestreckten Körperform, in dem Mangel der Bauchfloßen und den Nalen überein, unterscheiden sich aber von den übrigen durch die wölbungsartige gabelige Schwanzflosse, durch die zwar nackte, aber silberglänzende Haut und durch die vollständige Ausbildung des Kiemenapparats, der ganz frei und nicht von lederartiger Haut überzogen ist. Die Rückenflosse beginnt fast immer an der Basis der Schwanzflosse und reicht bis zur Spitze der Flosse, sie ist ebenso wie die Afterflosse von weichen Strahlen gestützt, die aber völlig ungetheilt und einfach sind. Die Sandaale besitzen Nebenkiemen und eine kiemenförmige Knochenschultergürtels, welcher den Nalen fehlt, bei den übrigen Knochenfischen aber vorhanden ist. Die schlanken Fische graben sich in der Nähe des Strandes besonders gern da ein, wo der Sand bei der Ebbe trocken gelegt wird; sie dienen hauptsächlich bei dem Fischfange als Köder.

Die Schlangenfische (*Ophidiidae*) kommen mit den Nalen und mit der vorigen Familie durchaus in der Körperform sowie in dem Mangel der Bauchfloßen überein. Manche dieser Fische haben auch wie die Sandaale keine Brustfloßen, sobald man sie früher häufig zu diesen stellte. Die festsitzenden Flossen sind von einfachen, ungetheilten, weichen Strahlen gestützt und zuweilen so sehr von Haut überzogen, daß sie eiförmig gleichen; sie haben alle eine Schwimmblase, welche keinen Luftgang besitzt, und deutliche Nebenkiemen, meist aber keine Fortmeranhänge; der After steht sich bald mehr in der Mitte des Körpers, bald mehr nach vorn unter der Kehle. Einige haben Fortsätze und kleine Schuppen, in der Haut versteckt, während andere ganz nackt sind; sie kommen nur in der See vor, und zwar nicht nördlicher als im Mittelmeere.

Weit bekannter und zahlreicher als die vorige ist die Familie der Stöckfische (*Gadidae*), welche sich hauptsächlich nur im Meere, und zwar mehr in den nördlichen Gegenden finden. Es sind langgestreckte, keilförmige Fische mit langem Schwanz, kurzer Bauchhöhle und meist breitem, abgeplattetem Kopfe, deren Körper gewöhnlich von schleimiger Haut überzogen ist, in der sehr kleine, weiche Schuppen sitzen, welche gänzlich in Hauttaschen versteckt sind, wenige, weit abstehende concentrische Linien besitzen, die um die ganze Schuppe herumlaufen, und durch wenige Querlinien durchschnitten werden, so daß sie aus Zellen zu bestehen scheinen. Selten nur ist der ganze Körper mit einem Ueberzuge zusammenhängender, horniger, fadenförmiger Schuppen bedeckt. Das Maul ist meist weit geöffnet, endständig, mit kleinen behelfsmäßigen Zähnen besetzt, der Zwischenkiefer begrenzt es in seiner ganzen Länge; der Kopf ist schuppenlos; der Schädel ausgezeichnet durch die blasenartige Aufreibung seiner hinteren Hälfte auf der untern Seite, die wie ein

runder Sack vertritt. Die zugefügten Bauchfloßen stehen unter der Kehle vor den Brustfloßen und sind zuweilen selbst auf einen einzigen Strahl reducirt. Das System der festsitzenden Flossen ist außerordentlich entwickelt, indem zu einer großen Schwanzflosse sich meist noch zwei bis drei Rückenfloßen und wenigstens eine große, wenn nicht zwei Afterfloßen gesellen. Alle sind äußerst gefäßreiche Raubfische, deren Fleisch sehr geschätzt ist und häufig getrocknet oder gesalzen als Nahrung dient. Zum Fange des gewöhnlichen Kabeljau (*Morhua vulgaris*, Taf. 24, Fig. 6) werden besonders nach Newfoundland und den norwegischen Inseln (Lofoten) zahlreiche Schiffe ausgerüstet. Man fängt die Fische mit langen Grundangeln oder Riefnetzen und trocknet sie, nachdem man sie ausgeweidet und den Kopf abgehauen hat, entweder einfach, wo sie dann Stöckfisch heißen, oder man salzt sie ein, in welchem Falle sie Laberdan genannt werden, zuweilen auch salzt man sie nur zur Hälfte, trocknet sie dann und bringt sie unter dem Namen Klippfisch in den Handel. Auch andere Gattungen derselben Familie, z. B. die Schellfische, Dorsche u. s. w. werden, in ähnlicher Weise zubereitet, in den Handel gebracht und die einzige im süßen Wasser lebende Gattung, die Maquappe (*Lota vulgaris*, Fig. 8), gilt ebenfalls für einen guten Tafelfisch.

Familie der Schollen (*Pleuronectidae*), ausgezeichnet durch ihren hohen platten Körper und die unsymmetrische Form ihres Kopfes. Der Körper dieser Fische bildet eine eiförmige Scheibe, deren vordere Spitze von dem Kopfe, die hintere von der meist kleinen runden Schwanzflosse eingenommen wird. Die Rückenflosse beginnt meist unmittelbar über den Augen, zuweilen selbst vorn an der Schnauzenspitze, und zieht sich über den ganzen Rand des Körpers hinweg; die ihr entsprechende hintere Afterflosse ist nur wenig kleiner, da die Bauchhöhle ungemein klein ist und der After sich ganz vorn an der Kehle befindet. Der ganze Körper ist demnach eigentlich nur ein ungemein zusammengegrüßter, scheibenförmiger Schwanz. Diese ganze Bildung wäre noch nicht so sehr auffallend, da es viele Fische gibt, deren Körper ungemein zusammengegrüßt, hoch und platt ist, allein bei den Schollen tritt hierzu noch die Eigenthümlichkeit, daß der vordere Theil ihres Schädels so verschoben und verbogen ist, daß sich die Augen nur auf einer Seite befinden. Diese Augenseite, welche bald die rechte, bald auch die linke ist, wird von dem Fische in der That stets nach oben gewendet und ist allein mehr oder minder dunkel gefärbt, zuweilen getupelt, während die andere Seite, auf welcher die Augen nicht stehen, stets durchaus ungefärbt, weißlich gelb ist. Die Mundspalte ist gewöhnlich klein, an der vorderen Kante ausgebracht, mit Hakenzähnen besetzt; die Brustflosse zuweilen unsymmetrisch, indem sie auf der ungefärbten, augenlosen Seite nur rudimentär ist oder selbst ganz fehlt; die Bauchfloßen stehen ganz vorn, unmittelbar unter der Kehle. Die meisten Schollen haben trotz der durchaus weichen Flossenstrahlen raube, hinten gezähnte Kammuschuppen, einige aber wirkliche Cycloidenschuppen ohne eine Spur von Zähnelung auf dem hinteren Rande. Die Fische lieben tiefe, sandige Küsten und sind alle nur Meeresbewohner, obgleich sie hier und da mit der Flut in größere Fluthflutungen aufsteigen; ihr Fleisch ist äußerst wohlschmeckend und gesund, ihre Größe manchmal bedeutend.

Sie sind Raubfische und besitzen neuern Beobachtungen zufolge sogar die Fähigkeit, sich in ihrer Farbe dem Grunde, auf dem sie zu liegen pflegen, anzupassen. Bei den Schollen flüßt die Schwanzflosse nicht mit den andern Flossen zusammen, sondern bleibt

Stachelstrahlen in den seitlichen Flossen wirklich fehlen, findet sich doch wenigstens in den Bauchflossen, sobald diese vollständig entwickelt sind, ein ausgebildeter Stachelstrahl vor. Die Bauchflossen stehen nur in ihr ersten Fächer unter dem Leibe, gewöhnlich an der Brust, zuweilen auch vor den Brustflossen, die ebenfalls vorhanden sind, unter der Kehle. Die Schwimmblase fehlt häufig, wenn sie aber vorhanden, so findet sich stets der embryonale Luftgang durchaus verschlossen der verschunden, sodas niemals eine Spur von Kommunikation mit dem Schlunde existirt. In Hinsicht aller übrigen Charaktere herrscht bei den zahlreichen Familien die größte Mannichfaltigkeit, sodas unmöglich wäre, hier weiter darauf einzugehen.

Die Röhrenmäuler (Autostomida) besitzen eine lange vorgezogene Schnauze, welche ganz in derselben Weise, wie die Schnauze der Biskeltiemer, von den in einer Röhre verlängerten Gesichtsknochen gebildet wird, an deren Ende sich die kleine Mundspalte mit den kleinen Kieferknochen befindet. Der Zwischenkiefer begrenzt die Mundspalte in ihrer ganzen Ausdehnung. Der Körper dieser Fische ist bald lang, cylindrisch, bald schmal und hoch, die Haut fast nackt oder mit kleinen Kammschuppen oder selbst mit breiten schuppenartigen Panzerstücken besetzt. Die mit weichen Strahlen besetzte Rückenflosse steht weit nach hinten über der Afterflosse, und vor ihr befinden sich bald eine zweite Stachelflosse, bald freie Stachelstrahlen, ja bei einer Gattung fehlen alle Stachelstrahlen gänzlich. Die kleinen Bauchflossen stehen etwa in der Mitte des Körpers unter dem Bauche, und es zeigt sich durch diese Stellung, sowie durch den Mangel von Stachelstrahlen bei der einen Gattung eine unverleugbare Annäherung dieser Familie zu den Weichflossern. Es sind ungenießbare Fische, die gegen Norden hin nicht höher als nach dem Mittelmeere sich ausbreiten. Die abgebildete Art (Meerschnepfe, *Centiscus scolopax*, Taf. 22, Fig. 13) im Mittelmeer.

Die Familie der Panzermangen (Cataphracta) zeigt in einigen Gattungen die seltsamsten Formen, welche überhaupt in der ganzen Klasse vorkommen. Der Kopf dieser Fische ist meist unverhältnismäßig groß und oft mit seltsamen Stacheln, Vorsprüngen und Hautlappen versehen, sodas er ein höchst sonderbares Aussehen gewinnt. Der Vorderbedel ist fast immer in Stacheln oder Dornen ausgezogen, mit Raubigkeiten und Eden bedeckt und die Reibe der Unteraugenknochen unter sich und mit dem Vorderbedel so verwachsen und so ausgedehnt, das sie eine schützende Knochendecke auf der Wangengegend bilden, unter welcher der Kammuskel sich ansetzt. Das System der seitlichen Flossen ist gewöhnlich sehr stark entwickelt, die mächtigen Stachelstrahlen stehen bald vereinzelt, wie bei den gemeinen Stacheln (Gasterosteus aculeatus, Taf. 23, Fig. 10), bald bilden sie eine verdere Rückenflosse, wie bei den Gruppen (Cottus), bald vereinigen sich beide Arten von Strahlen zu einer einzigen großen Rückenflosse. Die Brustflossen sind meistens ungemein entwickelt, bei einer Gattung (Dactylopterus) sogar von Körperlänge, sodas sie als Flugwerkzeuge dienen; zuweilen finden sich vor ihnen freie gebiegene Strahlen, die wie es scheint selbst zum Laufen benutzt werden; die Bauchflossen sind klein, meist unter den Brustflossen aufgehängt; jedoch gibt es auch Gattungen, wie die erwähnten Stacheln, wo sie durch einen starken Stachel, der unter dem Bauche steht, vertreten sind. Die Haut ist bei der Mehrzahl entweder nackt oder mit Knochentafeln gepanzert, meist aber mit kleinen Schuppen bedeckt, die stets Kammschuppen sind, sonst aber in ihrer Structur sehr

wechseln. Oft finden sich nur sehr wenige Zähne auf dem hintern Rande, bei andern kleine, wenig erhabene, kiefelförmige Leisten; ja bei einigen Knurr- oder Seebähnen (*Trigla*) scheinen sogar die Kammschuppen gänzlich zu fehlen und reine, ganzrandige Cycloid-schuppen vorzukommen. Die Stacheln, welche unsere süßen Gewässer bewohnen, zeichnen sich durch eine merkwürdige Fürsorge für ihre Jungen aus. Das Männchen baut nämlich zur Laichzeit aus Wasserpflanzen, die es mit Steinen beschwert, ein rundes Nest mit einem einzigen Zugange, in welches das Weibchen dann die Eier ablegt, die das Männchen in dem Neste befruchtet. Während der ganzen Zeit der Entwicklung der Jungen bewacht nun das Männchen mit vielem Muth das Nest, von dem es jede sich nähernde Gefahr abzuwenden sucht. Außer diesen und den Gruppen kommt keine Art der zahlreichen Familie in den süßen Gewässern vor, während sie alle Meere bevölkern.

Die Familie der Barsche (*Percida*) unterscheidet sich von der vorigen durch die freien Unteraugenknochen, welche mit dem Vorderbedel in keiner Weise verwachsen sind. Der Kopf hat meistens eine regelmäßige Gestalt und entbehrt jener unförmlichen Stacheln und Anhänge, welche bei den Panzermangen so oft vorkommen; dagegen ist der Vorderbedel oder der Kiemenbedel oder beide zugleich an ihrem hintern Rande mit Stacheln oder Zahnreihen versehen. Der Schädel ist namentlich in seinem hintern Theile sehr entwickelt, während das Gesichtstheil lang und schmal ist. Der mittlere Kamm des Schädels setzt die Stirnlinie fort, ohne sich von den Hinterhauptbeinen über die Stirnbeine wegzuziehen, die stets flach sind. Die seitlichen Schädellämme gehen ebenfalls nie weiter, als bis zum hintern Rand der Augenhöhle. Die Mundspalte ist gewöhnlich weit und die Kiefer sowohl wie der Vordertheil des Kieferbogens immer, die Gaumenbeine meistens mit Geheiß- oder Wirtenzähnen besetzt, unter denen sich zuweilen einige größere Fangzähne auszeichnen. Die Schuppen sämtlicher Barsche sind an ihrem hintern Rande rau und flachig, meist durch aufgesetzte kleine zahnartige Stücken, zuweilen aber auch dadurch, das die sehr dicke und starke Schuppe auf ihrer Hinterfläche wie ein Kamm ausgefägt ist. Nähere Untersuchungen über die Anatomie dieser sehr zahlreichen Familie, und namentlich über die Structur ihres Schädels werden ohne Zweifel noch fernere Anhaltspunkte zu ihrer Unterscheidung bieten. Wir theilen dieselben einstweilen in folgende Gruppen: Die eigentlichen Barsche (*Percida*), mit spindelförmigen, meist etwas seitlich zusammengebrühtem Körper, gezähneltem Vorderbedel und weiter Mundspalte, haben gewöhnlich sieben, selten weniger, niemals mehr Strahlen in der Kiemenhaut und bald eine einfache, halbstachelige Rückenflosse, wozu unser Kaulbarsch (*Acerina cernua*, Taf. 23, Fig. 13) gehört; bald zwei Rückenflossen, von welchen die erste stachelig die zweite mit weichen Strahlen versehen ist; hierher gehört unser gewöhnlicher Flußbarsch (*Perca fluviatilis*, Fig. 12) und der mit Recht so geschätzte Sander, Schill, Amsal oder Zogofsch der Ungarn (*Lucioperca sandra*, Fig. 11); ihre Bauchflossen die höchstens sechs weiche Strahlen haben stehen unter den Brustflossen und ihre Schuppen sind stets an dem hintern Rande durch aufgesetzte Stücken rau und gezähnt; sie kommen theilweise in süßen Gewässern, meistens aber in dem Meere vor und haben meist vortreffliches Fleisch. Die Urbarsche (*Holocentrida*) gleichen den vorigen in der Stellung der Bauchflossen, die indessen stets wenigstens sieben weiche

herer größern Hälfte meist stachelig und ent-
 inner fast ebenso ausgebreiteten, halbstacheligen
 je; die Bauchflossen stehen unter den Brust-
 Die Zähne bilden eine einfache, meist schnabel-
 vortretende Reihe in beiden Kiefern, während
 und Flugfisch zahllos sind. Gewöhnlich
 diese Fische zu beiden Seiten des Schwanzes
 : mehrfache scharfe Stacheln oder auch einen
 nig gekrümmten schneidenden Dorn, mit dem
 Wunden versehen können, wie die abgebildete,
 gefürchtete Art (Seebader, *Acanthurus chi-*
Fig. 14).

Familie der Matrelen (*Scomberida*) ist nicht
 zahlreich, als die Familie der Warche, steht
 eher an Nützbarkeit für den Menschen weit
 es sind nur Seefische, die bald eine regelmä-
 drmige, bald eine mehr abgeplattete hohe Körper-
 zeigen und stets ein dünnes Schwanzende mit
 er, gewöhnlich halbmondförmiger Schwanzflosse
 Ihr Körper ist oft ganz nackt, mit sehniger,
 inzender Haut überzogen, in andern Fällen ist
 theilweise, namentlich in der Schultergegend
 ngs des Rückens, in seltenen Fällen gänzlich
 nen, rundlichen Cycloidischuppen besetzt, denen
 herlinien ganz fehlen, während die concentrischen
 nur dem hintern Rande parallel laufen und
 kreis um die Schuppe herum bilden. Meist
 sich an den Seiten des Schwanzes, am Ende
 itenlinie und an den Kanten desselben vor-
 nde, mit gekielten Schuppen, die oft sägeförmig
 , besetzte Leisten; Kiemen- und Vorderbedel sind
 ndig und ungezähnt. Die Anordnung der
 ist sehr verschieden; zuweilen findet sich nur
 üdenflosse, vorn mit Stacheln, hinten mit bie-
 Strahlen versehen; in andern Fällen sind beide
 der Rückenflosse gänzlich getrennt; oft sind die
 In des vordern Theils gänzlich frei, nicht durch
 verbunden, zuweilen einige davon in langen
 enfasen ausgezogen, was auch manchmal mit
 egamen Strahlen geschieht. Bei den typischen
 len sind die hintern weichen Strahlen nur kurz
 nicht durch Flossenhäute miteinander verbunden,
 man hier eine fischelförmige Rücken- und After-
 findet, hinter denen auf beiden Kanten des
 unzes eine größere Anzahl kleiner Nebenflossen
 Die Bauchflossen fehlen nur selten, stehen aber
 der unter den Brustflossen oder etwas weiter
 vorn; die Zähne sind meist hechelörmig, zu-
 sehr groß und spitz und meist nur auf den
 n entwickelt.

man kann in dieser Familie zwei Gruppen unter-
 en: die eine mit seitlich zusammengedrücktem,
 n Körper, steilem Stirnprofil, vorstrebarem
 e und kleiner Mundspalte, wozu die Silberplatte,
 Skelet wir geben (Skelet der Silberplatte, *Ar-*
osus, Taf. 23, Fig. 4.) und der im Mittelmeere
 nte Sonnenfisch oder St. Petersfisch (*Zeus faber*)
 en; die andere mit lang ausgezogenem, spindel-
 igem oder selbst aalförmigem Körper, flachem
 wprofil und weit gespaltenem Maule, das oft mit
 en hakenförmigen Fangzähnen bewaffnet ist. Letztere
 gefäßliche Raubfische, die gewöhnlich in Scharen
 laichzeit wandern und ein äußerst schmackhaftes,
 ndes Fleisch besitzen. Die gewöhnliche Matrele
 mber scombrus, Fig. 2) sowie der Thun-
 (Thynnus vulgaris, Fig. 1) sind besonders
 r ihnen bekannt; letzterer, der eine bedeutende
 ge und oft ein Gewicht von 10 Centnern er-
 t, wird im Frühjahr bei seinen Zügen an den
 ten des Mittelmeers in eigenthümlichen Reges ge-

fangen, die trichterförmig beginnen, nach hinten sich
 inner mehr verengen und in einen beultförmigen
 Sad auslaufen, in dem man die Thunfische zu-
 sammentreibt und dann mit Spießen und Harpunen tödtet.

An die Familie der Matrelen schließen sich zunächst
 die Schwertfische (*Xiphioida*) an, die man bisher
 mit den vorigen vereinigte. Die Oberlinie dieser
 Thiere ist in einen langen Schnabel ausgezogen, welcher
 hauptsächlich von dem Zwischenkiefer gebildet wird und
 der bald rund, bald schwertsförmig platt und meistens
 mit kurzen kleinen Zähnen besetzt ist; der Unterkiefer
 ist bei weitem kürzer, spitz ausgezogen, der übrige
 Kopf rundlich und der Schädel oben ganz platt und
 durchaus ohne vorspringende Leisten oder Kämme,
 welche bei den Matrelen immer stark entwickelt sind.
 Ihre Wirbelsäule zeichnet sich noch durch eigenthümlich
 gestaltete Dornfortsätze aus, die in Gestalt breiter
 Platten fast die ganze Länge der dünnen, in der
 Mitte stark eingezogenen Wirbelkörper einnehmen. Auch
 die Bildung der Kiemen ist höchst eigenthümlich, indem
 die Blättchen derselben alle miteinander so verwachsen
 sind, daß sie eine einzige breite gewellte Hautlamelle
 bilden, an welcher man die Abtheilung der ursprüng-
 lichen Blättchen nur durch einzelne ripartige Streifen
 angedeutet sieht; eine Bildung, die bei keinem andern
 Knochenfische vorkommt. Der Körper der Schwertfische
 ist langgestreckt, mit einer stacheligen Rückenflosse ver-
 sehen, die in dem Nacken anfängt und sich fast bis
 zum Schwanz fortsetzt, wo eine kleine weichtrahlig
 Flosse sich an sie anschließt; die Brustflossen sind ziem-
 lich groß, säbelförmig, die Bauchflossen fehlen entweder
 ganz oder sind durch zwei lange Knochenstrahlen unter
 der Kehle ersetzt; die Schwanzflosse ist sehr tief aus-
 geschnitten; an ihrer Wurzel finden sich ein oder zwei
 knorpelig häutige, vorspringende Leisten. Es sind
 große, schwere Fische, außerordentlich gute Schwimmer,
 von denen einige Arten eine Länge von 20 Fuß er-
 reichen und die besonders die größern Fische verfolgen
 und mit dem starken Schwerte durchbohren. Sie ge-
 hören hauptsächlich den südlichen Meeren an, und nur
 der gewöhnliche Schwertfisch kommt im Mittelmeere
 häufig und vereinzelt zuweilen in der Nordsee vor.
 Der abgebildete Fächerfisch (*Histiophorus immacu-*
latus, Fig. 3) aus den indischen Meeren wird über
 20 Fuß lang; man hat öfters sein Schwert in Schiffs-
 körpern gefunden, in die er es in toller Wuth einge-
 bohrt hatte und abgebrochen zurückließ.

Die Familie der Harder (*Mugilida*) umfaßt nur
 wenige Fische mit spindelförmigem Körper, die in
 ihrer äußern Form einige Ähnlichkeit mit den Weiß-
 fischen haben. Der Kopf ist plattgedrückt, die Wangen
 meist in gleicher Weise wie der Körper und die Stirn-
 fläche des Kopfes mit großen, runden Schuppen be-
 deckt, welche ihre hintern Zähne sehr leicht ver-
 lieren, sobald sie glattrandig erscheinen. Das Maul
 ist quer, eckig, zahllos oder mit sehr feinen Bürsten-
 zähnen bewaffnet; die kleine stachelige Rückenflosse steht
 etwa in der Mitte des Leibes und ist durch einen
 weiten Zwischenraum von der ebenfalls kleinen, weichen
 Flosse getrennt; die Bauchflossen stehen etwas nach
 vorn, aber doch stets in einiger Entfernung hinter den
 Brustflossen. Es sind wohlthunende Fische, die nicht
 hoch nach Norden gehen und gern in die Flußmündungen
 aufsteigen. Die abgebildete Art (Harder, *Mugil*
cephalus Fig. 6) ist unter dem Namen Cefalo am
 ganzen Mittelmeer bekannt und geschätzt.

Die Familie der Scheibenbäuche (*Gobioida*) wird
 aus einer großen Anzahl meist schlanker, langgestreckter
 Fische gebildet, bei denen die an der Kehle oder an
 der Brust stehenden Bauchflossen in eigenthümlicher

Weise zu einer Haftscheibe ausgebildet sind. Die Schuppen dieser Fische sind groß, ihre concentrischen Linien wenig vortretend und weit auseinandergerückt, die Fächerlinien zahlreich; die Zähne auf der hintern Schuppenhälfte klein, nur in einfacher Reihe aufgestellt und oft so auf die obere Fläche aufgesetzt, daß der hintere glatte Rand der Schuppe über die Zähne hinausragt. Bei einer Gruppe dieser Thiere (Opistognathus) sind zwar die Bauchfloßen noch vollständig getrennt, ihre Strahlen aber so gestellt, daß sie von beiden Seiten her eine Art von Trichter bilden. Bei den andern (Echeneis) sind die Bauchfloßen nur an dem Grunde miteinander verwachsen; bei noch andern endlich vollständig zu einer trichterförmigen Scheibe vereinigt, an welcher dann sämtliche Strahlen unverzweigt und einfach, aber doch biegsam (Cyclopterus), oder auch bis auf den ersten Strahl alle verzweigt sind. Hierher gehören unsere Groppen (Gobius fluviatilis). Die meist kleinen Fische lieben in der That den Strand, wo sie sich am Grunde mit ihren Bauchfloßen gern unter Steinen anheften. Die Stacheln der Rückenfloße sind entweder weich und biegsam und wenig zahlreich, oder selbst gänzlich unter der Haut verborgen, die Brustfloße gewöhnlich stark entwickelt. Die Gruppe der Seehasen (Cyclopterus lumpus, der Lump, in der Nordsee) zeichnet sich außerdem noch dadurch aus, daß sie nur drei oder vierhalb Kiemen besitzen, und die Schiffshalter (Echeneis), welche ebenfalls zu dieser Familie gehören, zeigen auf dem Kopf einen unerwärtigen, aus gezähnelten hölzernen Querblättchen gebildeten Apparat, mit dem sie sich äußerst fest sogar an lebende Fische anheften und so sich von diesen umhertragen lassen.

Die Schleimfische (Blennioidei) ähneln den vorigen ziemlich in ihrer Körperform, unterscheiden sich aber von ihnen durch die sehr unvollständig entwickelten kleinen Bauchfloßen, welche unter der Kehle sitzen, oft gänzlich fehlen und gewöhnlich nur sehr wenige, biegsame, unverzweigte Strahlen besitzen. Der Körper dieser Thiere ist von einer weichen, sehr schleimigen Haut überzogen, die Schuppen fehlen entweder ganz oder sind nur äußerst klein und verstreut. Ihr Schädelbau ist höchst charakteristisch. Das Hinterhaupt ist abgeplattet und bildet ein gleichseitiges Dreieck, dessen nach vorn gerichtete Spitze sich in einen mittlern Kamm bis über die Augenhöhlen hin erstreckt. Hinter den Augenhöhlen ist der Schädel von der Seite her so zusammengeedrückt, daß nur wenig Raum für das Vorherhinein bleibt und die Ränder der Augenhöhle flügelartig nach hinten vorragen, während sie zugleich seitlich sich aufwölben, sodaß die Stirnfläche eingeedrückt erscheint. Die untere Schädelfläche bildet einen schneidenden Kiel. Es findet sich nur eine Rückenfloße, die sich meist vom Nacken bis zum Schwanz erstreckt und deren Stachelstrahlen in den häufigsten Fällen äußerst weich und biegsam sind. Die Brustfloßen sind gewöhnlich sehr groß, fächerartig und ziemlich frei beweglich, die Bauchhöhle kurz und vor dem After eine stark vorspringende, weiche Geschlechtswarze angebracht, die um so mehr eine wirksame Begattung möglich zu machen scheint, als manche Arten dieser Fische lebendige Junge gebären; ihre Zähne sind meistens sehr groß, stark kegelförmig, und oft finden sich hinter den Fangzähnen noch Mahlzähne, wie beim Seewolf der Nordsee (Anarrhichas lupus). Die eigentlichen Blennius-Arten sind oft sehr schön gezeichnet (Seeschmetterling, Blennius ocellatus, Taf. 22, Fig. 16). Eine Art aus der Ostsee zeichnet sich dadurch aus, daß sie lebende Junge zur Welt bringt (Kalmutter, Zoarcus viviparus, Fig. 17).

Die Familie der Krustfloßer (Pediculata) umfaßt eine kleine Gruppe häßlicher, widerlicher Fische, ganz natter oder warzig rauher Haut, deren vorspringende Brustfloßen sich durch eine lebendige Beweglichkeit auszeichnen. Die Knochen der Rückenfloßen sind nämlich vollkommen stiel förmig ausgezogen und bilden so einen langen armähnlichen Knochen, der eine ziemlich freie Beweglichkeit besitzt und an seiner Spitze die Floßen angebracht sind. Manche dieser Thiere können sich dieser verlängerten Brustfloßen förmlich als stützhaltiger Stützen bedienen, auf denen sie den Vorderleib emporzuheben und zu wackeln im Stande sind. Hinter diesen Brustfloßen befindet sich die kleine Kiemenpalste, welche in einen ungewissen weiten Kiemenfad führt, in dem sich nur drüßig die vierhalb Kiemen befinden. Die Bauchfloßen stehen vor den Brustfloßen unter der Kehle und sind ebenso wie die seitlichen Floßen nur sehr wenig entwickelt. In Hinsicht des Maales kann man zwei Typen unterscheiden: die einen (Lophius, Batrachus) mit ungewissen großem, abgeplatteten Kopfe, der wenigstens ein Drittel ja selbst über die Hälfte der Körperlänge einnimmt und mit weiter Nackenspalte, die mit großen Fangzähnen bewaffnet ist; die andern mit kleinem Kopfe und enger, schwach gezählter Mundspalte. Zu dieser letztern gehört die Seefledermaus (Maltha vespertilio, Fig. 15) der indischen Meere.

Die letzte Familie dieser Unterordnung wird von den Labyrinthfischen (Labyrinthida) gebildet. Der äußere Körperform dieser Fische wechselt sehr, dem bald nähert sie sich derjenigen der Rippfische (Cephalus) sich in langgestreckter Algegestalt zeigen. Es findet sich stets nur eine Rückenfloße, deren vorderer Theil gewöhnlich flachelig ist, und schwach ausgebildete Bauchfloßen, die seitlich unter den Brustfloßen stehen. Alle sind beschuppt, doch haben die Gattungen mit starken Stacheln in Rücken- und Afterfloße wohl ausgebildete Kammfalten, während die aalartige Gattung bei weichen biegsamen, wenn auch ungetheilten Strahlen der seitlichen Floßen zugleich wohl ausgebildete Cycloidfalten besitzt. Der wesentliche Charakter dieser Fische liegt in den oberen Schuttknochen, welche zu gewundenen Blättern ausgebildet sind, die in einer bedeutenden Höhle an der Seitenbasis und zur Seite derselben entfallen und so ein Reservoir mit vielen Zellen bilden, in welchen diese Fische das zur Ansehung ihrer Kiemen nöthige Wasser aufbewahren können. Alle Fische dieser Familie leben nur in den süßen Gewässern tropischer Gegenden und verlassen oft lange Zeit das Wasser, um auf dem festen Lande herumzutreiben, ja die hier abgebildete, aus Indien stammende (Kletterfisch, Anabas scandens, Taf. 23, Fig. 7) Art soll sogar mittels der Stacheln ihrer untern Floßen und namentlich ihrer Kiemenbedels in den Ritzen von Baumstämmen in die Höhe klettern können. Die meisten liefern ein schmackhaftes, gesundes und sehr geschätztes Fleisch, und einige Arten zeichnen sich auch noch dadurch aus, daß ein Strahl ihrer Bauchfloßen zu einem ungewissen langen Faden ausgezogen ist.

Wir erwähnen nur die Familien der Doraden (Coryphaenida), der Pfeilhechte (Sphraenida), der Doraden (Notacanthida), der Bandfische (Taenioida).

Ordnung der Haftkieser (Plectognathi).

Der Oberkieferapparat mit dem Schädel verwachsen; laumförmige Kiemen.

Die kurzen, entweder fast kugelförmigen oder stiel-

mmengegedrückten Fische, welche dieser Unter-
 angehören, zeigen in dem Baue ihres
 eine ganz besondere Festigkeit, während
 e Skelet bei einigen lange Zeit nur unvoll-
 ertknochert und die Wirbel namentlich jene

llige Structur zeigen, deren wir früher er-
 Der Zwischentier ist bei diesen Fischen
 groß und bildet für sich allein den obern
 stets engen und kleinen Mundspalte; er ist
 mit den Schädelknochen und andererseits mit
 ater liegenden Oberkiefer, welcher an der Be-
 der Mundspalte keinen Antheil nimmt, fest
 verwachsen; ebenso sind die Gaumenknochen
 ht mit den übrigen Schädelknochen unbeweg-
 unden, namentlich an dem Schläfenbeine, wo
 eines hintern Gelenks eine Naht vorkommt,
 e ganze Kiefer-Gaumenapparat ein einziges
 wölbe bildet. Der Kopf bildet meist einen
 theil des Körpers. Die Kiemenapalten
 klein, der Kiemendeckel und die Kiemenhaut
 durch aufliegende Haut und Muskeleinlagen
 Rippen und Bauchfloßen fehlen meist
 Die Wirbelsäule ist äußerst kurz, die Wirbel
 hreich (höchstens 20); das Rückenmark reicht
 geringe Strecke in den Wirbelkanal hinein
 sich dann in die Nervenwurzeln auf. Die
 bedeckung ist in eigenthümlicher Weise aus-
 Die Lederhaut ist sehr dick und bald nur
 ch kleine Schmelzstücke, wie bei den Haien,
 e längern, dreieckigen Stacheln, Fußangeln
 besetzt, bald auch in ihrem ganzen Umfange
 ein belegt, welche durch ihr Zusammenstoßen
 rrmlichen Panzer bilden, der demjenigen der
 schupper einigermaßen ähnelt, obgleich dieje-
 eine durchaus verschiedene Structur besitzen.
 rrmkanal ist weit, kurz, ohne pylorische An-
 die meisten haben eine große, weite Schwimms-
 Die Floßen sind im ganzen nur schwach
 und nur von weichen Strahlen gestützt, aus-
 en bei einigen Gattungen, wo sich außer der
 hintern Rückenfloße noch ein Paar vorberei-
 e vorfinden, welche in eigenthümlichen Gelenken
 hiet und festgestellt werden können.

Familie der Harthäuter (Sclerodermata)
 die kleine Mundspalte mit einer Reihe schie-
 r Zähne bewaffnet, die in eigenen Zahnhöhlen
 fers stehen und in ihrer Form den menschlichen
 ezähnen einigermaßen ähnlich sehen. Es werden
 ähne durch Ersatzzähne gewechselt, die in der
 re verborgen liegen und von unten herauf all-
 an die Stelle des alten Zahns eintreten.
 rper ist mit hornigen Tafeln bekleidet, die auf
 Oberfläche mit einer Lage von Zahnschubstanz
 sen sind, sonst aber entweder nur lörrige Zeich-
 ober auch eine ganz glatte Oberfläche dar-
 Bei einer Gattung (Vierhorn, *Ostracion*
cornis, Taf. 24, Fig. 21), welche die Unter-
 der Koffersfische (*Ostracida*) bildet, werden
 Tafeln sehr groß, meist sechseckig, und rücken so
 neu, daß sie eine unbewegliche Panzerapfel
 aus welcher nur der Schwanz und die beweg-
 Floßen hervortragen; die Zähne sind bei dieser
 amilie nur klein, weiselförmig und ohne Schmelz-
 e Unterfamilie der Hornfische (*Balistida*)
 diese Tafeln eine förmliche Schuppenbekleidung,
 jarbar und beweglich, welche sich über Kopf und
 e fortsetzt und zuweilen selbst zu ganz kleinen
 penförmigen herabsinkt. Die meisten Fische dieser
 ie haben oben auf dem Rücken starke gezähnelte
 eln, welche in eigenthümlichen Gelenken ein-

schnappen und so festgestellt werden können; sie finden
 sich, wie diejenigen der folgenden Familie, nur in
 südlichen Meeren und gehen nicht weiter nördlich, als
 bis in das Mittelmeer.

Die Familie der Raetzähner (*Gymnodonta*) unter-
 scheidet sich von der vorigen hauptsächlich durch die
 Hautbedeckung und die Bewaffnung der Kiefer; diese
 letztern treten nämlich scharf schnabelartig vor und
 sind außen wie innen mit einem Gusse fester Zahn-
 substanz überkleidet, die aus senkrechten Zahnröhren
 besteht und zuweilen in der Mitte durch eine Furche
 getheilt ist. Diese einzige scharfe Zahnplatte, welche
 die Kiefer bekleidet, dient den Thieren zum Zermalmen
 von Krusten- und Schalthieren, welche ihre haupt-
 sächlichste Nahrung ausmachen. Die Haut ist sehr
 dick, leberartig, mit größeren oder kleineren Stacheln
 besetzt, welche sogar zuweilen von dem Fische willkür-
 lich gestraubt werden können. Die meisten Gattungen
 dieser Familie besitzen eine sehr große Schwimmblase
 und außerdem noch einen weiten beutelförmigen Kehls-
 ad, der in den Schlund mündet und sich weit nach
 hinten unmittelbar unter der Haut des Bauches er-
 streckt. Die so gebildeten Fische kommen bei ruhigem
 Wetter an die Oberfläche des Wassers, schluden dort
 eine Menge Luft in den Kehlsad ein, blähen sich da-
 durch in unförmlicher Weise auf und treiben dann,
 den Bauch nach oben gelehrt, auf der Oberfläche des
 Wassers; ihr Fleisch ist sehr schlecht, und das einiger
 Arten wird, ebenso wie das Fleisch vieler Fische der
 vorigen Familie, für giftig gehalten. Man kann unter
 ihnen drei Unterfamilien unterscheiden: Die Fgel-
 fische (*Diodontida*), welche die erwähnte Fähigkeit
 des Aufblasens im hohen Grade besitzen und deren
 obere Wirbelbogen sich in der Mittellinie nicht ver-
 einigen, sodas der ganze Rückenmarkskanal von oben
 her geöffnet ist. Ihr Rückenmark ist nur knorpelförmig;
 Rippen fehlen durchaus. Die Nase ist sehr eigen-
 thümlich gestaltet. Meist steht sie warzig vor; oft ist
 die Warze gewölbt, mit zwei Nasenlöchern versehen,
 zuweilen finden sich sogar ganz solide Warzen ohne
 Höhlungen irgendeiner Art. Die Dreizähner
 (*Triodontida*) können sich nicht aufblasen, sondern
 als die Mondfische (*Orthogoriscus mola*, Fig. 20)
 die einen kurzen, platten, schwanzlosen Körper mit
 faserknochigem, weichem Stelet und keine Schwimm-
 blase haben.

Ordnung der Büschelfiemer (*Lophobranchii*).

Kiemen büschelförmig.

Die kleinen Fische, welche dieser Ordnung angehören,
 sind auf der ganzen Oberfläche ihres Körpers mit
 Knochenbildern gepanzert, welche meist eine vierseitige
 gerippte Gestalt haben und mit ihren Rändern an-
 einanderstoßen. Meistens unterscheidet man an diesen
 Knochenbildern eine äußere und eine innere Lage
 von Knochenlamellen, zwischen welchen in der Mitte
 Hornsubstanz entwickelt ist. Die Gesichtsknochen, be-
 sonders die Nasenbeine, die Gaumenbeine und das
 Pflugschärbein sind außerordentlich lang, vorgezogen
 und bilden eine Röhre, welche den Schädeltheil des
 Kopfes oft um das Sechsfache an Länge übertrifft und
 an deren vordern Ende sich die kleine Mundspalte
 von den kleinen Kiefern umgeben zeigt; die verlängerte
 Schnauze wird demnach bei diesen Fischen nicht von
 den Kiefern, sondern von den Tragenknochen derselben,
 die den Gesichtstheil zusammensetzen, gebildet. Der
 Kiemendeckel ist groß, blasig aufgetrieben, an seinem
 untern und hintern Rande aber durch die Haut gänz-
 lich an den Schultergürtel befestigt, sodas nur an

seinem obern Rande eine kleine Spalte übrigbleibt, welche in die weite Kiemenhöhle führt. Der Bau der Kiemen selbst ist höchst eigenthümlich und dient als wesentlicher Charakter der Ordnung. Auf den Kiemenbögen stehen nämlich einzelne, aneinandergebrängte Büschel von feinen Kiemenblättchen, welche eine Art Knopf zusammensetzen, sodas jeder Kiemenbogen eine doppelte Reihe solcher aneinandergebrängter, geblätterter Knöpfe trägt. Die Flossen sind meist nur mangelhaft ausgebildet, die Brustflossen nur bei einer einzigen Gattung ziemlich groß, bei den übrigen klein, die Bauchflossen entweder sehr rudimentär oder auch gänzlich fehlend. Von den seitlichen Flossen ist nur die kleine Rückenflosse beständig vorhanden, während After- und Schwanzflosse häufig fehlen. Sehr eigenthümlich ist in dieser Ordnung, welche nur eine Familie, die der Tangschnellen (*Syngnathida*) bildet, die Art und Weise der Fortpflanzung. Bei den Männchen finden sich nämlich an der Wurzel des Schwanzes entweder ein förmlicher Beutel mit einer kleinen vordern Oeffnung (*Seepferdchen*, *Hippocampus brevisrostris*, Taf. 24, Fig. 22), oder zwei Hautklappen, welche die Fingelfalten übereinandergreifen (*Syngnathus*), oder endlich nur eine etwas vertiefte Stelle (*Scypsius*), in der sich zur Begattungszeit kleine rundliche Hautzellen entwickeln, die von Eiern erfüllt werden. Auf welche Weise das Weibchen die Eier an diese Stelle bringt, ist noch unbekannt; die Thatfache aber steht fest, das es wirklich die Männchen sind, welche in diesen eigenthümlichen Bruttafeln die Eier und selbst die ausgeschlüpften Embryonen so lange mit sich herumtragen, bis dieselben gänzlich den Dotterfack verloren haben. Die kleinen Fischechen finden sich nur in der See, und namentlich gern im Tang, an den sie sich mit ihren langen, oft flossenlosen Schwänzen anklammern.

Klasse der Rundmäuler (*Cyclostomata*).

(Tafel 24.)

Wirbelthiere mit einfacher Nase, ohne Kiefer, Rippen und paarige Gliedmaßen, ohne Wirbelsäule, mit persistirender Wirbelsäule, nackter Haut und totaler Dotterfurchung des Eies.

Die wurmförmige Gestalt, die durchaus schuppenlose, derbe, schlüpfrige Haut, die ungenügend ausgebildeten seitlichen, den Hinterkörper umgebenden, von feinen Hornstrahlen gestützten seitlichen Flossen, das gänzliche Fehlen paariger Flossen lassen diese Thiere auf den ersten Blick erkennen. Das Skelet besteht nur aus einer einfachen Wirbelsäule, ohne Spur von Wirbelkörpern, Rippen oder untern Bogen, deren Scheide sich nach oben in ein häutiges Rohr fortsetzt, welches das Rückenmark umhüllt. Der Schädel knorpelig häutig, auf beiden Seiten die Ohrblasen umhüllend und hinten die Chorda umfassend, die etwa bis auf die Hälfte der Länge seiner Basis eindringt. Kiefer oder ihnen entsprechende Bildungen fehlen durchaus; dagegen ist die Lippe des runden, trichterförmigen Saugmundes durch knorpelige Stütze unterstützt, die meist eine weit bedeutendere Entwicklung als der Schädel selbst zeigen. Vorn am Schädel in der Mittellinie befindet sich die einfache Nasenöffnung, welche sich nach hinten in einen röhrenförmigen Sad fortsetzt, der zwischen der Schädelbasis und dem häutigen Gaumengewölbe durchgeht und bei den einen geschlossen, bei den andern in die Nasenhöhle geöffnet ist. Das Maul ist ziemlich weit, trichterförmig nach hinten

verengt, von einer kreisrunden Lippe häufig mit Wärteln besetzt; zuweilen in der innern Fläche dieser Lippe kleine spitzgezähnte oder auch nur ein einziger Zahn auf, in andern Fällen ist sie gänzlich ohne Zähne. Die Mundhöhle führt in der Tiefe in der Mitte auf beiden Seiten die Kiemenöffnungen, ebenso viele Löcher, als Kiemenblätter vorhanden sind, oder auch durch einen mittleren Saugtrichter in den Schlund geöffneten Kanal stehen. Nach außen öffnen sich die Kiemen in der inneren Fläche sich die respiratorischen Kanäle, entweder einzeln, sodas an jeder Seite sich eine Längsreihe von Knopflochen findet, oder sie münden jederseits in einen Kanal, der nach hinten zu mit demjenigen überstehenden Seite sich verbindet und auf jeder Seite in der Mittellinie mit einer einzigen Öffnung, eine Annäherung zu jener Art Athemapparates, welche wir bei den Lungenfischen finden. Das wohl ausgebildete Herz liegt oft eine bedeutende Länge einnehmenden Saugtrichter hat einen deutlichen, zweiflappigen Atrium ein Muskelbeleg fehlt, wogegen die auskommenden venösen Stämme allgemein aus dem Pulsvens zu bestehen scheinen. Der Darmtraktus ist meist ohne weitere vortretende Fortsätze. Die männliche und weibliche Geschlechter sind eine an die Wirbelsäule gebundene Klammer. Hodenbläschen und Eierfäden die in der Bauchhöhle fallen, um so dann ohne Gang durch neben dem After befindliche Ausführgänge nach außen entleert zu werden.

Die Familie der Lampreten, *Petromyziden* (*Petromyzida*) zeigt ein trichterförmiges Maul, das von einer kreisrunden, bezahnten Lippe umgeben ist. Wärtel fehlen unter allen Umständen; die Öffnung führt in einen blinden Sad, bei der folgenden Familie in den Darmtraktus; die Augen sind gewöhnlich wohl ausgebildet, aber wie es scheint unbeweglich; die Kiemen befinden sich auf beiden Seiten des Halses durch eine Reihe von sieben Spalten nach außen geöffnet, während in einen unpaaren unter dem Saugtrichter liegenden Kanal münden, der hinten blind ist, aber sich hinter der Zungenwurzel in den Schlund öffnet. Mit Ausnahme einer einzigen Art, die in der Klasse steigt, leben sämtliche dieser Familie im süßen Wasser, besonders in kaltem, wo sie sich gern unter Steinen festsaugen. Süßwasserarten hat man die merkwürdige Eigenschaft gemacht, das die Eier sich vollständig durch das Wasser zu ihnen eine augenlose Larve entwickelt, früher als eine eigene Gattung betrachtet (*Ammocoetes*) nannte und dadurch einen Unterschied, das sie zwei Lippen, eine obere, eine kleine untere und keine Hornzähne hat. Diese Larven leben mehrere Jahre in kleiner Wache wühlend, bis endlich die Fortpflanzungsorgane und die Augen sich ausbilden, die Lippe rund wird und kleine Hornzähne erhält. Der nun im Wasser an Steinen sich ansetzende Fortpflanzungsorgane scheinen diese Keimlinge zu sein.

Die Familie der Inger (*Myxini*) (*Myxini*) steht auf der niedersten Stufe der Organisation, und dem Lanzettfischechen an der Lippe des Males ist nicht gleichförmig, sondern groben, durch Lippenknorpel gestützten Saugtrichter, das Nasenrohr öffnet sich nach hinten in den

ein einziger Gaumenzahn oder einige wenige Zähne sind vorhanden. Die äußern Augen fänglich; dagegen finden sich innere Rudimente, wovon nur von der äußern Haut oder selbst Muskeln und Haut bedeckt sind und deren Organisation noch nicht genauer bekannt ist. Die Athemorgane ziemlich weit nach hinten und öffnen sich bei einer Gattung (Schleimfisch, *Myxine glutinosa*, 4, Fig. 24) mittels zwei Seitenkanäle in ein schiffartiges Mittelloch, bei der andern (Büello) in Reihen von Löchern zu beiden Seiten. Die Arten, welche bekannt sind, leben wie es parasitisch in andern Fischen, in welche sie sich ren.

Klasse der Knochentiere (Leptocardia).

(Tafel 24.)

Der erste Wirbelthiere ohne Hirn, ohne mit farblosem Blute und von einem des Körpers zum andern durchgehenden Leiste.

Landigen Küstenstellen der Nordsee, Italiens selbst Südamerikas hat man ein kleines Fischehen, anzettelfischehen (*Amphioxus lanceolatus*, Taf. 25), von höchstens 2 Zoll Länge entdeckt, welches dem ersten Beobachter für eine Schnecke gehalten, aber als das niedrigste stehende Wirbelthier erwies. Das Fischehen ist äußerst durchsichtig, angestreckter, schmaler Gestalt, nach beiden Enden fast gleichmäßig zugespitzt; unter dem vordern des Körpers befindet sich der eiförmige Mund, von einem eigenthümlichen Reife Anorpeligen Spinnen ist, welche sich zusammenbiegen und so die nung verschließen können. Die Mundhöhle, die ihrer Zwickelfläche lebhaftest Zitterbewegung zeigt, ist eine Art von Haderorgan bildet und Infusorien befechtigen Wirbel in den Mund einführt, öffnet unmittelbar in den weiten Kiemen Schlauch, der aber die Hälfte des ganzen Thiers einnimmt, und einer Menge schief von oben nach unten laufender aller Anorpelstäbe gebildet ist, die durch seine Rippen miteinander verbunden sind. An dem letzten Ende führt dieser Kiemen Schlauch durch eine stehende ringförmige Falte unmittelbar in den Anfang des Darmkanals über. Zwischen den Anorpelstäben befinden sich ebenso viele Spalten, durch welche Wasser in die allgemeine Körperhöhle überfließt und dann durch eine mittlere unpaare Öffnung (*porus abdominalis*) entleert wird, die sich an der Oberfläche des Bauches etwa in der Länge des Thiers befindet. Die Bewegung des Wassers wird durch eine stimmende Schleimbaut bedingt, welche durch die Anorpelstäbe, nicht aber die Zwischenpalten verzieht, und die sich unmittelbar über die ganze Länge des Darmkanals fortsetzt und in diesem die Zitterbewegung der Verdauungsstoffe vermittelt. Dieser Thiere beginnt, wie schon bemerkt, unmittelbar hinter dem Kiemen Schlauch mit einer engern Stelle, erweitert sich dann plötzlich und sendet einen weiten Blinddarm nach vorn aus, der an der rechten Seite des Kiemen Schlauchs zwischen diesem und der Leibeswandung liegt, in seiner Wandung mit grünen Drüsenkörnern besetzt ist und offenbar der Leber entspricht. Kurz nach Abgabe dieses Leberblinddarms vereinigt sich der Darm bedeutend und läuft als kaum gebogene Röhre bis zum After, der sich am letzten Vierteltheile des Thiers etwas auf der linken Seite befindet. Das ganze hintere Ende des Thiers ist von einer

zarten, embryonalen Masse umgeben, welche an dem Schwanz selbst lanzettartig verbreitert ist und als schmaler Hautsaum sich einseitig bis zum After, anderntheils über die größte Länge des Rückens erstreckt. Das innere Skelet besteht nur aus einer Chorda, welche sich durch die ganze Länge des Thiers von der Schnauzenspitze bis zum Schwanzende erstreckt und an beiden Enden abgerundet endigt. Unmittelbar auf dieser Chorda liegt das Rückenmark, welches merkwürdigerweise die daraus entspringenden Nervenpaare seitlich alternierend entsendet und etwas hinter dem vordern Ende der Chorda abgerundet aufhört. Auf diesem Ende sitzt ein Pigmenthaufen auf, der ein Auge vorstellt, aber taub ist. Rechterseits, also unsymmetrisch, findet sich eine becherförmige, mit langen Zitterhaaren ausgefüllte Grube, welche die erste Anlage der Nasengrube. Keine Spur von Gehörgängen. Die Geschlechtstheile bestehen aus trambigen Zellenhaufen, die vor dem *porus abdominalis* an der innern Seite der Leibeswand liegen; Eier und Samen gelangen durch Poren in die Bauchhöhle und werden durch den *Porus* nach außen geschafft. Das durchsichtige, farblose Blut wird durch wellenförmige Zusammenziehungen der größern Gefäßstämme im Körper angetrieben, und zwar findet sich unter dem Kiemenlorbe in der Mittellinie ein Längsgefäß, welches das Blut nach vorn und in die Kiemenbogen treibt, aus denen es sich in einer Aorta sammelt, die längs der Chorda nach hinten läuft, Zweige an den Körper und die Eingeweide gibt, die sich in einer Längsvene vereinigen, welche am Darm nach vorn läuft und unmittelbar in das Kiemengefäß sich fortsetzt.

Beobachtungen über die Entwicklungsgeichte dieses Thiers haben nachgewiesen, daß sich der Dotter in seiner ganzen Masse sucht und der Körper des Embryo sich in einer den Wirbelthieren entsprechenden Weise aufbaut. Zugleich aber haben diese Untersuchungen auch gezeigt, daß in dieser Entwicklung viele Ähnlichkeit mit derjenigen der einfachen Seecheiden (*Ascidien*) obwaltet und demnach hier ein Zusammenhang zwischen Wirbelthieren einerseits und diesen Wirbellosen andererseits obwaltet. Wir können auf diese Verhältnisse, die jetzt durch Kowalewski, Kupffer u. a. genauer dargelegt sind, nicht näher eingehen; es genügt, darauf aufmerksam gemacht zu haben.

Kreis der Gliederthiere.

(Arthropoda.)

Symmetrisch gebaute Thiere mit äußerem, durch Ablagerung von Chitin verhärtetem Hautskelet, das in hohle Ringe getheilt ist, welche meist noch zu besondern Körperabtheilungen sich ausbilden und dann häufig verschmelzen. Ursprünglich drei Paar bauchständiger Extremitäten, die fast immer im Laufe der Entwicklung vermehrt werden und mannichfachen Umbildungen unterworfen sind. Die bewegenden Kräfte (Muskeln) sind im Innern der hohlen, aus der verhärteten Haut gebildeten Hebel angebracht. Niemals Zittererepithelien. Darm meist an beiden Enden offen. Niemals geschlossenes Blutgefäßsystem. Athemorgane sehr verschieden gestaltet. Centralnervensystem aus einem über dem Schlunde gelegenen Theile

(Hirn) und einem auf der Bauchseite gelegenen Theile (Bauchganglienkette) zusammengelegt. Dotter rückenständig.

Für sich allein umfaßt dieser Kreis eine bei weitem größere Anzahl von Thieren als das ganze übrige Reich zusammengekommen, sowohl wenn man die Zahl der Individuen, als auch die Mannichfaltigkeit der in Gattungen und Arten repräsentirten Formen in das Auge faßt. Deshalb sind es die Thiere dieses Kreises auch hauptsächlich, welche trotz der verhältnismäßigen Kleinheit ihres Körpers — denn nur wenige Gliedertiere können sich hierin mit den Wirbelthieren messen — den einzelnen Strichen und Zonen der Erde eine bestimmte Physiognomie aufdrücken, indem sie ebenso wol die Luft als das Wasser mit ihren unzähligen Schwärmen erfüllen, als auch durch ihr massenhaftes Auftreten und den Schaden, den viele von ihnen stiften, selbst weniger aufmerksamen Beobachtern in die Augen fallen.

So mannichfaltig auch die äußern Formen der Krebse, Spinnen, Tausendfüßer und Insekten sein mögen, welche diesen Kreis bilden, so läßt sich doch auf der andern Seite nicht leugnen, daß die Organisation der genannten einzelnen Glieder des Kreises viele und höchst wesentliche Verührungspunkte miteinander gemein hat, welche wahrscheinlich dem Umstande zu verdanken sind, daß allen eine gemeinsame Ausgangsform zu Grunde liegt, die sich in den niedern Krebsthieren als Larvenform erhalten hat und unter dem Namen Nauplius bekannt ist. Die charakteristischen Kennzeichen dieser Larvenform sind ein rundlicher Körper mit bauchständigem Mund, geradem Darm und endständigem After, ein einfaches Stirnauge und drei Extremitätenpaare, die theils vor, theils neben dem Munde stehen. Diese Grundform ist zwar fast bei allen größern Abtheilungen der Krebsthiere nachgewiesen, bei den luftathmenden Gliedertieren aber noch nicht thatsächlich erkannt. Es läßt sich indessen aus einzelnen Thatfachen schließen, daß sie bei diesen nur ausgedeutet und schnell von den weitem Entwicklungsstadien überholt wird.

Die Symmetrie im Körperbau ist meistens vollständig, und ein senkrecht durch die Mittellinie geführter Schnitt trennt das Thier in zwei durchaus gleiche Hälften. Ausnahmen von dieser symmetrischen Anordnung kommen nur selten vor, im äußern Bau durch ungleiche Entwicklung seitlicher Anhänge, z. B. der Scheren, oder auch im ganzen Körper bei einigen Schmarotzertreibern. Hinsichtlich der innern Organe ist es uneinig nur der Darm mit seinen Anhängen, der durch Verlängerung gezwungen wird, Windungen zu machen und dadurch unsymmetrisch zu werden.

Zu dieser Symmetrie gefellt sich, wie bei den Wirbelthieren, eine quere Theilung des Körpers in Ringe, Zouiten oder Metameren, die nur bei einigen, meist schmarotzenden Typen gänzlich aufgehoben oder niemals entwickelt ist. Selten findet auch, wie bei den Tausendfüßern, eine vielfache Wiederholung gleichgebauter Ringe statt; gewöhnlich wird die Ringelung eine ungleichartige, sodaß verschiedene Regionen des Körpers, Kopf, Brust und Bauch sich unterscheiden lassen. Jede dieser Körperabtheilungen besteht aus einer gewissen Anzahl von Ringeln, die bald mehr, bald minder miteinander verschmolzen sind. Bei den höhern Formen ist die Trennung dieser drei Körperabtheilungen vollständig durchgeführt, und jede derselben hat eine eigenthümliche Beziehung zu der Gesamtorganisation, indem der Kopf die Sinnesorgane, das Gehirn und die Mundtheile, der Rumpf oder Thorax die Bewegungsorgane, der Hinterleib die

Hauptorgane des vegetativen Lebens und pflanzungswertzeuge trägt. Bei den niedern ist bald die eine, bald die andere dieser Abtheilungen verkümmert oder mit den andern Masse verschmolzen. So findet man bei vielen Spinnen und Krebsen Kopf und Hinterleib in einigen Theile, der Kopfbrust (Cephalothorax) verschmolzen, während bei manchen Krebsen der Kopf getrennt, Brust und Hinterleib aber vereinigt, und bei den Milben und Abtheilungen in eine einzige rundliche Kugel zusammengelassen sind.

Diese Verschmelzungen betreffen indessen dieselben Ringe, sodaß ihre Trennung nicht zusammenfallen. Die Kopfbrust (Cephalothorax) meisten Krebse entspricht z. B. der Kopfbrust der Spinnen oder dem Kopf der Insekten, sondern schließt noch auch den Bauch derselben ein, sodaß der abgetheilte der im gewöhnlichen Leben der Schere wird, eigentlich ein Hinterleib (Postabdomen) auch mit diesem Namen bezeichnet wird.

Die Haut besteht überall ursprünglich aus einer festen, unlöslichen, der Holsäure analoge Substanz, die von einer zelligen Hautlage (Cuticula) weißlich abgelagert wird, von Porenkanälen (Poren) und mannichfachen, sehr verschiednen Gebilden wie Schuppen, Haare, Borsten, Stacheln etc. In dieser Substanz lagern sich häufig auch ebenso mineralische Stoffe, besonders Kalk. Viele Farben der Gliedertiere werden durch specifischen Bau der Haut selbst (Chitine, Kieselung, Plättchen, die Interferenzfarben erzeugen) hervorgebracht. Dünne Ausbreitungen der Chitinhaut sind biegsam und finden sich zwischen den Ringen und an den Gelenken der. Mit dieser Structur der Haut, die die Auskleidung der innern, mit der Auskleidung der äußern, mit der Auskleidung der Hohlungen, z. B. des Mundes, etc., scheint es auch zusammenzuhängen, die Zitterbewegung, welche auf der GröÙe der Auskleidungen mit wimpernden Cilien überall im ganzen Bereiche des Gliedertieres allen Zeiten fehlt, während sie bei allen niedern Thierkreisen bald während des Lebens bald auch zu bestimmten Zeiten auftritt, im Fehlen der Zitterbewegung charakteristisch für den Kreis der Gliedertiere ist.

Ein wesentlicher Unterschied der Gliedertiere besteht in der Bildung der Bewegungsorgane und in der Art und Weise, wie die bewegenden Muskeln sich zu den Gelenken zum starren Gerüste des Körpers und der Gelenke halten. Bei allen Gliedertieren ist die Gelenkverhältnismäßig weit härter und fester als die Gelenktheile des Körpers, und bildet so für die Gelenke sowohl wie für die Bewegungsorgane eine feste Grundlage, welche bei größerer Ausdehnung der Gelenke darstellen, in denen die Organe der Bewegung sind. Die bewegenden Muskeln setzen sich an der Innenseite dieser Gelenke an, sind also an der Gelenkverbindung, deren Bewegung sie hervorzubringen sollen. Die Glieder selbst bestehen aus starren Stücken, welche durch Gelenke verbunden sind und nur durch diese Gelenke die zukommende Biegsamkeit besitzen. Durch die eigenthümliche Anordnung der Bewegungsorgane z. B. an dem ersten besten Beine eines Fluges bestäätigen kann (noch ganz vielleicht die Schere eines Krebses),

hiere wesentlich von den Wirbelthieren, zwar eingelenkte, starre Hebel für die Vorkommen, die Muskeln aber auf der He dieses zu bewegenden Hebels angebracht und sie bei den Gliedertieren auf der innern Hebel liegen. Nicht minder unterscheiden Gliedertiere von den später zu behandelnden entweder gar kein starres Hautskelet und Bewegungshebel besitzen, oder, wenn dergleichen in Form von Vorsten, Stacheln u. s. w. sind, niemals eingelenkte Glieder und durch bundene Hebel zeigen. Die Gelenke, welche den Theile der Glieder miteinander und bedung des Körpers einigen, sind häufiglich complicirt und weit mannichfaltiger in, als bei den Wirbelthieren, schon wegen des Hohlzylinders, den die einzelnen Stüde besitzen. Indessen lassen sich diese Verformen doch meist auf zwei Typen, den Fußgelenks und denjenigen des Charniers. Auch die Art der Bewegungsorgane ist mannichfaltig, doch lassen sich dieselben darauf, daß sie stets paarige Anhänge darstellen, meisten Fällen an der Bauchfläche und nur ern Klassen (Flügel der Insekten) an der angebracht sind. In der Zahl und Anwie in der Function dieser Anhänge findet die Mannichfaltigkeit statt, daß ihr gegenhält niß zwischen den größern Gruppen noch nicht vollständig erkannt ist. Es läßt sich so schwerer bestimmen, als selbst während kelung die Form, Lage, Zahl und Function ert und dasselbe Gliedmaßenpaar auch bei en Geschlechtern sehr verschieden entwickelt. Bei höchst entwickelter Gliederung lassen die Gruppen unterscheiden:

Die erste Gruppe besteht aus einem oder zwei Paar (antennae), einem vordern und einem hintern so nebeneinanderstehen, daß die vordern Zähler, die hintern als äußere bezeichnet. Bei einigen Klassen ist nur ein Paar Zähler, bei andern fehlen sie scheinbar und sind oder Beisorgane umgewandelt. Sie stehen meist über dem Munde auf der Stirnfläche gewöhnlich aus einem mehrgliederigen Stiele ste und einer Geißel gebildet, die höchst e Formen annehmen.

Die Gruppe der ausgebildeten Kauwerkzeuge ursprünglich aus drei seitlichen Kieferpaaren. In dem gewöhnlich eine Oberlippe (Labrum), Oberliefer, Kiefer (mandibulae), ein seit zusammengefügter Paar, die Unterlippe (labium) oder Lade (maxillae) und eine sehr zusammengesetzte Unterlippe (Labium) unge der Mundhöhle vor. Während die meist nur aus einem einzigen mächtigen, ornstüde bestehen, zeigen Kinnladen und nbläßen eine analoge Zusammensetzung, in dieser Theile aus einem Schaft oder Kdr: i innern, meist zum Kaen oder Decken e Theile, der Lade, und einem äußern geglieange besteht, dem Taster oder der Geißel welcher wesentlich zum Tasten der Nahrungsnt und durch seine vielfachen Formänderunze Charaktere zur Unterscheidung bietet.

Die Gruppe der eigentlichen Kauwerkzeuge ch besonders bei denjenigen Gliedertieren, ist theil ganz oder theilweise mit dem Kopfe a ist, eine Gruppe von Anhängen an, die dem Namen der Kaufüße oder Kiefer:

füße belegt, und die sich bis zur Zahl von drei Paaren vermehren können. Es zeigen diese Theile in ihrer Bildung die merkwürdigsten Ueborgänge von wahren Bewegungs- oder Greiforganen, kurz von wirklichen Füßen zu förmlichen Kauwerkzeugen, und liefern dadurch den Beweis, daß die eigentlichen Kauwerkzeuge ihrer Anlage nach dem Typus der Füße angehören und eigentlich nur die Füße der Kopfzinge sind, welche zu besondern Zwecken sich umgestaltet haben.

4) Hierauf folgt erst die Gruppe der eigentlichen Beine oder Füße (pedes), der wesentlichsten Bewegungsorgane auf der Erde, wie im Wasser, deren Zahl wenigstens drei Paare beträgt, aber außerordentlich vermehrt werden kann. Die wohl ausgebildeten Füße bestehen immer aus einem meist kugelförmigen oder cylindrischen Hüftgelenke (coxa), an das gewöhnlich ein unbewegliches Stück, der Schenkel- oder Hüftknorren (trochanter), angewachsen ist, aus einem Schenkel (femur), einer Schiene (tibia) und einem Endtheile, dem Fuße (tarsus), der meist aus mehreren Gliedern besteht. Die Modificationen der Form, wodurch die Beine oft ihrer ursprünglichen Bestimmung entfremdet und zu Tastorganen, Greifwerkzeugen u. s. w. umgestaltet werden, sind ebenso mannichfaltig als diejenigen, welche sie innerhalb ihres ursprünglichen Bestimmungskreises erleiden, wo sie je nach der Art der Bewegung zu Schreit-, Lauf-, Spring-, Grab-, Schwimmbeinen u. s. w. sich gestalten.

5) Eine letzte Gruppe gegliederter Anhänge, welche hinter den Beinen an den Ringeln des Hinterleibes befestigt sind, findet sich nur bei den Krustenthiere und ist dort unter dem Namen der falschen Füße, Bauchfüße oder Afterfüße (pedes spurii), bekannt. Meist sind es blattförmige Organe, bald zum Schwimmen oder Strudeln bestimmt, in andern Fällen zu Athemorganen (Kiemenblättern) umgewandelt, oder zum Tragen der Eier, zu Deckplatten u. s. w. entwickelt; selten nur bilden sie sich zu wirklichen Bewegungsorganen heran. Den Insekten und Arachniden fehlen diese Anhänge des Hinterleibes durchaus, und bei den Tausendfüßlern dürfte es noch zweifelhaft sein, ob die vielfältige Wiederholung der gleichförmigen Ringe, welche bei ihnen Beine tragen, eher der Brust oder dem Hinterleibe angehört.

Es ist höchst wahrscheinlich, daß nur die drei ersten Gliedmaßenpaare, also die Zähler und die Oberliefer, aus den drei ursprünglichen Gliedmaßen des Nauplius hervorgehen, alle andern aber nachträglich erworben sind. Diese drei ersten Paare können aber ebenfalls in Function und Form sehr abändern, so daß z. B. das erste Zählerpaar sich zu giftigen Mundorganen umwandelt (Kieferfühler der Arachniden), das zweite Oberlippe wird (bei den Insekten) oder Greiforgan (Branchiopoden) u. s. w.

Von den rückenständigen Gliedmaßen (Flügel der ausgebildeten Insekten, Rückenkiemen mancher Larven) wird bei diesen die Rede sein.

In dem Nervensystem finden wir eine von dem Bau der Wirbelthiere sehr verschiedene charakteristische Anordnung, die auf dem Typus ruht, welchen wir bei den höhern Ringelwürmern ausgebildet finden werden. Ein flotiger Strang, dessen meist doppelte Verbindungsfäden oft seitlich auseinanderweichen, zieht sich in der Mittellinie des Körpers an der Bauchfläche fort und entfendet aus seinen einzelnen Knoten die Nerven der verschiedenen Organe. Je länger gestreckt der Körper erscheint, je gleichartiger die verschiedenen Ringe sind, in desto gleichmäßigeren Abständen folgen sich die Knoten dieses Bauchnervenmarks, während

beim Zusammenschmelzen der Ringel sowie der Körperabtheilungen auch die einzelnen Knoten miteinander in größere Massen verschmelzen. Das ganze Bauchmark nimmt seinen Ursprung von einem oder mehreren beträchtlichen Hirnknotten, welche in dem Kopfe über dem Schlund liegen und zwei Verbindungsfäden nach unten schicken, die sich in den ersten Bauchknotten vereinigen. Es ist also ein förmlicher Schlundring vorhanden, der sich aber nach hinten in ein streng symmetrisches, in der Mittellinie des Körpers gelegenes Bauchmark fortsetzt. Wichtig erscheint die Lagerung dieses Bauchmarks unter allen Eingeweiden unmittelbar an der Innenfläche der äußeren Bauchbedeckungen, die der Lage des Centralnervensystems bei den Wirbelthieren gerade entgegengesetzt ist.

Die Sinnesorgane sind meist sehr hoch entwickelt und nur bei festsitzenden oder schmarotzenden Arten verkümmert. Dem Tastsinne dienen meist besondere Anhänge, Fühler (Antennae), die mit glashellen Stäbchen, sogenannten Taststäbchen, ausgerüstet sind. Solche Taststäbchen, die übrigens nur unter dem Mikroskope sichtbar sind, finden sich zuweilen noch an andern Körperstellen. Hörorgane sind nicht überall nachgewiesen und haben einen ganz besondern, von dem der Wirbelthiere abweichenden Bau, kommen auch an andern Stellen als am Kopfe vor und sind stets nach außen gebohrt. Geruchs- und Geschmacksorgane sind nirgends mit Sicherheit nachgewiesen. Augen kommen fast überall vor. Sie bestehen ursprünglich aus einem Kristallstäbchen, das als empfindendes und lichtbrechendes Organ zugleich fungirt und eine directe Endigung eines Sehnervenfadens darstellt. Man unterscheidet: einfache Augen (Stemmata) bald mit, bald ohne Hornhaut, und zusammengesetzte Augen, welche aus vielen einzelnen Kristallstäbchen zusammengesetzt und meist mit einer vier- oder sechseckig facettirten Hornhaut überzogen sind, die zuweilen aber auch einfach, ohne Facetten, sich über das Auge wölbt. Die Zahl der einfachen Augen kann sehr wechseln, die der zusammengesetzten ist stets zwei.

Der Kreislauf ist stets unvollständig, wenn er überhaupt vorhanden ist. Das Herz liegt, wenn vorhanden, unter allen Umständen an der Rücken- oder Rückenseite des Körpers unmittelbar unter der Haut, also entgegengesetzt der Lage, die bei den Wirbelthieren maßgebend ist, und zeigt in den meisten Fällen Spaltöffnungen, durch welche das Blut eintritt, um dann durch ein arterielles, mehr oder minder entwickeltes Gefäßsystem wieder ausgetrieben zu werden. Häufig existiren gar keine Gefäße, und das farblose Blut circulirt in den Zwischenräumen der Organe und Gewebe. Die Form des Herzens ist ursprünglich die eines rundlichen Schlauchs, paßt sich aber mehr oder minder der Körperform an, indem es meist sich in die Länge ausdehnt und mehrfache Kammern mit Zwischenklappen und Spaltenpaaren zeigt.

Die Athmung geschieht bei den niedern Formen durch die Körperoberfläche, sonst aber bei den im Wasser lebenden Gliederthieren durch Kiemen, bei den Lufathmern durch Luftröhren oder Tracheen, die bald nur einfache oder zusammengebrückte, in Bündeln vereinigte Röhren darstellen, bald sich durch den ganzen Körper verzweigen und die Organe umspinnen. Meist öffnen sich dieselben durch Luftblöcher (Stigmata) nach außen, bei vielen im Wasser lebenden Larven enden oder beginnen sie auf kiemenartigen Anhängen, sogenannten Tracheenkiemen. Charakteristisch sind besondere Strudelorgane, die durch Muskelzusammenziehung in Thätigkeit gesetzt werden, bei den meisten Kiemenathmern.

Der Darmkanal fehlt nur in dem Schmarotzern durch Nahrungsaufnahme. Bei den anderen, zwei Oeffnungen, einen beim Kopfe gelegenen Mund und einen am After. Doch ist die Mundöffnung zuweilen beidseitig geschlossen, die keine Nahrung mehr aufnehmen können (Männchen einiger Fliegen). Obere und untere Theile des Darms mit dem After sind die Mundorgane annehmen und z. B. Spinnweben (Löwen) oder Athmorgane (Tubellarien). Die Mundorgane sind, wie aus der Lage der Extremitäten hervorgeht, umgewandelt, also immer paarig, und wirken beim Essen einander, nicht, wie bei den Wirbelthieren, nach oben. Die ursprünglich lausenartige Mundorgane werden bei vielen in stechende, saugende Organe umgewandelt. Der Darm ist mannichfaltigsten Abtheilungen, was als bei den Wirbelthieren. In seiner Endigung münden die Lebergänge, in die Mundorgane die Geschlechtsorgane mit den Nieren. Die Geschlechtsorgane sind entweder aus einfachen aus mit Zellen ausgelegten Röhren gebildet.

Die Geschlechter sind in der Regel getrennt, die meisten Rankenfässer (Circulipoda) phroditisch, und jedenfalls sind es bei den Tardigrada. Nicht selten kommt es vor, und zwar in verschiedener Art, dass von gewissen Formen nur unbefruchtete Individuen während gewisser Zeiten producirt werden, während gewisse Individuen niedern Crustaceen bei demselben Individuum gewisse Geschlechter aber befruchtet werden, wo dann die Befruchtung auf das Geschlecht des Weibchens. Auch kommt Pädogenese vor, indem bei Cecidomyia Keime und Junge erzeugen. Fäulen, bei geselligen Thieren, verkümmert sind vorhandenen Geschlechtstheile, sondern unfähig zur Reproduction werden. Neutra (Arbeiterinnen der Bienen und Wespen) Geschlechtsunterschiede sind häufig ausgemerkt. Bei den Weibchen verkümmern oft die Sinnesorgane auf Kosten der sich entwickelnden Fortpflanzungsorgane. Die Befruchtung besonders bei den Schmarotzern, oft durch ähnlich und in ihrem Wachsthum. Die Geschlechtstheile selbst sind in beiden Weisen entwickelt, fast immer paarig, die Befruchtung geschieht oft in indirekter Weise durch Samenmaschinen (Spermatophoren) besonders umgewandelte Organe, z. B. Spinnenmännchen. Die Befruchtung ist meist und die Begattungswerkzeuge oft in beiden Weisen gebildet.

Die Zerküftung des Dotters ist meist spaltet sich der Dotter in einen Bildungsdotter und großzelligen Nährdotter in der Entwicklung seiner Zellen zurückbleibt.

Bei allen Gliederthieren zeigt sich ein Gegensatz zwischen der Keimanlage, dem Embryo hervorgeht, und dem Dottersack, die gegenseitige Anlagerung dieser beiden so beschaffen, daß der sich ausbildende Embryo dem Dottersack zugewandt ist. Die Bildung der Organe von der Bauchseite den Rücken hin fortschreitet. Der Dottersack selbst schießt sich zuletzt in der Rückenab, während bei den Wirbelthieren

rung stattfindet und der Embryo mit äche dem Dotter zugewandt ist.

ersten Gliedertieren finden sich mehr oder derte Larvenzustände, die sogar häufig Theil des Lebens des Individuums ausse oft außerordentlich von der definitiven henden Larvenzustände gehen in diese abgeschnittene Perioden über, bei deren isher den Körper umhüllende Chitinhaut wird nebst denjenigen Theilen, deren Exi visorisch war, während die neuen Theile en schon vorgebildet waren. Ähnliche mmen auch bei fortzuschreitendem Wachse gebildeten Thiere vor. Unter den Larven- lbst unterscheidet man namentlich als id diejenigen, wo die Larve, die einen ng genügenden Vorrath von Bildungstoff at, keine Nahrung mehr sucht und auf- ich meistens vollkommen ruhig verhält. en folgende Klassen an:

Insecta), Luftathmer mit einem Fühler- Weinpaaren, rückenstängigen Bewegungs- flügeln) und gliederlosem Hinterleibe.

he (Myriapoda), Luftathmer mit vielen n, einem Fühlerpaar.

iere (Arachnida), Luftathmer mit um- en Fühlern und anhangslosem Hinter-

ere (Crustacea), Kiemenathmer mit zwei ren und Gliedmaßen am Hinterleibe.

Klasse der Insekten (Insecta).

(Tafel 25 bis 27.)

inige, Luftathmende Gliedertiere e deutlich in Kopf, Thorax und b geschiedenem Körper, stets mit ern und beim vollkommenen Thiere angslosem Hinterleibe. Höchstens nständige, auf dem Thorax ein- flügelpaare.

i des Körpers aus einzelnen Ringeln, fig. 31: Maitäfer, in seine Ringe zer- pft mit den Fühlern [i] und den vor- stern (Palpen); b Vorderbrust [Prothorax] en Weinpaare; c Mittelbrust [Mesothorax] weiten Weinpaare und den Flügeldecken h l Hinterbrust [Metathorax] mit den Hinter- f Hinterleib aus neun Ringen gebildet), n Gliedertieren gemeinsam ist, läßt sich n Insekten stets nachweisen, obgleich nicht ieile vorkommen, daß einzelne dieser Ringel n ganzen oder nur in bestimmten Stücken e verwachsen und verschmolzen sind. Ge- assen sich indeß drei Abtheilungen unter- men zufolge diese einzelnen Ringel gruppirt , Brust und Hinterleib. Nur bei einigen Schmarotzern erscheinen Brust und Hinter- ander verschmolzen; bei vielen hängen die erabtheilungen in ihrer ganzen Breite zu- bei andern wieder ist die Verbindung nur ne Stiele vermittelt, so daß die drei Theile sten Bild in die Augen fallen. Der Kopf er allen Umständen die Fühler und die zeuge, meistens auch zusammengesetzte Augen he Nebenaugen; an den drei Ringen der n sich auf der untern Seite die drei Fuß- n der obern die Flügel an; der Hinterleib die Ringelung am deutlichsten, trägt aber füße, und nur höchst selten eigenthümliche e Bewegungsorgane, während sein hinteres

Ende oft mit Apparaten ausgestattet ist, die zu dem Fortpflanzungsgeschäfte in der nächsten Beziehung stehen.

Die Fühler (antennae), welche meist vorn auf dem Kopfe, auf der Stirn oder mehr zu beiden Seiten eingelenkt sind, zeigen äußerst wechselnde Formen, die sich indeß wesentlich auf zwei Grundtypen reduciren lassen. Gewöhnlich haben sie die Gestalt einer einfachen Vorste, einer Keule oder eines Regels und erscheinen dann aus einzelnen Ringeln oder Gliedern zusammengesetzt, welche ziemlich gleiche Beschaffenheit und Structur zeigen. Untersucht man nämlich die Fühler unter einer hinreichend starken Vergrößerung, so sieht man die äußere Fläche dieser gleichartigen Fühler mit Ausnahme der Gelenkglieder überall mit feinen Gruben besetzt, deren Grund mit einer dünnen, zarten Haut verschlossen ist, welche mit sehr zarten Flaumhaaren dicht besetzt erscheint. Bei den ungleichartigen Fühlern, wo stets ein besonderer Schaft oder Stiel existirt, sind diese eigenthümlichen Poren und Gruben nur auf den kammförmigen Zaden, Zähnen, Nesten und Fiederblättchen der Fühler angebracht, während der Stiel die gewöhnliche Beschaffenheit der übrigen äußern Körperhaut zeigt. Es ist zwar jedenfalls anzunehmen, daß dieser eigenthümliche Bau der Fühler zur Function derselben in der engsten Beziehung steht, welcher Art aber die Beziehung ist, hat bis jetzt noch nicht mit Sicherheit ermittelt werden können. Jedenfalls tasten die meisten Insekten sowol mit den Fühlern als auch mit den Palpen der Mundwerkzeuge; ob aber auch in den Fühlern der Sitz des oft in ausgezeichnete Weise entwickelten Geruchsinns zu suchen ist, darf jetzt noch billig bezweifelt werden. Die Form der Fühler, die Gestalt und Zahl ihrer einzelnen Glieder bieten werthvolle Unterscheidungszeichen für größere Gruppen, wie für Gattungen und Arten.

Der Kopf trägt vorn, oben oder an den Seiten die Augen, die nur sehr selten bei solchen Insekten rückgebildet sind, welche an dunkeln Orten, in Höhlen u. s. w. leben und gewöhnlich in zwei Formen sich darstellen: als zusammengesetzte Netzaugen (oculi) oder als einfache Punkt- oder Nebenaugen (stemmata). Oft kommen die Punktaugen allein vor, und dann sind sie meistens gehäuft und stehen in Gruppen an den Seiten des Kopfes auf eigenen Wülsten von verschiedener Gestalt und Größe. Sind die Nebenaugen zugleich mit den zusammengesetzten Augen vorhanden, so findet man meist nur zwei oder drei dieser Organe oben auf dem Scheitel, wo sie gewöhnlich dem Hirnknoten so nahe aufsitzen, daß ihr Sehnerv nur ein kurzes Würzchen bildet. Es bestehen diese einfachen Augen stets aus einer becherförmigen, von wenigen Krystallstäben gebildeten Netzhaut, welche von einem dunkeln Farbstoffe umgeben und von einer meist halbkugelförmigen durchsichtigen Stelle der Haut (Hornhaut) überwölbt ist. Die zusammengesetzten Augen bilden meist hügelartige Hervorragungen auf beiden Seiten des Kopfes, die rundlich, nierenförmig, zuweilen auch sehr tief ausgeschnitten sind, manchmal so sehr anwachsen, daß sie auf dem Scheitel zusammenstoßen, zuweilen auf unbeweglichen Stielen sitzen und oft mehrere tausend Facetten zählen, die nicht immer gleich groß an demselben Auge sind und zwischen welchen oft Haare eingepflanzt sind. Hinter jeder Facette beginnt ein nach innen sich zuspitzender, oft selbstam zugeschnittener Krystallstab, der zugleich lichtbrechendes und empfindendes Element ist und nach innen in eine Faser des Sehnervs übergeht, die von einem Ganglien entspringt.

Jeder Krystallstab ist oft in seiner ganzen Länge, stets aber wenigstens am innern Theile von einer schwarzen oder farbigen Pigmentschicht überzogen. Welche specielle Beziehung zum Sehen die Punktaugen und zusammengesetzten Augen besitzen, wo beide gemeinschaftlich vorkommen, ist noch unbekannt.

Die Mundwerkzeuge, welche der Kopf stets an seiner untern oder vordern Fläche trägt, sind bei allen Insekten nach demselben Grundtypus angeordnet, wenn sie auch in Form, Beschaffenheit und relativer Ausbildung unzählige Modificationen erleiden und je nach der Nahrung der Insekten bald mehr zum Rauhen, bald mehr zum Saugen eingerichtet sind. Die Erkenntniß dieses allgemeinen Plans in der Organisation so höchst verschiedener Theile bildet eine der schönsten Eigenschaften der neuern Wissenschaft. Da die einzelnen Theile bei den laudenden Insekten am meisten ausgebildet sind, so gehen wir zuerst auf diese ein, um ihnen die Analogien der saugenden Mundtheile, bei welchen einzelne dieser Werkzeuge mehr oder minder verkümmert sind, entgegenstellen zu können. Man findet bei einem (Taf. 25, Fig. 32: Mundtheile des Lederlaufkäfers), vergrößert und von oben gesehen. a Lippentaster, b Labentaster, c Kinnladen, d Kinnbäden, e Oberlippe, f Unterlippe) Käfer oder einem Geradflügler, indem man von oben nach unten geht, zuerst einen unpaaren Dedel, die Oberlippe oder Lefze (labrum), dann zwei seitliche, meist hakenförmige Hornstücke, die Kiefer, Oberkiefer oder Kinnbäden (mandibulae), unter diesen zwei andere seitliche Stücke, die Kinnladen oder Unterkiefer (maxillae), und endlich als untern Schluß ein wie die Oberlippe von oben nach unten bewegliches Stück, die Unterlippe oder Lippe (labium), die man als ein in der Mitte verwachsenes drittes seitliches Kieferpaar betrachten muß, da sie, wie z. B. bei den Geradflüglern, zuweilen in zwei seitliche Hälften getrennt ist. Kinnladen und Unterlippe tragen gewöhnlich seitliche gegliederte Anhänge, die Labentaster (palpi maxillares) und die Lippentaster (palpi labiales). Die normalen Mundwerkzeuge bestehen also aus zwei meist unpaaren Lippen, zwei Paar Kiefern und zwei Paar Tastern.

Die Oberlippe besteht meistens aus einem unter allen Umständen unpaarigen, mehr oder minder großen Vorsprunge, der wie eine Klappe an der Unterfläche des Kopfes beweglich ist und gewöhnlich die Kiefer deckt oder wenigstens auf ihrem Ursprunge aufliegt. Zuweilen ist die Oberlippe unbeweglich mit dem hornigen Skelet des Kopfes verwachsen, und bei manchen saugenden Insekten sucht man vergebens nach einer Spur von ihr.

Die Kiefer sind bei den laudenden Insekten stets aus zwei hohlen Hornstücken gebildet, die zu beiden Seiten durch ein Charniergelenk so mit dem Kopfe verbunden sind, daß sie sich nur gegeneinander bewegen können. Sie sind meistens hakenförmig, trumm gebogen, gewöhnlich sehr fest und hart, bei den Fleischfressern spitz gezähnt, bei den Pflanzensressern mehr mit meißelartigen oder stumpfen Vorragungen zum Rauhen versehen; in vielen Fällen ragen sie weit über den Kopf hervor und haben oft bei den verschiedenen Geschlechtern derselben Art eine verschiedene Form, wie z. B. bei den bekannten Hirschkäfern, wo das Männchen große geweihartige, mit mehrfachen Räden besetzte Kiefer besitzt, während sie beim Weibchen nur kurze Haken darstellen. Je mehr die Aufnahme fester Nahrungsmittel zurückfällt, desto unscheinbarer werden die Kiefer, und bei den echten Saugern fehlen sie entweder ganz, oder sind auf zwei hornige

Vorsten reducirt, welche gewöhnlich benutzt werden.

Weit complicirter an Gestalt und Bau sind die Unterkiefer oder Kinnladen, die einen so offenen Winkel wie die Oberlippe einnehmen, in dem sie stehen, und nur selten die Schärfe ihrer Zähnelungen gleichmäßig laden. Sie stehen der Unterlippe sehr nahe und zuweilen mit ihrer Basis so mit der Unterlippe verbunden, daß man sie für einen Theil derselben halten könnte. Sie bestehen meist aus mehreren einzelnen Stücken, die man in einen Schaft oder Stiel und einen Kopf oder Stielkopf theilen kann. Der Stiel ist meistens aus einem queren, sogennanten Angel (cardo) und mehreren Stielen (stipes) zusammengesetzt, die an der Seite die Laben oder Lappen (malae) bilden, an der andern Seite die Labentaster (palpi maxillares), an der Spitze oft hakenförmig umgebogen, die sich härten oder selbst mit spizen Hornstücken, der Kiefer, besetzt ist. Das Ende des Stieles ist namentlich sehr in seiner Form, indem es blattförmig ist und von der Seite her in eine Klammer (galea, bei den Geradflüglern) die die Unterlippe bedeckt, umgewandelt, oder selbst einen tastförmigen Anhang, die Kinnlade, bilden. Die Kinnladen sind meist auf ihrer Innenseite mit Borsten besetzt und dienen den saugenden Insekten erleiden sie mannichfache Modificationen, indem sie bald in ähnliche Kiefer zu Stechborsten umgewandelt werden, namentlich bei den Zweiflüglern und bei den Hautflüglern, oder aber, indem sie sich in eine Klammer umwandeln, wie bei den Hautflüglern, selbst das Saugorgan werden, indem sie sich in eine spirallig aufgerollten Haken bilden, durch Zusammenlegen eine Röhre bilden, wie dies bei den Schmetterlingen der Fall ist. Die Labentaster, welche nur in seltenen Fällen gewöhnlich viel länger als die Kiefer sind, bestehen aus einem Schaft und einem Kopf, als die Lippentaster, und ihre Glieder sind für jede Insektenordnung ein bestimmtes, z. B. vier für die Käfer, fünf für die Hautflüglern, u. s. w.

Die Unterlippe besteht außer dem Schaft, welche in Form und Größe meistens der Oberlippe ähnlich sind, noch aus mehreren verhältnißmäßig kleinen Theilen, die gewöhnlich sitzt sie auf einer abgewinkelten Mittellinie verwachsenen Kinnladen, die gewöhnlich aber mit Haaren besetzt sind. Die Unterlippe ist gewöhnlich nach unten und trägt eine große Fläche meist einen häutigen weichen Theil, die Zunge (ligula) genannt, die oft diese Zunge im Munde verborgen ist. Neben ihr noch einige selbstständige, sogennanten Nebenzungen (paraglossae) und Zungen zeigen nicht nur mannichfache Verschiedenheiten, sondern auch sehr eigenthümliche Modificationen ihres Baues. Bei vielen Insekten, und zwar namentlich bei den Hautflüglern, hat sich die Unterlippe verlängert und bildet eine ebenen Scheide, in welcher die zu Stechborsten

Kinnladen eingeschlossen liegen. Bei den Käfern ist die zum Schnabel gewordene Unterlippe aus mehreren Gliedern zusammenhängend, sie bei den Zweiflüglern einen häutigen Schlauch, einen Saugrüssel bildet, der nämlich zurückgezogen werden kann. Die oft entartete Zunge wird schon bei manchen Käfern, daß sie stets aus dem Munde hervorragt, zu Hautflügeln erreicht sie den höchsten Entwidlung, indem sie zu einem langen, Schöpftrichter wird, der wesentlich zur dieser Thiere und zum Auffammeln des trägt.

Die Brust (thorax) trägt, wie wir schon oben bei allen Fällen die Bewegungsorgane, indem der Fläche ihrer beiden hintern Ringe die der Unterfläche aller drei Ringe aber die lenkt sind. Die Brust ist im ganzen die größte der drei Körperabtheilungen, was denjenigen Insekten, die harte Flügeldecken (z. B. den Käfern), nur auf der Unterseite werden kann, indem dann die Flügel, die Mittel- und Hinterbrust sich ausdehnen, den meisten Fällen ist es leicht, die drei, die man mit dem Namen der Vorderbrust (prothorax), der Mittelbrust (mesothorax) und der Brust (metathorax) unterscheidet, trotz ihrer Verwachungen zu erkennen; und ebenso kann häufig die einzelnen Stücke unterscheiden, in jeder einzelne dieser Ringe wieder zerlegt ist. Bei den Beschreibungen werden die Unterfläche der Brust, das sogenannte Sternum (sternum), und die Rückenfläche (notum) angegeben, so daß wir über die weitere Zerlegung der einzelnen Bruststücke, die äußerst ist, hier hinweggehen können. Sehr verdienstlich die gegenseitigen Verhältnisse der einzelnen, da ihre Entwidlung besonders in Beziehung zu den Functionen der Bewegungsorgane an ihnen befestigt sind. So ist die Vorderbrust den Käfern, den Geradflüglern und Halbfleglern ganz bedeutend entwidelt, frei beweglich, und dann den Namen des Halschildes, die bei andern, besonders fliegenden Insekten, den Schmetterlingen, den Haut- und Zweiflüglern nur die Form eines schmalen oder eines dünnen Stiels hat, welcher den der Brust vereint; zuweilen ist der Kopf geborgen unter der schildförmigen Vorderbrust, so daß in dem Munde derselben gebracht sind, um den Augen einigen Spielraum oben zu gewähren. Die Vorderbrust trägt das erste Paar der Beine, aber niemals auf der Rückseite.

Die Mittelbrust erscheint besonders bei denjenigen vorzugsweise entwidelt, bei welchen die Flügel die wesentlichsten Flugorgane bilden, wie bei den Haut- und Zweiflüglern, während denjenigen Insekten, wo die Vorderbrust als den dienen, die Mittelbrust entsprechend auch unbedeutende Ausbildung zeigt und oft gar nur mit einem kleinen Theile auf der Oberseite ist, den man das Schildchen (scutellum) hat. Die Hinterbrust endlich, welche bei tageweiße fliegenden Insekten nur wenig entwidelt, bildet sich da besonders aus, wo die Hinterbrust die wesentlichste Flugorgane geworden sind, oder Hinterbeine zu Springfüßen benutzt werden diesem Endzwecke mächtige Muskeln erhalten. Die Flügel, welche stets auf der Rückenfläche der

Mittel- und Hinterbrust eingelenkt sind, wechseln außerordentlich an Gestalt und Bildung. Sie fehlen ganz bei vielen einzelnen Gattungen von Käfern, Geradflüglern, Halbfleglern und Zweiflüglern, und häufig gehen sie den Weibchen ab, während die Männchen damit versehen sind; so sind auch bei den in Gesellschaft lebenden Insekten zuweilen die unvollkommen ausgebildeten geschlechtslosen Individuen, die Arbeiter, flügellos, während Männchen und Weibchen mit Flugorganen versehen sind. Viele Insekten, wie namentlich die Ordnung der Dipteren, besitzen nur zwei ausgebildete Flügel, wobei das andere Paar zu eigenthümlichen schwingenden Kölbchen verkümmert ist, und zwar sind es bei den Zweiflüglern die Hinterflügel, bei den Strepsipteren die Vorderflügel, welche in dieser Weise verkümmert sind. Da, wo vier Flügel vorhanden sind, findet man sie oft von ungleicher Bildung, indem die Vorderflügel mehr lederartig oder hornartig fest sind und nur als Flügeldecken (Elytrae) benutzt werden, ohne am Fluge selbst einen wesentlichen Antheil zu nehmen. Manchmal sind diese Flügeldecken sogar so verwachsen, daß sie durchaus unbeweglich erscheinen; in andern Fällen ist nur ein Theil der Vorderflügel lederartig und zur Dedek bestimmt, während der übrige Theil ebenso wie die Hinterflügel häutig erscheint. Die Flügel selbst sind eigentlich nur Duplikaturen des Hautskelets, deren beide Membranen sehr dicht aneinanderliegen und nur an den Orten, wo Luftadern und Gefäße sie durchziehen, voneinanderweichen. Jeder Flügel bildet so eine aus zwei Blättern bestehende häutige Platte, die je nach den Gattungen von mehr oder minder ausgebildeten Adern oder Nerven durchzogen ist. Bei Insekten, welche eben aus der Puppe hervortreten und bei denen die Flügel noch vollkommen unausgebildet sind, kann man nicht nur diese Zusammensetzung der Flügel aus zwei Blättern beobachten, sondern auch sehen, wie anfangs durch die Gefäße und Lufttröhren Blut und Luft in die Flügel vordringt und diese ausdehnt. Bei den meisten Insekten sind die Flügel nackt, einfach häutig, höchstens mit dünnen Härchen besetzt, und haben dann jene eigenthümliche schillernde Färbung dünner, durchsichtiger Blättchen; oft aber sind sie mit besondern Schuppen bedeckt, welche ihre Färbung begeben. Zuweilen ist ihre Fläche noch durch lange Haare vermehrt, die an ihrem Rande stehen. Die Vertheilung der Adern oder Nerven auf den Flügeln und der zwischen ihnen befindlichen, bald offenen, bald geschlossenen Zellen erscheint von großer Wichtigkeit für die beschreibende Naturgeschichte, da diese Vertheilung bei den natürlichen Gruppen stets übereinstimmend ist. Die Art und Weise, wie die Flügel in der Ruhe getragen und zusammengelegt werden, ist gewöhnlich sehr bezeichnend für die natürlichen Gruppen, ja selbst für die Ordnungen der Insekten. So kniden alle Käfer die Unterflügel ein, um sie unter die Flügeldecken zu schieben, während die Geradflügler sie fächerartig zusammenlegen, die Tagesschmetterlinge aber sie nach oben zusammenzuschlagen. Der Flug der Insekten ist begreiflicherweise je nach der Beschaffenheit und Ausbildung der Flügel außerordentlich verschieden, beruht aber im wesentlichen darauf, daß der Flügel durch Drehung in Form einer 8 beim Aufheben der Luft eine geringere Fläche darbietet als beim Niederschlagen, wodurch sich der zwischen den Flügeln angebrachte Körper erhebt. Die Flugkraft vieler Hautflügler, Halbfleglern und Zweiflüglern übersteigt alles, was wir an andern Thieren kennen. Die Stubenfliege macht nach genauen Messungen über 300 Schwingungen in der Secunde mit ihren Flügeln.

Die Beine der Insekten sind trotz der verschiedenen Ausbildung nach denselben Grundgesetze gebaut und enthalten selbst bei ihrer Verklammerung gewöhnlich dieselbe Zahl von einzelnen Theilen. Die Hüfte (coxa), mittels welcher das Bein in die Gelenkgrube des betreffenden Ringes eingelenkt ist, bildet meistens einen drehrunden oder länglichen Gelenkknopf, mit dem ein zweites Hornstück, der Schenkelanhang oder Trochanter, unbeweglich verbunden ist. Gewöhnlich können diese beiden Hüftstücke zusammen in dem Gelenke in ähnlicher Weise bewegt werden, wie unser Oberarm, in andern Fällen ist die Rollung unvollständiger. An den Hüftstücken sitzt, ebenfalls durch ein unvollständiges Kugelgelenk mit ihnen verbunden, der Schenkel (femur), der fast immer eine walzenförmige Gestalt hat, oft bestachelt oder bezähnt ist und an den Hinterbeinen der springenden Insekten gewöhnlich bedeutend verdickt erscheint. Mit dem Schenkel steht ein zweites, meist längeres und dünneres Stück durch ein Charniergelenk in Verbindung, das man die Schiene (tibia), nennt, und das an seinem Ende den Fuß (tarsus) trägt. Dieser letztere besteht nur sehr selten aus einem, meist aus mehreren, gewöhnlich aus fünf Gliedern, die oft erweitert und auf ihrer Unterfläche mit besondern Wallen, Bürsten oder Wärtchen zum Anhalten an glatten Oberflächen besetzt sind. Das letzte Taralglied trägt an seinem Ende gewöhnlich zwei, seltener eine gekrümmte, meist scharfe Hornklaue, die nur in äußerst seltenen Fällen gänzlich fehlt. Wesentliche Modificationen erleiden die Beine häufig durch ihre Beziehungen zur Lebensart der Insekten. So besitzen manche breite, quergestellte Vorderbeine, die zum Auswühlen der Erde geschikt erscheinen, sogenannte Grabfüße. Bei den Springbeinen sind die hinteren Schenkel verdickt und verlängert; bei den Schwimmbeinen die einzelnen Glieder abgeplattet, die Beine nur in wagrechter Richtung beweglich und mit steifen Haaren, die ihre Oberfläche vergrößern, besetzt. Bei manchen Insekten sind die Vorderbeine zum Fangen der Beute so eingerichtet, daß das letzte Glied gegen das vorletzte wie die Klinge eines Taschenmessers eingeklappt werden kann, Raubfüße; bei den meisten sind sie gleichmäßig entwickelt zum Gehen, Laufen und Klettern.

Der Hinterleib (abdomen) der Insekten zeigt stets die Ringelung weit deutlicher als die beiden andern Hauptabschnitte des Körpers. Die Hinterleibsringe sind fast immer aus zwei Bögen, einem oberen und einem untern, zusammenge setzt, die an den Seitenrändern durch elastische Häute miteinander verbunden sind, so daß der Hinterleib hierdurch sowohl wie durch die schuppige Anordnung der Ringe bedeutender Volumsveränderungen fähig ist, die namentlich durch die Entwicklung der Eier bei den Weibchen sowie durch das Einpumpen von Luft vor dem Aufsteigen bedingt werden. Zuweilen geht diese schuppige Lagerung der Ringe, die durch ausdehnbare Bänder vereinigt sind, so weit, daß der Hinterleib förmlich wie die Röhre eines Perspectivs ein- und ausgezogen werden kann. Die Normalzahl der Hinterleibsringe scheint nem zu sein, insofern wechselt dieselbe außerordentlich entweder durch Verwachsungen oder dadurch, daß die letzten Ringe in die Bauchhöhle selbst hineingeschoben und dort als Dedgeschuppen der Begattungsorgane angebracht sind. Eigentliche Bewegungsapparate trägt der Hinterleib nur bei einigen flügellosen Insekten, bei welchen die sonst unbeweglichen Borsten und Haare, die oft an ihm angebracht sind, zu Springorganen umgewandelt sind.

Die äußere Umhüllung des Körpers, die Haut,

deren Härte und Consistenz ungenau stets aus jenem eigentümlichen, ungenau gebildet, den man Chitin genannt, besteht, ist ein Stoff nur äußerst schwer zerlegbar ist, auch die meisten Häute und Röhren stellen sehr lange Zeit vollkommen dar, wenn sie noch so zart und dünn sind, der äußern Oberfläche dieses Hautkleides einfache Anhänge in Form von Stacheln, oder Schuppen vor, welche bald ziemlich fest, bald auch nur sehr lose in eigener Haut sitzen und bei der leichten Ablösung. Oft sind diese Stacheln und so dem mit Widerhaken besetzt, so daß sie sich wie Waffeln bilden, die einmal eingedrungen, sich sehr schwer wieder vordringen. Die Mägen mancher Insekten, wie z. B. des Kuckucks, sind mit einer Fläche mit einem so dichten Ueberzuge, in die Magenwand eingestochener Haare, lange lebhafter Streit über die Frage, ob diese Filzüberzüge zu dem Bau der Mägen gehören oder von den verschluckten Nahrungsmitteln rühren. Nach innen zu zeigt das Innere der Mägen eine Sammlung von Haaren und Ringen darstellend, zuweilen vorstehende Spikes, welche den verschiedenen Muskelgruppen dienen. Die äußern Umrisse der Mägen stehen überhaupt in wesentlicher Beziehung zur Ausbildung des Muskelsystems, und so ist da, wo mächtige Muskeln zur Bewegung vorhanden sind, auch entsprechend der Mägen ausgebildet, wie z. B. einen kräftigen starken Beißwerkzeugen, hohe dicke Mägen, die dem Flugvermögen u. s. w. Die Muskeln sind sehr ausgebildet und so wie die meisten Insekten Muskeln der höhern Thiere sehr stark, streifen zeigen, stehen im Verhältniß zu der Bewegung der Bewegungsorgane und der Kauen, aber im Verhältniß zu ihrer Masse Kraft und Energie, die sich besonders bei den Insekten kundgibt. Die meisten Insekten mit Leichtigkeit das Beben- oder Zittern, nichts aus dem Rücken; Ameisen können Kiefern, also mit ungünstigem Kraftverhältnisse größere und schwerere Gegenstände als sie selbst, und eine Grabwespe oder Maulwurfsgrille in einer Stunde einen Gang aus, zu zehn- bis zwölffach ihre eigene Länge, sie noch oben in die aufgewühlte Erde zu herausschaffen und die Wände desselben zusammenfallen sichern! Und solche Thiere nicht einmal bei außerordentlichen Anforderungen, sondern halten tagelang ohne zu ermüden, und ohne daß man dem Thiere etwas anmerkt.

Das Nervensystem der Insekten besteht aus allen Umständen aus einer Reihe von Nerven, unmittelbar auf der innern Fläche der Haut bedeckung aufliegen und meist durch die Fäden miteinander verbunden sind. In der über dem Schlunde liegt eine Gehirnmasse, die die Fühlernerven und die Sehnerven ausstrahlt, unter zwei dicke Fäden um den Schlund herum, die sich in einem unter dem Schlunde vereinigen und so einen förmlichen Schlauch bilden. Von dem untern Knoten aus gehen die Nerven hinten, die meistens getrennt, zuweilen aber in einem einzigen Faden verschmolzen sind, sich von Zeit zu Zeit den einzelnen Ringen anknüpfen, von welchen die Nerven

Bei den Larven und den langleibigen Insekten diese Knoten gewöhnlich weit voneinander, da, wo die einzelnen Körperringe nander verschmolzen und unbeweglich geworden, die einzelnen Knoten auch näher aneinander und oft gänzlich miteinander verschmelzen. So die mannichfaltigsten Uebergänge von Hamate, das in seiner ganzen Länge aus einem Knoten zusammengesetzt ist, die sich in 11 Abständen folgen, bis zu fast gänzlich in Massen, die kaum noch ihren Ursprung zeigen; und man kann diese allmähliche Continuität des Nervensystems auch bei denjenigen Arten, die als Larven eine langgestreckte Ganglien-vollkommene Insekten dagegen ein verbauchtes besitzen. Außer dem Bauchmark noch ein besonderes Eingeweidenervensystem, welches als zwei paarige und ein Nerv an Schlund und Magen hinläuft und Zweigen versorgt.

Der Sinnesorgane ist nur wenig. Wir erwähnten schon das auf Tastsinn, Geruch Bezügliche. Unleugbar sind viele Insekten hinsichtlich ihrer Nahrung, was sie schlucken lässt; wo derselbe seinen Sitz, ist noch nicht ermittelt. Als Gehörorgane gespannte Häute ausgesprochen, aus deren Mitte glashelle Krystallstäbchen sitzen, welche endigungen sich darstellen. Bei den Schnarrschrecken (Cicadida) liegt dieses Ohr am Hinterteile der Brust und stellt eine mit einem Trommelfläche offene Grube dar, hinter welcher ein hartes liegt, zu dem ein eigener, aus dem dritten entspringender Hörnerv geht. Bei den Grillen (Gryllida) und den Heuschrecken findet man gar unter dem Kniegelenk der obersten Gruben, welche durch Trommelflächen sind und hinter denen die Lufttröhre eine Blase bildet, zu der sich ein eigener begibt. Nervenstäbchen ohne ausgesprochene Enden bei den Käfern an den Hinterflügeln, Zweiflüglern an den Schwingelblättern vorwiegend sind Tonbildungen, die mit den functionen in Beziehung stehen, bei den Insekten Seltenes. So loden manche Holzkäfer durch, daß sie mit dem harten Kopfe erleide mit großer Heftigkeit auf das Holz die Schnarrschrecken gehen mit ihren Hinterdem Außenrande der Flügeldecken; die Heuschrecken reiben den harten und scharfen Wurzel der einen Flügeldecke gegen eine Ornamente an der Wurzel der andern Flügel, bringen dadurch den schrillenden Lauten viele Käfer und Wanzen zirpen, indem sie brust gegen den Mittelrücken oder den Hinterrücken der Flügeldecken reiben. Die Singcadren reiben ungleichförmigen sogenannten Gesang mittels kleinen Trommelfläche hervor, welche an dem Hinterleibsrinne in ähnlicher Weise wie das Tamburin in einem runden Ringe aussteht, durch einen eigenen Muskel gespannt sich wieder losgeschnellt wird. Alle diese leben sich auf die Vereinigung der beiden, und vielleicht steht auch das Summenden Insekten, welches offenbar durch die Spannung und Erschlaffung des Brustwährend der Flugbewegung und der dieselben zahlreichen Muskelcontractionen erzeugt zu in einiger Beziehung.

Verdauungskanal der Insekten ist stets

darmartig, aber von sehr wechselnder Länge, und zeigt sich immer aus mehreren Häuten zusammengesetzt, deren innerste an dem oberen und unteren Abschnitte des Darms mit dem Hautsalet in Verbindung steht und auch bei Häutungen mit demselben gewechselt wird. Bei den fleischfressenden Insekten sowie bei den Säugetieren ist der Darmkanal im allgemeinen weit kürzer als bei den Pflanzensessern, wo er oft viele schlingenförmige Biegungen im Hinterleibe bildet, die niemals durch ein Gefäß, sondern stets nur durch vielfache Verzweigungen der Lufttröhren in ihrer Lage erhalten werden. Gewöhnlich kann man drei Hauptabschnitte und folgende einzelne Theile unterscheiden: Von der Mundhöhle an, welche häufig in ihrem Grunde lappenartige Vorsprünge (epi- und hypopharynx) zeigt, zieht sich in der Brust zwischen den Muskelmassen derselben hindurch eine dünne, aber stark muskulöse Speiseröhre oder Schlund, der nach hinten oft in einen häutigen, mehr oder minder gefalteten Kropf und dann in einen meist runden Saugmagen sich erweitert, dessen innere Fläche gewöhnlich mit hornigen Leisten, Borsten und stumpfen Zähnen besetzt ist. Zuweilen auch, und zwar bei den Säugetieren, findet sich neben dem Schlunde noch eine dünnhäutige Blase, die durch einen längeren oder kürzeren Stiel mit ihm in Verbindung steht und als Saugmagen functionirt. Häufig sind an dieser ersten Abtheilung des Darmkanals noch besondere röhrlige oder traubige Speicheldrüsen entwickelt, die meistens in dem Kopfe verborgen liegen, zuweilen aber sich weit in den Leib hinab erstrecken. Die zweite größere Abtheilung des Darmkanals wird von dem sogenannten Chylusmagen gebildet und erstreckt sich von der Einmündung des Schlundes bis zur Insertion der Harngefäße in äußerst verschiedenen Formen und Gestalten. Gewöhnlich zeigt diese Abtheilung eine bedeutendere Breite als die andern, und vielfache Längs- oder Quersalten; sehr oft ist sie bald in ihrer ganzen Länge, bald nur in ihrer oberen Hälfte mit kurzen Drüsenschläuchen besetzt, welche ihr ein zottiges Ansehen geben. In das hintere Ende dieses Chylusmagens münden die Nieren ein, welche stets eine röhrlige Form haben, die im allgemeinen den Drüsenorganen der Insekten überhaupt zukommt. Die sehr dünnen und langen Harngefäße, deren Zahl sehr wechselt, haben entweder blinde Enden oder geben am Ende bogenförmig ineinander über und umgeben meist in vielfachen Windungen und Schlängelungen den Darmkanal. Der gelbliche oder röhrlige Harn, welchen diese Gefäße absondern, hat gewöhnlich eine breiige Consistenz und sammelt sich während des Puppenstadiums in bedeutender Menge in dem hintern Theile des Darms an, wo er dann, von den ausgeschlüpfen Insekten oft in großer Menge entleert, zu Sagen von Blutigen Veranlassung gegeben hat. Die hintere Abtheilung des Darms hat im Anfange stets eine geringere Weite als der Chylusmagen, bläht sich aber dann oft wieder bedeutend auf, so daß man einen engern Krummdarm, einen kloakenförmigen Dickdarm und einen kurzen muskulösen Mastdarm deutlich unterscheiden kann. In dem Dickdarme finden sich stets eigenthümliche durchsichtige Drüsenwülste, die oft eine ungemein große Zahl erreichen und in das Innere der Höhlung vorragen. Sehr häufig zeigt sich an diesem kloakenförmigen Dickdarme noch ein mehr oder minder ausgebildeter Blinddarm, der zuweilen eine ansehnliche Länge erreicht. Der After ist stets an dem letzten Körperringel angebracht, und sehr häufig münden unmittelbar vor ihm in den Mastdarm besondere Drüsenschläuche, Afterdrüsen, die

eine ätzende oder stinkende Flüssigkeit absondern, welche von den Thieren zu ihrer Vertheidigung hervorgespriht wird. Zuweilen finden sich auch solche eine ähnliche Flüssigkeit liefernde Drüsen an andern Stellen des Körpers, wie z. B. bei den Maimärmern (Meloe) an den Gelenken der Beine, oder bei den Wanzen an der Unterfläche der Brust. In eigenthümlicher Beziehung zu dem Verdauungsgefäße und dessen Organen steht dann ferner noch der Fettkörper, eine Masse von meist weißlichen oder gelblichen Fettzellen, die bei den vollkommenen Insekten nur eine geringe Ausdehnung besitzt, bei den Larven aber gewöhnlich alle Zwischenräume der Organe erfüllt und während des Puppenlebens zum Aufbau der Organe verwendet wird.

Alle Insekten besitzen in allen Zuständen ihres Lebens einen eigenthümlichen Kreislauf des Blutes, der durch ein in der Mittellinie gelegenes schlauchförmiges Herz vermittelt wird. Dieses Herz, das man auch unter dem Namen des Rückengefäßes kennt, liegt unmittelbar unter der Haut des Rückens und besteht aus mehreren einzelnen Kammern, die an den Einschnürungsstellen durch klappenartige Vorsprünge der innern Haut getrennt werden, welche dem Blute eine Strömung von hinten nach vorn gegen den Kopf anweisen. Die einzelnen Kammern sind durch dreieckige Muskelbündel an die Hinterleibsringe befestigt und zeigen jederseits in ihrer vordern Hälfte eine Längsspalte, durch welche das Blut von außen nach innen in das Herz eindringen kann. Durch Brust und Kopf setzt sich das Herz mittels einer in der Mittellinie gelegenen Körperader fort, welche plötzlich mit einer oder mehreren offenen Mündungen endigt. Dies ist der ganze Gefäßapparat, welchen die Insekten besitzen. Betrachtet man bei einem solchen Thiere, dessen Rückenhaut durchscheinend genug ist, z. B. bei der Seidenraupe, das Herz in seiner Thätigkeit, so sieht man, daß die Kammern desselben sich wellenartig von hinten nach vorn zusammenziehen und sich bei der Ausdehnung wieder füllen. Das Blut freist in beständigen Ströme durch das Herz und vertheilt sich dann in den Zwischenräumen der Körperorgane, wo sich wandungslose Kanäle finden, in denen es stets nach bestimmten Richtungen läuft. Die ganze Blutmenge sammelt sich dann im Hinterleibe in der Umgebung des Herzens an, das mithin förmlich im Blute schwimmt, und bei der Ausdehnung sich mit dieser Flüssigkeit füllt, die es durch seine Zusammenziehung weiter treibt. Man sieht also, daß der ganze Körper gleichsam ein Reservoir für die Ernährungsflüssigkeit bildet, dessen Inhalt durch eine angebrachte Saugspitze, das Herz, in Thätigkeit versetzt wird. Das Blut selbst ist gewöhnlich vollkommen farblos und enthält nur sehr wenige meist ungefärbte Blutügelchen, sodaß es oft sehr schwer fällt, auch in ganz durchsichtigen Insekten unter dem Mikroskop die Blutströme zu sehen.

Alle Insekten atmen zu jeder Zeit ihres Lebens Luft, und zwar meistens durch besondere Oeffnungen, die man Stigmen (Stigmata) genannt hat und die bei allen vollkommenen Insekten ohne Ausnahme vorkommen. Diese Stigmen sind kleine, rundliche oder längliche Spaltöffnungen, die sich paarweise zu beiden Seiten des Körpers finden und sehr oft durch eine besondere Färbung ihrer Umgebung ausgezeichnet sind. Meist sind sie mit einem besondern Hornringe eingefaßt und können durch eigene Muskeln geöffnet und geschlossen werden. Das Ein- und Auspumpen von Luft geschieht durch Ausdehnung oder Verschiebung der Hinterleibsringe, und man kann namentlich bei solchen Insekten, welche schwer fliegen, deutlich be-

obachten, wie sie sich zu der Erhebung durch Einpumpen von Luft vorbereiten. In der Regel in der Verbindung mit einzelnen Körperringe angebracht, oft so bald unter den Flügeldecken, bald unter der Haut des Körpers aufgesucht werden müssen, richtet sich bei den vollkommenen Insekten nach der Zahl der sichtbaren Körperringe der Kopf und der letzte Hinterleibsring. Nur bei den Larven findet man eine Spur von Stigmen, und an der Brust höchstens nur zwei Paare. Von den Larven legen sich eigene Luftröhren oder Tracheen in die Innere des Körpers nach allen Richtungen, alle Organe mit Ästen und Zweigen versehen, die diese Luftröhren meist, wenn man einem lebenden Insekte unter Wasser unter ihre silberglänzende oder milchweiße Haut sich verliert, sobald Wasser oder andere Flüssigkeiten eingebracht sind und die Tracheen haben. Der Bau dieser Luftröhren ist in der That die größern Stämme sind aus zwei Hälften gefest, zwischen denen ein horniger Faserstoff aufgewunden liegt. Den blasenförmigen Enden, welche an den Luftröhren vieler Insekten fehlen die Spiralfäden und ebenso werden nach und nach in den feinnern Ästen der Röhren, wo zuletzt nur noch eine einfache Membran übrigbleibt. Bei vielen Insekten fästeln sich die Luftröhren mit stets dünneren Zweigen allmählich, indem sie zahlreiche Äste untereinander eingehen. Bei andern dagegen fästeln sie sich oft zu vielfachen Luftblasen, die durch raschen und kräftigen Flug der Thiere oft eine ungemeine Größe erreichen und manchmal einen großen Theil des Hinterleibes füllen. In der Anordnung der Stämme und der zweifachen Modificationen untereinander, welche häufig zu beiden Seiten des Körpers zwei große, weite Stämme hin, in welche die Stigmen herkommenden queren Luftströme eintreten und von welchen aus die Luftröhren zu verschiedenen Organen des Körpers strahlen, unterscheiden sich die aus dem Stigma hervortretenden Äste unmittelbar an die Körperorgane, jede feiliche Verbindungsstämme zueinander. Die Rollen von Blut und Luft verhalten sich bei den Insekten durchaus anders, wie bei athmenden Wirbelthieren. Hier vertheilt sich durch Gefäße an alle Organe des Körpers tritt in einem besondern, beschränkten Luftstrom und wird durch den Blutstrom in alle Theile des Körpers geführt. Bei den Insekten hingegen das Blut frei alle Organe des Körpers durch, wird mittels eigener Gefäße durch die Stigmen hindurch zu den Organen geführt. Bei den Larven leben die Insektenlarven in Wasser, weder in ihrer Zahl reducirt und auf einen Theil hängen angebracht, die aus dem Wasser herausgehoben können, oder sie fehlen auch bei diesem letztern Falle finden sich nach der Zahl der Tracheen, d. h. häufige Verbindungen, festerförmige Anhängen, feiliche Äste, welchen die Tracheen sich verzweigen und die man nimmt an, daß diese Äste, so fern als Kiemen fungiren, als die Enden zweigten Tracheen-Enden Luft aus dem Wasser scheiden. Bei den Libellenlarven findet man eigenthümlich ausgebildete Tracheen in der Darms, in dem durch besondere Klappen

ein beständiger Wasserstrudel unterhalten.

Absonderungsorgane fehlen nicht. Außer den Harngefäßen (Malpighi'sche) sind einzellige Hautdrüsen, Stindrüsen am Rücken, an den Gelenken, die Spinndrüsen der Unterlippe ausmünden, die Giftstachel vieler Weibchen, die Wachs ausströmenden der Bienen u. s. w.

Die Geschlechter sind getrennt und mit einigen Ausnahmen, von denen später die Rede sein wird, getrennt bei Männchen und Weibchen. Bei einigen Insekten leben Geschlechtslose vor, die aber stets nur Weibchen sind, deren Eierstöcke und Fortpflanzungsorgane aus derjenigen Stufe der Entwicklung geblieben sind, welche sie in dem Uterus hatten. Bei den weiblichen Insekten sind stets zwei aus Röhren zusammengesetzte, die mittelst kurzer Gileiter in die Scheide münden. Die Eierstocksröhren zeigen äußerst mannichfaltige Hinsicht ihrer Länge, Zahl und Form, kommen aber insofern in ihrem Baue überein, als sie in ihren äußersten, meist spitz zulaufenden Enden die Eier bilden, die in dem Maße ihres Wachstums gegen die äußere Geschlechtsöffnung hin zunehmen. An der Scheide befinden sich gewöhnlich Anhangsorgane, gewöhnlich in Form von Beuteln, von welchen der eine, die Vagina, bei diesem Acte die männliche Hülse umgibt, während der andere, meist höher gehaltener, die Samenthieren beherbergt, die Befruchtung in diese Samentasche hinüberführt, in welcher sie sich monatelang lebend erhalten, bis sie im Frühjahr, wenn die Weibchen überwinteren und erst im Frühjahr legen, diese Samentasche, die nur selten in Gestalt großer doppelter Spiralaröhren vorkommt. Die Samenthieren erhalten sich in diesen monatelang frisch und lebendig, sodas durch die Befruchtung das Weibchen fähig wird, seines ganzen Lebens befruchtete Eier zu legen. In diesen Taschen finden sich meist vor der Geschlechtsöffnung in mannichfaltiger ausgebildete Drüsen, welche offenbar die Befruchtung, aus denen die äußeren Eischalen entstehen, und die man deshalb mit dem Namen Befruchtungsorgane bezeichnet hat.

Die Geschlechtsorgane bestehen aus einem oder taubigen Hoden, deren Form mannichfaltig ist und die zuletzt in vielfach gewundene Samengänge einmünden, die mit seitlichen Samenblasen besetzt sind. In der Regel wo beide Samenleiter zu einem einzigen zusammenmünden, senken sich meistens in eine oder mehrere, deren Absonderung offenbar die Menge der Samenflüssigkeit zu vermindern, die im Wasser sogleich erstarren und in höchst eigenthümlicher Weise innerhalb der Eierschalen in Fäden, Fibern oder Bündeln gruppieren. In Insekten werden diese Samenthiergruppen in Form von starren Schläuchen eingeschlossen, welche eine ähnliche Rolle spielen, wie die Eierschalen mancher niederen Thiere.

Die Befruchtung ist bei einer großen Zahl von Insekten der einzige Zweck ihrer Existenz im vollsten Zustande. Viele Arten nehmen durchaus während dieses Abschnitts ihres Lebens bei den meisten stirbt das Männchen un-

mittelbar oder kurze Zeit nach der Begattung, und das Weibchen, nachdem es die Eier gelegt hat. Die Befruchtungswerkzeuge selbst aber sind von sehr verschiedener Gestalt. Meist ist der Eingang der Scheide durch Hornleisten von eigenthümlicher Gestalt, deren Form bei jeder Art eine andere ist, klappenartig besetzt, und sehr oft gesellen sich bei den Weibchen zu diesen Klappen noch besondere Hornstücke, die bald eine gerade, bald eine säbelförmig gekrümmte Lege-scheide darstellen, durch welche die Eier tief in die Erde hineingesenkt werden können. Bei vielen Weibchen sind die verschiedenen Hornstücke, welche durch ihr klappenartiges Zusammenlegen diese Befruchtungsbildung, zum Anheften der Eier oder zum Bohren von Löchern gezeichnet, sodas sie eine wahre Lege-säge bilden; bei andern sind die Stücke fein zugespitzt, sodas sie damit verbunden und bei der Verbindung ein Ei durch den Legestachel in das Loch gleiten lassen können; noch bei andern endlich hat dieser Apparat nur seine verbindende Eigenschaft beibehalten und ist ein wahrer Giftstachel geworden, der mit einer besonders Drüse in Verbindung steht. Bei den männlichen Insekten ist die meist röhrenförmige Ruthe oft von sehr sonderbaren Leisten, Klappen und Zangen umstellt, deren eigenthümliche Vorprünge denjenigen der harten Theile an den weiblichen Geschlechtsorganen genau entsprechen und auf diese Weise gewissermaßen die Bürgschaft für die unveränderte Erhaltung der Art bilden. In einzelnen Fällen (bei den Libellen) gibt es besondere eigenthümliche Organe zur Uebersetzung des Samens in die weiblichen Geschlechts-theile.

Die Geschlechtsverschiedenheiten sind bei den Insekten außerordentlich groß, und nur selten wird man beide Geschlechter vollkommen übereinstimmend finden. Die Männchen sind fast immer bedeutend kleiner als die Weibchen, und häufig geflügelt, während die Weibchen flügellos sind. In andern Fällen ist die Zahl der Ringe an den Fühlern oder dem Hinterleibe verschieden. Verschiedene Körperteile haben oft bei den Männchen eigenthümliche Auswüchse, Hörner und Dornen, von denen bei den Weibchen keine Spur zu sehen ist. Hier sind bei den Männchen die Kiefer ungeheuer entwickelt, dort die Fühlhörner durchaus anders gestaltet; bei diesen die Füße mit besondern Haftorganen versehen, oder mit Spizen und Dornen besetzt, die den Weibchen gänzlich abgehen. Die Farben sind bei den Männchen meist weit lebhafter und oft so verschieden vertheilt, das man aus den verschiedenen Geschlechtern sehr häufig verschiedene Arten macht, bis die Beobachtung der Befruchtung das Richtige kennen lehrt. Die Sorge für die Eier und die Nachkommenschaft ist stets den Weibchen allein überlassen. Viele Arten legen die Eier nur einfach dahin, wo sie vor Feinden soviel als möglich geschützt sind und wo die austretenden Larven ihren Lebensunterhalt finden können; andere aber bauen für die zukünftige Larve oft mit großer Anstrengung besondere Zufluchtsorte, und tragen dort den Proviant zu, dessen das junge Thier während der Larvenzeit bedarf. Die Arten, deren Larven schwärmend im Innern anderer Thiere wohnen, wissen oft mit ungemeiner Schlanigkeit und Umsicht die vielfachen Gefahren zu vermeiden, welche ihnen von den durch sie bedrohten Thieren bereitet werden. Bei den höchsten Stufen finden wir eine mütterliche Sorgfalt, welche von keiner andern Klasse übertroffen wird, indem die jungen Larven und Puppen in gemeinschaftlichen Wohnungen erhalten, gefüttert und gepflegt und mit äußerster Hingebung gegen ihre Feinde vertheidigt werden. Diese Sorgfalt geht selbst

so weit, daß einzelne Arten den jungen Larven bei Verfertigung ihrer Puppen helfen und zur rechten Zeit wieder diese Puppen öffnen, um dem ausgebildeten Insekte seine Freiheit zu verschaffen.

Die meisten Insekten legen Eier; nur wenige Schmarogserliegen gebären lebendige Junge (Larven), und bei einer Gruppe derselben, den Pupiparen, verläuft selbst der ganze Larvenzustand im Innern der mütterlichen Organe, sodaß die Jungen als Puppen geboren werden. Die Eier der Insekten haben sehr verschiedene Formen und Farben; doch findet man meistens die Eiform oder Cylinderform vorwiegend. Zuweilen haben diese Eier eigenthümliche Fortsätze, Stiele oder Halsen, welche meistens dazu dienen, sie an irgendeiner Fläche festzuhalten, ihr weiteres Einsinken im Schlamm z. B. zu verhindern. Bei den in Haufen oder Gesellschaften lebenden Arten werden auch meist die Eier schon im Beginn zusammengelegt und durch einen Kitt in bestimmter Art vereinigt. Oft sind mehrfache Hüllen vorhanden, die besonders bei den im Freien ausdauernden Eiern zuweilen eine bedeutende Härte zeigen und namentlich auch die Eier vor dem Einflusse des Frostes auf das kräftigste zu schützen scheinen. Wol an allen Eiern finden sich besondere Öffnungen, Mikroporen, durch welche der Eintritt der Samensäden in das Innere des Eies ermöglicht wird.

Außer der regelmäßigen Fortpflanzung durch befruchtete Eier finden noch, freilich selten, andere Fortpflanzungsarten statt; bei einigen Mäden (*Cecidomyia*, *Heteropeza*, *Miastor*) erzeugen die Larven in einem Keimstode Keime, die sich allmählich zu Larven entwickeln auf Kosten der innern Organe der Mutterlarve, welche zuletzt nur einen hohlen Schlauch darstellt, aus welcher die Tochterlarven ausbrechen, um ebenso neue Generationen zu erzeugen oder sich zu verpuppen. Bei den Blattläusen finden sich im Sommer Weibchen, deren Begattungsorgane verkümmert sind, die aber in ihren Eierstöcken Eier erzeugen, welche ohne Befruchtung sich ausbilden und als lebendige Junge geboren werden. Erst im Herbst erscheinen Männchen und Weibchen, welche sich begatten und Eier erzeugen. Bei den Tannenläusen (*Chermes*) scheint sich hieran noch eine Doppelform der Individuen anzuschließen, schlankere Weibchen im Sommer, didere im Winter, die beide ohne Befruchtung sich fortpflanzen. Bei vielen Insekten bedürfen die Eier der Befruchtung zur Entwidlung nicht (*Parthenogenese*), und bei einigen wirkt dieselbe bestimmend auf das Geschlecht ein, sodaß z. B. bei den Bienen aus den befruchteten Eiern Weibchen und Arbeiterinnen, aus den unbefruchteten Männchen (Drohnen) entstehen.

Bei der Entwidlung des Embryos im Ei, die meistens außerhalb des mütterlichen Körpers stattfindet, bildet sich eine Keimhaut, im Umfange des Eies, in welcher eine begrenzte Abtheilung, der Keimstreifen, umschrieben wird, welche die Anlage des Kopfes und der Bauchfläche darstellt. An den Rändern desselben lassen sich Einkerbungen, die Ursegmente, unterscheiden. Der Keimstreifen wächst immer weiter um den Dotter herum, und während die Ringel sich deutlicher abheben, sieht man in der Mittellinie eine Anhäufung festerer Substanz, welche dem Bauchmark entspricht. Zugleich heben sich nun die Beine, die Fühlhörner, die Augen und die Mundwerkzeuge auf der untern Fläche der Embryonalscheibe deutlicher hervor, und man kann sich nun überzeugen, daß der Dotter der Rückenfläche des werdenden Insekts entspricht, und daß die Embryonalscheibe, von unten nach oben wachsend, den Dotter allmählich umschließt. Der Embryo ist

deshalb anfangs, wo die Dottermasse umrüdungs um dieselbe herumgebogen. Die innern Theile werden auf die beschreibende Weise gebildet und der Embryo aufgehebt, während der Embryo sich ausbildet und nach und nach statt der umgebogenen Lage gerade die entgegengesetzte einnimmt. Die Füße und Kaudergergäbiler, welche anfanglich warzenförmig gleichen, gliedern sich nach und nach in schnürungen und schlagen sich so ein, daß gekrümmten Bauchfläche hart nebenan Das Rückengefäß entsteht erst sehr spät, wo sich die Embryonalscheibe über den schlossen hat. Das junge Thier verläßt wöhnlich mit dem Augenblicke, wo die Dottermasse aufgehebt ist.

Nur bei wenigen Insekten zeigt das geschälpte Wesen schon bis auf wenige beiten Form und Verhältnisse des Thiers; in diesem Falle sind aber Unterschiede nicht größer als diejenigen, zwischen einem neugeborenen Kinde und findet. Das Insekt wächst nun bis zu bestimmten Größe aus, indem es sich verhäutet und mit jeder Häutung eine den Zustand mehr genäherte Form annimmt. Häutungen ist eine Art kritischer Periode, das vorher sich sichtlich unwohl fühlt und standener Häutung mit verdoppeltem Gewöhnlich springt die alte Körperhaut hollen Anstrengungen des Thiers in der Nacken, und das Thier, dessen neue Haut ist, zieht sich allmählich aus dieser Spalte läßt die alte leere Haut zurück, an der die innere Auskleidung des Anfangs der stämme sowie des Schlundes und des hängen sieht. Nach der letzten Häutung das Thier fort und stirbt gewöhnlich kurz dem es den Fortbestand der Art gesichert Insekten, welche diesen Umlauf des stehen auf der untersten Stufe in dieser und werden Insekten ohne Verwandlung (Hemimetabola) genannt.

Eine zweite Gruppe, zu welcher die Orthopteren und Neuropteren gehören, eine größere Verschiedenheit zwischen des aus dem Ei kriechenden Thiers und kommenen Insektes. Indessen bezieht sich Verschiedenheit nicht so sehr auf die allgemeine Körpers, die etwa nur in denselben Gruppen wie bei der vorigen Gruppe, als vielmehr auf die Ausbildung der Flügel und der gliederten Anhang des Körpers. Die kriechenden Thiere haben keine Spur der Beine zeigen oft weniger Ringe an den Füßen, Formen der Füße und ähnliche solche Veränderungen. Man hat diese unvollkommenen Thiere als Larven genannt. Bei den Häutungen und nach Flügelcheiden, die unbeweglich wachsen und aus denen endlich bei der das Thier die ausgebildeten Flügel dem mit Flügelcheiden versehene Entwidlungszeit die Puppen genannt. Das Thier Zeit seines Lebens und bewegt sich sowohl larve wie als Puppe mit derselben Gestalt als vollkommenes Insekt. Man nennt diese Insekten mit unvollkommener Verwandlung (Hemimetabola).

Bei der dritten, größten Gruppe (Metamabola).

dem Wesen, welches das Ei verläßt, das e Insekt wieder zu erkennen. Man unterdiesem Thieren drei verschiedene, scharf abstände, als Larve (larva), Puppe (pupa) etes Insekt oder Bild (imago). Während it beschäftigt sich das Thier einzig mit der; es frist und wächst, indem es sich meistens häutet; als Puppe verharrt es in meistm Zustande, ohne Nahrung zu sich zu s vollkommenes Insekt pflanzt es sich fort und em es für seine Nachkommenschaft gesorgt hat. en haben meistens die Gestalt eines runden; mit mehr oder minder deutlichen Abiele sind durchaus fußlos, andere besitzenurze Füße, welche denen des vollkommenen sprechen, noch andere (sogenannte Raupen) r diesen noch falsche Füße, die an den rpersegmenten stehen und bei der Puppe i verschwinden. Die Körpersubstanz der gewöhnlich weich, verhältnismäßig viel e diejenige des vollkommenen Insekts, und ist mit den mannichfaltigen Anhängen und n versehen. Viele sind durchaus glatt, andere aaren, Stacheln oder Hörnern besetzt, manche liche Anhänge, die beweglich sind und entGehen, oder zum Schwimmen dienen; imle sind es meist Vorstienbüschel, welche die der Bewegungsorgane vermehren. Der Kopf n ist zuweilen, namentlich bei den Zweibenso weich und der Ausdehnung fähig, wie n Körperringe, befestigt hingegen bei den ine hornige Beschaffenheit und trägt bei Mundwerkzeuge, die indessen oft vererscheinen. Im allgemeinen sind KauwerRegel, Saugwerkzeuge die große Ausnahme; denn nicht nur die Larven aller launen, sondern auch diejenigen der Schmetterder meisten Zweiflügler, die als Bildeauen während ihres Larvenzustandes; nur n kopflosen Fliegenlarven und bei einigen rn, die im Larvenzustande schmarozhen, zeigt n weichen Wäzchen umgebene Mundöffnung, ischlich nur zum Schlürfen von Flüssigkeit rscheint. Von den früher beschriebenen Mundakommen die Kiefer fast durchgängig in Gestalt vor, wie bei dem vollkommenen Innamentlich unterscheidet man sehr leicht die r pflanzenfressenden Larven durch ihre breite nd ihre innern Fäbnelungen von den scharfen rn der Fleischfresser. Bei einigen Larven, r letzten Gruppe gehören, sind die Kiefer bis Spitze durchbohrt und keine eigentliche Mundvorhanden. Die Larven schlagen die halenKiefer in den Leib ihrer Opfer und saugen ch die Kieferkanäle die Körperflüssigkeit dera. Die Oberlippe fehlt öfter, hat aber sonstie, die sie bei dem vollendeten Insekt zeigt. aden sind gewöhnlich vorhanden, meist aber isförmig und ohne Lappen; die Unterlippe ist e bei denjenigen Larven ausgebildet, welche Puppenhülle spinnen, da sie in den meisten die Deffnung der Spinndrüsen trägt. Die omol der Kinnladen als der Lippe sind genur sehr klein, kegelförmig und zweigliederer scheinen weit häufiger zu fehlen und stehen ich dem Munde weit näher als bei dem ausn Insekt; sie haben meist nur wenige Glieder allen Fällen weniger als bei dem Bilde, und bei vielen Larven willkürlich aus- und einwe rden, was keinem ausgebildeten Insekt mög-

lich ist. Keine Larve besitzt zusammenge setzte Augen; viele sind gänzlich blind und die meisten haben nur wenige einfache Augen, welche gebäuft zu beiden Seiten des Kopfes stehen und aus denen sich später die zusammenge setzten Augen des Bildes entwickeln.

Fast alle Larven, besonders aber die pflanzenfressenden, besitzen einen sehr großen und weiten Darmkanal, welcher fast die ganze Höhle des Körpers ausfüllt. Der Chylusmagen ist davon der größte Theil. Bei den Fleischfressern ist der Darmkanal im ganzen demjenigen der erwachsenen Insekten ähnlich, und wird es noch mehr während des Puppenlebens, wo er sich allmählich der bei dem Bilde vorkommenden Form annähert. Die Speicheldrüsen und Harngefäße sind bei den Larven meistens in derselben Weise wie bei den Bildern angeordnet; außerdem aber zeichnen sich die Larven, welche sich eine Puppenhülle spinnen, oder sich nur mit einigen Fäden befestigen, durch eigenthümliche Spinndrüsen aus, welche aus zwei langen gewundenen Schläuchen bestehen, die durch ein feines Löfflein in der Unterlippe ausmünden und besonders gegen das Ende des Larvenlebens in bedeutendem Grade entwickelt sind. Der flebrige Stoff, welchen diese Drüsen absondern, erhärtet an der Luft sogleich zu einem feinen Seidenfaden, den die Larve durch Drehungen und Wendungen des Kopfes so zu verweben weiß, daß das Gewebe die Puppe mehr oder minder einhüllt. Jedes Larvengespinnst besteht demnach nur aus einem einzigen Seidenfaden, der abgesponnen werden kann, aber zu industriellen Zwecken viel zu fein ist. Außer diesen beiden Hauptorganen der Larven, dem Darmkanale und den Spinndrüsen, findet man noch das Nidengefäß meist in höherm Grade entwickelt als bei dem Bilde, und das langgestreckte Bauchmark, aus einzelnen distanzirten Knoten von fast gleicher Größe zusammengesetzt. Die Geschlechtsorgane sind in höchst rudimentärem Zustande vorhanden und bestehen hauptsächlich nur aus den innern, leimbereitenden Organen, die noch außerordentlich klein und schwer aufzufinden sind. Die meiste Verschiedenheit von dem Bilde zeigen die Athemorgane vieler Larven, welche im Wasser leben. Die an freier Luft lebenden Larven haben stets Stigmen und einfach verzweigte Luftröhren ohne blasenförmige Erweiterungen; zuweilen sind die Stigmen unter Falten verbedt, in andern Fällen mit einer siebartig durchlöcherten Hornplatte verschlossen; bei vielen im Wasser oder im Schlamm lebenden Larven ist der Hinterleib zu einer Athemröhre ausgezogen, welche von den Larven an die Oberfläche des Wassers gebracht wird, sodas sie von dort her unmittelbar Luft schöpfen. In dem Puppenzustande werden diese am Hinterleibe angebrachten Athemröhren meist in die Radengegend verfest. Die mit solchen Athemröhren versehenen Larven und Puppen müssen begreiflicherweise die Deffnungen derselben stets an die Oberfläche bringen, um Luft schöpfen zu können, während dies bei den Larven nicht nöthig ist, welche sogenannte Tracheentriemen besitzen. Es sind diese Organe zarte Hautfortsätze in Form von Büschelhaaren, Federn oder Blättchen, welche zu beiden Seiten des Leibes stehen, und in denen unter der zarten Hautbedeckung sich sehr dünne, geschlossene Luftröhren vielfach verzweigen. Bei andern Larven ist sogar die ganze, dünne Hautoberfläche gleichsam der Repräsentant dieser Riementracheen, während besondere Anhänge dieser Art fehlen. Offenbar geht die Athmung mittels dieser nach außen geschlossenen Luftröhren in der Weise vor sich, daß die Luft durch die dünnen Hautüberzüge hindurch aus dem Wasser abgescieden wird und nun in den Luftröhren circulirt.

Bei einigen Larven sind diese Tracheentriemen sogar in dem weiten Mastdarm verstreut, der durch besondere Klappen befähigt ist, abwechselnd Wasser einzunehmen und wieder von sich zu geben.

Gegen das Ende des Larvenlebens, das bei vielen Arten nur wenige Tage oder Wochen, bei andern aber viele Jahre dauert — wie denn namentlich die im Holz und in der Erde lebenden Larven viel länger leben als diejenigen, die sich in faulenden Stoffen aufhalten —, bereitet die Larve ihre Umwandlung zur Puppe vor. Sie frisst nicht mehr, entleert den Darmkanal und sucht die zur Verpuppung geeignete Stelle auf. Die einen spinnen sich eine Hülle, die andern bohren einfach Löcher in die Erde oder verbergen sich in Mulm und unter faulenden Stoffen; viele bleiben noch eine Zeit lang in ihrer Hülle, die sie als Larve befehen, bei andern springt die Larvenhaut unmittelbar auf, und die härtere Puppe tritt hervor. Vielen Puppen dient die eigene starre Larvenhaut als Hülle. Die Form der Puppe selbst ist sehr verschieden und ebenso ihre Beziehung zu dem künftigen Insekte. Bei den meisten Zweiflüglern findet man die sogenannten Tönnchenpuppen mit harter Bedeckung in Form eines Fasses oder eines Schiffschens und ohne die mindeste Beziehung zu der Gestalt des Bildes. Der Körper des Insekts, welcher sich in dieser Tonne ausbildet, erscheint meist ungemein zusammengepreßt, sodas die ausgetrocknete Fliege kaum zur kleinen Puppe zu gehören scheint und sichtlich nach dem Auskriechen durch Einpumpen von Luft anschwillt. Bei andern erscheint die Puppe hart, edig, aus hornigen Ringeln zusammengesetzt, gewöhnlich mit unbedeutlicher Sichtbarkeit der Füße und Flügel. Bei den am höchsten stehenden Insekten endlich sieht man unter der zarten Puppenhaut alle Theile des Bildes vollkommen ausgeprägt, sodas das Auskriechen des vollkommenen Insekts gleichsam nur eine Entfaltung der in der Puppe zusammengelegten Organe darstellt. Während des Puppenlebens, dessen Dauer verschieden ist, aber doch wol selten die eines Jahres übersteigt, bilden sich auf Kosten des Fettkörpers der Larven insbesondere die Geschlechtstheile aus, sodas die meisten Bilder fast unmittelbar nach ihrem Auskriechen befruchtungsfähig sind. Die früher gestreckte Ganglienlinie des Bauchmarks verläuft sich bei denjenigen Gattungen, welche verschmolzene Knoten besitzen, und der Darmkanal sowie die Mundwerkzeuge bilden sich aus der Larvenform zu derjenigen des Bildes um. Dieser erscheint endlich, indem es die Puppenhülle sprengt, in seiner definitiven Gestalt, anfangs mit weichen, verkrüppelten Flügeln, welche durch Eintritt von Blut und Luft sich strecken und erhärten.

Die Lebensweise der Insekten und ihrer Larven ist so mannichfaltig, das keine allgemeine Schilderung davon gegeben werden kann. Es gibt fast keinen Stoff, von dem sich nicht Insekten nähren, keinen Ort, wo nicht welche wohnen. Direct nützlich sind dem Menschen nur höchst wenige, Heuschrecken und holzbohrende Käferlarven als Nahrung, Bienen zur Erzeugung von Wachs und Honig, und Seidenwürmer für Bekleidungsstoff; indirect sind einige fleischfressende Insekten nützlich (Lausläser, Ameisenlöwen, Blattlausfresser), indem sie schädliche Feinde vertilgen. Die größte Zahl der Larven besonders ist dem Menschen schädlich durch Vertilgung ihm werthvoller Gegenstände, Nahrungsmittel, Kleider, Holz, kurz alles, was benagt werden kann, oder auch als Schmarotzer auf seinem Leibe. Die geistigen Eigenschaften vieler Insekten stehen sehr hoch, und aus den Handlungen vieler läßt sich mit völliger Bestimm-

heit nachweisen, das sie mit Bewußtsein thätigen Schlüsse ziehen und sich richten.

Wir nehmen folgende Ordnungen an:

Geradflügler (Orthoptera). Raupenflügel der Länge nach gefaltet.

Ursflügler (Archiptera). Raupenflügel der Länge nach gefaltet.

Unvollkommene Verwandlung; gestreckt; Kiemen tragende Larven.

Neßflügler (Neuroptera). Raupenflügel der Länge nach gefaltet.

vollkommene Verwandlung; gestreckt.

Flügel der Länge nach gefaltet.

Jägerflügler (Strepsiptera). Vorderflügel verkrüppelt.

Käfer (Coleoptera). Raupenflügel der Länge nach gefaltet.

Unvollkommene Verwandlung. Vorderflügel der Länge nach gefaltet.

Gaufferflügler oder Immen (Hymenoptera). Raupenflügel der Länge nach gefaltet.

Mundtheile; vollkommen.

Schmetterlinge (Lepidoptera). Raupenflügel der Länge nach gefaltet.

Mundtheile; vollkommen.

farbig beschuppte Flügel.

Zweiflügler (Diptera). Saugende vollkommen.

unvollkommene Verwandlung; gestreckt.

Halbflügler (Hemiptera). Saugende unvollkommene Verwandlung; gestreckt.

unvollkommene Verwandlung; gestreckt.

Ordnung der Geradflügler (Orthoptera)

Insekten mit laubenden Paariger Unterlippe und unpaariger Oberlippe. Vorderflügel der Länge nach gefaltet. Hinterflügel nebenerig und in der Länge nach gefaltet. Prothorax festlich. Hinterleib festlich, nie zu

Gruppe der Geselligen (Socialia) unsere Ameisen und Bienen, in denen die von verschiedenen gestalteten Individuen

gelebt sind. Familie der Termiten oder weißen (Termitida). (Zaf. 25, Fig. 1—8: Termiten von Bordeaux. Fig. 1 Arbeiter. Fig. 3 Larve im zweiten Stadium, erster Form, Fig. 5 Nymphe zweiter Form, Fig. 7 Nymphe dritter Form, Fig. 8 große trachtige Königin.) Bekannte Länder, die in Gesellschaften ähnlich den Ameisen leben, deren Lebensart aber noch nicht so genau ermittelt ist, sind die jungfräulichen Insekten, welche geflügelt sind, runden Kopf mit vorstehenden Augen, kurzen, röhrenartigen Fühlern und mit einer vier-spaltigen, bis auf den Mund Lippe. Die Flügel sind äußerst zart, schwachen Längsadern durchzogen, sehr dünn und fallen bei beiden Seiten ab. Die Larven sind viergliederig. Die Individuen haben einen länglichen Leib, die jungfräulichen Weibchen. Nach der Schwilt der Leib der letztern umhüllt und bildet endlich einen ungeheuren Haufen von Eiern nach und nach geflügelten Männchen und Weibchen. Die Larven und Nympfen, zwei Formen, eine kleine; sie verlassen zu gewissen Zeiten den Stod, und begatten sich außen; die Weibchen werden zurückgebracht, und die Wohnung nur ein solches Weibchen

Zelle, während die Männchen zu Grunde. Außerdem finden sich in den Wohnungen ausende von Individuen, deren Körpergestalt der Männchen (ohne Flügel) gleicht und vers zum Arbeiten taugen. Diese Arbeiter: einen runden Kopf mit deutlichen Augen und stehenden Kiefern. Außer diesen die Larven phen der zwei Geschlechtsformen. Endlich: Art von Individuen, von denen man noch weiß, ob es Geschlechtslose oder Larven: einen großen cylindrischen Kopf ohne nit spitzer Schnauze und langen, scharfen, euzten Paltenkiefen. Sie sind weit weniger als die Arbeiter, deren Thätigkeit sie zu be: scheinen. Sie vertheidigen besonders die, weshalb man sie auch Soldaten genannt werden sich mit muthender Energie fest, sodas zerstückeln kann, ohne das sie losließen.

ermitten sind weit kleiner als unsere Ameisen, zahlreicher in ihren Wohnungen. Sie ar: ständig unter der Erde, oder bauen sich dunkle die von den Wohnungen aus nach den Orten tigkeit führen. Sie nagen alles an, besonders ene Pflanzenstoffe, Holz u. s. w., und zerstören von innen heraus, sodas man erst beim Zu: rechnen der vollständig ausgehöhlten Stämme, . dgl. bemerkt, das diese schädlichen Rager existirt haben. Ihre Nester und Wohnungen: meist von gelauter Erde, die schnell erhärtet. fden sie kegelförmige Erhöhungen, die oft che erreichen. Zuweilen werden die Nester Baumstämmen angelegt, wo dann bedeckte G: rde führen. Im Innern dieser ungeheuern det man eine große halbrunde Zelle, die von ruchteten Weibchen bewohnt wird und deren o eng sind, das das Weibchen sie nicht ver: un. Es wird dort von den Arbeitern ge: und die von ihm gelegten Eier sogleich in be: Zellen geschafft, wo sie von den Arbeitern werden. Die Zellen für die Eier und jungen bestehen aus gekautem und zusammengeliebtem Im Umkreis sind die Wohnzellen für Arbeiter: daten, und von hier aus gehen die Galerien zen, anfangs schief abwärts und oft von einem rchmesser nach allen Seiten hin, bis sie in Entfernung an der Oberfläche vertheilt aus: Die Zerniten sammeln ebenso wenig wie die Vorräthe ein. In Nothelle eingeschleppt, hat t eine Art eingeheims, bei welcher ebenfalls rnen von Männchen und Weibchen vorkommen, im Mai, größere im Herbst.

pe der eigentlichen Geradflügler (Ulonata). n der Kinnlade. Lederartige Vorderflügel.

Läufer (Cursoria).

Schaben oder Katerlaten (Blattida) haben abgeplatteten, runden oder linsenförmigen und einen kleinen herzförmigen Kopf, der senk: ter der Vorderbrust steht und meist ganz von: et wird. Fühler sehr lang fadenförmig; Augen Nebenaugen zwei, kaum bemerkbar. Kiefer sehr breit, mit vier bis sechs Zähnen am Innen: Kinnladen behaart, Helm oval; Vudentaster eberig; Unterlippe ganz gespalten, Lippentaster eberig, Brust schildförmig, fast dreieckig, Vorder: sehr breit, dünn, mit dünnerm Innenrande; lügel groß, dreieckig; beide meist sehr verschieden den Geschlechtern. Eine Gattung (Polystotera) n flügellos; bei andern (Heterogamia) haben

nur die Männchen Flügel. Bei den eigentlichen Schaben (Blatta; Periplaneta) sind beide Geschlechter geflügelt. Füße — Schreitfüße — alle gleich; Tarsen fünfgliederig, mit zwei Krallen und Fußballen dazwischen. Am Hinterleibe seitlich gegliederte, stachelartige Anhänge. Unangenehme, nächtliche Thiere von schwärzlicher Farbe, die sehr schnell laufen, das Licht fliehen, äußerst ge: fräßig sind und sich von trockenen Pflanzentoffen, be: sonders aber von allen Arten trockener Nahrungs: vorräthe für Menschen ernähren. Sie suchen deshalb vorzugsweise Häuser und warme dunkle Schlupfwinkel auf. Einige Arten haben sich über die ganze Erde ver: breitet. Zu diesen gehört unsere Küchenschabe, Blatta orientalis (Zaf. 25, Fig. 9, das Männchen). Die Eier werden noch im Leibe der Mutter zu vierzig und mehr von einem besonders lederartigen Cylindrer eingeschlossen und in dieser Hülle gelegt.

Schreiter (Gressoria).

Die Familie der Gespenstschreden (Phasmida). Thiere mit oft langgestrecktem, stabförmigem Leibe, von seltsam sparrigem, ungelentem Aussehen, meist von be: deutender Größe. Kopf eirund, nach vorn gerichtet; Augen klein aber stark vorstehend, kugelig; Neben: augen meist undeutlich. Oberlippe groß, tief aus: geschnitten; Kiefer klein, gezähnt; Unterlippe vier: theilig, bis auf den Grund gespalten; Lippentaster gro: dreigliederig; Kinnladentaster fünfgliederig. Fühler fadenförmig, stets kürzer als der Leib. Flügel fehlen oft gänzlich; obere fast stets sehr kurz, sodas die Unter: flügel noch immer ein oberes lederartiges Deckfeld haben. Beine meist lang und dünn, alle zum Gehen eingerichtet; die hintern Schenkel sind nicht wider als die vordern, oft aber alle mit blattartigen Lappen und Leisten verziert. Die flügellosen Larven zeigen meist diese Anhänge und Stacheln weit stärker ent: wickelt. Tarsen fünfgliederig. Träge Insekten der tropischen Gegenden, die sich in Gefahr steif machen, nur von Pflanzen leben und, wie das Wandelnde Blatt (Phyllium siccifolium, Taf. 25, Fig. 11), täuschend in der Ruhe dürrten Blättern oder Stäbchen Holz ähnlich sehen.

Fangheuschreden (Mantida). Körper langgestreckt; Kopf klein, senkrecht gestellt; drei deutliche Nebenaugen; Augen sehr vorstehend; Fühler meist fadenförmig oder selbst doppelt gekämmt. Kiefer klein, aber sehr stark und vielfach gezähnt. Unterlippe vierlappig. Der merkwürdigste Theil des Körpers ist die Vorderbrust, die meist sehr lang, dünn, dachförmig ist und halb aufgerichtet getragen wird, indem an ihrem vordern Theile die Greiffüße sitzen. Flügel meist groß, den Hinterleib ganz bedeckend. Füße sehr verschieden ge: staltet; das erste Paar ist sehr groß, die Hüfte sehr lang; der Schenkel lang, dünn, hoch; an seiner hintern Seite mit einem Falze versehen, an dem Stacheln sitzen und in welchen die ebenfalls gezähnelte und ge: stachelte Schiene wie eine Taschenuesserklinge eingeklappt werden kann. Diese Füße werden beim Gehen stets er: hoben und eingeschlagen getragen, sodas man glaubte, die Insekten gingen in betender Stellung einher. Sie leben aber nur vom Raube, beschleichen ihre Beute oder verfolgen sie im Fluge und fangen sie zwischen den Scheren der Greiffüße, worin sie auch das Thier beim Fressen halten. Die Fangheuschreden sind sehr gefräßig, zornig, greifen sogar kleine Eidechsen und ähnliche Thiere sowie einander selbst mit äußerster Wuth an und sind besonders ausgezeichnet durch ihren beweglichen Kopf, den sie beständig nach allen Rich: tungen hin drehen, um nach Beute zu spähen. Meist in südlichen Gegenden, nur eine Art, das Weibchen, in

Gottesanbeterin (*Mantis religiosa*, Taf. 25, Fig. 10), geht nördlich in Deutschland bis zur Mainlinie.

Springer (*Saltatoria*). Die Schenkel der hinteren, langen Sprungbeine verdickt.

Familie der Grabschreden oder Grillen (*Gryllida*). Die Fühler sind sehr lang, fein, borstenförmig, in Höhlen eingelenkt; das mittlere Nebenauge verschwommen, die beiden seitlichen deutlich; die Vorderflügel liegen in der Ruhe horizontal auf dem Hinterleib auf und sind weit kürzer als die Flügel, welche meist breit aber ungefärbt sind und riemenförmig oder in Spiralförmig aufgerollt auf dem Leibe liegen. Den Ameisenheimschen (*Myrmecophila*) fehlen die Flügel durchaus. Die Füße sind sehr verschieden gestaltet, obgleich stets mit dreigliedrigen Tarsen versehen. Bei den einen sind die Vorderfüße gewöhnlich, bei den andern sind sie außerordentlich verbreitert, kurz, dick, schief nach außen gestellt und zu mächtigen Grabwerkzeugen umgestaltet; bei einigen sind die Hinterfüße außerordentlich lang und unübertreffliche Springwerkzeuge (*Tridactylus*), bei andern schwächer. Die Männchen haben auf der Rückseite der Flügeldecken vorstehende unregelmäßige Rippen, welche sie heftig aneinanderreiben, wodurch das laute Geschreul der Thiere entsteht. Alle diese Schreden nähren sich von Pflanzen und leben in Erdhöhlen, Rigen und Spalten. Die Maulwurfsgrille (*Gryllotalpa*, Werra, Niesdurm; Taf. 25, Fig. 13) gehört hierher. Das Weibchen legt seine Eier im Juni $\frac{1}{2}$ Fuß tief unter die Erde in Wiesen; die Larven, die kleinen Ameisen gleichen, bleiben anfangs zusammen und zeigen ihre Gegenwart durch runderliche, gelbe Flecken an, wo sie die Graswurzeln zerfressen haben; sie überwintern zerstreut und vollenden ihre Entwicklung im Mai des nächsten Jahres. Die Heimchen (*Gryllus*) im Felde und in Häusern (*Acheta domestica*, Fig. 12), die Ameisenheimschen (*Myrmecophila*) in Ameisenhaufen.

Die Laubschreden, Heupferde (*Locustida*), unterscheiden sich von den Grillen durch einen weit längeren Körper, durch ihre sehr feinen und langen Fühlhörner, durch die langen Flügeldecken, welche nicht horizontal, sondern dachförmig in der Ruhe liegen und die Unterflügel fast stets gänzlich decken, sowie durch die viergliedrigen Tarsen, die mit breiten, herzförmigen doppelten Fußballen versehen sind. Beide Geschlechter sind gleich groß; die Männchen haben in dem aufliegenden Theile der rechten Flügeldecke einen runderlichen durchsichtigen Spiegel, von einem ringartigen erhabenen Nerven umgeben und im linken Flügel, der meist auf dem rechten liegt, an der entsprechenden Stelle stark vorspringende Rippen. Beide Theile werden mit großer Schnelligkeit aufeinandergerieben und erzeugen so das Singen. Die Weibchen haben einen langen, meist gekrümmten Legefühler. In Wäldern und Gebüsch, auf trockenen Wiesen; springen weit besser als die vorigen; brauchen die Flügel meist nur als Fallschirme; fressen Laub und Gräser, werden aber selten durch ihre Zahl schädlich.

Die Schnurrschreden, Feldheuschreden (*Acridida*). Körper kürzer, gedrängter; Fühler kurz, stets kürzer als der Körper. Die Punktaugen sind meist sehr deutlich; die Stirn dreieckig, oft zwischen den Augen spitz vorstehend. Das Gebörgan, welches bei den beiden vorigen Unterfamilien in den Schienen der Vorderbeine liegt, findet sich hier am ersten Bauchringe dicht über den Hüften.

Die Legefühler des Weibchens besteht nicht aus seitlichen, sondern zwei obern und zwei untern Stücken. Die Tarsen sind dreigliedrig; die Sprungbeine meist

sehr stark; die Flügel groß, mächtig, dunkel gefärbt; die Stimme wird dadurch hervorgebracht, daß die Männchen mit den rauen Hinterflügeldecken die Flügeldecken reiben. Die Weibchen legen gern und leicht und vereinigen sich oft zu großen Haufen. Zu ihnen gehört die Wanderheuschrecke (*Locusta migratoria*, Taf. 25, Fig. 15) der südlichen Länder. Diese Heere wolkenartig heranziehen und verursachen unsägliche Gefährlichkeit und zahllose Menschen- und Thier-Schäden anrichten.

Gruppe der Hautflügler (*Dermatoptera*). Flügel doppelt eingeschlagen.

Familie der Ohrwürmer (*Forficulidae*). Der kleine Ohrwurm, *Forficula auricularia* (Taf. 25, Fig. 16). Der Körper ist langgestreckt, schmal, ohne Leib nur im Anfange von den kurzen Hinterflügeldecken. Der Kopf rundlich oder dreieckig; die Fühler fadenförmig, aus 12 bis 40 Gliedern bestehend. Die Augen klein, kreisrund, die Kiefer stark gebogen. Der schief nach vorn gerichtete Mund ist mit einer runden Oberlippe, dreieckig, innen mit zwei Zahenzähnen besetzt. Die Unterlippe ist mit zwei zahnige Kinnlaben mit schmalen Gelenken. Die Flügeldecken sind viergliedrig, deren erste beide Glieder sind und eine bis zum Grunde gespalten. Die Unterflügel sind dreigliedrig. Die Flügeldecken sind kurz, lederartig; die Unterflügel bestehen aus schmalen, lederartigen Stücken, etwas linear. Die Flügeldecken, an welchem ein großes, halbkugelförmiges, von durchsichtiger Haut gebildetes Stück ist. Dieses häutige Flügelstück legt sich in der Ruhe zusammen, und zwar stoßen die Gelenke an der Basis der Flügeldecken zusammen, so daß alle vier Flügel ganz der bei den Monaten gewöhnlichen. Der gefaltete Flügel knickt sich aber noch ein in der Mitte ein, wie dies bei den Käfern und der so eingeknickte Flügel wird nur aus einem Stück des Unterflügels geschoben, so daß der Flügel in der Ruhe ein dreifach zusammengeklapptes Padet bildet, das den größten Theil des Körpers freiläßt und ganz unter der Flügeldecke liegt. Die Beine sind schwach, die Tarsen dreigliedrig, das dritte Glied mit zwei Krallen, zuweilen auch mit drei Krallen versehen. Der Hinterleib der Weibchen ist neun gliedrig, der des Männchens sieben. Die Weibchen haben zwei rudimentäre Ringe und ist am Ende mit einem gebogenen Zange bewaffnet, die beim Paarung länger und gezähnt ist.

Die Ohrwürmer sind sehr unschädliche Thiere. Sie suchen gern dunkle Schlupfwinkel aufsuchen, sich von süßen Pflanzensäften nähren und erst abends hervorkommen. Die Mutter schützt mit ihrem Leibe die Eier als auch die Larven, die den Weibchen die fehlenden Flügel sehr ähnlich sehen.

Gruppe der Nager (*Corrodentia*). Die Flügelpaare gleichartig, mit wenigen Adern, meistens faltbar.

Die Bücherläuse (*Psocida*), Holzbohrer (*Lineatus*, Taf. 25, Fig. 17) haben einen breiten, vorquellenden Augen, borstenförmige, kurze Fühler. Die Flügel sind im Dreieck stehende Nebenaugen. Die Flügel sind sehr groß, häutig, durchsichtig, mit netzartigen Adern durchzogen, oder fehlen ganz. Der Hinterleib ist kurz; Füße dünn, lang; Tarsen nur zweigliedrig. Die Kiefer sind schwach, die Kiefer mit zwei zahnigen Kinnlabenpalpen dick, cylindrisch, fadenförmig. Die Lippen sind sehr dünn. Kleine, weiche Thiere, die an dunkeln Orten leben; unter

ern und Sammlungen werden besonders häufig gefunden. In dieser Familie stehen sehr nahe die Embiida), vereinzelt lebende südliche Insektenenden Flügel, die auf keinem Stummel eichswollenen Füßen, dreigliedrigen Tarsen respaltiger Unterlippe.

ende Gruppen von zweifelhaftem Charakter.

Die Familie der Blasenfüße (Physopoda) besteht, höchstens eine Linie langen Insekten, die in Lumen, Blättern, Baumrinden leben, schnell herumlaufen und ziemlich behend springen, den umgeschlagenen Hinterleib in ähnlicher die Boburen ihre Springgabel als Schnell. Der Leib ist lang, schmal, flach; der Kopf gestielt, der Mund nach unten gerichtet; achtegliedrig, fadenförmig; hinter ihnen im Dreieck gestellte Nebenaugen; die Augen vorragend. Mundtheile im ganzen einen Rüssel bildend; Oberlippe dreieckig; Kieferig; Kinnladen klein, an die große Unterwachsen; Lippen- und Labentaster zweifig. Flügel schmal, lanzettförmig, am Rande langen Haaren besetzt; Vorder- und Hinter gleich, durchsichtig, nur mit parallelen. Die Beine kurz, die Tarsen nur zweigliedrig. Die Unterlippe mit einem runden Saugnapf versehen. Spur von Klauen. Sie nagen besonders auf der Pflanze und Blumenblätter ab. Die Art, die sehr vergrößert ist (der Geblasenfuß, *Thrips cerealeum*, Taf. 25, ut als Larve und vollkommenes Insekt dem Schaden.

der Springschwänze (Thysanura). Flügel mitrostförmigen, oft metallglänzenden Schuppen n besetzt, einfache, zu Gruppen zusammenge, mit Borsten oder Springgabeln am Körpers.

Die Familie der Gabelspringer (Podurida) ver: Anzahl kleiner, meist schlanker, flügelloser die man an feuchten, schattigen Orten, auf r und selbst auf Schnee und Eis in großen Massen findet. Der Kopf ist stets deutlich hergerundet, dreieckig oder etwas länglich und den, borstenförmigen, kurzen, meist vier: Fühlern versehen, hinter denen auf vor: Wülsten jederseits sechs bis acht einfache einer Gruppe vereinigt stehen. Die Mund: werden von zwei großen Lippen gebildet, die Mundöffnung gänzlich schließen und die 1 Kauwerkzeuge bedecken; diese bestehen aus 2, gezähnelten Kiefern und zwei halbig ge: ebenfallig gezähnelten Kinnladen, mittels 3 Thiere ihre Nahrung, zarte Pflänzchen und Pflanzenstoffe, zerkleinern; Taster fehlen durch: ganze Körper ist mit einzeln stehenden nd sehr feinen, oft metallglänzenden Schupp: kt, die sich sehr leicht abstreifen. Die Füße 4 schlank und behaart. Außer ihnen besitzen 5 meisten Gabelspringer ein höchst eigenthüm: 6 bewegungsorgan, in Gestalt zweier gabelförmig 7 Borsten, die an dem hintersten Gliede des 8 aus einem besondern Gelenkknopfe stehen. 9 ch wird diese Springgabel beim Gehen wag: 0 hinten gestreckt; sobald aber das Thier 1 will, so schlägt es die Gabel unter den 2 nd indem es sie plötzlich wie eine Feder los: 3 läßt, schleudert sich das Thierchen oft fußweit

fort. Außer dieser Springgabel, die nur sehr wenigen Arten fehlt, besitzen manche dieser Insekten noch ein eigenthümliches Haftorgan, das in Form eines klebrigen Knopfes oder zweier langer, beweglicher Schläuche aus der Unterfläche des Hinterleibes hervortritt und zum Anhaften an glatten Flächen dient.

Die abgebildete, stark vergrößerte Art (der Gletscherfloh, *Desoria glacialis*, Taf. 25, Fig. 23) findet sich auf den Gletschern unter Steinen und auf den Wasserlöchern.

Den vorigen nahe verwandt ist die Familie der Zucker: gäste (Zuckergast, *Lepisma saccharina*, Taf. 25, Fig. 22), kleine, meistens silberglänzende Thierchen von spinselförmiger Gestalt, deren Körper überall dicht mit feinen mitrostförmigen Schuppen bedeckt ist und stets aus vierzehn deutlichen Ringeln besteht. Der Kopf ist meist klein, tief unter dem ersten Halsringe verborgen, die Brustringe in der Gestalt nicht von den Ringen des Hinterleibes verschieden. Die Fühler sind lang, borstenförmig, aus vielen Gliedern zusammengesetzt; die einfachen Augen in bedeutender Zahl auf zwei seitlichen Häufen vereinigt. Die Mundwerkzeuge bestehen aus zwei kleinen hakenförmigen Kiefern, kleinen dünnen Kinnladen, die aber sehr lange, vielgliedrige, wie ein zweites Paar Fühlhörner vor dem Kopfe vorstehende Taster tragen, und einer Unterlippe mit kurzen viergliedrigen Tastern. Am Hinterleibe der Thiere befinden sich vielfach geringelte lange Borsten, mittels deren eine Gattung in ähnlicher Weise wie die vorige Familie springt. Die Thiere finden sich unter dem Moose, auf Steinen und auch in den Häusern, schweifen aber besonders bei Nacht umher.

Die Familie der Pelzfresser (Mallophaga), welche auf Säugethieren und Vögeln schmachtet, durchaus flügellos und im äußern Ansehen den Läusen ähnlich ist, zeigt einen deutlich abgehefteten Kopf von dreieckiger oder halbrunder Gestalt, der oft mit scharfen Spizen besetzt ist. Die Fühler sind fünfgliedrig, die Mundwerkzeuge zum Rauen eingerichtet. Sie haben nämlich zwei deutliche, hakenförmige Kiefer, welche von oben und unten durch zwei breite Lippen bedeckt sind. Bei einigen Gattungen sind außerdem noch dünne, schwache Kinnladen mit kurzen, zweigliedrigen Tastern vorhanden; andern Gattungen fehlen nur die Taster, oder auch die Kinnladen selbst. Die Füße sind meist schlank, gewöhnlich mit kurzen, einfachen Strahlen bewaffnet. Die Thierchen laufen sehr schnell zwischen den Federn und Haaren ihrer Wobnthiere umher; sie nähren sich niemals von Blut, sondern fressen den feinsten Flaum und die jungen sprossenden Haare ab; nach dem Tode des Vogels sammeln sie sich meistens an den nackten Körperstellen um Schnabel und Augen an und verlassen den Leichnam beim Erkalten. Man hat besonders auf den Vögeln eine ungemein große Anzahl von Gattungen und Arten dieser Familie gefunden.

Die abgebildete Art (Federlaus, *Philoaterus falcicornis*, Taf. 25, Fig. 24) schmachtet auf dem Pfau.

Ordnung der Urflügler (Archiptera).

Insekten mit laudenden Mundtheilen, gespaltenen Unterlippe, frei beweglichem Prothorax und vier gleichmäßig ausgebildeten, meist reich gegitterten Flügeln. Die Larven, den ausgebildeten Insekten sehr unähnlich, leben alle im Wasser und besitzen entweder äußere oder innere, im Mastdarm angebrachte Tracheentriemen. Sie verwandeln sich in das vollkommene Insekt, ohne einen ruhenden Puppenzustand durchzumachen.

Diese Ordnung bildet gewissermaßen ein Verbindungs- glied zwischen den Gerad- und Netzflüglern, und mögen die Insekten, welche ihr angehören, dem Urzustande vielleicht am nächsten stehen, sodas sie eine Art Stamm- gruppe bilden.

Die Florfliegen (*Pelida*) haben einen großen, breiten Kopf, vorstehende Augen, lange borstenförmige, weit voneinander auf der Stirn eingelenkte Fühler; sehr schwache Kauwerkzeuge, häutige kleine Kiefer, da- gegen lange vorragende innere und äußere Kinnladen- palpen und Lippentaster. Die Flügel werden in der Ruhe gefaltet und übereinandergelegt, sodas das Insekt sehr schmal aussieht; sie haben mehr Neadern als bei den vorhergehenden Familien. Die Füße sind lang, fein, die Tarsen nur dreigliederig, mit einem Ballen zwischen den Klauen versehen. Der Hinterleib trägt zwei mehr oder minder lange Anhänge. Die vollkommenen Insekten leben von Blumenäften; die Larven halten sich besonders gern in fließenden Ge- wässern unter Steinen auf, haben große harte Kiefer und feiliche haarförmige Tracheentriemen an den Seiten des Hinterleibes, die bei einer Gattung (*Pteronarcys*) sogar bei dem vollkommenen Insekt als feiliche Fäden überleben. Uferfliege, *Perla bicaudata*, Taf. 25, Fig. 18.

Bei den Eintagsfliegen (*Ephemera*) sind die Kauwerkzeuge fast gänzlich verflummert, sodas sie kaum zu erkennen sind, namentlich fehlen die Kiefer gänzlich. Die Thiere leben kaum einen Tag als Wilder und fressen während dieser Zeit niemals, sondern häuten sich noch einmal nach dem Verlassen der Puppe, begatten sich dann abends, wo sie oft in ungemein zahl- reichen Schwärmen an den Gewässern erscheinen, legen ihre Eier und sterben am nächsten Morgen. Die Fühler sind sehr kurz, dreigliederig, borstig; die Vorderflügel, weit größer als die Hinterflügel, werden in der Ruhe aufrecht getragen; die Vorderfüße sehr lang, dünn; die Tarsen viergliederig. Der sehr weiche Hinterleib trägt zwei oder drei sehr lange Haarborsten. Die Larven leben zwei bis drei Jahre im Wasser, haben deutliche hornige Kiefer und zu beiden Seiten große Büschel von Tracheentriemen, die zugleich als Ruder dienen. Die fressenden Nymphen unterscheiden sich von den Larven nur durch die Rudimente der Flügel.

Die abgebildete Art, auch unter dem Namen *Uferas* bekannt (*Eintagsfliege*, *Ephemera vulgata*, Taf. 25, Fig. 19), verpuppt in wasserreichen Gegenden die Luft durch ihre faulenden Massen.

Die letzte Familie dieser Ordnung ist die der Wasser- jungfernen (*Libellulida*), (*Libelle*, *Libellula depressa*, Taf. 25, Fig. 20), bekannt wegen ihrer schlanken Ge- stalt und den meist schönen, durchsichtigen Schiller- farben, welche ihre Flügel zieren. Der Kopf ist groß, breit; die Augen ungeheuer, meist in großer Aus- dehnung auf dem Scheitel genähert. Die Fühler sind kurz, borstenförmig, kürzer als der Kopf, meist sieben- gliederig, zwischen oder vor den Augen eingesetzt; an ihrer Basis stehen drei Punktaugen. Die Kauwerk- zeuge sind ungemein entwickelt und äußerst scharf ge- zähnt, in Uebereinstimmung mit der räuberischen Lebens- weise der Thiere. Die Oberlippe ist groß; die Kiefer did, kurz, oben hakig, weiter hinten gezähnt; die Kinnladen innen haarig, an der Spitze mit einem krummen Hornzahn und darunter mit fünf in zwei Reihen gestellten langen Hornzähnen bewaffnet (des- halb nannte man diese Familie auch *Odonata*); Kinn- ladentaster did, borstig. Unterlippe groß, fein ge- spalten; die beiden Lippentaster in zwei häutige Seiten- flügel umgewandelt, welche die Kauwerkzeuge von der Seite bedecken. Mittelbrust groß, hoch, faltig; Flügel

lang, durchsichtig, fein gegittert, in der Ruhe geschlagen. Beine kurz, schlank, stark be- wehrt. Hinterleib lang, schmal mit nach hinten ver- breiten. Die Geschlechtsorgane sind bei dieser Ordnung eigenthümlich gebildet. Die Ruthe ist bei den Insekten, die mit einer offenen Samenblase in der Ruhe ver- weilen, ist außer aller Verbindung mit dem Samen- trichter am Anfang des Hinterleibes unter der Ruthe, sodas die Männchen, deren Samenblase in der Ruhe ver- weilt, am After, münden, erst die Samenblase aus- stoßen müssen, um sich begatten zu können. Bei den Insekten, die bald dies geschehen ist, mit der Samen- blase des Weibchen im Raden, die demselben gegen die Brust des Männchens befehlige Ruthe krümmen. Die Larven der Libellen und zeichnen sich durch eine eigenthümliche Bildung der Unterlippe aus, wo die Unterlippe das ganze Gesicht von unten her um- geben, wie ein Storchschnabel auseinandergeklappt ge- sehen werden kann, um als Fangwerkzeug zu dienen. Die vollkommenen Insekten fliegen meist in der Nacht und sind gefährliche Räuber kleinerer Insekten.

Ordnung der Netzflügler (*Neuroptera*)

Insekten mit beißenden Mundtheilen, verflummelter Unterlippe, freier Unterlippe, vier häutige, meist netzförmig gegitterte Flügel und vollkommen metamorphose.

Der Körper ist meist langgestreckt, nur bei einigen nur sparsam gedert. Die Larven haben mannichfache Uebergänge von einer mehr oder weniger geführten Spaltung bis zu vollständiger Ver- schmelzung zu einer Platte. Die Larven sind meist in der Ruhe schlammig; die im Wasser lebenden haben oft Tracheentriemen, welche den auf dem Lande lebenden fehlen; viele haben kräftige, launende Fortsätze, andere sind die Mandibula zu Saugorganen umgewandelt, groß, spitz und der Länge nach durchgehend im Schilde zusammenlaufend. Die Larven schlagen diese Saugorgane in der Ruhe zusammen, welche sie aussaugen. Die vollkommenen Insekten, welche sie ausaugen, die Larven zusammen geschlossen, zeigt alle Theile des Körpers, ist nicht, bewegt sich aber nicht, zum Auskriechen des Insekts genügt es, die Larve zu zerbrechen.

Familie der Blattflügler (*Phaneroptera*) sind meist gestreckt, Augen halbkugelig, keine Nebenaugen; Fühler faden- oder röhrenförmig; Unterlippe mit dreigliederigen Taster. Vorder- und Hinterflügel fast gleich, meist nicht faltbar, in der Ruhe nach aussen ausge- schlagen. Die entwickelten Insekten sind meist fliegend (*Hemeroptera*), theils Libellen, theils selbst Schmetterlingen (*Ascalaphus*). Die Larven alle mit Saugorganen, vom Kopf bis zum After spinnen sich einen Cocoon mit dem sie sich in eine umgewandelte Mastdarms. Die Larven sind nicht selten Ameisenlöwen (*Myrmecoleon*), Taf. 25, Fig. 26 das ausgebildete Insekt. Die Larve in ihrem Trichter. Die Larven der Ameisenlöwen, deren Kopf und Brust klein sind, während die beiden Hinterflügel mit dem breiten Leibe verschmolzen sind, leben in einem vor Regen geschützten Orte, in den Dachtraufen und Steinen im Sande, wo sie auf die Larven der Ameisenlöwen warten, welche sie an den Beinen ergreifen und in den Sand graben, in dessen Grunde sie mit ihren Saugorganen lauern; kleine Insekten, welche sie werden augenblicklich erfasst und zer- zerkaut.

kleinigt, daß ihnen der Ameisenlöwe eine Hand von unten her mit den Kiefern anwirft. In der spangrünen, klebhaft stinkenden Erde (*Emmerobius*), die lange, spitz endende Fühler und langgestreckt, mit kurzen, breiten Saug- und langen Kinnlabentastern und unter dem atmlauslöwen bekannt, da sie, auf Gewächsen belind, sich von Blattläusen nährt.

Der Sumpfslibellen (*Sialida*), kleine Netz- kleinem Kopf ohne vorspringenden Mund, nigen Fühlern, deutlichen Kiefern, die innen schwachen Nebenzahn haben, scharfen Kinn- kurzen viergliederigen Tastern und einfacher, fester Unterlippe, die nur sehr kurze Taster. Die Flügel sind fast gleich; die Taster fünf- In Amerika gibt es riesenhafte Gattungen; hier nur kleine Thiere, deren Larven im Wasser, feiliche Büschel von Tracheentrieben aus Eiern hervorkommen, die in braunen Hüllen abgelegt werden.

Knabelfliegen (*Panorpidia*) (*Storpio-* *inorpa communis*, Taf. 25, Fig. 28) haben einen knabelförmig verlängerten Kopf, borstenförmige Fühler, die zuweilen federartig sind, drei- schnelnde Kinnlaben und vier Taster, die Labentaster vier- bis fünfgliederig, die anderen zwei- bis dreigliederig sind. Füße und Schenkel sehr in dieser Familie; erstere haben fünf Tarsalglieder, sind aber bald sehr lang, bald kurz und haarig; die Flügel sind meist geadernt und einander gleich, zuweilen aber gleich, die hintern lang ausgezogen, ja es tungen, wo die Weibchen ganz ungeflügelt

Die der Kamelfliegen (*Raphidida*), Kopf klein; vorn breiter, hinten schmaler; Augen ergequollen; Fühler kurz, borstenförmig; Kiefer krumm gebogen, mit zwei scharfen Zähnen. In der Gattung unter der Halsspitze (*Kamelhals-* *thaphidida crassicornis*, Taf. 25, Fig. 27); Laben- z, viergliederig. Vorderbrust sehr lang, schmal, ausgezogen; trägt bei einer Gattung (Man- laubfüße, die ganz in ähnlicher Weise gebaut; die der Jangheuschrecken; Flügel gleich, sein, fast von gleicher Größe. Die Larven sind lebend, leben in Baumrinden vom Naube und sich einen groben Cocon.

Die folgende Familie ist auch unter dem Namen arflügler (*Trichoptera*) als Unterordnung

Die Familie der Schmetterlingsfliegen (*Phry-* hat einen kleinen, etwas gebeugten Kopf, borstenförmige Fühler, mittelgroße Augen und venaugen, von denen zwei zwischen den Augen, zwischen den Fühlern steht. Die Raumerzeuger sind verkümmert; die Kiefer fehlen ganz; die anderen sind in der Mitte verwachsen, tragen aber meist fünfgliederige Taster beim Weibchen, wäh- rend Männchen oft nur drei oder vier Glieder hat. Die Unterlippe ist schmal gekrümmt, die Taster kurz und dreigliederig. Die Flügel sind stets am Naube behaart, mit feinen Längsadern, die keine nebartige Verzweigung zeigen; die werden fächerartig gefaltet; die obern bilden Naube ein Dach, so daß die Thiere manchmal Nachschmetterlingen entfernt ähneln. Füße sind fünfgliederig. Am Hinterleibe der Weib- chen steht eine runde, ziemlich bedeutende, nigen Klappen umgebene Grube, worin sie Eier-

packete herumtragen. Die Larven leben im Wasser, haben einen weichen rundlichen Leib mit seitlichen Haken am Ende, ziemlich lange behaarte Füße, einen hornigen Kopf und bauen sich aus Steinchen, Muscheln, Holz- stücken eine Röhre, die sie beständig mit sich herum- schleppen und worin sie sich ganz zurückziehen können. Zur Verpuppung spinnen sie auf beiden Seiten der Röhre einen gegitterten Dedel und wandeln sich in eine ruhende Puppe um, die aber wieder sehr lebendig wird, wenn die Fliege austreten soll. Die Puppen sprengen dann den Dedel, kriechen an Wasserpflanzen in die Höhe und kommen selbst ganz auf's Trockene, um auszuklüpfen. Manche, wie die abgebildete Art (*Frühlingssfliege*, *Linnophilus rhombicus*, Taf. 25, Fig. 29), erscheinen an Flüssen und Seen in großer Menge und werden besonders abends lästig, indem sie nach dem Lichte fliegen.

Ordnung der Fächerflügler (*Strepsiptera*).

Kleine Insekten, die schmarozend auf Wes- pen leben. Weibchen flügellos, die Männ- chen mit ausgebildeten Hinterflügeln und rudimentären, an der Spitze zusammenge- rollten Stummeln der Vorderflügel. Mundtheile verkümmert. Prothorax beweglich. Voll- kommene Verwandlung.

Lange Zeit kannte man nur die ausgebildeten Männchen (*Xenos Rossii*, Taf. 25, Fig. 30), kleine kaum eine Linie lange geflügelte Thierchen, die man selten auf dem Hinterleibe von Wespen flatternd an- trifft. Der Kopf ist breit, kurz, die Augen sehr groß, kugelförmig vorgequollen, gehäuft. Die Fühler sind kurz, gespalten, so daß scheinbar vier Fühler vorhanden sind oder auch bei einer Gattung mit wenigen langen Raumblättern versehen. Die Mundwerkzeuge bestehen aus zwei säbelförmig gekrümmten dünnen Kiefern, blattartigen Kinnlaben mit dreigliederigen Tastern, die indeß von dem Thierchen gewiß nie gebraucht werden, da sie nur wenige Stunden leben und während dieser Zeit mit der Begattung beschäftigt sind. Die Füße sind kurz, die Taster viergliederig; die Flügel höchst eigenthümlich. Die Mittelbrust trägt zwei kurze häutige, sonderbar verdrehte kolbige Anhänge, welche einiger- maßen den Schwingelstößen der Zweiflügler gleichen, aber auch als rudimentäre Flügeldecken betrachtet werden können; an der Hinterbrust stehen zwei häutige große, dreieckige Flügel die nur wenige fächerartige Falten haben. Es genügen diese Flügel aber trotz ihrer Größe nicht zum freien Fluge der Thierchen, sie flattern nur tanzend auf dem Leibe der Wespen und vielleicht auch in den Nestern derselben umher, bis sie ein Weibchen gefunden haben, mit dem sie sich begatten. Zu diesem Ende tragen sie an dem zu- gekippten Hinterleibe einen hornigen Hakenpenis, der nach der Seite zu eingeschlagen ist und deutlich mit den Samenleitern in Verbindung steht.

Die Weibchen dieser Thierchen bleiben das ganze Leben hindurch in einem larvenähnlichen Zustande schmarozend im Hinterleibe der Wespen. Man nennt die Wespen, welche solche Gäste beherbergen, kurzweg *stypopisirt*. Bei den fortpflanzungsfähigen Weibchen ist der Leib weich, geringelt, wurmartig, weiß; Kopf und Brust dagegen sind in ein plattes, linsenförmiges Schild zusammenverschmolzen, das eine braune Farbe und hornige Beschaffenheit hat. Unter dem Vorder- rande dieses Schildes steht man die kleine, halbmonds- förmige Mundöffnung, die in einen weiten, geraden, blind geendeten Darm führt und neben welcher zwei fast unbewegliche hornige Stummeln die Nester der

verkümmerten Kauwerkzeuge darstellen. Mit diesem Kopfschild bedeckt das Weibchen zwischen den Hinterleibsringen der Wespen in der Weise eingellemmt, daß der wurmförmige Leib in die Hinterleibshöhle frei hineinragt, der Vorderrand des Kopfes aber nach außen schaut. Die Thiere scheinen ganz unbeweglich. Untersucht man ihren Bau genauer, so findet man in der Leibesöhle außer dem blinden Darm eine Menge von Eiern zerstreut zwischen dem Fettkörper, und längs der Bauchseite einen platten, breiten, hinten geschlossenen Kanal, der nach vorn in das Kopfschild übergeht und mit einer schlitartigen breiten Oeffnung, die weit größer als die Mundöffnung ist, unter dieser sich nach außen öffnet. Auf diesem Kanal stehen drei bis fünf etwas gebogene Röhren, die einerseits mit einer trompetenartig ausgeweiteten Mündung sich frei in die Leibesöhle öffnen, andererseits in den Kanal, den wir den Brutkanal nennen, münden. Offenbar dient die unter dem Munde befindliche Schlitöffnung dieses Kanals, die zwischen den Hinterleibsringen der Wespen hervorsticht, als Begattungsöffnung, durch welche das Männchen sein hakenförmiges Glied von außen einführt.

Die in der Leibesöhle des Weibchens frei befindlichen Eier entwickeln sich in dieser Leibesöhle und es erzeugen sich darin Larven, die innerhalb der Mutter auskriechen, sodaß oft der ganze Leib des Weibchens mit ausgekrochenen Larven erfüllt ist. Diese Larven sind sehr klein, sehr lebendig, von schieferblauer Farbe, weshalb man sie durch die Bauchwände des Weibchens durchschimmern sieht. Sie kriechen so lange im Leibe umher, bis sie eine der erwähnten Röhren des Brutkanals finden, durch welche sie dann in den Brutkanal klettern, den sie oft stehend erfüllen. Durch die vordere Oeffnung desselben kriechen sie dann hinaus auf den Leib der Wespen, auf dem sie munter einherlaufen. Die Larven der Strepsipteren haben in diesem Zustande einen mehr oder minder schlanken, mit Borsten besetzten geringelten Körper, einen halbrunden Kopf, zu dessen beiden Seiten Häufchen von Nebenaugen stehen, und sechs Füße, von denen die beiden ersten Paare mit runden oder länglichen Haftlappen versehen und anders als das hintere Paar gestaltet sind. Sie laufen sehr behende und einige springen auch ebenso wie die Gabelschwänze mit Hilfe zweier Borsten, die sie am Ende des Hinterleibes tragen und unter den Leib biegen und loschnellen können. Diese munteren Thierchen, die man früher für Schmarözer der für Larven gehaltenen Strepsipterenweibchen ansah, die aber in der That nur der erste Larvenzustand selbst sind, lassen sich von den Wespen in ihre Nester tragen und bohren sich dort in die fußlosen weichen Larven der Wespen ein, zu welchem Zwecke sie einige harte Hornstücke (undeutliche Kauwerkzeuge) am Kopfe haben.

In dem Leibe der Wespenlarven gehen die sechsbeinigen Strepsipterenlarven eine rückschreitende Metamorphose ein. Sie werfen ihre Haut ab, verlieren die Füße und verwandeln sich in eine wurmhähnliche, fußlose, weiche Made mit neun körperingeln, deutlicher Mundöffnung, die in einen blinden Darm führt, und verkümmerten Kauwerkzeugen. An der Gestalt des Kopfes sowie des letzten Hinterleibsringels kann man schon das Geschlecht dieser Maden erkennen; der Kopf der männlichen Larven ist kegelförmig gewölbt, der der weiblichen platt, schuppenförmig. Diese Maden bewegen sich sehr träge in der Leibesöhle der Wespen herum. Kommt die Zeit ihrer letzten Verwandlung, so bohren sie den Kopf zwischen den Leibsringen der Wespen durch, bis sie dort eingellemmt sind. Bei

den weiblichen Maden besteht nur die Verwandlung darin, daß ihr Kopfschild zertrümmert wird und die Oeffnung des Brutkanals in den männlichen Maden erhärtet zwar nicht, aber die ganze Madenhaut dient, wie bei manchen, zugleich als Puppenhülle, und in ihr bildet sich die männliche Puppe, an der man schon die ausgebildeten Insekten zusammenzuschlagen und das Männchen zum Auskriechen reißen kann. Die Spitze des hartgewordenen Kopfendes der Puppe wie ein Dedel ab, und das vollendete Insekt tritt mit Mühe hervor.

Ordnung der Käfer (Coleoptera)

Insekten mit lauenden Mundtheilen, schmolzener Unterlippe, frei beweglichen Thorax, borstigen, zu festen Decken umgewandelten Vorderflügeln und ständiger Verwandlung.

Man unterscheidet bei den Käfern drei Hauptabtheilungen des Körpers, Kopf, Thorax und Hinterleib. Der meist rundliche oder dreieckige Kopf (Taf. 25, Fig. 33: Leberlaufkäfer, *Leberlaufkäfer*, von oben: a Fühldörner, b Fühler, c vordere Augen und Palpen, d Flügeldecken, e Schenkel, f Schenkel, g Hinterleib, h Brust, i Kopf, k Fühler, l Fühler, m Fühler, n Fühler, o Fühler, p Fühler, q Fühler, r Fühler, s Fühler, t Fühler, u Fühler, v Fühler, w Fühler, x Fühler, y Fühler, z Fühler) ist meist etwas vor und ist durch eine Art Hals von dem Thorax ringe getrennt, zuweilen aber ganz in den Thorax gefügt oder selbst unter ihm verborgen. In der Regel ist der Kopf sehr seltenen Fällen bei der Erde oder in Höhlen lebenden Arten stets zusammengeklappt und mit mehr oder weniger Facetten versehen. Sie stehen auf der Seite des Kopfes oft wie kleine Halbflügel hervor, die oft nierenförmig und zuweilen so tief eingesenkt sind, daß sie in zwei hintereinandergelegene Theile zerfallen. Bei manchen Gattungen springt der Kopf über die hintere Hornleiste in das Auge vor. Die Taumelkäfer (*Gyrinus*) existiren gar ohne Fühler, übereinanderliegende Augen auf der Seite von denen die höhern nach oben, die niederen unten in das Wasser gerichtet sind. Bei den einfachen Nebenaugen. Die Fühler stehen auf der Seite des Kopfes oder am Stirnrande und bestehen aus 9—11 Gliedern, deren Formen außerordentlich verschieden und oft sehr charakteristisch für viele Abtheilungen sind.

Alle Käfer haben beißende Mundtheile, aus den normalen sechs Haupttheilen, den Kiefern oder Mandibeln, den Kinnladen oder Unterlippe zusammengeklappt. Die Oberlippe ist meist ein kleines, hornartiges Hornstück, das oft nur sehr rudimentär ist. Die Kiefer sind fast immer gekrümmte, feste Hornstücke, die weit vor dem Kopfe vorstehen und bei den meisten sehr säbelförmig scharf und spitz gegen die Pflanzensprossen kurz, dreieckig und innerseits mit Fortsätzen, die oft ineinander passen, versehen sind. Bei einigen, die sich von Honig und Nektar nähren, werden die Kiefer selbst ganz oder theilweise häutig. Sie bestehen aus zwei Theilen, während die Kinnladen oder Unterlippe zusammengeklappt sind. Auf jeder Kinnlade stehen ein, bei den meisten Fleischfressern aber zwei Fortsätze (*palpi maxillares*) eingelenkt, die meist säbelförmig sind und aus vier oder drei Gliedern bestehen. Die querlängliche Unterlippe zeigt außer

entum), innen daraufliegend die Zunge und stets ein feilliche, neben der Zunge eingelenkte, zweis- bis gegliedrige Altpentaster (palpi labiales), sodas also der Käfer wenigstens vier, viele Fleischfresser aber sechs Taster im ganzen besitzen.

Hinter dem Kopfe zeigt sich bei allen Käfern der Vorderbrüstring in Gestalt eines festen Schildes, das Halschild (thorax, corselet) genannt wird und in Form, Verzierungen und Umfang äußerst mannichfaltig und für Gattungen und Arten sehr bezeichnend sind. An seiner Unterfläche, der Vorderbrüstring (Prosternum), ist das erste Fußpaar eingelenkt. Der zweite Brüstring, der die Flügeldecken trägt, ist ein, sowie die weitem hintern Ringe, von diesen edt oder zeigt nur zwischen den Ansatstellen der Flügeldecken einen kleinen, mittlern, meist dreieckigen, den man das Schildchen (Scutellum) nennt. Der dritte Brüstring trägt oben die hornigen festen Flügeldecken (Elytra), die in der Mitte mit dem hinteren zusammenstoßen, sodas sie eine gerabe Längs- linie bilden. Sie bedecken gewöhnlich den ganzen Leib bis zu seiner hintern Spitze, sodas der Käfer, von oben gesehen, nur drei Abtheilungen bildet, Kopf, Schild und Flügeldecken. Nur bei einigen Käfern sind die Flügeldecken abgestutzt, sodas ein mehr oder weniger bedeutender Theil der Hinterleibsringe frei ist. Die Flügeldecken werden beim Fluge nur gegeben, aber nicht bewegt. Die Flügel, welche der Hinterbrüstring trägt, sind häutig, von Längsadern durchzogen und werden, um unter die kürzern Flügeldecken geborgen werden zu können, in der Mitte quer gefaltet, eine Art der Zusammenlegung, die den Käfern entnehmlich ist. Nur selten tragen sie in der Ruhe die dann verkürzten Flügeldecken hervor.

An den Beinen, welche aus den gewöhnlichen Stücken zusammengesetzt sind, ist der Fuß (tarsus) besonders bezeichnend. Er besteht aus drei bis fünf Gliedern, deren jedes nur sehr selten eine, fast stets zwei Hornklauen trägt. Schienen und Hüften sind oft mit Stacheln, Borsten oder Haaren besetzt, und die Zahl der Glieder verdient besondere Beachtung, da sie sogar zur Haupttheilungsgrund benutzt wurde.

Bei den Käfern sind die Beine einfache Gehbeine; bei einigen sind die Vorderbeine zu Grabfüßen, bei andern zu Springbeinen mit angeschwollenen Gelenken oder zu platten Schwimmsfüßen umgewandelt.

Der Körper der Larven ist fast immer gestreckt, oft wurmförmig, oft beinahe drehrund; in den meisten Fällen aber von oben nach unten abgeplattet. Zuweilen erscheint er durchgehends weich; meist ist indessen der Kopf hornig und nur der Hinterleib mit weicher Haut bekleidet. Bei den wenigsten wird auch dieser letztere Horn bedeckt. Diese festen Larven schweifen meistens frei nach Raub umher. Der Kopf ist oft flach gedrückt, platt, rundlich, von Linienform; horizontal nach vorn oder nach unten gerichtet; bei einigen pflanzenfressenden Larven (Blätterhörnler, Äpfelkäfer, Vorktenkäfer) ist er rundlich und fentrecht gestellt, sodas der Mund der Brust genähert ist. — Zusammengesetzte Augen kommen bei den Larven nie vor, ebenso wenig einfache Stirnugen; oft, besonders bei den Holzbohrern, fehlen die Augen gänzlich, denn sie sind vorhanden, so stehen 1—6 einfache Augen auf jeder Seite und zwar dann meist auf einem weichen Büdel, der sich während des Puppenlebens in das zusammengesetzte Auge des Käfers umwandelt. Die Füßer fehlen zuweilen, besonders bei Holzbohrern; sie sind stets einfach faden- oder fegelförmig, aber nie mehr als vier Glieder und stehen fast immer

seitlich am Kopfende über den Kiefern, selten auf der Stirnfläche.

Die Mundwerkzeuge sind, je nach der Nahrung, verschieden gestaltet. Oft dient als Dede der ganzen Theile ein bewegliches, an der Stirn eingelenktes Kopfschild, das indess ebenso oft fehlt. Dasselbe begegnet oft der Oberlippe, die manchmal deutlich abgesetzt, beweglich, zuweilen mit der Stirn verwachsen ist oder ganz fehlt, wo dann der Stirnrand zugleich den Mundrand bildet und die übrigen Fresswerkzeuge ganz frei vor dem Kopfe stehen. Dies ist bei vielen vom Raube lebenden Larven der Fall, und dann ist die Mundöffnung außerordentlich fein und nur mit Mühe nachzuweisen. Die scharfen Kiefer dienen solchen Raublarven zum Anbeißen der Beute, zum Durchbohren der Haut und zum Zerfleischen der Eingeweide, deren flüssige Bestandtheile dann von der feinen Mundöffnung aufgesaugt werden. Bei den Wasserkäferlarven (Dytiscidae) ist sogar durchaus keine Mundöffnung vorhanden, sondern beide Kiefer selbst von den Kanälen durchlaufen, welche sich an der Spitze der Kiefer spaltförmig öffnen und durch die der Saft der Beute eingesogen wird. Kiefer sind stets vorhanden; bei den Räubern säbel- oder sichelförmig, scharf und spitz, meist über den Kopf vorragend und übereinandergreifend; bei den Pflanzenfressern kurz, derb, dreieckig, oft mit stumpf gezähnten Rändern und Schneidflächen, die gegeneinander passen. Die Kinnladen haben meist dieselben Theile, wie beim vollkommenen Käfer: eine Angel (cardo), die zuweilen stiel förmig wird und dann den Haupttheil des Ganzen ausmacht, eine Labe, die meist verwachsen, zuweilen geschnitten, selten eingelenkt ist, und einen Taster, der fadenförmige Gestalt und drei Glieder hat. Die Unterlippe ist oft verwachsen, stets klein, ihre Taster zweigliedrig, die Zunge meist nur rudimentär.

Vielen holzbohrenden Käferlarven fehlen die Beine durchaus, bei andern sind sie nur durch vorstehende Warzenvorprünge angedeutet. Wenn sie vorhanden sind, so stehen sie an den drei ersten, dem Kopfe folgenden Körpersegmenten an der Unterfläche und bestehen meist aus fünf Gelenken, von welchen das letzte dem Tarsus entspricht und mit den Larven der Fleischfresser mit zwei, bei den Maimurmlarven (Meloida) mit drei, bei allen übrigen mit nur einer Klaue besaßnet ist. Die Länge der Beine steht meist mit der Lebhaftigkeit und der Deutlichkeit der Larven im Verhältnisse. Der Leib besteht hinter den Beine tragenden Ringen aus neun Ringeln, sodas also außer dem Kopfe im ganzen zwölf Segmente vorhanden sind, eine Regel, wovon indess die Wasserkäferlarven eine Ausnahme machen, deren Leib nur elf Segmente zählt. Ein paar Atemlöcher steht an der Brust, acht Paare an den acht ersten Hinterleibssegmenten. Der After tritt meist röhrenförmig oder warzenförmig hervor und wird zum Nachschieben des Körpers benutzt; da solche Afterfüße und Nachschieber, wie Schmetterlings- und Holzwespenlarven sie besitzen, den Käferlarven gänzlich abgehen.

Die raubenden Käferlarven leben meist in Erdböden, im Mist, unter Baumrinnden, im Mulme, in Gängen und Nestern anderer Insekten, deren Larven sie besonders heimsuchen. Nur wenige überraschen ihre Beute im Schusse oder Sprünge, indem sie vorher darauf lauern (dies thun besonders die Larven der Sand- und Wasserkäfer), die meisten fressen flüssige oder träge Thiere, und namentlich Larven, zuweilen auch Weichthiere (Schnecken) an. Die Holzfresser bohren sich Gänge, oft in dem härtesten Holze, meist aber in den weichern Theilen, im Marke, im Splinte und Rinde und unter den Rinden. Viele fressen faulende oder

verwesende Stoffe; einige werden uns besonders schädlich durch Zerstörung der Wurzeln, die sie unter der Erde aufsuchen.

Alle Käferlarven verwandeln sich nach einiger Zeit in eine ruhende Puppe. Die Lebensdauer mancher Larven scheint mehrere Jahre zu dauern; die der Maiskäfer z. B., wie man aus den Flugjahren schließen kann, drei Jahre; manche Holzböhrer scheinen sogar sechs, zehn und mehr Jahre als Larven zu leben. Zur Verwandlung ziehen sich die meisten nur an einen geschützten Ort zurück; einige wenige spinnen sich aus grober Seide einen Cocon; viele machen sich aus Erde, Holz, Mist u., das sie mit einem klebrigen Stoffe zusammenkleimen, einen hohlen Klumpen, der erhärtet und in dessen Innern die Puppe liegt. Diese gleicht dem vollkommenen Insekt, nur mit dem Unterschiede, daß der Körper verkürzt und eingebogen, die Fühler unter die Brust geschlagen, die Flügeldecken sehr kurz, die Füße nach innen eingezogen sind, während zugleich oft noch besondere Anhänge existiren oder auch solche des vollkommenen Insekts fehlen. Der Puppenschlaf dauert meist einen Winter hindurch.

Man kann die Käfer, von welchen man eine ungemein große Anzahl Arten kennt, nach der Zahl und Bildung der Tarfalglieder in mehrere Gruppen theilen.

Erste Gruppe. (Pentamera).

An allen drei Beinpaaren fünf leicht erkennliche Fußglieder (Tarfalglieder).

Familie der Laufkäfer (Carabida). Körper länglich, meist stark gewölbt, hart. Kopf klein, schmal, meist weit schmaler als das Halschild. Augen vorstehend. Fühler von mittlerer Länge, borsten- oder fadenförmig. Kinnladen scharf, ganzrandig, stark gekrümmt, meist ziemlich vorstehend. Kinnladen ganz halbig mit doppelten Tastern. Füße lang, dünn, stets mit fünf Tarfalgliedern, die meist bei den Männchen verbreitert sind. Flügeldecken, den Hinterleib meist ganz bedeckend. Die Käfer dieser zahlreichsten unter allen Käferfamilien sind alle gute Läufer, die meisten auch vortreffliche Flieger. Sie schweifen, die einen mehr bei Tag, die andern mehr nächtlicherweise, überall nach Beute umher, die besonders aus andern Insekten besteht. Die meisten haben einen unangenehmen Geruch; viele lassen in Gefahr aus dem Hintern eine stinkende, braune, ägende Flüssigkeit. Die Larven sind meist etwas abgeplattet, hornig, mit starkem, oben flachem Kopfe, sechs langen Beinen und sechs einfachen Augen auf jeder Seite, die auf einer gewölbten Beule stehen; sie haben ebenfalls stark vorstehende, sichelförmige, spitze Kiefer und leben vom Raube, meist in versteckten Aufenthaltsorten. Einige, wie die *Calosoma*-Larven, jagen selbst ihre aus Raupen bestehende Beute auf Bäumen. Die bekannteste unter den einheimischen Arten, deren Larve wir auch abbilden, der Goldblaukäfer (*Carabus auratus*; Käfer Taf. 25, Fig. 34; Larve Fig. 35) ist auch unter dem Namen Gärtner, Goldschmied bekannt und ein erbitterter Feind der Schnecken, Regenwürmer und Mistkäfer.

Familie der Sandkäfer (*Cicindelida*) (*Cicindela campestris*, Taf. 25, Fig. 36). Körper länglich. Kopf breiter als das dünne, meist verlängerte Halschild. Fühler fadenförmig, von mittlerer Länge, vor den Augen eingelenkt. Diese sehr groß, vorstehend. Kiefer vorstehend, groß, stark, sehr scharf, innen meist mehrfach gezähnt. Kinnladen gebogen, an der Spitze mit einem beweglichen Zahne und doppelten Palpen. Lippenstachel stark behaart. Beine lang, stets fünfgliedrig, ohne Zähne

oder Einschnitte an den Schienen und mit einer Reihe von kleinen, meist auf trockenem, sandigem Boden kriechen. Die Larven leben in Löchern, die sie in den Boden, breiten Kopf mit vorkommenden Borsten auf jeder Seite, sichelförmig gebogene, sechs lange Beine mit zwei Krallen und zwei einfachen, aus, daß der erste und siebente Körperteil angeschwollen und letzterer mit zwei vorkommenden Borsten versehen ist, was sie beim Aufsteigen in ihren Löchern benützen. Sie lauern auf die Beute, die sie mit den Borsten auf die Öffnung des Loches schließen. Diese Käfer Gattungen haben verwachsene Flügel, ermangeln der Flügel.

Familie der Wasserkäfer (*Hydrophilidae*). Körper abgeplattet, platt eiförmig, Kopf klein, an die Augen in das Halschild eingelenkt. Borstenförmig, dünn, meist länger als das Halschild zusammengekommen. Kinnladen innen gewimpert, außen mit zwei Palpen versehen, die äußeren viergliedrig, die inneren drei sind, sodaß mit den Kinnladenzähnen sechs Palpen vorhanden sind. Vorderfüße bei den Männchen sind die drei ersten in eine breite Saugscheibe erweitert, womit sie fest anheften können. Hinterfüße lang, mit Schwimmborsten besetzt. Die Käfer leben im Wasser; schwimmen schnell und fliegen schwach; sie sind sehr räuberisch und fressen schwächerer Wasserthiere an. Die Larven sind schmal, platt, mit deutlich abgesetztem, dem ungemein großen Halbkörper, die stehen, sind an der Spitze durchbohrt, und lassen aus ihnen in die Speiseröhre. In diesen Larven ganz; sie schlagen die Fühler lebender Thiere und saugen die Säfte daraus ein. Sie haben lange, gewimperte zwei kurze Athemborsten am Hinterleibe, schnell auf ihren Raub los und gelten sie für verderblich.

Die gemeinste Art ist der gelbkäufliche Käfer (*Dytiscus marginalis*, Taf. 25, Fig. 37). Familie der Taumelkäfer (*Gyrinidae*). Körper eiförmig, platt, wie alle Wasserkäfer. Kopf an die Augen in das Halschild eingelenkt. Borstenförmig, zwischen den Augen eingelenkt, dorthin zurücklegbar; zweites Glied drittes dritenförmiges Fortsatz versehen, in welcher fadenförmig, geringelte Ende des Fühlers steht; horizontal halbirt, sodaß jederseits zwei von denen das eine nach unten, das andere nach oben gerichtet ist; Vorderfüße gewöhnliche, Hinterfüße sehr kurz, balenartig, der Tarfus im ganzen dreieckig, erstes Glied die übrigen sehr klein, mit steifen Haaren. Die Käferchen schwimmen stets in dreierlei Weise auf der Oberfläche stehender Gewässer. Larven lang, schlach, atmen durch seitliche Kiemen haben, wie alle folgenden, den eigentlichen farn angehörige Käferlarven, zwei Klauen am Dreifüßler (*Gyrinus mergus*, Taf. 25, Fig. 38).

Familie der Fiskäfer (*Hydrophilidae*). Körper oval oder mehr rundlich, platt, Kopf klein, Leib eng aneinandergeschlossen, meist sehr kurz, keulenförmig, durchblättert, mit langen eingemachten denen der Blätterhörner. Die Käfer meist so lang oder selbst länger als die Hörner, zurückgeschlagen. Beine verhältnißmäßig stets aber mit fünf Tarfalgliedern.

, besonders im Wiste lebenden Gattungen (Sphaeridius, Cyclonotum), sind alle Füße Gangfüße und hienan mit Dornen bewaffnet; bei den im Wasser lebenden dagegen (Hydrophilus; Hydrochus; Lacius) sind die beiden Paare der Hinterfüße lang, jogen, platt und durch steife Haare zu Schwimmgestalt, während die Vorderfüße Gangbeine sind. Die Käfer dieser Abtheilung schwimmen schnell und gut, fliegen schwerfällig mit Gesumme und kommen oft an die Oberfläche, wo sie unter die Flügeldecken nehmen, zu welchem Ende die Spitze des Hinterleibes etwas über die Flügeldecken emporstreckt. Die Käfer selbst nähren sich von faulenden Pflanzentheilen; die Larven dagegen, ebenfalls im Wasser leben, sind arge Räuber, dem platten wurmförmigen nach hinten zugespitzten sehr schnell schwimmen und allen Arten von thieren, selbst jungen Fischen, eifrig nachstellen. Starke Käfer sind länger als die Palpen; die Hinterfüße von mittlerer Länge. Die Larven verbergen sich in der Erde und bilden eine ovale Puppe, deren Hinterende man noch die beiden Athmeröhren, durch welche die Larve Luft schöpft. Der Fischkäfer (Hydrophilus piceus, Taf. 25, Fig. 9) ist der größte Wasserkäfer unserer Gegenden. Familie der Raubkäfer (Staphylinidae). Die Käfer dieser zahlreichen Familie haben einen langen, spindel- oder wurmförmigen Körper und stets abgestumpfte, meist kurz gestülpte Flügeldecken, die vornen, festen Hinterleib nur theilweise bedecken, die Flügel, die zuweilen fehlen, ganz umschließen. Die Käfer sind zehn oder meist elfgliedrig, kurz, stämmig oder schwach gestreckt, nur selten geknöpft; die meisten sind groß, baugig, spitz, meist ungezähnt; die Palpen lederartig oder häutig; die Gelenke einfach. Die Käfer sind sehr verschieden; Hinterleib lang, oben hart, beim Gehen nach oben gekrümmt und zeigt am Ende zwei blasenförmige Wargen, die willkürlich eingestreckt werden. Die Füße sind lang, kräftig, mit Dornen bewaffnet, bald mehrlos, und die hinteren Tarsalglieder außerordentlich wechselnd, sobald alle Extremitäten in Schwämmen und Pilzen, Töpfen, Eiern, omeren, Tetrameren und Trimeren in dieser Familie vertreten findet. Die Larven sehen den vollkommenen Käfern ähnlich, haben starke vortretende Kiefer, deutliche Augen, sechs lange Füße mit einfachen Enden und einen platten hornigen Körper. Käfer und Larven sind äußerst lebhaft fähne Räuber, die verschiedene Insekten jagen und diesen im Wiste, unter Steinen u. s. w. nachstellen. Die meisten haben einen unangenehmen Geruch. Kurzflügler (Stenus caesareus, Taf. 25, Fig. 40). Familie der Tasterkäfer (Pselaphidae). Körper im Allgemeinen birnförmig; Kopf länglich, frei, Augen stark ausgeprägt oder ganz fehlend; Fühler kurz oder lang, meist haarig, am Ende geknöpft oder keulenförmig, lebend, blätterig. Halschild länglich elliptisch, abgerundet, von den quergestülpten Flügeldecken nur bedeckt. Füße lang, schwach; Tarsen nur dreigliedrig, Endglied mit zwei Klauen. Kleine Käferträger Natur, die meist tags über still im Grase herumlaufen und nachts aber munter umherfliegen. Larven sind unbekannt. Die hier abgebildete Art (Pselaphus testaceus, Taf. 25, Fig. 41) lebt bei uns in eichenen und wird von den Ameisen gepflegt. Sie ist rostroth glänzend, gelb behaart, hat nur eine Linie lang. Familie der Stupkäfer (Histeridae). Körper breit, nach dem Tode wenig gekrümmt, ungemein hart.

Kopf klein, tief in das Halschild eingesenkt. Fühler dreigliedrig, mit seltenem Knopf, stark gekrümmt; Kinnladen stark, gezähnt; die Hinterfüße stark seitlich gestellt; Vorderfüße der Mittellinie genähert. Füße stark bedornig, schwerfällig. Käfer in Asche, Mist und faulenden Substanzen, die kurzfüßigen nachden augenlosen Larven ebenfalls selbst. Die trägen Käfer stellen sich beim Ergreifen tod. Stupkäfer (Hister fime-tarius, Taf. 25, Fig. 42).

Familie der Aschkäfer (Silphidae). Körper flach, scharfrandig, meist behaart; Flügeldecken gewöhnlich hinten abgestumpft, sodass mehrere Ringe des Hinterleibes sichtbar sind. Fühler dreigliedrig über den Kinnladen eingesenkt. Schildchen zwischen den Flügeldecken groß. Leise ausgeschnitten. Fortsatz der Mittelbrust nach hinten nur sehr klein. Häften einander genähert. Gestalt nach dem Tode sehr gebüht. Die schnell und gut laufenden und fliegenden Käfer sinken sehr, geben beim Ergreifen sinkenden, flüssigen Roth von sich und nähren sich von Asche und Leichen, die sie meist mit großer Schnelligkeit in den Boden ein-graben, um als Vorrath für ihre Larven zu dienen, die sehr gefräßig sind, mächtig lange Füße haben und sechs Augen auf jeder Seite besitzen, von welchen vier an der gewöhnlichen Stelle hinter der Einlenkung des Fühlers und zwei unter dem Fühler nach unten gerichtet stehen. Einige Larven indessen nähren sich auch von Blättern, wie die abgebildete Larve des schwarzen Aschkäfers (Silpha atrata, Taf. 25, Fig. 43). Am bekanntesten unter der Gruppe sind die großen langen, meist roth gefleckten Todengräber (Necrophorus vespillo, Fig. 44), welche meist in Gesellschaft arbeiten, laut durch Reiben der Flügeldecken an harten Leisten des Hinterleibes zirpen und sich durch diese Töne zusammenrufen.

Familie der Schnitkäfer (Scaphididae). Kleine, dicke, lebhaft Käfer, mit schnitförmigen Körper, elfgliedrigen, zugespitzten oder keulenförmigen Fühlern, abgestumpften Flügeldecken, großen Hinterfüßeln und zugespitztem Hinterleibe. Die abgebildete Art (Scaphidium quadrimaculatum, Taf. 25, Fig. 45) lebt, wie alle andern, in Schwämmen und Pilzen. Trotz ihrer Häufigkeit sind die Larven noch nicht genauer bekannt.

Familie der Colydiden. Wir erwähnen diese kleinen, langgestreckten Käferchen hier nur, weil die kurzbeinigen langgestreckten Larven einiger Arten, worunter die abgebildete (Colydium sulcatum, sehr vergrößert, Taf. 25, Fig. 47) in den Bohrlöchern der Vorkantel sich aufhalten, von deren Larven leben und sich dadurch nützlich erweisen.

Familie der Glanzkäfer (Nitidulariae). Keulenförmige Fühler, deren Stiel meist elfgliedrig, Beine kurz, Form verschieden. Käfer und Larven vieler Arten leben in Vorrathskammern auf Heiz, Körnern u. s. w. Die abgebildete, stark vergrößerte Art (Glanzkäfer, Nitidula aenea, Taf. 25, Fig. 46) metallgrün.

Familie der Cucujiden. Flachgedrückt, meist lebhaft gefärbte Käfer mit keulenförmigen oder fadenförmigen Fühlern, von denen einige, darunter die abgebildete Art (Cucujus sanguinolentus, Taf. 25, Fig. 48), häufig unter Baumrinde und in Waaren speichern und durch ihre Menge schädlich werden.

Pelzkäfer (Dermestidae). Körper eiförmig, gewölbt, hart, die Beine können angezogen werden, aber nicht vollständig, indem die Tarsalglieder frei bleiben. Kopf klein, zur Hälfte, bis an die Augen, in das Halschild eingesenkt; Fühler kurz, Endleule nur dreigliedrig, aber das Endglied oft sehr groß und lang; Oberflächennadeln did, kurz gezähnt. Die Käfer leben besonders in Pelzwerk und trockenen Thierstoffen, in Museen und zoo-

gischen Sammlungen, zuweilen auf Blumen; die baarigen Larven, an denselben Orten, richten große Verwüstungen an, da sie meist im Verborgenen arbeiten. Sie verpuppen sich in der eigenen Larvenhaut, die als Hülle für die Puppe dient. Die abgebildete Art (Spedtkäfer, *Dermestes lardarius*, Taf. 25, Fig. 49) ist überall häufig und einer der größten Feinde unserer Vorrathskammern.

Von dieser Familie scheidet sich als kleine Gruppe durch vollkommen zurückziehbare Beine, breite Unterschenkel und Verwachsung der drei vordern Leibesringe, die Gruppe der Billenkäfer (*Byrrhida*), deren Larven, Lebensart u. s. w. ganz analog der vorigen ist. Die Käfer, die meist an sandigen Orten leben, kugeln sich zusammen und stellen sich tot. Die abgebildete Art (Billenkafer, *Byrrhus pilula*, Taf. 25, Fig. 50) ist überall in Deutschland häufig.

Familie der Grundkäfer (*Parnida*). Langbeinige, kleine, im Wasser lebende Käfer, die durch seidenglänzende Haare am ganzen Körper oder an der Brust mit sich unter das Wasser nehmen und durch dieselbe athmen. Die abgebildete Art (Grundkäfer, *Elmis aeneus*, Taf. 25, Fig. 51) lebt am Grunde von schnellfließenden Gewässern unter Steinen.

Familie der Blattbömer (*Lamellicornia*). Die größten bekannten Käfer gehören dieser sehr zahlreichen ausgezeichneten Familie an. Ihr Körper ist meist oval oder rundlich, did, auf beiden Seiten stark gewölbt; der Kopf klein, der Stirnrand oft ausgebreitet oder hornartig verlängert, das Halsschild meist so breit als die Flügeldecken, oft ebenso wie der Kopf mit sonderbaren Fortsätzen, Spizen und Hörnern geziert. Die Fühler sitzen in einer tiefen Grube unter den Seiten des Stirnrandes und können meist ganz in dieser Grube geborgen werden; sie sind kurz geißelförmig, die untern Glieder knopfartig, die vordern blattförmig nebeneinandergestellt, sodass sie sich wie die Blätter eines Buchs öffnen und schließen lassen und einen Kamm oder Wöbel bilden. Die Füße sind stark, schwer, der Außenrand der Schienen gezähnt, die Tarsen stets füngliedrig, die Endtallen stark. Beide Geschlechter unterscheiden sich oft sehr bedeutend im Aeußern, indem das Männchen größer ist, eigenthümliche Hörner und Dornen und oft ungeheure Kiefer besitzt, die dem Weibchen abgehen.

Die Käfer leben von Blättern, faulenden Pflanzentheilen, Mist und andern Excrementen, haben einen schwerfälligen Gang und einen ungelassenen Flug, bei dem sie laut schnurren. Die Larven sind walzenförmig, weich, weißlich, mit sackförmigem, untergeboegenem Endtheile, hartem, gelbem, hornigem Kopfe, der wie bei den Raupen vertical steht, sechs langen harten Füßen, aber ohne Augen. Der bekannte Engerling liefert das beste Bild einer solchen Larve. Sie leben mehrere Jahre in der Erde von Mist, Wurzeln, Pflanzentheilen, und verpuppen sich dann in einem durch Schleim zusammengeklebten Erdballen.

Man unterscheidet mehrere Gruppen in dieser zahlreichen Familie, unter welchen wir nur die Hirschkäfer (*Lucanus*), mit den bei den Männchen geweihtartig entwickelten, bei den Weibchen als kurze Kneipzangen gebildeten Kiefern erwähnen, deren Larven bis 4 Zoll lang werden und in alten Eichen bohren; ferner die Mistkäfer, *Coprophaga* (Mistkäfer, *Geotrupes stercorarius* Taf. 25, Fig. 55), zu denen der bekannte, heilig gehaltene *Scarabäus* der Aegypter (*Ateuchus sacer*) mit gezähntem Vorderrand, und die abgebildete Art gehört, die abends mit lautem Summen umherfliegt; endlich der bekannte Mistkäfer (*Melolontha vulgaris*, Fig. 52), dessen Larve als Enger-

ling (Engerling, Larve, Fig. 53) mehrere Jahre in der Erde lebt, durch das Wurzeln oft außerordentlich schädlich ist, dann im Herbst verpuppt (Puppe, Fig. 54), um im Frühjahr als Käfer zu erscheinen. Der Käfer verwüßt die Laubbäume, und seine Larven zerstören in jedem Jahre unsere Felder. Die Larven leben fast regelmäßig in unterirdischen Höhlen, welche der Entwickelungszeit entsprechen. Abkühlen der Käfer am frühen Morgen ist das sicherste Mittel zur Vertilgung. Die Larven sammeln und getödteten Käfer mittel benutzt werden.

Die Familie der Prachtkäfer (*Cerambycidae*) ist zwar in unsern Gegenden nur durch wenige Gattungen, um so häufiger und reichlicher durch die Larven repräsentirt. Die Käfer sind meist in den lebhaftesten Metallfarben, längliche Gestalt und ausgezeichnet durch den Kopf ist meist breiter als lang, der Thorax gestreckt, die einfachen Palpen lang, das Glied cylindrisch. Das Halsschild breitet sich gerade; die Vorderbrust nach hinten stark ausgezogen, der zwischen der Mittelbrust reich, aber abgeplattet ist, die Hinterbrust vertieft. Die Füße sind lang, die Glieder und die vorletzten Tarsalglieder sind und schwammig. Die Käfer laufen nicht, aber gut mit schnurrendem Geräusche.

Die Larven sind augenlos, mit ganz hornartigen Füßen versehen; der Kopf ist fleischig; der zweite Ringel aber breit, und der Kopf kann in dasselbe zurückgezogen. Die Fühler sind sehr klein; Lippenstübe sind vorhanden. Die Käfer sind, wie bei den meisten Insekten, in Larven, kurz, fast immer stumpf geformt; besonders in trockenem Holze und leben da vollendete Käfer zuweilen aus dem Holze kommen, die schon Jahre hindurch im Holze waren.

Die Larve der abgebildeten Art (*Braconichneumon*, *Chalcophora mariana*, Taf. 25, Fig. 56) ist zu den größten europäischen Arten gehört, die Stämmen der Kiefern und richtet große unbedeutende Verheerungen an.

Die Familie der Schnellkäfer (*Elatridae*) hat mit der vorigen die hornartigen Fühler, die harten Flügeldecken, die Bildung der Vorderbrust gemein; der Thorax derselben noch weiter nach hinten von beiden Seiten zusammengedrückt, die Hinterbrust Doldgestalt besitzt. Er paßt in eine Jacke hinein. Legt man die Thiere auf den Rücken, so ziehen sie den Körper, ziehen Fühler und Füße nach, und mit Gewalt die Spitze der Vorderbrust aus dem Loch in der Mittelbrust, so daß mehrere Zoll hoch in die Luft geschleudert werden. Die Larven der Schnellkäfer sind denen der vorigen sehr ähnlich; sie sind drabstförmig, haben keine Oberlippe, dagegen ganz seitlich, die Oberlippe, eine sehr lange, fast unbewegliche Unterlippe und sehr kurze Füße; sie leben vorzugsweise in trockenem Holze und Wurzeln, während die Larven besonders auf Blumen, im Rasen und in Gärten umherkriechen. Einige Arten leuchten; die Larve des *Elatris noctilucus*, der Leuchtende Schnellkäfer, leuchtet wie ein Leuchte benutzt wird. Die Larve ist ein rundes Pünktchen am Hals.

Die Larven der abgebildeten Art (*Elatris*, *Agriotes segetis*, Taf. 25, Fig. 57) sind zuweilen durch Abnagen der Getreide den Schaden an.

nile der Cebrioiden (*Cebrio gigas*, und Weibchen, Taf. 25, Fig. 58 und 59) t sich von den Schnellkäfern durch tiefere, Grabbeine und den Mangel des Adgenä. Die Larven sind sehr ähnlich, odenem Boden von Wurzeln. Bei der ab- am Mittelmeer häufigen Art sind Männ- Weibchen sehr abweichend gestaltet. Erstere abends umher — letztere bleiben im Boden

der Leuchtkäfer (*Lampyrida*). Körper al; Kopf ganz in das platte Halschild Oberlinnen kurz, sehr spitz. Vorleßtes erweitert, zweilappig, die Klauen einfach. en sind oft ungeflügelt. Die Käfer stellen r Berührung todt; die Larven nähren sich und sind meist schwärzlich. (*Lampyris* das Johanniswürmchen, Taf. 25, Männchen und Weibchen.) Das ungeflügelte n Grase, leuchtet stark; Männchen und Larve Die Larve verzehrt die gewöhnliche Baum- elix nemoralis) und puppt sich in dem leer- Gehäuse ein. Sie trägt zu beiden Seiten del. Bei andern Arten sind beide Ge- eflügelt und leuchtend.

der Buntkäfer, Clerida. Körper lang- mal, meist haarig; Kopf kurz, sehr breit, als das oblonge Halschild, Fühler gefägt, das Ende knopfförmig verdidt; die Augen t; Rinnladen gezähnt; Palpen leulenförmig; Tarfalglied zweigclappt. Die schönen, meist ibern Käfer auf Blumen und alten Bäu- rosenrothen, behaarten Larven in Bienen- ennestern, in Schwämmen und im faulen ie andere Larven aufsuchen und nur von n. Sie sind ziemlich langbeinig und sehr Clerus aparius, der Bienenwolf — die in Bienenstöden und frist die Bienenlarven. ebildete Art (Buntkäfer, *Clerus formica-* 25, Fig. 61) sehr gemein in Kieferwäldungen der Holzbohrer (*Xylophaga*). Körper lich, ziemlich weich; Flügeldecken meist ge- bei einigen Gattungen aber lassend und ollständig. Der rundliche Kopf bald frei, oder weniger unter dem Halschild ver- Fühler kurz, weniger gefägt als in der amilie; die Rinnladen stark, kurz, gezähnt; en Palpen meist am Ende verdidt; die Füße ang, schwach, ohne schwammige Sohlen, ds fünfgliederig. Die Larven haben kurze Füße und keine Augen, bohren in Nutholz oder in trodenen Thierkörpern und n ihres großen Schadens berüchtigt. Man et zwei Unterfamilien. Die Bohrkäfer Taf. 26, Fig. 2) haben einen kürzern, eiför- ernen Körper, geschlossene Flügeldecken, kürzere den Kopf halb in das Halschild eingeseht; besonders in Sammlungen und altem Holze. öhnliche Bohrkäfer (*Ptinus fur*; Larve des s, Taf. 26, Fig. 3) greift nebst der Larve ierthierkörper und Herbarien an; die Todtenur e (*pertinax*) in altem Nutholze, todt durch it den Kiefern, stellt sich bei der Berührung äßt sich selbst durch empfindliche Martern Bewegung verleiten; eine verwandte Art, ilden (*Agathidium*, *Anobium striatum*, Fig. 62), hat ganz ähnliche Sitten und Larven; bei den Kammbohrern (*Kamm-* *Ptilinus pectinicornis*, Taf. 26, Fig. 1) sind öhrner vorn lang gewedeß, die schädlichsten

unter allen sind die Werfthoher (*Limexylida*) mit langem, weichem Körper, lassenden Flügeldecken, län- gern Füßen und freiem Kopfe — die Larven bohren besonders in trodenem Eichenholz und richten in den Borräthen der Schiffswerfte großen Schaden an.

Zweite Gruppe (Heteromera).

An den beiden vordern Beinpaaren fünf Tarfalglieder, an dem hintern nur vier.

Familie der Schwarzkäfer (*Melasmata*). Körper länglich oder oval, stark gewölbt; Halschild selten schmaler als der Leib. Äußere Deden meist ziemlich hart und fest. Fühler kurz, perlmuttelartig unter dem Kopftrabe eingeseht. Oberleier zweifaltig; Untertiefer mit horniger Klaue an der Innenleite. Vielen Käfern fehlen die Hinterflügel gänzlich und die Flügeldecken sind miteinander verwachsen. Die Käfer sind schnelllaufende Nachthiere von schwarzer Farbe, die sich tags über an dunkeln Orten aufhalten, nachts umherkriechen und meist elchast stinken. Die mittelbeinigen, drahtförmigen, mit abgesehtem Kopfschild versehenen Larven in Mulm, Mehl, Brot, faulenden Stoffen oder selbst Ercrementen. Wir bilden eine überall in Europa verbreitete Art ab, deren Larve, der Mehlwurm (*Mehlkäfer*, *Tenebrio molitor*, Taf. 26, Fig. 4; Larve des Mehlkäfers, Fig. 5), lebendig wie getrodnet sogar einen Handelsartikel bildet, da sie als Vogelfutter, namentlich als Nachtigallenfutter sehr geschägt ist.

Familie der Wollkäfer (*Lagriaria*). Käfer und Larven meist dicht behaart, Fühler elfgliederig. Larven mit großem Kopf und ziemlich langen Fühlern, länglich, fast gleich breit. Die abgebildete Art (*Wollkäfer*, *Lagria hirta*, Taf. 26, Fig. 6) häufig auf Ge- sträuch.

Familie der Scharlachkäfer *Pyrrhocroidea*. (*Scharlachkäfer*, *Pyrrhocroa rubens*, Taf. 26, Fig. 7.) Kopf gerade, wenig vorgestreckt, Halschild zu- weilen schmaler als die Flügeldecken. Fühler fadenförmig oder gekämmt; beim Männchen oft selbst wedelartig. Vordertaster bei einer Gruppe (*Melandrya*). *Melandrya caraboides*, Fig. 8, sehr verlängert mit verdicktem Endgliede. Flügeldecken oft bedeutend nach hinten verbreitert. Füße lang; vorleßtes Tarfalglied geklappt; Klauen einfach ungezähnt. Die Käfer auf Pflanzen; die mittelbeinigen Larven unter Baumrinden, im Mulm abgestorbener Stämme.

Familie der Stachelkäfer (*Mordellida*). Körper spinselförmig hinten zugespitzt; Kopf klein, gebückt unter dem Halschild bis zur Hälfte der Augen ver- borgen. Halschild so breit wie die Flügeldecken. Fühler fadenförmig, kaum gefägt. Hinterchenel meist etwas verdickt. Beine lang. Laufen hüpfend mit großer Schnelligkeit und stellen sich bei Berührung todt. Die Larven, welche sehr kurze Füße haben und den Larven der Holzwespen sehr ähnlich sehen, leben im Marke von Bäumen und Kräutern; die Käfer (*Stachelkäfer*, *Mordella fasciata*, Taf. 26, Fig. 9) grünen saftigen Blättern.

Familie der Blasenkäfer (*Vesicantia*). Körper länglich; der quere Kopf und das oblonge Halschild schmaler als die Flügeldecken. Letztere sehr weich, leberartig, biegsam, bei einigen Gattungen verkrümmert, so daß sie nur den halben Leib deden, in welchem Falle die Flügel gänzlich fehlen. Fühler fadenförmig oder gefägt. Die beiden Klauen des letzten Fußglandes sind der Länge nach in zwei ungleiche Hälften gespal- ten, so daß an jedem Fuße zwei größere und zwei kleinere Klauen vorhanden scheinen. Alle Käfer dieser

Familie enthalten einen scharfen, blazenziehenden, äphenen Stoff und werden auch an ihren Wohnorten als Blasenmittel benutzt.

Die Eier werden entweder auf den Sand oder an Bienenester gelegt; die sehr kleinen, rührigen, sechsbeinigen Larven, die daraus hervorgehen und am Hinterleibe noch besondere Springstangen haben, klettern auf Blumen und springen von da aus oder direct auf Bienen, Hummeln u. s. w., in deren Nester sie sich tragen lassen, um dort die Eier zu fressen. Dann verwandeln sich die Larven noch mehrmals: erst in eine fast fußlose Made, die sich von Honig nährt; in dieser entsteht eine Art Puppe, aus der wieder eine madenartige Larve hervorgeht, die sich endlich definitiv verpuppt. Der durch die kurzen Flügelbeden ausgezeichnete stahlblaue Maiwurm (*Meloe proscarabaeus*, Taf. 26, Fig. 10) wurde früher als Volksmittel gegen die Hundswuth benutzt; die spanische Fliege (*Lytta vesicatoria*, Fig. 11), welche oft massenhaft im Sommer, besonders auf Flieder, sich findet und smaragdgrüne Flügelbeden hat, liefert den Hauptstoff zu den Blasenpflastern.

Familie der Schwellfüße (*Oedemerida*). Körper oval, oft ziemlich breit; Halsschild meist so breit als die Flügel. Mund vorgestreckt, oft selbst rüsselartig verlängert, so daß sich die Kopfform derjenigen der Bruchiden nähert. Fühler borstenförmig, kaum gesagt, zuweilen von Körperlänge. Füße sehr lang, dünn, die Schenkel oft ansehnlich verdickt, so daß die auf Blumen lebenden Käfer (*Oedemera coerulea*, Taf. 26, Fig. 12) gut springen. Die Vorderhäften stehen dicht zusammen. Die Larven leben in Mulm, sind langgestreckt, vorn etwas breiter.

Dritte Gruppe (Tetramera),

An allen Füßen nur höchstens vier sichtbare Tarfalglieder.

Familie der Erbsenkäfer (*Bruchida*). (Erbsenkäfer, *Bruchus pisi*, Taf. 26, Fig. 13.) Kopf schnauzenförmig, abwärts gerichtet. Oberlippe hervortretend; Zäster frei; Fühler lang, derb; Körper kurz, gedrungen. Larven und Lebensart wie bei den Rüsselkäfern. Die Larven leben besonders in Samen von Schotengewächsen und richten oft bedeutenden Schaden an. — Die abgebildete Art ist Erbsen.

Familie der Rüsselkäfer (*Curculionida*). Die Käfer dieser Familie haben meist einen elliptischen Leib und einen mehr oder weniger rüsselartigen Kopf, an dessen Seiten die Fühler stehen. Die Mundöffnung befindet sich vorn an der Spitze des Rüssels; die Werkzeuge sind nur sehr klein, die Zäster unbedeutend, kegelförmig, ohne Bergliederung kaum sichtbar; die Zäster sehr scharf, beilartig, oft gezähnt. Die Fühler stehen bei den Gattungen mit deutlichem, langem Schnabel meist in der Mitte desselben oder etwas weiter nach vorn und sind entweder gekniet oder einfach fadenförmig. Bei den geknietten Fühlern ist das erste Glied ungemein lang, stabförmig, die andern Glieder kurz, zuweilen gesagt oder hinförmig, das oder einige letzte Glieder oft zu einem Knopfe verdidt. An den Seiten des Rüssels sieht man dann eine schiefe Furche, die Fühlergrube, die meist zu den Augen hinzieht und in die das erste Glied des geknietten Fühlers eingelegt werden kann. Die an der Basis des Rüssels stehenden Augen sind klein, zuweilen ausgeschnitten; das Halsschild vieredig, hinten breiter, die Flügelbeden gerippt oder gerönt und so hart, daß viele dieser Käfer nur schwer mit einer Nadel gespießt werden können. Die Tarfen sind viergliederig;

nur selten findet sich ein sehr kleines, in einer Höhlung des Schenbels vorstreckendes Tarfalglied meist herzförmig, letzte mit doppelter Klaue.

Die Larven dieser Käfer haben meist zwei Augen; sie bohren im Innern von Bäumen Früchten und Samen und spinnen in der Puppung eine Hülle aus feiner Seide, sowohl, wie die Käfer richten große Schichten Pflanzungen und Fruchtvorräthen an.

Man hat mehrere Gruppen unter der Gattung unterschieden: *Curculionida* mit Rüssel und geknietten Fühlern. Zu dieser Gattung Calandra, von welcher eine *Cal. granaria*, ihre Eier in das reife Getreide, Larve (der schwarze Kornwurm, *Calandra*, Taf. 26, Fig. 14) höhlt das Getreide verpuppt sich darin. Millionen kleiner Abbildung ist sehr vergrößert) schlüpfen aus treidehaufen aus.

Einer andern Gruppe fehlt die Fühler hat einen längeren Rüssel und einfache Fühler gehört der Nebensteher (*Rhynchites*, Taf. 15), der Käfer frist die jungen Blätter die Blätter an, um die Eier hineinzulegen. Larven haben die Blätter ab; der Kornwurm (*Apion frumentarius*); *Apion* pfeife Apfelwurm.

Familie der Borlenkäfer (*Bostrychida*). Käfer haben einen länglichen platten Leib, nur klein und weniger hart als die Rüsselkäfer. Kopf ist kurz, platt, ohne Rüssel, die Zäster mit einem großen, derben, meist geringelten versehen, der meist die Hälfte der Körperlänge Das breite Halsschild deckt oft einen Theil der darunter zu hängen scheint. Die Zäster stets vier Tarfalglieder; die hintern stehen den übrigen ab; bei einigen sind die Zäster gezähnt. Die Larven sind augenlos und so kurz und unscheinbar, daß sie mancher Entgingen. Käfer und Larven dieser Familie meist in lebenden Bäumen, und zwar an Bast und Splint, wodurch die Saftkanäle behindert wird und die Bäume verdorren. Die Käfer (*Bostrychus typographus*; *Bostrychus*, Taf. 26, Fig. 17), der eigentümliche, arabischen Buchstaben ähnliche Gänge bohrt, ist sehr schädlich, besonders im Harz öfters ungeheure Verheerungen Nadelholzwäldern angerichtet. Man nennt die von den Bäumen, die er veruracht, die Schenke. Einige etwas abweichende Gattungen bewohnen in Schwämmen; von andern werden in verfaulten Pflaumen im Innern zerwesenen Käfert, *Scolytus pruni*, Fig. 18, andere arbeiten in Wurzeln, z. B. des Kieferwurzelkäfer, *Hylesinus trifolii*, Fig. 16, dadurch der Landwirthschaft schädlich.

Familie der Bodkäfer (*Longicornida*). Diese Familie gehörigen, meist grobkörnigen Käfer haben einen länglichen Körper, der meist flach, die Bauchseite dagegen stark gewölbt ist. Der Kopf ist vorgestreckt, frei, meist mit einem kleinen, vieredigen Halsschild, das oft mit zwei Zaden verziert ist. Augen länglich, meist ausgeschnitten, in dem Ausschnitte ist meist ein eingelenkt. Fühler fadenförmig, meist ebenso lang als der Körper, oft noch länger, sehr selten kürzer. Zunge häufig ausgedehnt spaltig; Unterkinnlade einfach, spitzig, deutlich viergliederig; das Kinneglied

kleinen Knöpfchen versehen, sodas die Füße fünf Glieder haben; vorlestes Tarfalglied zweite häufig herzförmig ausgeschnitten. Die Käfer (Alpenbockkäfer; *Rosalia al-* 26, Fig. 19) halten sich in Wäldern und am die oft sehr großen Larven bohren alle in anders im Stamme lebender Bäume, haben einen rundlichen Kopf ohne Augen und ent- keins oder nur sehr kleine, kaum Gesele- üße. Ihre Kiefern sind, wie die aller an- ohrer, kurz, aber sehr stark und schneidend. n Käfer dieser Familie geben durch Reiben hilbes an den Flügeldecken einen knarrenden ich.

Der Blattkäfer (*Chrysomelina*). Körper, meist hoch gewölbt; Kopf wenig frei; Füße; Fühler fadenförmig, meist efgliederig. gewöhnlich zweispitzig; Taster kurz. Fuß- ist gezähnt. Die meist metallisch gefärbten attkäfer der Bitterpappel, *Lina tremulae*, (Fig. 20) leben nebst ihren Larven, meist ihren Larven, welche deutlich entwickelte Beine meist warzig, mit Dornen besetzt und viel- b, vorzugsweise von den grünen, saftigen Blättern und Sprossen, der Blattpflanzen sie oft große Verheerungen anrichten. den haben die Eigenthümlichkeit, ihre Ez auf ihrem eigenen Rücken aufzuhäufen, cheint, zum Schutze, so z. B. die be- selhaftesten Larven des schön feuerrothen Li- (*Crioceris*); andere machen sich selbst Ge- diesem Stoffe. Die abgebildete, grün ober llich glänzende Art findet sich in größter auf Pappeln und Weiden. Zu dieser Fa- ren auch die so schädlichen Erdföhe (*Mal- line* Käferchen mit auf der Stirne sehr nahe lebenden Fühlern und did geschwollenen en, die wie Flühe springen, aber auch sehr l, und deren Larven die Blätter unserer Ge- em miniren.

Vierte Gruppe (Trimera).

rei deutlich erkennbare Tarfalglieder Weinpaaren.

Der Schwammkäfer (*Endomychida*). Kör- Kopf klein; Halschild in Form eines Tra- hler länger als Kopf und Halschild zusam- men, an der Spitze meist knospartig verdickt. Schild viel schmaler als die Flügeldecken. Palpen nicht beiförmig endend. Hinter- voneinander abstehend. An den Tarsen Glieder; das vorletzte meist lappig. Meist er, die in Pilzen und Schwämmen leben, auch die kurzbeinigen Larven finden. Die z, stark vergrößerte Art (Schwammkäfer, *na bovistae*, Taf. 26, Fig. 21) lebt im gif- tigt.

Der Marienkäfer (*Coccinellida*). Körper ch gewölbt, unten platt; Kopf klein, frei; urz, fadenförmig oder gering keulenförmig; er groß, mit beiförmigem Endgliede. Hals- t, kurz; Füße kurz, dreigliederig; vorlestes d tief gelappt Beim Verhären lassen sie uren gelben Saft aus den Jugen der Beine en. Lebendige Käfer (Marienkäfer, *Cocci-* empunctata, Taf. 26, Fig. 22), die gern flie- h, wie die langbeinigen, langhaarigen, röbri- gen von Blattläusen nähren, die sie in Menge

Ordnung der Hautflügler oder Immen (Hymenoptera).

Insekten mit beißenden Mundtheilen, ring- förmigen, am Rücken verwachsenem Prothorax und häutigen, gleichartigen Flügeln. Voll- kommene Verwandlung.

Die Insekten, welche dieser Ordnung angehören, lassen alle deutlich die drei großen Abtheilungen des Körpers, Kopf, Brust und Hinterleib, und meist selbst in der Art getrennt wahrnehmen, daß diese Stüde durch Stiele miteinander verbunden sind. Der Kopf (Bienenkopf, von vorn gesehen, Taf. 26, Fig. 23. Man sieht die Stirne mit den drei Nebenaugen und den seitlichen großen Augen. a Fühler; e Kinnladen (Mandibeln); f Oberlippe; h Kinnladen (Maxillen); d Lippentaster; c Zunge) ist meist viel breiter als lang und so gestellt, daß die Mundwerkzeuge senkrecht nach unten schauen; die Fühler sind von mittlerer Länge, wol niemals länger als der Körper, meist borsten- förmig oder gekniet, selten keulenförmig und nur bei wenigen Gattungen gekniet oder gefägt. Die zu- sammengesetzten Augen stehen stets an der Seite des kopfes und sind meistens bei den Männchen viel größer, als bei den Weibchen, sodas sie sich manchmal auf dem Scheitel berühren. Auf der Stirn, in dem Raum zwischen den Fühlern und den Augen, stehen drei kleine kugelige Nebenaugen, welche nur äußerst selten bei ungeflügelten parasitischen Gattungen fehlen. Die Mundwerkzeuge bestehen bei allen Hautflüglern aus einer ziemlich kleinen Oberlippe und aus zwei starken, in ihrem ganzen Umfange hornigen Kiefern, welche meistens auf ihrer innern Fläche gezähnt sind, und zwar in der Weise, daß die Zähne ineinander- passen. Die Kinnladen sind meist schwach, häutig, oft so sehr verlängert, daß sie eine Art Scheide um die dann gleichfalls verlängerte Zunge bilden; ihre Taster sind stets deutlich, oft stielförmig verlängert. Die Unterlippe ist stets groß, ihre Taster deutlich, und in den meisten Fällen erscheint sie doppelt gespalten und ihr mittlerer Theil, die Zunge, mehr oder min- der verlängert und beweglich, während die Seiten- theile (Paraglossae) als Nebenanhänge sich zeigen. Die meisten Hautflügler bedienen sich dieser Zunge und der daran angelehnten Kinnladen als eines Schöpf- rühfels, um süße Pflanzensaft, namentlich Honig, aus den Blumen zu saugen, und man hat deswegen auch wol gesagt, daß bei ihnen die Zunge zum Saug- organ umgewandelt sei. Indeß scheint ein wahr- haftes Saugen durch Herstellen eines luftleeren Raums in der That bei den Hautflüglern nicht stattzu- finden; sie gebrauchen vielmehr ihre Zunge etwa in ähnlicher Weise zum Schlappen, wie die Hunde sich der ibrigen beim Saufen bedienen.

Die Brust besteht immer aus drei deutlichen, eng miteinander verbundenen Ringen, von denen indessen der erste meist nur sehr klein, der zweite nur selten verlängert oder mit Spitzen bewaffnet ist. Die vier Flügel sind in ihrer Structur gleich, oft von sehr zierlichen, nefförmigen Adern durchzogen, die aber in manchen Fällen den Unterflügeln gänzlich und den Vorderflügeln bis auf einige Kubimente fehlen. Die Vorderflügel sind stets weit größer als die Hinter- flügel. Bei vielen Gattungen fehlen den Weibchen, oder den Geschlechtslosen, die Flügel gänzlich; bei andern fallen sie nach dem Begattungsgehefte ab oder werden sogar von den Thieren selbst entfernt. Die Füße sind meist schlank und dünn, die Tarsen stets aus fünf Gliedern zusammengesetzt, und meist zwischen den beiden Endklauen ein kleiner mittlerer

ten Stellen behaart, was zur Sammlung staubes benutzt wird, der bei den einen unterfüßen (Apis, Bombus, Anthophora, locopa), bei andern an dem Bauche (Osmia, Anthocopa, Anthidium), bei andern t (Panurgus, Andrena, Halictus, Ancyra, sammelt, geballt und so nach Hause ge- . Bei allen einsam lebenden Bienen nur zweierlei Individuen, Männchen und während bei den geselligen verkleinerte Geschlechtslose oder Arbeiter vorkommen, hauptsächlich die Einsammlung der Vorräthe rge für die Jungen obliegt.

nsart der verschiedenen Bienen zeigt sehr Verhältnisse. Es gibt eine Gruppe (Psilothermus, Melicta, Nomada), deren Lar- nahrung von Honig und Blumenstaub and- , ohne daß die Mütter im Stande wären, sammeln und einzutragen. Die zu dieser öbrigen Gattungen legen ihre Eier in ähn- e wie die Goldwespen in die Nester der enen, besonders der einsam lebenden, und entstehenden Larven, die sich weit schneller als der rechtmäßige Bewohner, zehren die selben bestimmte Nahrung auf und weihen dem Hungertode. In einer andern Gruppe Anthophora, Macrocera, Meliturga) bauen en eigentliche Nester, die aus einem Haufen t bestehen, deren jede zum Wohnsitz einer mmt ist. Jede dieser Zellen wird mit einem ichen Brei, der aus Honig und Blumen- nmengenehlet ist und der Larve bis zu ihrer n hinreichende Nahrung bietet, angefüllt, wird dann, nachdem ein Ei hineingelegt n und die Larve ihrer weitem Entwickel- assen. Die meisten dieser Nester werden in oder in Mauern angelegt (Colletes, An- egachilus, Panurgus, Halictus) und die s einem erhärteten Leige gebaut, den die erst mit ihren Kinnbäden durcharbeiten und den Weinen und dem Munde formen. An- ngen, die man Mauerbienen genannt icodoma, Osmia, Heliades, Chelostoma), u ihren Nestern den Mörtel der Mauern, en außerordentlich harte klumpenartige Ge- welche etwa wie Schwalbennester an Mauern en angelegt werden und wo zuweilen die t hierlich geschnittenen Pflanzenblättern aus- werden. Megachila. Noch andere (Centris, bohren in altem Holze einen Gang, an e sich die in verschiedenen Stodwerken über- enden Zellen befinden.

essig lebenden Bienen (Apis, Meli- bus) sind die einzigen, welche ein wahres n dem ersten Larvalstadium des Hinterfüßes n welchem die sogenannten Höschchen, d. h. ten Klumpen geballte Ladung von Blumen- ch Hause getragen werden. Ihre Gesell- n bald jäbzig, wie diejenigen der Hummeln, end, wie die der Honigbienen, und ihre en sich stets dadurch aus, daß die für die ehmten Zellen nur aus einem eigentüm- sonderungsstoffe, dem Wachs, gebildet wer- des Wachs wird in dünnen Blättchen zwischen enen des Hinterleibes an bestimmten Stellen t, dort hervorgezogen und mittels des Spei- eicht und verarbeitet.

ummeln bauen die unregelmäßigsten Nester. uchtete Weibchen gräbt eine Vertiefung in die e breit und wenig tief ist, und übermöbt diese

Höhlung mit einer Moosbede, welche sie innen mit einer dünnen Wachsschicht ankleidet. Sobald dies Nest einige Ausdehnung erlangt hat, so trägt die Hummel Honig und Blumenstaub ein, den sie zu einem Leige verarbeitet und zu unregelmäßigen Kugeln ballt; in diese Masse legt sie die Eier, und während die bald ausgeklüpfte Larven innen fressen, fügt das Weib- chen von außen stets neue Massen von Futter hinzu, sodaß der unregelmäßige Haufen einer Trüffel nicht unähnlich sieht. Die Larven verpuppen sich nun, in- dem sie sich Zellen spinnen, welche einem Fingerbute nicht unähnlich sehen; aus den Puppen kommen kleine Weibchen hervor, welche ihrer Mutter sogleich in den Arbeiten helfen, indem sie die unterdes herangewachsenen Larven füttern und die übrigen leergewordenen Finger- hutzellen mit Honig füllen. Aus den gefütterten Lar- ven entstehen kleinere Männchen, und Weibchen, die sich begatten und von denen nachher die Weibchen ebenfalls bei den Arbeiten helfen; erst gegen das Ende des Sommers werden diejenigen Eier gelegt, aus denen die Männchen und Weibchen der großen Kasse hervor- kommen, welche bestimmt sind, die Art über den Winter fortzupflanzen. Sobald die Individuen dieser größern Kasse sich begattet haben und die Kälte beginnt, so löst sich die Gesellschaft auf; die noch vorhandenen Larven und Puppen werden aus den Zellen heraus- gerissen und umgebracht; die Individuen der kleinern Kasse sowie die Männchen kommen vor Hunger und Kälte um, und die überlebenden Weibchen der größern Kasse gründen im Frühjahr eine neue Gesellschaft.

In einem gewissen Gegensatze zu den jährlichen Ge- sellschaften stehen die dauernden Gesellschaften, welche von den Honigbienen und den eigentlichen Ameisen gebildet werden. Die Wohnungen, welche von diesen Thieren errichtet werden, dienen nicht nur zur Erziehung der Jungen während des Sommers, sondern auch zur Herberge der ganzen Gesellschaft während des Winters. Die Gesellschaften der Bienen bestehen immer aus einem einzigen Weib- chen, der sogenannten Königin, aus 600—1000 Männchen, den Drohnen, und aus 15—30,000 verkleinerten Weibchen, den Arbeiterinnen, welche die Sorge für die Jungen und für das Einsammeln der Vorräthe allein tragen. Auch hier wird die Gesell- schaft, welche sich neu bildet, stets nur von dem ein- zigen Weibchen gegründet, das aber sogleich von einer verhältnißmäßigen Anzahl Männchen und Arbeiter be- gleitet wird. Die neuen Bienengesellschaften entstehen im Laufe des Sommers, indem eine gewisse Anzahl von Männchen und Arbeitern, mit einem Weibchen an der Spitze, den Mutterstod verlassen; man nennt dies das Schwärmen. Der erste Schwarm, welchen eine Gesellschaft liefert, wird von den ursprünglichen Bewohnern des Stods gebildet, die darin überwinter- ten, also von einem befruchteten Weibchen und einer Anzahl Arbeiter; sie verlassen den Stod, um ihrer Nachkommenschaft Platz zu machen, und fliegen, in didem Haufen der Königin folgend, so lange umher, bis diese sich irgendwo niederläßt. Die wilden Bienen wählen zu ihrer Ansiedelung die Höcher hohler Bäume; bei den zahmen benutzt man die Niederlassung der Königin, um sie in einen neuen Stod zu fassen. So- bald die Königin sich fixirt hat, so beginnen unmittel- bar die Arbeiten. Zuerst werden alle Rigen und Zu- gänge bis auf ein kleines Flugloch mit einem klebrigen Stopfwachse (propolis) zugeseilt, und dann die Waben begonnen, die aus doppelten Schichten sechsseitiger Zellen bestehen, welche mit den Böden aneinander- stoßen. Die Waben sind an der Decke des Stodes senkrecht aufgehängt und durchweg aus Wachs gebaut,

welches sich in dünnen Blättchen zwischen den Schienen des Hinterleibes bildet und von der Biene mittels der Kiefer und der Füße verarbeitet wird. Die süd-amerikanischen Honigbienen (*Melipona*) bilden dagegen aufrecht stehende, kegelförmige Zellen, ähnlich den Amphoren, welche sie mit Honig füllen und mit engem Halbe und Deckel schließen. Zugleich mit dem Bau der Waben beginnt das Eintragen des Honigs, den die Biene in ihrem Saugmagen nach Hause bringt und durch Erbrechen in die Zellen entleert, und des Blütenstaubes, der in der Form von Häuschen an den Hinterbeinen getragen wird und innerhalb des Stocks zu einer eigenthümlichen Masse, dem sogenannten Bienenbrote, verarbeitet wird, das besonders zur Nahrung der Larven dient. Sobald die Waben und ihre Zellen einigermaßen im Baue vorgerichtet sind, so beginnt die Königin, die noch von dem vorigen Jahre her befruchtet ist, das Eierlegen. In jede Zelle wird ein Ei an den Boden geheftet; anfangs legt die Königin nur Arbeiter-eier, nach einiger Zeit aber werden Zellen gebaut, welche um zwei Drittel größer sind als die gewöhnlichen Vorraths- und Arbeiterzellen, und in denen die Drohnen sich entwickeln. Nach den Drohnenzellen erst bauen die Arbeiter einige wenige Zellen, höchstens sechs bis zehn, von der Form einer Flasche oder einer langgestreckten Birne, die irgendwo an die Waben angeheftet werden, senkrecht mit der Öffnung nach unten schauen und zur Erziehung von Königinnen bestimmt sind. Eine einzige solche Zelle enthält etwa so viel Wachs als hundert Arbeiterzellen. Die Königin legt zuletzt in jede dieser Zellen ein einziges Ei. Sie lebt vier bis fünf Jahre. Die Eier entwickeln sich mit verschiedener Schnelligkeit. Die wurmartige Larve schlüpft nach drei Tagen aus; die ganze Entwicklungszeit von dem Legen des Eies an bis zum Auskriechen der vollkommenen Biene beträgt für eine Königin 16 Tage, für eine Arbeiterin 20 Tage, für eine Drohne 24 Tage, und die Unterschiede sind hauptsächlich durch den Puppenzustand bedingt, der bei der Königin 8, bei der Arbeiterin 11, und bei der Drohne 14 Tage dauert. Während der Larvenzeit werden die kugelförmigen Würmchen von den Arbeiterinnen sehr sorgsam gefüttert, und die Zelle, sobald sie sich verpuppen, mit einem Wachsdeckel geschlossen. Die dem Auskriechen nahe junge Königin bringt einen eigenthümlichen Ton hervor (Lüten); sobald dies gehört wird, versammelt die alte Königin einen Theil des Volks und wandert aus, um einen neuen Hausstand zu bilden (Schwärmen). Die erste der auskriechenden Königinnen tötet sogleich nach ihrer Geburt die noch in der Zelle eingeschlossenen weiblichen Puppen und bleibt fortan an der Spitze der Gesellschaft; schlüpfen mehrere Weibchen zugleich aus, so kämpfen sie so lange untereinander, bis eine überlebt; ist aber unglücklicherweise die alte Königin durch schlechtes Wetter an Schwärmen verhindert worden, bevor die jungen Königinnen auskriechen, so werden diese letztern von ihr ohne Gnade umgebracht, ohne daß die Arbeiter sich widersetzen. Geht durch irgendeinen Zufall die Königin zu Grunde, ohne daß Larven oder Puppen im Stode vorhanden sind, so bilden die Arbeiter sich dadurch eine neue Königin, daß sie eine Arbeiterlarve, die noch nicht drei Tage alt ist, in eine königliche Zelle bringen und mit königlichem Futter nähren; in diesem Falle entwickeln sich die Geschlechtstheile, während dieselben bei dem gewöhnlichen Arbeiterfutter rudimentär bleiben. Die junge Königin verläßt bald nach ihrem Auskriechen in Begleitung der Drohnen den Stod, begattet sich, wie dies die meisten Hautflügler thun, hoch oben in der Luft, kehrt dann in den Stod zu-

rück und legt nun Eier in derselben. Erst Arbeiter-eier, dann Drohnen-eier, dann Königinnen. Die Puppen der letztern zur Zeit des Auskriechens von den Larven und die Königin von ihrer Fütterung. Sobald sie dies bemerkt, verläßt sie die Arbeiter den Stod und bildet einen neuen Stod, indem sie während des ganzen Jahres Eier legt, bis zum nächsten Frühling. Der Kreislauf der Erscheinungen beginnt, wie hier beschrieben. Während des Sommers arbeiten in den Bienenstöcken auf im Monat August, werden sämtliche die der Gesellschaft angehören, her umgebracht.

Die Familie der Wespen (*Vespa* *vulgaris*, Taf. 26, Fig. 28) theilt mit den Bienen ihre Geselligkeit in Bienenbau. Es kommen bei ihnen nur Arbeiter und Männchen, keine sogenannten Königinnen; dagegen legen bei einigen Gattungen (wie bei den unbefruchteten Weibchen im Sommer) sich Weibchen entwickeln. Die Arbeiter legen und füttern die Larven mit Honig auf; es finden sich indeß auch Gänge zu den Grabwespen, daß eine (*Odynerus*, *Masaris*, *Synagra*) die ganz neuen Nester mit lebenden Insekten besetzt. Der Kopf der Wespen ist meist kurz, nach dem Ende hin etwas verdickt, aber sehr kräftig, fast ebenmäßig abgestuft und mit vier Zähnen und Zunge kurz, beinahe hersförmig; die Antennen sind sehr kräftig, fast ebenmäßig abgestuft und mit vier Zähnen und Zunge kurz, beinahe hersförmig; die Schienen der Hinterbeine sind aber ohne irgendwelche Erweiterung. Die Oberflügel werden der Länge nach in zwei Falte, ein Charakter, welcher nur die Wespen hat. Die Gesellschaften der Wespen sind diejenigen der Hummeln, zu den Sommeren die sich im Winter auflösen und in den befruchteten Weibchen, welche die Winter überstanden haben, bestehen. Die Nester der Wespen sind meist fertig, das von der Wespe ausgebaut wird, und wovon sie Stücken anlebt und dann mit der Zunge glättet. Nester der gewöhnlichen Wespe, die in räumigen Höhle unter der Erde angelegt wird, die Hornisse das ihre in hohle Stämme. In Arten es ganz frei an einem Stiele stehen sich vier bis zehn horizontale Runden, die aus Schicht sechsediger senkrechter Zellen besteht, bekanntlich in den Bienenstöcken die aus zwei Schichten horizontaler Zellen mit den Böden aneinanderstoßen. In den Nestern sind die horizontalen Waben durch Räume getrennt, welche den Wespen zum Umhergehen, und die Festigkeit durch Pfeiler hergestellt, welche die einzelnen Waben miteinander verbinden. Das Nest enthält stets nur wenigen Larven, da die Larven unmittelbar mit dem Wachs, was die Wespen von ihren Auskriechern sammeln gewöhnlich Honig, süßen Früchten, greifen aber auch an, die Honig sammeln, wie namhafte Fliegen; in der Noth begnügen sie mit andern Insekten und sonstigen Nahrung, besonders Fleisch, welches sie ihren Larven. Diese haben im Gegensatz zu den Bienen

Welche denen der vollkommenen Insekten ähnlich und mit welchen sie an den Wänden ihrer Zellen, sobald sie Hunger empfinden.

der Grabwespen (*Crabronida*). Nur die Weibchen, keine Gesellschaften. Flügel kurz, meist reich geadert. Kopf breit; Fühler beiden Geschlechtern gleich lang. Kiefertaster kurz, Lippentaster viergliederig. Schenkel glatt, die der meist langen Hinterbeine gewöhnlich, so daß sie leicht graben können. Prothorax. Die abgebildete Art (*Sandwespe*, *Am-sabulosa*, Taf. 26, Fig. 29) sehr häufig an Orten.

der Wegwespen (*Pompilida*). Unterschied von der vorigen nur durch die langen Beine beim Weibchen kürzer sind als beim Männchen, durch den seitlich nach hinten bis zur Flügelverlängerung Prothorax. Die abgebildete Art (*Wespe*, *Pompilus viaticus*, Taf. 26, Fig. 30) den Wegen.

Familien, die man deshalb auch oft unter gemeinsamen Namen der Grabwespen zählt, haben dieselbe Lebensart und Sitten. Die einsamen, niemals in gemeinsamen Nestern Gemeinschaft; beide Geschlechter sind vollkommen unabhängig und die Weibchen tragen Sorge, den an geschützten Orten lebenden Larven die bis zur Nahrung nötige Nahrung beizugeben, welche aus lebenden Insekten besteht. Die meisten Wespen bohren zu diesem Zwecke Gänge in die Erde oder in Holz, wo sie der Larve nebst ihrem Nest bereiten; andere mauern selbst mit Lehm oder Mörtel förmliche Zellen auf, in welchen die Larve verborgen ist. Der Proviant, welchen diese Wespen ihren Larven begeben, besteht aus lebenden Insekten und Larven aller Ordnungen, sowie auch aus Pflanzen, welche in dem Neste aufgeschichtet und von der sich entwickelnden Wespenlarve verzehrt werden. Eine jede Grabwespe verproviantiert nur mit einer bestimmten Art von Thieren, während die einen sich mit leichter Mühe der Nahrung oder Larven bemächtigen, die ihnen keinen Widerstand entgegensetzen können, so kostet es den anderen oft einen harten Kampf, bevor sie eine Biene, eine Fliege oder gar eine Küchenfliege überwältigt. Meist siegen diese Wespen durch Ueberraschung, indem sie plötzlich auf ihre Beute losstürzen, die im Schrecken regungslos stehen bleibt und ehe sie sich bewerkstelligen kann, von den scharfen Mandibeln der Wespe an dem Kopfe gepackt wird. In dem Augenblicke biegt die Grabwespe ihren Hinterleib unter den Bauch der Beute und stechen in einen Stachel an irgendeiner weichen Stelle ein. Die Wundung hat unmittelbar eine eigenthümliche Wirkung des Betörfens zur Folge; das gestochene Insekt meißtens noch seine Beine schwach bewegen, ist sonst in einem Zustande, wie wenn es in Schlaf versunken wäre, so daß es ihm unmöglich ist, sich zu wehren, zu gehen oder irgendeine willkürliche Handlung auszuführen. In diesem gelähmten, willenlosen Zustande bleiben die getroffenen Thiere nicht nur mehrere Wochen- und monatelang am Leben und sind sich frisch und weich, ohne einzutrocknen, so daß die Wespe, welche sie verzehren soll, die gehörige Nahrung aus ihnen ziehen kann, während sie doch unversehrt, dem unbehüllichen, fußlosen Wurme, welcher aufsteigt, auch nur den mindesten Widerstand entgegensetzt.

Familie der Goldwespen (*Chrytida*) besteht aus kleinen, didleibigen Wespen, deren runder Hinter-

leib meist abgeplattet und auf der untern Fläche so ausgehöhlt ist, daß das Insekt ihn wie ein Schild unter die Brust schlagen und auf diese Weise sich förmlich zusammenklappen kann. Der so gebildete Hinterleib scheint nur aus drei Ringeln zusammenge-
setzt, da die übrigen hintern Ringel nach innen eingezogen sind. Die Fühler der Goldwespen sind gegliedert und aus dreizehn Gliedern zusammenge-
setzt, von denen das erste sehr lang ist und den Stiel der Fühler bildet. Die Aeren der Flügel sind meist sehr unvollständig entwickelt; die Legeöhre ist nur kurz, aber dick und stark, so daß die Thiere empfindlich damit stechen können; da sie aber nicht in Verbindung mit einem Giftbläschen steht, so ist auch dieser Stich bei weitem nicht so empfindlich oder bössartig, als derjenige der eigentlichen stacheltragenden Hautflügler, zu welchen die Goldwespen den Uebergang bilden. Die Larven der Goldwespen, soweit man sie bis jetzt beobachtet hat, leben hauptsächlich in den Nestern der Grabwespen und der einsamen Bienen, deren Larven sie auffressen. Die Goldwespen schleichen sich in diese Nester ein, indem sie den Augenblick abpassen, wo die Biene oder Grabwespe sich entfernt, um Provision zu holen; die Goldwespe legt dann ihre Eier an Stellen, wo sie von der heimkehrenden Erbauerin des Nestes nicht leicht entdeckt werden können; oft indeß werden sie bei diesem Geschäft von jener überrascht und mit äußerster Wuth angegriffen, wo ihnen dann die Fähigkeit, sich zusammenzuklappen, ein vortreffliches Vertheidigungsmittel bietet.

Familie der Wespenameisen (*Heterogyna*). Die vollkommenen Insekten sind groß, stark behaart, namentlich an den kurzen dicken Beinen, und haben kurze, an der Spitze verdickte Fühler, die besonders beim Weibchen sehr kurz sind. Der Stiel des eiförmigen Hinterleibes erscheint so kurz, daß besonders beim Männchen der Hinterleib unmittelbar an der Brust angefügt scheint. Die Weibchen sind entweder, wie bei den Gartenwespen (*Scolia*), geflügelt, aber in Form und Farbe von den Männchen verschieden, oder wie bei Mutilla und ähnlichen Gattungen, gänzlich ungeflügelt und so sehr von den Männchen verschieden, daß man sie sogar andern Familien zuteilte. Die einzige Art von *Scolia*, deren Haushalt bis jetzt beobachtet wurde, sucht die Larve des Nashornkäfers, welche hauptsächlich in Gartenerde lebt, an ihrem Wohnorte auf und lebt ihr, aber ohne sie zu stechen ein Ei auf den Rücken, aus dem später die Larve hervorgeht, welche den Engerling des Nashornkäfers auffrisst, der so groß ist, daß er zwei Larven der Gartenwespe genügende Nahrung bieten könnte.

Die Weibchen der in Europa lebenden Mutillen (*Spinnenameise*, *Mutilla europaea*, Taf. 26, Fig. 31) gleichen in der Gestalt großen Ameisen und halten sich, wie ihre Larven, in Hummelnestern auf.

Familie der Ameisen (*Formicidae*). Die Ameisen leben in ständigen Gesellschaften, welche aus stets geflügelten Männchen, aus zur Begattungszeit geflügelten Weibchen und aus stets ungeflügelten Arbeitern zusammenge-
setzt sind. Der Kopf dieser Thiere ist dreieckig, durch einen Stiel von der Brust getrennt, mit scharfen, massiven, auf der innern Fläche gezähnelten Kiefern versehen; die Augen sind klein, meist rund; die Fühler geißelförmig gegliedert, das erste Glied lang und gerade, das Ende aus vielen kleinen Gliedern zusammenge-
setzt. Die Brust erscheint lang, zusammenge-
drückt; der Hinterleib besteht, und zwar ist dieser Stiel entweder aus einer Schuppe oder aus einem bald einfachen, bald doppelten Knoten gebildet. Viele Ameisen besitzen einen Stachel, andere aber geht der-

selbe ab und sie besitzen dafür die Fähigkeit, die in der Giftblase enthaltene Flüssigkeit, wasserfreie Ameisensäure, eine Strecke weit zu spritzen. (Gelbe Ameise, *Formica flava*, a Arbeiterin, b Männchen, Taf. 26, Fig. 32; braune Waldameise, *Formica herculeana*, Fig. 33 Weibchen, Fig. 34 Arbeiterin.)

Die Gesellschaften der Ameisen haben einen noch verwidelteren Hausbau als die der Bienen. Die meisten dieser Thiere bauen sich unter der Erde an, indem sie Gänge, Zellen und Kammern ausböhlen und mit verhärtetem Lehm überwölben. Auch diejenigen Wohnungen, welche über der Erde, hauptsächlich aus Holz zusammengetragen sind, besitzen einen unterirdischen Theil, in welchen sich die Ameisen bei drohender Gefahr oder im Winter zurückziehen. Alle Gesellschaften bestehen aus geflügelten Weibchen, kleineren Männchen und noch kleineren ungeflügelten Arbeitern; meistens unterscheidet man bei diesen letztern zwei Klassen, eine größere, welcher die Vertheidigung der Wohnung obliegt, und eine kleinere, der die speciellen Arbeiten des Hausbaues zufallen. Bei den amerikanischen Wanderameisen bestehen die zahlreichen Truppen, die in langen Colonnen marschiren, nur aus kleinen Arbeitern; die Individuen der größeren Rasse marschiren ganz in ähnlicher Weise wie Offiziere zur Seite der Colonnen, und man sieht sie häufig auf überragende Zweige oder Blätter klettern und von diesem erhöhten Standpunkt aus den Zug der Truppen aufmerksam beobachten.

Die Ameisen sammeln durchaus keine Vorräthe ein, sondern fallen im Winter in eine Art Schlaf, während dessen sie keine Nahrung zu sich nehmen. Während der Sommerszeit nähren die Arbeiter nicht nur sich, sondern auch die Larven, die Weibchen und die Männchen, welche alle unthätig sind, mit allen möglichen organischen Stoffen, besonders aber mit süßen Pflanzensäften, die ihnen namentlich durch die Blattläuse verschafft werden, indem diese auf dem Hinterleibe zwei Röhren besitzen, aus welchen von Zeit zu Zeit ein süßer Honig quillt, welchen die Ameisen sehr begierig auflecken. Die Blattläuse werden von den Ameisen mit der größten Sorgfalt behandelt, von abgestorbenen Zweigen und Sprossen auf frische, lebende Blätter verpflanzt und mit den Fühlhörnern so lange geliebkost, bis sie Honigsaft von sich geben. Die meisten Arten von Ameisen bauen von ihrem Neste aus bedeckte Wege, wahre Kunststraßen, nach den Bäumen und Sträuchern, auf denen sich die Colonien ihres Nektaries befinden; andere bringen selbst solche Blattläuse, welche an Wurzelstöcken hausen, in ihre Nester, wo sie sie den Winter über halten. Außer der Sorge für die Nahrung und Fütterung der übrigen Glieder der Gesellschaft bestehen die hauptsächlichsten Beschäftigungen der Arbeiterameisen noch besonders in der Wartung der Puppen, der sogenannten Ameisen Eier, welche sie beständig zwischen ihren Kiefern umher schleppen, um sie bald an die Sonne, bald tiefer hinab in die Gänge zu tragen, sowie in der Sorge für das Haus, dessen Zugänge am Morgen geöffnet, am Abend aber regelmäßig geschlossen werden.

Einige Arten von Ameisen zeigen noch verwideltere Verhältnisse in ihrem Haushalte. Die geschlechtslosen Individuen der blutrothen und der röthlichen Ameise (*Polyergus*), welche in unsern Gegenden vorkommen, arbeiten selbst nicht, sondern machen nur förmliche Krieggzüge, um die Stöcke anderer Ameisen zu überfallen und die Puppen der Arbeiter daraus zu rauben. Meistens ist ihre Taktik die, daß sie plötzlich einen benachbarten Ameisenhaufen überfallen, und wenn seine Bewohner sich zur Wehre stellen, mit der Hauptmasse

eine förmliche Schlacht liefern, während im Hausen die Flügel des Feindes ungenutzt im Stod desselben auspländern. Das Schicksal eines solchen Kampfes mit Leichen bedeckt, beissen sich mit der größten Erbitterung, Verwundeten und Kampfunfähigen werden die Freunde aus dem Getümmel an sich hergeschleppt. Die geraubten Puppen entwickeln sich in der Wohnung der Räuber und versehen die scheinbaren Sklavendienste, indem sie allein alle Arbeiten des Haushaltes übernehmen, ihre unthätigen Herren und deren Larven besorgen. So entstehen gemischten Ameisengesellschaften, in welchen Individuen existiren: Männchen, Weibchen und fortpflanzende Individuen (sogenannte Amazonen) in Art, und arbeitende Sklaven einer andern Art.

Die Gründung neuer Ameisengesellschaften erfolgt in folgender Weise: Im August verlassen die Schwärme geflügelter Männchen und Weibchen am Nachmittag die Stöcke und begatten sich. Die Männchen sterben fast unmittelbar nach der Paarung; die meisten Weibchen werden von den Arbeitern eingefangen und in den Stod getragen, wo sie besonders im nächsten Frühjahr die neuen Colonien gründen. Die nicht eingefangenen befruchteten Weibchen suchen zuerst die Flügel aus, welche sehr leicht abfallen, und böhlen dann einen Eingang in die Erde aus, dem sie Kammern beifügen, in welchen sie ihre Arbeiter legen. Sobald diese sich entwickelt haben, helfen sie ihrer Mutter bei ihren Arbeiten, und mit ihr und führen dann im nächsten Jahr die Wirthschaft weiter, während das Weibchen in ähnlicher Weise, wie bei den Bienen, fort mit Eierlegen beschäftigt, und auch die Nachfolge beibehält, indem es erst Arbeitererzeuger, dann Weibchen und schließlich Eier legt.

Gruppe der Bohrwespen (Terebrantiden)

Das Weibchen besitzt einen von zahlreichen Klappen umgebenen Legebohrer (Terebra), der nicht ganz in den Stod eingezogen werden kann und oft sehr weit ausragt.

Außerordentlich zahlreich ist die Familie der schlupfwespen (Ichneumoniden), die einen langen, schmalen Körper, kleinen, ovalen Brust und langen Hinterleib haben. Der Hinterleib ist sehr dünn gestielt, bald auch mit einer breiten Aussackung. Die Fühlhörner sind meist borstenförmig, selten gezähnt oder leuchtend, bei dem lebenden Insekten fast beständig in vibrierender Bewegung; die Mundtheile sind sehr schwierig unterscheiden, die Kiefer sind meist zahnig, die Unterlippe sehr klein, ihre Glieder, während die Labentaster fünf Glieder von denen das zweite breit und dreieckig ist. Die Flügel besitzen sehr wohl ausgebildete Adern, die Füße sind meist sehr lang, dünn, zum Springen tauglich. Die Legebohrer sind ordentlich in ihrem Verhältniß zum Körper. Die Gattungen ist sie kaum sichtbar, bei andern besonders ihre Eier in die Larven gebend. Die flügel legen und hierzu die Nesthöhlen bohren müssen, ungemein lang, ja selbst die ganze Körperlänge. Sie besteht aus zwei Theilen, einer Scheide und einem mittlern Stiel, aus dem wieder aus einer Galbrinne und zwei Stachelborsten zusammengesetzt ist, die das Bohrinstrument bilden. Man hat in dieser zahlreichen Familie, welche nur in Deutschland

ten zählt, einige Unterfamilien unterscheiden, erwespen (*Evania*) mit sehr langer Lege- dünngefieltem, meist auf dem Mittelfüßchen dem Hinterleibe; die eigentlichen Schneu- mit zwei, und die Braconiden mit nur lauten Nerven in den Oberflügeln. Die upe des Kiefernswärmer als Larve lebende a wesppe (*Microgaster nemorum*, Taf. 26, ehört zu dieser Gruppe.

milie der Schwanzwespen (*Proctotru- recht zum größten Theil aus sehr kleinen, fast chen Insekten (Kleinschlupfer, Teleas tero- 26, Fig. 36), welche durch den Mangel nerven und die häufig verdickten Beine, so- die Structur der Mundtheile der vorigen nahe stehen, sich aber von ihr durch die niemals geschnittenen Fühler, den Mangel einer an dem Kopfe und die meist matten, arden des Körpers unterscheiden. Die Lege- tur bei wenigen zurückgezogen werden, ie nur den meisten Gattungen frei hervor- arven leben besonders in Eiern von andern sowie in den Larven von Zweiflüglern.*

der Springwespen (*Chalcididae*). Meist Schlupfwespen, mit schmalem, querm Kopfe n Fühlern von wechselnder Gliederzahl und ie aber stets gebrochen oder geschnitten, am lenförmig gesägt oder gefiedert sind und es, stielartig verlängertes Glied in einer der Stirn geborgen werden kann. Die ue sind denen der vorigen Familie sehr mit Ausnahme der Unterlippe, welche lang it und mit einem breiten runden Lappen e Brust ist meist hochgewölbt und budefig, leib rund und mit einem kurzen Stiele an efestigt. Die Flügel haben meist gar keine der nur einen kurzen Randnerven, der quer gefläche hineingeht und plötzlich endet. Bei en Gattungen sind die Hinterschenkel sehr nd oft mit Spizen und Dornen versehen; icken sind vollkommen flügellos; ihre Lege- meistens ziemlich lang, gerade und wird bei en in dem Bauche verborgen, bei andern artig über die Rückenfläche des Hinterleibes ie Insekten sind meistens fast mikroskopisch, lebhaft glänzenden Metallfarben gezier, und sich oft zu Hunderten und Tausenden, selbst ern anderer Insekten.

nn die bisher abgehandelten Familien unter nsamen Namen Schlupfwespen zusammen- a sie alle eine gemeinsame Lebensart und n- industrie besitzen. Die Weibchen legen näm- Eier entweder in die Nester oder unter die erer Insekten, und die Larven nähren sich von der Körpersubstanz der Thiere selbst, bewohnen. Besonders häufig sind die Lar- der Insekten, die Raupen der Schmetterlinge n Angriffen der Schlupfwespen ausgefressen wird von dem Weibchen mittels der spizen in einem Nu unter die Haut der Raupe , und die austretende fußlose Larve nährt ivers von dem Fettkörper der Raupe, ohne Leben nöthigen Organe anzugreifen. So denn häufig, daß die Raupen, welche nicht e Bewohner dieser Art beherbergen, noch ft genug besitzen, um sich in Puppen zu ln, daß die Parasiten sich dann im Innern pe ebenfalls verwandeln, und daß endlich s Schmetterlings eine oder mehrere Schlupf- us der Puppe hervorbrehen. Indes werden

nicht nur die Raupen der Schmetterlinge, sondern auch Larven, Puppen und vollständige Insekten aller Ordnungen von den Schlupfwespen angegriffen; ja man kennt einzelne Gattungen, deren Larven sogar auf Kosten schon parasitisch lebender Larven sich ernähren. So legt die Gattung *Hemiteles* ihre Eier nur in die Larven von Schlupfwespen, welche schon im Innern von Schmetterlingsraupen schmachtet, namentlich solcher aus der Familie der Braconiden; und während die Braconidenlarve den Fettkörper der Raupe verzehrt, wird ihr eigener Fettkörper wieder von der Larve des *Hemiteles* aufgefressen. In ähnlicher Weise sticht das Weibchen von *Chrysolampus* nur solche Blattläuse an, in denen schon die Larve eines *Aphidius* schmachtet, und weiß mit seiner Legeröhre den Schmarotzer in der Blattlaus so zu treffen, daß das Ei im Innern seines Körpers abgelagert wird. Alle die schmarotzenden Larven dieser Schlupfwespen sind wurmförmig, weich, weißlich, durchaus fußlos oder höchstens mit fleischigen Würschen statt Füßen versehen; sie bilden nadtie Puppen im Innern der Thiere, auf deren Kosten sie lebten, und nur wenige Gattungen spinnen sich eine Art Hülle, zu welcher sie meist Stücke der Raupenhaut verwenden.

Die Familie der Gallwespen (*Cynipidae*) besteht aus einer Anzahl meist sehr kleiner, träger Insekten, die durch eine ungemeine Entwidlung des Bruststücks budefig erscheinen. Der Kopf ist klein, quer gestellt, die Brust breit, hoch, eiförmig, der Hinterleib gewöhnlich rund und durch einen kurzen Stiel mit dem Bruststücke verbunden. Meist ist der Leib an seinem hintern Ende zusammengebrückt und endet dort in zwei Klappen, welche die außerordentlich dünne und feine Legeröhre einschließen. Die Fühler sind gerade, mitten auf der Stirn eingelenkt, aus dreizehn bis funfzehn Gliedern zusammengesetzt, kürzer bei den Weibchen; die Oberlippe sehr klein; die Kiefer kurz, did, am Rande gezähnt; die Kinnladen am Ende mit einem großen, häutigen Lappen versehen; Kiefertaster kurz, funfsgliedrig, Lippentaster rudimentär. Die Flügel sind sehr zart und durchsichtig und zeigen nur sehr wenige, unbedeutende Adern, die sogar bei einigen Gattungen gänzlich fehlen.

Die Gallwespen legen ihre Eier unter die Oberhaut der Pflanzen, in das Zellengewebe derselben, indem sie mit ihrer Legeröhre, die aus einer einfachen Halbscheide und zwei darin verborgenen gezähnelten Vorsten besteht, ein Loch in die äußere Hülle sägen, in welches sie dann ihr Ei einschieben. Die Verwundung erzeugt bei den Gewächsen eine hohle, meist harte Geschwulst, in deren Innern dann die fußlosen Larven leben und sich von dem Marke des Gallapfels nähren. Zuweilen verpuppen sich die Larven im Innern der Galläpfel selbst; andere bohren sich hervor, und verpuppen sich in der Erde. In den meisten Galläpfeln lebt nur eine Larve; es gibt indessen auch Arten, wo man mehrere Hunderte von Larven, Puppen oder Fliegen in derselben Pflanzengeschwulst antrifft. Andere Hautflügler mit langer Legeröhre bringen oft ihre Eier in diese Galläpfel hinein, und die daraus entstehenden Larven fressen die rehtmäßigen Bewohner derselben auf und entwiceln sich auf Kosten derselben. Die Galläpfel der Eichen, welche von einer besonders Art (*Cynips gallae tinctoriae*) hervorgebracht werden, dienen ihres großen Gehalts an Gerbsäure wegen zur Herstellung schwarzer Farbe und besonders der Tinte. Die abgebildete Art (*Rosengall- wesppe*, *Rhodites*, *rossae*, Taf. 26, Fig. 38) bildet den sogenannten Bedegar der Rosen.

Gruppe der Sägewespen (Phytophaga).

Der Legebohrer hat die Gestalt einer Säge. Die Larven nähren sich von Pflanzentheilen.

Die Holzwespen (Uroceridae) haben einen beinahe runden Kopf, der meist der Brust unmittelbar aufsitzt, und einen cylindrischen Körper, an dessen hinterm Ende die sehr starke, sägeförmige Legeröhre hervorsteht. Die Fühler sind sehr lang, borstenförmig, aus vielen kleinen Gliedern zusammengesetzt und oft in der Form von Widerhörnern gekrümmet. Die Mundwerkzeuge bestehen aus zwei dreieckigen, starken, innen gezähnelten Kiefern, zwei rudimentären Kinnladen mit kurzen zweigliederigen Tastern und einer schmalen Unterlippe, die längere viergliederige Taster trägt. Die Flügel sind stängeltig, die vordern weit größer als die hintern, und die Legeröhre der Weibchen außerordentlich stark und gezähnt, so daß sie tiefe Löcher in das festeste Holz bohren können. Die Larven der Holzwespen sind cylindrisch, gestreckt, mit hartem, hornigem Kopfe und sechs kleinen, gegliederten Füßen versehen, so daß sie fast ganz das Ansehen von Käferlarven haben; sie bohren in lebendem Holze und verwandeln sich nach einigen Jahren, nachdem sie sich einen losen Seidencocoon gesponnen haben.

Die Familie der Blattwespen (Tenthredinidae) ist der vorigen in dem erwachsenen Insekten sehr ähnlich, unterscheidet sich aber hauptsächlich durch die oft sonderbar gestalteten Fühler, die bald keulenförmig, bald ausgezeichnet fahrmartig gestaltet sind, ferner durch die sechsgliederigen Kinnladentaster und die weit kürzere Legeröhre, welche indeß ebenso stark und sägeartig gezähnt ist, als diejenige der vorigen Familie. Die meisten Blattwespen sägen die Blätter oder saftigen Stengel mit dieser Legeröhre an, worauf sich diese meist eintrollen und so der jungen Larve Schutz gewähren; die Larven selbst haben einen hornigen Kopf und sechs hornige Brustfüße, sowie falsche Bauchfüße, wodurch sie den Schmetterlingsraupen sehr ähnlich sehen; sie unterscheiden sich aber von diesen gerade durch die Zahl der Afterfüße, indem sie wenigstens deren zwölf haben, ja selbst sechzehn haben können, während die Schmetterlingsraupen nur acht und höchstens zehn falsche Füße besitzen. Außerdem haben diese Afterraupen, wie man sie genannt hat, zwei einfache Augen auf der Stirn und zwei sehr kleine kegelförmige Fühler, die ebenfalls den echten Raupen abgehen; ihre Kiefer sind sehr dick und stark gezähnt; in der Ruhe rollen sie sich meist spiralförmig auf und spritzen, sobald man sie berührt, einen unangenehm riechenden Saft aus feinen, seitlichen Oeffnungen, die unter den Luftlöchern liegen. Alle diese Larven sind äußerst gefräßig, und manche richten an den Blättern der Bäume und Kräuter große Verheerungen an. Die meisten spinnen sich in der Erde oder unter abgefallenen Blättern ein und manche bleiben sehr lange Zeit als Larven in ihren Gespinnsten.

Wir bilden einige besonders schädliche Blattwespen und deren Raupen ab; die, welche die Pflaumen anbohrt (Pflaumen sägewespe, *Tenthredo suvicornis*, Taf. 26, Fig. 39; Raupe der Pflaumenwespe, Fig. 40), die Zerstörerin der Rapspflanzen (Raps sägewespe, *Tenthredo spinarum*, Fig. 41; Raupe der Rapswespe, Fig. 42), die auf Birnbäumen lebende (Birnwespe, *Lyda pyri*, Fig. 43; Raupe der Birnwespe, Fig. 44), und endlich die Getreidewespe (*Cephus pygmaeus*, Fig. 45), deren Larve oft große Verheerungen anrichtet.

Ordnung der Schmetterlinge (Lepidoptera).

Insekten mit saugenden Mundtheilen, welche verwichenem Prothorax, schwarzfarbig beschuppten Flügeln und einer Verwandelung.

Der Kopf der Schmetterlinge ist meist und in den häufigsten Fällen so wie bei den Insekten, daß nur die großen, gebildeten Tastern und Fühlern hervortragen.

Die Fühler sind gewöhnlich verhältnißmäßig sehr selten länger als der Körper und in der Gestalt, am häufigsten borstenförmig oder Ende hin knospenförmig verdickt, zuweilen bei Schmetterlingen und namentlich bei den fadenförmig oder gefiedert; sie haben meist die Form der eng aneinanderliegenden Ringe bilden.

Die Augen sind meist sehr groß, rund oder halbrund, mit außerordentlich vielen versehen; die Nebenaugen fehlen meistens unter den Haaren und Schuppen verdeckt, das man sie erst nach Entdecken aufsuchen kann. Die Mundwerkzeuge zum Saugen eingerichtet und bestehen aus den beiden außerordentlich verlängerten, welche die Form einer Halblehre haben, die zusammenlegen einen hohlen Kanal bilden, der gewöhnlich spiralförmig eingetragene Unterläufe des Kopfes getragen wird. Dieser Kanal reicht einerseits eine ungemessene Länge, bis hin zum Abendschwärmer, welche die Kelchblumen auszusaugen im Stande sind; in wenigen Fällen fehlt er ganz, und die Insekten leben dann nur wenige Tage, die Fortpflanzung beschäftigt. Die Oberlippe wird durch eine äußerst kleine runde runde Hautfalte repräsentiert, welche die Ursprünge des Kanals ausliefert; die zwei kleinen Höckerchen eingeschrumpft, über behaart sind. Zu beiden Seiten der Lippen Kinnladen stehen zwei äußerst kleine, die gänzlich von den großen bebaarten bedeckt werden, welche meistens dreieckig den Kanal im aufgerollten Zustande schließen; die Unterlippe selbst ist nur eine häutige Vorsprung, an dem diese große eingefügt sind.

Die Brust, welche fast immer besteht, meist nur eine ringförmige Vorderbrust, hinter welcher Mittel- und Hinterbrust verschmolzen sind. Zu beiden Seiten der Brust und an der Basis der Vorderflügel zwei häutige Lappen der Rückseite, die die Flügelschuppen (Pterygota) genannt werden. Die Flügel selbst sind stets in der Regel und im Verhältniß zum Körper bedeckt und stets dicht mit mikroskopischen Schuppen, welche oft sonderbare Formen haben, die in der Wurzel in einer Vertiefung der Flügel nachgiebig förmig übereinanderliegen und die erhabene Rippen das auffallende Bild bilden. Ein eigenthümlicher, je nach der Art und Farben schillernder Glanz entsteht. Die Gattungen sind die Flügel theilweise gefaltet, bei andern zum Theil gefaltet und in jeder Art mit Haaren besetzt. Die Flügel wechseln außerordentlich und sind durch constante Kennzeichen für die Unterscheidung der Arten, als die Färbung und die Zeichnung, welcher zufolge die Farbe

ih der Hinterflügel ist sehr verschieden und bei vielen Tagfalterlingen in lange Fäden ausgezogen. Die Adern der Flügel sind reich und bilden nur eine geringe Anzahl, deren Form und Größe für die Unter- der einzelnen Gruppen von Wichtigkeit ist. In Ruhe werden die Flügel sehr verschieden ge- Die Tagfalterlinge schlagen sie meist senkrecht in die Höhe; die Nachtfalterlinge legen sie flach über den Leib, so daß die Vorderflügel die Decken, oder breiten sie ganz aus. Einige sogenannte Gliden, legen die obere Flügeldecke dachförmig, während sie die untere ausbreiten. Bei manchen Motten und Spinnern sind die Vorderflügel vollkommen ungeflügelt, während die sehr verschieden gestalteten Männchen Flügel besitzen. Die Nachtfalterlinge sind wie bei den übrigen Insekten gebildet, behaart oder beschuppt, fünfgliedrig und an der Spitze mit zwei Haken bewaffnet, zwischen denen meist noch ziemlich viele Haarspitzen stehen. Bei vielen Tagfalterlingen ist das vordere Fußpaar klein, zum Gehen und Greifen selbst gänzlich verkümmert, so daß sie auf der Art behaarter Blätter bilden, welche an der Brust hinaufgeschlagen werden. Der Hinterflügel ist stets länglich, walzenförmig, aus sieben Ringen zusammengesetzt, niemals mit einem oder einer Legeöhre versehen, dagegen manchmal eigenthümlichen Begattungswerkzeugen aus-

gestaltet. Die Eier der Schmetterlinge sind meist rundlich, fest und werden von der Mutter an solchen Stellen abgelagert, daß die auskriechenden Rau- chen die ihnen zukommende Nahrung finden. Viele der männlichen wissen ihre Weibchen in einer Ruhe von mehreren Stunden zu finden, und be- sitzen mit ihnen sogar, wenn die letzteren schon in die Erde angelagert sind. Die Eier der Schmetter- linge sind eine sehr große Kugel, und in der Regel überwintern die meisten Gattungen als Eier ruhende Puppen, während sie im Sommer puppen und Schmetterlinge sich zeigen.

Die Larven der Schmetterlinge, die allgemein unter den Namen der Raupen bekannt sind, haben meist eine ovale, gestreckte Gestalt und zeigen stets außer dem Kopf zwei bis drei Paare mit neun Luftschläuchen auf jeder Seite und wenigstens zehn, höchstens sechs Paare. Die Mundwerkzeuge sind zum Kauen und Greifen aus zwei kräftigen, hornigen, zwei Kinnladen mit sehr kleinen Zahnstücken, und einer Warzenförmigen Lippe, deren Spitze von dem Ausführgänge durchbohrt ist. Die drei ersten Ringe des Körpers tragen die echten oder hornigen Beine mit kleinen Krallen besetzt sind und den des vollkommenen Insekts entsprechen; sie sind sehr kurz, und dienen hauptsächlich zum Kriechen der Zweige, während die falschen Füße, die an den hinteren Körpersegmenten stehen, zum Gehen dienen und meist die Form von Stielen haben, die nach oben oder unten mit kleinen Haken besetzt sind. Der vierte, fünfte, zehnte und zwölfte der Raupen besitzen niemals falsche Füße. Die eigentlichen Spannpuppen kommen nur bei den hinteren Körpersegmenten gefaltete Paare falscher Füße vor, weshalb sie beim Fortschreiten den Raum ausfüllen, indem sie sich erst mit den vorderen anklammern und dann den Hinterleib nachziehen. Manchen Spinnern fehlt das hintere Paar falscher Füße ganz oder ist durch zwei lange Fäden

ersetzt. Einige Raupen von Tagfalterlingen besitzen ganz sonderbare Fühlfäden im Nacken, die hervor- gestülpt werden können. Die Körperbedeckung der Raupen ist äußerst mannichfaltig; viele sind nackt, andere über und über mit langen Haaren besetzt, welche leicht abbrechen, sich in die Haut einspießen und eine Art Nesselsucht verursachen können; noch andere sind mit Dornen, Hörnern oder biegsamen Fortsätzen bedeckt, die ihnen sogar zuweilen beim Klettern behülft sind. Die Farben sind äußerst mannichfaltig und ändern sehr oft durch die wiederholten Häutungen, welche während des Wachstums der Raupe stattfinden. Die meisten Raupen verpuppen sich gegen den Herbst hin; nur einige verfallen im Sommer in eine Art Winterschlaf, aus dem sie erst im Frühling erwachen. Sie nähren sich meist von Blättern und grünen Pflanzen- theilen, wenige bohren in Holz oder in Wurzeln; einige leben gesellig in Nestern und wandeln in Colonnen von einem Baume zum andern; die meisten sind einsam und ohne weitem besondern Instinct.

Zur Verpuppung sucht die Raupe einen sichern, geschützten Ort, meist an der Unterseite der Blätter und Zweige, in Spalten und Ritzen, unter dem Moose oder in der Erde. Die meisten spinnen ent- weder eine eiförmige Hülle von Seide, zu welchem Zwecke sie den Faden mehr oder minder regelmäßig schlingen, oder sie bleiben nackt und hängen sich dann bald einfach an dem Schwanzende auf, bald schlingen sie sich einen Faden um die Mitte der Brust, so daß sie in wagerechter Stellung sich befinden. Die Puppen sind hornig, vorn dicker, hinten geringelt und zugespitzt und lassen meist von außen die Flügel, die Füße und oft auch den Rüssel erkennen. Durch man- nichfaltige Hörner, Auswüchse, Stachel u. s. w. er- halten diese Puppen oft ein höchst bizarres Ansehen. Die meisten Tagfalterlinge sowie die kleinen Nachtfalterlinge bleiben nur vierzehn Tage bis einen Monat in der Puppe, während die größeren Nachtfalterlinge und die Schwärmer meistens als Puppe überwintern. Manche Puppen, welche in der Erde oder im Innern von Gewächsen in Gängen sich be- finden, die von der Raupe gebohrt wurden, klettern gegen das Ende ihres Puppenstandes mittels eigener Stacheln an den Ringen in die Höhe bis an die Oberfläche, so daß der austretende Schmetterling beim Sprengen der Puppenhaut unmittelbar in das Freie gelangt; andere Puppen zerstören selbst mittels ihrer scharfen Fortsätze und Hörner die von der Raupe ge- spinnene Hülle, und bei noch andern erreicht der Schmetterling dieselbe, und durchbricht sie dann, bevor seine Flügel hart geworden sind.

Gruppe der Großschmetterlinge (Macrolepidoptera).

Familie der Tagfalter (Rhopalocera). Die Fühler sind an der Spitze keulenförmig verdickt; der Körper klein, Hinterleib dünn; die Flügel sehr groß, breit, in der Ruhe senkrecht nach oben geschlagen; Hinterflügel ohne Haftborste zur Befestigung an die Vorderflügel; Raupen nackt, mit Dornen oder Auswüchsen, selten behaart; Puppen nackt, am Hinterende aber mit einem Brustfaden besetzt, deshalb nur kleine Spinn- drüsen bei den Raupen.

Edelfalter (Papilionida). Die verschiedenen ge- stalteten Raupen sind meist träge und befestigen sich bei der Verpuppung in eigenthümlicher Weise, indem sie sich mit der Schwanzspitze festhängen, sich aber dann noch einen Faden über die Brust ziehen, in dem die Puppe wie in einer Schlinge hängt. Die größten

und schönsten Tagfalter gehören dieser Gruppe an, zu welcher besonders die herrlich gefärbten Falter der südlichen Zone gehören, welche durch die langen Schwänze der Hinterflügel sich auszeichnen, die sogenannten Ritter, zu welchen auch unsere Segelfalter (*Papilio Podalirius*) und Schwalbenschwänze (*Schwalbenschwanz*, *Papilio Machaon*, Taf. 26, Fig. 46; Raupe des Schwalbenschwanzes, Fig. 47; Puppe des Schwalbenschwanzes, Fig. 48), sowie die vielfach gesprengelten Schedenfalter (*Thais*), gehören deren Faltzeichnung eine Eigenthümlichkeit der Gattung ist. Einige Raupen dieser Familie zeichnen sich besonders durch die kurze, plattgedrückte, schiffsförmige Gestalt und die Schmetterlinge durch die sehr verschieden gefärbten Flügel aus, indem die Oberfläche meist einfarbig, goldig oder blau, die Unterfläche mit vielfachen kleinen Augenflecken besetzt ist. Zu den Edelfaltern gehören freilich auch die Weißlinge (*Pierida*), von denen einige erheblichen Schaden an den Obstbäumen, dem Kohl und den Rüben anrichten.

Hängefalter (*Suspensa*). Bei den Tagfaltern dieser Abtheilung stehen die Fühler auf dem Kopfe sehr nahe zusammen, dagegen sind die Vorderfüße bei den Männchen immer und bei den Weibchen größtentheils nur rudimentär und unfähig zum Gehen. Die meist dornigen, haarigen oder mit eigenthümlichen Fortsätzen besetzten Raupen hängen sich bei der Verpuppung senkrecht an der Schwanzspitze auf und bilden eine nackte, meist edige Puppe. Hierher gehören die Schillerfalter (*Apatura Iris*), die Vanessa-Arten (*Vanessa Antiopa*, Trauermantel; *Vanessa jo*, Tagpfauenauge; *Vanessa cardui*, Distelfalter; *Vanessa polychloros*, großer Fuchs) und der schöne Admiral (*Vanessa Atlante*, Fig. 49; Raupe des Admirals, Fig. 50; Puppe des Admirals, Fig. 51).

Didköpfe (*Hesperida*), kleine Schmetterlinge mit kurzem, didem, gedrängtem Körper und didem Kopfe, deren Fühler seitlich weit voneinander bei den Augen eingelenkt sind; die Flügel werden in der Ruhe nur halb aufgerichtet, die Flügel sind alle vollkommen ausgebildet und die Hinterflügel mit zwei Seitenadern bewaffnet (*Didopf*, *Hesperia comma*, Fig. 52). Die Raupen haben einen diden, queren Kopf, dünnen, walzenförmigen, nackten Körper; die Puppen sind walzenförmig, ohne Eden, und ruhen in einem Gewebe, das aus zusammengewickelten Blättern besteht.

Familie der Abendswärmer (*Sphingida*), meist ziemlich große Schmetterlinge mit langem, walzenförmigem, hinten zugespitztem Leibe, der mit eng-anliegenden Schuppen bedeckt ist, und kurzen Fühlern, die gegen die Spitze hin etwas verdickt sind und oft mit einer dünnen, gewöhnlich hakenförmig umgebogenen Vorste abschließen. Zuweilen sind diese Fühler auf der Innenseite gefägt oder mit abwechselnden Haarbündelgruppen besetzt. Der Rüssel ist gewöhnlich sehr lang, oft viel länger als der Körper, nur selten kurz; die Flügel lang und schmal, besonders die Vorderflügel, und in der Ruhe dachförmig übereinandergelegt. Die Schmetterlinge schwärmen meistens mit lautem Summen nach Sonnenuntergang, und saugen im Fluge Honig; die Raupen sind stets nackt, walzenförmig, mit sechzehn Füßen und einem Horne auf dem vorletzten Ringel versehen, das nur selten durch eine Platte ersetzt ist; sie verpuppen sich meist in der Erde und erscheinen im nächsten Frühjahr als vollkommene Thiere.

Die Hummelschwärmer (*Hummelschwärmer*, *Macroglossa bombyliiformis*, Fig. 53) verlieren meist sehr schnell die Schuppen auf den Flügeln; die Raupe des abgebildeten Tannenpfieles (*Tannepfiehl*, *Sphinx pinastri*, Fig. 54) lebt auf Tichten.

Die Familie der Holzbohrer (*Xyleborini*) besteht aus sehr verschiedenartigen Gruppen, die aber alle in Holz bohren. Die eine Gruppe umfaßt einige große, tiefliebige, dickhäutige Schmetterlinge (*Weidenbohrer*, *Coma*, Fig. 55) mit gefägten oder gezähnelten schweren Flügeln, kurzen Rüsseln und meistens schmutzigen Farben. Die laugen, lederartigen, plattgedrückten Raupen bohren im Holz Wurzeln ab und können hierdurch Schaden anrichten; sie bilden ein festes Spinn, in welches zernagte Pflanzentheile sind. Die andere Gruppe, *Hornschwärmer*, *Trochilus apodactylus*, hat glasartige Flügel, ebenso wie der Leber der Schwärmer; die Raupen unterscheiden sich nicht wesentlich von den vorigen.

Die Familie der Widderhörner (*Syntomis Phegea*, Fig. 57) mit didem, mäßig und schmalen, abgerundeten Flügeln, sparsam mit Schuppen bedeckt sind, ja bei so glasähnlich und durchsichtig erscheinen, wie der Hautflügler. Die Fühler sind meist gegen das Ende hin verdickt, an der Endung umgebogen; sie sind stark bei den Männchen oft gezähnt oder doppelt. Die Rüssel fein und dünn. Die kurzen, sparsam sechzehnfüßigen Raupen spinnen sich in einen Cocon ein, der eine pergamentartige Beschaffenheit hat. Die Schmetterlinge fliegen fast nur bei Sonnenheine.

Familie der Bären (*Euprepida*), mittelgroß gefärbt, flechtig; Hinterleib did; die Flügel did und lang behaart, sonst den vorigen Raupe der abgebildeten Art (*Bär*, *Arctia*, Fig. 27, Fig. 1) im Grase; überwintert als Raupe.

Die Familie der Spinner (*Bombycidae*) besteht aus einer Anzahl von Nachtschmetterlingen, die stets tauenförmige Fühler besitzen, die meist gezeichnet gefleckt sind. Die Larven sind meist sehr kurz und zuweilen gänzlich ohne Brust und Leib sind gewöhnlich did und ziemlich did, die Flügel groß, abgerundet, haben alle 16 Beine und zeigen keine Verlebung alle Zwischenstufen von ganzlich ohne bis zu der dichtesten Behaarung und Verlebung, spizen Vorsten, die bei der Verlebung brechen. Alle diese Raupen spinnen bei der Verpuppung ein mehr oder weniger dichtes, reines Seide, das bei mehreren Arten zu Zwecken benutzt wird. Die Seidenraupe (*Bombyx mori*) (*Männchen*, Fig. 60; *Weibchen*, Fig. 59; Raupe, Fig. 60; Fig. 61), ist die einzige Art, welche in Europa vorkommt. Es würde zu weit führen, wenn wir die Bedingungen der Seidenzucht angehen, in welcher man die Raupen zu Seidenzucht vollkommen eingesponnen haben.

Jeder Cocon besteht nur aus einem einzigen Faden, der von der Raupe selbst gesponnen und da der Schmetterling beim Auskriechen vielfach durchdringt und zerstört, so daß er nicht mehr abspinnen kann, so tödtet man die Raupen im Cocon durch Hitze und läßt nur die Raupen, als zur Nachzucht nöthig sind. So sind manche andere ausländische Arten, zum Beispiel die großen Nachtpfauenraupen (*Attacus*), ähnlich sind, zur Seidenzucht eingeführt worden. Verschiedenheiten zwischen Männchen und Weibchen sind sehr bedeutend, und häufig haben die

immerte, oder sogar durchaus keine Flügel. Viele Raupen leben gesellig und werden sehr schädlich durch ihren Fraß.

Die Familie der Eulen (Noctuida) umfaßt Nachtschmetterlinge von meist dunklen Farben, aber mit br. konstanten Zeichnungen, die oft eine sehr bedeutende Größe erreichen, stets nur borstenförmige oder höchstens gefiederle Fühler besitzen und deren Rippenstifte nur kurz sind und mit einem kleinen, dünnen Haken endigen: der Rüssel ist meist lang, der Hinterleib geförmig, dünn behaart, meist nur mit eng anliegenden Schuppen besetzt. (Pyphilon, Plusia gamma, Taf. 26, Fig. 62; Kohlraupe, Noctua brassicae, Fig. 63.) Die Raupen sind lang, gestreckt, oft abgeplattet, kurz behaart und meist von den Baumknospen, an denen sie sitzen, schwer zu unterscheiden; sie haben gewöhnlich 16 Füße und besonders lange Lackschieber; ihre Puppen sind in einen lazen, schlecht entwickelten Cocon eingeschlossen. Die bekannte Kohlraupe frisst sich in der Mitte des Kohlkopfs ein.

Familie der Spanner (Geometrida). Die Schmetterlinge dieser Familie haben große, breite Flügel, welche ihnen viele Ähnlichkeit mit den Tagesschmetterlingen geben. Die Fühler sind bei den Männchen gekämmt oder gefiedert, die Fächer gewöhnlich kurz, der Körper schlank; die Flügel werden in der Ruhe ausgebreitet. Die Raupen sind lang, dünn, wurmförmig, nackt oder sehr sparsam behaart und gleichen meist dünnen Baumzweigen; sie haben gewöhnlich nur zehn Paar Beine und spannen deshalb beim Schreiten, da der ganze Mittelteil keine Füße trägt; in der Ruhe halten sie meist den Vorderkörper aufrecht, indem sie sich nur mit den falschen Füßen anklammern, und manchmal beharren sie stundenlang unbeweglich in dieser ermüdenden Stellung. Die Puppen sind nackt und meist nur mit wenigen Fäden angehaart. Manche Weibchen haben gar keine Flügel, wie die abgebildete Art: der Frostspanner (Hibernia defoliaria Taf. 27, Fig. 2—4; a Männchen, b ungeschlechtliches Weibchen, c Raupe). Die Raupen sind durch Abstreifen der Knospen den Obstbäumen sehr schädlich.

Gruppe der Kleinschmetterlinge (Microlepidoptera).

Die Familie der Fäulfliegen (Pyralida) besteht aus mottenartigen Schmetterlingen, deren Fühler bei den Männchen meist gekämmt oder gefiedert und deren Kiefertaster stets sehr deutlich sind. Die Flügel sind lang, schmal und bilden in der Ruhe ein Dreieck, dessen lang ausgezogene Spitze der Kopf ist; die Beine sind sehr lang, stark gespornt; die Raupen nur vierzehnhüftig, haarig und spinnen sich eigene Cocons meistens auf der Unterseite der Blätter; manche Arten richten an Obstbäumen und Weinbergen große Verwüstungen an.

Die Familie der Blattwidler (Tortricida) zeigt kurze, fadenförmige Fühler, verlängerte vorgestreckte Fächer, deren letztes Glied dicht beschuppt ist, dachförmige aufsteigende Flügel und einen weit dideren, kürzeren Leib als die Motten, mit denen sie sonst in ihrem Verhalten viele Ähnlichkeit haben. Ihre Raupen haben 16 Beine und verfertigen sich dadurch eine schützende Röhre, daß sie die Blätter vom Rande her aufrollen und mit Seidenfäden förmlich zu einer Röhre zusammennähen, innerhalb welcher sie sich später verpuppen, wobei sie sich einen Cocon von reiner Seide spinnt. Sie werden ebenso wie die folgende Familie durch ihre Verheerungen an Gewächsen zuweilen

zu dieser Familie gehört der Traubenwidler oder Saurewurm (Traubenwidler, Tortrix uvana, Taf. 26, Fig. 64; Raupe des Traubenwidlers, Fig. 65), und der unter dem Namen der Apfelmade bekannte Apfelwidler (Carpocapsa pomonella, Taf. 27, Fig. 5 u. 6).

Die Familie der Motten (Tineida) besteht aus meist sehr kleinen Schmetterlingen mit fadenförmigen Fühlern, die zuweilen länger als der Körper sind, und schmalen verlängerten Oberflügeln, welche zuweilen an der Spitze einen Ausschnitt zeigen. Die Unterflügel sind stets breit, der Länge nach gefaltet, die Fächer gewöhnlich sehr lang und ihr letztes Glied oft nackt und zugespitzt; bei einigen treten auch die Kiefertaster deutlich in die Erscheinung. Die Männchen der Motten haben 16 Beine, sind stets nackt und bilden sich von den Stoffen, von welchen sie leben, eine Röhre, die entweder beweglich ist, sobald sie dieselbe überall mit sich herumkleppen können, oder die fest sitzt und ihnen bei drohender Gefahr hindereiche Zuflucht gewährt. Viele dieser Motten leben im Innern von Zweigen und Knospen, in dem grünen Gewebe der Blätter, wo sie gewundene Gänge zwischen den beiden Oberhautschichten graben; andere leben in trockenen Pflanzen- und Thierstoffen, wo sie uns oft, wie die Pelz- und Kleidermotten und die Getreidemotten (Motte des Getreides, weißer Kornwurm, Tinea granella, Taf. 27, Fig. 9), großen Schaden anrichten. Die Wachsschabe (Tinea cerella, Fig. 7 u. 8) lebt als Raupe in den Bienenstöcken, denen sie durch Zerstören der Waben und Zellen sehr schädlich ist. Zur Verpuppung schließen sie ihre Höhlen mit Dedeln von Seide.

Die Familie der Federermotten (Pterophorida), hat borstenförmige, ziemlich lange Fühler, zugespitzte, wenig behaarte Fächer, nierenförmige, nach hinten ausgechnittene Augen, lange mit spitzen Sporen besetzte Beine und einen langen, dünnen Hinterleib. Sie zeichnen sich vorzüglich durch eine Spaltung der Flügel aus, indem die Hinterflügel stets, die Vorderflügel meistens in einzelne fingerartige Theile zerlegt sind, welche wie Federn auf beiden Seiten mit Haaren besetzt sind und so das Ansehen eines Vogelflügels geben (Federgeistchen, Pterophorus pentadactylus, Taf. 27, Fig. 10). Die Raupen dieser niedlichen Thierchen sind klein, nackt, haben 16 Füße und verwandeln sich in eine nackte, mit Hödern besetzte Puppe, um die nur selten eine Seidenhülle gesponnen wird.

Ordnung der Zweiflügler (Diptera.)

Insekten mit saugenden Mundtheilen, zwei ausgebildeten Vorderflügeln und verkümmerten Hinterflügeln, und mit vollkommener Verwandlung.

Die Fühler sind bei den Zweiflüglern fast stets vorn auf dem Kopfe, an der Stirn, zwischen den Augen eingelenkt und mit ihrer Basis einander genähert. Sie zeigen zwei sehr verschiedene Typen, wonach man auch die ganze Ordnung in zwei Unterordnungen, Langhörnler und Kurzhörnler, zerfällt hat. Bei den letztern ist der Fühler stets kürzer als der Körper und nie aus mehr als drei Gliedern zusammengesetzt. Das oberste der beiden ersten Glieder sind cylindrisch, stiel-förmig, das letzte hingegen breit, fiedelförmig oder schwammartig und einzig mit jenen feinen Niedgruben versehen, die auf den Gliedern der Handhabe ganz fehlen. Bei diesen Kurzhörnern steht dann meist auf dem dritten Gliede noch eine kurze, gerade Borste (stylus), die zuweilen selbst Gliederung zeigt. Bei

den niedersten parasitischen Familien schwinden die Fühler zu einem unbedeutenden gliederlosen Knötchen; bei den Langhörnern dagegen sind sie stets aus mehr als sechs Gliedern zusammengesetzt, oft selbst länger als der Körper und zeigen sehr mannichfaltige Gestalten, Fiedern, Federbüsche, Cylinder, Kolben, Faden.

Die Augen sind meist von zweierlei Art, zusammengesetzte und einfache: erstere sind oft ungeheuer groß, seitlich gerückt und scheinen manchmal fast den ganzen Kopf einzunehmen. Besonders zeichnen sich die Männchen durch die Größe dieser Organe aus, und bei vielen Gattungen bildet das Zusammenstoßen der Augen auf der Stirn für das Männchen und ihre Trennung für das Weibchen einen constanten Geschlechtsunterschied. Zuweilen sind diese zusammengesetzten Augen über und über mit langen Haaren besetzt, die in den Zwischenräumen der einzelnen Facetten wurzeln; oft sind die Facetten der oberen Augenhälfte größer als die der untern. Die Nebenaugen stehen meist in einem Dreieck auf der Höhe der Stirn zwischen den Augen; gewöhnlich ist die Zahl drei, selten finden sich nur zwei oder gar keine.

Die Mundwerkzeuge der Zweiflügler sind stets zum Saugen eingerichtet, theilweise selbst bei den Larven, und zwar ist es besonders die Lippe, welche zum Rüssel (proboscis) umgewandelt ist. Der Rüssel ist meistens knieförmig in der Mitte eingeknickt, bald senkrecht, bald horizontal unter den Kopf gestellt und kann meistens zwischen die Backen zurückgezogen werden. Seine untere Spitze ist gewöhnlich verbreitert, verbildet, in Form einer rundlichen oder ovalen Platte ausgebildet, welche größere oder kleinere Querschnitte zeigt und oft mit Haaren besetzt ist. Die eigentliche Mundöffnung befindet sich über dieser Platte in dem Rnie des Rüssels an dem Ende einer meist tiefen Furche. An der Mundöffnung stehen zwei Laster (palpae), die bei den Kurzhörnern meist nur ein- bis zweigliedrig, bei den Langhörnern vier- bis fünfigliedrig, lang und oft in ähnlicher Weise wie die Fühler buschig sind. Untersucht man den Rüssel genauer, so findet man, daß seine fleisige oder häutige mit der Platte versehene Röhre nur ein Hülle bildet, in welcher besondere steife Hornborsten stecken, die offenbar den Rinnbäden und Rinnladen der lauwenden Insekten entsprechen. Es sind stets wenigstens zwei solcher Borsten vorhanden, die meist mit den Palpen in Verbindung stehen und offenbar die umgewandelten Rinnladen (maxillae) darstellen. Bei einigen Familien sind außerdem noch zwei weitere Borsten vorhanden, welche den Kiefern (mandibulae) analog sind. Die sämtlichen in dem Rüssel eingeschlossenen Borsten werden in ihrer Vereinigung der Sauger (haustellum) genannt. Außer diesen Borsten findet sich noch am Grunde des Rüssels die Oberlippe, meist dreieckig, zuweilen vorn zugespitzt, hornig oder häutig und auf ihrer Unterseite mit einer Mittelrinne versehen, worin die sehr feine, zugespitzte, kurze Zunge liegt. Sind diese beiden Organe bedeutend in die Länge gezogen, so scheint der Rüssel sechs Borsten einzuschließen. Nicht immer inbezug sind diese Mundorgane vollständig — es finden sich sogar manche Dipteren, wie z. B. Menops, wo dem ausgebildeten Thiere jede Spur von Mundwerkzeugen, ja die Mundöffnung selbst fehlt und nur die Begattung sein einziger letzter Lebenszweck ist. Die Hornborsten, in welche Rinnbäden und Rinnlade umgewandelt sind, dienen zum Durchbohren der Haut, während der äußere Rüssel eigentlich nur zur Bedeckung und Nahrung des Saugers bestimmt ist. Die Säfte, welche ausgesogen werden, fließen zwischen den Hornborsten in die Höhe.

Der Raum zwischen dem Rüssel und dem Kopf bildet das Unter Gesicht (hypostoma), gewöhnlich meistens durch zwei vorstehende mit Haaren versehene Backen ausgefüllt, welche das Unter Gesicht (mystax) heißen.

Die Brust der Zweiflügler besteht aus drei Ringen durch Querschnitte oder Querschnitten, deren jeder mehr oder minder deutlich abgegrenzt ist. In einigen Gattungen zeigt sich eine deutliche Trennung der Vorderbrust. An der Unterseite der Brust befindet man nie mehr als vier Luftlöcher — gewöhnlich in der Nähe des Kopfes, zwei ganz hinten, zwei ganz vorn den Schwingen.

Es finden sich nicht mehr als zwei Flügelpaare, die Vorderflügel der vierflügeligen Insekten. Sie sind stets häutig durchsichtig, zuweilen sehr feinen häutigen Schuppen besetzt. Diese Flügel mächtig groß, von langgestreckter lebhaft in Regenbogenfarben schillernd; die der Insekten ist sehr bedeutend und an der Spitze sehr schnell. Die Flügel sind in ihrer Gestalt verschieden, besonders bei den Weibchen, und in schwächeren Gattungen fehlen sie ganz. Die Rippen oder Adern der Flügel sind meist sehr stark und ausgebildet; wesentlich sind nur die vorderen und wenigen Queradern vorhanden, jedoch sind die gestreckten Zellen meist nach außen hin offen. Meist findet man fünf Hauptlängslinien, die die beiden ersten dem Vorderrande der Flügel nahe anliegen.

Eigenthümliche Organe sind die Schwingen (halteres), zwei kleine bewegliche Körner, die einem mehr oder minder langen Stiel aus runden Knöpfchen bestehend, die an der Brust stehen, fast in beständiger Bewegung sind und meist von zwei kleinen Schuppen bedeckt sind. Die Form der Schwingen gleicht ziemlich den mit Regenwürmern besetzten Blättern, die man beim Federballspiel zum Werfen des Balls gebraucht; ihr Nutzen ist der, das Fliegen zu erleichtern.

Die Füße der Zweiflügler sind meist aus den gewöhnlichen Insektenfüßen abgeleitet. Der Tarsus hat immer fünf Glieder, die meist sehr einfach, zuweilen aber gegliedert Klauen, die nur bei wenigen Gattungen stark vortreten; meistens befinden sich an jedem Fuß zwei oder drei Klauen (ungues). Die Klauen sind meist sehr stark und sind mit Gräbchen oder Leisten dicht besetzt sind, die eine sehr klebrige Flüssigkeit ausschütten, die den Insekten als Haftorgane dienen, und auf glatten Oberflächen, selbst in umgekehrter Lage, leicht festhalten können.

Der Hinterleib der Zweiflügler ist meist länglich, zuweilen auch breit und eiförmig, bald mit seiner ganzen Breite an der Spitze ist er durch einen Stiel mit ihr verbunden. Meist 6—9 sichtbare Ringe und endet in einem oder mehreren Spizen, die aus mehreren verschiebbaren Ringen besteht, welche aus- und eingezogen werden können.

Die Zweiflügler leben als vollkommene Insekten meist nur kurze Zeit; die Männchen sterben meist nach der Begattung, die Weibchen leben für ihre Brut gesorgt haben. Sie leben gesellig in großen Schwärmen, in denen sie nahrung, auf Blumen und Blättern, vorzuziehen und zu saugen gibt. Einige sind

selbst weit größere Insekten an, um sie und auszusaugen; andere leben parasitisch vom Blute größerer Thiere, doch sind es die Weibchen, welche stechen und Blut saugen, die Männchen. Das Tanzen und Schwärmen und Schnaken ist das Vorspiel zum Bese, der meist im Fluge, bald in der grellsten, bald mehr in der Dämmerung vorgeht. Die Eier, welche meist rundlich ohne Formgestaltungen sind, werden an die Orte, die Larven leben; in Form zusammenwimmender Klöße auf das Wasser, in den feuchten Erde, auf Keime und Blätter der Pflanzen. Die Raubfliegen legen ihre Eier in die Wunden, deren Larven von ihrer Nachkommen getödtet werden, zwischen die Blattläuse, auf größerer Thiere, wo sie abgelegt werden, im Darm zu entwickeln u. s. w.

Die Larven der Zweiflügler sind alle fuflos, mit Würzchen an deren Stelle versehen und verschiedener Typen gestaltet. Die einen haben einen weichen häutigen Kopf, der mit kurzen Borsten versehen ist, hierhin gehören die meisten Larven, die in faulenden Stoffen lebenden Larven in Erde oder solchen Materialien lebende Larven, die in Wasser lebenden Larven. Diese haben dann oft noch deutliche hornige Fortsätze, die geeignete Kiefer mit Palpen, seitliche Fortsätze, die zugleich als Flossen und als Schwimmfüße fungiren und meist neben dem Schwanzende eine oder mehrere Borsten, die mit einem Vorstern versehen sind, durch die sie die Luft einziehen. Die Larven, die sich zu diesem Endzwecke verkehrt in das Wasser, indem sie den Vorstern an der Oberfläche

zu Puppen verwandeln sich in eine ruhende Puppe, die zwar dient den meisten die eigene Larvenhülle. Diese Hülle verhärtet sich in der Puppe, in welcher das vollkommene Insekt ausgebildet und endlich nach Sprengung der Hülle vorgeht. Bei andern aber, namentlich bei den Larven lebenden Schnakenlarven, wird die Hülle abgestreift und eine oft sehr in ihrer Gestalt abweichende Puppe erscheint, die die Larve durch eine Afterröhre, sondern eine kurze, an der Brust angebrachte Röhren

Ordnung der Langhörner (Nemocera).

Der Körper dieser Thiere ist dünn, lang; der Kopf klein, die Brust meist kurz, abgewölbt. Der Rüssel ist bald kurz, bald lang. Die Palpen lang, wenigstens zweigliedrig, oft federbuschartig. Die Füße lang, dünn, fadenförmig, wenigstens zweigliedrig zusammengefasst, oft oder gefiedert. Die Füße sind lang, die Flügel meist lang und schmal.

Die Tipuliden (Tipulidae) haben einen kurzen, diden, den Rüssel mit zwei deutlichen Endlippen und zwei Hornborsten (Kinnbäden) im Innern; die Langen oder sind eingebogen und haben fünf oder sechs Borsten, die meisten aber sind völlig

Sie tanzen meist abends in so zahllosen Schwärmen, daß man sie oft schon für Raubfliegen halten hat. Man hat mehrere Gruppen unterschieden: die Bibioniden (Bibionidae) mit didem, fliegenähnlichem Körper, auf Blumen; die Larven in Mist

und Moder; die Griebelmücken oder Gninen (Simuliidae) mit kurzen vorstehenden Fühlern und vorstehendem Stechrüssel; hierher die meisten Mosquitos und die berühmte Columbar Mücke des Banats, die dem Vieh so gefährlich ist; die Pilzmücken (Fungicidae) mit fadenförmigen Fühlern, deren Larven meist in Schwämmen und Moder leben; hierher gehört die Trauermücke (Sciara Thomae), deren hinter einander kriechende Larven den sogenannten Heerwurmbilden; die Gallmücken (Cecidomyiidae) mit kegelförmigem Kopf und langen Fühlern, deren Larven meist in Pflanzen leben, zum Theil durch innere Knospenzeugung sich mehren, und zu welchen die dem Getreide so schädliche sogenannte Heßensfliege (Cecidomyia destructor) gehört; die Wuschmücken (Tanypidae) mit federbuschartigen Fühlern, deren Larven im Wasser leben; die Erdmücken (Terraridae) mit langen gespornen Füßen, die Larven in feuchter Erde.

Die Familie der Schnaken (Culicidae) hat einen langen, dünnen, geraden Rüssel mit vier deutlichen Borsten; fängsgliedrige Palpen, die meist länger sind als der Rüssel, viergliedrige Fühler, lang, buschartig bei den Männchen, kürzer bei den Weibchen. Die Flügel sind längs den Adern mit haarförmigen Schuppen besetzt. (Stechmücke, *Culex annulatus*, Taf. 27, Fig. 11.) Nur die Weibchen stechen. Die Larven leben im Wasser, haben einen hornigen Kopf mit zwei gefiederten Kinnbäden, die einen steten Strudel unterhalten und eine lange Athmeröhre, die schief vom Leibesende absteht und einen Vorstern hat. Die Puppe ist kurz gedrungen und athmet mit zwei an der Brust liegenden kurzen Röhren.

Unterordnung der Kurzhörner (Brachycera), der eigentlichen Fliegen.

Der Körper dieser Thiere ist meist breit, selten länglich; der Kopf halbkugelförmig oder quereoval, von der Breite der Brust; der Hinterleib breiter; der Rüssel ist bald kurz, bald, fleischig, in welchem Falle er meist ganz in eine Vertiefung am Vorderkopfe zurückgezogen werden kann, bald lang, vorstehend, dünn, lederartig. Das wesentlichste Kennzeichen besteht in den Fühlern, die höchstens aus drei Gliedern bestehen, von welchen zwei klein und stielartig, das dritte did, knopfartig ist. Auf diesem dritten steht eine Geißel oder Borste (stylus). Die Fühler können meist in eine Rinne am Kopfe eingesetzt werden. Flügel fehlen nur in einigen Ausnahmefällen, sonst sind sie stets vorhanden.

Die Familie der Bremsen (Tabanidae) unterscheidet sich von allen übrigen Kurzhörnern durch die Organisation ihres Rüssels, der ganz demjenigen der Schnaken analog gebaut ist. Der ganze Körper ist breit, platt, stark; der Kopf breit, zusammengebrückt; die Augen groß, meist grünlich schillernd; der Rüssel vorstehend, kurz, did; die Mittelschienen mit zwei Spitzen, die Tarsen mit drei Fußballen versehen. Das dritte Fühlerglied ist lang, cylindrisch, vier- bis achteigliedrig; Flügel stark, dachförmig. Sie stechen sehr empfindlich, saugen das Blut der Säugethiere, fliegen außerordentlich schnell und lange, ohne zu ermüden, und haben ein leises, scharfes Summen. Die Männchen lauern in sonnigen Waldwegen und Schneisen auf die Weibchen, indem sie eine Zeit lang schweben, dann plötzlich an das andere Ende des Weges schießen und dort wieder

schwebend lauern. Sie stürzen sich im Fluge auf die Weibchen, packen sie und erheben sich dann hoch in die Luft. Die Larven leben in der Erde, haben einen hornigen, mit haligen Kiefern bewaffneten Kopf. Die Puppen sind haarig. Die abgebildete Art (*Kindsbremse*, *Tabanus bovinus*, Taf. 27, Fig. 12) ist eine allgemeine Viehplage. Die Maden (Made der Kindsbremse, Fig. 13) leben in der Erde.

Raubfliegen (Asilida). Kopf groß, Stirn eingedrückt, Augen seitlich sehr vorragend. Rüssel kurz, wagemrecht, Endlippen des Rüsselkopfes vorspringend; Lippe kurz; Fühler kurz, abstehend; Borste oft fehlend. Das Gesicht sehr haarig, Knebelbart stark. Hinterleib cylindrisch oder rundlich. Schwinger unbedeckt. Schienen und Tarsen stachelig. Flügel groß, stark. (*Habichtsflye*, *Dioctria oelandica*, Taf. 27, Fig. 14). Kleine Räuber, die an trockenen, sonnigen Orten selbst weit größere Insekten überfallen, anstechen und ausfressen. Die Larven leben in der Erde, haben einen hornigen Kopf und starke, gekrümmte Rinnbäden. In südlichen Gegenden gibt es Gattungen (*Mydas*) mit längern Fühlhörnern, die den Uebergang zu den Laubhörnern machen.

Familie der Tanzfliegen (Empida) (Schneppenfliche, *Empis tessellata*, Taf. 27, Fig. 15). Kopf klein, kugelig. Rüssel dünn, lang, gerade nach unten gerichtet. Palpen zweigliederig. Fühler dreigliederig, das erste Glied sehr unentwickelt. Brust hoch, gewölbt; Hinterleib stets dünn, lang, schmaler als die Brust. Füße lang, dünn. Sie schweben und tanzen abends in ungeheuern Schwärmen über Heiden und Gebüschen, leben von Blumenjaft und dem Raube kleinerer Insekten, und meist gelingt dem Männchen die Begattung nur, während das Weibchen mit dem Ausfressen seines Raubes beschäftigt ist, den es im Fluge oder im Laufe fängt. Die Larven in der Erde; Puppen mit Widerhäuten.

Familie der Dickfliegen (Hemipida). Kleiner kugelig Kopf mit ungeheuern Augen. Hinterleib groß, blasig aufgetrieben. Fühler klein. Kein Rüssel, der Mund bei den einheimischen Arten ganz geschlossen; bei ausländischen Arten langer Rüssel. Die Schwingen haben unter großen Schuppen verborgen. Die abgebildete Art (Dickfliege, *Hemops gibbosus*, Taf. 27, Fig. 16) legt ihre Eier haufenweise an dürre Zweige. Larven unbekannt.

Familie der Gemeinshweber (Bombylida). Kopf kleiner als die Brust. Rüssel dünn, lang, nach vorn gerichtet; Oberlippe sehr lang. Palpen eingliederig, Fühler lang, nahe beieinander; Borste kurz oder fehlend. Brust buckelig. Füße dünn; Flügel lang ausgebreitet (Gemeinshweber, *Bombylius major*, Taf. 27, Fig. 17). Meist sehr behaarte Fliegen, die äußerst schnell mit tiefem Summen fortfliegen und über Blumen schwebend Honig saugen. Eine besondere Gruppe bilden die Trauerfliegen (*Anthracida*). Kopf vorn rund; Rüssel kurz, meist verborgen, nach vorn gerichtet; Endlippen des Rüsselkopfes deutlich; Palpen eingliederig, an der Basis des Rüssels. Augen getrennt. Brust eben; Füße dünn, Fußballen rudimentär. Flügel sehr groß, seitlich ausgebreitet. Meist schwarz mit weißen Linien und Bändern. Sie schweben langsam in Gebüschen und auf Blumen. Die Larven finden sich in Biennestern und scheinen sich theils von den Biennenmaden, theils vom Honig zu nähren.

Familie der Schnepfenfliegen (Leptida). Rüssel vorstehend, Rüsselkopf verlängert; Fühler tief am Grunde des Kopfes eingelenkt; die beiden Hinterfußpaare mit Stacheln an den Schienen; das Endglied des Tarsus mit drei Fußballen versehen. Flügel ab-

stehend; Hinterleib lang zugespitzt. Diese Insekten nehmen nur selten Nahrung zu sich. Blumenjaft oder kleinen Insekten. Sie sind meist ruhig in der Sonne mit senkrechten Hinterleibe. Die Larven leben in der Erde in südlichen Europa vorkommende Gattung fliege, *Leptis vermileo*, Taf. 27, Fig. 18, im Grunde einen Trichter, in dem sie kleine Insekten fängt. Ihr Körper ist wurmartig; der Kopf hornig, legerig.

Familie der Wassenfliegen, Stratiomyidae. Wassenfliege, *Stratiomys chamaeleon*, Taf. 27, Fig. 19, breitem Körper, dreigliederigen abstehenden Endfied fünfvingelig und mit einer Borste ist. Die Augen haben oben größere Jalousien. Sie haben zuweilen lebhaft metallische Farben auf Blumen; die Larven besitzen einen harten verwandelten sich in ihrer Larvenhaut in einen weichen im Malm oder im Wasser und in warmen Fälle eine mit einem Verhaken versehenen Athemröhre.

Familie der Schwebfliegen (Syntherisma). Schwebfliege, meist vielgliedrige Fliegen, die metallischen Farben geziert. Stirn vorstehend, Lippe breit, gewölbt, ausgerandet. Rüssel kurz, drei Punktaugen. Leben auf Blumen; die Larven erscheinen, wenn diese klaffen. Sie meist einsam schwärmend, abwechselnd und dann lange an demselben Plage schwebend fliege, *Syrphus seleniticus*, Taf. 27, Fig. 20, Larven, die einen weichen häutigen Kopf haben, meist in der Erde, im Mist, im Malm oder in gewässerten (Merodon). Andere Larven sind groß und fußlos, kleinen Blütengelen in der Erde ähnlich, saugen die Blattläuse aus und sind Endzwede mit einem dreispitzigen Stachel. Andere (*Volucella*) leben in Nestern der Wespen und Hummeln und saugen sie aus; noch andere endlich in klüftigen schmutzigen Wasser (*Eristalis*) und in langen perspectivartigen Athemröhren zu verweilen, während zu beiden Seiten der Halsentfaltung sich finden, die zur Begattung.

Familie der Fliegen (Muscida). Fühler mit rückständiger Borste. Rüssel mit Endlippen. Sehr zahlreiche Familie mit vielen Familien. Dungkfliegen, *Acalyptera*, fehlen ganz oder sind nur rudimentär. Bei beiden Geschlechtern breit, die Fühler aus einem oder zwei Gliedern gebildet. Der Kopf ist länglich, der Kopf halbflugelig, die Flügel als bei den übrigen Fliegen. Man findet gebildeten Insekten meist in schattigen Orten und auf Wasserpflanzen. Ihr Geruch ist schwach. Die Larven sind wurmartig, veränderlichem Kopfe und leben theils in verwesenden Stoffen, theils auch in Wasser zuweilen Galläpfel und ähnliche Früchte bringen. Die Brillenfliegen (*Diopsidae*), (*Scatophaga*), die Zettfliegen (*Propheta*), leben in Pflanzfleisch, im Rasse (die bestimmten leben und durch Zusammenringelung und nachheriges Loschnellen springen.

Blumenfliegen (Anthomyia). Zettfliege, die Schwingen nicht bedeckend. Fühler mit drei Gliedern. Augen auf dem Kopf gerückt, berühren sich meist beim Fliegen. Der Kopf ist länglich, Kopf halbflugelig; Flug langsam. Sie leben in Gebüschen, an hellen Tagen auf Wasserpflanzen, die Männchen bilden

in der Luft, die Larven haben meist zwei Mundhaken und leben in allen Arten pflanzlicher, besonders verwesender Stoffe. Einige Larven bohren sich Gänge im Gewebe der Blätter vor Kräutern.

Die Fleischfliegen (*Crepophila*) haben meist einen gedrungenen Körperbau, rundlichen Hinterleib, breite Brust, queren Kopf und große Dickschuppen, welche die Schwingelobben gänzlich überragen. Die Fliegen haben einen raschen und anhaltenden Flug, halten sich meist auf Blumen oder auf verwesenden Stoffen und in Häusern auf. Die Larven leben im Kothe, in Aas und verwesendem Fleisch, wie unsere Schmeißfliege (*Musca vomitoria*, Taf. 27, Fig. 24), oder auch parasitisch in Raupen von Schmetterlingen und in andern Insekten, besonders solchen, welche von Grabwespen und andern Hymenopteren zur Proviandierung ihrer Brut benutzt werden (Morbfliege, *Tachina fera*, Fig. 22). Im letztern Falle legen die Mutterfliegen die Eier auf die Raupen u. s. w. in demselben Augenblicke, wo die Mutter Grabwespe ihre Beute in das Loch zieht, worin sie auch ihr Ei legt. Die eben ausgeschlüpfen Würmchen bohren sich ins Innere ein, wo sie sich besonders vom Fettkörper nähren und so den Grabwespenlarven ihre Provision vortuegnen, sobald diese zuweilen vor Hunger umkommen. Die Fliegenmaden selbst verpuppen sich zu kleinen Tönnchen, und die Fliegen brechen oft erst aus der Puppe statt eines Schmetterlings hervor. Eine große Raupe kann bis hundert solcher Schmarotzer nähren. Einige dieser Fliegen gebären lebendige Larven.

Familie der Dasselfliegen (*Oestrída*). Körper dick behaart. Der Rüssel fehlt meist ganz, so daß die ausgebildeten Thiere keine Nahrung zu sich nehmen können, oder ist nur sehr klein und der Mundspalt dann sehr eng. Palpen undeutlich. Fühler sehr kurz, in einer Rinne des Kopfes gelegen; drittes Glied kegelförmig, die dicke, harte Borste auf seinem Rücken eingeklappt. Dickschuppen der Schwingelobben meist sehr groß. Flügel ausgebreitet, in der Ruhe vom Leibe abliegend.

Die ausgebildeten Insekten leben nur sehr kurze Zeit, fliegen rasch und schnell mit scharfem, aber leisem Summen und legen ihre Eier an verschiedene Stellen auf die Haut grasfressender Säugethiere. Die Larven, welche aus diesen Eiern hervorgehen, sind eiförmig, ihr Mund meist mit Wärtchen oder auch mit zwei harten, gebogenen Haken versehen. Auf dem Leibe stehen Querreiben kurzer Stacheln, die nach hinten gerichtet sind. Die beiden Luftlöcher sind am Hinterende der Larven angebracht. Einige dieser Larven bohren sich in die Haut der Thiere, und eine Art in Südamerika auch in die der Menschen ein und verursachen dort große Eiterbeulen, in welchen sie mit dem Vorderende nach innen stecken, während das Hinterende gegen die Öffnung des Eiteradzes (Dasselbeule) zum Luftschöpfen gerichtet ist. Diese Dasselbeulen werden oft in heißen Ländern so zahlreich, daß die Häute fast wehrlos werden. Unter den Landeuten herrscht der irrige Glaube, daß die Larven dieser Dasselbeulen sich in die Viehbremse (*Tabanus*) verwandeln. Zur Zeit der Verpuppung kriechen die Larven aus der Eiterbeule heraus und lassen sich zur Erde fallen. Ihre äußere Haut bildet die Schale der Puppe (*Cuticula*, Hypodermis, Oedemagus auf Hals, Dösen, Renthieren). Andere Larven leben in den Stürnhöhlen der Schafe und Hirscharten, die Mutter legt die Eier an den Eingang der Nasenhöhlen, von welchen aus die Larven hinaufkriechen (*Cephenomyia*, *Cephalomyia*); noch andere endlich legen ihre Eier auf die Schultern der Pferde und Kühe (Kindsschädel, *Oestrus bovis*,

Taf. 27, Fig. 23), wo die Thiere sie abledern, hinabschlucken, die Larven sich im Magen oder Darm mit ihren Hornhaken festsetzen, zur Zeit der Verpuppung loslassen und mit dem Kotthe abgeben, um sich im Dünger zu entwickeln.

Die Unterordnung der Puppengebärer (*Pupipara*) umfaßt eine kleine Anzahl merkwürdiger parasitischer Insekten, die besonders auf Vögeln und Säugethiere leben und zum Theil ungeflügelt, zum Theil aber auch geflügelt sind. Statt der zu einer Rüssel-scheide umgewandelten Unterlippe haben diese Insekten zwei seitliche Hornklappen, die wahrscheinlich umgewandelte Palpen sind. Zwischen diesen Klappen liegen auf einem kleinen Vorsprung zwei starke scharpfe Hornborsten, die zum Stechen dienen. Die Fühler sind sehr verschieden gestaltet, bald in Form eines Knötchens, bald wie eine haarige Platte; sie stehen meist mit dem Rüssel auf einem deutlichen Vorsprung des Kopfes, hinter dem die Augen einen markirten Abfluß bilden. Die Füße sind lang, stark, mit großen Krallen am Ende versehen, womit sich die Thiere in den Haaren und Federn ihrer Wohnungsgeber festhalten. Einige haben Flügel und Schwingelobben, andere sind durchaus flügellos. Der Hinterleib zeigt keine deutlichen Ringe, sondern nur eine weiche, sehr dehnbare Haut.

Die Art und Weise der Fortpflanzung dieser Thiere ist sehr merkwürdig. Die Eierstöcke sind sehr kurz und mit wenigen Eiröhren versehen; die Eier selbst kommen nach der Befruchtung in den untern,beutelartig ausgedehnten Theil der Scheide, wo sich die Embryonen ausbilden und ausschlüpfen. Die Mutter behält die Larven in demselben Sack, wo sie durch das Secret einer eigenen Drüse ernährt werden und sich endlich verpuppen. Die Puppen, wenn sie geboren werden, haben beinahe die Größe des Hinterleibes der Mutter, sind anfangs weich und bläulich, erhärten dann und springen endlich beim Ausschlüpfen der Fliege mit einem Dedel auf.

Die Hautläuse (*Hippoboscida*) haben einen breiten, platten Körper, mittelmäßig großen Kopf, deutlich getrennt von der Brust, die wieder vom ungeringelten Hinterleibe abgesetzt ist; längliche, zusammengelegte Augen; dicke kurze Füße, das fünfte Tarsalglied sehr lang; zwei gezähnelte Krallen am Endgliede. Einige (*Lausfliege*, *Hippobosca equina*, Taf. 27, Fig. 25) haben Flügel; andern (*Melophagus*) fehlen sie gänzlich. Die geflügelten fliegen schlecht und wenig. *Hippobosca* (auf Pferden), *Ornithomyia*, *Olfersia*, *Ornithobia*, *Anapera*, *Stenopteryx* (alle auf Vögeln), *Leptotena* (auf Hirschen), *Melophagus* (auf Schafen).

Die Fledermausläuse (*Nycteribida*) sind vollkommen flügellos. Kopf sehr klein, vertical gestellt. Brust und Bauch zu einer Masse verschmolzen; Fühler fehlen oder sind nur in Form kleiner Knötchen vorhanden. Die Beine sehr lang, haarig. Die Thiere gleichen kleinen Spinnen, haben aber nur sechs Beine und leben auf Fledermäusen.

Die Bieneuläuse (*Braulida*) haben keine Augen, breiten Kopf, keine Flügel, die Fühler in Rinnen und starke Endhaulen mit Krallen an den Füßen. Sie leben auf Bienen (*Braula coeca*).

Die Unterordnung der hüpfenden Dipteren (*Aphaniptera*) umfaßt nur die einzige Familie der Flöhe (*Pulicida*). Der Kopf dieser Thiere ist sehr klein, vorgebeugt und nur mit einfachen seitlichen Augen, nicht aber mit zusammengelegten versehen. Die Ringe der Brust sind deutlich getrennt, aber in ihrer Gestalt sehr wenig von denen des Hinterleibes geschieden, der linienförmig, hoch und von der Seite

her zusammengedrückt ist. Die Körperbedeckungen sind fest, hornig. Neben an dem Kopfe stehen zwei kurze, stolbige, dreigliedrige Fühler, in einer Rinne hinter den Augen versteckt, meist zurückgeklappt. Der Rüssel zeigt einiges Abweichende von den übrigen Zweiflüglern; er liegt feutrecht unter der vorstehenden Kopfplatte und besteht aus einer zweiflappigen, gegliederten Scheibe (Unterlippe) mit fünfgliederigen Tastern, aus einer mittlern Hornspitze, der Zunge, und zwei seitlichen, diese umfassenden Spitzen, den Kinnladen, welche mit der Zunge zusammen den Stachel bilden. Zur Seite finden sich noch zwei gegliederte Palpen, die den Kinnladen angehören. Die Beine sind lang, die Schenkel dick und besonders die Hinterbeine zum Springen tüchtig. Alle Flöhe (Floh, Pulex irritans, Taf. 27, Fig. 26) sind Schwarzer, aber nur die Weibchen stechen und saugen Blut. Die Larven finden sich in modernden, sauligen Stoffen, in den Ritzen der Dielen u. s. w., sind madenartig, fußlos, springen, indem sie sich im Kreise biegen, und haben einen hornigen Kopf. Nach zwölf Tagen spinnen sie sich einen kleinen Cocon aus Seide, woraus sie nach etwa zwölf Tagen wieder als vollkommene Insekten hervorgehen.

Die Flöhe der Hunde, Katzen u. s. w. sind specifisch verschieden von denen des Menschen, ebenso der Sandfloh (Chique), dessen Weibchen sich in heißen Gegenden unter die Nägel der Beine eingrät und dort seine Brut absetzt, die vorher den Hinterleib ungeheuer auftreibt.

Ordnung der Halbflügler oder Schnabelflerse (Hemiptera).

Insekten mit saugenden Mundtheilen, freiem Prothorax, vier ungleichartigen oder gleichartigen Flügeln und unvollkommener Verwandlung.

Der Kopf ist klein, oft breit, meist aber schmal, dreieckig, vom Halschilde deutlich abgesetzt und nach unten in einen Schnabel (rostrum) verlängert, der bald mehr an der Spitze des Kopfes, bald mehr nach hinten entspringt und an der Unterfläche des Leibes, zwischen den Einkentungen der Beine, zuweilen selbst in einer Rinne verborgen liegt. Man unterscheidet an diesem Schnabel, sobald er vollständig ausgebildet ist, folgende Theile: Die Hauptmasse bildet eine gegliederte, von vornher tief ausgehöhlte Halbröhre, deren Rinne vorn offen ist und die meistens aus drei oder vier zusammengelenkten Abtheilungen besteht. Diese Schnabelscheide geht oben aus der Unterhaut des Kopfes hervor und ist offenbar die ausgewachsene, quergegliederte Unterlippe. In ihr liegen vier feine Hornborsten, die an ihrem Ursprunge im Kopfe spindelförmige Muskeln haben, wodurch sie bewegt werden und neben der Mundöffnung hervortreten. Die äußeren dieser Borsten sind meist an der Spitze etwas umgebogen, stärker, leichter zu trennen, es sind die verwandelten Kiefer oder Mandibeln. Die innern Borsten liegen fester zusammen, es sind die Kinnladen oder Maxillen. Zusammen bilden die Borsten ein in der Schnabelscheide verborgenes Stilet, womit die meisten dieser Insekten empfindlich stechen. Am Anfange der Schnabelscheide liegt über dem Beginne der Hohlrinne eine schmale, zungenförmige Dede, die Oberlippe, jedoch also der Schnabel aus den Hauptmundwerkzeugen, Oberlippe, zwei Kieferpaaren und Unterlippe, freilich in fast unentwerflicher Weise modificirt und aller Tafter beraubt, zusammengelest ist. Die Fühler sind meist fadenförmig, sonst

aber sehr wechselnd; die Augen klein, stehend; Nebenaugen fehlen oft.

Die Flügel sind sehr verschieden. Die Vierzahl vorhanden, zeigen sich die Vorderflügel, bald theilweise hornig und dann mit adern, geadernten Theile versehen; bei manchen lederartig, ebenfalls nur zum Theile; bei manchen gänzlich den Unterflügeln im Baue gleich. Die Hinterflügel sind meist kleiner als die in der Regel den Oberflügel, glasheft und mit Adern versehen. Die Brust zeigt meist ein deutliches Schildchen, oft ist zwischen den Flügeln noch ein mehr oder weniger großes Rückenchildchen (Scutellum) vorhanden. Bei den meisten finden sich Gangfüße, bei manchen mehr als drei Tarsofüßern; bei einigen Vorderbeine zu Raubfüßen, oder die Hinterbeine zu Schwimmsüßen umgestaltet.

Bei der Begattung sitzen viele Schnabelflerse einander. Aus den Eiern kommen Larven, deren Form, Gewohnheit, Lebensart, Nahrung von den Eltern sehr gleichen, aber fast immer meist mit zartem, seidenartigem Glanze. Nach mehrfacher Häutung zeigen sich die Flügeldecken und später die vollständig ausgebildeten Flügel. Manche gebären lebendige Jungthiere.

Alle Schnabelflerse saugen Säfte, entweder von lebenden Insekten oder auch von Blättern. Manche Pflanzenläusen lebenden wohnen meist in Gruppen zusammen und verursachen durch ihre Stiche Entartungen der Gewächse.

Unterordnung der Landwanzen (Coreidae). Der Körper meist breit, platt; Kopf kleiner als der Rücken. Fühler fadenförmig, drei- oder viergliedrig, frei vorstehend mit deutlichen cylindrischen Gelenken länger als der Kopf. Der Rüssel entspringt an der Spitze des Kopfes, wird knieförmig umgebogen, reicht höchstens bis ans Ende der Brust. Die Flügel sind stets von den Unterflügeln verschieden, die Hinterflügel ganz oder nur zur Hälfte hornig und dann mit Adern, geadernten Theile versehen; bei manchen lederartig, ebenfalls nur zum Theile; bei manchen gänzlich den Unterflügeln im Baue gleich. Die Hinterflügel sind meist kleiner als die in der Regel den Oberflügel, glasheft und mit Adern versehen. Die Brust zeigt meist ein deutliches Schildchen, oft ist zwischen den Flügeln noch ein mehr oder weniger großes Rückenchildchen (Scutellum) vorhanden. Bei den meisten finden sich Gangfüße, bei manchen mehr als drei Tarsofüßern; bei einigen Vorderbeine zu Raubfüßen, oder die Hinterbeine zu Schwimmsüßen umgestaltet.

Familie der Schildwanzen (Pentatomidae). Der Körper meist breit, oval, hart. Fühler fünfgliederig. Der Kopf des Rückens ist sehr groß, bedeckt wenigstens die Hälfte des ganzen Hinterleibes, jedoch die Hinterflügeldecken der Käfer sehr ähnlich sehen. Kopf klein, dreieckig, breit, oft verlängert, mit scharfen Ecken. Die Hinterflügeldecken der Käfer sehr ähnlich sehen. Kopf klein, dreieckig, breit, oft verlängert, mit scharfen Ecken. Die Hinterflügeldecken der Käfer sehr ähnlich sehen. Kopf klein, dreieckig, breit, oft verlängert, mit scharfen Ecken.

Familie der Landwanzen (Coreidae). Der Körper meist breit, oval, hart. Fühler fünfgliederig. Der Kopf des Rückens ist sehr groß, bedeckt wenigstens die Hälfte des ganzen Hinterleibes, jedoch die Hinterflügeldecken der Käfer sehr ähnlich sehen. Kopf klein, dreieckig, breit, oft verlängert, mit scharfen Ecken. Die Hinterflügeldecken der Käfer sehr ähnlich sehen. Kopf klein, dreieckig, breit, oft verlängert, mit scharfen Ecken.

Familie der Flinwanzen (Cassidae). Der Körper meist breit, oval, hart. Fühler fünfgliederig. Der Kopf des Rückens ist sehr groß, bedeckt wenigstens die Hälfte des ganzen Hinterleibes, jedoch die Hinterflügeldecken der Käfer sehr ähnlich sehen. Kopf klein, dreieckig, breit, oft verlängert, mit scharfen Ecken. Die Hinterflügeldecken der Käfer sehr ähnlich sehen. Kopf klein, dreieckig, breit, oft verlängert, mit scharfen Ecken.

is, Taf. 27, Fig. 29.) Leben meist in Gräse, an Baumstämmen und auf Schirmen.

der Hautwanzen (Membranacea). Kopf flach, horizontal. Augen klein. Schnabel einer Rinne unter der Kehle versteckt. Fühler keulenförmig, kurz, nur auf die halbe Brust. Flügel dünn, geädert, zuweilen gänzlich vorbrühen, Flügeldecken und Hinterleib oft röhren blasigen und häufigen Fortsätzen versehen. Keine zart, dünn, zuweilen die vordere zu n gestaltet und verdickt. Der ganze Körper oben meist im Gräse, unter Baumrinne, aber be. Eine Art, die Bettwanze (*Cimex lectularius*, Taf. 27, Fig. 30), ist gänzlich flügellos und vom Blute des Menschen. Sie hält sich ben Fugen und Ritzen des Holzwerks auf, erder Kälte und kann in diesem Zustande Jahre bring zubringen.

der Schreitwanzen (Reduviidae). Kopf oder länglich, hinter den Augen häßförmig geschnürt. Schnabel kurz, meist absteigend, ung, dünn; Augen groß. Flügeldecken wenig. Beine meist lang; Schenkel oft verdickt, mit und Vorsten besetzt. (Kothwanze, *Reduvius* us, Taf. 27, Fig. 31.) Sie nähren sich alle ern Insekten, die ihr auch dem Menschen indlicher Stich augenblicklich tödtet; sind nächtliche, die tags über im Moos, unter Baumrinne der Wohnungen lauern und in der it ihrem Raube nachgehen. Larven meist art, flaumig, mit Moder und Kiebricht bedekt. Ordnung der Wasserwanzen (Hydrocorae). st groß; Augen stets deutlich, stark hervortragend. ei: ober viergliederig, sehr klein, unter den Augen meist in einer Rinne liegend. Schnabel kurz, knie gebogen, sodaß er höchstens bis auf die r Brust reicht. Flügel ungleich, die obere artig, deckend, die untere dünn, wasserhell igen Längsadern. Füße sehr verschieden, die e meist Raubfüße, die hintern Schwimmfüße gen Vorstenhaaren besetzt. Larven ein: bis erig, mit oder ohne Krallen. Alle Arten leben i Gewässern, und die meisten haben zu dem der Atmung am Hinterleibe zwei längerehren. Sie leben sämtlich vom Raube ansekten, die sie mit den Raubfüßen ergreifen dem starken Schnabel durchbohren und aus: Die meisten stechen sehr empfindlich.

der Wasserläufer (Hydrometridae). Körp lang gestreckt, linearisch; Fühler lang; vier:; Schnabel bis auf die Vorderbrust reichend, gedreht; Scheide dreigliederig. Nebenaugen Flügel meist verkürzt oder selbst ganz fehlend, vollständig und dann die Flügeldecken ganz g, ohne häutigen Anhang. Beine sehr lang, die hintern meist länger als die vordern. in einem Ausschnitt des letzten Larfsalles. Der ganze Körper ist mit feinen, weichen, Härchen bedekt, die das Wasser abhalten. erläufer, *Hydrometra paludum*, Taf. 27, Fig. Die Thiere laufen und springen mit großer eiligkeit auf der Oberfläche besonders stehender r und nähren sich von kleinen Insekten. Eine g, *Halobates*, ist das einzige Meerinsekt; sie f hoher See in tropischen Zonen.

der Wasserfroschlurche (Nepidae). Kopf ein, rundlich; Schnabel sehr kurz, bogenförmig ten gerichtet, nur bis zum Anfange der Brust. Beine taht, meist lang; die Hinterbeine zu-

weisen mit Vorsten besetzt, aber nicht breitgedrückt und in Ruderform umgewandelt; Vorderbeine kräftig, gebogen, zum Fangen eingerichtet, einigermaßen den Scheren der Skorpione ähnlich, woher der Name. Hinterleib mit langen Athemschüßeln. (Wasserfroschlurche, *Nepa cinerea*, Taf. 27, Fig. 34; Wasserfroschlurche, *Naucoris cimicoides*, Fig. 33.) Kriechen meist langsam auf dem Grunde der Gewässer, kommen aber nachts hervor, um selbst herumzuspringen.

Familie der Rüdenschwimmer (Notonectidae). Kopf sehr breit, kurz; Schnabel bis auf die Mitte der Brust reichend. Vorderfüße trallernartig gebogen; Hinterfüße sehr lang, quer nach den Seiten in der Ruhe gerichtet, plattgedrückt, mit langen Schwimmvorsten an Schienen und Larven, die zweigliederig sind. (Rüdenschwimmer, *Notonecta glauca*, Taf. 27, Fig. 35.) Bauch flach, behaart, Rücken gewölbt. Schnelle geschickte Schwimmer, die aber beim Schwimmen den Bauch nach oben, den Rücken nach unten kehren, also verkehrt schwimmen.

Unterordnung der Gleichflügler (Homoptera).

Vier gleichgestaltete Flügel.

Die Familie der Zirpen (*Cicadidae*), besteht aus didleibigen Thieren mit großem queren Kopfe, die nur sehr kurze, borstenförmige Fühler von drei bis sechs Gliedern, runde vorgequollene, mittelgroße Augen und meist auch Nebenaugen besitzen, die indessen oft fehlen, oder nur zwei, sehr selten drei sind. Der Schnabel ist kurz, dick, sehr nach hinten gezogen, sodaß er zwischen den Vorderfüßen zu entspringen scheint. Der Vorderbrust hat oft auffallende Fortsätze, Verlängerungen und Dornen, ebenso die Stirn, welche zuweilen blasig hervorgequollen ist. Flügel sind stets in der Vierzahl vorhanden, glashell, die vordere zuweilen mehr lederartig, die hintere weicher, beide mit Netaubadern durchzogen. Die Hinterbeine sind meist Springbeine, die Larven dreigliederig, die Krallen breit. Sie leben alle auf Pflanzen, deren Saft sie saugen, sind lebhaft und springen oder fliegen, während die Larven oft unbeweglich sitzen. Man unterscheidet folgende Unterfamilien:

Singzirpen, eigentliche Cicaden (*Cicadidae*). Die Fühler stehen vor den Augen, sind drei: bis viergliederig; Augen groß; drei Nebenaugen. Kopf breit, meist vorn ein Kreissegment bildend. Schnabel lang, Flügel ungleich, die vordere länger. Die Larven der Singcicade (Larve der Singcicade, Taf. 27, Fig. 37) leben mehrere Jahre, sind plump und dick und graben sich zum Ueberwintern in die Erde. Die Weibchen bohren ihre Eier in die Rinde der Gewächse mit einem Legestock. Die Männchen haben an der Unterseite des ersten Hinterleibsringels zwei tiefe, weite Stimmböhlen, in deren Grunde eine gefaltete, trockene, elastische Haut ausgespannt ist, welche ein starker Muskel nach innen zieht. Das Vörspringen dieser Trommelmhaut erzeugt einen scharfen, singenden, lauten Ton, der wirklich noch unangenehmer bei den südlichen großen Arten ist, als das Schreien der Heiden oder Grillen unserer Gegenden, aber unbegreiflicherweise von den sonst so ästhetischen Griechen als schöne Musik gepriesen wurde. Die abgebildete Art (*Singcicade*, *Cicada plebeja*, Fig. 36) kommt bei uns besonders auf der Ulme vor.

Leuchtzirpen (*Fulgoridae*). Die Fühler sind unter den Augen neben den Wangen eingelenkt und meist unter einer Leiste, welche die Wangen von der Stirn trennt, verborgen. Der Kopf ist scharfartig, oft in eine Spitze oder Nase vorgezogen, mit scharfen Leisten



bedeckt; Flügel meist gefärbt, ziemlich gleich. Man glaubte von einigen Arten, dem Laternenträger aus Surinam (*Fulgora lateraria*) insbesondere, die hohle Stirn leuchte, was aber unrichtig ist. Die Larve der abgebildeten, sehr vergrößerten Art (*Minircicade*, *Cixius nervosus*, Taf. 27, Fig. 38) bohrt in Blätter.

Budelzirpen (*Membracida*). Der Kopf steht senkrecht, die Stirn ist nach unten, der Scheitel nach vorn gerichtet; der Vorderrücken mit großen Dornen, Fortsätzen, Budeln u. s. w. versehen, die oft den ganzen Leib bedecken und wodurch die Thiere ein abentheuerliches Ansehen erhalten. Vorderflügel meist häutig, mit parallelen Adern. (*Ohrénzirpe*, *Ledra aurita*, Taf. 27, Fig. 40.)

Schaumzirpen (*Cercopida*). Körper meist kurz; Kühler dreigliederig, vor den Augen eingelenkt; zwei Nebenaugen. Kopf horizontal gestellt, Stirn nach vorn gewendet, Rücken schildförmig unbedeckt. Die Larven lassen ihren flüssigen Roth in Blasen aus dem After hervortreten und bedecken sich so mit einem Tröpfchen Speichel, dem sogenannten Kukultspeichel. (*Schaumcicade*, *Aprophora spumaria*, Taf. 27, Fig. 39.)

Die Familie der **Blattflöhe** (*Psyllida*) unterscheidet sich durch einen mehr rückwärts eingelenkten Stachel, kürzere Fühler, die nie die Länge des Leibes erreichen und an der Spitze gespalten sind, und verbildete, zum Springen eingerichtete Hinterchenkel. (*Blattfloh*, *Psylla genistae*, Taf. 27, Fig. 41.) Beide Geschlechter sind stets geflügelt. Sie leben ebenfalls auf Blättern, springen aber bei der geringsten Bewegung ab. Die Weibchen haben eine Gefäßgasse, mittels deren sie die Eier in die Knospen der Blätter einsenken.

Blattläuse (*Phytophthiria*). Kurze Thierchen mit schmalem Kopfe, dreiringeliger Brust und flaschenförmigem, widem Hinterleibe, die stets auf Gewächsen leben und dort oft durch ihre Stiche Gallen und ähnliche Auswüchse verursachen. Die Fühler sind faden- oder borstenförmig, länger als der Körper; die Augen meist mittelgroß, rundlich vorstehend, die Fühler zwischen ihnen eingesetzt. Nebenaugen fehlen. Der Schnabel ist meist lang, dünn, entspringt an der untern Seite des Kopfes weit nach hinten hin und wird unter den Kopf zurückgeklappt getragen; die Schnabelscheide ist dreigliederig; Flügel meist vorhanden, öfter bei den Weibchen fehlend; Vorderflügel stets viel größer; Beine lang, dünn; Larven zweigliederig, mit zwei Klauen versehen.

Bei den eigentlichen Blattläusen (*Aphidida*) stehen auf dem Hinterleibe zwei gerade Röhren, aus denen ein süßer Zuckersaft quillt, nach dem die Ameisen besonders sehr begierig sind. Jeder Ameisenhaufen hat gewissermaßen eine Domäne von Bäumen, Sträuchern und Kräutern, auf deren Blättern und Wurzeln Blattlauscolonien sitzen, die von den Ameisen sorgsam gepflegt, oft selbst von einem Orte zum andern getragen werden. Man sieht, wie die Ameisen dieses ihr Nahrungsmittel, welches sie mit den Fühlförnern streicheln und klosen, bis sie den Sonigsaft aus den Röhren lassen, welchen die Ameisen gierig einschluden. Die Fortpflanzungsweise dieser Thiere ist eigenthümlich. Im Herbst gibt es geflügelte Männchen und Weibchen, die sich begatten, wonach das Männchen stirbt, das Weibchen seine Eier in Rinden legt oder auch unter der Erde an Wurzeln fortlebt. Im Frühjahr kriechen die Jungen aus; flügellose Weibchen, deren Eierstöcke vielsammlerige Cirröbren besitzen und kurze Eileiter ohne Samentasche, Begattungstasche oder Rittorgane. Diese Thiere bringen ohne Begattung durch innere Knospung Eier hervor, die noch im Eileiter ausschöpfen, sodas sie lebendige Larven gebären, die nach mehrmaliger

Häutung wieder auf dieselbe Art Junge zu erzeugen folgen sich den ganzen Sommer hindurch ab, unter günstigen Umständen selbst in mehreren Generationen ungeschlechtlicher Weisen, die die Erzeugung von Männchen und eierlegenden Weibchen sich begatten, die Reihe schließt. Die Weibchen haben lange Rittdrüsen, ein Organ, welches beides den Ammen fehlt, und einleiten kann. Viele Blattläuse bedingen durch ihre Röllungen und Auswüchse der Blätter, die sie mit ihrer Brut leben.

Schildläuse (*Coccida*). Die meisten wohnen in wärmern Zonen, alle parasitisch auf Pflanzen, die sie selten verlassen. Ihre Fortpflanzung ist sehr verschieden, oft so abweichend, dass man lange von einigen Arten bezweifelte, ob sie zu den Thieren seien. Die Männchen sind meist sehr schlank, mit wagerechtem Kopfe, langen schnurförmigen Fühlern, die meist beinahe die Länge der Flügel erreichen, und sehr kleinen Augen, die aus gehäuftem Ringelwerk bestehen. Die Mundwerkzeuge sind die im vollkommenen Zustande nur sehr wenig entwickelt, leben und keine Nahrung zu sich nehmen, sind sehr verarmt, sodas nur ein Paar Beine ihrer wahrgenommen werden. Flügel sind nur bei wenigen vorhanden, sehr selten findet man geflügelte, meist statt ihrer nur Schwingelohren, die verarmte Stummeln; sie sind sehr kurz. Die Weibchen sind durchgängig flügellos; der Körper schildförmig, oben gewölbt, unten abgeflacht. Beine sehr kurz; der Kopf gar nicht aus dem Körperhülle oft undeutlich. Die Weibchen sitzen wie flache Warzen an den Gewächsen, deren Gewebe ihr mit sehr langen Borsten versehen permanent eingesenkt ist, und sind meist mit einem feinen Flaum zarter Wachsfäden bedeckt. So oft sie in diesem Zustande die Beweglichkeit verlieren, legen nach der Begattung die Eier unter die Haut, die sie dieselben mit dem schildförmigen Körper nach dem Eierlegen sterben lie, und der sich bildet nun eine feste, schildförmige Decke, die die Eier, die demnächst ausschöpfen, die Thiere bewege, muntere Thierchen, deren Gesicht sich meist nur an der Breite des Leibes zeigt; auch die männlichen Larven vermehren sich, sind bewegliche, umherkriechende Thiere mit Gliedern und anliegenden Fühlern und Fühlern, während die weiblichen Puppen sich nur durch die Breite von den Larven und durch längere Fühler von den Weibchen unterscheiden. Die meisten führen in der Körperhaut ein schön rothes Cochenille oder Kermeslad. Man nimmt die Anwendung dieses Farbstoffs besonders in Mexico, wo man die Cochenille (*Coccus cacti*, Taf. 27, Fig. 42) in einem man trachtige Weibchen in besonderer Weise die Blätter der Pflanzen fest und die Larven sich festgelesen haben, auf diesen Pflanzen zu sammeln, die toten Männchen nach der Begattung und tödtet diejenigen trachtigen Weibchen, deren man nicht zur Nachzucht bedarf, und die Weibchen, worauf man sie getrocknet in der Küche bringt. Vor der Ausbeutung in America hat man zu gleichem Zwecke eine Schildlausart, die in Norddeutschland und Polen auf den *Scleranthus perennis* vorkommt.

Schmaröser (Parasita)

In die Familie der Läuse (*Psocoptera*) gehören einige Gattungen mit durchscheinendem, durchsichtigem Körper, an denen Brust und Hinterleib

oder gar nicht getrennt sind und die nur auf Säugethieren schmarozhen. Der Kopf ist deutlich abgesetzt, dreieckig, kugelig oder eiförmig; die Fühlhörner kurz, meist schwach behaart, aus fünf beinahe gleichgroßen Gliedern zusammengesetzt; die Augen sehr klein, jedesseits hinter den Fühlern bemerklich; die Mundwerkzeuge bestehen aus einem Küssel, der ganz in den Kopf zurückgezogen werden kann und aus einer weichen, unten erweiterten Scheide zusammengesetzt ist, in welcher vier Stachborsten spielen, die das eigentliche Stilet zusammensetzen; die Scheide selbst hat an ihrer Spitze eine doppelte Reihe von feinen Hälften. Die Brust läßt sich bei den meisten Gattungen nicht deutlich von dem Hinterleibe unterscheiden; sie trägt drei kurze, kräftige Klammerfußpaare, deren letztes Glied mit einer starken, getrümmten Klaue bewaffnet ist, die sich gegen einen Ausschnitt einklappen und so das Haar wie eine Zangenscherre fassen kann.

Die verschiedenen Gattungen und Arten dieser Familie leben schmarozend nur auf dem Menschen und auf Säugethieren, deren Haut sie ansetzen, um ihr Blut zu saugen. Die Eier oder sogenannten Nisse werden an die Haare angelagert und schlüpfen in wenigen Tagen aus. Jede Art von Säugethieren hat eine besondere Art von Läusen, und der Mensch allein nährt vier Arten, die verschiedenen Gattungen angehören, indem die Kopf- und Kleiderlaus (Kopflaus, *Pediculus capitis*, Taf. 27, Fig. 43) sehr von der Sitzlaus (*Phthirus pubis*, Fig. 44) abweichen.

Als Anhang erwähnen wir noch die Familie der Felsfresser (*Mallophaga*). Diese Insekten haben im allgemeinen die Gestalt der Läuse, zeigen aber stets einen deutlich abgesetzten Kopf von dreieckiger oder halbrunder Gestalt, der oft mit sonderbaren Spigen besetzt ist. Die Fühler sind ebenfalls fünfgliederig, die Mundwerkzeuge aber zum Kauen eingerichtet. Sie haben nämlich zwei deutliche, hakenförmige Kiefer, welche von oben und unten durch breite Lippen bedeckt sind. Kinnladen mit oder ohne Taster sind bald vorhanden, bald fehlen sie. Die Füße sind kurz, kräftig, die Tarsen zweigliederig, mit starken, einfachen oder doppelten Krallen bewaffnet. Sie leben meist auf Vögeln, sowie auch auf Säugethieren, fressen die feinen Flaumfedern und Flaumhaare ab, saugen kein Blut und gehören, ihrer launenden Mundtheile wegen, gar nicht zu den Halbflüglern, lassen sich aber bis jetzt noch zu keiner andern Ordnung bringen.

Klasse der Tausendfüße (*Myriapoda*).

(Tafel 27, Figur 45 bis 49.)

Durch Tracheen athmende Gliederthiere mit getrenntem Kopfe, einem Fühlerpaare, ohne deutlich geschiedenen Thorax und mit vielfach fußtragenden Ringeln, die einander ziemlich gleich sind.

Die äußere Körperform dieser Thiere ist gewöhnlich die eines langgestreckten, bald walzenförmigen, bald mehr abgeplatteten Wurms mit deutlich abgesetztem Kopfe und einer großen Anzahl von gegliederten Füßen, die zu beiden Seiten des Körpers seiner ganzen Länge nach stehen; nur wenige Arten sind platt, breit, etwa von der Gestalt der Kelleraaseln, mit welchen ältere Naturforscher sie zuweilen verwechselten. Der rundliche, platte Kopf trägt stets ein Paar fadenförmiger, meist vielgliederiger Fühler, welche ganz in derselben Weise wie die Fühlhörner der Insekten vorn auf der Stirn eingelenkt sind; gewöhnlich sind diese Fühler nur kurz, selten erreichen sie die Länge des Körpers. Hinter den Fühlern stehen auf der Seite die Augen, welche bei einigen Gattungen

fehlen, und immer aus gehäuteten einfachen Augen bestehen. Die Mundwerkzeuge, welche der Kopf auf seiner untern Fläche trägt, sind eigenthümlich gebildet und zeigen bedeutende Verschiedenheiten bei den einzelnen Gattungen. Die Oberlippe ist sehr klein und meistens mit dem Kopfschilde verwachsen; unter ihr liegen zwei längliche, gegliederte, quer gezähnelte und harte Hornstüde, welche offenbar zum Kauen tauglich sind und die man den Kiefern der Insekten zur Seite stellen muß. Hinter diesen Kiefern findet man zwei andere gegliederte Stüde, die weicher sind und eine tasterartige Beschaffenheit haben; an ihrer Basis sind sie mit zwei spitzen, langen Hornstüden verbunden, welche in die Mundöffnung hineinstehen und offenbar die Kinnladen (*maxillae*) der Insekten darstellen. An diesen Laden ist noch ein zweites Paar von Tastern eingelenkt, die an ihrer Spitze mit einer kleinen Klaue bewaffnet und wol dem innern Videntaster der Läusefresser analog sind. Die Unterlippe ist bei den Tausendfüßen das wesentlichste Organ zum Ergreifen der Beute und zum Beißen geworden. Die Lippe selbst ist nämlich tief gespalten, hart, hornig und auf der Innenseite mit starken Zähnen besetzt; auf ihr eingelenkt stehen die Lippentaster, welche hier zwei starke, gegliederte Haken darstellen, die wie eine scharfe Kneipzange gegeneinander wirken und bedeutend verlesen können, so selbst, daß der Biß der großen Arten in südlichen Gegenden für eine gefährliche Verwundung gilt. Nicht bei allen Gattungen sind indeß die Kauwerkzeuge in dieser Weise ausgebildet, ja es gibt selbst solche, bei denen die Lippentaster und Kiefer gänzlich zurückfallen und die Lippe sich zu einer Art Scheide ausbildet, sodas gewissermaßen ein Saugrüssel hergestellt wird.

Der Körper der Tausendfüße läßt niemals eine Abtheilung von Brust und Hinterleib erkennen. Er besteht aus einzelnen Ringen, deren Zahl oft in die Hunderte steigt, und die einander um so ähnlicher sind, je bedeutender ihre Zahl ist. Jeder dieser Ringe trägt entweder ein oder selbst zwei Paar Füße, an welchen man stets deutlich die besondern, mit Krallen bewaffneten Fußglieder unterscheiden kann, während die übrigen Glieder des Fußes meist durchaus von derselben Größe sind und keine weitem Formeigenthümlichkeiten zeigen. Auffallend ist die Besonderheit, welche nur bei der Familie der Doppelfüßer in dieser Klasse, und sonst bei keinem Gliederthiere vorkommt, daß die Körperringel je zwei Paare von Beinen tragen, die hintereinander stehen.

Der innere Bau der Tausendfüße entspricht ganz demjenigen der Insekten. Der Hirnnoten ist ziemlich groß, in zwei Hälften getheilt, das Bauchmark lang gestreckt, aus vielen fast gleichmäßig großen, in einer Reihe längs des Körpers gestellten Knoten zusammengesetzt, die bald durch doppelte Längsfäden verbunden sind, bald unmittelbar aneinanderstoßen. Der Schlund ist kurz; auf ihn folgt ein langgestreckter Chylusmagen, der mit einem förmigen Leberüberzuge versehen ist und in dessen Ende die sehr einfachen, wenig zahlreichen Harngefäße einmünden. Die Athemorgane sind sehr deutlich und bestehen aus büschelförmig verästelten Luftröhren, die ganz wie diejenigen der Insekten gebaut sind und von Stigmen ihren Ursprung nehmen, die meist spaltenförmig gebaut, zuweilen aber auch rund und von einer siebförmigen Hornplatte bedeckt sind. Diese Luftröhren stehen meist paarweise neben den Fußwurzel und entsprechen nicht immer den einzelnen Ringen, sondern wechseln gewöhnlich in unregelmäßigen Verhältnissen ab. Das Herz bildet einen langen, cylindrischen Schlauch, welcher der Rücken

seite entlang läuft, eine Menge Arterien abgibt, und gegen den Kopf hin sich in eine Aorta fortsetzt, deren beide Äste die Schlund umfassen und sich auf der Bauchseite wieder vereinigen, um ein längs der Nervenleiste hinlaufendes Bauchgefäß zu bilden. Die Arterien endigen mit offenen Mündungen; das in die Leibeshöhle ergossene Blut sammelt sich in der Umgegend des Herzens und tritt durch viele seitliche Spalten in die Herzklammern ein.

Alle Tausendfüße sind getrennten Geschlechts und pflanzen sich nur durch geschlechtliche Zeugung fort; sie haben stets nur einen einzigen, weiten, schlauchförmigen Eierstock, der sich bald vorn unter dem dritten, bald hinten an dem letzten Leibesringel durch zwei kurze Gileiter öffnet und mit dem gewöhnlich birnförmige Samentaschen in Verbindung stehen. Die Männchen haben bald einen, bald zwei Hodenschläuche, zuweilen selbst mehrere, welche gewöhnlich in der vordern Leibeshöhle in eine oder zwei kurze warzenförmige Röhren ausmünden. Man hat beobachtet, daß die Thiere, wenn sie aus dem Ei schlüpfen, nur drei Fußpaare besitzen, oder auch ganz fußlos sind, und daß bei jeder folgenden Häutung eine gewisse Anzahl von Füßen neu entsteht.

Die Tausendfüße leben meist auf der Erde unter Steinen, Moos, niedrigen Pflanzen, oder auch unter Baumrinden verborgen. Einige graben sich in die Erde ein. Die meisten laufen ebenso schnell rückwärts als vorwärts, und rollen sich in Gefahr ringförmig ein. Wir theilen die ganze Klasse in zwei Familien.

Die Familie der Einsfüßer (Chilopoda) besteht aus stets plattgedrückten Tausendfüßern mit meist dachziegelförmigen Ringen, langen Fühlhörnern, die wenigstens vierzehne Glieder haben und deren Mundwerkzeuge jene Ausbildung zeigen, welche wir oben von der Klasse überhaupt beschrieben. Der Eier Schlauch der Weibchen läuft von vorn nach hinten und öffnet sich unmittelbar vor dem After. Die Ringe des Körpers, die gewöhnlich gleich, zuweilen aber auch abwechselnd ungleich sind, bestehen aus zwei Halbbogen, die an der Seite häutige Verbindungen haben. Jeder Ring trägt nur ein einziges Beinpaar, die oft eine bedeutende Entwicklung erreichen. Der Biß der großen Arten, welche in den heißen Zonen vorkommen, wird für giftig gehalten, ohne daß man bis jetzt besondere Giftorgane hätte entdecken können. Der Schildfuß (Scutigera araneoides, Taf. 27, Fig. 45), den wir hier abbilden, findet sich in Südeuropa in der Erde, während der tropische Skolopender (Scolopendra Lucasi, Fig. 46) gefürchtet ist und der kleine Tausendfuß (Geophilus electricus, Fig. 47), ein unschädliches kleines Thier, bei uns häufig ist.

Die Familie der Doppelfüßer (Diplopoda) besteht aus gewöhnlich wurmförmigen oder stark abgeplatteten Thieren mit Ringen, welche die bei den Krustenthieren gewöhnliche Härte erreichen. Die Fühler sind kurz, siebengliedrig, der Leib aus unter sich gleichen Ringen zusammengesetzt, deren jeder zwei Paare kurzer Füße trägt, die aus sechs Gliedern bestehen und eine kleine einfache Kralle tragen. Die weiblichen Thiere haben einen von hinten nach vorn verlaufenden Eier Schlauch, dessen Öffnungen am vordern Leibesende sich befinden. Die Klawenwerkzeuge sind verschieden gestaltet, die großen hakenförmigen Klawentaster der Unterlippe nur rudimentär. Zu dieser Familie gehören die drehbrunden Biersfüße (Biersfuß, Julus terrestris, Taf. 27, Fig. 48), die sich einrollen und von welchen die abgebildete Art den Runkelraben zuweilen sehr schädlich wird, und die Schalenasseln (Schalenassel, Glomeris limbata, Fig. 49) mit abgeplattetem Kör-

per, die sich wie Asseln kugelförmig zusammenrollen können.

Klasse der Spinnenthiere (Arachnida)

(Tafel 27, Figur 50 bis Tafel 28, Figur 51)

Gliederthiere ohne deutlich getrennten Kopf, mit zu Werkzeu gen umgewandelten Fühlern und nur an der Region des Thorax (phalothorax) eingelenkten, bestenfalls Gliedmaßen, ohne Füße am Hinterleib. Nur einfache Augen. Niemals Athmung.

Die drei Körperregionen sind bei den Arachniden niemals vollständig getrennt; bei vielen niedrigeren Formen bildet der ungeliederte Körper eine einzige mehr oder minder rundliche Masse, von vorn die Mundwerkzeuge, weiter gegen hinten die Beine, und hinten After und Geschlechtsorgane angebracht sind, sodas also sämtliche Körperteile gänzlich ineinandergeheftet sind. Die übrigen Arachniden sind Kopf und Brust als einzigen Masse, der Kopfbrust (cephalothorax) schmelzen, der Hinterleib dagegen mehr oder weniger deutlich abgesetzt; doch zeigt sich bei manchen auch hier gegliedert und in deutliche Ringe abgetheilt, denen jeder ein Paar Füße trägt. Die Glieder finden sich in der Bildung des Hinterleibes bald gegliedert, bald ungeliedert. Die Grundlage der Haut besteht aus einem meist weichen, haut- oder lederartigen Grund, nur in wenigen Fällen eine größere oder kleinere glasartige Sprödigkeit erhält. Trotz der Dehnbarkeit, die sich besonders nach der Entwicklung zeigt, besitzt dennoch diese Haut keine Contractionsfähigkeit; nur selten ist sie über den Körper nackt; meist finden sich Haare, und auch sehr sonderbar gegliederte Anhangsorgane auf dieser Haut, unter welchen in Form von Warzen und Bläschen die Farbstoffe abgelagert sind. Bei vielen Arachniden ihre schönen Färbungen.

Die Beine der Arachniden bestehen aus einer Ausbildung aus denselben Theilen, welche so festem Typus bei den Insekten besteht aus einem rundlichen Hüftglied (coxa), an welches ein oder mehrere Trochanteren (trochanter) anschließen. Die Gelenkung des Beins an der Kopfbrust folgt gewöhnlich ein ziemlich kräftiger Stachel und dann eine langgestreckte Schiene (tibia), die gewöhnlich ein gewöhnlich zweigliedriger Tarsus, dessen Ende eine oder mehrere Krallen bildet. Bei den Milben fällt es häufig sehr verschieden in gleiche Abschnitte getheilten verschiedenen Abtheilungen herauszutreten. Bei langbeinigen Weber spinnen erscheint der Tarsus als ein sehr vermehrt, die Bestimmung ebenso schwierig wird. Bei den drei hintern Beinpaaren einander, das vordere Beinpaar sehr mannichfaltig nimmt und sich hierdurch wie durch einen Stachel an die Mundwerkzeuge als einen eigentlichen Fuß oder als Kinnlade (Mandibula) darstellt. In der Bestimmung verschieden ist dann ferner der Tarsus des letzten Tarsalgliedes; bei manchen Milben sind die Fußkrallen durch einen Stachel ersetzt; bei den übrigen, welche ihre Beine zum Laufen oder zum Spinnen der Beute benutzen, sind gewöhnlich eine oder zwei einzeln an den meisten spinnenden Arachniden hinteren Krallen auf der innern Seite mit einem

besetzt, die offenbar zur Handhabung des Bezugs stehen und denen oft noch eine weitere Krallen gegenübersteht.

Mundwerkzeuge der Arachniden sind zwar selben Typus ausgebildet, allein in so verschiedenen Entwickelungen, daß es schwierig hält, allgemeinen zu schildern. Mit Ausnahme einer Familie sind sämtliche Arachniden fleischfresser, die meistens ihre Beute mit List oder Verfall und aussaugen, nachdem sie ihr tote Wunde beigebracht haben. Die beiden an dem Munde werden von den umhüllten Fühlern gebildet, die bald stiletartig Messertlingen vorgehoben werden können, Scheren ausgebildet sind, und in andern oder einen biden, kurzen Fortsatz darstellen, der eine scharfe Kante wie die Klinge eines Messers erzeugt; hinter diesen Kieferfühlern die eigentlichen Kiefer, welche bald scheren-, bald wirkliche viergliedrige Zäher darstellen, deren Basis sich nur eine Platte befindet, auch kaum zum Beißen oder Rauen benutzt un. Außer diesen mannichfach wechselnden findet man gewöhnlich nur noch sehr kleine Lippen, die bei dem Saugen an die Wunde der Beute angebracht werden. Bei vielen ist die Mundwerkzeuge auf einem besondern Kiefer, dessen Basis oft so angeordnet ist, besonders bei jungen Tieren, daß man vermuthen, vom Leibe abgetrennt Kopf vermuthen, der sich leicht durch die Beobachtung Augenstellung aufklären läßt.

Das Nervensystem der Arachniden zeigt, übereinstimmend mit der Verschmelzung der einzelnen Körperteile, auch meistens einen sehr hohen Grad der Vereinfachung. Bei den einleibigen Milben existirt ein einziger Bauchknoten, und statt eines Hirns nur ein einfaches Band über den Schlund, während bei den Spinnen ein ungeheureren sich findet, der fast unmittelbar in das Gehirn übergeht, so daß in der Nervenfaser nur ein oder zum Durchtritt des Schlundes bleibt. Die Hinterleibes fuhrt sich dann noch ein kugelförmiger Bauchknoten, der indessen fehlt, während bei den langleibigen Skorpione den Ringeln des Hinterleibes entsprechende tentakel existirt.

Die Sinnesorgane hat man bis jetzt außer Augen keine Spur entdecken können, obgleich bei den Arachniden um so weniger Grund zu bezweifeln darf, als man namentlich hinlänglich bei der Zähmung von Spinnen nachgewiesen hat, daß sie auf musikalische Töne sehr empfindlich und das ihnen bestimmte Futter nehmen. Die einfachen Augen der Arachniden aus einer becherförmigen Ausbreitung der Netzhaut, die von einer dunkel gefärbten Pigmentzelle umgeben ist und nach innen einen kegelförmigen Kern umhüllt, in dessen nach außen gerichteter kegelförmige Linse steht, welche von einer Hornhaut überwölbt wird. Die Zahl der Augen wechselt von zwei bis acht, und meistens je sechs, oder noch häufiger in einer Gruppe von drei, oder selbst mitten auf dem Kopf des ungegliederten Leibes auf. Gewöhnlich ist bei dieser Augen ebenso verschieden wie ihre Zahl und Richtung, so daß alle diese Verschiedenheiten vortreffliche Merkmale zur Unterscheidung der Arten bilden.

Der Darmkanal der Arachniden beginnt gewöhn-

lich mit einem dünnen, knieförmig gebogenen, anfangs hornigen, dann sehr muskulösen und angeschwollenen Schlund, der bei den Skorpionen und übrigen kräftigeren Arachniden in den geraden Darmtrakt sich fortsetzt, welcher, ohne weitere Besonderheiten in seinem Verlaufe zu zeigen, am Ende des Hinterleibes sich in einen spaltenartigen After öffnet. Bei allen übrigen Arachniden dagegen bildet der Magen entweder einen mittlern Saß, oder gar einen hohlen Ring, von welchem aus oft sehr lange Blindfäden entspringen, die bald auf die Kopfbrust und den Leib beschränkt sind, oft aber auch weit in die Beine und Kiefertaster hinein, selbst bis in die Nähe des Klauengliedes sich erstrecken. Von diesem vielfach verzweigten Magen aus entspringt nach hinten ein Darmkanal, der meistens unmittelbar vor dem After eine kugelförmige Ausbuchtung besitzt. Speicheldrüsen kommen fast überall vor; die Leber erscheint bei den niederen Typen nur als körniger Ueberzug über den Darm, während sie bei den höheren eine ansehnliche lappige Masse bildet, die aus kurzen Blindfäden besteht. Die Harnorgane existiren in Form dünner, meist unverästelter Röhren, die unter dem Magen in den Darm einmünden.

Besondere Athemorgane fehlen mehreren niederen stehenden Arachniden durchaus, während bei den höheren bald Luftröhren, bald aus einer eigentümlichen Modifikation dieser Luftröhren hervorgehende, sogenannte Lungen vorhanden sind. Die Luftröhren sind äußerst zart, mehr oder minder verästelt und entspringen von Athemlöchern, Stigmen, die meistens sehr versteckt und paarig angebracht sind. Bei den Spinnen kommen ganz platte Luftröhren vor, welche die Luft sehr fein zertheilt enthalten und den Uebergang zu den sogenannten Lungen bilden. Diese bestehen aus runden, sich in die Bauchfläche des Unterleibes befinden, durch eine Querspalte nach außen öffnen und in ihrem Innern eine gewisse Anzahl von Platten, in ähnlicher Weise gestellt wie die Blätter eines Buchs, enthalten; jedes dieser Blättchen stellt eigentlich eine Reihe plattgedrückter Luftröhrenstämme dar.

Die Arachniden, welche keine besondern Athemorgane besitzen, entbehren auch jeder Spur eines Kreislaufs, während bei den andern sich ein wohl ausgebildetes Herz findet, das meistens eine schlauchförmige Gestalt besitzt. Dieses Herz ist in mehrere Kammern abgetheilt, die auf ihren Seiten Spaltöffnungen zeigen, während das Herz selbst eine große Anzahl von sehr feinen Arterien aussendet, die sich in dem Körper verzweigen und ohne Zweifel mit offenen Mündungen endigen, da nirgends rückführende Gefäße existiren.

Fast alle Arachniden sind mit besondern Giftorganen ausgestattet, welche bei den meisten an dem Kopf liegen und mit den Mundwerkzeugen in Verbindung stehen, bei den Skorpionen aber an der Spitze des Hinterleibes angebracht sind. Gewöhnlich bilden diese Giftdrüsen paarige gewundene Drüsenknäuel, die dünne Ausführungsgänge entsenden, welche in den hakenförmig gebogenen, scharfen Klauen der Kieferfühler oder in dem gekrümmten Schwanzfaden der Skorpione nach außen münden. Bei größeren Spinnen kann man leicht beobachten, wie in dem Augenblicke, wo die Gelenke der Kieferfühler in den Körper eines gefangenen Insekts geschlagen werden, ein Tröpfchen beller Flüssigkeit aus der Spaltöffnung der Klaue in die Wunde fließt, und den augenblicklichen Tod des Insekts herbeiführt. Für uns hat dieses Gift nicht einmal die Folge, wie dasjenige, welches der Stachel einer Wespe liefert, und der Biß der größten Vogelspinnen führt nach dem Zeugniß der Reisenden in

den heißen Klimaten Südamerikas höchstens Fieber mit einiger Geschwulst des gebissenen Theils herbei. Von manchen Gattungen heißer Länder, deren Biß von den Eingeborenen für giftig gehalten wird, fehlen durchaus alle constatirten Beispiele, und die Geschichten, welche man von der Tarantel, einer in Südeuropa einheimischen Art von Wolfspinnen, oder von der Ralmignatte erzählt, sind insofern reine Fabeln, als zwar die sogenannte Tarantelkrankheit, eine eigenthümliche Art von Nerventränpfen, existirt, ihre Ursache aber niemals in dem Biße der unschuldigen Spinne liegt, welcher sie zugeschrieben wird. Gefährlich ist aber allerdings der Stich der großen Skorpione, welche die Tropen bewohnen, und man kennt unzweifelhafte Beispiele tödlicher Verwundung von Menschen durch diese Thiere.

Die weiblichen Geschlechtstheile bestehen aus traubigen Eierstockschläuchen, die zuweilen eine Röhrengestalt haben und mit kurzen Eileitern in die Scheide einmünden, welche sich gewöhnlich an dem Vordertheile des Hinterleibes in der Nähe der Wurzel desselben öffnet. Unmittelbar an dem Ausgange der Scheide liegen zwei hornige, birnförmige Samentafeln, und sehr oft zeigt sich eine Legeröhre, die ziemlich weit aus dem Leibe hervorgetreten werden kann. Die männlichen Geschlechtstheile sind im Durchschnitt sehr ungenügend bekannt, obgleich man die Geschlechtsunterschiede, welche viele dieser Thiere in Größe, Farbe und namentlich in der Gestalt der Kiefertaster zeigen, schon lange erkannt hat. Die Hohen stellen bald einfache Schläuche, bald vielfach gewundene Blinddärme, bald traubenförmige Bläschen dar, welche gewöhnlich an der Basis des Hinterleibes in einer einfachen Querspalte sich öffnen. Bei einigen Milben, sowie bei den Weber-spinnen, existirt eine lange, meist hornige Ruthe, und bei den Männchen gewöhnlich besondere Stacheln und Haftapparate. Am merkwürdigsten sind die Begattungsorgane der männlichen Spinnen, die gewöhnlich weit kleiner sind als die Weibchen, und oft nur mit großer Gefahr ihre Brunn befriedigen können, indem bei vielen Gattungen, wie z. B. den Kreuzspinnen, die Weibchen, wenn sie keine Lust zur Begattung haben, oder auch unmittelbar nach derselben über die schwächeren Männchen herfallen und sie ohne weiteres aufstreffen. Bei andern Gattungen herrscht freilich Eintracht zwischen beiden Geschlechtern, so daß Männchen und Weibchen benachbarte Nester oder selbst eine Zeit lang nur ein Nest gemeinschaftlich bewohnen. Bei den männlichen Spinnen sind die Kiefertaster verdickt und enthalten in ihrem letzten ausgehöhlten Gliede einen weichen, spirallig aufgerollten Körper, zu dem sich meistens noch höchst seltsame hornige Stücke gesellen, die bald wie Haken, bald wie Schüsseln oder Schalen aussehen und einen äußerst complicirten Apparat darstellen, vermittelt dessen die Männchen vor der Begattung die aus ihrer Geschlechtsöffnung tropfenweise hervortretende Samenseuchtigkeit aufzusaugen und dann in die weibliche Geschlechtsöffnung hineinbringen.

Die meisten Arachniden legen Eier, nur einige Milben und die Skorpione machen hiervon eine Ausnahme, indem bei ihnen die Eier sich innerhalb der Eileiter so weit entwickeln, daß sie lebendige Junge gebären.

Die meisten Thiere der Klasse, besonders die den höhern Typen angehörenden, kommen durchaus in derselben Form aus dem Ei heraus, welche sie später behalten werden, und die ganze Aenderung, welche sie erleiden, bezieht sich auf unbedeutende Farbenveränderungen während der mehrfachen Häutungen; die nieder stehenden Arachniden dagegen, wie die Assel-

spinnen und die übrigen Milben, durchlaufen artige Metamorphosen, indem sie entweder mit wenigen Fußpaaren zur Welt kommen oder mit unentwickelten Füßen, denen die unentwickelten Milben haben gewöhnlich nur zwei, zuweilen selbst nur zwei, und die übrigen weibliche Gestalt, indem ihr Körper lang und der Vordertheil, welcher die Lungen trägt, knospenförmig angeschwollen ist. Das mangelnde Fußpaar bei der ersten Larve bei einer schwarzen Familie aber, die Würmern (Linguatula), geben die Larven ein Leben gänzlich verloren, und bei einigen Insekten sehen sich die sechsbeinigen Jungen, wie andere Wasserinsekten, indem sie sich in dem Schmel einbohren, und machen einen Puppenschlaf durch, während dessen das Fußpaar ausbildet und die sackförmige Puppenhülle dient.

Ordnung der Gliederfüßer (Arthrogastrea).

Hinterleib gegliedert; Kiefertaster sicherensförmig; Kiefertaster vielgliedrig.

Die Familie der Skorpione (Scorpiones) schon aus alten Zeiten wegen ihrer Eigenschaften berühmt und lange Zeit mit den Schlangen zusammengeworfen worden, mit welchen sie die That durch die massiven Scheren, die die Kopfbrust und den gegliederten Hinterleib, der von der Kopfbrust nicht abgetrennt ist, Aehnlichkeit hat. Die ganze Familie ist in fünf Zonen beschränkt und nur eine kleine bildet eine Art (Skorpion, Scorpio europaeus, Fig. 50) kommt auf dem Südbahne von Europa vor.

Die schildförmige Kopfbrust der Skorpione hat dem Vorderrande in der Mitte zwei große, die auf einem Hügel stehen, und zwei kleinere Paare an dem Vorderrande. Die Schere ist groß, vielgliedrig, ihr äußerstes Glied ist breit, handförmige Schere, die sich über die Krebsschere auf den ersten Blick dadurch unterscheidet, daß der äußere Finger beweglich ist und sich festzieht, während bei der Krebsschere der innere Finger eintritt. Zwischen diesen beiden Fingern vorn an dem Kopfschild die kleinen sicherensförmigen Kiefertaster. Betrachtet man die Seite eines Skorpions, so sieht man eine Reihe gleichgestalteten, mit Doppelstrahlen versehenen, welche auf die Scheren folgen und deren so hart aneinanderstehen, daß sie zum Zerkleineren dienen können, zwei eigentümliche Organe, deren Bedeutung noch nicht ist, zwischen denen sich aber die Geschlechtsöffnung findet. Die vier ersten Ringe des Hinterleibes tragen auf der Unterseite die gegliederten Schläge, welche in die Lungen führen. Der schwanzartig verlängerte Hinterleib ist einem etwas angeschwollenen Gliede, dem Schwanz, sehr scharfen und harten, balancirten, an dessen Spitze die Öffnung der After befindet. Beim Gehen tragen die Glieder des Schwanzes nach oben gehalten, stets zum Stechen bereit sind. Sie sind Insekten, die größern südlichen Arten sind Reptilien und ähnlichen Thieren, die Giftstachel tödlich verwunden. Das Gift der südlichen Arten, welche die Länge eines

erreichen, kann sogar für den Menschen den.

Scherscorpione (Obisida) (Bücher-scorpion: *scorpio*, Fig. 51) sind kleine Thiere mit walzenförmigen Körper, der vielgliederig und vier Paar gleichmäßiger Füße sowie unges. Tasterpaar trägt, deren viertes Glied die Schere endigt. Zwei oder vier Augen der Seite der vordern Abtheilung der Kopfscheibe. Mundwerkzeuge sind aus zwei kleinen, eig. Kieferfühlern gebildet, welche nach hinten zwischen den Scherentastern stehen. Auf der Seite der beiden ersten Hinterleibsringe ein Paar seitlicher Stigmen, von welchen ununterbrochene Luftröhren den Körper durchziehen. Die nächtlichen Thiere schweifen besonders an warmen, unter alten Büchern, in Häusern u. s. w.

Schilderscorpione (Phrynia) ähneln einigen Scorpionspinnen, indem sie ebenfalls nur ein Paar Füße besitzen, während die Vorderfüße die Tastorgane umgewandelt sind. Die Hinterfüße sind schildförmig, der deutlich geringelte Hinterleib bald rundlich, bald dann in eine vielgliederige Vorsteile endigt. Die Taster sind außerordentlich dick, stark gebogen und mit einer hakenförmigen Spitze bewaffnet, also förmliche Greiforgane, mit Stacheln oder scharfen Vorproben versehen. Zwischen ihnen stehen die kleinen Kieferfühler, fadenförmig, wie bei den Vogelspinnen, bald dick sind, wie bei den Scorpionen. Die Augen acht, von denen zwei mitten und zwei auf der Kopfbrust stehen. Es finden sich nur zwei Paar Lungenäste, deren Zwischenräume der drei ersten Bauchringe. Die wenigen Arten kommen nur in der Wärme vor und gelten, vielleicht ihrer Ähnlichkeit mit Scorpionen wegen, für giftig.

Schilderscorpione (Solpugida) sind nur wenigen, meist großen, spinnenartigen Thiere sehr wesentlich von den eigentlichen Spinnen. Die Gliederung des ganzen Körpers unterscheidet man deutlich drei Abtheilungen, eine welche man mit vollem Rechte den Kopf nennt und die außer den Mundwerkzeugen und noch zwei Paar fußartige Anhänge trägt; die Brust, aus drei Ringen bestehend, ein Paar eigentlicher Füße tragend; und einen Hinterleib, meist birnenförmigen und walzigen. Die Mundwerkzeuge bestehen aus zwei großen Kieferfühlern, die eine Schere bilden, welche sich nach unten öffnet; unter diesen auf deren oberem Kamm eine dünne Geißel steht, steht noch ein kleineres, scherenförmiges Werkzeug, welches offenbar den eigentlichen der Insekten entsprechen dürfte. Hierauf folgen sehr langen, vielgliederigen Taster, welche aus drei Hinterfüßpaaren nur dadurch unterscheiden, daß sie keine Krallen am Ende tragen, und so wie die eigentlichen Füße beim Gehen ein weiteres Paar von Anhängen, den sogenannten gleich, ebenfalls ohne Krallen, das ähnlich als das erste Fußpaar zählt, entspricht den Kieferfüßen der Krebse und ist, wie das zweite, unter dem Kopftrage angebracht, welches zwei großen kugelförmigen Augen an seinem vordern Ende trägt. Die drei echten, mit Doppelreihen versehenen Fußpaare, von welchen das dritte, lappenartige Anhängen an Schenkel und

Schienen trägt, sitzen an den Bruststrängen fest. Zwischen dem ersten und zweiten Fußpaar befinden sich seitliche und an der Unterseite des Hinterleibes noch zwei mittlere Spaltöffnungen, welche in die Luftröhren führen. Die Scorpionspinnen sind äußerst gefräßige, nächtliche Thiere, welche selbst Eidechsen und kleine Vögel anfallen und in ihrem Vaterlande für äußerst giftig gelten, besonders die Art (*Scorpion*: Spinne, *Galeodes araneoides*, Fig. 54), welche in den Steppen der Wolga vorkommt, obgleich man keine constatirten Beweise für diese Volksmeinung hat.

Die Weberspinnen (Opilionida) (Weberspinne, *Phalangium opilio*, Fig. 53) bestehen aus kurzleibigen Thieren, die sich meist durch ihre ungeheuer langen und dünnen Füße auszeichnen. Die Kopfbrust, welche vier enorme Fußpaare trägt, ist gewöhnlich so breit als der Hinterleib, welcher in allen Fällen gegliedert erscheint und dadurch sich wesentlich von dem Hinterleibe der Milben unterscheidet. Die Mundtheile sind eigentümlich gebildet; nach außen stehen die Taster, welche gewöhnlich fünfgliederig sind, eine einfache, borstenförmige Gestalt haben. Zwischen diesen Tastern, die etwas mehr nach hinten eingelenkt sind, finden sich die eigentlichen Kieferfühler, welche hier aus drei Gliedern bestehen, deren erstes sehr dick und groß und das letzte als Schere gestaltet ist. Diese Organe werden meistens nach unten eingeschlagen getragen, so daß nur das dicke Basalglied vor dem Kopfe in Form eines stumpfen Fortsatzes vorragt. Der Ragen der Weberspinnen hat außerordentlich viele kleine Blindfäden, und die Centralganglienmasse eine sehr sonderbare Gestalt, indem sie flügelartige seitliche Fortsätze darbietet, von welchen die Nerven entspringen. Das Luftröhrensystem ist sehr entwickelt, die Stigmen unter den hintersten Beinen angebracht und zwischen denselben die Geschlechtsöffnung, aus welcher beim Männchen eine außerordentlich lange, gegliederte, vorn mit Borsten besetzte Ruthe hervorstreckt werden kann. Es sind meistens nächtliche Thiere, welche sich von kleinen Insekten nähren.

Ordnung der Weberspinnen (Araneida).

Hinterleib ungegliedert; Kieferfühler klauenartig; zweites Tasterpaar beinförmig, deshalb acht Beine.

Der Körper der eigentlichen Spinnen besteht immer aus zwei verschiedenen Abtheilungen, aus der einfachen, ungegliederten, gewöhnlich härteren Kopfbrust und dem rundlichen oder länglichen, selten mit Hödern oder Auswüchsen gezierter, kurz gestielten Hinterleibe, an dessen hinterem Ende die eigentümlichen Spinnwarzen sitzen. Die sechs oder acht einfachen Augen stehen stets vorn am dem Rande der Kopfbrust in einer eigentümlichen Gruppe, sind nicht immer gleich groß und bieten durch ihre Stellung ganz vortreffliche Charaktere zur Unterscheidung der Gattungen dar. Vorn am dem Kopfe sind seitlich, dem ersten Fußpaar genähert, die langen Taster eingelenkt, welche gewöhnlich fünfgliederig sind und bei dem Männchen ein angeschwollenes Ende tragen, das, wie früher bemerkt wurde, als Begattungsglied dient. Bei einigen Gattungen sind diese Taster zu einem förmlichen rudimentären Fußpaare mit Klaue und Sohle an der untern Fläche umgewandelt. Nach innen von diesen Tastern liegen die Kieferfühler, die hier zu eigentümlichen Waffen umgewandelt sind. Sie bestehen aus einem außerordentlich dicken, angeschwollenen Basalgliede, in welchem die Giftdrüse liegt, und aus einem scharfen, hakenförmigen Endgliede, einer Klaue, die gewöhnlich nach

innen, selten nur noch unten eingeschlagen wird und an ihrer Spitze von dem Kanal der Giftdrüse durchbohrt ist. An der Basis der Taster und unter den eben beschriebenen Kieferfühlern finden sich zwei seitliche, haarige Lappen, unter denen eine einfache Platte als Unterlippe die Mundöffnung schließt. Einen höchst merkwürdigen Apparat besitzen die Spinnen in den Spinndrüsen und Warzen, mittels deren sie ihre Gewebe anfertigen. Die Spinnwarzen, deren sich meistens drei, selten nur zwei Paare an der untern Spitze des Hinterleibes befinden, haben die Gestalt stumpfer, meist zwei- oder dreigliederiger, oben abgerundeter Kegele, deren jeder auf seiner Spitze ein von einem Vorstentranze umgebenes nacktes Feld trägt, auf welchem erst die eigentlichen Spinnröhrchen stehen, deren Zahl bei den größten Spinnen oft über tausend beträgt. Jedes dieser Spinnröhrchen läßt bei dem Spinnen den zähen, glasbellen Stoff vortreten, welcher augenblicklich an der Luft zu einem außerordentlich feinen Faden verhärtet; mittels der Fußklauen, zu denen oft noch eigenthümliche, lammartige Vorrichtungen treten, werden diese vielfachen Fäden zu einem einzigen vereinigt. Durch diese Fäden, welche sie überall hin ankleben, können sich die Spinnen sogar in die Luft erheben, und sie dienen ihnen hauptsächlich, um jene Gewebe zu verfertigen, die theils ihre Wohnungen bilden, theils auch zum Fange der Beute dienen. Die Drüsen, welche diesen Klebstoff absondern, haben sehr verschiedene Gestalten, meist aber eine schlauchförmige, verästelte Form.

Die Spinnen scheiden sich nach ihrer Lebensart in zwei große Gruppen; die einen bedienen sich ihrer Seide nur zum Tarpesieren ihrer Wohnungen, zum Einhüllen der Eier in besondere Cocons, welche bei jeder Gattung eine eigenthümliche Gestalt haben und deren Fäden man sogar, wenn auch ohne Erfolg, in der Industrie zu verwenden versucht hat, sowie zum Festhalten bei ihren Bewegungen; die andern aber benutzen außer zu den erwähnten Zwecken ihre Seide auch zur Anfertigung von Geweben, in welchen sich die Insekten fangen, verwideln und ausgefogen werden. Die Gestalt dieser Netze ist äußerst verschieden; bald bilden sie förmliche fentrecht Kreise mit radiären Strahlen und äußerst regelmäßigen Zwischenräumen; in andern Fällen erscheinen die ebenfalls fentrecht angelegten Netze unregelmäßig; andere, wie unsere gewöhnlichen Hausspinnen, machen sehr dichte Gewebe, die wie eine Hängematte horizontal ausgespannt sind. Die meisten Spinnen bauen sich eigene Wohnungen in der Nähe ihrer Gewebe, welche oft mit großer Kunst angelegt sind und in denen die Cocons mit den Eiern verborgen werden; andere schleppen sogar diese Eier in einem eigenen Sack mit sich herum.

Die Familie der Vogelspinnen (*Mygalida*) umfaßt die größten aller Spinnenarten, die mit ausgespannten Füßen oft einen handgroßen Raum einnehmen. Sie kommen nur in wärmern Ländern, die nördlichsten an den Ufern des Mittelmeers vor, sind meistens viel behaart und unterscheiden sich von allen übrigen Spinnen durch den Bau ihrer Taster, ihrer Kieferfühler und die Zahl ihrer Lungenfäden, deren vier mit besondern Stigmen versehen sich finden, an ihrer Spinnwarzen, deren nur vier sind, während die übrigen Spinnen alle sechs Spinnwarzen haben. Die Taster sind lang, fußartig, in ähnlicher Weise wie die Füße, vorn mit einer Klaue bewaffnet und am letzten Gliede unten mit einer Sohle versehen, so daß sie also förmliche Kieferfüße darstellen, wie sie bei den Krebsen gewöhnlich sind. Die gewaltigen Kieferfühler haben eine große, gebogene Klaue, die

nicht wie bei den übrigen Spinnen nach oben, sondern nach unten eingeschlagen wird. Deren braun oder schwärzlich gefärbte Taster haben Erbsbüchsen oder in Spalten, in denen die regelmäßigen Fäden spannen; meist jagen sie und die großen Arten der Tropen auch kleine Vögel bemächtigen können. Die einheimische Minirspinne (*Cteniza scabula*, Fig. 55) schließt ihr mit Seide ausgeklebtes Nest mittels eines sehr künstlichen Deckels, in welchem sie verweilt, und den sie mit vieler Kraft verfestigt, sobald man ihn zu öffnen versucht.

Die eigentlichen Spinnen (*Araneida*) haben Spinnwarzen, einfache Taster, die nur zum Kieferfühler, bei welchen die Klauen zu eingeschlagen werden. Man kann sie in drei Unterabtheilungen unterscheiden: die Webespinnen (*Sedentaria*) haben zwei gerade oder gekrümmte Lungenfäden, in gleicher Entfernung voneinander, die Enden einander genähert sind. Die Webespinnen alle ihre Beute entweder in förmlichen oder unregelmäßigen Fäden, in deren Nähe sie sich haben. Die gewöhnlichen Kreuzspinne (*Aranea diadema*, Taf. 27, Fig. 56), unsere Hausspinne (*Aranea genaria*) und eine im südlichen Europa häufige Art, die Ralsmignatte, gehören zu dieser Gruppe. — Eine zweite Gruppe wird von den Vogelspinnen (*Argyronetida*) gebildet, die webespinnen, die aber im Wasser selbst leben und spannen und sich unter dem Wasser in eine dichte Glode weben, die sie mit der Beute unter welcher sie auf ihre Beute lauern. In ähnlicher Weise wie einige auf dem Lande lebende Gattungen außer den Lungenfäden haben sie auch in weite Luftröhren, welche sich im ganzen Körper verzweigen. Diese Gruppe endlich wird von den Jagdspinnen (*Theridida*) gebildet und zeigt in unterm kleine Arten (*Theridion*, *Theridion*, *Theridion* und 58), in südlichen Gegenden aber die Vogelspinnen nahe kommende Gattungen, auch die berühmte Tarantel (*Lycosa*) gehört. Ihre Augen stehen in drei Reihen, die die Thiere machen kein Gewebe, sondern nur mit Fäden zur Vorjage gegen die Beute und Fallen an, schweben tagsüber nach der Beute, welche sie im Sprunge fassen.

Ordnung der Milben (*Acarina*)

Kopfbrust und ungegliederter Hinterleib sind in eine gemeinsame Masse verschmolzen, wie bei den Spinnen.

Kopf, Brust und Hinterleib sind in eine gemeinsame Masse verschmolzen, aus deren Mitte die Beine eingelenkt sind, die bei den meisten Familien, sogar im ausgebildeten Zustande sehr reducirt sind. Die Körperbedeckung ist bei den Thierchen, deren größte Arten nur einige Linien erreichen, ist gewöhnlich außerordentlich dünn und eine einzigen Familie zeigt sie eine fast glatte Haut. Die Mundwerkzeuge bestehen aus einem Kiefer, in welchem zwei starke, gebogene Zähne verborgen sind, die zum Zerbrechen der Beute dienen. Zuweilen ist der Kiefer mit einem Waffel trägt, förmlich gegliedert und mit einem Farnrohr aus- und eingeschoben werden kann, welcher auf diesen Kiefer selbst

he feiltliche Anhänge, die meistens schon von außen nach die Nuancen der Farbe erkannt werden können. elen Milben, besonders denen, welche unter der mit anderer Thiere schmarozogen, fehlen die Augen; in den meisten sind sie in der Zweizahl vorhanden d stehen dann feiltlich auf dem vordern Theile der rüst. Zu beiden Seiten des Rüssels sind bei n meisten zwei tastartige Organe eingelenkt, welche r verschiedene charakteristische Formen annehmen nnen und gewöhnlich fünf Glieder besitzen. Bei der n Familie erscheinen diese Taster klappenartig, nen bezähnt, in ähnllicher Weise zum Fangen der eute eingerichtet, wie die Raubfüße der Heuschrecken- iere; bei andern dient das einschlagbare Glied dieses ieres, das mit einem Gelenk bewaffnet ist, als Unter m Festhalten unter dem Wasser; in andern Fällen d die Taster spindelförmig oder einfach borstenförmig, d in andern klappenartig und mehr oder minder it dem Rüssel selbst verwachsen. Die Füße wechseln rporordentlich an Ausbildung, Länge und Gestalt, d daß man von fast fußlosen Gattungen bis zu r höchsten Ausbildung von Schreit- oder Schwimm- n alle möglichen Zwischenstufen findet. Bei den r entwickelten Familien der Ordnung hat man ene Athemorgane gefunden, welche aus Röhren ehen, die ununterbrochen Rüssel bilden und von zwei lichen Luftschläuchen entspringen, die gewöhnlich zwisch n Reinen angebracht sind. Ein Herz hat man noch i keiner Milbe entdeckt.

Die meisten Milben legen Eier, einige wenige ge- ren lebendige Junge; alle machen während der ugend einen Larvenzustand durch, in dem sie sich ch die Existenz von nur sechs Reinen auszeichnen. Die Familie der Laufmilben (Trombidida) wird n einer großen Anzahl kleiner, meist rother oder rter Milben gebildet, die meistens sehr lange, dünne, haarte, mit spizen Krallen besetzte Lauffüße haben n deren Taster geteilt und mit stumpfem Endgliede rsehen sind, sodas sie wie Raubfüße zum Jang be- uzt werden können. Ihr Körper ist sehr weich, meist icht behaart, zuweilen gleichförmig, in andern Fällen uer geteilt, die Augen sehr verschieden; bei einigen hlen sie ganz, bei andern finden sich zwei, vier, selbst chs Augen, die meist auf der Seite, zuweilen sogar u eigenen Stielen außerhalb der Taster stehen. Die uf Büumen, im Moose u. f. w. lebenden (Cochenille- ilbe, Trombidium holosericeum, Taf. 27, Fig. 59) iere sind gewöhnlich lebhaft, laufen sehr schnell und rinnen kleine Zelte über ihre Eier und Nester. Die ch abeinigen Jungen, deren Gestalt von derjenigen r Alten oft sehr verschieden ist, leben als Schmarozer wöhnlich auf Insekten und wurden unter mehrfachen Gattungsamen früher beschrieben.

Die Familie der Wassermilben (Hydrachnida) begreift verhältnismäßig sehr große, zuweilen mehrere imen lange Milben mit kugeligem oder eiförmigem Körper und langen, meist behaarten oder beschalteten, am Ende mit zurückziehbaren Klauen besetzten Füßen (Muschelmilbe, Limnochares concharum, Taf. 27, Fig. 60), die zum Schwimmen tauglich erscheinen. Die Taster sind lang, die beiden ersten Glieder meist did, die letzten hornig gekrümmt und wie eine Klinge nach unten einschlagbar. Die Augen stehen auf dem Scheitel meist zu zweien oder viieren, zuweilen auch so gehäuft, daß das scheinbar einfache feiltliche Auge aus zweien zusammengesetzt ist; der Schnabel ist bald verborgen, bald vorstehend. Die Thiere leben im Wasser und besitzen Luftröhren, kommen aber niemals an die Oberfläche, um Luft zu schöpfen, sodas es scheint, als ob diese Luftröhren geeignet wären, mittelbar aus

dem Wasser die in ihm enthaltene Luft abzuscheiden, in ähnllicher Weise, wie dies bei den Kiementracheen vieler Insektenlarven der Fall ist. Die jungen sechs- fühligen Larven zeigen sehr wesentliche Unterschiede von den alten Thieren, indem sie einen ganz eiförmigen Körper besitzen, an dem vorn die Mundwerkzeuge löff- artig hervorsteigen; sie heften sich an verschiedene Wasser- inselten an, bohren den Schnabel ein und bilden sich als schmarozende Puppen vollständig aus.

Die Familie der Zeden (Ixodida) besteht aus ziem- lich großen, platten Milben, deren vorderer Körper- theil auf dem Rücken mit einem harten, hornigen Schilde bedekt ist, während der hintere Theil des Hinterleibes sehr ausdehnbar ist und außerdem meist gefaltet erscheint. Die Füße sind kurz, aus gleich- förmigen, rosenkrantzartigen Gliedern gebildet, am Ende mit einer Kralle und einem ungehiesigen Haftlappen versehen; der Rüssel ist bedeutend groß, vorstehend, die Taster scheibenartig an ihn angelegt, die Unter- lippe hervorgezogen, in Form einer Halbheile ausge- bildet und mit rückwärts gewandten Zähnen besetzt; die Klängen sind kurz, did, dreigliederig, das äußerste Glied ebenfalls gezähnt und scharf. Die augenlosen Thiere lauern in Wäldern und Gebüsch auf vorübergehende Säugethiere, bohren den aus der Vereinigung der Unter- lippe und der Klängen gebildeten Rüssel in die Haut ein und saugen sich so voll Blut, daß sie manchmal die Größe einer Bohne erreichen. Die abgebildete Art lebt auf dem Zigel (Zigelzede, Ixodes Erinacei, Taf. 28, Fig. 2).

Die Familie der Krätzmilben (Acarida) besteht aus meist kugelförmigen, weichen, ungefarbten Milben, welche als Schmarozher auf der Haut anderer Thiere, auch des Menschen (Krätzmilbe, Sarcoptes hominis, Taf. 28, Fig. 4), leben, dort Gänge graben und durch den steten Reiz, welchen sie ausüben, jene Ausschlags- krankheiten erzeugen, die man unter dem Namen der Krätze kennt. Andere Arten leben freilich in faulen- den Bilanzen- und Thierstoffen, wie namentlich eine sehr häufig in altem Käse (Käse milbe, Acarus siro, Taf. 28, Fig. 3), welche von geschickten Beträgern den Unkundigen zuweilen als die echte Krätzmilbe vor- gezeigt wird. Die Milben dieser Familie sind alle sehr klein, durchaus blind und mit meistens kurzen, unförmlichen Füßen versehen, die wurstförmig gegliedert erscheinen und sehr weit von der Mittellinie nach außen eingelenkt sind. Außer einer kurzen, feinen Kralle tragen diese unvollkommenen Füße meist noch einen an einem langen Stiele befestigten Haftlappen und lange beweg- liche Fäden, die wie Peitschenschmuren umherhängen. Der Rüssel ist lang, did, fegelförmig; die Klängen scherenförmig, did; die Taster klein und mit dem Rüssel selbst verwachsen. Die Zungen haben nur sechs Füße, sonst aber die Körperform der ausgebildeten Thiere. Zu dieser Familie gehören auch die Balg- milben (Demodex), welche häufig in den Haarbälgen des Menschen, besonders in den sogenannten Mitestern auf der Nase vorkommen. Die Thiere haben höchstens die Länge einer Feinlinnie und bestehen aus einem wurm- förmigen Leibe, der sich bei zunehmendem Alter mehr und mehr verlängert, und aus einer breiteren, weichen Kopfbrust, welche bei den jüngern, langleibigen Individuen drei Paar, bei den ältern, kurzleibigen, vier Paar kurze, mit drei Krallen bewaffnete Fußhummel trägt.

Ordnung der Zungenwürmer (Linguatulina).

Durch Schmarozerthum zurückgebildete, wurmhäuliche Milben ohne Füße.

Familie der Zungenwürmer (Linguatulida), eine Gruppe von Thieren, die in den Stirnhöhlen, der

Lungen der Säugethiere oder in den Lungen verschiedener Eidechsen und Schlangen gefunden werden. Die ausgebildeten Thiere haben einen wurmförmigen, bald rundlichen, bald abgeplatteten Körper mit vielen deutlichen Ringeln und ohne eine Spur von Sinneswerkzeugen, Füßen oder andern gegliederten Anhängen. Am vordern Ende des Körpers befindet sich der Mund, und zu beiden Seiten desselben zwei Paar trummer, beweglicher, scharfer Haken, welche zur Befestigung des Thiers an seinen Aufenthaltsort dienen und früher für Öffnungen gehalten wurden, woher der unrichtige Name *Pentastomum*, den man der Gattung gab. Das Nervensystem besteht wesentlich aus einem biden Brustnoten, der mit einem einfachen Schlundringe in Verbindung steht. Die Geschlechter sind getrennt. Ehe man die Entwicklung der Eier kannte, mußte man diese Thiere nothwendig zu den Eingeweidewürmern stellen, obgleich ihre Organisation vieles Abweichende von diesen bot; seitdem man aber in den Eiern die freilich noch unentwickelten Embryonen gefunden hat, die einen birnförmigen Körper besitzen, welcher in der Mitte zwei Paar gegliedeter, kurzer, mit Doppelkrallen versehener Füße und vorn einen Stechapparat trägt, der aus einer mittlern Klinge und zwei seitlichen spigen Klappen besteht; seit dieser Zeit ist es unmöglich, in den Zungenwürmern etwas anderes zu erkennen als Gliedertiere, welche im ausgebildeten Zustande durch das Schmarogerleben eine Rückbildung erleiden, die den ursprünglichen Typus bis zum Unkenntlichwerden verwischt. Die Jungen leben meist in Cysten in der Leber und Lunge von Pflanzenfressern und gehen beim Verzehren derselben in die Nasen- und Rachenhöhle des Fleischfressers über, wo sie geschlechtsreif werden. Die abgebildete Art (*Zungenwurm, Pentastomum taenioides*, Taf. 28, Fig. 6) aus der Rachenhöhle des Hundes.

Ordnung der Bärthierchen (*Tardigrada*).

Acht stummelförmige Beine; Stechapparat; Zwitter.

Die Familie der Bärthierchen (*Tardigrada*) besteht aus kleinen Thierchen mit weichem, walzenförmigem Leibe, die sich fast überall im Moose, im Sande der Bächen und in süßen Gewässern finden (*Bärthierchen, Macrobiotus Hufelandi*, Taf. 28, Fig. 5). Bei den meisten zeigen sich nur undeutliche Andeutungen einer Ringelung in der sehr weichen und dehnbaren Haut; bei einer einzigen Gattung (*Emydium*) findet man eine festere Hautbeschaffenheit und schildartige Ringe von unbestimmter Zahl. Die acht Beine, welche diese Thiere besitzen, sind sehr kurz, stummelartig, kaum deutlich gegliedert und gewöhnlich mit vier großen, bald gleichen, bald ungleichen Krallen bewaffnet. Das letzte dieser Fußpaare sitzt immer ganz hinten an dem Körper, fast wie ein gehetzter Schwanzanhang, sodas also ein eigentlicher Hinterleib gänzlich fehlt. Nach vorn erscheint der Körper schmaler, zugespitzt oder abgerundet, ohne daß man einen eigentlichen Kopf unterscheiden könnte. Man sieht vorn auf diesem Kopfe zwei seitliche einfache Augen. Die Mundwerkzeuge dieser Thiere bestehen aus einem kurzen röhrenförmigen Rüssel, in dessen Innern ein Stechapparat angebracht ist, der aus zwei kurzen spigen Klingen besteht, die zusammengelegt einen dolchartigen Stachel bilden und durch mächtige, im Schlundloche angebrachte Muskeln vor- und rückwärts bewegt werden können. Der Darmkanal läuft gerade durch den Körper hindurch, hat aber eine Menge traubiger Anhänge an allen Seiten. Besondere Athemwerkzeuge und Kreislauforgane

fehlen gänzlich. In dem kurzen Eiertube paarig scheint und auf den nach hinten abgeblasen folgen soll (die aber wahrscheinlich Samentasche ist) entwickeln sich jetzt zu gleicher Zeit. Die Thierchen legen in der Häutung in die abgelegte Haut sich ein so zum Schutze dient. Die ausgebildeten sind den Alten vollkommen ähnlich, die Gattung fehlt ihnen ein Paar Füße, welche im Moose und im Sande leben, können beim Austrocknen des Thierleibes in den todten Zustand verharren und tritt von Wasser aufs neue wieder zu.

Ordnung der Affelspinnen (*Pycnogonida*).

Cephalothorax aus vier Ringen; Hinterleib verkümmert; vier Paar Beine.

Familie der Affelspinnen (*Pycnogonida*). Der Körper besteht regelmäßig aus vier Ringen, deren jeder ein Paar Beine trägt, und an der Brust zu einer Kopfbrust verschmolzen ist, deren vordern Rande vier kleine einfache Füße in der mittlern Höder stehen. Diese Augen sitzen auf dem Hirnnoten auf, von dem ein Schlundring nach hinten geht, an dem breite Nervennoten ohne Verbindungen. Vor der Kopfbrust steht eine meist trichterförmige Klappe, welche man als Kopf betrachtet hat, die Art steifen Schnabels ist, an dem die Mundöffnung befindet. Der Hinterleib aus einem kleinen knotartigen Knoten trägt. Die vier Fußpaare sind gebeuer lang, dünn, vielgliedrig und mit einer großen gebogenen Kralle versehen, welcher oft noch kleine, krallenartige Beine anhängen. Bei manchen Gattungen dieser Thiere kommen weiter durchaus keine Krallen als der erwähnte steife Schnabel, welcher auf dem ersten Ringe der Kopfbrust sitzt. Die Glieder gebildet Rieferfüßler sind, die eine wohl ausgebildete Schere trägt. Bei den ist auf dem ersten Kopfbrusttrichter die Füße befestigt, welche fünf bis zehn Glieder zum Tragen der Eier bestimmt sind. Das dreikammerige Herz, aber keine Kiemenorgane. Die Geschlechtsorgane liegen in der Beinpaare. Am auffallendsten ist der Stechapparat gebildet, indem die Blindäste, die an der Basis der Beine sitzen, ganz ungemein lang sind und die Klauenglieder vordringen. Die Beine aus dem Gie kommen, besitzen nur zwei- oder dreigliedrige Beine, die nicht befestigt sind, und einen vollkommenen Schwanz, sodas sie also bedeutende Metamorphosen durchlaufen müssen, deren Einzelheiten erst ganz in der neuesten Zeit bekannt worden sind. Die weiblichen Larven Schmarotzer in den Kammern in diesen Thieren angelockt, allmählich die beiden hintern Beinpaare lange Endborste tragen, während die zu den Scherenfüßlern sich ausbilden. Dann nach und nach die definitiven Krallen vor und dann erst sind die Thiere fertig, lassen das Wohnthier, um frei zu sein, die kleinen Thierchen im Tang an der Klammert (*Affelspinne, Pycnogonum*, Fig. 7).

isse der Krustenthiere. (Crustacea).

afel 24, Figur 8 bis Tafel 29, Figur 5.)

Ablerpaare, meist zusammenge-
setzte Gliedmaßen am geringelten Hinter-
asserathmung.

Der der Krustenthiere hat eine mehr oder
weniger kugelförmige Gestalt, die sich indeß bei
deutend zusammenschiebt und mehr kugelförmig
wird. Die Bewegungsorgane, die
Brühen und Larven niemals fehlen, bei
einen Thieren dagegen zuweilen in sonder-
lich verkrüppelt sind, stehen stets auf der
des Körpers in bestimmter Beziehung zu
aus, aus welchen derselbe zusammenge-
setzt ist, an allen Abtheilungen des Körpers vor-
wiegend man Kopf, Brustfüße und Bauch-
füße kann. Meistens zeigt sich der Kör-
per diese drei Abtheilungen, in Kopf, Brust
klein, getheilt, und jeder dieser Theile
eigenen Ringeln zusammenge-
setzt, die mehr oder weniger voneinander abgetrennt sind.
erscheinen Kopf und Brust in eine einzige
das Kopfbruststück (Cephalothorax) zu-
setzt, so daß dann der Körper, wie bei unserm
nur aus zwei Abtheilungen besteht, dem
Kopf, welches Sinnesorgane, Kauwerkzeuge
sensitiven Füße trägt, und einem hintern
Theile, den man uneigentlichweise den
Rumpf, der aber, da er den Darm und die
des Bauchmarks enthält und eigenthüm-
liche Füße trägt, als Hinterleib bezeichnet
ist. Meist zeigt sich in allen den Fällen,
deutlich vora der Brust getrennt ist, diese
in der Hinterleib deutlich aus einzelnen
Ringeln bestehend, die nur in seltenen Fällen
sind, aber stets aus zwei gleichen sym-
metrischen bestehen.

Die gegliederten Anhängen selbst be-
stehen in der Unterfläche dieser Ringe eingelassen
in diese der verschiedensten Art, und die
einzelnen Anhängen eines Rings wechselt
als ihre äußere Form und Gestalt. Der
ganze ist nur bei wenigen Krustenthieren frei,
sonst mit den nachfolgenden verschmolzen;
sogar überhaupt Anhängen an ihm entwickelt
sich auf Stielen, welche beweglich sind
und zurückgezogen werden können. An dem
dritten Kopfringe sind die gegliederten
Antennen, die innern oder vordern
Antennen sind meistens kleiner und meistens
einem kurzen Stiele ein oder zwei faden-
förmige, welche man die Geißeln genannt hat.
Die Fühler (antennae), welche sehr selten
die Geißel haben, sind gewöhnlich bei weitem
kleiner als die Geißel. Zuweilen sind diese
breiten Blättern umgestaltet, in andern
Fällen sind sie dann als Bewegungsorgane,
Antennen der folgenden Ringe sind meistens
Antennen des Mundes entwickelt, und da sie
Krusten zugleich Bewegungsorgane sind
sich aus wahren Füßen sich umgestalten, so
entweder alle, oder wenigstens die letzten
Kau- oder Kieferfüße bezeichnet.
meistens erscheint diese doppelte Eigenschaft
in den Schildkröten der Molusken (Limulus),
ein Stützglied der Gangfüße eine knieförmige
Antenne den Mund hat und hier mit harten
Zähnen ist, die zum Zermalnen der Beute dienen.

Gewöhnlich finden sich drei Paar Kieferfüße, von
welchen das erste Paar fast ausnahmslos als Kau-
organ dient, während die nachfolgenden, ebenso wie
die Brust- und Bauchfüße, mannichfache Umwand-
lungen eingehen. Die Entwicklungsge-
schichte lehrt, daß die wol allen Krustern ursprünglich zu Grunde
liegende Larvenform, welche man Nauplius genannt
hat, nur drei Gliedmaßenpaare besitzt, welche unter
allen Umständen den drei vordern Paaren der aus-
gebildeten Thiere entsprechen; das erste Paar den
innern, das zweite Paar den äußern Antennen, das
dritte dem ersten Kieferfußpaare (Mandibula), und daß
alle nachfolgenden Anhängen der ausgebildeten Thiere
sich erst durch spätere Sprossung auf den nach und
nach hervortretenden Segmenten des Cephalothorax
und Hinterleibes entwickeln. Auf die unter dem Cep-
halothorax angebrachten eigentlichen Gang- oder
Schwimmfüße, deren sich bei den höhern Krebsen
fünf Paar finden, die oft mit Scheren oder Klauen
bewaffnet sind, folgen diejenigen Anhängen, die unter
den Ringeln des Hinterleibes stehen und welche man
mit dem Namen der falschen Füße oder der Bauch-
füße bezeichnet. Die analogen Gebilde sind bei an-
dern Krustenthieren hauptsächlich in blattartiger Form,
besonders zur Deckung der Kiemen oder der Eier ent-
wickelt, und auch bei den weiblichen Insekten dienen
diese Anhängen zur Befestigung der Eiertrauben bis
zum Austritten der Jungen. Das letzte Paar von
Anhängen endlich bildet bei dem Krebse die seitlichen
Theile, welche mit dem blattartig erweiterten Schwanz-
stück jenes mächtige Ruder zusammensetzen, welches
für den Krebs das hauptsächlichste Schwimmorgan ist.
Die Modificationen, welche diese einzelnen Anhängen
bei den verschiedenen Ordnungen und Familien er-
leiden, können wir bei diesen erst genauer ins Er-
gessen, da sie zu sehr ins Einzelne führen würden.

Die Bewegungen der Krustenthiere, zu deren
Ausführung sie sich ihrer gegliederten Anhängen be-
dienen, sind äußerst mannichfaltig. Die meisten leben
im Wasser und haben dann wie der Krebs Schwimm-
und Gehörorgane zugleich. Bei den guten Schwimmern,
die sich zugleich schnell fortbewegen, trägt der Hinter-
leib stets eine solche breite Kasse wie beim Krebse,
und das Thier bewegt sich auf die Weise rückwärts
fort, daß es den Hinterleib lebhaft unter die Brust
krümmt und so das Wasser wiederholt mit dem breiten
Schwanzruder schlägt. Bei andern Schwimmern sind
die Füße geißelförmig und mit langen Röhren von
Vorstößen besetzt, die als mächtige Ruder dienen, wäh-
rend wieder bei andern die Schwimmfüße sich blatt-
artig ausbreiten. Mit vieler Geschicklichkeit wissen sich
die meisten Krustenthiere ihrer Gangfüße zu bedienen.
Viele im Wasser lebende Arten haben nur solche Gang-
füße zur Bewegung, mittels deren sie auf dem Grunde
umherkriechen oder sich beim Nahen von Gefahren
mit großer Schnelligkeit in Schlamm und Sand ein-
wühlen. Bei manchen entwickeln sich die hintern Bauch-
füße zu langen geißelartigen Vorstößen, die als schnellste
Stützen beim Sprunge dienen, und einige Arten,
welche den Meeresstrand oder das trodne Land be-
wohnen, können so schnell und mit so viel Ausdauer
laufen, daß ein Mensch ihnen zu folgen kaum im
Stande ist. Im Gegensatz hierzu sind bei andern die
Füße zu Klammerorganen, Saugnäpfen u. s. w. um-
gewandelt oder Strudelorgane zur Herbeiführung eines
Wasserstroms geworden, und bei den Schmarotzern
verkrüppeln sie endlich gänzlich, ohne sogar zuweilen
eine Spur zu hinterlassen.

Das Nervensystem der Krustenthiere zeigt sehr
verschiedene Stufen der Ausbildung, besteht aber bei

allen aus einem knotigen Bauchmark, welches durch einen Schlundring mit einer mehr oder minder verdickelten Gehirnmasse in Verbindung steht. Diese Gehirnmasse, welche hauptsächlich die Sinnesorgane, die am Kopfe liegen, Augen, Ohren und Fühler mit Nerven versieht, schwindet mit der Ausbildung dieser Sinnesorgane und wird endlich bei denjenigen Schmarotzern, die im erwachsenen Zustande gar keine Sinnesorgane besitzen, vollständig vermisst. Zahl und Größe der Bauchknoten richtet sich besonders nach der Unabhängigkeit der einzelnen Ringe, sowie nach der Entwicklung ihrer Anhänge. Bei den lauggestreckten Krustenthiern zählt man mehrere und gleichmäßig ausgebildete Knoten des Bauchmarks, während bei den Gattungen mit mehr rundem Leibe, wie z. B. bei den Krabben, die Brustknoten in eine einzige Masse verschmolzen erscheinen und das Bauchmark gänzlich rudimentär wird. Bei starker Entwicklung der Anhänge sind auch die entprechenden Knoten sowie die von ihnen abgehenden Nerven verhältnismäßig stärker und trägiger.

Die Augen der Krustenthiere fehlen zwar im erwachsenen Zustande einigen schmarotzenden oder sonst feststehenden Familien, kommen aber im jugendlichen Zustande fast ausnahmslos vor. Einfache Augen finden sich meist nur im Jugendzustande, und bei dem Nauplius ist ein einziges, aus zwei Hälften zusammengefügtes Stirnauge Regel. Außer diesem einfachen Auge, das häufig wieder verschwindet oder rudimentär wird, finden sich, meist in der Zweifzahl gebaute oder zusammenge setzte Augen mit facettirter Hornhaut, welche in manchen Fällen innerhalb eines besondern Raumes, in den meisten dagegen auf besondern, zuweilen sehr langen Stielen beweglich sind. Höroorgane an der Basis der Fühler oder bestimmter Beinpaare, Geruchsorgane ebenfalls an der Fühlerbasis in Form eines Grübchens und krystallhelle Taststäbchen an verschiedenen Stellen des Körpers sind ebenfalls nachgewiesen.

Die Verdauungsorgane der Krustenthiere sind meist in hohem Grade entwickelt, und nur selten zeigen sich solche rudimentäre Formen, wie wir früher zu finden gewohnt waren. Die Mundwerkzeuge sind, wie schon aus der obigen Analyse der Anhänge des Krebses hervorgeht, äußerst mannichfaltig und hauptsächlich nach zwei Grundrichtungen hin ausgebildet. Die meisten Krustenthiere haben kauende Mundtheile; sie zerkleinern ihre Nahrung mittels harter Kiefer, welche von der Seite her gegeneinander wirken und wovon uns in dem Flusstreife ein Beispiel gegeben war. Bei andern Krustenthiern aber wird durch theilweise Verkümmerung oder Verwachsung der kauenden Mundtheile ein Saugapparat hergestellt, der meist rüsselförmig verlängert ist und oft nebenbei eigene spitze Waffen trägt, womit die Thiere ihre Beute anbohren, um sie nachher auszusaugen zu können. Die eigenthümlichen Modificationen, wodurch die kauenden Mundtheile allmählich zu saugenden degradirt werden, sind sehr mannichfaltig ausgeprägt und werden uns bei der genauern Betrachtung der Schmarotzerektrebe noch besonders beschäftigen.

Das Darmrohr selbst verläuft bei den meisten Krustenthiern in gerader Linie von dem Munde bis zu dem am Schwauze befindlichen After, und bei vielen lassen sich sogar nicht einmal einzelne Abtheilungen unterscheiden. Nur selten zeigt der Darm schlingenförmige oder schraubenartige Biegungen, und nur bei einer einzigen Ordnung, bei den Mantelfüßern, endet er in ziemlich bedeutender Entfernung von dem Schwauze. Bei den höhern Formen lassen sich meistens Schlund, Magen, Mitteldarm und Afterdarm unterscheiden. Der Magen ist sehr häufig auf seiner innern Fläche nicht nur mit hornigen Vorsten und

Haaren, sondern auch mit scharfen Nadeln besetzt, welche durch besondere Muskeln bewegt und zum Zerkleinern der Nahrung dienen können. Diese Hornbewaffnung bei sich als feiner, meist aus Haaren bestehend durch den ganzen Verlauf des Darmes wird auch bei der scharflichen Fütterung dann die abgestoßenen Stücke theils an theils aus dem After hervorgezogen.

Die meisten Krustenthiere besitzen keine Leber, dagegen eine sehr deutliche Leber, welche verästelter Blindschläuche, bald als sehr feine, bald als gröbere, deren röhrige Strahlen ausstrahlen lassen und deren Ausführungsgänge mittelbar hinter dem Magen in den Darm münden. Gewöhnlich sind diese Drüsenorgane und fallen einen beträchtlichen Theil der Bauchhöhle ein.

Die Athmorgane sämmtlicher Krustenthiere auf Wasserathmung berechnet und bemerkt man ausgiebig. Manchen niedern Krustenthiern, insofern diese Kiemen durchaus und es ist die Athmung lediglich durch die äußere Haut zu werden. Bei den meisten Krustenthiern finden sich eigene Kiemen, die entweder in Körper, und zwar an der Basis der Beine angebracht sind, oder in besondern Kiemenbüchsen, die dem Kopfbrustschilde liegen. Bei vielen sind theils an den Bauchfüßen, theils an den Körperanhängen besondere Fortsätze, die in steter Bewegung erhalten werden und so Strudel erzeugen, der das Wasser an den Körper und in der Umgebung der Kiemen ständig wechselt. Die Kiemen selbst sind baumartig verästelt, oder von einfachen gegliederten Blättern gebildet, die von wasserführenden durchzogen werden. In der That zeigen sich diese Kiemen besonders bei den niedern und den ihnen nahe stehenden Ordnungen eine große Anzahl breiter Blätter entwickelt, die der Unterfläche des Leibes übereinanderständig auf- und zugelappt werden. Hier noch eigene Dedel entwickelt, welche äußerst zarter Haut überzogenen Kiemen bilden schützen. Die wandungslosen Kiemen, welchen das Blut strömt, ziehen sich gegen den hart aneinanderliegenden dünnen Kiemenblättchen hin. Bei andern Krustenthiern, namentlich bei den Mantelfüßern, sind die Kiemen, wie namentlich bei unserm Flusstreife, in der Unterfläche des Bauches, während sie bei den höhern Krustenthiern, wie namentlich bei unserm Flusstreife, an der Unterfläche des Kopfbrustschildes über dem Mund zweif Zugänge, einen spaltförmigen und einen rüsselförmigen, durch welchen das Wasser einströmt, und einen vordern Spalt, durch welchen das Wasser ausströmt, und zum Theil das Wasser bestimmt ist. In diesem Flusstreife ist das hintere Kausfüß wie ein Pumpenstengel hin und her, und die stete Erneuerung des Wassers. Bei Krustenthiern, welche auf dem Lande leben, sind die spaltförmigen Zugänge der Kiemen abgedrosselt, und da auch die Thiere die innere Fläche der Kiemen mit höhlen negartig oder schwammig entwickeln, so ist das zur Befruchtung der Kiemen lange Zeit auch auf dem trockenen Lande zu

en Landasseln finden sich außer den Kiemenre Höhlen, welche offenbar zur Luftathmung die wir bei den Familien selbst genauer erben.

At der Krustenthiere ist meistens farblos röthlich oder violett gefärbt; die Blut- welche stets farblos sind, erscheinen als rube, feinstörnige Körperchen, die oft einen Kern zeigen. Der Kreislauf selbst elmäßig, aber insofern unvollständig, als ährende Gefäße gänzlich fehlen und die it sich durch die Zwischenräume der Organe zum Herzen zurückbahnen muß. Ein Herz es liegt stets in der Mitte des Rückens, elbar unter der Schale, und hat bei den Gat- länger gestrecktem Körper oft eine Schlauch- id es bei denen mit kürzerem Kopfbruststüde t, meist in seitliche Zipfel ausstrahlend lt. Bei den niedern Familien der Krusten- namentlich bei den Scharopertreben, rz einen an beiden Enden offenen Schlauch r die in wandungslosen Räumen herzu- Blutmasse in seine hintere Lehnung auf- r die vordere wieder austreibt. Meistens hier in der Nähe des Herzens größere e, in welchen das Blut sich sammelt, um en nächsten Herzschlage in den Schlauch ten. Bei den höhern Typen findet sich rgen ausgehende Arteriensysteme, oder das rgane speisende Gefäßsystem mehr oder Wandungen ausgestattet.

nahme der Mantelsüher, welche Zwitter n bei allen übrigen Krustenthiern männ- weibliche Individuen vor, die in den meisten nur durch die Form der äußern Ge- zeile, sondern auch durch die Körpergestalt n. Fast allgemein sind die Weibchen weit die Männchen, und diese Vermümmung t, daß bei einigen Scharopertreben das welches unendlich viel kleiner ist, eine ab- gestalt hat und stets an dem Weibchen an- hängt, für einen Scharopert des Weib- chen werden könnte. Bei einigen niedern er Krustenthiere sind übrigens männliche sehr selten, oder auch an einzelnen Orten ten Arten noch nicht beobachtet. Unzweifel- bei vielen während längerer Zeit oder idig Fortpflanzung ohne Befruchtung statt. nlichen innern Geschlechtsorgane möglichen Zwischenformen von der Gestalt chen, blind geendeten Schlauchs an bis zu ichen Hodendrüse, die aus einem knuel- lichen zusammengefaßt ist und zuletzt in zwei gänge übergeht, die sich nach außen öffnen. zwei zu beiden Seiten der Mittellinie lie- n vorhanden, die aber oft auch miteinander t und so nur einen einzigen Drüsenkörper

Die männlichen Geschlechtsöffnungen fin- ts an dem Bauche, oft nur als zwei feine hlye, während bei den höhern Krebsen luthen vorhanden sind, deren Einbringung- lichen Geschlechtsöffnungen oft noch durch- inhänge unterstützt wird, die von den ersten r falschen Füße gebildet werden. Außer- rganen der Begattung finden sich häufig- nchen noch eigenthümliche Umgestaltungen- rperanhänge, besonders der Fühler und der- uch dieselben geschickt werden, die Weibchen- nern und festzuhalten. Die Samenmasse der- re unterscheidet sich meist wesentlich von der-

jenigen aller andern Thiere, indem statt beweglicher, fadenartiger oder teulenförmiger Samenelemente, runde, starre, unbewegliche Körper sich vorfinden, die zellenartig sind und meistens in starre Strahlen aus- laufen, welche ebenfalls keine Beweglichkeit zeigen.

Die weiblichen Geschlechtstheile erscheinen im wesentlichen in ähnlicher Form wie die männlichen, jedoch oft nur durch den Zubalt die Natur der innern Ge- schlechtstheile erschlossen werden kann. Bei vielen Krustenthiern hängen die Eileiter mit aus Blinddärmen gebildeten Kistorganen zusammen, welche die Eier beim Heraustrreten miteinander verkleben; bei andern ver- einigen sich die Eileiter jederseits in ein birnförmiges Säckchen, welches wahrscheinlich zur Aufnahme des bei der Begattung ergossenen Samens bestimmt ist, also die Bedeutung einer Samentasche hat. Die Geschlechts- öffnungen sind fast stets doppelt, eine auf jeder Seite, und finden sich meist an der Wurzel des Hinterleibes, an dem letzten Fußpaare der Brust, oder noch unter dem Kopfbrustschilde selbst. Die Fußpaare, welche sich unter dem Hinterleibe befinden, sind fast bei allen weiblichen Krustenthiern in eigenthümlicher Weise zur Aufnahme der gelegten Eier bestimmt, die mittelst eines klebrigen Stoffs an die Blätter oder Vorsten- baare dieser Füße in Gestalt von Trauben oder Häufen befestigt werden. Meist sind in diesen Fällen die vor- dern Afterfüße breit und blattartig, sodas sie förm- liche Dedel über diese unter dem Schwauze geborge- nen Eierhäufen bilden. In den niedern Reihen der Krustenthiere werden auch häufig die Eier von den Weibchen bis zur vollständigen Entwidlung der Larven in mehr oder minder langen, durchsichtigen Schläuchen getragen, die zu beiden Seiten am Leibe befestigt sind.

Die meisten Kruster durchlaufen höchst eigenthümliche Larvenzustände, welche sogar in mehrfachen Formen bei vielen aufeinanderfolgen und so sehr von den erwachsenen Thieren verschieden sind, daß man sie unter besondern Gattungsnamen (Nauplius, Zoöa, Phyllo- soma u. s. w.) verschiedenen Familien und Ordnungen zutheilt. Die häufigste Grundform, welche bis jetzt bei einzelnen Typen fast aller größern Abtheilungen, mit Ausnahme der Siphagen (Edriophthalma), nach- gewiesen wurde, ist ein Thierchen mit drei Fußpaaren, einem unpaaren Stirnauge, bauchständigem, hinter einer großen Oberlippe verborgenem Munde, geradem Darmanal, endständigem After und ungleichertem Körper, das mit dem Namen Nauplius belegt wurde. Bei fast allen Entomostraceen und manchen Podoph- thalmen erscheint diese Grundform als freilebendes Thier, bei den meisten Stielaugen spielt sich die entsprechende Entwicklungsphase im Ei ab. Die spätern Formen bilden sich durch successive Häutungen aus und durch rückschreitende Metamorphose; besonders bei Scharopern und festigenden Thieren verschwin- den oft die ursprünglichen Glieder des Nauplius, das Auge u. s. w. gänzlich, wie denn überhaupt bei keiner Klasse die Rückbildungen eine so wesentliche Rolle spielen, als bei den Krustern.

Ordnung der Siphagen (Edriophthalma).

Kein ausgebildeter Cephalothorax; zu- sammengesetzte sitzende Augen.

Unterordnung der Asseln (Isopoda).

Körper breitgedrückt; Kopf nur mit dem ersten Brustringe verschmolzen oder frei, blätterige Kiemen am Bauche.

Der Körper der Asseln ist gewöhnlich platt, von oben nach unten zusammengedrückt, bald mehr läng-

lich, bald eiförmig, oder selbst der Kreisform sich nähernd; ihr Kopf ist klein, aber stets deutlich von dem ersten Brusttringe getrennt; die gewöhnlich gehäuf- ten, seltener zusammengefesten Augen rund, zuweilen von bedeutender Größe; die Fühler von mäßiger Länge, gewöhnlich quer nach außen gestellt, die vordern zu- weilen rudimentär; die Mundwerkzeuge sind wohl aus- gebildet, die Kiefer stark, gezähnt, die Kausfüße sehr groß, aber von wechselnder Form; die Brust besteht aus sieben Ringen, deren Seitenränder meist blatt- artig vorragen; jeder Brusttring trägt ein Paar Füße, die fast immer von gleicher Form sind und am Ende eine scharfe Klaue, niemals eine Schere haben; an ihrer Basis tragen diese Füße bei den Weibchen eine breite Blatte zur Aufbewahrung der Eier, niemals aber solche Kiemenblätter, wie bei den folgenden Ordnungen. Der Hinterleib ist wohl ausgebildet, ur- sprünglich aus sechs Ringen zusammengefest, die aber zuweilen miteinander verschmolzen sind. Die Bauch- füße tragen jeder zwei große, häutige, eiförmige Blätter, deren inneres Blatt sehr zart ist und als Kiemenblatt fungirt; das sechste Bauchfußpaar dagegen weicht von den vorhergehenden in seiner Bildung ab und zeigt sich gewöhnlich in Gestalt eines dedelartigen Flügels, der sich über die andern Flügeldecken hin- überklappen kann; zuweilen auch bilden diese letzten Bauchfüße eine Art stielsförmigen Schwanzes oder eine Flosse.

Das Nervensystem der Affeln besteht aus einem ziemlich großen Hirnnoten, aus sieben gewöhnlich gleichmäßig großen Brustnoten, die durch Längsfäden miteinander verbunden sind und auf die zuweilen noch mehrere kleine Hirnknötchen folgen. Der Magen ist innen mit gezähnten Hornleisten besetzt und das Herz erstreckt sich über die ganze Länge des Rückens. Die oben beschriebenen Kiemenblätter erleiden bei den Land- affeln bemerkenswerthe Modificationen, die wir bei dieser Familie betrachten werden. Eierstöcke und Ho- den gleichen sich in ihrer Gestalt und bilden seitliche Blindschläuche, die sich bei den Weibchen an der Basis des fünften Fußpaares, bei den Männchen auf dem letzten Brusttringel, entweder auf doppelten, war- zenartigen Nuthen, oder in einer einzigen kurzen Nuthen öffnen, welche durch zwei lange Stiele, die von dem zweiten Fußpaare ausgehen, noch unterstützt wird. Die Affeln durchlaufen keine eigentliche Metamorphose; doch haben die meisten Jungen beim Auskriechen aus dem Ei weniger Körperringe und Beinpaare. Es läßt sich bei ihnen eine förmliche Reihe von hochentwickelten Landthieren bis zu asymmetrischen, rückgebildeten Schmarotzern verfolgen.

Wir erwähnen hier die Familie der Landasseln (Oniscida) (Landassell, *Oniscus murarius*, Taf. 28, Fig. 23). Die meisten dieser Thiere leben auf dem Lande an feuchten, schattigen Orten, unter Steinen, im Moose, in Mauerritzen und Gewölben, und sind zu diesem Zwecke mit eigenen Organen zur Luftathmung versehen; die Kiemenblättchen der hinteren Bauchfüße sind nämlich sehr rudimentär, die der vordern dagegen bedeutend entwickelt und an ihrer Basis mit einer engen Spalte versehen, welche in eine gefäßartig ver- zweigte Höhle führt, die zwischen den Lamellen der Platten sich hinzieht und stets mit fein zerkleinter Luft gefüllt ist, die sich leicht hervorpressen läßt. Offenbar stellen diese Blätter den ersten Anfang zur Ausbildung solcher luftathmender Organe dar, wie wir sie früher namentlich bei den Spinnen in einem weit höhern Grade der Ausbildung gefunden haben.

Ferner die Wasserasseln (Asellida) mit stielsförmigen Anhängen am Hinterleibe; die abgebildete Art,

in einem Theile der Abdrücke seltener Thiere lebt im Nordmeere. (*Asellus* Kroyeri, Taf. 28, Fig. 22.)

Die Kugelasseln (Sphaeromida) (*Sphaeroma serratum*, Fig. 24) mit stiellosem und hintern Gehfüßen; die im Nordmeere sich zusammenheften; (*Cymothoida*) (Fischlaus, *Cymothoe*, Fig. 25), mit ähnlicher Schwimmschuppe, aber ohne Füße, mit welchen sie sich an Fischen anheften. Die Kugelasseln (Bopyrida) (*Garne- thoracica*, Fig. 26), deren Weibchen an Garneelen schmározten und ganzlich werden, während die Männchen, wie die Affelntypus bewahren.

Unterordnung der Kegelasseln (Laemodipoda).

Hinterleib mit seinen Anhängen merk.

Der Kopf dieser Thiere ist meist gedrückt und noch mit dem ersten Brusttringe verwachsen, so daß er das erste Fußpaar stets vier Fühler vorhanden, die immer von borstenförmiger Gestalt haben. Die Fühler bestehen aus einer fast kreisförmigen Basis, stark gezähnten Kiefern, zwei den Kinnladen und einem Paar großer, lange Tastergeißeln tragen. Die Kiefern sind sieben, zuweilen aber sind statt der vierten Fußpaares eigenthümliche Blätter, welche die Athemwerkzeuge vervollständigen, auch an dem zweiten Ringe vorkommen. Die Füße sind gewöhnlich mit scharfen, knag- schlagbaren Haken, niemals mit Scheren.

Zu dieser wenig zahlreichen Unterordnung gehören die Familie der Walfischläuse (*Cymatium* Körper, und die der Gespenkthiere (*Gespennkrebs*, *Caprella linearis*, Taf. 28, Fig. 27), mit stabförmigen, laugen Fühlern und klappenförmigen Bruttajchen am Unterleibe. Die tragen Thierchen klettern an Meeresrüsten umher.

Unterordnung der Flohasseln (Amphipoda).

Körperseitlich zusammengedrückt, Leib stark entwickelt, an allen Gliedern und theilweise Springfüßen gebend.

Der Kopf ist vollkommen von dem ersten Brusttringe getrennt, nicht, wie bei den vorigen, sondern mit demselben verschmolzen, und trägt zwei bedeutende, gehäufte Augen, denen zwei gemeinschaftliche Hornhaut abzugeben ist. In andern Fällen unter der glatten Haut der zweiten Facettirte sich findet. Der Kopf hat zwei Fühler vorhanden, die auf den Seiten untereinander stehen und oft eine große Länge erreichen. Die Mundwerkzeuge bestehen aus einer Oberlippe, einem Paar großer, einen Taster tragen, zwei Paar Kausfüße, die in der Mitte zu einer Lippe verwachsen. Die Brust ist aus sieben Ringe getheilt, die sich auf den Seitenkrümmen und hier eigene Dedelblätter an der Basis der Füße bilden, die gewöhnlich und meist an ihrem Grunde eine große

en. Die Weibchen zeigen oft an der Basis eine eigene cylindrische Anhänge, welche dazu und, die Eier festzubalten, die sie unter dem legen. Der Hinterleib ist sehr entwickelt und vielfachen Anhängen versehen; die drei ersten Bauchfüße gehalten sich zu Schwimmgorganen lange, hornige, stark behaarte Enden; die hintern Paare sind gänzlich an das Ende gerückt, und bald blätterig, sodaß sie eine Kasse bilden, bald auch in Form langer, r. Griffel ausgezogen, auf die sich die Thiere eichlagenem Bauche stützen und die ihnen meistens als Springstangen dienen.

Die der Flosskrebse (*Gammaridea*) kommt süßen Wasser, als besonders häufig im dem Strande vor, wo sie zu Laufenden in umherkriechen oder mit ihren langen Fühlern um aufzuklopfen, um die darin verborgenen abzufinden. Der Kopf dieser Thiere ist als in der vorigen Familie, zugerundet bei Paaren gewaltig großer Fühler besetzt, rander stehen. Die Kaushe sind sehr große bedeutend entwickelt und an ihrer Seite geistförmige Zaster angebracht. Die Brust eben Kinge, und die zwei vordern Fußpaare nlich am stärksten und zum Greifen der zum Aufwühlen des Bodens geeignet; die der Rüdenschilde steigen gewöhnlich sehr und bilden so eine Art tiefer Rinne, in die Füße fast nur von hinten nach vorn nnen. Bei den einen, zu welchen unser süßen Gewässern gewöhnlicher Flosskrebse *pulex*, Taf. 28, Fig. 19) und der (*irrhämen* Theile der Exemplare des Atlas Quallen) Küstenschloß (*Talitrus saltator*, Fig. 20) der Hinterleib stark gebogen; bei den im lenden Gattungen nicht. Die Familie der öhe (*Hyperidea*), deren Arten in Quallen Seethieren leben, unterscheidet sich durch uere Entwicklung des großen Kopfes und

eigentlichen Füße sind fast immer in der Zahl von fünf Paaren vorhanden, was ebenso wie das Fehlen einer Unterlippe ein leichtes Kennzeichen zur Unterscheidung von der folgenden Unterklasse abgibt. Die Füße sind meistens cylindrisch und entweder zum Gehen, Schwimmen oder Greifen eingerichtet, wonach namentlich ihre Endglieder sehr verschiedene Formen zeigen.

Eine fernere wesentliche Auszeichnung der stiel-
 äugigen Krustenthiere wird durch den Bau der Athem-
 organe gegeben. Während in allen übrigen Ord-
 nungen entweder die Füße selbst oder ein Theil der-
 selben zu meist blätterigen Anhängen umgewandelt
 sind, welche der Athmung vorstehen, findet man hier
 eigene Athmorgane, Kiemen, von gefiedertem oder
 blätterigem Baue, die gewöhnlich in einer eigenen Höhle
 unter dem Kopfschild geborgen sind, zuweilen
 aber auch frei an der Unterfläche des Körpers, an den
 Bauchfüßen angeheftet getragen werden.

Unterordnung der Zehnfüßer (Decapoda).

Zehn Brustfüße; Cephalothorax unegliedert; die blätterigen Kiemen von der Wurzel der Brustfüße und der beiden letzten Kausfüße entspringend und in einer seitlichen Höhle des Brustschildes verborgen.

Gruppe der Taschentrebse oder Krabben
(Brachyura).

Von oben gesehen bietet der Körper dieser Thiere nur eine einzige, bald mehr runde, bald nach vorn zugespitzte Masse dar, welche von dem Kopfbrustschild durchaus bedeckt wird; dieses ist meist ebenso breit oder noch breiter als lang, nach vorn zuweilen schnabelförmig ausgezogen, meist aber abgestuft oder in Bogen gerundet und häufig durch Furchen, die aber niemals durchgehen, in verschiedene Felder getheilt. An dem vordern Stirnrande geht dieses Schild über den Augerring hinaus und verbindet sich nach unten mit einer Fortsetzung des zweiten Ringes, so daß der Augerring ganz innerhalb des Schildes liegt und die auf beweglichen Stielen stehenden Augen gänzlich in die Höhlungen unter der Stirn zurückgeschlagen werden können. Die innern Fühler sind stets sehr kurz und stehen zwischen den Augen an der Mittellinie in der Weise angebracht, daß sie gänzlich in Querrubden des Stirnrandes zurückgelegt werden können. Die äußern Fühler sind ebenfalls kurz, aber nicht zurückziehbar. Das Brustschild biegt sich von allen Seiten nach unten um, und läßt auf der untern Fläche nur einen geringen leeren Raum, den Mundrahmen, in welchem die Kauwerkzeuge angebracht sind und in dessen vordern Eden sich die ausführenden Kanäle der Kiemenhöhlen öffnen; nach hinten zu schlägt sich das Rückenschild auf der Seite so ein, daß es die ganze Kiemenhöhle deckt und nur einen schmalen Schlitz zum Eintritt des Wassers in die Kiemenhöhle läßt. Betrachtet man eine Krabbe von unten, so sieht man vorn in dem Mundrahmen des umgeschlagenen Kopfbrustschildes die Kauwerkzeuge, und weiter nach hinten ein breites, bald eiförmiges, bald mehr rundes Schild, das Brustbein oder Bauchschild, an dessen äußern Rändern die Beine eingelenkt sind, während in der Mitte in einer vertieften Rinne der untergeschlagene, rubimentäre Hinterleib eingelagert ist. Bei den Weibchen ist derselbe meist weit breiter als bei den Männchen und trägt mittels langer, dünner, stabförmiger Anhänge am zweiten bis fünften Ringe die Eier, welche unter dem Bauche festgehalten sind. Schlägt man den Hinterleib zurück, so sieht man bei

der Stielaugen (Podophthalma).

elter Cephalothorax; zusammen-
hingen auf beweglichen Stielen.

der besteht aus zwei wohlgetrennten, in Gestalt wie durch ihre Anhänge getheiltungen, die sich auf der Rückenfläche entfaltend machen; nämlich aus einer Kapsel mit den Sinneswerkzeugen, den Mund und die Gliederenden, sowie die Gliederenden, welche dem Geben und Greifen bestimmten Füßen, einem Hinterleibe, welcher stets aus einer geringeren Anzahl von Ringeln zusammengefaßt ist, Hauptknotenpunkten der ganzen Ordnung, daß die Augen, welche stets zusammengefaßt facettirten Hornhäuten vertheilte Augen sind, eine bedeutende Länge erreichen und gewöhnlich zurückgezogen werden können. Die Beine sind immer zum Rauen eingerichtet, einer Oberlippe, einem Paar Kiefern und einem Paar Fühlhörner zusammengesetzt; meist auch noch einige besondere Paare von Kauwerkzeugen, das Ganze eine höchst verwinkelte Form verschiedener gegliederter Organe zeigt, zum Rauen, bald zum Bürsten, Betasten oder zur Abnutzungsmittel bestimmt sind. Die

dem Männchen an seinem Grunde die röhrenförmigen Ruthen, während bei dem Weibchen die Oefnungen der Eileiter etwa der Mitte des Hinterleibes gegenüber in der Rinne desselben auf dem Bauchschilde angebracht sind. Die Kauerwerkzeuge, welche in dem Mundrathen des ungeschlagenen Brustschildes stehend, sind förmlich aufeinander gehäuft, sodas ein hinteres Paar von Anhängen stets das vorübergehende verbirgt und das dritte und letzte Kausfußpaar mit seinen verbreiterten Gliedern die ganzen Kauerwerkzeuge wie mit zwei Flügelhüllen deckt. Es bestehen übrigens diese Werkzeuge aus drei Paar Kausfüßen von meist sehr complicirter Gestalt, zwei Paar Kinnlappen und einem Paar Kiefern. Alle Krabben haben fünf einfache, an den Rändern des Bauchschildes eingelenkte Fußpaare, die stets alle wohl ausgebildet sind und von denen das erste immer eine Schere trägt, während die andern vier Paare gewöhnlich nur mit einer Klaue oder mit Schwimmplatten enden. Viele Krabben sind geschickte Schwimmer, die andern aber gute Läufer, die indeß dadurch überraschen, daß sie fast niemals vorwärts, sondern stets von der Seite laufen, was einen ziemlich komischen Anblick gewährt.

Die Eier werden von den weiblichen Krabben unter dem Bauche getragen, und die Embryonen schlüpfen in Gestalt großhäugiger Krebschen aus, welche in der Gestalt viele Aehnlichkeit mit den langschwänzigen Krebsen zeigen, ein längliches Rückenschild und einen bedeutenden Hinterleib besitzen, mit dem sie sehr lebhaft herumschwimmen. Bei der ersten Häutung erhalten diese Thierchen mitten auf dem gewölbten Rückenschilde einen unverhältnißmäßig langen, hornartig gekrümmten Stachel, während zugleich der vordere Schnabel des Schildes einen zweiten, nach unten gekrümmten Stachel bildet, der dem Rückenstachel an Länge nichts nachgibt. Die Augen sind ungeheuer groß und stehen auf beweglichen Stielen; die Anhänge der Füße wechseln sehr in Gestalt und Form, da alle diese Thierchen gewöhnlich verschiedenen Entwicklungszuständen angehören, die man früher unter dem Gattungsnamen *Zoea* zusammenfaßte. Der Hinterleib dieser Larven ist sehr entwickelt und am Ende mit bedeutenden Flossenborsten versehen. Nach wiederholten Häutungen erlangen diese Larven eine weitere Form, welche man ebenfalls als besondere Gattung unter dem Namen *Megalops* beschrieben hat. In dieser Gestalt haben die Thiere die beiden gekrümmten Hornstacheln verloren; die beiden Fühlerpaare sind deutlich, das Rückenschild hat eine länglich leierförmige Gestalt, die fünf Fußpaare sind vollständig da, das vorderste mit Scheren bewaffnet, nur der Hinterleib ist noch sehr lang und mit falschen Füßen besetzt, welche Flossenborsten tragen; diese brauchen nur verloren zu gehen und der rudimentäre Hinterleib unter das schon bedeutend breite Bauchschild untergeschlagen zu werden, so ist die junge Krabbe auch in der Gestalt ihren Nestern ähnlich.

In der außerordentlich zahlreichen Familie der Krabben (*Cancerida*), die sich durch ein vieredriges, vorn quer abgestutztes Maul unterscheidet, hat man, nach der Form des Panzers, viele Formen unterschieden, als deren äußerste Grenzen wir eine Landkrabbe (*Gecarcinus rusticola*, Taf. 28, Fig. 8) mit vorn breitem Kopfschild, und eine Dreieckskrabbe (*Spinnekrabbe*, *Maja squinado*, Fig. 10) abbilden. Erstere lebt auf den Antillen auf dem Lande in Erdlöchern, oft stundenweit von der Küste, nach welcher hin sie zur Fortpflanzung in großen Scharen bei Nacht wandert; eine besondere Einrichtung schützt die Kiemen vor dem Verrotten; letztere ist häufig im Mittelmeer, ebenso wie die Wollkrabbe

(*Dromia vulgaris*, Fig. 11), welche in Vertümmung des auf den Rücken gelegenen Beinpaars ausgezeichnet. Auf dem Lande Schwämme oder Seescheiden, die es leicht erscheinen lassen. Zu der Familie mauler (*Oxytomata*) mit dreieckiger, deren verlängerte Spitze nach vorn gerichtet, die sonderbare, im Indischen Ocean lebende Krabbe (*Hanina dentata*, Fig. 9).

Gruppe der Halbschwänzer (Amphipoda)

Die Gruppe wird von einigen Familien gebildet, die eine förmliche Stufenfolge von den langschwänzigen Krebsen zu den langschwänzigen Krabben bieten, und stets die Charaktere, wie der andern dieser Ordnung so zeigen, einzigen, daß die Thiere keiner von beiden zugezählt werden können. Die allgemeine Erinnerung bei den einen an die Krabben, bei den andern derjenigen der Krabben so ganz, eine genauere Untersuchung beider Thiere zeigt, daß das Kopfbrustschild ist stets sehr ansehnlich und größer als der Hinterleib, welcher niemals bei Krabben, durch eine breite, fächerförmige, mächtige Muskulatur das hauptsächlichste Merkmal abgibt, sondern entweder wie bei den Krabben gebogen und rudimentär, oder doch von weicher Beschaffenheit ist. Die Thiere sind groß und gewöhnlich frei, wie bei Krabben, nur bei einer Familie können sie in dem des Stirnrandes zurückgeschlagen werden, allgemein bei den Krabben der Fall ist, der Brust wechselt ungemein; gewöhnlich ist der Ring nicht mit den vorigen verwachsen, eingelenkt, und das Brustschild bald mehr, aber niemals mit einer mittlern Kante, sondern entwickelten innern seitlichen Platten, die drei ersten Fußpaare sind stets vollkommen und das erste häufig mit einer großen Schere versehen, während das fünfte immer und gewöhnlich rudimentär ist und dann als ein flüchtiger Anhang auf dem Rücken getragener Ausklammern in den Wohnungen derselben in seiner Form so sehr wechselnde, niemals falsche Füße, wie bei den Krabben, sondern höchstens an seinem vorderen unbedeutenden Anhang von verschiedenen Gliedern findet man ein untergeordnetes Merkmal der Krabben darin, daß sich die Glieder der selben Weise wie bei den Krabben an den Gliedern des dritten Fußpaares und dem Brustschild nach außen öffnen.

Den langschwänzigen Krebsen steht die Familie der Bernhardenkrebsen (*Bernhardina*) am nächsten, die die gestreckte Form der Krabben, der Bauch vollkommen weich ist und der Hinterende trägt. Die Kopfbrust ist nicht eine quere Furche in eine hintere und vordere theilung zerlegt; die vordersten Füße sind gewöhnlich ungleich und mit einer Schere versehen, folgen nur mit einer Klaue, sonst wohl entwickelt und zum Gehen dienend, vierte und fünfte Paar rudimentär, die zwei schwachen Fingerringe geendet, die Stemmten und Fehlbalken. Der Hinterleib ist weich, beim Männchen auf der Unterseite mit Haltorganen versehen. Der Hinterleib befindet sich zwischen zwei Paar Anhängen, welche wohl entwickelt sind. Die meisten Thiere der

weichen Hirterleibe in leere Schnedenschalen, wner sie wahrscheinlich vorher aufressen, n sich mit ihren hintern Füßen und mit en des Leibes in den Schalen fest, die sie it sich herum schleppen. Eine gewaltig große Krebs, *Birgus latro*, Taf. 28, Fig. 12) lebt ten der Inseln Südasiens in Erdböchern, is auf die Kotosbäume und kneipt mit a Scheren die Nüsse auf.

ähnen außerdem noch die Familie der se (*Hippida*) mit länglichem, sehr gewölbtem e, hartknochigem, untergebogenem Hinter- igen Endanhängen. Die abgebildete Art, ebs (*Albunea symnista*, Fig. 13), lebt im ecan im Sande vergaben.

isse der Porzellankrebse (*Porcellanida*) Scheren und rudimentäres letztes Fußpaar. ete Art (*Galathea strigosa*, Fig. 14), ittelmeere, einem langschwänzigen Krebse in hr ähnlich.

der Langschwänzer (*Macrura*).

edte Thiere mit kräftig entwickeltem Hinter- Brustschild meist viel länger als breit ist llich kaum über die Basis der Füße hinaus Gewöhnlich läuft dieses Schild, dessen seit- sich über die Kiemen hinab nach unten h vorn in eine zwischen den Augen stehende rum) aus, während es nach hinten aus- t und mit dem ersten Hinterleibsringe sich uf der untern Fläche findet man zwischen ur eine dünne, schmale Leiste als Brust- ach innen vielfache Vorsprünge zeigt und jomie derer Muskeln zum Anspannpunkte Fühler sind gewöhnlich sehr entwickelt und auf derselben Linie; die innern sind stets , oft getheilt und können niemals in eine dgelegt werden, die äußern wechseln viel- r Gestalt, tragen aber gewöhnlich an ihrer horizontalen Platte. Die Mundwerkzeuge, r vertieften Grube liegen, sind sehr com- bestehen aus einer Oberlippe, einem Paare lches gewöhnlich einen Tafter trägt, zwei aden und drei Paar Kaufüßen, von welchen lätterig ist und die alle drei sowol einen auch gewöhnlich noch außerdem einen en Anhang tragen, welcher in dem Aus- uge der Kiemenhöhle verborgen liegt und seine Bewegung das Ausströmen des Was- t und befördert. Auf diese Kaufüße folgen ar eigentlicher Füße, die gewöhnlich einfach ehen eingerichtet sind und deren erstes us eine Schere trägt, während die übrigen en Klauen bewaffnet sind. Die relative r dieser Füße wechselt sehr, und es ist un- e bestimmte Regel aufzustellen, wonach diese en sich ausbilden. Der Hinterleib ist g entwickelt, meist nach unten gebogen und Ringen zusammengefügt, von welchen die n bald blattförmige, bald cylindrische After- i, während der sechste Ring zur Seite ein er trägt, die sich an die Endflosse des letzten ebnen und mit dieser eine fächerförmige osse bilden, die das wesentlichste Bewegungs- Die Krebse schlagen den Hinterleib heftig ein und bewegen sich mit großer Schnellig- ts durch das Wasser. Die meisten in der en Krebse zeigen sehr auffallende Metamor- ährend unsere Fluszkrebse in einer der de- nlichen Gestalt aus dem Ei schlüpfen.

Die Familie der Panzerkrebse (*Loricata*) wird von meist großen, breiten, sehr hartknochigen Krebsen mit kurzem, platttem Hinterleibe und glattem Kopfschild, das nach hinten besonders sehr breit ist, gebildet. Die innern Fühler sind kurz, gewöhnlich am Ende zweifächerig, die äußern bald sehr lang und borsten- förmig, bald in eine breite, krustenartige Platte ver- wandelt. Die Bildung der Füße wechselt, doch hat das erste Paar nur selten eine Schere, und die an- dern niemals; das fünfte Paar ist oft rudimentär; die Schwanzflosse ist breit, aus fünf Lappen gebildet, von denen die äußern stets, der mittlere häufig fast in seinem ganzen Umfange häutig ist. Die meist großen und schweren Thiere leben an den Küsten in ziem- licher Tiefe und sind, wie die Langfüße (*Palinurus vulgaris*, Taf. 28, Fig. 15), ein bedeutender Handels- artikel. Höchst merkwürdig ist die Metamorphose der Langkusten. Ihre Larven, früher unter dem Namen *Phyllosoma* bekannt und den Spaltfüßern (*Schizopoda*) beigezählt, bestehen aus außerordentlich flachen Streb- thieren mit dünner, durchsichtiger Schale, deren Körper so sehr abgeplattet ist, daß kaum ein Raum für die Eingeweide zwischen der obern und untern Schalen- schilde übrigbleibt. Das Kopfbrustschild ist gewöhn- lich breit oder länglich und hängt nur in der Mitte an den Brustringen an, während es sonst nach allen Seiten frei ist und von unten her mit einem zweiten zusammenhängenden Schilde bekleidet erscheint, so daß man diese Thiere auch die doppeltgepanzten (*Bipel- tata*) genannt hat. Die Augen sind groß, auf dün- nen Stielen getragen, die innern Fühler am Ende ge- spalten, die äußern bald borstig, bald blattartig. Der Mund liegt weit hinter den Fühlern zurück, und hinter ihm beginnt das Brustschild, an dessen Rande die sieben oder acht Paar Füße sehr weit von der Mittellinie eingelenkt sind. Das erste Fußpaar ist gewöhnlich verkümmert, die andern lang, dünn, gespalten, zum Schwimmen eingerichtet. Die Kaufüße und die falschen Füße des Hinterleibes sind rudimentär, der Hinterleib wenig entwickelt, aber mit einer fünfblättrigen Schwimmflosse versehen.

Die Hummerkrebse (*Astacida*) (*Fluszkrebse*, *Astacus fluviatilis*, Taf. 28, Fig. 16) begreifen diejenigen Krebse, welche unserm gewöhnlichen Fluszkrebse nahe stehen und sich durch eine harte Schale, eine große un- gekielte Kopfbrust und einen mehr platten Hinterleib auszeichnen. Die beiden Fühlerpaare sind auf der- selben Querlinie eingelenkt, die innern zweifachig, die äußern einfach, bedeutend verlängert und an ihrer Basis mit einer spießförmigen Platte versehen, welche niemals die Größe erreicht wie bei der vorigen Fa- milie. Der Hinterleib ist groß, in seiner ganzen Länge fast gleich breit, nicht zugespitzt; die äußern Blätter der Schwimmflosse durch ein queres Gelenk getheilt; das vorderste Fußpaar ist stets weit größer als die übrigen und immer mit einer bedeutenden Schere bewaffnet. Die Kiemen sind sehr zahlreich und aus cylindrischen Fäden gebildet, während sie bei der vorigen Familie aus horizontalen Blättern zusammengefügt sind. Die größten, in der See leben- den Arten dieser Familie, wie namentlich die Hummer, bilden bekanntlich einen bedeutenden Handelsartikel mancher Küsten.

Die Familie der Garnelen (*Carida*) besteht aus meist kleinen Krebsen mit dünner, hornartiger Körper- bedeckung, deren Kumpf gewöhnlich von der Seite zu- sammengedrückt und oben mit einem scharfen Kiele versehen ist, welcher nach vorn in einen langen, oft gezahnten Stachel ausläuft. Die äußern Fühler sind tiefer eingelenkt als die mittlern und mit einem

großen Blattoberfläch versehen, welcher den Stiel des Fühlers nicht nur bedeckt, sondern meist auch überragt. Die Füße sind dünn, lang und ein oder zwei Paare derselben gewöhnlich mit Scheren bewaffnet; der Hintere Leib ist lang, vorn dick, nach hinten zugespitzt, schwanzförmig stark gebogen und mit einer sehr großen Schwanzflosse versehen, deren äußere Blätter aus zwei verwachsenen Stücken bestehen. Die Thiere leben alle in der See, meist gesellig an den Küsten, sind gewöhnlich nur klein, dienen aber dennoch allgemein zur Nahrung. Bei einer Art (*Peneus*) wurde die Naupliusform als Larve nachgewiesen, während bei andern das entsprechende Stadium im Ei verläuft. Die abgebildete Art ist die größere unter den gewöhnlichen Garnelen (*Crevettes*), die man verspeist. (Garnelle, *Palaeomon serratus*, Taf. 28, Fig. 17.)

Unterordnung der Mundfüßer (Stomapoda).

Keine oder büschelförmige Riemen an den Bauchfüßen; letzte Kiezersfüße und erste Bauchfüße gleich gestaltet.

Wesentlich schwimmende Thiere mit meist langem Körper und kurzem Kopfsprachshide, von dem gewöhnlich der Augenring vollkommen getrennt ist. Dieser trägt dann die langgestielten, facettirten Augen und die vier Fühler, und zuweilen ist er selbst noch in zwei Ringe getheilt, von denen dann der hintere den Einlenkungspunkt der Fühler gibt. Die Ausdehnung der Kopfbrust ist sehr verschieden, denn bald läßt sie drei oder vier mit eigentlichen Füßen besetzte Ringe unbedeckt, bald überzieht sie alle Brustringe so vollständig, daß die Anknüpfungspunkte sämmtlicher Füße von oben bedeckt sind, wobei indessen doch die Ringe auf der untern Seite erkenntlich bleiben. Die Bildung der Füße und des Hinterleibes wechselt außerordentlich bei den verschiedenen Familien. Die innern Fühler sind gewöhnlich ziemlich lang, frei und durch mehrere vielgliederige Fäden geendigt, die äußern einfach, an ihrer Basis mit einem großen gefiederten Blatte und am Ende mit einem vielgliederigen Faden versehen.

Die Familie der Heuschreckenkrebse (*Squilla*), (*Heuschreckenkrebs*, *Squilla mantis*, Taf. 28, Fig. 18) bietet die größten der ganzen Ordnung dar. Der Augenring ist deutlich getrennt, die Augen rundlich oder nierenförmig, kurzgestielt; die innern Fühler lang, mit drei Endborsten versehen, die äußern einfach und an der Basis mit einer ovalen gewimperten Platte besetzt. Das Kopfschild ist klein, länglich und läßt noch wenigstens drei Ringe der Brust unbedeckt, an welchen drei Paare kurzer, cylindrischer, vorn abgeplatteter Füße stehen, die keine Klauen tragen und nur zum Schwimmen bestimmt sind. Der Mund liegt ziemlich weit nach hinten, ist mit Kiefern, zwei Paar Kinnladen und fünf Paar Kieferfüßen bewaffnet, von denen das erste Paar stiel förmig und die drei letzten Paare mit einem blafenförmigen Anhang versehen sind und stets auf der Mundöffnung dicht aufliegen. Das zweite Paar dieser Kieferfüße ist außerordentlich groß, stark und zu einem Nahrungsgestalt; sein letztes, gewöhnlich mit Stacheln bewaffnetes Klauenglied schlägt sich wie eine Klinge gegen das vorhergehende Glied ein, das zu seiner Aufnahme an der äußern Seite einen vertieften, oft ebenfalls gestachelten Falz besitzt. Der Hinterleib ist lang, sehr stark und kräftig, und das hauptsächliche Schwimmorgan. Er trägt fünf Paar blattartiger, fächerförmiger Füße, an deren Wurzel die gefiederten Kiemen befestigt sind, und ist an seinem hintern Ende mit zwei Paaren seitlicher, langer, gegliederter Blatten ver-

sehen, welche die Oberfläche der Höle
größern. Die räuberischen Thiere finden in
Nähe des Strandes, aber meist in geringer
Familie der Spaltfächer (Schwämme),
meist fehlend; Kiefer und Drüsen ge-
lang, am Ende gespalten. Keine Röhren.

Ordnung der Beilichwänger (Per

Rücken schild quergetheilt; alle Beine
Cephalothorax beinartig, die ersten
renförmig endend; Bauchfüße klein
ungegliederter Stachel am Hinterende

Der Körper dieser Thiere, die zu den Krebsen gehören, besteht aus drei dreieckig halbmondförmigen Kopfbrustschilden, die nach vorn gerichtet ist, während die beiden hinteren schauen, einem ungleichseitig dreieckigen Schilden, dessen drei vordere Seiten der Kopfbrust umfasst werden, und einem dreieckigen, ungegliederten Schwanzschild, dessen hintern Ende scharf zugespitzt ist. Kopfbrustschild bilden zusammen eine fast runde, das das Ganze der äußeren Körpergrenze. Werfen des Federballs bestimmten Schwanzschildes unähnlich sieht. Das gewölbte Kopfbrustschild der Mitte der Rückenfläche eine Leiste, an deren vordern Ende zwei sehr kleine, erhabene Höcker stehen und zwei Seitenleisten, zu deren Enden halbmondförmigen, gewölbten, zusammengefügten Gliedern zeigen, die mitbin ganz dieselbe Stellung einnehmen wie die Augen der Trilobiten. Das Kopfbrustschild mit dem Kopfbrustschild aus einer queren Leiste, die sich zwischen den Seiten erstreckt, aus der die Augen stehen. Die beiden hinteren Kopfbrustschildes sind mit gehobenen Stacheln besetzt; der in der Mitte eingestülpte Stachel ist nach allen Seiten hin beweglich, so dass das Thier von der untern Seite her in der Mitte des Kopfbrustschildes den Kopf an dessen Rand unmittelbar die mit Stacheln besetzten Gebilde einglenkt sind. Neben den Stacheln stehen in der Mittellinie, mit der die Stacheln nähert, zwei Zahler, die nur klein und unbedeutend sind und deren Endglied eine Schere bilden, die folgen die fünf eigentlichen Fußpaare, die den eigenthümlichen Bau zeigen; sie bestehen aus sechs Gliedern, von denen das erste Glied auf seiner innern Fläche mit einem Fortsatze versehen ist, das starke Stacheln trägt, die gegen dasjenige der andern Seite wirken. Die übrigen Glieder sind cylindrisch und dünn, schwache Schere. Der fünfte Fuß ist sehr großes Vasaalglied, welches nach innen falls eine stark gezähnte Platte, eine Schere trägt, nach außen hin aber mit einem Fortsatze versehen ist. Diese fünf Fußpaare nach den vollkommensten Typus von Kraken, dem sie wirklich durch ihre Endglieder Bewegungsglieder sind, während die übrigen die einzigen Werkzeuge bieten, deren sie zum Kauen und Zerkleinern der Beute bedürfen. Die untere Fläche des Bauchbrustschildes ist von Abhängen, welche dem Kopfbrustschild analog gebaut sind. Die falschen Füße aus sechs Gliedern bestehend, von welchen das erste die Schere überträgt und keine Kieme trägt, während die übrigen Paare auf ihrer Hinterfläche die Kieme aus den Kiemenlamellen zeigen.

aben. Unmittelbar hinter diesen Kiemenan der Basis des stachelförmigen Schwanzes keine Eingeweide birgt, der After, Anatomie und Entwickelungsgeschichte dieser sind so viel Eigentümliches dar, daß manche sich geneigt sind, sie als eine besondere Gliederthiere zu betrachten. Es gibt nur eine mit mehreren Arten; die abgebildete an amerikanischen Küsten, die andern an den daher der Name Molukkenkrebs *Limulus* us, Taf. 28, Fig. 27).

Ordnung der Trilobiten (Trilobita).

Die Trilobiten sind eine ausgestorbene Ordnung von Krustern, den ältesten Schichten der Erde massenhaft und bis zur Kohlenzeit sich erhält, nachher durch andere Typen ersetzt wird. Wir haben sie abgebildet, um die Form dieser merkwürdigen Thiere zu zeigen, von welchen offenbar ein Theil der jetzt lebenden Krebsstämme indirect abstammt. Die abgebildete Art findet sich in den unteren Schichten Böhmens. (Trilobit, *Sao hirsuta*, Fig. 28.)

Ordnung der Blattfüßer (Phyllopoda).

Die Blattfüßer, häufig umgewandelt; Malacostraca; Hinterleib sehr entwickelt; blattförmigen Anhängen an den Füßen.

Der Körper dieser Thiere ist bald vollkommen von einem breiten einfachen Schilde, bald von einer dünnen zweiflappigen Schale umgeben; gewöhnlich frei, mit zwei großen, zusammenhängenden, zuweilen auch noch mit einem mittleren, einfachen Auge und zwei Fühlern versehen, die oft seltsame Umgestaltungen der Mund ist stets mit Kiefern oder Kinnladen; hinter ihm stehen die Füße, welche in Reihen gezählter oder behaarter Platten die während des Lebens in beständiger Veränderung. Der Hinterleib ist stets frei, gewöhnlich mit langen, fadenförmigen Anhängen; die Schilde und Schalen, welche bei vielen Arten den Körper bedecken, sind sehr verschiedenartig und hornartig.

Die Familie der Blattfüßer (Apsida) trägt einen großen Anhang von Kiemenfüßen, welche den untern Raum des Schildes ausfüllen, ein großes, einfaches Kopfbrustschild, bald flappige Schale bildet, die dann nur mit wenigen Punkten des Rückens zusammenhängen. Die gewöhnlichen Blattfüßer sind der Körper so sehr verwaschen, daß nur die Augen auf der Fläche hervorstehen. Mundwerkzeuge und Füße man auf der untern Fläche suchen. Die Mundwerkzeuge bestehen aus einer sehr großen, Oberlippe, neben welcher die kurzen, dreiflügeligen Fühler stehen, aus einem Paar starker, gezählter Kiefern und zwei Paar blätteriger, der Hinterleib ist frei und trägt gewöhnlich lange, fadenförmige Anhängen. Die Thiere (Kiefernfüßer, *Apsis canceriformis*, Taf. 9) erscheinen zuweilen plötzlich in süßen Gewässern und verschwinden wieder beim Umrufen derselben, indem sie sich mit ihren Larven in den Schlamm des Bodens eingraben.

Die Familie der Kiemenfüßer (Branchipoda) wird von wenigen, langgestreckten Gattungen gebildet,

deren Körper vollkommen frei und in eine bedeutende Anzahl von Ringen zerfällt ist. Die Augen sind gestielt, die vordern Fühlhörner oft zu hakenförmigen Organen beim Männchen umgewandelt, während die hintern fadenförmig sind. Es finden sich stets ein Paar blattförmiger Kiemenfüße, und bei den Weibchen hinter denselben die eigentümlichen Eierstöcke, die mit starken Muskeln versehen sind, durch deren Zusammenschiebung die Eier beständig hin- und hergeworfen werden. Die Thiere schwimmen wie die der vorigen Familie auf dem Rücken, den Bauch nach oben gehend, und finden sich sowohl in Pfützen als auch in salzigen Wässern, namentlich in den Salzseen, selbst bei einem bedeutenden Grade ihrer Concentration.

Die Familie der Wasserflöhe (Cladocera) (Wasserfloh, *Daphnia pulex*, Taf. 28, Fig. 30) hängt nur mit einem geringen Theile des Rückens mit ihren Schalen zusammen, jedoch Kopf und Leib ziemlich frei sind. Der Kopf trägt ein rundes bewegliches, in einem freien Raum gelegenes, zusammengelegtes Auge, einen schnabelförmigen Mund und zwei Paar Fühlhörner. Die vordern Fühlhörner sind sehr klein, stets unter der Schale geborgen, die hintern dagegen sehr groß, ästig, mit langen Büscheln besetzt und fast das einzige Bewegungsorgan. Der Mund zeigt eine große Oberlippe, starke, hakenförmige Kiefern, horizontale, mit hakenförmigen Dornen besetzte Kinnladen. Die vier vordern Fußpaare sind breit, abgeplattet, mit langen Haaren besetzt und dienen nur als Strudelorgane; das fünfte Paar trägt einen geißelförmigen Fortsatz, der nach oben gerichtet ist und die Eier in der Bruthöhle umfaßt. Der Hinterleib ist kurz, endigt in zwei nach unten gerichteten Fäden und trägt auf der Rückenseite mehrere nach oben gerichtete Warzen, die durch ihre Anlagerung an die Schale einen bedeutenden Raum zwischen dieser und dem Hinterleibe abschließen, der als Bruthöhle dient. Während des Sommers werden in dieser Höhle die Eier nur wenige Tage hindurch ausgebrütet, gegen den Herbst hin aber bildet sich in der Bruthöhle ein eigentümlicher jattelförmiger Apparat von dunkler Farbe, welcher wesentlich aus zwei Klappen besteht, die in ihrem Innern besondere Kapseln enthalten; man hat diesen Apparat das Ephippium genannt. Jede der beiden Kapseln dieses Apparats enthält ein oder mehrere Eier, die bei der letzten Häutung vor dem Herbst mit Klappen und Klappen aus der Bruthöhle ausgestoßen werden. Die Thiere gehen den Winter über zu Grunde; die in den beschriebenen zweiflügeligen Kapseln gelegten Eier aber harrten den Winter hindurch aus und entwickeln sich im nächsten Frühjahr.

Ordnung der Muschelkrebs (Ostracoda).

Eine zweiflügelige, vollkommen schließende Schale mit Schließmuskeln und Andeutung eines Schlosses.

Die Familie der Muschelkrebs (Cyprida) (Muschelkrebs, *Cypris monacha*, Taf. 28, Fig. 31) besitzt zwei Paar Fühler, von welchen die vordern dünn, borstenförmig, nach vorn gerichtet, die hintern breit knieförmig gebogen und mit langen Borsten besetzt sind, jedoch sie als das hauptsächlichste Bewegungsorgan dienen. Diese Fühler tragen lange Borsten und Stacheln und treten an dem untern Schalenrande hervor. Der vorspringende Mund, der in der Mitte zwischen diesem großen Fühlerpaare liegt, zeigt eine Ober- und Unterlippe, ein Paar Kiefern und zwei Paar Kinnladen. An der Basis dieser Mundwerkzeuge finden sich blattförmige Lappen, unter denen die des ersten Kinnladenpaares besonders groß, ringsum mit

Vorsten besetzt und an den Seiten in die Höhe geschlagen sind; sie wurden vorzugsweise als Kiemen betrachtet, sind aber offenbar nur Strudelorgane. Unter dem Leibe findet man zwei Paar Füße; die hintern sind nach unten gestülpt, mit einem Haken bewaffnet, die vordern gabelförmig in die Höhe geschlagen, zur Stütze des dort liegenden Eierstocks. Der Hinterleib endigt in zwei spitze, schwanzartige Stacheln, die nebst dem vordern Fußpaare und den beiden Fühlerpaaren die einzigen Organe sind, welche aus der Schale hervortreten. Die Eier werden in einem eigenen Raume zwischen Schale und Hinterleib gesammelt, aber sehr bald an Wasserpflanzen gelegt. Die im Meere lebenden Gattungen tragen zwei seitliche Augen fast mitten auf dem Rücken, nahe der Mittellinie, die im Süßwasser wohnenden ein aus zwei Hälften zusammengesetztes, vorn am Kopfe gelegenes Auge. Sie finden sich zu Millionen in allen Wassertümpeln.

Ordnung der Krebsfische (Copepoda).

Cephalothorax entwickelt; Bauchfüße zweiflügelig, mit langen Vorsten zum Schwimmen besetzt; laufende Mundtheile.

Der Leib dieser Thiere zeigt gewöhnlich drei deutliche Abtheilungen, eine vordere Kopfbrust, welche die Fühler, Augen und Kausfüße trägt, einen gewöhnlich viergliederigen Leib, mit vier Paaren von Schwimmfüßen ausgerüstet, und einen gegliederten Hinterleib, an dem Ende mit Schwimmborsten versehen und an seiner Basis die Eierstiele tragend. Das vordere Fühlerpaar ist meist lang, borstenförmig, das hintere kleiner, zuweilen rudimentär oder zu einem Schwimmfüße umgewandelt. Die Mundorgane sind zum Kauen eingerichtet und tragen ein Paar hakiger Kiefer und ein oder zwei Paar blattförmiger, mit Vorsten versehener Kinnlappen. Die Kausfüße, deren zwei oder drei Paare vorhanden sind, scheinen stets mit langen Vorsten besetzt und dienen als Strudelorgane, welche durch ihre beständige Bewegung der Unterseite des Körpers frisches Wasser zuführen; die Schwimmfüße sind stets kurz, zweiflügelig und mit langen Vorsten besetzt. Die Sinnesorgane sind durch ein einfaches, aus mehreren gehäufte Kristallkegel zusammengefügtes bewegliches Auge, oder durch zwei einfache, nahe zusammenstehende Augen repräsentirt. Der Darmkanal ist vollkommen gerade, in seinem Verlaufe durchaus gleich weit; das Herz dünn, schlauchförmig, nur vorn und hinten geöffnet; besondere Athmungsorgane sind durchaus unbekannt; wie es scheint, versieht die gesammte Haut des Körpers diese Function. Die Eier werden bis zum Auskriechen der Jungen in langen Säden am Hinterleibe vom Weibchen herumgetragen. (Krebsfisch, *Cyclops viridis*, Taf. 28, Fig. 32.)

Die aus dem Ei auskriechenden Jungen haben, wie diejenigen der Schalenfische, der Walfische und der folgenden Schmarogertrebe und Rankenfische, die gewöhnliche Naupliusform. Die außerordentliche Zahl dieser Thierchen im süßen wie salzigen Wasser hat zur Aufstellung einer ziemlich großen Anzahl von Familien nöthigt, die wir übergehen.

Ordnung der Schmarogertrebe (Siphonostoma).

Mehr oder minder durch Parasitismus umgewandelte Krebsfische, deren Jugendform sie haben, mit laugenden Mundtheilen.

Der Körper dieser Thiere zeigt die seltsamsten Gestalten und außerordentlich vielfache Zwischenstufen von

einer wurmförmigen, veränderlichen, weichen Körpergestalt bis zu einer ziemlich festen Consistenz und einer durchgreifenden Ringelung des ganzen Leibes, an dem sich dann bald zwei Haupttheile, Kopfbrust und Hinterleib, oder sogar drei unterscheiden lassen, indem die Kopfbrust sich mehr oder minder vollständig theilt. In keiner Ordnung lassen sich, so wie hier, die Degradationen der Fühler, der Augen und der Bewegungsorgane in solch ausgedehntem Maße und in der That nachweisen, daß die Entwicklung derselben stets mit der mehr oder minder parasitischen Natur in Verbindung steht. Bei denjenigen Gattungen, die sich zeitlich fixiren, im übrigen aber sich ziemlich freier Bewegungen erfreuen, findet man wohl ausgebildete Schwimmfüße mit langen Vorsten und außerdem noch Saugnapfe oder Klammerfüße zum Anhaften. Bei andern finden sich nur noch wenig bewegliche Klammerfüße, die zuweilen selbst von beiden Seiten der einem Ringe zusammenwachsen, der in das Fleisch des Wirththiers eingelenkt ist. Bei denjenigen Gattungen, die am meisten zurückgefallen sind, sieht man selbst gar keine gegliederten Anhänge mehr, und statt aller Bewegungsorgane nur einige auf Warzen stehende Haken oder weiche Fortsätze am Körperende, mittels deren die unförmlichen Wesen in die Substanz ihres Wirththiers eingegraben sind. Fühler kommen noch bei den meisten dieser Schmaroger vor; gewöhnlich sind sie nur kurz, borstenförmig, zuweilen auch zusammengedrückt und ziemlich platt; Augen fehlen bei den meisten und kommen nur bei den höher stehenden Arten in Form zweier seitlichen, der Mittellinie ziemlich nahe gerückten gehäufte Augen vor.

Die Mundwerkzeuge sind bei allen diesen Thieren nach einem gemeinschaftlichen Plane gebaut, und unterscheiden sich von denen aller andern Krustenthiere dadurch, daß sie nicht zum Kauen, sondern zum Saugen geeignet sind; sie bestehen aus einem meist kurzen, kegelförmigen Saugrüßel, der eine Röhre darstellt, welche aus der Verwundung der Ober- und Unterlippe hervorgegangen ist. In dieser Röhre, die zuweilen ziemlich lang ist und dann wie ein Fernrohr ein- und ausgehoben werden kann, spielen gewöhnlich zwei spitze Stiele, welche zum Anticken der Wirththiere dienen und offenbar die umgewandelten Kiefer sind. Die eigentlichen Kieferfüße sind meist zu Klammerfüßen und sonderbaren Körperanhängen umgewandelt, womit sie sich auf den Füßen, auf welchen sie gewöhnlich schmarogern, festsetzen.

Sämmtliche Schmarogertrebe haben deutlich gezeichnete Geschlechter, und meistens ist sogar die Verschiedenheit der Männchen und Weibchen außerordentlich groß. Die Männchen sind gewöhnlich verhältnißmäßig sehr klein und hängen, wie Schmarogertrebe, während ihres ganzen Lebens an der Geschlechtsöffnung ihrer tiefenhaften Weibchen fest.

Man hat eine große Anzahl von Familien aufgestellt, auf die wir nicht weiter eingehen. Um indessen einigermaßen die Degradation innerhalb dieser Ordnung vor Augen zu führen, bilden wir die schnell schwimmende Art *Karpfenlaus*, (*Argulus foliaceus*, Taf. 29, Fig. 1) ab, welche auf unsern Karpfen und Weichthieren schmarogt, aber noch ausgebildete Schwimmfüße besitzt außer den großen vordern Saugnapfen, womit sie sich festhält; ferner die *Parasitische Laus* (*Achtheres percarum*, Fig. 2), bei welcher ein Fußpaar zu einem Klammerbogen umgewandelt ist, womit sie an den Kiemen der Wirtse selbst festhält, und endlich den *Lauswurm*, (*Lernaea branchialis*, Fig. 3) der sich in den Kiemen des Stodfisches, seines Wirthes, einnistet, mit Ausnahme von einigen Klammerthalen alle Glieder

und eine vollkommen wurmförmige Gestalt hat.

g der Mantelfüßer (*Cirripedia*).

ende, hermaphroditische Kruster ohne und mit zu Manteln umgewandelten

iere, welche dieser höchst abnormen Ordnung, sitzen im erwachsenen Alter stets am Boden, schmaropend auch auf der Haut großer Fische und sind in ein aus mehreren Stücken bestehendes Gehäuse eingeschlossen, das sie beim Verlassen vollständig verschließen können und das ein kaltiges Gefüge hat. Dieses Gehäuse unmittelbar, bald mittels eines beweglichen Stützes und enthält das Thier in solcher Lage, daß die dem gewölbten Theile des Rückens oder der Kopfbrust nach unten gegen die Basis des Gehäuses gewendet ist und der Mund ganz in dasselben verborgen liegt. Die Schale selbst ist so gestaltet, weshalb wir sie erst bei den Familien betrachten werden. Auf ihrer Oberseite wird sie von einem Mantelsacke ausgekleidet, der stark muskulös ist und auf der unteren Seite einen Schlit zeigt, aus welchem die eigenthümlichen Fühlerpaare und der röhrenförmige Fortsatz hervortreten. Die Grundlage des Mantels ist aus Chitinblättern gebildet und die ganze Oberseite des Körpers und die Manteloberfläche sind in ähnlicher Weise gegliedert, wie die Krabben von Zeit zu Zeit ihren Schalenpanzer wechseln, während die Schale selbst niemals der Erneuerung unterworfen ist und mithin ein Gebilde darstellt, welches durch diese Eigenthümlichkeit sich außer dem gemeinsamen Organisationsplans der Krustentiere. Die Bewegungsorgane bestehen aus einem oder mehreren äußerst vielgliederigen, mit Borsten besetzten Fortsätzen, deren sich jeder alsbald in zwei Spalten, sodas auf jeder Seite des Körpers die gegliederte Mantel durch die Mantelspalten können. Die dem Munde zunächst liegenden sind die kleinsten und dienen als Lasten, die weiter entfernten größern werden hauptsächlich zum Ergreifen der Beute und zur Erzeugung des Strömels benutzt, der frisches Wasser in die Mantelhöhle führt. Ein eigentlicher Kopf fehlt durch den Mund liegt in der Tiefe des Mantelschlitzes und ein Paar seitlicher kurzer Kiefer, die auf der Mantelfläche gezähnt sind und zum Kauen ineineinander greifen. Außer diesen Kauwerkzeugen bemerkt man keine Spur von Organen irgendwelcher Art an der Manteloberfläche oder an dem meist runden, beutelförmigen Vorderkörper, der in der Tiefe des Mantelschlitzes verborgen ist. Fühler, Augen u. s. w. fehlen. Die gegliederte Röhre, welche zwischen dem Mantel und dem Mantel als Fortsetzung des Schlitzes zeigt, läßt an ihrem Anfangspunkte den Eindruck an ihrer Spitze des Öffnung des Samensackes wahrnehmen.

Die Mantelfüßer sind Zwitter, in der Weise, daß jedes Individuum männliche und weibliche Geschlechter auf denselben Individuen ausgebildet findet. Die Eierstöcke liegen stets zwischen dem Mantel und dem Mantel, und zwar bei den gestielten Thieren in der Höhle des Fußes selbst, bei den ungestielten zwischen den Lamellen des Mantels als einzelne Stämme.

Die jungen Embryonen verlassen das Ei und die

Mantelhöhle der Mutter in einer Gestalt, welche derjenigen der jungen Krebskrebse so sehr ähnelt, daß kaum ein Unterschied wahrzunehmen ist. Der Körper dieser jungen Thierchen ist birnförmig, nach hinten zugespitzt und trägt in der Nähe des Stirnrandes ein einziges, wohlcharakterisiertes Auge, das später gänzlich verschwindet. Auf der Unterseite des Körpers sieht man drei Paar gegliederte Anhänge, von welchen die ersten, die Fühler, einfach, die beiden andern gegen das Ende hin doppelt getheilt sind. Die schildförmige Haut, welche den Körper bedeckt, geht nach hinten in zwei seitliche, am Leibe liegende Hornfortsätze aus, die sich nach und nach ablösen und in rechtem Winkel absteigen, während zugleich auch der schwanzförmige Anhang sich theilt und die gegliederten Anhänge nach und nach längere Schwimmhaare entwickeln, sodas das Junge nun sehr geschickt in dem Wasser umherschwimmt. Später zeigen die Thierchen eine zweiflügelige Schale und eine Gestalt ähnlich derjenigen der Muscheltiere, und erst nachdem sie diese Stadien durchlaufen haben, setzen sie sich mittels der Antennen fest und nehmen die definitive Gestalt an. Wir bilden, mit Uebergehung der schmaropenden Wurzelkrebse (*Rhizocephala*) und der in Muscheln sich einbohrenden Bauchkrebse (*Abdominalia*), die zwei Hauptformen der Mantelfüßer ab: die Entenmuschel (*Lepas anatifera*) mit zweiflügeliger, aus mehreren Stücken zusammengefügter Schale, die auf langem Stiele steht (Taf. 29, Fig. 4), und die Seepode (*Balanus tintinnabulum*, Fig. 5), die auf Felsen sitzt und eine becherförmige, aus sechs Hauptstücken bestehende Schale hat.

Kreis der Weichtiere.

(Mollusca.)

Ursprünglich symmetrische Thiere, deren Symmetrie aber oft im weiteren Auswachsen sich verliert, ohne inneres oder äußeres Skelet, ohne gegliederte Gliedmaßen, mit fleischigem, aus dem allgemeinen Hautmuskelschlauche differenzirtem Bewegungsorgane, (Fuß), von einer mehr oder minder großen Hautduplikatur (Mantel) eingehüllt, welche meist eine stets aus tohlenfaurem Kalk bestehende Schale absondert. Ausnahmslos findet sich Wimperbewegung, entweder über den ganzen Körper verbreitet, oder nur an einzelnen Oberflächen entwickelt.

Die eigentlichen Weichtiere, aus den Kraken, Schnecken und Muscheln gebildet, lassen sich leicht durch gemeinsame Organisationszüge charakterisiren, während die ihnen nur provisorisch angegeschlossenen Klassen der Armsfüßer, Manteltiere und Moostiere eine sehr abweichende Organisation erkennen lassen.

Die symmetrische Anlagerung der Organe ist bedeutend zurückgeblieben, namentlich häufig im erwachsenen Zustande. Bei vielen Weichtieren zwar erscheinen die äußeren Anhänge des Körpers, die Bewegungsorgane, die Tastwerkzeuge u. s. w. symmetrisch geordnet, allein diese Anordnung ist weit entfernt, im übrigen Körperbau durchzugreifen, und man findet deshalb meist die inneren Organe, besonders die Verdauungs- und Geschlechtswerkzeuge, in höchst unsymmetrischer Lagerung. Bei einer ganzen Klasse, den Bauchfüßlern, zeigt sich die Tendenz, die Ebene, zu deren Seiten die Organe vertheilt sind, spiralförmig auf-

der mannichfaltigsten Form als seitliche Blätter und Schüßeln, als baumartig verzweigte auf und stehende stets in nächster Beziehung zu, dessen ganze Masse meist durch die Gesehler Athemorgane circulirt. Die Lungen sind einfachenbeutelartigen Sacl, auf dessen Äste die Gefäße verzweigt sind.

Die Fortpflanzung geschieht nur auf geschlechtliche Weise; Sprossung und Knospzeugung sind nicht. Die meisten Weichthiere sind getrennten Geschlechtes. Die meisten Schnecken besitzen in der Art, männliche und weibliche Geschlechtsorgane vollständigem Individuum vorhanden sind. Bei zwei Drittel totale Theilung, bei einer partiellen Theilung durchgehen mehr oder minder aufzuerhalten.

Die meisten Weichthiere leben im Wasser, die meisten fast ausschließlich im Meere, und nur die Schnecken besitzen einige Gattungen, welche an Land und in der Erde bewohnen. Aber auch diese Landbewohner sind in gleicher Weise wie die Erdwürmer stets eines Lebens bedürftig und gehen bei vollkommener Trockenheit ein. Sie halten sich deshalb vorzugsweise an feuchten Orten unter Steinen und Kräutern auf.

Die kriechenden Gattungen, welche das süße Wasser bewohnen, lieben besonders flache von Steinen und Wasserpflanzen umgeben, in sich auch in den Sand oder Schlamm einzuweichen und Kalksteine werden vorzugsweise von ihnen angegriffen und durchlöchert. Die Schwimmern bewohnen alle das Meer und mit Ausnahme in offener See angestrichen. Nur ein einziges Beispiel von innerem Leben.

Kopffüßler oder Kraken (Cephalopoda.)

(Tafel 30, Figur 23 bis 30.)

Die Kraken mit wohlgeordnetem Kopf, um den Mund gestellten Fangarmen, wohlorganisirten Augen, mit Kiemen, die Kiemen einschließendem Mantel und aus der Umwandlung des Fußes hervorgegangenen Trichter über der Kiemenöffnung getrennt; Dotter beim Kopffüßler.

Kopffüßler tragen ihren Namen von der eigentlichen Anordnung ihrer verschiedenen Körperteile. Sie bestehen aus einem großen, meist runden oder rundlichen Eingeweidebeutel, auf welchen mehr oder minder deutlichen Einschnürung folgt, der mit gewaltigen, im Kreise gestellten Armen umgeben ist, die eine Art Trichter bilden. In der Mitte der Mund befindet sich. Der Kopf ist von einem beutelförmigen Mantel umgeben, nur auf der Bauchseite nach vorn gerichtet und hier die Zugänge zu der Kiemenhöhle bilden. Die Kiemen durch diese Oeffnungen sieht man röhrenförmige Röhre, durch welche das Wasser, das die Atmung bedient hat, ausgeworfen wird. Der Kopf des Kopfes stehen zwei große, meist vorgezogene, deren Structur hinsichtlich ihrer Form keiner Weise derjenigen der höhern Thiere entspricht. Die Arme selbst, welche um den Kopf herum sind muskulöse Fortsätze, die sowohl zur Nahrung als auch zum Fangen der Beute dienlich sind mit Saugnapfen oder Haken besetzt. Jedes dieser Arme kriechen die Cephalopoden in umgekehrter Stellung umher, theils bedienen sie selbst zur Unterstützung des Schwimmens,

welches vorzugsweise durch die Athembewegung vollbracht wird. Nur wenige der jetzt lebenden Kopffüßler haben eine Schale, die indeß höchst eigenthümlich gebildet ist. Viele besitzen einen innern, in der Rückenwand des Mantels gelegenen Knochen, der oft versteinert erhalten wurde, und keine entbehren aller festeren Theile, da bei allen ein solider, meist aus mehreren Stücken zusammengefügter Kopfschale existirt, in welchem das Gehirn eingeschlossen ist.

Die Haut der Kopffüßler ist meistens derb, lederartig und mit einer zarten Oberhaut versehen, welche nirgends Wimperhaare trägt. In dieser Haut sind eigenthümliche Zellen eingeschlossen, welche eine sehr dehnbare elastische Haut haben und während des Lebens durch in der Haut gelegene Fasern abwechselnd ausgedehnt und zusammengezogen werden. Diese Zellen (Chromatophoren genannt) sind mit blauen, violetten, rothen, gelben oder braunen Farbstoffen gefüllt, die bei der Ausdehnung der Zelle sehr verdünnt und über einen großen Raum ausgebreitet erscheinen und deshalb fast verschwinden, während sie bei der Zusammenziehung der Zelle durch ihre Anhäufung ihre Farbe intensiv vortreten lassen. Jede solche Zelle enthält nur einen Farbstoff; die Zellen verschiedener Farben liegen aber regellos nebeneinander, so daß bei den abwechselnden Zusammenziehungen und Ausdehnungen an einem bestimmten Punkte bald diese, bald jene Farbe hervortritt. Die Kopffüßler zeigen so während ihres Lebens ein herrliches Farbenspiel von blauen, rothen und gelben Tönen, die schillernd über den Körper hinweglaufen und beständig miteinander abwechseln. Es hält dieses Farbenspiel mehrere Stunden nach dem Tode noch an und dient deshalb auf den Märkten der Küsten, wo man die Thiere kauft, zum Zeichen ihrer Frische.

Die äußeren Schalen, welche manche Kopffüßler besitzen, sind nach abweichenden Typen gestaltet und können nicht mit denen der Schnecken verwechselt werden. Sie sind stets im Verhältniß ihrer Größe, dünn und zerbrechlich, lassen aber bei zwei verschiedenen Typen eine sehr verschiedene Structur erkennen. Der eine Typus wird durch das Papierboot (Argonauta) dargestellt, ein Thier, das sich häufig in dem südlischen Mittelmeere findet und ein bootförmiges, sehr leichtes, dünnes, hinten spiralförmig eingerolltes, quer gerichtetes Gehäuse bewohnt, das im Innern keine Scheidewände hat und an dem das Thier so wenig anhängt, daß manche Naturforscher noch bis in die neueste Zeit behaupteten, es halte sich nur als Schmarotzer in dieser Schale auf, die das Werk einer noch unbekannten Schnecke sei. Es werden aber diese Schalen offenbar nicht von dem Mantel des Thiers, welches nirgends damit zusammenhängt, sondern von den beiden regelmäßig ausgebreiteten, hinteren Armen des Thiers gebildet, welche nach unten zurückgeklappt getragen werden und auf ihrer negativ gegitterten Außenfläche die Substanz dieses Gehäuses absondern, die hauptsächlich hornartig ist und die Kalkmasse in kleinen rundlichen Häufen abgelagert enthält. Die Thiere sind, entgegen dem bei den Schnecken geltenden Gesetze, im Ei vollkommen nackt und erhalten diese Schale erst später umgebildet.

Weit wichtiger für uns erscheinen diejenigen Schalen, die nach einem Typus gebaut sind, von welchem das sogenannte Schiffsboot (Nautilus) den Typus bildet. Alle diese Schalen sind gekammert, d. h. durch eine Menge von Scheidewänden in einzelne Abtheilungen zerlegt, welche sich meist in regelmäßigen, vom innern Ende der Schale an allmählich zunehmenden Abständen beim Aufbrechen der Schale

erkennen lassen. Diese Scheidewände sind nie ganz vollständig, sondern an irgend einer Stelle durchbohrt, jedoch bei todtten Schalen jede Kammer mit der andern durch ein Loch der Scheidewand in Verbindung steht. In den meisten Fällen setzt sich das Loch nach hinten zu in eine mehr oder minder lange zapfenförmige Kaltröhre fort, welche besonders in den fossilen, mit Steinmasse erfüllten Schalen deutlich ist und die man den Siphon genannt hat. Bei den todtten Schalen scheint so jede vorübergehende Kammer nach hinten in die folgende geöffnet; untersucht man aber die Sache bei einem lebenden Thiere, so zeigt sich der Siphon durch einen Faserstrang ausgefüllt, der durch alle Kammern hindurchgeht, von dem hintern Theile des Eingeweidesacks entspringt und das Thier an die Schale befestigt. Das Thier bewohnt nur die letzte Kammer, die es mit zunehmendem Wachsthum vergrößert und nach hinten mit einer neuen Scheidewand abschließt; die übrige Schale mit den leeren Kammern dient offenbar als Gegengewicht, als Schwimmblase.

Innere Schalen finden sich bei vielen wenigstens angedeutet, bei andern sehr ausgebildet in der Dide der Haut in eigenen Säcken gelagert und oft von sehr complicirter Structur. Die einen gleichen den gekammerten Schalen der Nautilen (*Spirula*), die andern sind mehr oder minder breite, im Rücken gelagerte Schulpfen, bald nur hornartig (*Loligo*), bald aus Kalkgewebe aufgebaut (*Sepia*). Die höchste Vollendung bieten diese innern Schalen in den fossilen Belemniten.

Außer den verschiedenen Schalenstücken besitzen die Kopffüßer ein besonderes inneres Skelet, welches stets aus Knorpelstücken besteht und hauptsächlich zur Deckung des Gehirns und der Sinnesorgane bestimmt ist. Die Hauptmasse dieses innern Skelets wird von einem Kopfsknorpel gebildet, der rund um den Schlund herumliegt und als ein hohler Ring erscheint. Auf der Rückenseite schließt dieser Ring das Gehirn und die Gehörorgane ein und nach der Seite schied er zwei becherartige Fortsätze aus, welche den innern Theil des Augapfels in ähnlicher Weise umfassen, wie der Fruchtkörper die Eichel. Gestalt und Ausbildung der einzelnen Theile dieses Kopfsknorpels weichen bei den einzelnen Gattungen ziemlich voneinander ab, indem bald der Rückentheil des Hohlringes nicht ganz geschlossen, bald der Bauchtheil mehr entwickelt ist und die Augenbecher dann gänzlich fehlen. Außer diesem Kopfsknorpel, der durch seine Bestimmung vollkommen dem knorpeligen Schädel mancher Wirbelthiere entspricht, findet man nur bei einzelnen Gattungen, bald in der Rücken- oder Bauchseite des Mantels, bald an dem Trichter, bald an der Basis der Arme, vereinzelte Knorpelstücke von geringerer Bedeutung, die besonders zur Herstellung fester Punkte für die Wirkung der Muskeln dienen.

Die Bewegungsorgane der Kopffüßer besitzen sämmtliche Muskeln, die sich in einzelne, wohlgeordnete Bündel trennen lassen und hauptsächlich im Mantel und den Armen entwickelt sind. Der Mantel ist seiner Hauptmasse nach aus Ringfasern gebildet, wodurch besonders die Kiemenhöhle sehr kräftig zusammengezogen und das in ihr befindliche Wasser mit einiger Gewalt herausgepreßt werden kann. Der Trichter, welcher über dem Kiemensack steht und dessen Wandungen ebenfalls sehr fleischig sind und eigene Muskeln besitzen, kann sich ebenso kräftig zusammenziehen. Er scheint aus der Umwandlung des Fußes der Schnecken hervorgegangen zu sein. Auf diesem Apparate beruht hauptsächlich das Schwimmen der Kopffüßer. Sie öffnen die Mantelspalte, welche in die

Kiemenhöhle führt, dehnen diese letztere aus und füllen sie gänzlich mit Wasser; sodann ziehen sie, preßten sie durch Zusammenziehung der Lippen die beiden Lippen der Mantelspalte zusammen, so daß nur die Oefnung des Trichters mit Wasser offen bleibt, und indem sie eine kräftige Zusammenziehung des Mantels durch die enge Oefnung des Trichters in die Arme im Strahle ausströmen, wird der Körper mit einem Ruckprall rückwärts fortbewegt. Die Arme ziehen also alle rückwärts, die hintere Saugnapfgeißel voran, und sie sind meist mit Schwimmern, je spitzer und langgestreckter und je weiter ihre Kiemenhöhle ist. Je weniger werden viele von ihnen unterhalb der seitlichen Hautlappen oder Flossen, welche hinten am Körper in Dreiecksform, bald nach der Mitte zu angebracht sind und offenbar zur Haltung des Körpers in horizontaler Lage bestimmt sind.

Die zwei im Kreise um den Mund gelegenen, doch symmetrisch zu beiden Seiten gelegenen, welche zum Aufklammern, Kriechen, zum Beute bestimmt sind, bestehen aus einem Cylindrer, außen aus Ringmuskeln, innen aus Muskeln gebildet, durch dessen Röhre die Nerven in die Höhe steigen. Es sind zwei verschiedenen Typen gestaltet und auf artiger Weise bewaffnet. Bei den Schnecken sind die Arme in großer Anzahl vorhanden, bestehen aus kurzen geringelten Fäden, welche in die Basis des Arms zurückgezogen werden und außerdem noch büschelweise einen schigen Dedel sich bergen, dessen äußere Spitze es scheint, auch zum Kriechen benutzt wird. Bei den übrigen Kopffüßern sind die Arme faden oder doppelten Reihen von Saugnapfern innern, dem Munde zugewandten. Jeder Saugnapf bildet einen runden, bald unmittelbar, bald mittels eines dicken Stiels auf der innern Armfläche angedrückt. Jeder Saugnapf selbst ist in seiner Wandung einstrahlig gestellten Muskelfasern gebildet. Die Mündung meist mit einer hornigen Spindel, die in der Mitte ein Loch hat, in welches der Wulst des Bechergrundes eingeschieben wird. Stempel nach dem Anpassen des Saugnapfes zurückgezogen werden kann. Jeder Saugnapf dieser Weise einen Schröpfkopf, in welchem Raum in ähnlicher Weise hergestellt wird. Bei vielen Gattungen sind an dem Saugnapfes hornige Zähne entwickelt, und es ist der innere Wulst, welcher aus der Saugnapfes hervorsticht, mit einem hornigen Beise. Dieser Haken entwickelt sich dann während der Ball des Saugnapfes, und es tritt zurück, und es erscheint dann der Arm mit mehreren Reihen von Krallen bewaffnet. Jede Familie sind nicht alle Arme gleichmäßig, sondern zwei derselben sehr lang und die Spitze verbreitert und mit Saugnapfen versehen, während ihre Stiele vollkommen glatt und ohne Krallen die Arme meistens in einer Linie zu beiden Seiten des Kopfes angeordnet gezogen werden.

Das Nervensystem der Kopffüßer ist sehr hohen Grad der Ausbildung. In den Knorpelring eingeschlossen, umgibt es

und und kann hier in zwei Hauptmassen, ein und einen untern Theil, unterschieden werden. Die Mantelmasse, welche etwas unbedeutender ist, nur wenige feine Nerven zu den Mundtheilen, die untere Nervenmasse die beiden Sehnerven, Gehör- und Gehörnerven, sowie sämtliche Nerven Armen, dem Mantel und den Eingeweiden. Die Armnerven erscheinen in ihrer ganzen Länge als einzelne Knoten angeschwollen, deren jeder eine Saugnäpfe entspricht und in diesen feine Nerven fadenförmig verlaufen. Die beiden seitlichen Mantelnerven verlaufen ebenfalls am Eingange der Kiemenhöhle zu dem bedeutenden Ganglion an, das nach allen Seiten ausstrahlen läßt und unmittelbar unter der Haut liegt, so daß man es sehr leicht erkennt, sobald die Kiemenhöhle aufgeschnitten hat. Die Nerven systeme entsprechend, sind die Sinnesorgane ausgebildet. Wenn die mit Saugnäpfen und eckigen Arme vieler Gattungen weniger zum Ergreifen geeignet erscheinen dürften, so haben doch gewisse einziehenden Fäden auf dem Kopfe der Perl- und Tintenfische, für den sie ganz geeignet erscheinen. Die Augen sind bei den meisten Kopffüßlern endlich entwickelt, sie stehen, wie schon erwähnt, an den Seiten des Kopfes, meist mit ihrem Grunde in der Mantelhöhle. Die Verlängerung des Kopftrumpfes ist und zeigen eine äußerst zusammengesetzte, auf die wir hier nicht näher eingehen können. Die Gehörwerkzeuge der Kopffüßler bestehen aus birnförmigen Säcken, welches einen untern, aus einzelnen Kristallen zusammengesetzten, enthält und in zwei runden Höhlen eingelassen ist, die in der untern Hälfte des Kopftrumpfes gehöhlt sind. Außerdem finden sich an der Fläche des Kopfes, neben den Augen, zwei von Hautwülsten umgeben, aus deren Grunde ein weißes Wärmchen erhebt, das offenbar als das Organ eines Riechorgans angesehen werden kann. Da nun außerdem noch in dem Eingange der Mantelhöhle ein fleischiger Vorsprung sich befindet, der bedeutende Nerven erhält und auf seiner Oberfläche zwei weichen Botten besteht, ist, also sicher die Basis einer Zunge hat, so sind die Kopffüßler mit ihren Sinnesorganen ausgestattet, welche auch die höchsten Thiere besitzen.

Die Verdauungsorgane der Kopffüßler beginnen mit dem kreisförmigen, von einer gekrausten Lippe umgebenen Mundöffnung, hinter welcher unmittelbar der muskulöse Schlundkopf angebracht ist, der in der gekrümmten, einem Papageienschnabel nicht unähnlichen, sich befindenden Hornkieseln bewaffnet ist. Diese liegt nicht horizontal, wie bei den Gliedertieren, sondern senkrecht einander gegenüber, und bestehen aus zwei stielartigen Seitenästen, die sich vorn in hakenförmig umgebogenen Spitze vereinigen. Die Seitenäste liegen so ineinander, daß bei dem Schließen der Kiefer der Oberkiefer den Unterkiefer umschließt. Zwischen den Ästen des Unterkiefers liegt die äußerst nervenreiche Zungenwarze. Von dem Mund zum Schlundkopfe, welcher die Bewegungen vermittelt, steigt nun ein dünner Schlund nach hinten in der Eingeweidefalte, wo er zuweilen in eine Erweiterung oder Kropf anschwillt, in andern Fällen bis zu einer Erweiterung bis zu dem breiten muskulösen Magen fortschreitet. Der Magen bildet einen runden, aus welchem der Darmkanal in der Richtung nach hinten hervorgeht und bald nach seinem Austritte in den Blinddarm abgibt, der zuweilen spiralförmig gewunden erscheint. Nach Abgabe dieses Blinddarms tritt der ziemlich enge, dünnhäutige Darmkanal meist

in gerader Linie nach vorn in die Höhe und öffnet sich in dem Grunde des Trichters mit einem meist krausig begrenzten After nach außen. Die Drüsengänge, welche an diesem Darmkanale sich befinden, sind ungemein groß und zahlreich, denn meist sind zwei Paar von Speicheldrüsen entwickelt, wovon das eine am Schlundkopfe, das andere am Kropfe liegt, und außerdem eine Leber, die zuweilen in mehrere Abtheilungen zerfällt und von einer besondern Kapsel umgeben ist.

Die Athmung geschieht bei den Kopffüßlern durch Kiemen, welche in der Mantelhöhle zu beiden Seiten hervortreten und aus krausigen Blättchen bestehen, die mit ihrer Basis angewachsen sind, mit dem gekrausigten Rande aber frei hervorstehen. Bei den gewöhnlichen Kopffüßlern findet sich nur eine Kieme auf jeder Seite, bei den Perlbooten dagegen zwei unmittelbar untereinander, also vier im ganzen. An der Basis einer jeden Kieme liegt ein weiter pulsirender Sack, ein Kiemenherz, welcher das von den Kiemen zurückkehrende Blut, das bläulichgelb oder violett gefärbt ist, in das in der Mitte gelegene Herz treibt. Dieses bildet einen bald runden, bald mehr länglichen Schlauch, von dem aus ein großes Hauptgefäß längs des Magens und Schlundes nach dem Kopfe zu verläuft, das auf seinem Wege Leber, Magen und Schlund und den ganzen Kopf mit Zweigen versieht. Eine kleinere untere Arterie versorgt die übrigen Eingeweide. Das Blut, welches durch diese Gefäße vom Herzen weggetrieben wird, sammelt sich in einzelnen Räumen des Körpers und selbst in der Eingeweidehöhle an und geht dann in rückführende Gefäße über, welche endlich eine große Mittelvene bilden, die neben der Aorta herläuft und sich im Grunde des Eingeweidesacks in zwei seitliche Äste theilt, welche das Blut nach beiden Seiten hin zu den Kiemen führen. Es ist also auch bei diesen Thieren der Kreislauf nicht vollständig geschlossen, sondern statt eines Haargefäßsystems zwischen den Arterien und Venen ein System von Räumen eingeschoben, die, wie es scheint, wandungslos sind und zwischen den Organen sich hinziehen.

Außer den erwähnten Organen besitzen die Kopffüßler noch zwei höchst eigenthümliche Absonderungsorgane, von welchen das eine durch seinen Inhalt so gar für die Verfeinerungen der Wichtigkeit erlangt hat. Die beiden Hohlvenen, welche das Blut nach den Kiemen hinführen, sind mit eigenthümlichen sotten oder schwammigen Knollen besetzt, welche Hohlräume bilden, auf deren Außenfläche die Absonderung geschieht. Die abgesonderte Masse enthält Harnstoff und Harnsäure; es müssen deshalb diese schwammigen Venenkörper gewiß als Nieren angesehen werden. Außerdem liegt aber in einem gemeinschaftlichen Sack mit der Leber ein birnförmiger Beutel, dessen kurzer Ausführungsgang unmittelbar neben dem After in den Trichter mündet und der stets mit einer bräunlich-schwarzen Flüssigkeit erfüllt ist, welche durch den Trichter entleert werden kann und das Wasser in weitem Umfange dunkel färbt. Es findet diese bräunlich-schwarze Masse als Farbstoff, besonders in der Malerei vielfache Anwendung und ist unter dem Namen Sepia bekannt. Bei fossilen Körpern hat man häufig diesen Tintenbeutel mit seinem schwarzen Inhalte vollkommen wohl erhalten gefunden und daraus bedeutende Schlüsse für die räthselhafte Natur mancher Körper entnehmen können.

Alle Kopffüßler sind getrennten Geschlechts und pflanzen sich nur durch befruchtete Eier fort; während aber bei vielen Gattungen dieser Klasse Männchen und Weibchen genau dieselbe Gestalt zeigen und sich erst

durch die Untersuchung ihrer innern Geschlechtstheile oder ihrer Arme voneinander unterscheiden lassen, kommt bei andern Gattungen eine ziemlich bedeutende Verschiedenheit in Form und Größe der Männchen und Weibchen vor. Der Bau der Geschlechtstheile ist folgender: bei den Weibchen findet sich ein einziger, einfacher, rundlicher, im Grunde der Eingeweidehöhle gelegener Eierstock, der von einer derben sehnigen Hülle eingeschlossen ist, welche sich unmittelbar in die Eileiter fortsetzt. In dem Eierstock wachsen die Eier zu einer solchen Größe heran, daß endlich bei den reifen Eiern das ganze Eierstocksgewebe nur noch dünne, häutige, gefäßreiche Kapselfüberzüge über die Eier bildet, welche später platzen und die reifen Eier in den Eileiter übertreten lassen, der entweder einfach oder doppelt ist und gewöhnlich im Grunde des Trichters ausmündet, wo er meist von einer Drüse umgeben ist. Außer dieser Eileiterdrüse kommen bei den meisten Kopffüßlern noch eigenthümliche Nebendrüsen oder Nestdrüsen vor, welche ebenfalls in den Trichter einmünden und wahrscheinlich den Stoff zu den einzelnen Hüllen bilden, von welchen die gelegten Eier umgeben sind. Die Eier selbst nämlich haben meist eine mit negativen, nach innen vorspringenden Falten versehene Dotterhaut und stecken selbst wieder in einer hornigen Schale, die zuweilen schwärzlich gefärbt ist. Viele solcher Eier werden nun von den einzelnen Gattungen wieder in eigenthümlich charakteristischer Weise zu Massen vereinigt. So bilden die gewöhnlichen Tintenfische birnähnliche Flaschen, welche traubenartig zusammengelagert in Meertrüben angeheftet werden und unter dem Namen Meertrauben bekannt sind. Die Kalmare erzeugen lange Stränge, die zusammengelagerte Massen bilden. Die Papierboote spinnt an jedem Ei einen langen Faden aus, den sie mit denen der andern Eier zusammenwickeln und so einen traubenartigen Haufen bilden, welchen sie an ihrer Schale angeheftet mit sich herumtragen.

Die männlichen Geschlechtsorgane sind aus einem einfachen Hohen gebildet, welcher an der Stelle des Eierstocks liegt und aus einer Menge verästelter Drüsenschläuche besteht, die sich in einer mittlern Höhle vereinigen. Die Samenmasse gelangt von hier aus durch einen vielfach gewundenen Samenleiter und eine gewundene Samenblase in einen weiten, mit Längsfalten versehenen Samenfad, die sogenannte Needham'sche Tasche, aus welcher ein schlauchförmiger Ausführungsgang, der in der Mantelhöhle frei hervorstreckt, die Samenmasse nach außen leitet. Diese selbst ist indeß bei den meisten Kopffüßlern in höchst eigenthümlicher Weise gebildet. Die ganze Samenmasse besteht nämlich in der erwähnten Needham'schen Tasche aus eigenthümlichen großen cylindrischen Schläuchen, Spermatophoren oder Samenmaschinen, welche einen sehr sonderbaren Bau haben. Jeder Schlauch stellt ein glashelles Rohr dar, in dessen hinterm Ende eine sehr zarthäutige Blase voll Samenthiere sich befindet, die auf einem meist spiralförmig gedrehten Bande ruht, welches bis an das Vorderende des Schlauchs verläuft und hier von einer eigenthümlichen Masse, einem Schleuderstoffe, umgeben ist, welcher durch Einsaugung von Wasser außerordentlich anschwillt. Sobald diese Samenthierschläuche aus der Needham'schen Tasche, in der sie dicht gedrängt nebeneinanderliegen, in das Wasser kommen, so saugt der glashelle Schlauch Wasser ein, schwillt an seinem Vorderende auf und platzt endlich, wobei die innere Schwellmasse herausgeschleudert wird und an dem spiralförmigen Bande das mit Samenthierchen gefüllte Säckchen aus dem Schlauche herauszieht. Bei allen männlichen Kraken findet sich ein Arm (bei Sepia, Loligo u. f. w., der vierte links,

bei Octopus und andern der dritte rechts) besonders an der Spitze umgewandelt in einen Saugnapf in quergestellter Papille, das Ende lösselförmig ausgehöhlt, in diese Arme hectocotyliert genannt. In manchen nun (Tremoctopus) wird das Ende und bei Argonauta sehr klein und schmal, wird der hectocotylierte Arm außerordentlich verästelt. Er bildet sich in einer Hautkapsel, eine besondere Saugnapf und einen Ventralarm mit langem, peitschenförmigem Anhang, der endlich bei der Begattung, wo er ebenfalls Samenmaschinen wird, los, um in der Zeit der Weibchen noch längere Zeit selbständig. Hier traf man solche losgelöste Arme und hielt sie für Eingeweidewürmer und nannte sie *cotylus*.

Die Entwicklung des Eies beginnt mit der Zerknung an einem Pole, wo sich aus den Zellen die erste Embryonalanlage zusammen bildet. Der Embryonaltheil breitet sich allmählich aus, die einzelnen Zellen legen sich zusammen und scheinen nun nach und nach die verschiedenen Theile des Embryos, zuerst in der Form des Eizyklus, dann in der Lagerung, daß der Kopftheil des Embryos dem Dotter zugewendet, das hintere Bauchende von ihm abgewendet erscheint. Dieser auch vor den übrigen Theilen ist zu Anfangs sitzt der Embryo gleichsam wie auf einer Scheibe auf dem Dotter auf, der ziemlich groß ist, dann hebt er sich mehr auf, die Eingeweidefalte erhält allmählich seine ursprüngliche Gestalt. Eine vom Embryo ausgehende und umwächst allmählich den Dotter und bildet einen Dotterfackel. Während der Dotter umwächst wird und der Embryo stets mehr aus sich auswächst, bleibt die gegenseitige Lagerung der Theile stets dieselbe. Der Embryo an seinen nun hervorsprossenden Armen den Seiten seinem Kopfe gegenüberliegt. Der Dotterfackel seiner Zeit des Embryonallebens mit irgendeiner des Darmkanals in Verbindung; er bildet sich für sich abgeschlossenen Sack, dessen Stiel in dem Munde in die Leibeshöhle eindringt.

Die Entwicklung der einzelnen Kraken großer Genauigkeit verfolgt worden. Der Mantel in der Mitte, als ein flacher Sack, dessen beiden Seiten die später zusammengefallenen des Trichters und nach vorn als zwei schmale Wülste sich erkennen lassen, sich nun der Mantel vom Dotter abhebt, naheinander die verschiedenen Paare der Kiemen, unbedeutende Höcker, Mund und Fühler gegenüberstehenden Stellen noch auf dem Dotter ausliegend, die Kiemen mit ihren Stielen und dem dazwischenliegenden Vortragsberg, zugleich vom Embryo ausgehende Umbildungstheile denselben mehr und mehr umschließt. Jetzt ist jetzt noch immer vier- bis fünfmal kleiner. Der Dotter, flimmert auf seiner ganzen Oberfläche dreht sich bei denjenigen Gattungen, bei denen ein Weib und ein kleiner Dotter vorhanden ist, er bei den andern weder Kraft noch die diese Umbildungen zu bewirken. Alle diese gane bilden sich nun mehr und mehr namentlich der Bauchtheil des Embryos in Mischverhältnissen gegen den Kopf aus, der Dotter allmählich ganz schwindet.

Alle Kraken leben im Meere und sind Raubthiere, die sich vorzugsweise von Fischen

wieder besonders von Mollusken gegast. Die Votische scheinen nur von Cephalopoden. Die Arten mit sackförmigem Körper leben an den Küsten, die Kalmare (Votigen) gestrecktem Körper häufig auf offener See. Die meisten Arten, von welchen von Zeit zu Zeit nur in der Nähe des Landes kommt, wie erst bei Boston, Arten, die Arme von 30 Fänge haben. Man benutzt besonders die Kalmare als Speise, den Farbstoff des Tintenfisches Farbe (Sepia) und die Schulpfen als fast kohlensauren Kalk (Os sepiae).

Die Kraken sind nur die letzten Repräsentanten außerordentlich zahlreichen Reihe von Tintenfischen, welche von den ältesten Zeiten der Erde existieren.

Ordnung der Zweikiemer (Dibranchiata).

Riemen in der Mantelhöhle; acht Arme, zu welchen bei einigen zwei verschieden gestaltete längere kommen, mit Saugnäpfen oder Haken; ganzer Trichter und Tintenbeutel; große Augen.

Außer der Schiffboote, begreift diese Ordnung jetzt lebenden Kraken in sich.

Decapoda. Achtarmige Kraken.

Meist gleich gebaute und in ihrer Länge wenig verschiedene Arme umstehen den Mund und sind mit Saugnäpfen ohne Hornring in doppelten oder dreifachen Reihen versehen. Die Arme sind an ihrer Basis durch eine Verbindungshaut miteinander zusammengeheftet, die zuweilen fast bis zur Spitze reicht. Die Augen sind verhältnismäßig kleiner als bei den Votischen und können durch ein rundes Augenlid geschlossen werden. Der Körper ist sackförmig oder beutelförmig und hat keine innere Kalkschale, meist auch keine Flossen. Sie sind Kalkschalen.

Die der Pulpen (Octopoda). Der Mantel hat keinen Schließapparat und ist in der Mitte durch einen Muskel an den Eingeweiden befestigt. Bei den Männchen nur hectocotylistische (vierte Paar), die sich niemals lösen. Die an allen europäischen Küsten häufigen (Octopus), die der fabelhaften Pleure zu liegen, mit zwei Reihen von Saugnäpfen auf langen Armen; der besonders im Mittelmeer vorkommende Moschuspulpe (Eledone moschata, Fig. 23), mit nur einer Reihe von Saugnäpfen; das unheimliche Geruch, und die abweichenden Circus im Nordmeere, wo die Verbindungshaut die Spitze der Arme geht, so daß dieser Apparat als Schirm darstellt, mit innerer Schale und seitlichen Flossen.

Die der Armpulpen (Phionexida). Mantel hat Schließapparat, Mantel nicht an dem Eingeweiden befestigt, Wasserporen am Kopfe. Bei den rechten oder linken Seite löst sich beim Einatmen, das zuweilen verkrüppelt ist, als wahrer Mantel aus. Meist gute Schwimmer. Hierher gehören einige kleinen, den gewöhnlichen Pulpen ähnlichen Gattungen (Phionexis, Tremoctopus), das Argonauta (Argonauta argo, Fig. 25). Die Männchen sind sehr klein, verkrüppelt, schalenlos, den kleinen Pulpen bis auf den Hectocotylistischen; bei den Weibchen ist der Körper in einer Kalkschale, wenig gebogenen Schale eingeschlossen,

welche von der äußeren Fläche der Arme abgeheftet wird, wovon zwei zu diesem Endzweck flügelartig erweitert sind und die Schale umklammern. Das Thier gebraucht indeß die Arme nicht wie Segel, wie man oft erzählt hat, um auf der Oberfläche des Wassers einherzuschiffen, sondern es schwimmt ganz wie andere Kopffüßler durch Einziehen von Wasser und Ausstoßen desselben aus dem Trichter.

Decapoda. Zehnarmige Kraken.

Der meist längliche Körper trägt am Munde zwei horizontal gestellte, mehr oder minder ausgebildete Hautflossen; Trichter und Mantelrand besitzen einen sehr ausgebildeten Schließapparat; außer acht gleich langen, aber meist kurzen Armen existieren noch zwei lange, in besondere Scheiden zurückziehbare Fingerringe, die erst gegen das Ende hin verbreitert und mit Saugnäpfen oder Haken versehen und zwischen das dritte und vierte Fußpaar gestellt sind; die Saugnäpfe sind gestielt und mit Hornringen versehen; die Augen sehr groß, ohne kreisförmiges Augenlid; meist ist eine innere Schale vorhanden. Zu dieser Gruppe gehören die Thiere, von welchen die unter den Namen der Belemniten oder Donnerkeile bekannten Versteinerungen stammen.

Außer den in südlichen Meeren vorkommenden Posthornkraken (Spirulida), deren Schale derjenigen der Schiffboote insofern ähnelt, als sie gekammert ist, und den auf hoher See vorkommenden langgestreckten Lochaugen (Oigopsida), bei welchen die Hornhaut des Auges weit durchbohrt und die Linse unbedeckt ist, erwähnen wir besonders der Tintenfische (Sepida), deren Körper bald mehr langgestreckt ist, wie bei den Kalmaren (Loligo), bald breiter mit ganzrandiger Flosse, wie bei der abgebildeten Art (Tintenfisch, Sepia officinalis, Taf. 30, Fig. 24), die besonders häufig im Mittelmeere vorkommt und einen gewaltig großen Tintenbeutel besitzt, welcher die Grundlage der bekannten Farbe bildet. Die Schale dient gewöhnlich als neutralisirendes Mittel z. B. bei Magensäure, und zum Abschleifen feiner Gegenstände.

Ordnung der Vierkiemer (Tetrabranchiata).

Vier Riemen; die Arme in zahlreiche, zurückziehbare Tentakeln aufgelöst; der Trichter gespalten; eine vielsamige Schale; kein Tintenbeutel.

Die letzte Kammer der Schale dient den Thieren allein zur Wohnung. Bei zunehmendem Wachsthum vergrößert dieses seine Schale nach vorn, läßt aber zugleich nach hinten eine Strecke der Schale, welche ihm zu eng geworden ist, frei und bildet sich eine neue Scheidewand, welche die Wohnkammer nach hinten abschließt. Die Structur dieser Scheidewände selbst ist sehr mannichfaltig. Bei den lebenden Schiffbooten, und der ganzen Familie der Schiffboote (Nautilida) überhaupt, sind diese Scheidewände einfach ausgeschweift und ihre Convergenz nach hinten, ihre hohle Seite nach der Mündung der Schale hin gerichtet. Bei den geraden Schalen, welche besonders in den Uebergangsgebirgen vorkommen, gleicht deshalb das ganze Gehäuse einer Reihe aufeinandergefügter Unterabtheilungen von Tassen, die allmählich an Größe zunehmen. Bei der gänzlich ausgestorbenen Familie der Ammoniten (Ammonitida) dagegen sind die Ränder der Scheidewände mehr oder minder eingebogen und oft vielfältig ausgezackt, so daß man an den versteinerten Schalen, wo meistens die dünne Schale fehlt und nur der Steinkern vorhanden ist, diese Scheidewände als

mannichfach verzweigte Figuren auf der Außenfläche erblüht.

Eine zweite Eigenthümlichkeit dieser gekammerten Schalen ist, wie schon oben bemerkt, die Existenz eines Siphos, einer mehr oder minder unterbrochenen Röhre, welche durch alle Kammern der Schale sich fortsetzt, oft aber auch nur aus einzelnen Löchern besteht, welche die Scheidewände an correspondirenden Stellen durchbohren. Durch diese Röhre oder durch die entsprechenden Löcher erstreckt sich ein fehniger Strang, welcher das Thier an der Schale befestigt. Bei dem lebenden Schiffsboot, sowie bei den fossilen verwandten Gattungen liegt der Siphos in der Mitte, bei andern oft ganz an dem äußern oder innern Rande der Schale.

Der Kopffühler selbst, welcher diese Schalen bewohnt, hat eine kurze cylindrische Gestalt und ist größtentheils von seinem sackförmigen Mantel eingeschlossen, der sich überall genau an den letzten Kammern der Schale anlegt. (Schiffsboot, *Nautilus pompilius*, Taf. 30, Fig. 26. Die Zeichnung ist in der Weise gemacht, daß man die Schale im Querschnitt und das in der Wohnkammer befindliche Thier von der rechten Seite in unverletztem Zustande sieht.)

Das Thier liegt so in dieser Kammer, daß seine Rücken- oder Spindel-, seine Bauchseite dem äußern Rande der Schale zugekehrt ist. Der Mantel bildet nach hinten einen Fortsatz, welcher auf der Windung der Schale aufliegt, und zeigt auf der Rückseite einen breiten, dreieckigen Flügelappen, welcher theils zum Schluß der Schale, theils auch zum Kriechen zu dienen scheint. Auf der Bauchseite liegt der der Länge nach gefaltene Trichter, und zwischen ihm und dem sogenannten Fuße eine Menge von Armen, welche keine Saugnapfe tragen, sondern schwach geringelt sind und in eine Scheide zurückgezogen werden können. Zwischen diesen Füßklappen liegt der mit zwei hornigen Kiefern bewaffnete Mund, und unter ihnen auf jeder Seite ein großes gestieltes Auge. Außer vielen andern Eigenthümlichkeiten in der Anatomie dieses Thiers zeigt sich besonders die, daß auf jeder Seite zwei Kiemen vorhanden sind, welche ein einziges Arterienberg speisen, und daß der Tintenbeutel, welcher die übrigen Kopffühler so auszeichnet, hier gänzlich fehlt.

Wir theilen die Ordnung der Vierkiemer in zwei Familien. Diejenige der Schiffsboote (*Nautilida*) besitzt eine einfache ausgeschwifene, höchstens S-förmig oder in einfachem Zickzack gebogene Scheidewände und sehr verschieden aufgerollte Schalen. Sie sehen sich von den ältesten Schichten an bis in die neueste Zeit fort, wo der einzige Repräsentant in der Südsee meist nur auf hohem Meere vorkommt. Die leeren Kammern der Schale, welche bei allen diesen Thieren sehr dünn war, dienen offenbar wie eine feste Schwimmblase, zur Erleichterung des specifischen Gewichts des Thiers. In den ältesten Schichten kommen *Nautiliden* vor, welche vollkommen gerade sind und keine Spur von Aufrollung zeigen, während andere die selbstsamsten, abnormen Formen verschiedener Windung erkennen lassen.

Die Familie der Ammonshörner (*Ammonitida*) unterscheidet sich von der vorigen durch eingebogene und gezackte Scheidewände, welche entweder in Zickzacklinien geknickt oder gänzlich ausgezackt und sogar wie eine Krone gefaltet erscheinen. Der Siphos liegt bei ihnen stets an dem Außenrande der Schale, während er bei der Familie der Schiffsboote in der Mitte oder dem Innenrande nahe liegt. Die Ammonshörner sind gänzlich ausgestorben, kommen dagegen in den ältern Schichten außerordentlich zahlreich vor und zeigen gewissermaßen eine umgekehrte Geschichte wie die Schiffs-

boote. Die ältesten Ammonshörner sind alle in einer Ebene gewunden (Humphresianus aus dem Jura, von vorn; Taf. 30, Fig. 27), während selbst alle jene Formen von geraden halbgezwundenen, halbförmig gebogenen, *Ceras Matheronianus* aus der Kreide, Schalen vorfinden, welche bei den ältesten Geschichten sich zeigten und sogar förmig gewundene Formen (*Turrillites* der Kreide; Fig. 30) vorfinden. Ammoniten Formen der Aufrollung, sowie der Scheidewände verschiedene große Schichten, und es ist hier allerdings merkwürdig, daß bei vielen im Muschelkalk vorkommenden Ammonshörnern, welche sich in der Kreide, ungezackte Scheidewände haben (z. B. *Ceratites nodosus* aus dem Muschelkalk; Fig. 28) mit hinten ausgebogenen Lappen der Schale versehen sind, die oben genannt hat, gezackte Lappen gerichtet (die Sättel) hingegen glatt sind, bei denjenigen Gattungen, welche vom Jura aufwärts in den Schichten des Jura gefunden werden, alle Ausbiegungen der Sättel und Loben durchaus gezackelt sind.

Klasse der Vanchfüßer oder Schnecken (*Gastropoda*) (Tafel 30, Figur 31 bis 40 und Tafel 31, Figur 1 bis 10)

Bilateral symmetrische Weichthiere, häufig spirallig aufrollen und die ursprüngliche Symmetrie verlieren. Die meisten deutlich getrennt und dann die Fühler tragend. Eine fleischige, auf der Bauchseite entwickelte Muskeleinlage dient als Bewegungsorgan. In der Regel stets eine Schale, welche aber im Laufe der Zeit abgeworfen wird; einisch gekammert oder der Länge nach gespalten. Mantel zusammenhängend, in zwei Spalten.

Die Haut der Schnecken ist im allgemeinen leberartig und mit einer schlüpfrigen Oberhaut bedeckt, welche besonders an den zur Bewegung dienenden Stellen mit Wimperhaaren besetzt ist. In einigen im Meer lebenden Schnecken ist die Haut so derb und festig, daß sie der Verwundung entbehrt dann auch jener Schleimhaut, welche bei den übrigen in so reichem Maße vorkommt. Die meisten Schnecken bilden die den Körper umschließende Haut eine Falte im Nacken, welche durch Zurückziehen des Körpers wie eine Kanne aus dem Kopf weggeschoben werden kann, vor dem die Haut zusammenfällt. Meistens finden sich in der Haut, welche durch diese Kapuze gebildet wird, die Organe, sowie die Dessignen der Geschlechts- und des Verdauungsapparats. Man hat eine Falte, welche diese Höhlung bildet, in die sich zurückziehen kann, den Mantel genannt, es hat ist es auch diese Falte und besonders die stige Rand derselben, der Mantelflamme, die Kalkschale absondert, die bei den meisten Schnecken Thier einschließt. Es befinden sich nämlich in der Mantelflamme eine Menge kleine, schlauchförmige, in fast senkrechter Stellung, in der Drüsenzellen sich ein feinstörniger Kalkabsondet, der zum Weiterbau der Schale dient.

Die Schale besteht aus Schichten von sogenannter Perlmuttersubstanz, auf welcher sich oft noch eine harte, rissige Außenschicht ablagert.

Die Gestalt der Schalen ist schon um deswillen äußerst wichtig, weil man zur Bestimmung der verteinerten Reste sich nur an diese halten kann. Man hat deshalb beßers der Beschreibung gewisse Kunstausdrücke angenommen, deren Kenntniß nöthig ist.

Zust alle Schnecken kommen aus dem Ei mit einer dünnen, hornartigen Schale, welche die Gestalt eines Napfes oder einer Freiheitsschnecke hat. Indem nun das Thier weiter wächst und eine Seite über die andere ein gewisses Uebergewicht erhält, entsteht eine spiralförmige Drehung des Körpers, an welcher die feste Kalkröhre, welche das Thier umfließt, ebenfalls Antheil nimmt. Die Schale erscheint also bei den meisten Schnecken spiralförmig gewunden, und da das Thier stets wächst und an Umfang zunimmt, so sind die letzten Windungen der Schale weiter als die vorhergehenden, die oft gänzlich von der letzten Windung verdeckt und eingeschlossen werden. Zuweilen erfolgt diese Windung der Schalenröhre in derselben Ebene, so daß das Gehäuse ganz flach erscheint und in der Mitte als Anfangspunkt der ganzen Schneckenwindung die ursprüngliche, aus dem Ei mitgebrachte Schale erscheint. Die gewöhnlichen Fellerschnecken (Planorbis), welche man so häufig in allen unsern Bächen findet, liefern von dieser Anordnung ein leicht zugängliches Beispiel. In den meisten Fällen aber ist die Spirallinie um eine Achse in die Höhe gewunden und bildet so eine wahrhafte Schnecken- und Schraubenlinie; je nachdem die Form des Gehäuses hierdurch modificirt wird, nennt man dieses kreisförmig, thurm-, spindelförmig u. s. w. Bei diesen schneckenartig gewundenen Schalen entsteht durch die Aneinanderlagerung der innern Seite eine Achse im Innern des Gewindeg, welche man die Spindel (columnella) nennt und die man beim Aufbrechen einer Schale, z. B. einer Weinbergsschnecke, deutlich im Innern als eine Säule gewahrt, um welche die Windungen sich herumziehen. Meistens legen sich die innern Seiten der Röhre nicht ganz vollkommen aneinander, so daß, wenn auch eine Spindel gebildet wird, diese dennoch im Innern hohl ist und diese Höhlung sich mit einer Mündung nach außen öffnet. Man nennt diese Mündung den Nabel (umbilicus). Verfähren sich die einzelnen Windungen der Schale gar nicht, wie z. B. bei den Wendeltropfen, so ist begreiflicherweise dieser Nabel verhältnißmäßig sehr weit, aber diese Weite nimmt um so mehr ab, je fester die Spindel selbst wird. So hat z. B. die gewöhnliche Weinbergsschnecke einen kaum merkbaren Nabel, der noch dazu von dem umgeschlagenen Mundsaume des Gehäuses fast gänzlich überdeckt wird. Die Öffnung, durch welche das Thier aus der Schale hervorsteht, heißt die Mündung oder Mundöffnung (apertura); und man kann an derselben stets zwei Ränder unterscheiden, den äußeren oder Lippenrand (labrum), welcher die Convergenz der Schale bildet, und den innern oder Spindelrand (labium), welcher der Achse des Gehäuses zugewandt ist. Meist sind diese beiden Ränder scharf voneinander getrennt, indem die Öffnung mehr oder weniger länglich oder selbst spaltenartig erscheint, welches letztere namentlich dann der Fall ist, wenn, wie bei den Kegels- oder Porzellanschnecken, die letzte Windung die vorherigen einschließt, so daß diese kaum oder gar nicht sichtbar sind. Gehäuse dieser Art hat man eingerollte Schalen genannt. In manchen Fällen indeß, wie namentlich bei den Kreischnecken, verschmelzen beide Ränder vollständig zu einer fast runden Öffnung, und

man sagt dann, daß das Gehäuse einen ganzen Mundsaum (peristomium) besitze. Bei vielen Schnecken ist der Mundsaum, und namentlich der äußere Lippenrand schwierig, verdeckt, mit Falten und Vorsprüngen versehen, die dann beim periodischen Wachsen als Leisten und Vorsprünge oder Wülste auf der Schale zurückbleiben. Es gibt namentlich einige Kreischnecken, welche von Zeit zu Zeit sich einen sehr stark wulstigen Mundsaum bilden, der dann als Ring auf den Windungen sich darstellt.

Bei den Bauchfüßern ist das wesentlichste Bewegungsorgan eine fleischige Sohle, der Fuß, welcher mit vielfach sich durchkreuzenden Fasern durchwebt und auf der Bauchseite des Thiers angebracht ist. Mittels dieses Fußes gleiten die Bauchfüßer auf den glattesten Flächen nach allen Richtungen hin, und wissen ihn auch meistens zum Schwimmen an der Oberfläche des Wassers zu gebrauchen. Durch Aushöhlung seiner Unterfläche, nachdem sie ihn vorher fest angegründet haben, können sie auch diesen Fuß zum festen Anheften beugen, und namentlich die Arten mit napfförmigen Schalen besitzen diese Fähigkeit in so hohem Grade, daß man vergebens versuchen würde, ein Seeohr oder eine Schüsselchnecke mit den bloßen Händen vom Felsen loszureißen. Beim Zurückziehen der Schnecke dient der Fuß meistens dazu, die Mündung des Gehäuses zu verstopfen, und zu diesem Endzweck ist häufig an seinem hintern Ende ein eigener Dedel (operculum) angebracht, welcher in die Öffnung des Gehäuses paßt und dieselbe vollständig verschließt. Dieser beständig vorhandene Dedel, welcher wesentlich mit zur Charakteristik der einzelnen Gattungen dient, hat bald eine hornige, bald eine kalkige Beschaffenheit und ist stets aus concentrischen Schichten gebildet, welche zuweilen sogar ebenfalls eine spiralförmige Anordnung haben. Nicht zu verwechseln mit diesem permanenten Dedel sind diejenigen vorübergehenden, aus unregelmäßiger Kalkmasse gebildeten Dedel, womit unsere Landschnecken im Winter ihr Gehäuse schließen und die mit dem Beginne des Frühjahrs beim Aufhören des Winterschlafs von ihnen selbst wieder abgestoßen werden. Gestalt und Ausbildung des Fußes sind außerordentlich verschieden und können als gute Unterscheidungszeichen benutzt werden; genauer betrachtet ist derselbe nur eine bedeutendere locale Entwidlung der Hautmuskelschicht, welche überall am ganzen Körper der Schnecken sich vorfindet und die auch namentlich die Mantelschale sowie die übrigen Theile des Körpers so äußerst contractil macht.

Das Nervensystem der Schnecken variirt in seiner speciellern Anordnung ungemein, bleibt sich aber darin gleich, daß stets ein Schlundring entwidelt ist, mit welchem verschiedene, in dem Körper zerstreute Ganglien in Verbindung stehen. Bei allen Schnecken, welche einen deutlichen, mit Augen und Fühlern versehenen Kopf besitzen, sind an diesem Schlundringe zwei obere, dicht aneinandergedrängte, oft in mehrere Abtheilungen getrennte, zuweilen aber auch zu einem einzigen Knoten verschmolzene Ganglien zu erkennen, welche man als Gehirn bezeichnen kann. Die untern Knoten, welche den Schlundring completiren, sowie die Verbindungsstränge zwischen den beiden Häften zeigen eine besonders große Mannichfaltigkeit in Größe und Anordnung. Bei den Kiessfüßern sind die Verbindungsstränge ähnlich wie bei den Muscheln sehr lang und die untern Knoten sehr weit nach hinten gerückt. Bei denjenigen Schnecken hingegen, wo Augen und Fühler fehlen, sind hauptsächlich nur die untern Knoten entwidelt und die obern durch einen einfachen Verbindungsstrang ersetzt, während bei manchen Arten,

wo der Fuß nur geringe Entwicklung zeigt, die untern Knoten rudimentär werden. Von den Gehirnganglien werden besonders die Sinnes- und Mundorgane, von den untern oder Fußganglien die Haut und der Fuß sowie einzelne Eingeweide versorgt. Alle Nerven entspringen aus den Ganglien selbst, niemals aus den Verbindungssträngen derselben, und außerdem findet sich noch ein aus äußerst dünnen Nerven und Knötchen zusammengefügtes Eingeweidenervensystem, welches indeß bei den meisten Gattungen sich schwer verfolgen läßt und namentlich die Verdauungsorgane sowie die Geschlechtsheile mit feinen Fäden versorgt.

Sinnesorgane sind bei den meisten Schnecken vorhanden. Besondere Taster oder Fühler sitzen fast bei allen an dem Kopfe und können meist willkürlich aus- und eingezogen werden. Es haben diese Fühlerhöcker oder Tentakel die verschiedensten Gestalten, bald wie ein feiner Faden, bald wie eine Röhre, die sich wie ein Handschuhfinger aus- und einfüllt, bald wie ein zugespitztes oder eingerolltes Blatt oder wie eine breite Blatte, die durch Verschmelzung der beiden Fühler im Nacken entsteht. Meist kommt nur ein Paar solcher Fühler vor. Nur unsere Landschnecken und einige Faden- und Schnecken haben zuweilen zwei Paar. Die Tastnerven, welche in diese Organe treten, sind verhältnismäßig sehr dick und das Gefühl in den Organen äußerst fein. Außer ihnen dienen noch öfters besondere Mundklappen und weiche Lippen um den Mund den Schnecken zum Tasten.

Augen sind fast überall vorhanden, und zwar stets nur in der Zahl von zweien. Nur der niedersten Ordnung, den Stoffsenkern und einigen wenigen Bauchfüßern, fehlen die Seborgane. Es sitzen dieselben entweder im Nacken oder an verschiedenen Stellen der Fühler, bald an dem Grunde, wie bei unsern Teichschnecken, bald in der halben Länge, bald auch an dem vordersten Ende der Fühler, wie bei unsern Gartenschnecken. Jeder Augapfel ist von einer festen Haut umgeben, welche nach vorn durchsichtig und bis zu dieser durchsichtigen gewölbten Stelle innen mit dunkeln Farbstoffe ausgekleidet ist. Der Sehnerv durchbohrt von hinten her die äußere Augenhaut und breitet sich auf der innern Fläche derselben zu einer Netzhaut aus, deren Höhlung von einem Glaskörper und einer Linse erfüllt wird. Die Sehnerven sind meist ziemlich voluminös, fehlen aber bei manchen Schnecken fast ganz, so daß die Augen dem Gehirn unmittelbar aufliegen.

Gehörorgane kommen wol allen Schnecken ohne Ausnahme zu, und trotz der niedrigen Stufe ihrer Entwicklung scheinen sie von großer Bedeutung für die Oekonomie der Thiere, da sie bei den Embryonen sehr früh erscheinen. Sie sitzen meist unmittelbar auf dem Gehirne auf oder zeigen nur einen kurzen Hörnerven, welcher nur bei einigen wenigen Kielfühlern bedeutend verlängert ist. Es bestehen diese Gehörorgane nur aus einer runden oder länglichen Kapsel, in welcher entweder ein kugelförmiger oder viele kristallinische Gehörsteinchen liegen, welche durch Wimpern in steter zitternder und wälzender Bewegung gehalten werden.

Die Verdauungswerkzeuge sind bei den meisten Schnecken in weit höherm Grade entwickelt als bei den Muscheln, und besonders zeichnen sich sehr viele durch eine starke Bewaffnung des Mundbeingangs aus. Bei den meisten Schnecken findet sich ein mittlerer, in die Vede der Mundhöhle eingefenkter Kiefer, dessen Muskeln mit denen der Zunge einen starken fleischigen Schlundtopf bilden, welcher meist unmittelbar hinter der Mundöffnung liegt und sehr oft, besonders bei Meeresschnecken, selbst an einem mehr oder minder langen hervorstreckbaren Rüssel angebracht ist. Zuweilen

ist der Kiefer in zwei seitliche oder auch in drei Stüde, ein mittleres und zwei seitliche, zerfallen. Gewöhnlich stellt er sich als ein halbmondförmiges, mit Leisten und Vorsprüngen versehenes hartes Blatt dar, gegen welches die Zunge (Radula) gerieben werden kann. Diese besteht meistens aus einer riemenförmigen, sehr beweglichen, mit langen Muskeln versehenen Hautleiste, welche zuweilen viel länger als der Körper ist und in einer eigenen Tasche vor oder neben dem Schlundtopfe eingerollt liegt. Diese Zunge, welche ein eigentliches Greiß- und Schöpforgan ist, kann meist aus dem Munde hervorgeküpft und zum Fassen und Zermahlen der Beute benutzt werden. Zu diesem Endzweck ist sie auf ihrer Außenseite entweder mit queren gezähnelten Platten, deren Zähne in Längsreihen stehen, oder mit Reihen langer und spitzer Zähne versehen, welche zum Anspießen und Zerreiben der Beute dienen. Viele Schnecken nähren sich von Polypen, und diese trafen meist mittels der stacheligen Zunge die Polypenstöcke förmlich ab; andere bohren Schnecken und Muscheltiere mittels ihrer scharfen Kiefer an und fressen sie aus. Die wenigsten nur ernähren sich von Pflanzenstoffen, welche sie mit Zunge und Kiefer zernagen. Die meisten sind nächtliche Thiere, welche tagsüber still sitzen und nur nachts ihrem Raube nachgehen.

Der Darmkanal, in welchen sich die so stark bewaffnete Mundhöhle fortsetzt, ist meistens sehr einfach gebildet. Eine mehr oder minder lange Speiseröhre, die meist mit Längsfalten ausgekleidet ist, führt in einen Magen, der gewöhnlich dünnwandig, bei einigen Gattungen aber sogar auf seiner innern Seite mit harten Leisten oder selbst hornigen Zähnen besetzt ist. Von hier aus windet sich ein sehr dünnwandiger Darm durch die Massen der Eingeweide, besonders der Leber, hindurch und öfnet sich meist an der rechten Seite des Körpers in der Nähe der Athemwerkzeuge. Die Stellung des Afteres wechselt ganz außerordentlich. Meistens liegt er vorn auf der rechten Seite, oft unmittelbar hinter dem rechten Fühler, bei anderen liegt er links, noch bei andern auf der Rücken- oder Bauchfläche, bald weiter hinten, bald näher am Kopfe. Speicheldrüsen, welche in den Schlundtopf und Zungenfad münden, fehlen fast keiner Schnecke, eben so wenig die Leberorgane, welche freilich zuweilen eigenthümlich entwickelt sind, indem der Darm eine Menge oft verzweigter Blindsäde bildet, die zugleich Leberzschläuche darstellen.

Eigentliche Athemorgane fehlen nur den wenigsten Schnecken, wo dann einzelne Stellen der Haut die Function derselben übernehmen. Im übrigen sind die Athemorgane dem Aufenthalte der Thiere entsprechend entweder in der Form von Kiemen oder auch als Lungen entwickelt. Die Kiemen bestehen aus federartig gestellten oder baumartig verzweigten Blätter, welche meistens in einer eigenthümlichen Höhle des Mantels im Nacken oder an den Seiten des Körpers verborgen sind und durch einen Schlit oder durch ein Loch die nöthige Zufuhr erhalten. Häufig ist sogar der Zugang zu der Kiemenhöhle in eine mehr oder minder lange Röhre ausgezogen, welche in einem Querschnitt oder in einer schnabelartigen Verlängerung des Spindelrandes der Mündung gelegen ist, jedoch, wenn auch das Thier die Öffnung der Schale vollkommen mit seinem Deckel schließt, dennoch der Zugang zu der Kiemenhöhle durch diese Röhre oder den Querschnitt geöffnet erscheint und die Athmung unterhalten werden kann. Die Lagerung der Kiemen wechselt außerordentlich; sehr selten nur sind sie symmetrisch auf dem hintern Theil des Rückens oder im Umkreise des Afters

unter einer Mantelfalte angebracht. Bei den meisten liegen sie unsymmetrisch bald auf der rechten, bald auf der linken Seite, wo dann ihre Lagerung zugleich diejenige des Herzens sowie des Afters und der Geschlechtsöffnung bedingt.

Die Lungen, welche sich nur bei Land- und Süßwasserthieren vorfinden, bilden einen meist auf der rechten Seite geöffneten, gewöhnlich in der Radengegend gelegenen Sack, dessen innere Fläche mit einem äußerst zierlichen, erhabenen Netze von Lungengefäßen überzogen ist, welche sich gewöhnlich in einen einzigen Hauptvenenstamm sammeln, der sich unmittelbar in den Vorhof des am Lungenack gelegenen Herzens ergießt. Bei unsern Garten- und Weinbergschnecken öffnet sich dieser Lungenack unter dem Mantelwulste auf der rechten Seite, wo man sehr leicht die abwechselnde Öffnung und Schließung des Athemloches beobachten kann.

Ein Herz ist wol bei allen Schnecken vorhanden und ebenso ein geregelter Blutkreislauf, der indessen das Eigentümliche hat, daß entweder die ganze Venenbahn oder ein großer Theil derselben durch wandungslose Kanäle ersetzt ist und daß die Eingeweidehöhle in diesen Kreis mit eingeschlossen ist. Das Blut selbst ist farblos, opalisirend und gerinnt kaum. Das Herz besteht immer aus einer einfachen, dickwandigen, lebhaft pulsirenden Kammer mit einer einfachen oder doppelten Vorkammer, die nur äußerst dünne Wände besitzt und die beide meist in einem besondern Herzbeutel an der Basis der Kieme oder des Lungenacks, und zwar bald vor, bald hinter den Athemorganen liegen. Von der Herzkammer geht unmittelbar die große Körperschlagader aus, die sich meist nach kurzem Verlaufe in zwei Äste trennt, von welchen der eine den Kopf und dessen Theile, der andere die mehr nach hinten gelegenen Eingeweide versorgt. Die sehr zierlichen Verzweigungen dieser Äste lassen sich bei unsern Wegschnecken auf dem meist braunen Darne sehr leicht durch ihre milchweiße Farbe erkennen. Allmählich verlieren sich die Wandungen dieser Gefäße; das Blut strömt durch die Zwischenräume der Körperorgane durch die Eingeweidehöhle und sammelt sich dann wieder in einzelne Kanäle, welche es zu den Kiemen oder den Lungen hinleiten und von da durch die Kiemenvenen dem Herzen zuführen. Ob außer diesen Zwischenräumen noch eigene Wassergefäße den Körper und namentlich den Fuß durchziehen, ist noch nicht genauer ermittelt.

Neben dem Herzen und meistens in Verbindung mit ihm einerseits und dem Mastdarm andererseits liegt fast bei allen Schnecken ein eigenthümlicher Drüsenack von blättriger Structur, welcher offenbar eine Niere ist, da die Flüssigkeit, welche er aussondert, deutlichen Gehalt an Harnsäure erkennen läßt. Bei vielen Schnecken namentlich ist diese Absonderungsflüssigkeit bläulich-roth gefärbt und wurde von den alten Griechen und Römern als edler Purpur zum Färben benutzt. Merkwürdig ist die auch bei den Muscheln vorkommende Communication der Niere mit dem Herzbeutel und dadurch mit dem Herzen, wodurch Wasser aus der Niere in das Blut gepumpt werden kann, welches den Herzbeutel erfüllt.

Ungeschlechtliche Zeugung oder Parthenogenese sind bis jetzt noch nicht beobachtet worden; dagegen finden sich ebenso viele Zwitter, als Typen mit getrennten Geschlechtern. Im ersten Falle sind die Geschlechtstheile so ineinander geflochten, daß zwar die Ausführgänge getrennt sind und deshalb auch meist gegenseitige Begattung stattfindet, die keimbereitenden Organe dagegen, Eierstock und Hoden, eine einzige

Drüse, die sogenannte Zwitterdrüse bilden. Die Eier entstehen dann in der Wand der Drüsenschläuche, die Samenelemente dagegen in der Höhlung derselben, in welche dann die Eier ebenfalls durchbrechen. Die ausführenden Organe sind meist sehr complicirt durch Samenblasen, Begattungswerkzeuge mannichfacher Art und besondere Drüsen. Die Eier, die aus hüllenlosen Dotterklumpen bestehen, sind häufig in flüssigem Eiweiß und oft sehr sonderbar gestalteten einfachen oder gemeinsamen Schalen eingeschlossen. Sie wandeln sich durch gänzliche Zurückbildung allmählich in einen wimpernden Embryo um, der sich im Eiweiß unaufhörlich umherwälzt. Als typisch kann man eine Larvenform bezeichnen, deren Körper in eine napf- oder mühlenscheibelförmige Schale eingeschlossen ist, in welche sich das Thier gänzlich zurückziehen und die es mit einem auf der Rückseite des Fußes befindlichen Dedel schließen kann. Am Kopfe trägt diese Larve zwei mit großen Wimpern besetzte Segel, mittels deren sie umher schwimmt. Selbst bei den abweichenden Formen, wie unsern Landschnecken, lassen sich solche rudimentär gewordene Segel noch nachweisen. Dagegen gibt es allerdings Formen, bei welchen die Larve gänzlich verschieden und wie bei den Würmern mit Wimperreihen versehen ist.

Unterlasse der Segelschnecken (Velata).

Larven- und Jugendzustände mit deutlichem oder rudimentärem Wimpersegel und meist auch mit einer napf- oder mühlenscheibelförmigen Schale.

Ordnung der Kielfüßer (Heteropoda).

Meerschnecken mit langem Körper und Kopf und kielförmigem Ruderfuß, der in der Mitte des Leibes angebracht ist.

Die Ordnung begreift nur sehr wenige schwimmende Thiere mit glasartig durchsichtigem, aber doch sehr festem und wenig contractilem Körper, die stets getrennten Geschlechts sind. Das Schwimmorgan besteht aus einer kielförmig zusammengebrückten Flosse, welche in der Mittellinie auf der Bauchseite angebracht ist. Beim Schwimmen wenden die Thiere diese Flosse nach oben, während die Rückenfläche nach unten gedreht ist. Der Kopf ist deutlich, mit mehr oder minder ausgebildeten Fühlern versehen, und trägt meistens zwei große Augen und einen langen Rüssel, an dessen vordern Ende die mit Stacheln besetzte Zunge eingekerkelt liegt. Die oberen Ganglien des Nervenringes sind meist bedeutend entwidelt, die untern weit nach hinten geschoben und liegen in der Nähe des Eingeweideknäuels, welcher bei den meisten Gattungen sich auf dem Rücken befindet. Die lamellenförmigen Kiemen liegen mit dem Herzen, der Leber und den Geschlechtsorganen zusammen in diesem Knäuel. Wir unterscheiden zwei Familien. Die Atlantiden, *Atlantida* (*Oxygyrus* [Atlanta] *Keraudreni*, Taf. 30, Fig. 31), besitzen eine schneckenartige gewundene Schale, in welche sich das Thier vollständig zurückziehen kann. Der mit Fühlern, Augen und einem kurzen Rüssel versehene Kopf sitzt auf einem verlängerten Halse, auf dessen Bauchseite der lanzettförmige, mit einem Saugnapf versehene Schwimmnapf und noch ein jugenformiger Fortsatz stehen, welcher letztere einen dünnen Dedel trägt, mit dem das Thier beim Zurückziehen die Schalenöffnung verschließen kann. Die Kiemen liegen im Innern der Schale verborgen. Der trichterförmige After ragt in Gestalt einer Trompete aus der Schalenöffnung hervor.

Die Familie der Kielschnecken (Firolida) ist entweder nackt, oder hat nur eine kleine, müßenschrägige Schale, welche den Eingeweidenrüssel einschließt. Der Körper ist lang, oft bis zum Maße eines Fußes, spindelförmig und so durchsichtig, daß man alle Einzelheiten der Organisation bei dem unverletzten Thiere verfolgen kann. Die Thiere erscheinen schon in dem Mittelmeere zuweilen in großen Schwärmen an der Oberfläche des Meeres, doch ist ihre Schale ihrer großen Zerbrechlichkeit wegen nur selten unverletzt zu erhalten.

Die den nackten Kielschnecken angehörige Art, die wir abbilden, ist in der Stellung (*Firola* [Pterotrachea] coronata, Taf. 30, Fig. 32) gezeichnet, in welcher das Thier schwimmt, mit der Brustflosse, die einen Saugnapf in der Mitte trägt, nach oben. Der Rüssel ist sehr lang und im rechten Winkel gegen den Kopf gebogen. Auf der Spitze des Rückens sitzen die hoch organisirten und beweglichen Augen.

Ordnung der Plattfüßer (Platypoda).

Kopf mit Fühlern und Augen versehen; breiter Kriechfuß auf der Bauchfläche. Eigentliche Schnecken.

Unterordnung der Lungenschnecken (Pulmonata).

Zwittergeschnecken mit einem auf der rechten Seite sich öffnenden Athemsack (Lunge), welche das Land oder das süße Wasser bewohnen. Rudimentäre oder ganz fehlende Wimpersegel des Jugendzustandes, keine eigentlichen Larven.

Die Lungenhöhle liegt meist in dem Nacken des Thiers in einer ähnlichen Kammer wie die Kiemen, und öffnet sich gewöhnlich gemeinschaftlich mit dem After und den Geschlechtsorganen auf der rechten Seite. Alle Lungenschnecken sind Zwitter. Fast alle haben eine Schale, die indeß bei manchen nur als ein dünnes Plättchen vorhanden ist, welches in dem Mantel selbst verborgen liegt, während die meisten sich vollständig in die Schale zurückziehen und einige selbst dieselbe mit einem Deckel verschließen können. Mit diesem Unterschiede sowie mit dem Baue der Geschlechtstheile hängen auch wesentliche Verschiedenheiten in dem Baue der Mundtheile zusammen, die gewöhnlich nur mit einem hornigen, stark gerippten Oberkiefer und einer nur kleinen Zunge bewaffnet sind.

Die Entwicklung der Lungenschnecken im Ei weicht in manchen Punkten sehr von derjenigen der Kiemenschnecken ab. Die Wimpern, welche bei diesen hauptsächlich nur an der Stelle der Kopfsegel erscheinen und dort eine so außerordentliche Länge erhalten, breiten sich hier im Anfange über den ganzen Embryo aus, und wenn sie gleich in der Stirngegend sich am kräftigsten entwickeln und so gewissermaßen einen Ersatz für die Segel bilden, so werden sie doch niemals bedeutend genug, um jene Bildung von Schwimmsegeln, wie sie bei den Kiemenschnecken vorkommt, veranschaulichen zu können. Im übrigen hat die Bildung der innern Theile viel Ähnlichkeit mit derjenigen der Kiemenschnecken, indem auch hier der Dotter sich gewissermaßen in zwei Theile theilt, von welchen der vordere den Kopf, die Sinnesorgane und den Fuß, der hintere die übrigen Eingeweide in sich entwickelt. Die Schale bildet sich sehr bald, ist anfangs napfförmig, bekommt aber dann allmählich die Windungen, welche ihr eigenthümlich sind. Eine besondere Larven-

periode machen demnach unsere Lungenschnecken nicht durch; sie verlassen das Ei in einer Gestalt, welche vollkommen derjenigen des Mutterthiers entspricht.

Eine auffallende Ausnahme von allen übrigen Weichthieren machen unsere nackten Wegschnecken. Auch hier bilden sich anfangs die beiden gegenüberstehenden Theile des Körpers aus, allein zwischen beiden bleibt ein mit großen Zellen besetzter Raum des Dotters übrig, welcher bei fortschreitender Entwicklung zu einer hellen Blase wird, die im Nacken liegt und sich durch ihre lebhaften Zusammenziehungen auszeichnet. An dem Hinterende des Leibes bildet sich zu gleicher Zeit eine andere, sehr durchsichtige Blase aus, welche ebenfalls lebhaft zusammenziehungen macht und mit der vordern Nackenblase in Wechselwirkung steht. Diese beiden Blasen pulsiren nun abwechselnd und regelmäßig, je daß beständig die Flüssigkeit der Leibeshöhle hin und her, aus einer Blase in die andere getrieben wird. Sobald das Herz entsteht, nehmen diese beiden Blasen an Wirksamkeit ab, schrumpfen ein und verschwinden endlich spurlos.

Alle Lungenschnecken leben entweder in süßem Wasser oder auf dem Lande, und zwar meistens in feuchten Orten und Schlupfwinkeln, die sie nur bei Nacht oder bei nassem Wetter verlassen. Alle sind Pflanzenfresser und manche von ihnen durch ihre Menge und Gefräßigkeit sehr unangenehme Gäste in unsern Gärten und Feldern.

Unter den vielen, meist ausländischen Familien, welche in dieser Ordnung vorkommen, erwähnen wir besonders drei inländische:

Familie der Spitzhornschnecken (*Lymnaeidae*). Ihre Gehäuse sind bald thurmförmig, bald nur in einer Ebene gewunden, meist ziemlich dünn und zerbrechlich und von horniger Beschaffenheit. Sie haben nur zwei Fühler, die bald dreieckig breit, bald lang, spitz und dünn sind und an deren Grunnde an dem innern Rande die Augen sitzen. Sie leben stets in Wasser, an dessen Oberfläche sie meist herumschwimmen und dabei mittels des aufgesperrten Athemlochs Luft schöpfen. Doch können sie wahrscheinlich auch unmittelbar aus dem Wasser die ihnen nöthige Luft beziehen, was aus dem Umstande geschlossen werden kann, daß man in den größten Tiefen der Süßwasserseen (Genslersee) Spitzhornschnecken findet, die gewiß nicht an die Oberfläche kommen können, um Luft zu schöpfen.

Die Schnirkelschnecken (*Helicidae*) bilden eine überaus zahlreiche Familie von Landschnecken, deren Typus unsere gewöhnlichen Weinbergschnecken oder Baumschnecken dienen können. Die Thiere dieser Familie haben vier Fühler, von welchen die kleineren oft ziemlich rudimentären neben am Munde, die größeren, welche an ihrer Spitze die Augen tragen, vorn am Kopfe stehen. Die Gehäuse, welche diese Thiere umschließen, sind sehr verschiedener Gestalt, bald nur dünn und durchsichtig, bald ziemlich dick und schwer und mit schönen Farben geziert. Bei der einen Gattung sind sie fast in einer Ebene gewunden, bei einer andern sehr lang und spitz, fast von der Gestalt eines Priemens. Bei manchen sind die Ränder der Öffnung scharf gekantet, bei andern ist ein vollständiger Mundsaum vorhanden; hier ist die Mündung glatt, dort Lippenrand oder Spindelrand oder auch beide zugleich mit vorspringenden Leisten versehen. Die überaus zahlreichen Gattungen und Arten, welche in allen Zonen vorkommen, lassen sich oft nur sehr schwierig unterscheiden. Die hier abgebildete Art (*Schnirkelschnecke*, *Helix aspersa*, Taf. 30, Fig. 33) wird in dem südlichen Europa allen andern als Fastenspeise vorgezogen.

Legschnecken (Limacida) sind entweder vollnackt oder haben nur ein kleines unbedeutendes, welches entweder in dem Mantel selbst ist oder wie ein kleines Schildchen an dem Ende des Körpers aufliegt. Der ganze Rücken der vordere Theil desselben, wo die Lungen und die Afteröffnung liegen, ist mit einem Schilde bedeckt. Das Thier hat vier Fühler, wie diejenigen der vorhergehenden Familie ind. Bei den mit einer äußeren Schale versehenen liegen After und Lungenhöhle unterhalb am hintern Ende des Körpers. Die abt. (Mderschnecke, *Limax agrestis*, Taf. 30, ist die Verwüsterin der Felder und Gärten Zahren.

Unterordnung der Kiemenschnecken (Branchiata).

Allgemein Kiemen; nur bei einigen Meeresschnecken keine differenzirten Organe. Junge mit Wimpersegeln beschale. Mit geringen Ausnahmen wohnen. Bald Zwitter, bald eingeschlechtlich.

Besonders zahlreich ist die Unterordnung zeichnet sich durch die Structur ihrer Athemorgane auch noch anders durch die Entwicklung ihrer Jungen le, ohne Ausnahme, durchlaufen nämlich einen Zustand, während dessen sie durch bewimperte zum Schwimmen befähigt sind. Nachdem um des Dotters vorüber ist, entwickeln sich in verschiedenem Zellen an demselben, von äußere, hellere den Mantel, die Haut und die innere, dunklere die Eingeweide bildet. Der neugebildete Embryo gleicht nach der Ausstülpung einer Schicht einem Kuchen, an dessen einer Seite Kiemenhaare von mehr oder minder beträchtlicher Länge entwickeln. Der Embryo, dessen Kiemenhaare anfangs in beständiger Bewegung sind, vollzieht eine stete Drehung um die Achse bewirken, zeigt aus zwei Regionen zusammengesetzt; einem kegelförmigen Theile, der bald von einer arten Schale in Gestalt eines Kapfens umhüllt wird, und aus einem vordern Theil, auf dessen Fläche die Kiemenhaare, auf der Bauchseite gegen ein zungenförmiger Fortsatz sich besitzend sich allmählich zum Fuße ausbildet, während im Innern dunklere Zellenhaufen wahrnehmen, welche die Entwicklung des Darms und der Kiemen vorbereiten. Bei fortschreitender Entwicklung der Thiere bilden sich alle so angelegten Organe und nach aus. Die Stelle im Nacken, wo die Kiemenhaare sich befinden, wächst zu zwei häutigen Blättern, die meist mit außerordentlich langen Wimpern besetzt sind, nach Willkür einzeln und ausgetrennt werden können und ein sehr wirksames Schwimmmittel die freigewordenen Thierchen bilden. Die Thiere sind mühsamartig und so groß, daß das ganze Thier in sie zurückziehen und mit einem an der Spitze des Fußes angebrachten Dedel die Oeffnungen schließen kann. Von den innern Organen sieht man zuerst die Gehörorgane mit den in empfindlichen Gehörsteinen erscheinen, dann den neuen Darmkanal, dessen Mundöffnung sich in den Wimpersegeln befindet, während der Fuß der rechten Seite in der Nackengegend sich erst lange nach den Gehörorganen erscheinen und zuletzt von allen innern Organen das einzige, daß bei fast allen diesen Schnecken die ganze

embryonale Entwicklung ohne Dazwischentritt eines Herzens, also eines Blutlaufs, zu Stande kommt. Inzwischen fehlt auch bei den Embryonen ein Umräumen der die Leibeshöhle erfüllenden Flüssigkeit nicht. Es blähen sich nämlich abwechselnd der Fuß und die Nackengegend auf und ziehen sich wieder zusammen, sodaß auf diese Weise ein unregelmäßiges Wogen der Flüssigkeit von vorn nach hinten und umgekehrt stattfindet. Die ausgebildete Larve ist ein äußerst lebhaftes, kleines Thierchen, welches mit großer Schnelligkeit mittels seiner Wimpersegel umhergeschwimmt und meistens auch in diesem Zustande die Kapfeln der Eischläuche durchbricht, in welchen die Eier sich befinden. Zuweilen (*Paludina*) geschieht die Durchbrechung schon im Eileiter der Mutter, sodaß die Schnecke lebendige Junge gebiert. Haben sich diese einige Zeit im freien Wasser umhergetummelt, so beginnt die Ausbildung der Schwimmorgane. Diejenigen Schnecken, welche im spätern Alter nackt sind, werfen die Schale ab, während bei den andern sie sich nach und nach zu ihrer bleibenden Form gestaltet. Hinter den Segeln, welche allmählich einschrumpfen und endlich vollständig verloren gehen, sprossen die Fühler hervor und der Fuß entwickelt sich mehr und mehr als einziges Bewegungsorgan. Aus einem lebhaften Schwimmer ist eine langsam kriechende Schnecke geworden. Die Größe und Ausbildung der Wimpersegel, die Gestalt und das Verhältniß der Schale bilden die wesentlichsten Unterschiede zwischen den Embryonen jener Thiere, welche im erwachsenen Alter so außerordentlich verschieden sind.

Nach der Lage der Athemorgane, hauptsächlich im Verhältniß zum Herzen, unterscheiden wir zwei größere Gruppen.

Gruppe der Halskiemer (Prosobranchia).

Alle diese Thiere haben im erwachsenen Zustande eine meist gerollte Schale, in welche sie sich vollständig zurückziehen können. Der Mantel bildet an der vordern Hälfte des Körpers im Nacken einen weiten Umschlag, unter dessen Wulst der Kopf zurückgezogen werden kann. In dieser Kammer des Mantels liegen die kammförmigen Kiemen sowie die Geschlechts- und Afteröffnung. Das Blut, welches aus den Athemorganen kommt, strömt nach hinten zu gegen das Herz hin, dessen Vorkammer nach vorn liegt. Alle Individuen sind getrennten Geschlechts und die Ruthe liegt bei den Männchen meist auf der rechten Seite, zurückgeschlagen in einer Falte des Mantels. Die meisten Familien dieser überaus zahlreichen Gruppe leben im Meere und sind durch dicke und feste Schalen ausgezeichnet.

Bei der außerordentlich großen Mannichfaltigkeit der Bildung, die sich zeigt, hat man nach verschiedenen Charakteren zur Klassifikation gesucht. Hinsichtlich der Schalen drängt sich zuerst ein Unterschied auf, welcher von Bedeutung scheint. Die einen haben einen Ausschnitt, oder selbst einen Kanal (unter den abgebildeten die Flügel-schnecken, Cerithien, Kegelschnecken); bei den andern ist der Mundrand der Schale ganz und vollständig (Nabelschnecke, Schüsselschnecke). Es hängt dies, wie schon bemerkt, mit der Organisation der Athemorgane zusammen; der Charakter erscheint aber deshalb wichtig, weil die ältesten Schnecken der Erdgeschichte in den Uebergangsgebilden alle nur ganz randige Mündungen der Schalen zeigen und die Ausschnitte erst später auftreten. Sodann hat man auf die Stellung der Kiemen Rücksicht genommen und danach unterschieden: Halskiemer (*Cyclobranchia*), bei welchen die Kiemen rund um den Körper herum

unter einer Mantelfalte ausgebracht sind (Schüsselfschnecken); Schildkiemer (Aspidobranchia), mit zwei Blattkiemen, die zuweilen verschmelzen und vorn im Rachen in einer Athemböhle liegen — es gehören dazu die Spaltfischschnecken (Fissurellida), Seeohren (Naliotida); Kreiselschnecken (Trochida) und Mondschnecken (Neritida) — und endlich Kammkieemer (Ctenobranchia), wo zwei ungleich entwickelte Kiemen in der hinterwärts entwickelten Athemböhle liegen. Endlich hat man auch die Organisation der Zunge vorwiegend in Betracht gezogen. So hat man die Kreiskieemer zugleich als Blattenzüngler (Dacoglossa) bezeichnet, indem die Zunge mit ballenartigen, zahntragenden Hornplatten bewaffnet ist; die Schildkiemer als Fächerzüngler (Klipidoglossa); ihre Zunge ist höchst complicirt gebaut, die Querreiben der Bejahung von Mittel-, Zwischen- und Seitenplatten gebaut, welche letztere fächerartig gestellt und nach oben als Haken umgebogen sind. Unter den Kammkieemern hat man unterschieden: Federzüngler (Pteroglossa), Zunge ohne Mittelplatten, mit zahlreichen kleinen Haken; hierher gehören die Wendeltreppe (Scalaria), die Sonnentreife (Solarida) und die Quallenboote (Janthinida), die mittels eines vom Fuße ausgehenden schwammigen Floßes auf dem Meere schwimmen; Bandzüngler (Taenioglossa), mit sieben gekrümmten Platten in jeder Querreihe der langen Zunge, die meist in einem Rüssel angebracht ist. Fast alle sind fleischfressende Meeresschnecken. Es gehören dahin die Nabelschnecken (Naticida); Mägen-schnecken (Capulida); Thurnschnecken (Turritellida); Hornschnecken (Cerithida); Tritonschnecken (Tritonida); Helmschnecken (Cassida); von welchen einige Arten Schwefelsäure als äussere Absonderung ihrer Speicheldrüsen liefern, Flügel-schnecken, Strombida, und endlich die schönen Porzellanschnecken (Cypræida), welche die seitlichen Lappen des Fußes über die engmündige Schale schlagen und dieser so ihre Glätte bewahren. Zu dieser Gruppe gehören noch Familien, welche den Uebergang zu den Lungen-schnecken machen, indem bei den Jungen die Segel und bei den Erwachsenen die Kiemen allmählich rückgebildet und gegen Lungen vertauscht werden. Diese Uebergangsfamilien sind die Strand-schnecken (Littorinida), besonders gern im Brackwasser; die Flußkiemenschnecken (Paludinida) — beide Familien haben nur Kiemen; die Fäulschnecken (Ampullarida), mit Kiemen und Lungen zugleich in den süßen Wässern südlicher Länder; die Thurnschnecken (Cyclostomida), nur mit Lungen, überall an feuchten Orten auf dem Lande. Unter den echten Kammkieemern unterscheidet man dann noch die Schmalzüngler (Rhachiglossa). Das Thier besitzt einen langen vorstreckbaren Rüssel, der mit kleinen seitlichen Kiefern und einer schmalen Zunge bewaffnet ist, auf der höchstens drei Längsreihen von Platten stehen, deren Mittelplatte breit und mit scharfen Zähnen bewaffnet ist. Sie bohren mittels dieses Rüssels meist andere Schalthiere an, die sie ansaugen, und einige Gattungen sind sogar gefürchtet wegen der giftigen Wunden, die sie damit versehen sollen. Außerdem haben diese Thiere stets eine Athemböhre und meist nur zwei runde Füßler, an deren Aufsehrande bald näher an der Basis, bald gegen die Mitte zu die Augen stehen. Hierher gehören die Faltenschnecken (Voluta), Eischnecken (Olivia), Rindhörner (Buccina), Felsen-schnecken (Muricea). Endlich die Pfeilzüngler (Toxoglossa), deren Rüssel pfeilartige Spitzen trägt, die vorgeknallt werden. Wir erwähnen hier nur diejenigen Familien näher, von welchen Abbildungen gegeben sind.

Familie der Kegelschnecken (Conida) (Kegel-

schnede, *Conus textilis*, Taf. 30, Fig. 37), zu den Pfeilzünglern gehörig. Das Gehäuse ist kegelförmig, das regelmäßig gerollte Gewinde an dem videren Ende des Kegels sichtbar; die Oeffnung spaltförmig, nach unten hin etwas erweitert und meist an der Spindel etwas ausgeschnitten für den Durchtritt der langen Athemböhre; der Lippenrand der Schale ist gerade, dünn und scharf und so wie der Spindelrand ohne alle Zähne oder Faltungen. Das Thier hat einen breiten Fuß, einen stumpfen Rüssel, der mit zwei Reihen langer, hohler, zuweilen widerhafter Zähne bewaffnet ist und womit es empfindlich stechen kann. Einige Kegelschnecken stehen der Wunden wegen, welche sie mit diesem Rüssel versehen, sogar im Verdachte der Giftigkeit. Sie kommen hauptsächlich in südlichen Meeren vor und bildeten früher bei Sammlern einen ähnlichen Gegenstand der Liebhaberei wie die Tulpen, so daß für eine einzige seltene und schön gefärbte Schale zuweilen selbst Tausende von Gulden bezahlt wurden.

Die Flügel-schnecken (Strombida) (*Flügel-schnecke* mit dem Thier, *Strombus gigas*, Fig. 35) zeichnen sich auf den ersten Blick durch ihr starkes längliches Gehäuse aus, dessen Gewinde ziemlich spitz ist und nach unten an dem Spiralarande in einen kurzen gebogenen Kanal für die Athemböhre ausläuft. Der Lippenrand der Mündung zeigt vorn eine bedeutende Bucht, in welcher der Kopf liegt, und ist dann flügelartig ausgebreitet, so daß die Mundöffnung der Schale ungeheuer groß erscheint, während sie, abgesehen von dieser flügelartigen Ausbreitung, doch nur eine schmale Spalte bildet. Das Thier, welches diese Schale bewohnt, hat eine sehr bizarre Gestalt. Der Rüssel ist sehr groß und dick, geringelt und weit vorstreckbar; er fällt besonders die erwähnte Bucht des Lippenrandes aus. Die Zunge stellt sie zu den Bandzünglern. Die Füßler sind nur klein, die Stiele dagegen, welche die Augen tragen, ungemein groß und stark, und neben denselben ein eigentümlicher zungenförmiger Fortsatz des Fußes angebracht, welchen schmalen, spizen, hornigen Dedel trägt, der zur Schließung der Schale bestimmt ist. Sie kommen hauptsächlich in südlichen Ozeanen vor und finden sich in den ältern Schichten ziemlich zahlreich. Die Gestaltungen unterscheidet man hauptsächlich nach der Gestalt des Lippenrandes, der bei einigen ganzrandig ist, bei andern die sonderbarsten fingerförmigen Fortsätze trägt. Die Schale der hier abgebildeten, im Meere der Antillen häufigen Art dient besonders zur Anfertigung von Cameen.

Zu den Bandzünglern gehören ebenfalls die Hornschnecken (Cerithida) (*Cerithium hexagonum*, Fig. 36). Sie haben ein sehr in die Länge gezogenes, thurmähnliches Gehäuse, dessen Lippenrand breit ausgezogen ist, während an dem schwielig verdickten Spindelrande ein kurzer Ausschnitt zur Aufnahme einer kleinen Athemböhre sich findet. Der Rüssel des Thiers, an welchem nur rudimentäre Kiefer angebracht sind, ist ziemlich lang, die Füßler dünn und weiß stehen die Augen etwa in der Mitte ihres Augensandes, zuweilen an einem seitlichen Anhang. Die Kiemen sind ziemlich groß und in doppelte Reihen gestellt. Sie kommen besonders in den Tertiargebilden häufig versteinert vor.

Die Nabelschnecken (Naticida) (*Nabelschnecke*, *Natica lineata*, Fig. 38), von denen wir ein Gehäuse abbilden, bohren mit ihrem langen Rüssel zweilappige Muscheln (z. B. Auster) an und saugen sie aus.

Schüsselfschnecken (Patellida) (*Schüsselfschnecke*, *Patella algira*, Fig. 39). Die abgebildete Art ist von unten gesehen und zeigt in der Mitte den breiten Fuß.

Von der Kieme, vorn den Kopf mit den Fühlern. felförmige Schale hat die Gestalt eines flachen, von dessen Spitze meist strahlige Leisten nach ablaufen. Die innere Höhlung dieses Kegels ohne vorspringende Leisten und Falten. Das ist diese Höhlung fast ganz aus und saugt sich breiten, treisförmigen Füße so fest an, daß sie wie ein Schröpfkopf auf dem Felsen aufsteht. Der Kopf ist rüsselförmig vorgezogen, mit zwei kleinen Fühlern besetzt, an deren Grund die Kiemen liegen. Die stachelige Zunge ist meist länger als der Körper und liegt oft mehrfach gewunden in der Höhle. Die blattartigen Kiemen finden sich um den Körper in der rinnenartigen Vertiefung zwischen dem Fuhrande und dem Mantel. Sie liegen in allen Meeren und dienen besonders der Klasse der Bevölkerung zur Nahrung. Die Kiemen äußerst fest an den Felsen und manchmal finden sich sogar ihren Sitzplatz aus.

Der Rüdentieme (Opisthobranchia). Blut strömt von den auf dem Rücken gelegenen Herzen gegen das Herz zu, und die Vorhöfen sind infolge dieser Lagerung hinter dem Herzen gesammelt. Die Kiemen bilden Büschel, welche Anhängel, welche mehr oder weniger auf dem Rücken oder an den Seiten liegen; als findet sich ein eigentlicher Mantelumschlag in einer Kapuze, welche eine Kiemenhöhle in der Umgebung bildet.

Die Kiemen fehlen der Kiemen ganz, so daß die Haut die Gesamtheit der Athmung übernimmt — in welchem auch in diesem Falle die Anordnung der Kiemen dieselbe, wie bei den Kiementragenden. Häufig aber durch einfache oder verästelte Blutdrüsen. Sie sind durchaus Meeresbewohner. Alle zur Theilung gehörigen Schnecken sind Zwitter, und haben nur eine sehr dürrig entwickelte Kieme oder sind im erwachsenen Alter vollkommen

kann, je nach der Organisation der Athemborg drei Gruppen unterscheiden: Seitentieme (Pleurobranchia). Die blatt- oder fadenförmigen Kiemen stehen selten auf beiden Seiten, meist nur auf einer, unter einer Falte des Mantelrandes, wo der Uebergang zu den Schälfschnecken sich darstellt. Repräsentanten dieser Gruppe, welche auch die Blasenschnecken (Bollida), die Blattschnecken (Phyllidida) und Seitentieme (Pleurobranchia) einschließt, nehmen wir die Familie der Seebasen (Lysida) (Seehase, Aplysia depilans, Taf. 30). Das Thier ist vom Rücken gesehen und der auseinandergeklappte, so daß man die Kiemen theils auf der rechten Seite sieht. Die Kieme wird von großen, oft fußlangen, fast gänzlich Schnecken gebildet, die in der Gestalt viel Aehnlichkeit mit unsern nackten Landschnecken haben. Der Kopf nach hinten breiter, nach vorn halsartig verengt, und der Kopf mit zwei Paar Fühlern versehen, von welchen die vordern breit und blattartig, die hintern rund und spitz sind. Vor diesen liegen die Kiemen. Der Fuß ist ziemlich schmal, der Mantelrand breit, und seine freien Ränder werden nach oben zurückgeschlagen, so daß sie den Rücken des Thieres bedecken. Die Kiemen befinden sich hinten unter einer zweiten Mantelfalte, in welcher eine hornartige Schale verborgen ist. After und Harnöffnung verhalten sich wie bei der vorigen. Der Mund ist mit einer breiten, mit vielen

gezähnelten Querplatten besetzten Zunge bewaffnet. Die Thiere sondern, wie es scheint zu ihrer Verteidigung, aus den seitlichen Lappen des Mantels eine dunkelröthliche Flüssigkeit ab, die das Wasser färbt und für giftig gehalten wird. Sie kriechen hauptsächlich unter den Tangen an der Küste umher und finden sich manchmal so zahlreich, daß man bei starker Ebbe den Strand ganz damit besetzt findet.

Bei der zweiten Gruppe, Rüdentieme (Notobranchia), stehen die Kiemen in Form verschiedener gestalteter, einfacher oder verästelter Anhängel frei auf dem Rücken, und zwar bald über denselben zerstreut, bald mehr in zwei Reihen (Tritonida), bald im Kranze um den After (Sternschnecken, Doridida). Wir geben als Repräsentanten der ersten Familie mit zerstreuten Rüdentanhängen die Familie der Faden- und Schnecken (Eolida). Der längliche Körper gleicht fast dem einer gewöhnlichen Wegschnecke und trägt meistens auch vier Füße, die oft blattartig eingekollt sind. Auf dem Rücken finden sich gewöhnlich eigenthümliche cylindrische Anhängel, oft in großer Anzahl, in welche sich die verzweigten Lebergänge hinein erstrecken. Meist sind diese Anhängel an der Spitze mit einem Drüsenloche versehen, aus welchem Nesselorgane hervorgepreßt werden können, und in den Röhren, welche, mit Leberkörnern besetzt, sich in diese Anhängel erstrecken, sieht man häufig Nahrungstoffe circuliren. Der After liegt bald mehr nach vorn, bald mehr nach hinten, meist auf der rechten Seite des Thiers, vor ihm auf der rechten Seite die Geschlechtsöffnung und in der Nähe des rechten Fühlers die Öffnung für die Nuth. Die Fadenanhängel des Rückens spielen offenbar auch die Rolle von Kiemen, da zwischen ihrer glashellen Haut und dem darin enthaltenen Lebergange ein bedeutender Raum ist, worin das Blut circulirt. Bei einigen Gattungen sind diese Anhängel zu beiden Seiten auf Fortsätze gestellt und dienen zugleich als Ruderlappen zum Schwimmen auf dem hohen Meere. Die abgebildete Art (Faden- und Schnecke, Flabellina affinis, Taf. 31, Fig. 1) in europäischen Meeren.

Die dritte Gruppe, Kiemenlose (Abranchia), begreift endlich solche Thiere, bei welchen keine Athmungsorgane sichtbar sind, wo die ganze nackte Körperoberfläche wimpert. Hierzu gehört die höchst abweichende Familie der Blattschwimmer (Phyllirhoe), von den Seiten plattgedrückte Thiere ohne Fuß noch Kiemen, die auf hohem Meere schwimmen. Die Meeresschnecke (Pontolimacida), den Wegschnecken in der Form ähnlich, aber mit rüdenthändigem After und breitem Fuße, und die Firschneden (Actaeonida), die sich in ihrer Organisation ganz den Faden- und Schnecken anschließen, aber eine seitliche Ausbreitung des Körpers in Blattform besitzen, in welcher Darm und Geschlechtsorgane sich verästeln. Die abgebildete Art (Elysia [Acteon] viridis, stark vergrößert, Fig. 2) häufig an den Küsten des Oceans auf Tang.

Ordnung der Flügelfüßer (Pteropoda).

Meerbewohnende Weichthiere mit zwei flügelartigen Schwimmklappen am Kopfe, mit oder ohne Schale. Zwitter.

Hauptbewegungsorgane sind die großen Flossen oder Flügel, welche zu beiden Seiten des Kopfes stehen und Weiterbildungen der Seitentheile des Fußes darstellen, dessen Mitteltheil als rudimentärer Fortsatz an der Bauchseite erhalten bleibt und aus einer unendlichen Anzahl gekreuzter Muskelfasern gebildet sind. Die meist sehr kleinen Thiere treiben sich mittels dieser Schwimmklappen auf der Oberfläche des Meeres umher und wer-

den nur selten durch Verschlagen in der Nähe des Strandes angetroffen. Sie sind alle Nachthiere, heben sich erst mit der Dämmerung aus der Tiefe des Meeres in zahllosen Schwärmen heraus und sinken mit dem Morgenlichte wieder hinab. Tagsüber trifft man keine Spur von ihnen, und manche Arten kommen nur in ganz finstern Nächten an die Oberfläche. Die Schwimmlappen sind auch bei ruhigem Schwimmen in steter schwingender Bewegung, ähnlich den Flügeln eines Schmetterlings; bei der geringsten Gefahr, die sie merken, ziehen sie die Ruderlappen ein und sinken in die dunkle Tiefe hinab. Die meisten von ihnen besitzen eine sehr dünne, oft nur hornige Schale von sehr wechselnder Gestalt, die den ganzen Körper des Thiers umschließt und nur den Mund mit den Schwimmlappen hervortreten läßt. Einige dieser Thiere sind ganz nackt und dann von einer festern Haut umgeben.

In allen Körperorganen ohne Ausnahme zeigt sich der niedrigere Stand der Organisation dieser Thiere. Den meisten fehlt ein eigentlicher Kopf und damit auch Fühler und Augen; bei andern sind zwei oder selbst vier kurze Fühler ausgebildet. Bei dem Schlundringe sind die oberen Ganglien meist durch einen einfachen Verbindungsstrang ersetzt, während nur die unteren Schlundganglien entwickelt sind. Nur zwei Gattungen besitzen Augen, den übrigen fehlen sie, während die Gehörorgane ziemlich allgemein entwickelt sind. Der Mund ist meist unbewaffnet, höchstens von kurzen Fortsätzen umstellt, welche zuweilen Saugnapfe tragen. Er führt in einen muskelförmigen Schlundkopf, in welchem eine stachelige, mit rückwärts gewendeten Zahnzähnen besetzte Zunge sich findet. Die Afteröffnung des gewundenen Darmkanals befindet sich meist auf der rechten Seite, zuweilen aber auch auf der Bauchseite in der Mittellinie oder etwas mehr nach links angebracht. Die Leber ist aus einzelnen Schläuchen zusammengesetzt, welche unmittelbar in den Darm münden. Das Herz scheint nur unvollständig entwickelt, indem es meist nur aus einer Kammer ohne Vorlammer besteht; jedenfalls ist der Blutkreislauf nur sehr unvollkommen und das Venensystem gänzlich durch Lacunen ersetzt. Athemorgane fehlen bei einigen Gattungen ganz, während andere eine geräumige Mantelhöhle haben, in welcher eine fächerartige Kieme verborgen liegt.

Die Niere ist stets wohl ausgebildet und einestheils mit dem Blutraume, welcher das Herz umgibt, in Verbindung, andererseits durch eine stark wimpernde Öffnung nach außen oder in den Mantelraum geöffnet. Alle sind Zwitter; doch sind Hoden und Eierstöcke zuweilen getrennt und nicht immer zu einer Zwitterdrüse verbunden. Geschlechtsöffnung und Copulationsorgan liegen rechts in der Nähe des Afters. Die Eier werden in langen, oft spiralförmig gedrehten Schürren von Eiweiß umhüllt im Meere abgesetzt und schwimmend angetroffen. Alle entwickeln sich anfangs nach dem Typus der Meeresschnecken mit Segel und Schale; erst später tritt bei einigen eine Aenderung ein. Hiernach sowie nach dem Vorhandensein einer Schale kann man zwei Unterordnungen unterscheiden.

Unterordnung der Schalenträger (Thecosomata).

Der Körper in einer Schale, die von einem Mantel ausgekleidet ist.

Wir geben als Beispiel dieser Unterordnung eine Art (*Hyalea tridentata*, Taf. 31, Fig. 3) vergrößert. Die Schalen bestehen bei dieser Unterordnung bald aus

glasartig durchsichtiger und spröder Masse (*Hyalea*), bald aus halbweicher, wider Anorpelmasse (*Cymbulida*), bald sind sie spiralförmig gedreht, wie Schnecken-schalen mit spiralem Dedel (*Limacinida*). Die Flossen sind unter dem Munde, der zwischen ihnen angebracht ist, verwachsen, der Kopf nur sehr undeutlich abgesetzt; in der Mantelhöhle finden sich bald Kiemen (*Hyalea*), bald keine (*Cymbulida*); erstere können die Flossen in die Schale zurückziehen, letztere nicht. Die Larven sind denen der Fadenwürmer sehr ähnlich; die embryonale Schalenform wird meist abgeworfen, um eine neue zu bilden.

Unterordnung der Radikörper (Gymnosomata).

Weder Schale noch Mantel.

Als Beispiel dieser Unterordnung dient die Walfschnecke (*Clio borealis*, Taf. 31, Fig. 4). Die durchscheinenden blaugefärbten Thiere schwärmen in Millionen im Nordmeere und sind die gewöhnliche Speise der Wal-fische, die sie tonnenweise hinabschlürfen.

Der Kopf ist bei diesen Thieren deutlich getrennt, die Flossen hinter demselben angebracht, nicht zusammenfließend. Bei den Walfschnecken (*Clioida*), zu denen die abgebildete Art gehört, finden sich keine Kiemen, aber meist Fühler; bei der andern Familie der Hautathmer (*Pneumodermoida*) äußerliche Kiemen und meist zwei mit Saugnapfen besetzte Arme am Kopf. Die Thiere durchlaufen nach Abwerfung der embryonalen Schale und der Segel ein zweites Larvenstadium, in welchem sie Wimperreifen um den Körper besitzen, ähnlich den Larven der Würmer; bei manchen bleiben noch später im reifen Alter Spuren dieser Wimperreifen bestehen.

Unterklasse der Wimperreife (Ciliophora).

Larvenzustände nur mit Wimperreifen, ohne Segel. Erwachsene Thiere ohne Augen.

Wir vereinigen in dieser Unterklasse zwei wenig zahlreiche, aber sehr abweichende Typen, die Ordnung und zugleich Familien vorstellen, nämlich einerseits die Käferschnecken (*Chitonida*), die sich mehr den eigentlichen Plattfüßern annähern, und andererseits die Zahnschnecken (*Dentalida*), welche den Uebergang zu den Muscheln machen. In der letzten Organisation, Bildung der Schale u. s. w. sehr verschieden, zeigen doch beide insofern eine gemeinsame Bildung, als das Nervensystem auf einer sehr niedrigen Stufe der Bildung steht, die Augen ganz fehlen, die Fühler nur in der Weise der Würmer bei den einen entwickelt sind, und daß aus dem Ei direct Larvenformen entstehen, welche mehrere Wimperreifen um den Körper besitzen und ganz in der Weise der Würmer gebildet sind. Jede Spur von Segeln fehlt auch aus bei diesen Larven.

Ordnung der Familie der Käferschnecken (*Chitonida*). Diese Thiere sind von ovaler, zuweilen etwas länglicher, plattgedrückter Gestalt und zeigen auf der Unterseite einen ovalen Fuß, zwischen welchem und dem Mantelrande, der den Fuß weit überragt, blattartige Kiemen liegen. Auf dem Rücken des Mantels sind acht kalkige Schuppenstücke eingefügt, welche entweder dachziegelförmig übereinanderliegen oder auch so weit voneinander entfernt sind, daß sie nicht einmal sich berühren. Der Mantel ist sonst mit Stacheln, Haaren, Vorstienbüscheln oder kleinen Schüppchen meist über und über bedeckt, eine Bekleidung, welche bei keiner andern Schnecke vorkommt und der der Seeräupchen

ist. Der Kopf ist klein, rundlich, ohne Augen
hier, von einem Hautsegel überdeckt, eigentlich
Wulst um den Mund. In den innern Or-
eigen sich wesentliche Verschiedenheiten von den
Schnecken. So sind die Geschlechtsorgane zu
Seiten der Mittellinie symmetrisch vertheilt und
tliche Geschlechtsöffnungen vorhanden, wie sie
keiner andern Schnecke vorkommen. Der After
nau am Ende des Körpers in der Mittellinie.
erz liegt am Hinterrande; die daraus ent-
Aorta läuft oberflächlich am Rücken längs der
nie fort und gleicht ziemlich dem Rückengefäße,
bei den meisten Gliederthieren vorkommt. Die
sind anfangs länglich rundlich, mit Wimpern
und einem vordern Wimperbüsch, platten sich
sch und nach ab und lassen den Rücken und
iten unterscheiden. Die erwachsenen Thiere
ie Schüsselfschnecken an Steinen fest.

Ordnung und Familie der Zahnschnecken
(*Stomatopoda*) besteht aus einer höchst sonderbaren Gat-
eren wenig gebogene, spitz zulaufende, an bei-
den offene Schale etwa die Gestalt eines Stö-
vom Elefanten nachahmt. Ehe man das Thier
reicht man diese Schalen unter die Röhren-
; und in der That ist das Thier so abweichend
d, daß man seinen Platz nur unsicher bestimmen
nd in ihm einen Uebergang von den Röhren-
en zu den Schnecken erkennen muß. Der Kör-
lang, wurmförmig, von einem dünnen Mantel
üllt, der über dem Kopfe einen glockenförmigen
ag bildet, sonst aber das ganze Thier so ein-
daß nur die hakenförmige Spitze des Fußes aus
rdern Oeffnung hervorsticht. Der Mundwulst
st sehr klein, mit acht Lippenfäden besetzt und
leichsam nur als Anhang aus dem cylindrischen,
fleischigen, dreilappigen Fuße, der weit nach
über den Kopf hervorgestreckt werden kann und,
z Thier verkehrt im Sande steckt, zum Aufwühlen
Sandes dient. Das Nervensystem ist demjeni-
topflosen Muschelthiere ähnlich; es gibt obere
nere Schlundganglien und Afterganglien, durch
iffuren miteinander verbunden; auf den Fuß-
en liegen zwei Gehörbläschen; Augen fehlen.
Büschel von verästelten wimpernden Fühlern ste-
n dem Halsstragen, wo Mantel und Körper sich
den. Kiemen fehlen; ein Herz ist nicht vor-
; das Blut circulirt, wie bei den Würmern,
Zusammenziehungen zweier Längsgefäße, ein
und ein unteres, welche durch ein Lücken-
ander communiciren. Im Schlundlopf liegt
leine sämstheilige Schneckenzung; in den Magen
n die verästelten Gänge der Leber, die man
ußen durch den Mantel sieht; der After ist hinter
Fuße in die Mantelhöhle geöffnet; der Darm
ach gekrümmt. Die Geschlechter getrennt. Der
em Ei entstehende Embryo hat sieben Wimpern,
von welchen der vordere der stärkste, fast einem
ähulich, einen vordern Wimperbüschel und eine
e, schuppenförmige Schale, die so eingebogen
daß sie fast zweilappig erscheint. Später wächst
sammen.

Re der Muschelthiere oder Blattkiemer (*Lamelli-branchia*).

(Tafel 31, Figur 10 bis 23.)

splose Weichthiere mit mehr oder minder
viele Blätter gepalstenem Mantel, zwei-
piger Schale, deren Klappen durch ein
oß verbunden sind, zwei Paar blätterig

gen Kiemen und blattförmigen Mundfählern,
bauchständigem Fuße, meist getrenntem Ge-
schlecht.

Die Schalen der Muschelthiere sind außerordent-
lich charakteristisch für die ganze Klasse, indem nur bei
ihnen, aber auch ganz allgemein, diese Schalen aus
zwei Klappen gebildet sind, welche den Körper von
beiden Seiten her einschließen. Selbst bei denjenigen
Muschelthieren, bei welchen später diese Anordnung
sich verwischt, findet man in der Jugend diese beiden
Schalen vollkommen ausgebildet.

Die äußerste Schicht der Schalen wird von einem
zerreiblichen Ueberzuge horniger Natur gebildet, der
Oberhaut, welche offenbar mit der den Mantel be-
deckenden Oberhautschicht in Beziehung steht. Bei den
meisten Muscheln reibt sich diese Oberhautschicht leicht
ab, oder wird selbst künstlich an dem in den Samm-
lungen bewahrten Thieren entfernt. Auf diese Schicht
folgt nach innen hin eine zweite, die aus hornigen
Säulchenzellen zusammengesetzt ist, welche mit Kalk-
masse gefüllt sind. Es stehen diese Säulchenzellen
meist gerade oder schief von außen nach innen; ihre
Absonderung, sowie diejenige des kohlensauren Kalks,
welcher sie erfüllt, geht offenbar von dem verdidten
Rande des Mantels aus, und da sie nicht beständig,
sondern periodisch stattfindet, so werden hierdurch ein-
zelne Blätter gebildet, welche dachziegelförmig über-
einanderliegen und concentrische Kreise bilden, die
dem jeweiligen Umriß der Muschel bei jeder Wach-
thumsperiode entsprechen. Die Anwachsstreifen,
wie man diese durch die einzelnen Lamellen gebildeten
Linien genannt hat, bieten manche Anhaltspunkte für
die Charakterisirung der Arten insbesondere. Oft
stehen sie nämlich auf der Oberfläche der Muschel mit
scharfen Kändern hervor, oder bilden auch hier und da
Zaden, Spitzen und Röhren; meist aber zeigen sie
sich nur als feine Linien, die gewöhnlich dem äußern
Umriße der Muschel parallel laufen. In dieser Säul-
chen-schicht sind hauptsächlich die verschiedenen Pig-
mente abgelagert, welche manche Muschel so herrlich
färben. Die Ablagerung dieser Farbstoffe machte es
möglich zu bestimmen, daß wirklich der Mantelrand
allein diese Schicht absondere. Muscheln nämlich,
welche über dem Mantelrande verlegt wurden, erzei-
gen den Substanzverlust ihrer Schalen durch eine Masse,
welche der ungefärbten Schicht der innern Schale ent-
spricht; geschieht aber die Verlegung am Mantelrande,
so erhält die Ersatzstelle die Farbe, welche der Mantel-
rand an der verlegten Stelle besitzt. Die dritte in-
nerste Schalenschicht, die Perlmutter-schicht, hat einen
mehr blätterigen Bau und eine gleichförmige Grund-
masse, welche äußerst fein gestaltet erscheint und durch
die Brechung des Lichts den eigenthümlichen Perl-
mutterglanz hervorbringt, welcher so vielen Muscheln
eigenthümlich ist. Die Perlen selbst sind nur krank-
hafte Auswüchse der äußern Mantelfläche, welche
diese Schicht hervorbringt, in der nur selten Farbe-
stoffe abgelagert werden.

Betrachtet man die Lagerung der Schalen in ihrem
Verhältnisse zu dem Körper, so läßt sich sogleich ent-
scheiden, was oben und unten, rechts und links, vorn
und hinten sei. Obgleich kein Muschelthier einen deut-
lichen Kopf besitzt, so finden sich doch bei allen Mund
und After an entgegengelegten Enden, und bei den Frei-
lebenden das kiel-förmige Bewegungsorgan, der Fuß,
auf der Unterseite. Diese drei Organe bestimmen
demnach bei allen Muschelthieren die Benennung der
einzelnen Regionen. Der freie Rand der Schalen,
durch welchen der Fuß hervorgestreckt wird, ist der

untere Rand; der Schloßrand, wo die beiden Schalen zusammengefügt sind, der obere Rand; diejenige Seite, nach welcher hin der Mund gerichtet ist, die vordere Seite; die entgegengesetzte, welche meist länglich ausgedogen erscheint, die hintere Seite der Muschel. Stellt man die Muschel so vor sich hin, daß sie mit dem freien Schalenrande auf dem Tische ruht, während der Schloßrand nach oben schaut und das vordere Ende von dem Beschauer ab, das hintere ihm zugekehrt ist, so hat man links die linke, rechts die rechte Schale. Die Länge der Muschel wird durch eine gerade von dem Mundende nach dem hinteren gebende Linie gemessen; die Höhe von dem höchsten Punkte des Schloßrandes bis zu dem niedrigsten Punkte des freien Schalenrandes; die Dide quer durch den Körper von der Wölbung einer Schale zur andern.

Man unterscheidet regelmäßige und unregelmäßige Muscheln und bezieht diese Ausdrücke hauptsächlich auf die äußere Form, sowie auf das Verhältniß beider Schalen zueinander. So sind die Auster und Hammerschalen sehr unregelmäßige, die Aaler- und Herzmuscheln sehr regelmäßige Muscheln. Bei den meisten Muscheln sind die beiden Klappen vollkommen gleich, sie heißen gleichschalige; bei andern hingegen, wie z. B. bei den Austern oder den Raummuscheln, ist die eine Schale kleiner als die andere oder von verschiedener Gestalt, sie heißen ungleichschalig. Gleichseitig nennt man die Muscheln, wenn das vordere Ende dem hinteren vollkommen gleich ist, so daß ein queres, durch die Dide geführter Schnitt jede Schale in zwei vollkommen gleiche Hälften theilen würde.

Bei den meisten Muscheln schließen die beiden Schalenränder, die oft gezackt und gefaltet sind, vollkommen ineinander, so daß nirgend ein Zugang zu dem Körper stattfindet; es sind geschlossene Muscheln, wie z. B. unsere Tschumuscheln. Andere können die Schalen niemals vollkommen schließen, indem bald hinten, bald vorn ein bedeutender offener Raum bleibt; man nennt sie klapfende Muscheln; die Sand- und Messermuscheln sind in diesem Falle. (Einle Schale einer Venusmuschel, *Cytherea exoleta*, von innen gesehen; Taf. 31, Fig. 14. a Schloß mit Zähnen und Gruben, b Schalenrand, c Schloßband, d Wirbel, e Hofraum [Lunula], g Muskeleindrücke, h Mantelrand, i hintere Mantelbucht.)

Die Schalen der Muschelthiere sind in den meisten Fällen in einer größern oder geringern Erstreckung längs des Rückens aneinandergeschlossen. Nur in sehr wenigen Fällen ist durchaus kein Schloß vorhanden, und dann war die größere Schale unbeweglich an den Boden geheftet und die kleinere bewegliche Schale spielte die Rolle eines Deckels, welcher der größern, die das Thier enthielt, auflag. Die Betrachtung des Schloßes und die Kenntniß seiner einzelnen Theile ist von der größten Wichtigkeit für die Kenntniß der Gattungen und Arten. In den wenigsten Fällen bildet das Schloß nur eine einfache Linie, eine Art Falt, in welchem sich die beiden Schalenklappen wie Flügel einer Thüre vereinigen. Meistens finden sich Vorsprünge, Leisten und Faden auf der einen Schalenklappe, welchen dann Kerben, Gruben oder Einschnitte auf der andern Seite entsprechen. Man hat diese Vorsprünge, wodurch die Ränder des Schloßes fest ineinandergreifen, sehr unpassenderweise Zähne und die Vertiefungen Gruben genannt. Die Anordnung dieser Zähne und Gruben ist sehr mannichfaltig und bietet gute Charaktere für Unterscheidung der Gattungen und Arten dar.

Ein wesentlicher Theil des Schloßes ist das Schloßband (Ligamentum); eine halb sehnige, halb knorpel-

artige Masse, welche meist eine große Dehnbarkeit und bedeutende Elasticität besitzt. In den meisten Fällen sind die elastischen Fasern dieses Bandes an der Rückenfalte der Muschel in einem Falt in eine Rinne angebracht und so von einer Schale nach der andern hinübergespannt, daß bei dem Schließen der Schale die Fasern gedehnt und gespannt werden und durch ihre Elasticität die Schalen wieder auseinander hinübergepannt, daß bei dem Öffnen der Schale die Fasern gedehnt und gespannt werden und durch ihre Elasticität die Schalen wieder zusammengequetscht und gestaut werden, sobald die Wirkung der Schließmuskeln nachläßt. Das Schloßband bildet bei dieser Anordnung einen breiten Hebel, dessen Stützpunkt an dem vorderen Ende und wo das Schloßband an dem langen Schließmuskel an dem langen Hebel ansetzt, an dem vorderen Ende ist, das Schloßband an der Seite der Schalen angebracht, wo es einen Länglichen Ausschnitt oder viele einzelne Gruben im Schloßband bildet. In diesem Falle werden die Fasern des Schloßbandes beim Zusammenklappen der Schalen zusammengequetscht und gestaut und durch ihre Elasticität die Schalen wieder auseinander getrieben. In manchen Fällen findet sich das Schloßband halb außen, halb innen, jedoch beim Öffnen und Schließen der Schale verbleibend. Die Wirksamkeit dieser elastischen Schloßbänder dauert auch nach dem Tode des Thiers fort, dann die Gegenwirkung der lebendigen zugezogenen Schließmuskeln aufhört, so klappen die Schalen der meisten Muschelthiere nach dem Tode auseinander.

Bei den meisten Muschelthieren beginnen concentrischen Wachsthumstreifen, welche auf der Innenseite der Schale sich zeigen, auf der Rückenseite in zwei einander entsprechenden Linien, welche man die Wirbel (Umbones) nennt. In diesen Linien bilden diese Wirbel einfache Erhöhungen, welche sich nach innen zu ein, so daß sie sich selbst wie Widerbörner gestärkt haben. Die Wirbel liegen stets ganz oder zum Theil vor dem Schloßbande und man sieht an letzterem von einem besonders abgegrenzten Raume, den man das Schildchen (Archa) hat. Ein ähnlicher Raum findet sich bei den meisten Muscheln vor den Wirbeln und wird dann die Lunula (Lunula) genannt. Die Archa und die Lunula können als die ausgezeichneten Punkte für die Entwicklung dieser beiden Räume hinter den Wirbeln genannt werden.

Auch die innere Fläche der Schalen kann durch nähere Untersuchung Eigenthümlichkeiten darbieten, welche zur Unterscheidung von Familien, Gattungen und Arten vortreffliche Merkmale liefern. Die Muscheln, welche bei den verschiedenen Thieren die Schalen schließen, gehen auch von innen aus, und der Raum, wo sie ansetzen, zeigt einen tiefen Eindruck, an dem man die einzelnen Lagen, durch welche sich die innere Schicht verbildet, unterscheidet. Bei den meisten Muscheln entweder zwei Muskeleindrücke an der Innenseite der Schale, die dann an dem vorderen und hinteren Ende liegen (Fig. 14 g), oder nur einer, der dann mehr in der Mitte der innern Schale liegt. — Der Mantel, welcher den Leib des Thiers einhüllt und zunächst an den Schalen ansetzt, läßt ebenfalls einen Eindruck auf der Innenseite, welcher seinem Umriß im Leben entspricht. Dieser Eindruck ganz, bei vielen Muscheln aber, bei welchen hintere Röhren (Siphonen) vorhanden sind, welche zur Athmung und zur Ausfuhrung des Urins bestimmt sind, zeigt dieser Eindruck einen hintern Ausschnitt, die Mantelbucht.

form, Größe und Tiefe meist sehr charakteristisch und durch ihre Erhaltung an fossilen Muscheln auf die Anwesenheit eines Siphons schließen läßt.

Muschelthiere sind Wasserbewohner und die meisten eine sehr geringen Ortsbewegung fähig. Einige sind entweder unmittelbar durch einen Fuß, oder mittelbar durch einen eigenthümlichen Fortsatz, den Bart (Byssus), an den Boden oder zwischen Unregelmäßigkeiten in der Form der Schalen zur Folge hat. Die freilebenden Muschelthiere bohren sich größtentheils in den Sand des Ufers, oft aber auch in Holz ein, oder kriechen mühsam und mittelst ihres Fußes an dem Boden einher; nur ist dieser Fuß geschickt zum Springen, wenn sie in Wasserpfützen oder glatten Gerinnen und nur bei einer einzigen Familie, bei den Muscheln, hat man bis jetzt beobachtet, daß sie schwimmen, indem sie die beiden Schalenflügel auf- und zuklappen und durch Ausströmen des Wassers sich stoßweise fortbewegen.

Die Muscheln, welche sich einbohren, sei es in weichen Boden oder in festere Gesteine, richten die Mundseite stets nach dem Grunde, die Afterseite nach der Ausgangsöffnung, und wenn diese letztere (was meistens der Fall) mit Röhren versehen ist, so stehen sie nicht auf der Öffnung der Röhren, sondern freie Wasser hinein. Diejenigen Muscheln, welche sich auf dem Boden der Gewässer einbohren, während des Lebens eine senkrechte Öffnung in ihren Schalen, den After nach oben; die Steinbohrer dagegen, welche ihre Röhren in die Wände eintreiben, stehen meist in horizontaler Richtung. Die angehefteten Muscheln ruhen auf der einen Schale, während die andere frei beweglich ist, und die freien Sandmuscheln auf dem Mantelrande umher, den sie nach oben gerichtet, indem sie mit dem Mantel vorgestreckten Fuße Furchen in den Sand graben.

Die Anheftung der Schalen, wie sie bei den Muscheln vorkommt, hat den größten Einfluß auf die Gestalt und Regelmäßigkeit der Schalen. Oft ist ihrer Unterlage anschniegen und so derselben wiederholten. Weit weniger ist es bei der freien Art der Anheftung der Schalen vorhanden. Die Sehnenfäden, welche die Anheftung bewirken, treten entweder durch einen Ausschnitt der einen Schale, oder eine Rinde zwischen beiden Schalen, die der vordern Seite des Schloßrandes sich anheftet. Eine eigenthümliche Drüse, welche sich zwischen dem Fuße liegt und die durch eine dem zungenförmigen Fuße selbst in Verbindung, liefert eine glasbelle, zähe Absonderung, die alsbald in Fäden gerinnt und die Blättliemer, welche sich durch solche Absonderungen, wozu namentlich die bekannten Niesmuscheln, drüben den zungenförmigen Fuß an, wo sie sich festsetzen wollen, und die hrehende Bewegungen einen Faden nach dem andern, bis die Anheftung gesichert erscheint.

Die Schale dieser Muscheln liegt der platte, von der zusammengedrückten Körpermitte, von deren beiden Seiten wieder genau dieselben Bestimmungen, wie für diejenigen der Schalen. Dieser Faden zuerst eingeschlossen von zwei seitlichen Fortsätzen, welche hart an der innern Fläche der Schale

ansetzen und der Mantel genannt werden. In den meisten Fällen sind die Mantelblätter nach unten hin frei, während sie an dem Schloßrande der Schale und an dem Sade, welcher die Eingeweide umhüllt, angewachsen erscheinen. Die Ränder eines solchen freien Mantels sind fast stets mit Fortsätzen, Rippen oder Wälzchen besetzt, welche sehr verschiedene Gestalten annehmen und oft zu langen Fühläden auswachsen, die in mehrfachen Reihen den Mantelsaum bekleiden. In der Regel sind diese Fühläden in der Gegend des Afteres, dann auch des Mundes am ausgiebigsten entwickelt und selbst dann an diesen Stellen vorhanden, wenn sonst der freie Mantelsaum glatt ist. Am After namentlich fehlen sie wol keinem Muschelthiere, und es mag dies mit der Tendenz zur Verwachsung der beiden Mantelhälften zusammenhängen. Bei vielen Muschelthieren nämlich vereinigen sich die beiden Mantelhälften mit ihren untern freien Rändern auf eine größere oder geringere Strecke, und es bleiben dann nur einige Schlige übrig, welche für den Mund und den Zutritt des den Athemorganen bestimmten Wassers, für das Durchlassen des Bewegungsorgans oder Fußes und für den After bestimmt sind. Bei denjenigen Muscheln, welche sich in Schlamm, Sand oder Steine einbohren, schließt sich der Mantel noch mehr, so daß er völlig sackförmig den Körper umschließt, seinen vordern Mundschlitz hat, sondern nur nach hinten in zwei mehr oder minder lange Röhren (Siphones) sich auszieht, von welchen die eine, die Athemröhre, das für die Kiemen bestimmte Wasser und damit auch die Nahrungstoffe einzieht, die andere, die Afterröhre, dieses Wasser mit dem Unrathe wieder austreten läßt. Beide Röhren sind zuweilen in eine einzige Doppelröhre miteinander verwachsen und ihre Länge steht mit der Länge der Bohrlöcher, welche die Thiere sich machen, in Verhältniß. Die Tastwälzchen und Fühler stehen in solchen Fällen bei mehr oder minder geschlossenem Mantel nur an den Rändern der Schlige oder an der Mündung der Röhren.

Die Hauptmasse der dünnen, an den freien Rändern verdickten Mantelblätter besteht aus mannichfach gekreuzten Sehnen und Muskelfasern, die von vielen Gefäßen und Nerven durchzogen werden. Auf seiner innern Fläche ist der Mantel von stiel förmigen Wimpern besetzt, die sich überhaupt auf fast allen Oberflächen, innern wie äußern, der Muschelthiere vorfinden und für das Athmen und Ernähren derselben von der größten Bedeutung sind. In dem Mantelrande finden sich drüsige Bildungen, welche zur Absonderung der Stoffe dienen, aus denen die Schale zusammengesetzt ist. Man findet deshalb zu den Zeiten, wo die Schalenbildung besonders lebhaft ist, eine milchige Flüssigkeit in dem Mantelrande, die mit Säuren ausbraut und vielen Niederschlag von kohlensaurem Kalk enthält. Die Umrisse des Mantels zeigen sich bei den meisten Muscheln sehr deutlich auf der innern Fläche der Schalen und dienen wesentlich zur Erkenntniß der einzelnen Arten und Familien.

Die Bewegungsorgane der Blättliemer sind zweierlei Art. Zum Schließen der Schalen dienen entweder nur ein mittlerer, oder zwei, vorn und hinten angebrachte Quermuskeln, die bald gleich, bald ungleicher Größe sind.

Das Organ der Ortsbewegung, der Fuß, ist stets auf der Bauchseite der Muschel und meistens in solcher Größe ausgebildet, daß er zwischen den Schalen hervorgestreckt werden kann. Bei denjenigen Muscheln, welche sich anheften, ist dieser frei bewegliche Muskelmasse nur sehr rudimentär oder fehlt auch

gänglich, während sie bei andern, die im Sande kriechen, oft eine bedeutende Größe erreicht. Meistens ist der Fuß beilsförmig und bildet die vordere Schneide des Eingeweidesacks, an dessen Seiten seine Sehnenfäden hinaufsteigen, um sich in der Nähe des Schloßes an die Schalen festzusetzen; zuweilen ist er dünn, lang, zungenförmig oder hakenförmig, wie bei der Herzmuschel (Zaf. 31, Fig. 15), in andern Fällen wieder dick, walzenförmig und mit einer Art von Scheibe versehen. Es hängt diese Form des Fußes wesentlich mit seiner nähern Bestimmung für das Thier zusammen. Die beilsförmige oder zungenförmige Gestalt findet sich bei solchen Blattkriechern, die, wie unsere Flußmuschel, im Sande kriechen; die Muscheln mit hufeisförmig eingebogenem Fuße schnellen sich sogar mit demselben, wie mit einer Feder, springend fort. Löffelförmige oder ähnliche Gestalt, wie bei der Niesmuschel, dient wesentlich zum Spinnen des Bartes, womit sich die Muscheln anheften. Bei solchen Thieren findet sich am Grunde des zungenförmigen Fußes eine Grube, deren Boden durch eine Menge weicher, aufrechtstehender Lamellen quer gesurcht erscheint und so eine Menge von Rinnen darstellt, in welchen die weiterhin zerfaserten Hornblätter des Bartes festliegen. Von dieser Grube geht eine ebenfalls drüsige aussehende Furche an dem löffelförmigen Fuße hinauf, dessen Spitze besonders als Tastorgan dient. Der Stoff der Byßusfäden ist anfangs klebrig, erhärtet aber dann zu einem hornartigen Gewebe, das man sogar bei einigen Muscheln, wie z. B. der Stedmuschel, zum Spinnen eines seidenartigen Stoffs benutzt.

Eine ganz entgegengesetzte Form des Fußes zeigen die eigentlichen Bohrmuscheln (*Pholas*, *Saxicava*, *Teredo*, *Gastrochaena* u. s. w.). Viele dieser Thiere bohren in Holz, selbst in Eichenholz und Mahagoni, andere in Stein und zwar meistens Kalkstein oder Schiefer, tiefe röhrenartige Gänge, in denen sie zeitlebens stecken bleiben. Sie haben meist einen wurmförmigen Körper und sadartig geschlossenen Mantel, der nur vorn für den Fuß geöffnet und hinten in lange Abemröhren ausgezogen ist.

Kein Muschelthier besitzt einen eigentlichen Kopf; die Mundspalte befindet sich an dem vordern Ende des Körpers und nirgends sieht man in ihrer Nähe besondere Sinnesorgane oder eine Abschnürung, welche einen Kopf herstellte. Das Nervensystem besteht aus einzelnen Ganglien, die durch Stränge miteinander verbunden sind und von denen man in der Regel drei Paar unterscheiden kann. Ein Paar solcher Knoten liegt unmittelbar neben dem Munde auf der obern Seite des Schlundes und ist durch einen Querstrang über den Schlund hinüber brüdenartig miteinander verbunden. Von diesem Schlundnotenpaare gehen zwei Hauptverbindungsstränge ab, die einen nach unten, um sich mit einem Paar Knoten zu vereinigen, die in dem Fuße unmittelbar unter den Eingeweiden liegen, die andern nach hinten, wo in der Nähe der Kiemenblätter ebenfalls ein Paar von Hauptnervenknoten liegt. Zuweilen verschmelzen die Bauch- oder Fußnervenknoten, zuweilen auch die Kiemennoten in eine einzige Masse, sodaß hierdurch sowie durch die wechselnde Lage der Knoten eine ziemlich Mannichfaltigkeit in die Anordnung des Nervensystems gebracht wird. Die Schlundnoten versorgen die Umgebung des Mundes, den vordern Theil des Mantels und die vordern Schließmuskeln; die hinteren Knoten die Kiemen, die hintere Mantelhälfte und deren Röhren; das Fußpaar den Fuß mit Nerven-

Sinnesorgane finden sich bei vielen Blattkriechern, und zwar sowohl Gehörorgane als Augen. Die Gehörorgane bestehen aus runden, durchsichtigen, aber ziemlich festen Kapseln, die eine Flüssigkeit einschließen, in welcher ein durchsichtiger, tropfenförmiger Kern von tohlenfaurem Kalk durch die Wirkung der Nimmerhaaren hin- und hergetrieben wird. Es liegen diese beiden Gehörkapseln unmittelbar vor den Nerventnoten des Fußes, mit denen sie meist nur durch einen sehr kurzen Gehörnerven verbunden sind, wie kommen wol allen Muschelthieren ohne Ausnahme zu.

Weniger verbreitet sind die Augen, welche nur besonders bei den Kammuscheln als runde, in Edelsteine glänzende Punkte an den Mantelrändern zu finden sich fast immer zwei, nur selten ein Paar, meist dreieckiger Kapseln, die sogenannten Kamm-lappen, welche in ihrer Structur den Kiemen gleichen und mit einem äußerst lebhaften Nimmerzuge versehen sind. Diese Mundlappen, welche auch bei sehr wenigen Gattungen verkümmert erscheinen, oft aber sehr lang, riemenförmig oder spiralförmig gebogen sind, vereinigen sich zu einer Rinne, aus der dem Munde hinströmt und in welche durch die Sackbewegung die feinstzertheilten Futterstoffe hineingetrieben werden. Außerdem dienen diese Lappen noch ohne Zweifel als Tastorgane in ähnlicher Weise wie die Mantelränder.

Die Verdauungsorgane der Blattkriecher sind äußerst einfach. Zu beiden Seiten des Mundes befinden sich fast immer zwei, nur selten ein Paar, meist dreieckiger Kapseln, die sogenannten Kamm-lappen, welche in ihrer Structur den Kiemen gleichen und mit einem äußerst lebhaften Nimmerzuge versehen sind. Diese Mundlappen, welche auch bei sehr wenigen Gattungen verkümmert erscheinen, oft aber sehr lang, riemenförmig oder spiralförmig gebogen sind, vereinigen sich zu einer Rinne, aus der dem Munde hinströmt und in welche durch die Sackbewegung die feinstzertheilten Futterstoffe hineingetrieben werden. Außerdem dienen diese Lappen noch ohne Zweifel als Tastorgane in ähnlicher Weise wie die Mantelränder.

Die Mundöffnung der Blattkriecher ist stets unbewaffnet und zeigt namentlich nie eine Spalte zwischen Kiefern, Zähnen oder einer Zunge; sie führt entweder unmittelbar oder mittels einer kurzen Speiseröhre in einen geräumigen Magen, der ebenso wie der schlundförmige, bald mehr, bald minder gebundene Darmkanal in der Masse der Leber, theilweise selbst in der Tierhaut vergraben liegt. Der Mastdarm mündet sich bei allen Muschelthieren mehr oder weniger gegen das Schloß der Schale hin, durchbohrt meistens das Herz und öffnet sich in dem hintern Winkel der Schale, entweder auf einer kurzen Warte oder in der Afterröhre des Mantels. Die Leber ist meistens groß und läßt sich meist nur schwierig von den Verdauungen des Darms trennen.

Das Herz aller Blattkriecher ist einfach und liegt in der Rückengegend in der Nähe des einfachen oder wenn zwei Schließmuskeln vorhanden, in der Mitte des hintern Schließmuskels gelegen; es ist demnach von einem Herzbeutel umschlossen, der eine schleimige Flüssigkeit enthält, und besteht aus einer Kammer mit zwei seitlichen Vorhöfen, die weit dünnere Wände haben. Die Herzkammer wird fast bei allen Muschelthieren ihrer ganzen Länge nach von dem Rastrohr durchbohrt: ein Verhalten, von welchem hauptsächlich nur die Arckenmuscheln eine Ausnahme machen. Von der Herzkammer aus gehen fast überall zwei große Blutgefäßstämme, von denen der eine nach hinten, der andere nach vorn sich erstreckt und hauptsächlich in den Mantel und die Eingeweide sich vertheilt. Von hier aus leitet das Blut durch wankungsfähige Gefäße zurück, indem zugleich der ganze Eingeweidesack als Behälter für das rückfließende Blut dient. Auch in den Kiemen strömt das Blut, welches bei

es ist, in durchaus wandungslosen Räumen erhalten die Kiemen hauptsächlich ihre einem meist schwärzlichen, mit drüsigem überzogenen Saad, welcher hinter dem Herd offenbar das erste Rudiment einer L.

organe sind bei allen Muschelthieren aus blättrigen Kiemen gebildet, welche unter dem Mantel, zu beiden Seiten des sich befinden. Fast überall finden: Seite zwei Kiemenblätter, von denen welches dem Mantel anliegt, meist etwas das innere. Nur in höchst seltenen (Lucina) ist ein Paar dieser Kiemenmündungen und auf jeder Seite nur ein Blatt. Nach unten hin sind die Kiemenblätter verwachsen aber zuweilen an ihrem hinteren nach oben sind sie an dem Eingestüpfte. Die Structur dieser Kiemenblätter ist verschieden; durch knorpelige Fäden sind sie geschieden, die wieder durch Querzweige schmale Fächer getheilt sind. Die Kiemenblätter aus einer doppelten Lamelle entstehen ebenso viele Taschen mit Querspalten alle in die Mantelhöhle ausmünden. Der Falten und Taschen sind mit auferst und äußerst lebhaft schwingenden besetzt, welche beständig den Zustrom erneuern. Eine Abweichung von diesem ist sich besonders bei den Kammmuscheln (Muscheln), wo die einzelnen Knorpel sind und so das Kiemenblatt aus einer, oft hakenförmig gekrümmter, palissadenförmig stehender Bläschen gebildet

ten Blattkiemer sind getrennten Geschlechtern und vielleicht sind die wenigen Ausnahmen man bis jetzt zu kennen geglaubt hat, Aufschauung begründet. Die Eierstöcke oder übrigen im Aeußern ganz gleich gebildet, sind mikroskopische Untersuchungen kaum man genauer unterscheiden. Sie bilden eine Masse unter und hinter der Leber, die theilweise Bindungen des Darmanals umhüllt und sogar in die Mantelblätter vordringt. Die meist eine gelbliche oder selbst rothe Farbe, der Same milchweiß erscheint, und die Ausgänge der einzelnen Drüsenlappen vereinigen in einem Schlige, der entweder neben dem: Niere sich befindet oder selbst mit diesem mündet.

Entwicklung der Eier ist bis jetzt nur bei wenigen Arten, und auch hier nur unvollständig. Die Eier, in welchen man anfangs eine Eihülle, einen körnigen Dotter, ein Eibläschen, welches stets zwei Keimfäden enthält, unterseidet, treten aus dem Schlige werden meistens in die Fächer der äußeren Eihüllen und dort ausgebrütet. Diese zur Fortpflanzungszeit strobend mit Eiern bei manchen Gattungen erscheinen die weiblichen Individuen behufs der Auslassung der Eier in die Kiemenblätter bauchiger als männlichen, so daß es möglich ist, an den Geschlecht zu unterscheiden. Während der Entwicklung in den Kiemenblättern geht die Bildung des Eies zu einer völligen Larve über in vieler Beziehung von dem erwachsenen sehr verschieden ist. Die Entwicklung des Dotters bis zur vollständigen

Bildung der Zellen, welche den Körper des Embryos zusammensetzen, geht ganz in der gewöhnlichen Weise vor sich. Aus der Zellenanhäufung geht ein kugelförmiger Embryo hervor, der auf seiner ganzen Oberfläche mit Wimperhaaren bedeckt ist und sich beständig innerhalb des Eies um seine Achse herumdreht. Allmählich wächst eine Schale heran, die bei unsern Fußmuscheln ziemlich allgemein aus zwei biegsamen, dreieckigen Hälften besteht, welche mit einem geraden Schloßrande aneinanderstoßen und anfangs wie ein Sattel auf der Embryonalmasse aufliegen. Die Schalen wachsen mehr und mehr und die Zitterbewegung, welche anfangs auf der ganzen Oberfläche bestand, concentrirt sich nach und nach auf einen wulstförmigen Theil, der dem Schloßrande gegenüber hervorgetreten und zurückgezogen werden kann. Dieses Wimpergeißel ist mit langen Zitterhaaren besetzt und dient dem Embryo, der es willkürlich bewegen kann, zum Schwimmen. Bald unterscheidet man auch die beiden Hälften des Mantels und einen anfangs einfachen Muskel, der durch zunehmende Zusammensetzungen die Schale zu schließen sucht, sowie längere zum Zurückziehen des Wimpergeißels bestimmte Muskelmassen. Dann erscheint der Fuß, auch bei denen, bei welchen er, wie z. B. bei den Austern, später rückgebildet wird, das Nervensystem mit den Ohrbläschen, die Kiemen und zuletzt das Herz, während der Darm mit der Leber sich schon früher differenzirt. Die so gestalteten Larven der Meeremuscheln schwimmen frei umher; die unserer Süßwassermuscheln bleiben in den Kiemenfächern bis zur völligen Ausbildung eines langen Faden, der aus ihrer Mitte hervorgeht, und werden in sehr unausgebildetem Zustande und von der definitiven sehr verschiedenen Form von der Muschel mit dem Kiemenflehme ausgestoßen. Sie heften sich nun an Fische, besonders junge, und namentlich an die Flossen, graben sich in die Haut ein, leben eingelappt als Scharakter lange Zeit ohne Veränderung. Ihre weiteren Entwicklungsphasen sind bekannt.

Alle Muschelthiere ohne Ausnahme leben im Wasser, die meisten im Meere. Durch die Fixierung großer Massen kohlensauren Kalks spielen sie eine bedeutende Rolle im Haushalte der Natur. Mehrere Arten, wie ganz besonders die Austern, sind als Nahrungsmittel geschätzt und Gegenstand eines sehr bedeutenden Handels. Andere liefern die echten Perlen, und in kalten Gegenden werden die Schalen gebrannt, um Kalk zu Mörten zu haben. Einige Arten sind schädlich durch ihr Bohren in Holzwerk. Viele Arten dienen als Köder beim Fischefang und von andern wird die Perlmutter gewonnen.

Ordnung der Röhrenmuscheln (Inclusa).

Mantel zur Röhre geschlossen; Schalen ohne eigentliches Schloß, stets weitklaffend und meist in secundäre Kalkröhren eingeschlossen; sehr lange Siphonen. Bohren im Grunde, in Steinen und Holz.

Bei der einen Familie, den eigentlichen Bohrmuscheln (Pholadida), umschließen die vorn und hinten weit klaffenden Schalen den Körper noch vollständig. Die beiden Klappen sind in einer ziemlich strecken am Schlosse durch einen lösselförmigen Fortsatz verbunden. Der Fuß ist kurz, dick und rund, die hintere Röhre einfach, aber durch eine innere Scheidewand getheilt. Die Bohrmuscheln bohren sich in einer gewissen Tiefe unter dem Wasserpiegel an liebsten in kalkige festere Gesteine, aber auch in weiche, verfestigten aber auch Korallen und selbst Schlamm nicht.

Die in Kalk oder weichen Stein bohrenden werden gern gegessen.

Die Pfahlwürmer (Toredida) sind bekannt durch die ungeheuren Verheerungen, die sie in Häfen und Werften an dem unter Wasser befindlichen Holz anrichten. Das Thier hat etwa die Dike und Länge eines Regenwurms und endet nach hinten in zwei lange, zuletzt getrennte Röhren. Die Schälchen am vordern Ende sind außerordentlich klein, dünn und unregelmäßig in ihrer Gestalt. Am hintern Ende des Körpers, wo die Röhren anfangen, finden sich zwei schaufelförmige knorpelige Anhangs, durch welche das Thier mit der Kaltröhre, mit der es seine Galerie auskleidet, verwachsen ist. Sie zernagen alles Holz, selbst das festeste, ohne Unterschied und durchbohren es mit Millionen sich so sehr durchkreuzender Gänge, daß es vollkommen unhaltbar wird und zusammenbricht. Die Jungen werden in dem Mantelsade ausgebrütet und besitzen als Larven zwei große, fast dreieckige Schalen, die den Körper vollständig umschließen und aus denen sie ein lappenförmiges, mit lebhaft schwingenden Wimperorganen besetztes Schwimorgan hervorstrecken können. Später wird dieses durch einen langen zungenförmigen Fuß ersetzt, der bei dem erwachsenen Thiere ebenfalls vollständig verschwunden ist. Die Abbildung (Schiffsbohrer, *Teredo navalis*, Taf. 31, Fig. 10) zeigt das aus der Kaltröhre herausgenommene Thier mit den beiden nach oben gerichteten Siphonen. Andere, in noch festern, mit Siebplatten geschlossenen Röhren eingehüllte Gattungen (*Aspergillum*) finden sich im Sande.

Ordnung der Zweimuskler (*Dimyaria*).

Zwei Schließmuskeln der Schalen.

Gruppe der Gleichmuskler (*Isomyaria*).

Untergruppe der Mantelbuchter (*Sinupallia*).

Die Thiere haben lange Siphonen und infolge dessen eine hintere Mantelbucht, welche einen Eindruck auf die Innenseite der Schalen hinterläßt. Die zwei Schließmuskeln sind etwa gleich an Größe.

Bei den Sandmuskeln (*Myacida*) ist der Mantel ringsum geschlossen und hat ganz vorn einen Schlit zum Durchtritt des meist kurzen, aber massigen Fußes, der aus dem vordern offenen Ende der Muschel hervorstreckt wird. Die hintern Mantelröhren sind bei den meisten ungeheuer lang und zuweilen in eine einzige Doppelföhre verwachsen. Die Muscheln sind gleichschalig, gleichseitig und stets an beiden Enden kassend; oft sogar in so bedeutender Weise, daß die äußern Ränder sich kaum berühren. Das Schloß ist unregelmäßig, entweder gar nicht oder nur schwach gezähnt; die beiden Schließmuskeln aber sowie der tiefe Ausschnitt des Mantels deutlich an ihren Eindrücken auf den Schalen zu erkennen. Die zahlreichen Gattungen und Arten dieser Sandmuskeln, welche alle im Schlamm und Sande sich einbohren, haben zu allen Zeiten der Erdgeschichte den Strand der Meere bewohnt und bieten deshalb schätzbare Erkennungszeichen für den Geologen bei Bestimmung der einzelnen Schichten.

Die Abbildung zeigt das aus der Schale genommene Thier mit dem in den Mantel eingehüllten Körper und den langen Siphonen einer sehr großen, im Schlamm wohnenden Art (*Sinupallia*, *Panopaea australis*, Taf. 31, Fig. 11).

Die Venusmuskeln (*Venerida*) haben schön geformte und gefärbte, sehr harte, rundliche oder oblonge regelmäßige Schalen, dreieckiges, meist mit drei Zähnen

verseheneß Schloß, zusammengekehrte Siphonen mit tiefer Mantelbucht. Der frei beweglich, wie die Art, von denen diese Abbildung (Venusmuschel, Taf. 31, Fig. 14); andere bohren in Steinen unter dem Namen Meerdatteln als Steinbohrer, *Petricola pholadiformis*. Wir übergehen einige andere Muscheln und schmalen Meißerschalen, die gegessen werden, die *Trogmatrida*) und andere.

Untergruppe der Ganzmantler (*Sinupallia*).

Die Siphonen sind meist lang, nicht ausgebildet; der Mantelbucht; die beiden Muschelschalen gleich groß.

Die Herzmuskeln (*Cardida*) haben schalige, meist fast gleichseitige, überall gleichschalige Muschel mit vorstehenden, nach Wirbeln, die von vorn oder hinten die Gestalt eines Kartenherzens bilden. Die Zähne sind stark, unregelmäßig, das Schloß ist. Das große und dicke Thier hat seinen Mantel, dessen Umriss indeß über die Schalenrande folgt, so daß der Mantel die Schalen keine Bucht zeigt. Der Gehör hat vorn einen Schlit zum Durchtritt des schmalen, mit scharfer Schneide versehenen in der Mitte knieförmig gebogenen Fußes, durch den das Thier schnellend auf dem Sande springt. Nach hinten ist der Mantelbucht; die nach Willkür gezogen werden können. Mehrere Arten an den Küsten gegessen (*Cardium edule* — die Südfranzosen, *Capa totidia* der Japaner). Die Abbildung (Herzmuschel, *Cardium edule*, Taf. 31, Fig. 15) zeigt das Thier einer in der rechten Schale. Zu dem mit der Mantelhälfte sind weggenommenen langen, knieförmigen Fuß, über dem lappen und den vordern Schließmuskeln über ihm die Kiemenblätter und hinten die Siphonen.

Die Flußmuskeln (*Najades*) bewohnen süße Wasser und sind besonders in der Zone Nordamerikas in äußerst zahlreicher Handen. Unsere Teich- und Malmuscheln sind besten Typen dieser Familie, die sich unregelmäßigen, gleichschaligen und fast gleichschaligen Muscheln auszeichnet, die meistens ziemlich dicke die Perlmutterföhre sowie eine Haut besitzen, welche sich leicht abblättert. Sie liegen fast in der Mitte des Schloßes, los, bald mit stark vorpringenden Zähnen versehen ist, die einen vollständigen Schloß bilden. Das Schloßband liegt außen, die Muschel liegt nahe an dem vordern Ende der Schale und sind fast gleich groß und kriecht langsam im Sande auf dem langen knieförmigen Fuß. Der seiner ganzen Länge nach vollkommen röhrenförmig hinten, meist etwas verlängerten stumpfen Lastwarzen besetzt. Die Kiemenblätter sind jederseits hinter dem Fuße miteinander verbunden. Die Eier meist hochroth oder gelblich und die Kiemenblätter zur Fortpflanzungzeit angefüllt. Die abgebildete Art (*Najades*)

Fig. 16) gemein in Flüssen und Seen. Die nur wenig verschiedene Flussmuschel (*Unio margaritifera*) kommt in Deutschen Bächen vor und wird in Sachsen und Böhmen Gewinnung ausbeutet, wobei aber rauskommt, da die Flussperlen den Seeschönheit und den künstlichen an Wohltheben.

gehen zahlreiche Familien dieser Unter-Erbsenmuscheln (*Cycladida*) in unsern Zeichen, die schweren Gienmuscheln die Riesenmuscheln (*Tridacnida*), häufigen oder Brunnenbeden benutzt, die Arciden (*Arcida*) und andere, alle im Meere.

er Ungleichmüßler (*Heteromya*).

Schließmuskeln, von welchen aber der nur klein oder kaum entwickelt ist. Der Muskel ganz, stets vollkommen gespalt: Siphonen.

lenmuscheln (*Aviculida*) zeigen gleichblättrige, innen sehr glatte Schalen, die Lamellenschicht so stark ist, daß sie als Futter verarbeitet werden kann. Die Ungleichschalig und gleichseitig, die Wirbel geneigt, das Schloß gerade, linienförmig, ganz zahlos oder nur mit einem sehr unvorsprung versehen. Das Schloßband ist in einem Falze des Schloßrandes, der vor den Wirbeln einen Ausschnitt für den des Bastes zeigt. Der Körper ist meist platt und klein im Verhältniß zu dem Mantel, der an seinem ganzen Rande frei ist. Ist klein, rundlich und der hintere Muskel gegen den vordern, dessen Eindruck bemerktbar ist, daß man manche Gattung einmuskelig hielt. Die Mundklappen sind aber weit nach hinten in ziemlicher Entfernung dem Munde. Diese Muscheln heften sich Baste äußerst fest an oder stecken selbst mit gerichteten Wirbeln tief in dem Boden, ihre flassenden Schalenränder hervorstechen. Zu dieser Familie die echte Perlensmuschel *margaritifera*, Taf. 31, Fig. 18 von g. 19 von innen), welche sich hauptsächlich in den Meeren, um Ceylon und in den Theile der Nothen Meeres findet und erei dort einen wesentlichen Erwerbszweig. Die echten Perlen sind krankhafte Erzeugnisse concentrischen Schichten derselben Substanz aus welcher die innere Lamellenschicht der zusammengefest ist. Die Perlenfischerei wird dort betrieben, welche mit Gewichten mit einem Saß am Gürtel und einem Eisen an der Muscheln bewaffnet, sich auf den ablassen und dort die Muscheln abstoßen. In Ostasien wegen, welche in diesen Ländern vorkommen, erscheint das Landermisch gefährlich, auch ist für jeden Landwer ein Mann bestimmt, der auf ein gegebenes mit der größten Geschwindigkeit in die suchen muß. Ein Landwer läßt sich etwa in fünfzigmal im Tage hinab, und soll an Orten bis zu mehreren Tausend Muscheln in sammeln können. Die gesammelten Muscheln an die Sonne gelegt, wo sie bald ablassen und in Fäulniß übergeben. Man sucht den verfaulten Muscheln die Perlen aus,

reinigt und polirt sie mit zerstoßener Perlmuttersubstanz und liefert sie dann in den Handel.

Die Fischerei ist jetzt fast nur noch im ostasiatischen Meere im Persischen Meerbusen, um Ceylon, Madagascar u. s. w. betrieben; um die Antillen hat sie aufgehört.

Derselben Art gehören auch die Stedmuscheln (*Pinna*) an. Die hier abgebildete Art (*Schinkenmuschel*, *Pinna nobilis*, Fig. 17) findet sich im Mittelmeere. Der gelbgraue, seidenglänzende Wyßfuß wird an einigen Orten (Neapel) zu Geweben benutzt.

Die Riesmuscheln (*Mytilida*) stehen durch die Form ihrer Schalen, das zahnlöse Schloß, die vorwärts geneigten Wirbel, den schmalen zungenförmigen Fuß und den an seinem Grunde befindlichen Bart, sowie durch die ungleichen Schließmuskeln der vorigen Familie sehr nahe, unterscheiden sich aber dadurch, daß hinten in dem Mantel eine besondere Oefnung für den After sich befindet, unter welchem eine kurze, mit verbidten Lastfransen versehene Röhre den Athemschlig bildet. Die in den europäischen Meeren so häufig vorkommende eßbare Riesmuschel, sowie die Steindattel, (Fig. 13) welche die Strandfelsen des Mittelmeers anbohrt, gehören zu dieser Familie.

Die Riesmuscheln (*Moule* der Franzosen, *Pedochio* der Italiener) werden in vielen Orten förmlich gezüchtet, indem man Pfähle, Faschinen u. s. w. in schlammigen Buchten einsetzt, an welchen sich die Brut der Muscheln festhaftet, die nach zwei Jahren eßbar sind.

Ordnung der Einmüßler (*Monomya*).

Ein einziger Schließmuskel in der Mitte der Schalen. Vollständig gespaltener ganzrandiger Mantel ohne Bucht und Siphonen.

Die niedrigste, aber für die menschliche Oekonomie wichtigste Ordnung.

Die Familie der Auster (*Ostreida*) wird von meist schweren, dicken Schalen gebildet, die gewöhnlich sehr unregelmäßig und ungleichschalig sind. Die Muscheln haben eine meist platte Einsengestalt und die meisten Gattungen sind mit der linken tiefen Schale angeheftet, während die rechte flache Schale als Dedel dient. Das Thier ist im Verhältniß zu den Schalen meist nur klein und hat entweder, wie bei den eigentlichen Austern, gar keinen Fuß oder nur einen höchst rudimentären. Die Mantelränder sind in ihrem ganzen Umfange frei; die Kiemen dagegen an ihrem äußern Rande miteinander verwachsen. Der Schließmuskel ist sehr groß, in der Mitte des Thiers gelegen und deutlich aus mehreren Abtheilungen zusammengefest, die bei einer Gattung sogar so sehr getrennt sind, daß sie drei deutliche, nebeneinanderliegende Eindrüde auf der einen Schale hinterlassen. Das Schloß ist klein, dreieckig und zahlos oder höchstens aus zwei im Winkel zusammenlaufenden Leisten gebildet; das Schloßband liegt innerlich. Die Familie der Auster schließt sich an nächsten an die Armfüßler durch die Gattung *Anomia* an, bei welcher die untere flache Schale von einem knorpeligen Fortsatz der mittlern Abtheilung des Schließmuskels durchbohrt wird, welcher Fortsatz zum Anheften an Felsen dient. Bei den meisten Gattungen dieser Familie sind die Schalen äußerst blättrig, etwa wie bei der gewöhnlichen Auster. Diese, welche fast an allen europäischen Küsten vorkommt und bekanntlich eine ledere Speise bildet, siedelt sich auf weite Strecken hin in bedeutenden Massen, sogenannten Austerbänken an. Sie wird mit eigenthümlichen Schleppnetzen aufgesucht, welche mit einem eisernen Rechen versehen sind, den

man auf dem Meeresgrunde hin- und herschleift. Man reißt auf diese Weise die Auster ab, die man dann, um sie mit allerlei Stoffen, Abgängen aus Schlachthäusern u. s. w. zu mästen, in eigene, durch Meerwasser gespeiste Behälter bringt, welche man Austerparks nennt, und von wo sie dann wohlverpackt, lebend versendet werden. Durch den vollkommenen Schluß ihrer Schalen behalten die Thiere eine große Quantität von Meerwasser, das zur Unterhaltung ihrer Athmung dient, und lassen sich auf diese Weise lange am Leben erhalten.

In neuern Zeiten wird die Austerzucht, die indessen bis jetzt nur geringe Erfolge gehabt hat, ganz besonders aber die Mästung in den Parks methodisch betrieben. Der Umsatz in dem Austerhandel ist ungemein bedeutend und wird für Nordamerika, wo die Auster zur Volksnahrung beiträgt, allein auf 25 Millionen Dollars geschätzt. Die an verschiedenen Küsten vorkommenden Arten und Varietäten haben sehr verschiedenen Geschmack. Die abgebildete Art ist die gewöhnliche der Nordsee (Auster, *Ostrea edulis*, Taf. 31, Fig. 22).

Unter den lebenden Austern kommen Arten mit halbförmig eingebogenem Wirbel vor, ähnlich der fossilen Form aus dem Oberjura, die wir abbilden (*Exogyra virgula*, Fig. 23).

Die Familie der Kammmuscheln (*Pectinida*), welche den Austern am nächsten steht, unterscheidet sich von ihnen auf den ersten Blick durch die fast regelmäßige, beinahe gleichklappige Schale, die meistens auch fast gleichseitig ist, und durch die Festigkeit der Structur, welche keine solchen Blätter zeigt, wie bei den Austern. Fast alle Schalen dieser Familie zeigen auf ihrer äußern Oberfläche Fächerfalten, die von den Wirbeln nach dem freien Schalenrande ausstrahlen. Die Thiere sind im Verhältnis zu der Schale weit größer als die Austern, im übrigen aber denselben außerordentlich ähnlich. Der Mantelrand ist vollkommen frei, meistens aber mit sehr langen und dicken Fühlfäden besetzt, zwischen welchen zahlreiche, oft smaragdglänzende Augen sitzen. Der stets vorhandene Fuß ist stets sehr klein und kann höchstens zum Spinnen vonbyssusfäden, nicht aber zum Kriechen benutzt werden. Die meisten Gattungen dieser Thiere sitzen auf der einen Schale oder mit byssusfäden fest, welche bei einigen durch eine Ausbucht oder selbst durch einen tiefen Einschnitt der einen Schale hervortreten. Die eigentlichen Kammmuscheln (*Kammmuschel*, *Pecten varius*, Fig. 20) sind die einzigen Blattkriecher, welche durch lebhaftes Auf- und Zullappen ihrer Schale ziemlich rasch schwimmen können und die man auch deshalb sowie wegen ihrer bunten lebhaften Farben oft die Schmetterlinge des Meers genannt hat.

Ihnen nahe stehen die schweren Klappmuscheln (*Spondylus spinosus*, Fig. 21), deren Schale ebenso wie die der großen Fächermuscheln (*Pecten jacobaeus*) zu Schüsselfäden für seine Gerichte benutzt werden. Alle diese Thiere werden gegessen.

Wir schließen an die Weichtiere einige Klassen an, über deren Stellung man, je mehr Studien gemacht werden, desto unsicherer werden muß. Daß die Armfüßer (*Brachiopoda*), die man wegen ihrer zweiklappigen Schale bis jetzt zu den Muscheltieren stellte, bald nur als Ordnung, bald als Klasse, überhaupt nicht zu den Weichtieren gehören, sondern einem andern Organisationsplane beigelegt werden oder selbständig einen bilden müssen, steht durch die neuesten Untersuchungen von Rowleytski namentlich fest — aber es will uns deshalb nicht räthlich erscheinen, sie ebenso wie die sogenannten Molluskoiden (Mantel- und Moos-

thiere) den Würmern zuzuweisen, die am Ende die Kammkammer werden, in welche man alles hineinwirft, was nicht leicht unterzubringen ist. Wir ziehen also vor, diese Klassen, deren verwandtschaftliche Beziehungen so schwer zu entwirren sind, hier abzuhebeln, ohne sie einem bestimmten Kreise oder Organisationsplane zuzutheilen.

Klasse der Armfüßer (*Brachiopoda*).

(Tafel 31, Figur 5 bis 9.)

Feststehende, kopflose Thiere mit einer Rücken- und einer Bauchschale und entsprechenden Mantellappen und spiralförmig aufgerollten Armen, ohne Kiemenblätter, Fuß und Schloßband.

Der Körper dieser Thiere ist stets von einer zweiklappigen Schale umschlossen und entweder durch eine Schale oder durch einen bald sehnigen, bald fleischigen Stiel an dem Boden angeheftet. Man könnte sie also den Muscheltieren anreihen, wenn die Lagerung der Theile nicht eine ganz andere wäre. In der That werden die Muscheln durch einen Plan, welcher senkrecht von dem Schloßrande nach dem Schalenrande gelegt wird, in zwei gleiche, symmetrische Hälften getheilt, so daß sie eine linke und eine rechte Schale haben. Bei den Armfüßern aber muß der Plan, der die Eingeweide und den ganzen Körper in zwei symmetrische Hälften theilt, mitten durch die Schalen gelegt werden, so daß sie also eine obere (Bauchschale) und eine untere (Rückenschale) besitzen. Der Körper der Muscheltiere ist von den Seiten her zusammengebrückt, der der Armfüßer von oben her, das Schloß der Muschelschalen steht parallel mit der Körperachse, das Schloß der Armfüßerschalen in rechtem Winkel zur Körperachse. Der Körper ist innerhalb der Schalen von zwei aus sehnigen und contractilen Fäden gewebten Blättern eingefasst, welche nach unten zu frei sind, nach oben hin aber einen Sacl bilden, in welchem die Eingeweide eingeschlossen sind. Die freien Blätter dieses Mantels, welche dem äußern Umrisse der Schale nachgebildet sind und unmittelbar an der Innenfläche derselben anliegen, bestehen aus zwei aneinanderliegenden Lamellen, von welchen die äußere, den Schalen zugekehrte am Rande mit spröden steifen Vorsten besetzt ist, während die innere zahlreiche blasse Gefäßerweiterungen trägt und außerdem noch häufig Verzweigungen der Geschlechtsorgane. Schlägt man diese Mantelblätter zurück, so entdeckt man zuerst zwei eigenthümliche Arme, die zu beiden Seiten des Mundes angebracht sind. Diese Arme, welche der ganzen Klasse den Namen gegeben haben, sind meistens spiralförmig aufgerollt und bestehen aus einer muskulösen Röhre, die nach beiden Enden hin geschlossen und während des Lebens mit Flüssigkeit erfüllt ist. Auf der Außenseite sind diese Arme mit außerordentlich vielen contractilen Fühlfäden besetzt, welche wahrscheinlich während des Lebens eine bedeutende Fühlerbewegung besitzen. Der Raum zwischen den freien Mantelblättern wird gänzlich von diesen Armen ausgefüllt, die bei verschiedenen Gattungen verschiedene Längen und Aufrollungen zeigen und häufig durch besondere Kallgerüste gestützt sind.

In der Mittellinie des Körpers neben dem Rande, wo die Wurzeln der beiden Arme zusammenstoßen, befindet sich der nach unten gerichtete Mund, welcher nach oben in einen nur kurzen Schlund sich fortsetzt, der innerhalb des Eingeweidebuds in einen weit nach geringen Magen answillt und dann in einen gleichmäßig weiten Darmlanal sich fortsetzt, welcher zwischen den Lebermassen innerhalb des Eingeweidebuds

brere Windungen macht und entweder
der auf der einen Seite zwischen den
nach außen zu sich öffnet. Die Leber
sehr bedeutend und meist in mehrere
gespalten, welche sich mit besondern
ängen in den Darmanal öffnen.

System ist nicht geschlossen, sondern
ien in den Armen, dem Mantel und
Eingeweiden in Verbindung, welche die
neuträumen spielen. Das rundliche Herz
Rückseite des Magens und sendet Arter-
lit dem Gefäßsystem stehen zwei symme-
gefaltete Trichter in Verbindung, welche
den Eingeweideraum, andererseits durch
den Munde nach außen münden, drüsig
weder der Niere der Muschelthiere oder
kanälen der Würmer entsprechen. Diese
ane dienen auch zur Ausführung der
ducte.

venäsystem besteht aus einem über dem
egenen Ganglion, welches die Nerven für
die zahlreichen Schließmuskeln und den
tellappen liefert, und zwei seitlichen, un-
zen, die den vordern Mantellappen und
tel versorgen. Diese Ganglien sind durch
gane zu einem Schlundringe verbunden.
ane sind bis jetzt noch nicht nachgewiesen.
keln bestehen aus vielen queren und
deln. Bei einigen ist der Stiel, durch
angeheftet sind, aus einer bedeutenden,
schlauchähnlichen Röhre eingeschlossenen Mus-
mmengelegt.

d Zwitter, andere getrennten Geschlechts.
hizorgane liegen paarig in der Eingewei-
den bringen mit traubenähnlichen Fort-
en die Mantelblätter ein.

ie Entwidlung bis jetzt bekannt ist, ent-
nen Eiern eine mit Wimperstrahlen versehene,
rümlich gestaltete Larve, welche manchen
sehr ähnlich ist. Einzelne Formen schei-
tbat als Wurmlarven beschrieben worden
Bährscheimlich werden sie in nächster Zeit
rschungen über ihre Entwidlung eher den
ls den Weichtbieren zugetheilt werden und
esondere Ausbildung der ersten insolge
nß betrachtet werden.

nsfächer kommen besonders in den Ältern
er Erde in ungemeiner Häufigkeit vor, und
nimmt um so mehr ab, je mehr wir uns der
Schöpfung nähern. In dem Uebergangs-
leu sie für sich allein mehr als die Hälfte

Weichtbiere, wenn man die Arten berück-
sichtigt sie jetzt kaum ein halbes Procent
ausmachen; und während in den Ältern
die Individuen einzelner Arten so häufig
ie ganze Bänke bilden, so gehören sie jetzt
enem Arten, die nur hier und da vereinigt
sind. Vielleicht indeß beruht diese verhältniß-
mässigkeit zum Theil auch auf dem Umstande,
kräftiger meist nur sehr große Tiefen be-
wo sie weniger zugänglich sind.

ung der Schloßträger (Cardinata).

chale ist mit einem Schlosse versehen.
ie meist durch ein kalkiges, an der
Rückenschale befestigtes Kalkgerüst
Kein After.

Familie der Lochmuscheln (Terebratulida),
us Leisten bestehendes Gerüst ohne Kalkspi-

ralen für die Arme, zwei gewölbte Schalen, wovon die
größere einen durchbohrten Schnabel zeigt, besitzt, gebö-
ren die meisten jetzt lebenden Arten und Gattungen. Bei
der einen abgebildeten Art (*Terebratulina caput ser-*
pentis, Taf. 31, Fig. 5) ist die eine Schale wegge-
nommen, um die Arme zu zeigen; die andere fossile
Art (*Terebratula vulgaris*, Fig. 9) ist Leitmuschel
für den Muschelstall.

Zur Familie der Schmetterlingsmuscheln (*Spi-*
riferida), die ungeheuer spiralig eingerollte Kalkgerüste
der Arme besaß, aber ausgestorben ist seit dem Jura,
gehört die abgebildete Art (*Spirifer speciosus*,
Fig. 7), Leitmuschel der Grauwade. Die Arbeiter
nennen diese flügel förmig ausgezogenen Schalen ver-
steinerte Schmetterlinge.

Den Papagaienmuscheln (*Rhynchonellida*), de-
ren Armerüst zwei parallele Schenkel zeigt und die
noch in den europäischen Meeren Repräsentanten haben,
gehört die abgebildete fossile Art (*Pentamerus*
Knightii, Fig. 8), Leitmuschel in den sogenannten
Pentamerentalken des Devonischen Systems.

Ordnung der Schloßlosen (Ecardinata).

Kein Schloß. After rechts zwischen den
Mantellappen.

Zur Familie der Zungenmuscheln (*Lingulida*), die
von den ältesten Schichten bis auf die Jetztzeit fort-
gedauert hat und hornige, vollkommen gleiche Schalen
und einen gewaltigen Muskelstiel besitzt, gehört die
abgebildete Art (*Entenmuschel*, *Lingula anatina*, Taf.
31, Fig. 6; a Stiel, b Schale), die in der ganzen
Südsee einheimisch ist.

Klasse der Mantelthiere (Tunicata).

(Tafel 31, Figur 24 bis 29.)

Kopfslose, von einem derben Mantel, der
nur zwei Oeffnungen hat zur Einfuhr und
Ausfuhr, gänzlich eingehüllte Thiere. Ein-
sacher Nervenknoten; Herz und Kiemen.
Zwitter.

Der Körper der Thiere ist meist unförmlich, un-
regelmäßig cylindrisch, ei- oder walzenförmig, ohne
alle äußere Anzeichen einer Theilung in besondere
Regionen.

Die äußere Umhüllung des Körpers dieser Thiere
wird stets von einer losen, mehr oder minder derben
Hautschicht gebildet, welche den ganzen Körper wie
ein Sack einschließt und nur zwei Oeffnungen, eine
für die Aufnahme der Nahrungsmittel und des Was-
sers, die andere für den Auswurf derselben besitzt.
Dieser Mantel, welcher bald mehr knorpelig, bald
leder- oder gallertartig erscheint, ist merkwürdiger-
weise dem größten Theile seiner Masse nach aus
wirklicher Holzfasern oder Cellulose gewebt, also aus
einer stickstofflosen Substanz, welche sich weder in
Säure noch in Alkalien löst und dem größten Theile
nach die harten Bestandtheile der Pflanzen bildet.
Die innere Structur dieses Mantels ist sehr genau
erforscht; er besteht hauptsächlich aus einer hellen
Grundsubstanz, in welcher Fasern und Zellen, oft aber
auch verschiedenartig geformte krystallinische Anhö-
rungen von tohlenurem Kasse sich finden. Von den
beiden Oeffnungen, welche im Mantel vorhanden sind
und die bald einander gegenübergestellt, bald genäbert
sind, führt die eine, die Einfuhröffnung, stets in die
Athemhöhle, aus deren Grunde sich erst der Eingang
in den Darm, der Mund, befindet. Es ist also für
alle diese Thiere charakteristisch, daß das Athemorgan
die Kieme, sich in ähnlicher Weise wie bei den Wir-

belstieren am Anfange und vor dem Eingange in den eigentlichen Schlund ausbildet. Bei den gemeinschaftlich lebenden Seefischen fließt die äußere Mantelschicht der einzelnen Individuen zusammen, so daß eine gemeinschaftliche Gallertballe gebildet wird, in welcher die einzelnen Thiere stecken und aus welcher sie ziemlich leicht gelöst werden können. Die Auswurföffnungen sind bei vielen dieser Thiere so gestellt, daß sie in eine einzige Kloake münden, während jedes seine besondere Einnahmeföffnung besitzt.

Die leßtern Mantelthiere leben entweder in Colonien oder vereinzelt und meistens am Boden festgeheftet. Ihre einzige Bewegungsthätigkeit beschränkt sich in diesem Falle auf Oeffnung und Schließung der Oeffnungen ihres Mantels und meist nur geringe Zusammenziehungen desselben. Die Freilebenden sind Schwimmer und bewerkstelligen dies auf eigenthümliche Weise. Sie schluden nämlich das Wasser mit bedeutender Heftigkeit ein, und indem sie es mit ebenso großer Lebendigkeit wieder auspressen, werden sie durch den Rückstoß des ausströmenden Wassers vorwärts getrieben. Es werden diese Schlundbewegungen bei denjenigen Individuen, welche in Ketten vereinigt sind, gemeinschaftlich ausgeführt, und bei den Feuerzäpfen, wo viele Individuen gemeinschaftlich in einem schwimmenden Mantel stecken, von diesem Mantel selbst bewerkstelligt.

Das Nervensystem der Mantelthiere besteht immer nur aus einem einzigen größern Nervennoten, welcher stets in der Nähe der Einnahmeföffnung des Mantels auf der Rückenfläche sich befindet. Bei den Salpen liegt auf diesem Nervennoten, der fast die Gestalt eines Kessels hat, unmittelbar das einzige Auge auf, welches meist von dunkelrothem Pigment umgeben ist. Bei manchen Seefischen hat man in der Umgebung der Mantelöffnungen, die durch einen Stern dreieckiger Franzen geschlossen werden können, ebenso viel gelb gefärbte Flecken wahrgenommen, als Franzen vorhanden sind. Man hat zwar diese Flecken für Augen erklärt, ohne aber genauere Beziehung zum Nervensystem nachweisen zu können. Große Augenanlagen, die aber rückgebildet werden, finden sich bei den Larven der Seefische. Hörorgane sind zweifelhaft. Als Tastorgane mögen die Franzen und Lippen an den Oeffnungen dienen.

Der Darmanal ist bei den meisten Mantelthieren nur unvollständig entwickelt. Die Einnahmeföffnung des Mantels führt in einen sehr geräumigen weiten Sack, welcher die Kiemen enthält und an dessen Bauchseite eine von zwei flimmernden Falten umgebene Rinne, die Bauchrinne, welche von einem festen, im Mantel gelegenen Stabe, dem Endostyl, gestützt ist, gegen den Mund hinführt. Ganz im Hintergrunde dieses Sacks findet sich meist ziemlich verborgen die einfache, schlipartige, stets waffenlose Mundöffnung, welche in einen gewöhnlich dünnhäutigen Darm führt, der mehr oder weniger deutlich in einen Magen und einen ausführenden Darm zerfällt. Der Darmanal selbst ist meist mehrfach gewunden und öffnet sich in die Mantelhöhle, von wo aus die Excremente durch die Auswurföffnung ausgestoßen werden. Die Endigung des Darmanals, der eigentliche After, befindet sich auf diese Weise oft ziemlich weit von der Auswurföffnung des Mantels, und zwischen diesen beiden Oeffnungen ist ein ziemlich weiter Raum, eine wahre Kloake, in welche außer den Excrementen die Producte der Geschlechtstheile, Samen, Eier und Junge, entleert und später durch die Mantelöffnung ausgeworfen werden.

Keinem Mantelthiere fehlt eine Leber, sie ist in:

deß in Verhältniß zu den übrigen Thieren äußerst gering entwickelt. Sie besteht aus einer gelblichen oder bräunlichen Masse, welche die Wandung des Darmkanals bildet, und welche zeigt sich ein Packet kurzer, bräunlich-gelbe Fasern besitzend, welche ausgesprochen werden.

Das Blutgefäßsystem der Mantelthiere ist sehr einfach entwickelt und die Bewegung desselben in eigenen schlauchförmigen Herzen entweder in der Nähe des Athemwerzeugs tief im Grunde des Körpers liegt. In manchen aus gehen Blutströmungen, die in den Nerven ohne Wandungen verlaufen, und überall in den Zwischenräumen der Kiemen verbreiten. Werthwichtig ist auch, daß aber der Umstand, daß bei allen Thieren die Richtung des Blutstroms periodisch ist, das Herz, welches sich wurmförmig fortbewegt, zieht, macht eine gewisse Anzahl von Umdrehungen der Richtung von hinten nach vorn, und plötzlich still und beginnt darauf wieder, aber in der Richtung von vorn nach hinten. So wechselt es in unregelmäßiger Zeit oft von mehreren Minuten, ab und an, und sieht man das Blut abwechselnd von hinten nach vorn strömen, dann stoden und hierauf wieder in die Richtung des Blutstroms folgen. Bei den durchsichtigen Thieren kann man sich sehr leicht über verschiedene Richtungen des Blutstroms im Herzen angegeben werden, und daß er aus dem Herzen aus fortgeschoben wird, und nach und nach durch die Kiemenöffnungen fortplant. Man kann aber bei Thieren durchaus nicht von Arterien und ab- und zuführenden Gefäßen sprechen, da die Richtung des Blutstroms in den Gefäßen nicht constant ist.

Die Athemwerkzeuge sind bei den Thieren in hohem Grade entwickelt und nach manchen Typen gestaltet. Bei den Salpen wird Wasser durch die Aufnahmeföffnung in einen weiten Kiemenack, dessen ganzes Innere von einem Gitterwerke ausgestellt ist, Maschen zeigt und wo jede Masche ein feines, schwingendes Wimperbaaren auskleidet, das Wasser durch den Wimperbaaren in den Kiemenack hinein. Jede Masche bildet eine kleine Kloake sammelt und durch die Mantelöffnung ausgestoßen wird. Bei den Salpen bildet der Kiemenack den größten Theil des Körpers und die Kieme hat die Gestalt eines Netzes, der schräg von oben nach unten nach hinten in dem Sack ausgepannt ist. Der Kiemenack ist vollkommen glatt, aber rundum mit flimmernden Rippen besetzt, welche eine große Zahl von Gefäßen durch das Wasser hindurch in den Kiemenack führen und wird hinten wieder ausgeworfen.

Alle Mantelthiere sind Zwitter, d. h. außer durch geschlechtliche Zeugung, auch durch Kriosporen, theilweise selbst durch Kriosporen und Eierstöcke stellen beide Geschlechter dar, welche gewöhnlich an dem Darmkanal geheftet sind, und entwickeln sich nach dem Auswurf der Eier, so daß es einer mikroskopischen Prüfung nach dem Inhalte die Organe zu untersuchen, gattungsgorgane fehlen durchaus. Befruchtet jedes Individuum seine eigene

in hervorgebrachten Samenthierchen. Die
g des Embryos sowie die Art und Weise
anzung ist bei jeder einzelnen Ordnung so
ch, daß wir sie bei diesen behandeln werden.

ung der Seescheiden (Ascidiae).

ungen genähert, das Ganglion zwischen. Kiemensack mit Kiemenpalten.

nung besteht aus völlig unsymmetrischen
ren beide Mantelöffnungen meist sehr nahe
zerückt sind. Sie sitzen alle entweder auf
oder in einem schwimmenden Mantel fest
häufig Colonien von schwammartigem An-
oft mit den lebhaftesten Farben geziert sind.
ahmöffnung des Mantels befindet sich
nem vordern Ende des Thiers und ist fast
d oder eiförmig; sie kann durch zadenförm-
en geschlossen werden, die gewissermaßen
on Neuse bilden, durch welche das in die
ntretende Wasser durchgeleitet wird. Die
öffnung des Mantels liegt meist auf der
fläche in geringer Entfernung von der Auf-
ung; zwischen beiden ist der Nervennoten
. Die Aufnahmöffnung des Mantels führt
eiten, ringsum gegitterten Kiemensack, dessen
eiförmig sind und auf dessen Grunde sich die
Mundöffnung befindet. Auf der Bauch-
es Kiemensacks befindet sich ein äußerst
mernder Halbkanal, welcher die Bestimmung
heint, die mit dem Wasser in den Kiemen
a Nahrungstoffe nach dem eigentlichen
zuleiten. Der Darmkanal, der im Grunde
sacks beginnt, zeigt stets eine oder mehrere
ruiige Biegungen und öffnet sich meist in
ntfernung von der Auswurfsöffnung des
n die Kloake. Hoden und Eierstock sind
in einander verbunden, und ersterer öffnet sich
ch einen längern gewundenen Kanal eben-
ie Kloake, wo auch die Eier so lange ver-
en die Larve in ihrem Innern vollständig
. Das Herz liegt bei den Seefischen bald
runde des Körpers, bald mehr nach vorn,
Kiemenjade; es ist an beiden Enden offen
die farblose Ernährungsfähigkeit in allen
umen der Organe umher, ohne daß man
Kanäle oder Gefäße unterscheiden könnte.
Pflanzung ist in der letzten Zeit mit großer
studirt worden. Die Eier erhalten schon
de besondere Hüllen, die mit der Mantel-
Beziehung stehen. Dann sieht man die
minder entwickelten Eier, welche aus einem
lichen Dotter, einem hellen Keimbläschen
diden strukturlosen Hülle bestehen, neben
urfsstoffen in der Kloake sich sammeln, wo
groß werden, daß sie eine Art Bruchstük-
der ganze Dotter spaltet sich, bildet einzelne
bald unterhebt man einen kugelförmigen
an dessen einer Seite ein langer Schwanz-
gen ist. Dieser Schwanz löst sich nach und
und der Embryo besteht nun aus einem ei-
Körper, von einer glas hellen Hülle, dem
antel, umgeben, und einem langen Schwanz,
n hinein sich die gelbe Dottersubstanz fortsetzt.
tischenförmige Bewegungen dieses Schwanzes
die Larve, die nun aus der Kloake in das
t, im Wasser umher, setzt sich dann später
n fest, verliert den Schwanz und wandelt
ine Seefische um. Nur selten fehlt der
(Molgula); meist besitzt die Larve saugnapf-
förmige, 2. Aufl. — Zoologie.

artige Verlängerungen des Dotters an die Oberfläche der Mantelhülle, durch welche sich die Larve temporär anheften kann. Die definitive Anheftung geschieht durch die untere Fläche des Mantels neben dem Schwanz.

So verhält sich im allgemeinen die äußere Form-
entwicklung bei den einfachen Ascidien. Anders ver-
hält es sich bei vielen zusammengefügten See-
schnecken, wo viele Thiere gemeinschaftlich unter einem und dem-
selben Mantel stecken und ihre Auswurfsoffnungen in
gemeinschaftliche Kanäle münden, in verzweigte Kloten-
ten, die in einer einzigen großen Oeffnung zusammen-
fließen. Bei diesen zusammengefügten See-
schnecken stehen die einzelnen Thiere sternförmig um die ge-
meinschaftliche Kloakenöffnung, und dieser Bildung ent-
sprechend entsteht in dem Ei aus dem einfachen Dotter
nicht ein Embryo, sondern ein Kreis von Embryonen
mit einer gemeinschaftlichen Kloakenöffnung. Man
sieht den Dotter, ebenso wie bei den einfachen Eiern,
sich spalten, Zellen bilden, dann findet man einen ein-
fachen Dotterkern mit umgeschlagenem Schwanz, der
sich bald ablöst. In der Mitte dieses geschwänzten
Dotters, der sich ebenso bewegt wie ein einfacher
Embryo, bildet sich nun die hervorstechende gemein-
schaftliche Kloakenöffnung, umgeben von einer gewissen
Anzahl von Hödern oder Würschen, deren jedes all-
mählich zu einem besondern Thiere auswächst. Der
Embryo im Ei zeigt also schon die ursprüngliche ge-
sellschaftliche Colonie, welche sich dann durch Sprossen-
bildung weiter ausdehnt. In ähnlicher Weise enthält
bei den Feuerzapfen jedes ausgebildete Ei vier Zunge,
welche gemeinschaftlich im Stern um eine mittlere
Achse herumstehen und die Grundlage des ganzen
Zapfens darstellen.

Wenn diese äußere Formenbildung schon auffallend genug ist, so erscheint die innere um so interessanter, als hier eine unverkennbare Analogie mit den Wirbelthieren in der ersten Anlage sich darstellt. Es bildet sich nämlich eine auf der Außenfläche des Embryo geöffnete Rückenfurche, die sich durch allmähliche Schließung zu einem centralen Nervenstämme, ähnlich den Hirn- und Rückenmarksanlagen der Wirbelthiere, gestaltet, und unter derselben ein Zellenstrang, welcher der Wirbelsäule (*Chorda dorsalis*) entspricht. Der Hohlraum bildet sich allein aus und zeigt Anlagen eines Auges und Ohres. Er steht noch lange durch eine Oeffnung nach außen, die zugleich Mundöffnung wird, mit dem Anfange des Darms und der Mantelhöhle in Verbindung, verklümmert aber allmählich zum Ganglion. Die dem Rückenmark entsprechende Anlage, die nebst der Chorda in den Schwanz sich erstreckt, wird mit dieser bei der Umwandlung abgeworfen. Die Kiemen entstehen ursprünglich als einfache Spalten in ähnlicher Weise wie bei dem Amphioxus, vermehren sich nach und nach und bilden so den Kiemensack. Erst später brechen die Ein- und Ausführoffnungen nach außen durch. Es zeigt sich demnach bei der Entwicklung der Seecheiden aus dem Ei im ersten Anfange eine unverkennbare Analogie mit dem Wirbelthiertypus, aber mit dem großen Unterschied, daß bei den Seecheiden diese Wirbelthieranlagen baldigst abgeworfen, bei dem Wirbelthiere dagegen weiter gebildet werden.

Außer der Fortpflanzung durch einfache oder zusammengefestigte Embryonen kommt bei den gefelligen und zusammengefügten Seecheiden die Fortpflanzung durch Knospen ziemlich häufig vor. Es bilden sich an dem Grunde dieser Thiere Ausläufer des Mantels in Form von hohlen Wurzelfasern, in welche hinein die Blutströmung sich fortsetzt. In den knospenförmigen

Enden dieser Wurzelsfasern sammelt sich eine granulirte Masse an, welche immer mehr wächst und bald die Form einer Seescheide erkennen läßt, die mit dem mütterlichen Körper verbunden bleibt. Bei den Feuerzapfen findet sich in ähnlicher Weise wie bei den Salpen ein Keimstock, auf dem Embryonen sich durch Knospung bilden.

Die Schwanzscheiden (Appendicularia) stellen den Larvenzustand permanent dar. Sie besitzen eine äußerst durchsichtige große Hülle; der Kiemensack hat nur wenige Kiemenpalten und der Körper behält zeitlebens den langen Larvenschwanz, mit dem sie im Meere schwimmen.

Die Familie der einfachen Seescheiden (Ascidida) bildet meist unförmliche wuzige Körper von knorpeliger Härte, auf deren Außenfläche sich alle mögliche Arten kleinerer Thiere anheften, sodaß man oft Mühe hat, an der schwammigen Ungehalt die beiden Mantelöffnungen und überhaupt die ganze thierische Natur zu erkennen. In dem dicken Mantelsack liegen die Eingeweide neben dem weiten Kiemensack auf einen gemeinschaftlichen Anäuel zusammengedrängt. Die einfachen Seescheiden bilden niemals Ansläufer oder Knospen wie die geselligen, sondern pflanzen sich nur durch Eier fort. Wir bilden eine Art aus dem Mittelmeere ab (Wurzenseescheide, *Cynthia papillosa*, Taf. 31, Fig. 28), die nur die beiden Oeffnungen erkennen läßt, und eine andere durchsichtige Art aus dem norwegischen Meere (*Rhopalasia*, Fig. 27), bei welcher man durch den Mantel hindurch die feinen zur Zusammenziehung dienenden Muskelstreifen, den Kiemensack, den im Grunde des Körpers gelegenen Eingeweideanäuel und den Afterdarm in der Kloake rechts unterscheiden kann.

Die Keulenscheiden (Clavellinida), mit gestielten Körpern, aus deren Wurzelsäften oder Stämmen neue Individuen durch Sprossung entstehen, die aber selbständig sind, bilden den Uebergang zu den zusammengefügten Seescheiden (*Ascidia compositae*), die gemeinsame Stöcke von meist schwammiger oder lederartiger Beschaffenheit bilden, welche wie gefärbte Gallertklumpen die Oberfläche der Körper in dem Wasser überziehen und meist sich auf Steinen oder auf Seepflanzen festsetzen. Berührt man einen solchen Klumpen, der wie eine leiblose, halbweiche, lederartige Masse erscheint, so spritzen plötzlich aus einer Menge von Oeffnungen desselben feine Wasserstrahlen empor. Betrachtet man nun den Klumpen genauer, so unterscheidet man bald die einzelnen Aufnahmeöffnungen der Thiere, welche meist sternförmig um die gemeinschaftlichen Kloakenöffnungen gruppiert sind, aus denen das Wasser bei der Zusammenziehung hervorgespritzt wurde. Die Thiere steden mehr oder minder sentrecht in den schwammförmigen Massen und haben meist eine cylindrische oder spinselförmige Gestalt, die gewöhnlich von oben nach unten drei Abtheilungen erkennen läßt. Der obere weitere Theil des Körpers enthält den Kiemensack und die Kloake, der mittlere die Schlinge des Darmanals, der untere oft stabförmig verlängerte Theil die Windungen der traufenförmigen Geschlechtstheile und im tiefsten Grunde das Herz. Diese einzelnen, oft wohlgeschiedenen Abtheilungen schieben sich indeß bei manchen Gruppen von Gattungen so zusammen, daß endlich das Thier nur eine einfache eiförmige Masse darstellt, in welcher an den Seiten und am Grunde des Kiemensacks Darmschlinge, Geschlechtstheile und Herz zusammengedrängt sind. Die abgebildete Art (*Golddotryll*, *Botryllus genneus*, Fig. 29) findet sich im Ocean und Nordmeer auf Tangblättern.

Familie der Feuerwalzen (*Pyrosoma*) findet häufig in den südlichen Meeren gallertartige, zuweilen fußlange Kette die Gestalt eines Tannenzapfens haben, deren innere Höhlung zeigen, die eine Leuchte an dem breiten Ende besitz. Der Leuchter langsam mit abwechselnden Zusammenziehungen, welche er das Wasser aus seinem Kiemensack herauszieht. Bei Nacht leuchtet er in vollem Glanze, während des Tages. Das Leuchten beginnt mit Pünktchen und verbreitet sich dann über die Oberfläche des Zapfens, bis er ganz und gar unterleuchtet man einen solchen Zapfen, so glaubt man, daß er nur einen gemeinlichen Leuchter darstellt, daß seine innere Höhle nur eine große Kloake, und seine Oeffnung die Kloakenöffnung ist. ungemein große Anzahl kleiner Thiere im Mantel steden und den Seescheiden im Inneren (Einzeltiere einer Feuerwalze, *Pyrosoma*, Taf. 31, Fig. 26.) Ihre Cinnabmöffnungen auf der Außenfläche des Cylinders, gerade gegenüberstehende After in der Mitte des Zapfens einmündet. Es besitzen diese Thiere einen weiten gegitterten Kiemensack, wie die Seescheiden, dessen Grunde das Herz, der gewöhnlich der sehr große kugelige Eierstock und eine artig zusammengelegten Blindläden gebildet. Links ein Zapfen, der Keimstock, der die Zunge bilden. In der Kloake nicht nur die Thiere, sondern auch die Thiere, welche zusammengeklebt erscheinen. Sehr dicht an der Außenfläche des Kiemensacks der große Mund mit einem aufsteigenden Auge. Links ist der Kiemensack, nähern sich die Thiere Seescheiden, mit welchen sie auch in der Zusammenziehung übereinkommen, während der Ortsbewegung, der leuchtende Eingeweide nur Leber, Darm und Eierstock theilen und die Gegenstellung der Cinnabmöffnungen und der Thiere, die Cinnabmöffnungen eines Auges sie den Seescheiden.

Ordnung der Walzenscheiden (Biphora).

Auswurfsoffnungen gegenüberstehend, generationswechsel durch Knospung, Keimstocke. Kiemen stab: oder...

Die Ordnung begreift nur schwammig-glasscheller Durchsichtigkeit, welche meistens in den Meeren sehr häufig vorkommen. In der Mitte des Körpers wird von einem länglichen, verhältnißmäßig spitzen und anhängen, der fadenförmig gebildet, der deutlich aus einer äußeren Schicht und einer inneren Hautschicht besteht. Bündel oder krantzweise Bänder an der Außenfläche der Eingeweide sind in einen kleinen, zusammengebrängt, den man den Kiemensack nennt und der meist eine rothe oder blaue Farbe hat und in der Nacht im rothgelbem Lichte leuchtet. An dem Ende des walzenförmigen Körpers befindet sich ein beweglicher Lippen umgebene Oeffnung, die einen weiten Kiemensack führt. Hinter der Außenfläche ist der meist runde Mund, der sich in schiefer Richtung nach unten gegen den Kiemensack öffnet. Seine hintere Anheftungstelle ist in der Mitte, welches auf seiner Außenfläche eine Leuchte zeigt, die mit lebhaftem...

find. Auf der Rückenfläche, und zwar an der Stützungsstelle des Kiemenballens, sieht man den Nervenknoten mit seinen nach allen ausstrahlenden Nerven und dem unmittelbaren, von dunkelbraunrothem Farbstoffe umgebenen Auge. Auf der Bauchfläche des Kiemenknotens sieht man eine ähnliche Rinne mit bläulichgelbem Inhalt, wie wir sie schon bei den Seeanemonen, und noch außerdem vorn an dem Kiemenknoten schlingenförmig gewundene Kiemenblätter, deren Bedeutung noch nicht weiter ergründet ist.

Die runde, roth oder gelb gefärbte Eingeweidehöhle, die vom dem Darmkanal, der Leber, den Nieren und dem Herzen gebildet wird. Der Mund öffnet sich in der Nähe der hinteren Öffnung des Kiemenknotens als ein ovales Loch, welches in den einfachen Darmkanal, welcher von der Leber und den Geschlechtsorganen durch den gleichsam in dieselben eingetragenen Kanal, sehr schwer hält, diese einzelnen Eingeweide zu isoliren.

Die Walzen scheiden schwimmend in zwei verschiedenen gesellschaftlichen Zuständen: theils bilden sie Ketten, in der Art, daß ein Individuum durch die Spitzentheile des Körpers oder mit den Seiten aneinander verbunden, sodaß man in dem Meere ein langes Band sieht, welches mit einer großen Anzahl von Kernen in abwechselnden Reihen besetzt ist, theils, welche zu einer solchen Kette gehören, in das kalte Wasser ein, um es durch die Bewegung wieder auszutreiben, und so bewegt sie sich stöße weise fort. Ein Thier, welches einer Kette losgerissen ist, kann sich nicht mehr mit den übrigen vereinigen, denn es bleibt mit seinen Geschlechtsorganen durch verhärteten Schleim zusammen. Außer den Ketten verbundenen Individuen gibt es aber auch Walzen, die niemals und unter keinen Umständen zu Ketten verbunden gefunden werden, in ihrer Gestalt nicht mit den verkettenen Individuen vereinigen. Man hat aus diesen eine eigene Gattung, bis man in der neuern Zeit entdeckte, daß diese Ketten und vereinzelter Individuen, wenn auch in ihrer Form, dennoch nur sehr verschiedene Entwicklungsstadien einer und derselben Art sind. Man findet nämlich bei allen Walzen in der Nähe des Herzens eine Art Knospe, oder einen Knospen, in welchem ein starker Blutstrom aufsteigt, der anfangs nur höchst unbedeutend ist, nach einiger Zeit bemerkt man auf diesem Erhabenheiten wie Würzchen, die nach und nach wachsen und nun einen Kreis von Embryonen bilden, welche um den Zapfen herum gelagert sind, theils bildet also dieser Zapfen einen wahren Ast, der Stolo, bestimmt durch Knospung zu entstehen, und es ist diese Knospung äußerst problematisch, man oft drei oder vier hintereinander aneinander liegenden Embryonen verschiedenen Alters und demselben Individuum um den Knospen Knospen geschlungen sieht. Diese Successionen trennen sich nach einiger Zeit, wenn die Embryonen die Größe erlangt haben, von dem Zapfen ab, und schwimmen nun als Ketten umher. Es ist leicht aus dieser Art der Entwicklung, daß die Ketten, welche von Anfang an zusammenhängen, die einzelnen Individuen alle dieselbe Art sind: sie sind Producte derselben gemeinsamen Knospung.

Einzelnen Individuen pflanzen sich nur durch

Knospung fort, und man wird deshalb selten ein solches Individuum treffen, welches nicht eine oder mehrere Ketten von Embryonen an seinem Knospenzapfen umherträgt. Die verkettenen Individuen dagegen bezeugen eine geschlechtliche Zeugung, durch welche jedes Thier nur einen einzigen Embryo erzeugt. Schon während der Zeit nämlich, wo die verkettenen Thiere noch in ziemlich unentwickeltem Zustande um den Knospenzapfen geschlungen sind, bildet sich an ihrer Rückenfläche ein Ei aus, welches nach und nach so sehr anwächst, daß es weit in die Kiemenhöhle hineinragt. Neben diesem Ei bildet sich eine Art Mutterluche (placenta) aus, ein runder Körper, welcher einen lebhaften Blutzufluß erhält und mit dem auf der andern Seite die Blutcirculation des werdenden Embryos in Verbindung steht. Neben diesem Mutterluche findet sich im embryonalen Körper noch ein zweites räthselhaftes Organ aus einzelnen Zellen zusammengesetzt, das man den Ektoblasten (Ektoblast) genannt hat und das während des Auswachsens des Embryos allmählich verzehrt wird. Die genauere Entwicklung des Embryos selbst ist noch nicht im einzelnen bekannt; obgleich man häufig junge verkettenete Walzen findet, welche Embryonen enthalten, die noch durch den Mutterluche mit dem Mutterthiere verbunden sind. Ueberhaupt hat auch die Entstehung und Befruchtung eines Eies in noch nicht entwickelten Thieren manches Räthselhafte.

Wie dem auch sei, so ist doch so viel festgestellt, daß jede Art von Salpen aus zwei abwechselnden Reihen von Individuen zusammengesetzt wird: aus verkettenen und vereinzelter Thieren. Jedes vereinzelter Individuum erzeugt durch Knospung Ketten, und jedes in einer Kette befindliche erzeugt wieder einen vereinzelter Embryo, der während seines ganzen Lebens vereinzelter bleibt.

Wir bilden von einer im Mittelmeere häufigen Art (*Salpa pinnata*), deren Darmkanal nicht verknäuelst ist Taf. 31, Fig. 24 ein Einzelindividuum ab, das rechts den Keimstock mit den Jungen zeigt, und Fig. 25 ein Kettenindividuum, welches in der Kiemenhöhle links einen Embryo enthält.

Noch complicirter erscheint die Knospung bei den Tonnen salpen (*Doliolum*), auf die wir nicht näher eingehen.

Klasse der Moosthiere (Bryozoa).

(Tafel 31, Figuren 30 bis 33.)

Polypenähnliche, meist Thierstöcke bildende Thiere mit stielartigen Fühlfüßen, einfachem Nervenganglion und getrenntem Verdauungsapparat, der Mund und After besitzt.

Die Moosthiere sind kleine polypenähnliche Thiere, welche fast immer Colonien bilden und unter allen Umständen von Zellen umgeben sind, in welche sich die Thiere bald vollständig, bald nur theilweise zurückziehen können. Oft sind diese Zellen nur hornig oder biegsam wie Pergament, ja sogar zuweilen sehr zarthäutig und gallertartig; oft stehen sie auf eigenen Stielen, welche sich aus einem Netzwerk von Röhren erheben, das durch Ausläufer sich weiter verbreitet und bald wie die Wurzelstöcke gewisser Pflanzungen auf dem Boden hinkriecht, bald auch sich erhebt und dann meistens baumartig verästelt sich zeigt. In den meisten Fällen aber, und namentlich bei den im Meere lebenden Moosthiern, sind die Zellen kältiger Natur. Es finden sich indeß in diesen Zellen niemals Strahlen oder innere Scheidewände, ähnlich denen,

welche in den Korallen vorkommen, und in vielen Fäulen sieht man außer an denselben Spigen, Stacheln und Hörner, welche ganz constant sind und sehr wohl zur Unterscheidung der Arten benutzt werden können. Die Zelle selbst ist stets von der Haut des Thiers in der Weise ausgekleidet, daß dieses gewissermaßen einen doppelten Sack bildet, wodurch eine eigene Leibesöhle hergestellt wird, welche mit den Fingerringen im Zusammenhang steht und in der der Darmkanal frei aufgehängt erscheint.

Da alle Moosthiere ohne Ausnahme zusammengefestete Colonien bilden, so kann von eigentlichen Ortsbewegungen keine Rede sein. Doch hat man bei einigen Süßwassermoostthieren, deren zusammengefesteter Polypenstod nicht festgewachsen ist, ein sehr langsameres Fortgleiten des ganzen Stocks beobachtet. Die Bewegungen der übrigen Moosthiere beschränken sich auf das Ausbreiten ihrer Fingerringe, sowie auf das Entfallen und das Zurücksiehen ihres Körpers in die Zelle. Zu diesem letztern Zweck sind wohlausgebildete Muskelbündel vorhanden.

An den Stöcken finden sich häufig besondere Bildungen, welche als un- oder rüdgebildete Individuen betrachtet werden können; kugelige Eizellen, welche Brutindividuen sein mögen; Kapseln mit langem, peitschenförmigem, willkürlich bewegtem Fortsatz (Vibracula), und endlich die sogenannten Avicularien. (Zaf. 31, Fig. 32, Crisia). Es sind Zangen oder Greiforgane, die einem Vogelfoppe nicht unähnlich sehen, indem sie einen starken oberen und einen dünnen untern Zangenarm besitzen. Bei einigen Gattungen haben diese Vogelfopporgane einen besondern Stiel, bei andern nicht. Diese Organe sind in beständiger, pendelartig schwingender Bewegung, während zugleich die Zange von Zeit zu Zeit geöffnet und geschlossen wird, was durch deutliche Muskelbündel geschieht.

Der Nervenknoten, welcher bei vielen Moosthiere erkannt ist, liegt in unmittelbarer Nähe des Mundes auf der Rückenfläche, zwischen diesem und dem After. Er ist sehr klein und scheint bei einigen aus zwei seitlichen Hälfen zusammengesetzt. Außerdem soll noch ein besonderes Colonialnervensystem in den Wurzeln einiger Thierstöcke existiren. Augen- oder Ohrenbläschen fehlen durchaus.

An dem Vorderende des Körpers befindet sich bei allen Moosthierchen ein Kreis lebhaft flimmernder Fingerringe, deren jeder eine hohle, mit der Leibesöhle in Verbindung stehende Röhre darstellt, in welcher durch innere Wimperbewegung die Flüssigkeit, welche die Leibesöhle erfüllt, auf- und niedergedrückt wird. Der Strudel, der die äußeren, auf diesen Fingerringen befindlichen Wimpern im Wasser erregen, treibt die Nahrungstoffe, kleine Thierchen u. s. w. im Grunde des Fühlertranzes zusammen und nach dem dort befindlichen Munde hin. Es sind also diese Fühler wesentlich zum Haschen der Nahrung bestimmt, wenn sie auch nebenbei durch das stete Wechseln des Wassers auf der Oberfläche, mittels der Flimmerströmung, als Athemwerkzeuge dienen können, die im übrigen den Moosthierchen ganz abgehen. Zwischen diesen Fingerringen, welche bald einfach in einem Kreise stehen, bald auch von zwei seitlich angebrachten Armen getragen werden, befindet sich der Mund, der bald von einer Klappe geschlossen werden kann, bald meist in eine weite flimmernde Mundhöhle und von da in einen muskulösen, oft kugelig verdichteten Schlund führt. Der Magen liegt im Grunde der Leibesöhle und stellt einen meist bündelartigen Sack dar, der sich nach vorn in einen Darm fortsetzt, welcher sich in einen an dem vordern Ende außer dem Fühlertranz neben

dem Munde befindlichen After mündet. Der After bildet also eine förmliche Seitenöffnung, welche sich am vordern Ende des Darmkanals befindet und unterseidet sich dadurch wesentlich vom Kanal der eigentlichen Polypen und Leibesöhle, während er sich demjenigen nähert.

Die ganze äußere Fläche des Moosthierchens ist mit einem aufgehängten Darmschlauche wie ein Netz besetzt, welches die Flüssigkeit, welche diese Höhle erfüllt, in die äußere Fläche des Darmrohrs jenseits der Leibeswandung ist mit dem Darmrohre verbunden, welche äußerst lebhaft flimmern und so die Strömung der Flüssigkeit erzeugen, welche derselben Richtung vor sich geht und in die Wurzelröhren der Colonie fortsetzt. Diese Strömung dient statt eines eigentlichen Verdauungsorgans, denn der Darm ist durchgängig.

Die Moosthiere sind Zwitter; die Geschlechter sind getrennt, bilden sich aber nicht aus. Ihre Fortpflanzung ist sehr verschieden, trotz vieler Studien noch nicht vollständig. Bei vielen entstehen aus den Eiern kugelige Larven (Cyphonautes), die man sich zuerst anfangs und aus welchen sich die Larven nach vollständiger Auflösung der inneren Organe entwickeln. Bei andern entsteht eine fertige Embryo, der einen Flimmertranz und Knospung einen Zwilling, und beide werden abfallen des Flimmertranzes frei; so bildet sich ohne Auflösung der inneren Organe eine Larve, welche sich später zu einem Thierchen entwickelt. Außer äußerer Knospung, die an bestimmten Stellen oder regellos geschieht, giebt es Stöcke ihre Form gibt, kommen auch kleine Knospen vor, sogenannte Statoblasten, die in dicken, uhrglasförmigen Schalen eingeschlossen im Winter überleben und im Frühjahr zu neuen Thierchen aus den plagen den Schalen schlüpfen.

Es gibt Moosthiere im süßen und salzigen Wasser — in erstem aber nur wenige Arten. Sie häufig die Gegenstände, sogar lebende, mit seinen Krusten, bilden aber nie große Colonien. Man theilt sie in zwei Ordnungen: Stomatopoda (Stomatopoda) ohne Klappe über dem Munde, die Fühler kreisförmig gestellt, die Zellenmündung häufig durch eine verschließbar oder mit einem Vorhänge versehen. Die meisten sind Meeresthiere. Hierher gehören die Crisia (Fig. 33), die ein spindelförmiges Thierchen macht, sowie die Art aus den europäischen Gewässern Crisia avicularia (Fig. 32), von welcher Zellen vergrößert abbilden, um die Avicularien zu zeigen.

Die Armwürbler (Lophopoda) tragen auf einem mehr oder minder in Fühlertranz gebildeten Lappen, besitzen eine Klappe, die die Mundöffnung verschließen können, und die Fühlertranz noch Eizellen oder Vibracula, die sie weiche, niemals Kaltzellen, setzen die Statoblasten fort und bewohnen meist das Meer, wo sie besonders gern sich auf Holz niederlassen. Wir bilden eine Art aus dem Mittelmeer ab (Wuschelfuß, Lophopus cristatus), die eine gemeinschaftliche Gallerthülle bildet, die eine gemeinschaftliche Gallerthülle bildet. Eine Art aus dem belgischen Meere (Pectinaria, Fig. 31), die den Stod mit einem dicken und gestielten Individuen zeigt.

Kreis der Würmer.

(Vermes.)

Die Thiere mit mehr oder minder symmetrischer Anlagerung der Organe in eine senkrechte Mittelebene, mit einem Mund und Tendenz zur Ausbreitung der Glieder von gleichem Werthe (Symmetrie).

Charaktere des an Formen äußerst reichen Kreises sind, daß sie sich nicht gebend, und es ist wahrscheinlich fortgesetzte Untersuchungen zu einer genaueren Feststellung führen. Es zeigen sich die verschiedenen Anknüpfungspunkte: zu den Gliederthieren (Polychaeten), in denen die Symmetrie der Körperanlagen, Gliederung in gleichwerthige Theile (Zoniten), innerhalb welcher sich die verschiedenen Organe wiederholen, durch die Bildung, bei Ringelwürmern, einer Ganglienkette längs des Körpers, welche mit einem Schlundring und einem Ganglion in Verbindung steht, durch die Anknüpfungspunkte, welche freilich niemals gegliedert werden; und zu einigen Weichthieren (Mollusken), welche Larvenformen, welche Wimpertränze überhaupt durch die weite Ausdehnung der Bewegung bei manchen Klassen; zu manchen Insekten, wie Stachelhäutern und selbst Insekten, die die geringe Ausbildung der innern Organe, manche innern Eigenthümlichkeiten. Alle Eigenschaften und Verwandtschaften kommen aber in Klassen und Gruppen, nicht der Gesamtheit, sondern eben so hat keine spezifische organische Bildung. B. die der Excretions- oder Wassergerichte der geschlossenen Blutbahnen, des Hautmuskels u. s. w., allgemeine Verbreitung in dem Thierreich, sodaß von einer Charakterisirung durch Abstände genommen werden muß. Ebenso wie die Ausbildung der erwachsenen Thiere ist die Vorgänge der Entwicklung und der Larven, welche sich sogar oft nicht bei den einzelnen, geschweige denn bei dem ganzen Kreise gemeinsamen Typus zurückführen lassen — es, daß der Kreis überhaupt verschiedene ursprüngliche Baupläne in sich vereinigt, deren Trennung bessere Zusammenfassung erst aus weiteren Untersuchungen möglich werden wird.

Klasse der Räderthiere (Rotatoria).

(Tafel 29, Figur 6 bis 11.)

Die mikroskopische Thierchen mit flimmerndem Wimperorgan am vordern Ende, meist in zwei Abtheilungen (Kopf und Schwanz) getheiltem Körper, Glieder sich oft fadenförmig ineinander lassen, einfachem Hirnganglion und Wassergefäßsystem, die getrennten Theile sind und keine Metamorphose bei der Entwicklung durchmachen.

Der Körper der Räderthierchen hat meistens eine runde oder eiförmige oder spindelförmige Gestalt, besonders bei den gepanzerten Arten etwas abgeplattet. Er ist genau symmetrisch getheilt in einen Kopf- und Bauchtheil. Die Haut des Körpers ist äußerst elastisch und mit Ausnahme der Räder durchgängig frei von Wimperhaaren oder ähnlichen Fortsätzen. Bei vielen Arten sieht man sowohl

auf dem Körper als auf dem schwanzförmigen Anhang einzelne Ringel und Querrunzeln, die nur Falten der Haut sind. Diese Thiere können sich bei dieser Ringelung der Haut außerordentlich zusammenziehen, sodaß sie eine fast kugelförmige Gestalt annehmen. Bei einigen Gattungen erscheint die Haut wirklich als ein horniger, oft mit sonderbaren Spigen versehener Panzer, der entweder nur ein Rückenschild oder auch eine abgeplattete Hülle darstellt, in welcher das Thier wie in einer Schildkrötschale sitzt und Kopf und Schwanz hereinziehen kann; einige dieser Thiere stecken auch ähnlich wie Polypen vereinzelt oder gemeinsam in gallertartigen oder hornartigen cylindrischen Hüllen, in die sie sich gänzlich zurückziehen können.

Die Räderthiere haben ihren Namen von einem eigenthümlichen Bewegungsapparate, welcher an dem vordern Ende, dem Kopfe, angebracht ist und in den meisten Fällen aus einer mehr oder minder einziehbaren einfachen oder doppelten Scheibe besteht, auf welcher ein Kranz langer Wimpern sich befindet, die nach Willkür in Bewegung gesetzt werden können. Zuweilen bildet dieses Räderorgan, welches zum Schwimmen wie zum Fangen der Beute durch den von ihm erregten Strudel dient, im ausgestülpten Zustande eine vollkommen runde Scheibe, die manchmal nur eingekerbt ist, bei andern aber in einzelne geforderte Räderorgane zerfällt. Diese Organe stehen dann bald zu beiden Seiten des Kopfes auf zwei einstückbaren Fortsätzen, bald in einzelnen Haufen, die meistens einen Kreis bilden, zuweilen auch sind eigene Stützfächer mit einem solchen Räderorgane besetzt. Am eigenthümlichsten und abweichendsten sind die Räderorgane in der Familie der Blumenfische gebildet; hier erscheinen sie nämlich als lange Vorsten, die meist nur träge bewegt werden und bei der einen Gattung sogar auf fünf einzelnen Armen stehen, die von dem in einer Hülle lebenden Thiere ganz wie die Fingerglieder eines Polypen benutzt werden. Ein zweites Bewegungsorgan befindet sich fast bei allen Räderthieren an dem hintern Theile des Leibes, und zwar auf der Bauchfläche, als beweglicher Körperanhang, nicht als eigentlicher Schwanz, da der After sich stets auf der Rückensfläche des Anhangs befindet. Bei den polypenartigen Räderthieren bildet dieser Anhang einen förmlichen Stiel, der an seinem hintern Ende mit einem Saugnapfen versehen ist, mittels dessen sich die Thiere anheften; bei den übrigen Gattungen ist es meist eine mehr oder minder lange, fadenförmige Verlängerung, die an einer hintern Spitze oft eine gabelartige Endigung trägt. Diese Gabelung dient manchen Räderthierchen zum Anheften, während sie ihren Wimperkranz spielen lassen, oder auch zum Kriechen und Fortschieben auf dem Grunde des Wassers. Sie bewegen sich dabei förmlich wie die Spannräupchen, indem sie bei eingezogenem Räderorgane sich abwechselnd mit dem Kopfe anheften, den Gabelschwanz nachziehen und dann auf diesen gestützt den Körper ausdehnend fortschleichen. Bei einigen Gattungen sind einzelne oder selbst Bündel von steifen Vorsten auf der Bauchfläche des Körpers angebracht, mittels deren sich die Thiere völlig schnellend und hüpfend im Wasser fortbewegen.

Das Nervensystem besteht aus einem einzigen Ganglion im Raden, von welchem Fäden nach den Augen, den Fühlern und Vorsten ausstrahlen. Die Augen zeichnen sich meist durch rothes Pigment aus und haben oft eine Linse. Die gepanzerten Räderthiere besitzen meist nur ein Auge, die übrigen zwei im Raden gelegene; bei einigen festsitzenden Gattungen findet das auch in andern Klassen vorkommende Ver-

hältniß statt, daß die freischwimmenden Jungen Augen besitzen, die bei den alten feststehenden Thieren gänzlich verschwunden sind. Tastborsten finden sich oft in der Nähe der Naderorgane, und außerdem scheint ein oft mit kurzen Haaren besetzter Fühler in der Nadengegend, der aus- und eingezogen werden kann, als Tastorgan zu dienen.

Das Verdauungssystem, welches nur bei den Weibchen existirt, bildet stets einen geraden, in der Mittellinie gelegenen Darmfischlauch, der mit einem deutlichen After an dem Grunde des schwanzförmigen Anhangs endet. In dem Verlaufe des Darmkanals selbst kann man folgende Abtheilungen unterscheiden. Der Mund liegt stets am vordern Ende des Körpers zwischen den Naderorganen in solcher Weise angebracht, daß der erregte Strudel gegen ihn hingehet. Zuweilen führt der Mund in eine weite Rachenhöhle, an deren Grunde stets ein kugelförmiger Schlundkopf angebracht ist, der eine äußerst starke Muskulatur besitzt und in den meisten Fällen mit Zähnen bewaffnet erscheint, welche auf hornige Kiefer aufgesetzt sind. Die Kiefer wirken stets von beiden Seiten gegeneinander, und die Zähne selbst erscheinen bald in Gestalt horniger, mit queren vorstehenden Rippen versehener Kauplatten, bald als förmliche, mehrspitzige oder einspitzige Gabelzangen, die an einem Griffe befestigt sind. Die Gabelzähne der letztern Art werden von den Thieren zugleich als Greiforgane benutzt, indem sie den Schlundkopf lebhaft aus der Mundöffnung hervorstülpen und mit den scharfen Zangen die Beute packen und durchbohren. Der Schlundkopf selbst ist bei dem Wirbeln und Fressen so sehr in beständiger Bewegung, daß frühere Beobachter ihn für ein Herz hielten. Von dem Schlundkopfe aus erstreckt sich der dickwandige, lederartig gekörnte, innen mit Wimperhaaren besetzte Darm nach hinten, indem er meist eine anfängliche Erweiterung, einen Magen, dann eine Verengerung, eine Art von Kloake zeigt. Der After, der sich über dem Schwanze auf der Rückseite befindet, stellt einigen wenigen Gattungen. Unmittelbar hinter dem Schlundkopfe münden bei allen Naderthieren zwei dicke knollige Drüsen, die man als Speicheldrüsen betrachten kann, in den Darm ein. Die Nahrung der Naderthiere besteht bei den mit laubenden Leisten am Schlundkopfe versehenen Gattungen gewöhnlich aus pflanzlichen Stoffen, während die mit Gabelzähnen bewaffneten arge Räuber sind und meist gierig über Infusorien und andere Naderthiere herfallen.

Kreislaufs- und Athmorgane fehlen durchaus, dagegen existirt ein sehr ausgebildetes sogenanntes Wassergefäßsystem, aus zwei Kanälen bestehend, welche an den Seiten des Körpers nach hinten laufen. Diese Röhren vereinigen sich in der Nähe der Kloake zu einer lebhaft zusammenziehbaren Blase, die oft durch die Afteröffnung ihren wasserklaren Inhalt im Strahl nach außen ergießt oder, bei den Afterlosen und den Männchen, direct nach außen mündet. An diesen Kanälen selbst sieht man in größerer oder geringerer Zahl kurze Seitengefäße, welche frei in die Leibeshöhle münden und an deren Mündung ein wellenförmig gitterndes Wimperlappchen angebracht ist, welches fast in seiner stümmelnden Bewegung dem Fladern eines Flämmchens gleicht. Ähnliche Organe, die sehr verschiedene Functionen übernehmen können, existiren bei vielen Wärmern. Das Muskelsystem, sowohl für die einzelnen Organe als für die Körperbewegungen, ist sehr ausgebildet.

Von den meisten Arten kennt man nur Weibchen, die auch unbefruchtete Eier legen (Parthenogenese). Dieselben besitzen einen großen, lappigen Eierstock, von

welchem aus ein kurzer Gileiter in die Zeitweilen entwiceln sich die vollma- Gileiter, sodas die Thiere lebendig- während bei andern die Eier an den Schwanzes gelittet und bis zur herumgetragen werden. Fast bei allen Arten von Eiern beobachtet, dünne die sich sehr schnell entwiceln, und den gestaltete, hartschalige Winter Winter über ausharren und erst in entwiceln.

Die Männchen, welche sich aus Sommeriern entwiceln und nur wä- Zeit im Frühjahr leben, haben Naderorgane, sehr bedeutend an- system, keine Spur von Verdauungs- förmige, seitliche Körperanhänge und gefäßsystem. Der ganze Hintertheil von einem blasenförmigen, von gepropten Hoden erfüllt, der sich mit einem ausstülpbaren Ausführungs- Sie leben offenbar nur zum Zweck Wir geben zur Vergleichung Taf. 29. Männchen und Fig. 9 das Weibchen Die Jungen entwiceln sich ohne schon im Ei lassen sich Männchen und scheiden. Nur bei einigen feststehende eine rückschreitende Metamorphose vor- haft umherkriechenden Jungen die und der Schwanz, den man als eine trachten kann, zum Stiele wird.

Die Naderthiere kommen an allen man Infusorien findet, und waren zu Zeiten berühmt durch die Eigenschaft nach langer Eintrodnung bei Zubringen wieder aufzuleben. Auch in Infusorien einzelne Gattungen derselben häufig.

Ordnung der Röhrenthieren (Tubul- dem zum Stiele verwandelten Tasse oder ohne Hülse, in welche sich die können, mit ganzem oder tiefgepaltem in Arme umgewandeltem Naderorgan hier eine nicht allzu häufige schöne Kronenthieren (Stephanoceros Ektoderm Fig. 6), bei welchem fünf Arme große Wimpern tragen.

Ordnung der Schwimmtieren (Nes- schwimmen, kriechen oder springen thümlichen, steifen Borsten, sind weich, gepanzert; das Naderorgan ist sehr staltet, wonach man einzelne Familien hat: Ganzräder (Holotrocha) mit rundem Naderorgan; Kerbräder (Sch- tief eingelerbtem oder in Lappen get- organ; hierzu gehört die Art, von der und Weibchen abbilden (Notommata). Doppeltäder (Zygotrocha) mit pa- Nädern, wozu das Rüsselrädchen (P- ola, Fig. 7), welches sich bis 8000 den Alpen findet, wo es von den Schnee lebt. Zu derselben Gruppe gepanzerten Brachionusarten mit oft und Anhängen an dem starren und (Brachionus, Fig. 10). Zu der (Appendiculata) endlich gehört die großen, ruderartig gezackten seitlichen von welcher wir ein Individuum Ei abbilden (Polyarthra, Fig. 11).

Einige Arten mit verkrüppelten wähen wir nur.

des der Borstenwürmer (Chaetopoda).

(Tafel 29, Figur 12 bis 27.)

er mit langem, äußerlich durch Einsen, innerlich durch Scheidewände chartige Segmente (Soniolen oder ren) getheiltem Körper, abweichend en Kopf- und Schwanzsegmenten, rvenstrang und geschlossener Blut- deren Hauptgefäßströme contractil n den meisten Segmenten Borsten- , auf Fußstummeln (Parapodien) ruben der Haut eingesenkt, stets edert.

örper ist nur selten drehrund, meist etwas t, sodas sich Rücken und Bauch leicht unter- assen, fast immer sehr lang und aus einer ahl von Segmenten gebildet, unter welchen immer drei auszeichnen: das Kopfsegment, ie Augen und Fühler sowie die obern nglien birgt, das Mundsegment mit der zigen Mundöffnung, und das Schwanzsegment. ren Segmente sind bald über die ganze Körper- ald nur in einzelnen Gruppen gleichwertig. aut der Borstenwürmer besteht aus einer er minder hornigen Oberhaut, welche nur n einzelnen Stellen, häufig dagegen an den n, Fühlern u. s. w. flimmert, und aus einer rben Lederhaut, deren gekreuzte Fasern durch zung der Lichtstrahlen oft sehr schöne, schillernde hervorbringen. Bei vielen Gattungen ist diese olkommen nackt, bei andern mit mehr oder langen hornigen Haaren besetzt und bei den en von häutigen Schilbern überdeckt, die oft verfilzten Haaren eine förmliche zweite Dede t Rücken bilden. Viele Würmer bilden sich n denen sie entweder gänzlich haufen oder tweise verdeckt sind. In letztem Falle sind rien im Sand oder in feuchter Erde, innen t Schleim ausgekleidet; in ersterm aber leber- oder kallige Röhren, durch Auschwüzung aus t entstanden und meist von charakteristischer ur die einzelnen Gattungen und Arten.

Bewegungsorgane der Ringelwürmer sind nimmlich. Alle Würmer bewegen sich durch n förmige Windungen des Körpers fort; allein indungen werden unterstützt durch verschiedene. Bei den meisten findet man oft äußerst r gestaltete Borsten, Stacheln und Halen, die r nur lose in Gruben der Haut oder auf be- seitlichen Stummeln stehen, welche sich längs perringel wiederholen und Füße oder Fuß- eln genannt werden. Meistens unterscheidet u jedem Fußstummel einen oberen und untern en Höder, den Rückenstummel (ramus dor- den und den Bauchstummel (ramus ventralis), ach allen Richtungen hin bewegt werden können er einem fadenartigen Fühler (cirrus) einen von Borsten oder feinen Stacheln tragen. Borstenbündel leisten sowohl beim Kriechen als chwimmen die wesentlichsten Dienste. Man hat der Form dieser Borsten, besonders Psrien- n (festucae), Stachelborsten von bedeuten- ide (aciculae), und Halenborsten (uncinuli) zähnten Halen- oder anterähnlichen Spitzen ieden.

Nervensystem der Ringelwürmer steht in nisch zu den übrigen Klassen desselben Kreises er hohen Stufe der Entwicklung. Es besteht en Fällen aus einer vordern, im Kopfe über

dem Schlunde gelegenen Anschwellung, die man als Gehirn bezeichnen kann und die bald mehr, bald minder deutlich aus zwei seitlichen Hälften zusammen- gesetzt ist. Von diesen Anschwellungen aus gehen zwei seitliche Aeste, die einen Ring um den Schlund bilden und auf der Bauchfläche in eine Kette von Knoten zusammenfließen, welche in der Mitte des Körpers sich nach hinten erstreckt. In der Regel liegt in jedem Ringel des Leibes ein Nervenknoten, der Aeste nach allen Seiten hin, besonders an die Fußstummeln aus- sendet. Es existirt also bei der großen Mehrzahl der Ringelwürmer eine auf der Rückenfläche des Schlundes gelegene Hirnanschwellung, ein Schlundring, und ein auf der Bauchfläche gelegenes, aus einzelnen An- schwellungen bestehendes Bauchmark. Bei den meisten Familien ist dieses Bauchmark scheinbar einfach, wenn auch stets aus zwei seitlichen Strängen gebildet, die in den einzelnen Knoten durch Ganglienmasse zu- sammengeschweisst sind; bei andern sind die Ver- bindungsstränge zwischen den Knoten getrennt und bei einigen niedern Typen der Ordnungen kommt so- gar als Annäherung an die übrigen Klassen der Würmer eine völlige Spaltung des Bauchmarks in zwei seitliche Stränge vor, welche der Mittellinie bald näher gerückt, bald gänzlich auf beide Seiten hin- geworfen sind.

Besondere Sinnesorgane sind als Augen, Tast- organe und zuweilen als Ohrenbläschen vorhanden. Vielen Würmern, besonders den Röhrenbewohnern, fehlen die Augen fast durchaus und sind nur bei einigen wenigen Gattungen aufgefunden worden; bei manchen sind sie hochorganisiert und bestehen aus Nervenstäben, lichtbrechenden Körpern und farbigem Pigmente. Die höhern Ringelwürmer besitzen meist nur zwei oder drei symmetrisch gestellte deutliche Augen; bei einigen gibt es deren sogar an den Kiemen, am hintern Ende, sowie an den Seiten des Körpers. Bei einigen Borstenwürmern hat man auch auf den Gehirnknötchen selbst kleine runde Bläschen mit einem stein- artigen Inhalte gefunden, welche man für Gehör- bläschen anzusehen berechtigt ist. Die Tast- organe bilden mehr oder minder lange Fäden, welche entweder am Kopfe oder auch seitlich an den Fuß- stummeln angebracht sind. Die Gliedfäden (cirri) des Körpers stehen sowohl auf dem Rücken als auf den Bauchstummeln; da wo ein deutlicher Kopf vorhanden ist, sind sie nach vorn gerichtet und werden dann mit dem Namen Kopffühler (antennae) bezeichnet. Bei einigen Gattungen erscheinen sogar die Gliedfäden als die Kopffühler geringelt, sodas sie den Fühlhörnern mancher Krebse und Insekten nicht unähnlich sehen.

Der Verdauungsapparat der Ringelwürmer besteht in den meisten Fällen aus einem geraden Darmkanale, der von dem am Vorderende angebrachten Munde durch den ganzen Körper nach hinten verläuft und sich in einem euständigen After öffnet, welcher meist ein wenig nach der Rückenseite zu angebracht ist. Nur selten ist der After näher am Munde angebracht. Der Mund ist bei den meisten mit wulstigen Rändern versehen und oft auch von scharfen Kiefern umstellt, welche zum Durchbohren der Beute oder zum Aubeißen ihrer Haut und zum nachherigen Auszugen behülflich sind. Sehr oft wird die Aufnahme fester Nahrungs- mittel auch durch einen muskulösen Schlund und das Fangen der Beute durch einen Rüssel unterstützt, wel- cher aus der Mundöffnung hervorgeschoben werden kann. Die meisten Borstenwürmer sind auch in der That sehr räuberische Thiere, und das Fangen der Beute wird bei denen, welche Röhren bewohnen, oft noch durch die ungeheuer langen Kopffühler unterstützt,

welche zugleich als Schlingen benutzt werden. An dem Darmkanale selbst kann man meistens einen Schlund, der bald länger, bald kürzer ist, und den dünnhäutigen Darm unterscheiden, der durch seitliche Brücken von Zellstoff, manchmal auch durch ein förmliches Gefröse in seiner Lage erhalten wird. Meist hat dieser Darm einzelne knotenförmige Anschwellungen oder zuweilen förmliche Blindfäde, welche den einzelnen Ringeln entsprechen. Bei einzelnen Gattungen hat man an diesem Darne theils Speicheldrüsen, theils einen leberartigen Ueberzug von gelber, gelbröthlicher Masse unterschieden.

Bei den meisten Borstenwürmern lassen sich besondere Athemorgane unterscheiden, welche in der Form baumartig verzweigter Kiemen, bald an dem Kopfe, bald an der Rückenfläche über den Rückenstummeln ausgebildet sind. Trotz der bedeutenden Entwicklung, welche diese Kiemen bei vielen Würmern zeigen, fehlen sie oft nahe verwandten Familien, wo dann die Haut oder die innere Darmfläche die Athemfunction zu übernehmen scheint.

Von besonderer Wichtigkeit für den ursprünglichen Stamm, aus welchem viele Klassen der Würmer hervorgegangen sind, erscheinen auch die bei den Borstenwürmern wie bei den Rädertieren entwickelten Schleifenkanäle, seitliche, oft in Schleifen oder Knäueln ausgebildete Röhren, die sich meist mit einer stümmelnden oder mit einer Geißel versehenen Mündung in die Leibeshöhle und mit einer in dem folgenden Segmente bestehenden Oeffnung nach außen öffnen. Die Kanäle sind oft drüsig, also offenbar Secretionsorgane; oft treten sie mit den Geschlechtsorganen in nähere Beziehung, indem sie die Producte derselben nach außen befördern; oft scheinen sie den Austausch zwischen den Flüssigkeiten der Leibeshöhle und dem Wasser, in dem der Wurm lebt, zu übernehmen; häufig sind sie in ihren verschiedenen Theilen verschieden gebaut oder nur in einzelnen Segmenten entwickelt und ziemlich rudimentär, ganz dürften sie wol niemals fehlen.

Das Gefäßsystem ist fast bei allen Borstenwürmern bedeutend entwickelt, seine geschlossenen Röhren lassen sich fast überall leicht nachweisen, da sich in ihnen ein meist roth, zuweilen auch gelb oder grün gefärbtes Blut bewegt. Die Hauptgefäßstämme pulsiren deutlich ihrer ganzen Länge nach, und oft existiren noch einige besonders ausgezeichnete pulsirende Anschwellungen in Schlauch- oder Bläschenform, die man nur gezwungen mit Herzen vergleichen kann und die stets paarig in der Nähe des Schlundes liegen. Gewöhnlich findet sich ein mittleres Rückengefäß, welches das Blut nach vorn, und ein mittleres Bauchgefäß, welches dasselbe nach hinten treibt. Es werden diese Gefäße durch zahlreiche Querbogen und Netze miteinander verbunden, und da, wo Kiemen existiren, erhalten diese einen zuführenden und einen rückführenden Ast von den Hauptgefäßen. Bei einigen wenigen Familien ist in der That noch kein Gefäßsystem nachgewiesen worden.

Verloren gegangene Theile werden in großem Umfange ersetzt; bei einigen Meerbewohnern scheint sogar der Kopf mit der vordern Hälfte wieder neugebildet werden zu können.

Die Fortpflanzung ist äußerst mannichfaltig. Sehr gewöhnlich ist bei vielen als ungeschlechtliche Vermehrung die Knospung, bei welcher an dem Hinterende des Leibes meist zwischen dem letzten und vorletzten Ringel ein Glied hervorsproßt, welches deutlich das Kopfende des neuzubildenden Individuums ist; während dieses nun auswächst und Ringel an Ringel reißt, entsteht wieder zwischen ihm und dem

Mutterthiere eine neue Knospe, die sich zu einem unabhängigen Individuum entwickelt. Hat auf diese Weise an einem Mutterthiere sechs Knospen hängend gefunden, wobei die älteste, schon ein sehr vollständig ausgebildetes Individuum darstellte, während die vorderste, jüngste Knospe noch im Kopftringel zeigte. In andern Fällen zeigen Sprossen nur bis zu einem geringen Grade sich entwickeln erst nach der Trennung von dem Thiere, welche sich durch Knospung fortsetzen. Die Geschlechter sind verschieden, einige sind Zwitter. Die Geschlechter entwickeln sich in verschiedenen Zeiten in der Leibeshöhle oder auf der Leibeshöhle, treten durch Poren der Leibeshöhle ein und werden durch Schleifenkanäle nach außen geschafft. Bei einigen andern Familien dagegen finden sich besondere Ausführungsgänge. Die Eier entwickeln sich meist einzeln oder gemeinschaftlich in einem Haufen abgelegt; bei vielen noch innerhalb des Leibes, zum Theil in besondern Brutkammern, geschleppt; bei manchen so lange im Mutterthiere, bis die Jungen sich entwickelt haben; bei andern wüthen an den Rand der Höhle geflossen.

Die Entwicklung geht meistens durch Larvenformen hindurch, welche sich durch die von Wimpertränzen kennzeichnen, die ihnen den gestellt sein können, nur vorn, nur hinten, mehrfache in der Mitte entweder mit vorn und hinten Wimpertränzen. Dazu kommen oft seltsame Anbänge an den Borsten und Fühlern, und höchst seltsame Gestalten. Im Körper sieht man außer den gewöhnlichen Schichten, Epiderm und Muscularis zuerst den Darm und dann die Sinnesorgane. Oft werden bei Röhrenwürmern die Linsen, Augen, Gehörbläschen u. s. w. befestigt an Stielen, herabhängend, zur sitzenden Lebensart rathend. Während die bezeichneten Larvenformen bei Meerwürmern die normale Entwicklung darstellen, kommen sie bei den Süßwasser- und Landwürmern vor, indem hier das Junge in seiner Gestalt aus dem Ei kriecht.

Die meisten Borstenwürmer leben im Meer, im süßen Wasser oder in der Erde und in der That sind viele frei beweglich und kriechen oder schwimmen selbst auf hohem Meere; andere bauen Höhlen und Galerien. Einige werden als Angel benutzt; andere Verwendungen gibt es.

Ordnung der Vielborster (Polychaeta).

Zahlreiche Borstenbüschel auf dem Rücken oder minder entwickelten Fußstummeln der Rückenfläche. Die Fußstummeln tragen keine Borsten. Die Fußstummeln tragen keine Borsten.

Unterordnung der Schlangenkriecher (Errantia).

Leben frei oder nur im Sande. Die Kiemen stehen, wenn vorhanden, an den Fußstummeln der Rückenfläche. Die Fußstummeln tragen keine Borsten.

Eine sehr vielgestaltige Gruppe, mit den verschiedensten Formgestaltungen, bei welcher alle Organe in der Ausbildung gelangen. Man hat nicht nur Familien unterschieden, unter welchen man ausgezeichnete Repräsentanten ermitteln

reiden (Nereida) mit großem Kopf, vier Fühlern, acht Mundcirrhen, sehr kurzem starren, mit spitzen Zähnen besetzten Kiefer, gleichartigen Segmenten (Nereide, Nereis Taf. 29, Fig. 13), bald mit ungleichartigen, so aus zwei Hälften zusammengesetzt scheint. Ihr nahe steht die Glyceriden (Glycera Taf. 15), die unter dem spitzen Kopfigen ungeheuern, mit vier hakenförmigen affneten Rüssel hervorstrecken können.

Die Raupen (Aphroditida) sind aus dem Rücken der minder großen Schuppen und stachelbedeckt, die sich oft gänzlich verfilzen und in die Kiemen liegen. Der Körper wird flach; die Stachelhaare irisiren in prachtvollen. Die abgebildete Art (Seeraupe, Hertrix, Fig. 12) häufig bei Neapel.

Die Würmer (Arenicolida) sind an den Rücken durch den hier abgebildeten Pier (Arenicorum, Fig. 19) repräsentirt, der aus dem breiten, schüsselförmigen Rüssel hervorstreckt und drei Abtheilungen des Körpers zeigt, mit großen Vorsten, die mittlere mit baumkiemen besetzt. Er wirkt aus seinem Sande wie ein Regenwurm auf, bewohnt vorzugsweise Strandregion, die sich bei der Ebbe abdeckt, eifrig als Köder für die Angel aufgesucht. Die Familie der Hesioniden nähert sich durch Fußstummel und wenig zahlreiche Vorsten ruern, unterscheidet sich aber durch den Kopf, die Fühler und Cirrhen. Die abgebildete (Amone sicula, Fig. 16), findet man im Neapel.

Die Familie der Cirratuliden bildet den Ueberrest folgenden Unterordnung. Sie haben lange, feine Kiemen, die ihnen zugleich als Arme dienen, und lange Fühler an dem kleinen, runden Kopfe. Bei der abgebildeten Art (Hectopus ater, Fig. 17) stehen vier Kiemenfäden an jeder Seite des Kopfes hinter den beiden großen

Unterordnung der Röhrenwürmer (Tubicola).

Die Thiere wohnen meist in Röhren; die meisten, wenn vorhanden, am Kopfende in dessen Nähe. Vorsten meist hakenförmig. Nur Meerbewohner. Larvenentwicklung rüchigreichende Metamorphose.

Die Peruriden. Kiemen einfach, am Kopfende, von einem Kranze starrer Vorsten umgeben. Das Blut ist grün, daher der Gattungsname (Chloraema Dujardini, Taf. 10), die schwarzend, ohne Röhren zu bilden, leben. Die Familie baut keine Röhren, sondern nur dadurch den Uebergang zu der vorigen Unterordnung.

Die Lumbriciden besitzen wenigstens zwei deutliche Körperregionen, meist sogar drei. Fadenkiemen am Kopfe, an dessen Rand zwei große Fäden, welche die Röhre beim Zurückziehen der Kiemen aus Sand und Muschelhäuten festhalten. Die abgebildete Art (Hermella alba, Fig. 22) überzieht die Austerbänke und die Felsen mit ihren Röhren.

Die Terebelliden. Lange, höchst contractile und büschelförmige Kiemen am Kopfe. Fäden an den Kiemen. Bauen aus Sand und Muscheln sehr lag zusammengeleimte Röhren. Die

abgebildete Art (Terebella emmalina, Fig. 21) häufig im Ocean.

Serpulida. Feste Kalströhren, zuweilen spiralförmig gewunden. Kopf von einem Kranze von Kiemenfäden umstellt, von denen häufig einer oder zwei zu Dedeln der Röhre umgewandelt sind. Die abgebildete Art (Serpula vermicularis, Fig. 23) häufig auf Austerbänken, Felsen.

Chaetopterida. Körper in zwei oder drei Regionen getheilt. Keine Kiemen noch Blutgefäße. Bauchstummel doppelt. Röhren häufig. Die Röhren der abgebildeten Art (Phyllochaetopterus socialis, Fig. 18) bilden ineinander verflochten förmliche Nasen auf dem Boden des Golfs von Neapel.

Ordnung der Erdwürmer (Oligochaeta oder Scoleina).

Weder Kiemen noch Fußstummel, Fühler oder Cirrhen. Die wenigen Borsten stehen in Gruben. Zweiter. Meist im süßen Wasser oder in der Erde, einige im Meere.

Diese Würmer haben einen langen runden Körper, der oft nur undeutlich gegliedert erscheint. Die Haut ist derb, zuweilen selbst lederartig, und auf beiden Seiten des Körpers sind Vorsten in dieselbe eingesenkt, welche zur Unterstützung der Bewegungen dienen. Es stehen indeß diese Vorsten niemals auf eigenen Fußstummeln, sondern stehen vielmehr oft fast gänzlich verborgen in paarigen Gruben der Haut. Man unterscheidet keinen deutlich abgeordneten Kopf, wohl aber bei der einen Familie zwei Radenaugen, die den Regenwürmern abgehen. Der Mund zeigt niemals Kiefer oder rüsselartige Organe, der Darm läuft gerade durch den Körper und läßt nur abwechselnde, den Ringeln entsprechende Einschnürungen, aber keine Blindfäde wahrnehmen. Das Blut ist meist roth; es circulirt hauptsächlich durch zwei in der Mittellinie des Bauchs und des Rückens gelegene Längsgefäße, welche durch Quertäste verbunden sind, die bei den Regenwürmern namentlich im vordern Leibeisende perlchnurartig geformt sind und lebhaft pulsiren. Die Schleimkanäle sind meist nur an einzelnen Segmenten ausgebildet. Sämmtliche Erdwürmer sind Hermaphroditen und haben auf der Vorderfläche des Bauchs paarige Geschlechtsöffnungen, welche zu beiden Seiten der Mittellinie liegen, zum Unterschiede von den Egel, welche nur je eine Geschlechtsöffnung zeigen. Hoden und Eierstöcke stehen übrigens öfters so ineinander, daß es unmöglich ist, sie zu trennen, indem in dem schlauchförmigen Eierstocke selbst der Hodenschlauch eingeschachtelt ist. Die Jungen machen keine Larvenmetamorphose durch.

Die Familie der Regenwürmer (Lumbricida) besteht aus walzenförmigen, höchst ungleich gegliederten (Regenwurm, Lumbricus agricola, Taf. 29, Fig. 26) Thieren ohne geschiedenen Kopf und ohne Augen, auf deren Bauchfläche in seitlichen Gruben, welche nahe an der Mittellinie angebracht sind, Paare gekrümmter Vorsten stehen, die gänzlich in diese Gruben zurückgezogen werden können. Sie leben in Erdböhlen, im feuchten Boden und scheinen besonders nachts ihrem Raube nachzugehen. Daß sie Pflanzensäfte, Wurzeln und Schoffen abstreifen, ist eine Fabel. Zur Brutzeit entwidelt sich bei diesen Thieren hinter den Geschlechtsöffnungen eine Anhäufung von Drüsenbälgen, welche einen zähen, leberigen Schleim absondern, der besonders zum Festhalten bei der Begattung dient. Die Drüsenbälge selbst schwellen zu dieser Zeit an und bilden entweder einen auf dem Rücken liegenden Sattel oder einen förmlichen Gürtel um den Leib, welcher von Unkundigen meist für eine vernarbte Wunde gehalten wird.

Einige Gattungen dieser Erdwürmer bauen sich förmliche Höhlen, während die meisten sich begnügen, ihre Galerien mit Schleim auszufüttern und sie dadurch vor dem Zusammenfallen zu schützen. Die Eier werden in schleimigen erhärtenden Hüllen (sogenannten Cocons) abgelegt.

Die Familie der Wasserschlängel (*Naidida*) begreift kleine, unendlich gegliederte, außer den Vorstienbündeln am Leibe auch noch mit einfachen Seitenborsten versehene Würmer, welche besonders den Schlamm der süßen Gewässer bewohnen und darin sich Galerien graben, aus denen sie den stets lebhaft schlängelnden Kopf hervorstrecken. Einige Arten (*Chaetogaster*) schmarnogen auch in der Mantelhöhle der Wassersneden. Die meisten haben zwei deutliche Augen. Es pflanzen sich diese Thiere unabhängig von der geschlechtlichen Entwicklung auch noch in der oben beschriebenen Weise durch Theilung fort, und ihre ausgezeichnete Reproductionskraft nach Verletzungen ist schon oft der Gegenstand vielfacher Beobachtungen gewesen. Die abgebildete, in allen süßen Gewässern häufige Art (*Rüsselnaidide*, *Nais proboscidea*, Fig. 27) ist durch den langen, rüsselähnlichen Fortsatz der Stirn ausgezeichnet.

Zwei Typen, die anderwärts nicht unterzubringen sind, verdienten die Aufstellung eigener Klassen oder Ordnungen, obgleich sie nur je von einer Gattung gebildet werden. Der eine ist derjenige der Ruderwürmer (*Gymnocopa*) (*Tomopteris onisciformis*, Fig. 24), glashell durchsichtige, in der See schwimmende Thierchen mit Stirnfühlern, zahn- und kieferlosem Munde, zweitrunderigen Fußstummeln ohne Borsten, und die Klauenwürmer (*Onychophora*), die im feuchten Moose der Wälder Südamerikas und Südafrikas leben, borstenlose Fußstummeln mit Klauen tragen, zwei geringelte Kopffühler besitzen, Zwitter sind und den Uebergang zu den Gliedertieren machen (*Peripatus quitensis*, Fig. 25).

Klasse der Sternwürmer (*Gephyrea*).

(Tafel 29, Figur 32.)

Ungegliederte Meerwürmer von cylindrischer Gestalt, ohne Fußstummeln, mit meist einziehbarem Rüssel, gewundenem Darmkanal, stark entwickelten Schleifenkanälen und getrenntem Geschlechte.

Der Körper dieser Thiere ist walzenförmig, drehend, von einer derben lederartigen Haut umhüllt und meist nackt, doch sieht man bei einigen Gattungen steife, in die Haut eingepflanzte, unbewegliche Borsten, oder auch an dem Vorderende einige Halen, die zum Festhalten dienen. Alle diese Thiere leben im Sande, in Löchern und in Höhlen in ähnlicher Weise unter dem Wasser, wie die Regenwürmer auf dem festen Lande. Sie zeigen keinen besonders abgesetzten Kopf und keine Sinnesorgane. Das Nervensystem besteht aus einem Bauchmark und einem Schlundringe, an dem sich ein unbedeutender Hirnnoten erkennen läßt. Pigmentflecken, bei einigen vorhanden, werden als Augen gedeutet. Der Mund befindet sich an dem vordern Ende des Körpers und ist bei den meisten Gattungen mit einem langen Rüssel versehen, welcher meist unbewaffnet, zuweilen aber mit rückwärts gebogenem Haken besetzt ist. Der Mund steht bald an der Spitze, bald an der Basis dieses Rüssels, der bei einigen nur verkürzt, bei andern gänzlich eingestülpt werden kann, bei einer Gattung in zwei Klappen endet. Der Darmkanal erscheint bei den meisten Gattungen gewunden, nur bei einigen grade und öffnet sich an dem hintern Ende des Körpers; nur bei einer Gattung findet sich der After auf der Bauchseite in der vordern Hälfte des Körpers.

Das Gefäßsystem ist sehr wenig entwickelt, einigen als Rücken- und Bauchstamm, bei den Sternwürmern, nachgewiesen; bei andern scheint es ebenso wie besondere Atemorgane zu fehlen. Die Schleifenkanäle sind baumartige Röhren oder drüsenähnliche Gebilde, die theils in den Mastdarm, theils außen münden und mit weiten, trichterförmigen Oeffnungen in der Leibeswand nach außen führen. Sie sind meistens aus mit der Leibeswand verwachsenen Schleimschlechtsproducten betraut, welche in ihnen sich entwickeln und bei der Reife in die Leibeswand fallen. Die Larven schwärmen einzeln oder in Gruppen verkränzt in der Gestalt von kleinen Würmern. Gattungen und Arten sind wenig bekannt.

Man hat sie, je nach der Gegenseite, in Borsten, in bewaffnete und unbewaffnete getheilt. Wir bilden aus der ersten Gruppe die gemeinsten Arten aus dem Ocean (*Chaetognathus*, Taf. 29, Fig. 32). Das Thier besitzt einen sehr langen, mit Haken besetzten, einstülpbaren Rüssel zu entwickeln. Endlich ist ein Vorprunze den After.

Klasse der Rundwürmer (*Nemata*).

(Tafel 29, Figur 31, 33 bis 35.)

Meist drehrunde, schlauhe, ungetheilte Würmer ohne Gliederung, mit festem Kopf und ohne Fußstummeln. Die meisten sind Schmarotzer und gehen in die Leibeswand.

Der Körper der Rundwürmer ist meist zumellen gleichförmig an beiden Seiten abgeplattet oder mehr rundlich. Die meisten derselben erreichen im Verhältniß zu ihrer ungeheuren Länge, sodaß sie wie dünne Drähte erscheinen; bei vielen ist das vordere Ende des Körpers bedeutend verdickt, sodaß sie wie ein Rüssel oder feiner Schwanz während bei andern mancherlei Anhängsel, Schwanzblafen u. dgl. das eine oder andere Ende breiter oder verdickt erscheinen lassen. Die Thiere ist stets derb und bei den meisten in Querrungen gefaltet, sodaß der Körper mehr oder minder geringelt erscheint. Es ist leicht durch Einfaltung von Seiten sich der Körper oft bis zum Flagen hin zu verengen und oft sehr festen Oberhaut aus Querschnitten gewebte Lederhaut, eine Schicht von Muskelfasern, einen Hüllmantel untercheiden, durch welchen die Fortbewegung und Ausdehnungen des Körpers bewirkt werden, der meist an den Seiten oder auch an den Rücken unterbrochen ist, wodurch Längs- und Medienschnitte entstehen, in welchen die Nerven verlaufen.

Hinsichtlich des Nervensystems sind alle Zweifel gehoben. Bei den Kraken- und Tintenfischen, bei den Rüsselschnecken, bei den Nemotoden will man einen feinen Schlundring haben, der sechs Nervenstämme entsendet, die theils vor, theils neben und theils unter dem Schlundringe verlaufen; bei den meisten Arten kommen Augen, d. h. Pigmentflecken ohne lichtbrechenden Körper vor. Bei den meisten gar keine differenzirten Sinnesorgane und Pupillen am Munde mögen als Sinnesorgane betrachtet werden. Das Verdauungssystem ist bei den

t einfach. Bei den Krabern fehlt jede Spur
anals. Die Thiere ernähren sich nur durch
g der sie umgebenden Flüssigkeiten mittels
Bei den Saitemwürmern findet sich wol
anal, der in dem Körper hinführt, und auch
öffnung, aber kein After, während bei den
tern stets ein vollständig ausgebildeter Darm-
enständiger Mundöffnung und After vor-
Bei diesen lassen sich auch öfter in dem
und dem Anfange des Darmanals hornige
ober Wülste unterscheiden, die oft besonders
werden können und eine Bewaffnung des
anals darstellen.

Ende, sondern ist mehr oder minder nach

Gefäßsystem noch Athemorgane. Die den Analen der Würmer analogen Organe bilden einen Längskanal, die in den Seitenfeldern und vorn am Halse in einer gemeinschaftlichen, dem Halsparus, ausmünden, bei den Leibeshöhlen hineinragenden (Lemnisci) in Verbindung stehen.

schlechter sind meist getrennt und häufig sehr gestaltet. Bei den wenigsten findet Larvenruhe statt. Der Wurm entwickelt sich aus dem Ei.

nigsten Rundwürmer leben frei, im Meere, Wasser, in der Erde oder in verschiedenen Pflanzen. Die meisten sind Schmarotzer in andern Thieren, und viele wandern aus den einen in die andern über.

g der Borstentiefer (Chaetognathi).

schwimmende Meerwürmer mit Flossen, Borstenförmigen Kiefern und geradem Zwitter.

nung wird nur von einer einzigen Gattung *ge-
gitta bipunctata*, Taf. 29, Fig. 31). Der
walzenförmige, der Kopf etwas gesondert, der
von einem Flossensaume umgeben, der sich an
Stellen zu End- und Seitenflossen erhebt.
Ist ist mit zwei großen seitlichen Hakenfiesern
versehen, welche aus getrümmten, starken Borsten
geleitet scheinen. Zuweilen stehen seine
an den Seiten des Körpers. Der Darm ist
hinter bauchständig am Beginn des Schwanzes.
Der Hohlraum besteht aus zwei Schlundanglien;
obern sitzen zwei Augen. Die Geschlechts-
aus Hoden und davorliegenden Eierstöcken
liegen an der Basis des Schwanzes. Die
scheiden sich ohne Metamorphose.

viere schwimmen im Meere. Ihre Stellung
zweifelhaft, doch schließen sie sich durch einige
Leertwürmer (*Chaetosoma*, *Rhabdogaster*) noch
an die Nadenwürmer an.

ng der Fadenwürmer (Nematodes).

gebildeter Darmkanal. Geschlechter
t, mit sehr seltenen Ausnahmen.

rbnung ist von höchster Bedeutung für den
indem ihr diejenigen Schwarzer angehören,
r das Leben am gefährlichsten sind. Die all-
anatomischen Verhältnisse wurden schon bei
nblung der Klasse erörtert. Hier ist noch be-
das hinsichtlich der Fortpflanzung Bekannte
igen.

Die inneren Geschlechtsorgane sind stets in Röhrenform entwickelt; bald einfach, bald doppelt und vielfach im Körper umhergewunden. Die röhrenförmigen Eierstöcke, in welchen sich die Eier meist in eigentümlicher Weise um eine mittlere Spindel (Rhachis) entwickeln, gehen allmählich in die Eileiter über, die häufig Erweiterungen haben, in welchen die Eier sich zumellen vollständig entwickeln, jedoch die Würmer lebendige Junge gebären. Die weibliche Geschlechtsöffnung findet sich meist nach vorn an der Bauchseite, etwa in der Mitte der Körperlänge, selten am Ende. Das Weibchen ist stets größer und häufiger oft sogar sehr anders gestaltet als das Männchen, das außer den schlauchförmigen Hoden, in welchen seltam gestaltete Samentkörperchen erzeugt werden, meist noch sehr entwickelte Begattungsorgane besitzt in Form von hornigen Leisten (Spicula), glodenförmigen Taschen u. s. w. Die Copula bei der Begattung ist sehr innig, oft so sehr, daß sich das kleinere Männchen, das auf der weiblichen Geschlechtsöffnung wie ein zweiter Vorderkörper aufsitzt, nur mit Gewalt trennen läßt.

Die Jungen entwickeln sich aus dem ganzen Dotter und haben gemeinlich eine schlanke Form mit etwas schräg abgestuften Hinterende (Rhabbitisform). Außer den gewöhnlichen Individuen hat man auch bei einigen Arten verschiedene Erscheinungsformen beobachtet. So wird die Rhabbitislarve von Nochnius trigonocephalus, die im Wasser lebt, bald im Darm des Hundes, welcher das Wasser säuft, geschlechtsreif und ändert dabei die Form. Dann legt das Weibchen Eier, die mit den Excrementen des Hundes in das Wasser gelangen und dort Rhabbitislarven werden. Bleiben diese im Wasser oder kommen sie in Schnecken, so werden sie ebenfalls geschlechtsreif, ändern aber die Form nicht.

Ascaris nigrovenosa hat ebenfalls zwei geschlechtsreife Formen. Die eine lebt in der Lunge des Frosches. Die Jungen, von Rhabbitisform, wandern aus und finden sich in der Kloake des Frosches, von wo sie in Schlamm und feuchte Erde gelangen. Sie behalten die Rhabbitisform, begatten sich, die Jungen bleiben im Uterus, fressen erst die Eischalen, dann die Organe der Mutter, sprengen endlich die leere Hülse. Frei geworden ändern sie die Form und die Gestalt der innern Organe und pflanzen sich fort. Erst durch die Einwanderung in Frösche erzeugt sich der Spulwurm derselben in seiner Form.

Das Leben der Fadenwürmer setzt sich aus verschiedenen Phasen zusammen. Die einen leben beständig frei, im süßen und Salzwasser, in Schlamm und Dammerte, faulen Früchten, gärenden Pflanzenstoffen u. s. w.; die andern haben, wie wir gesehen haben, zwei geschlechtsreife Formen, eine freie und eine schmarogende. Viele schmarogten während des größten Theils ihres Lebens, besonders im entwickelten Zustande, leben aber frei während eines Theils ihrer Jugend. Die Schmarogter beschränken sich nur selten auf ein Wobnthier, gewöhnlich durchlaufen sie ihren Lebenscyklus in zwei Wirthen, in dem einen im unreifen Zustande, sei es frei, sei es eingekapselt, in dem andern im reifen Zustande. Gewöhnlich ist dann die Wanderung passiv. Der Wirth, in welchem sich der unreife Wurm befindet, wird von einem Feinde gefressen, z. B. Weichthiere von Fischen, Fische von Vögeln oder Säugethieren u. s. w. Im Darm des Fressers werden dann die Würmer frei, begatten sich, ihre Eier oder Jungen gelangen nach außen mit den Excrementen und kommen durch das Wasser, die Erde u. s. w. in den Bereich des ersten Wirthes. Außer diesen passiven Wanderungen kommen aber

auch active vor, indem freilebende Würmer sich von außen in die Wirths eindringen, wozu sie oft besondere Baufen (Bohrschalen u. s. w.) besitzen, die sie später abwerfen. Active und passive Wanderungen kommen auch innerhalb der Körper der Wirths vor, indem die winzigen Embryonen der einen in die Gefäße gelangen und mit dem Blute circuliren, bis sie zum gelegenen Entwicklungsorte gelangen, während andere sich einen Weg durch die Gewebe des Wirths bis zu ihrem Plage bahnen.

Die Familien sind sehr zahlreich. Wir erwähnen nur diejenigen, die besonders interessiren.

Die Familie der Nalwürmer (Anguillulida) besteht aus kleinen ründlichen Fadenwürmern mit spitzem, bei einer Gattung warzigem Schwanzende, die in großen Mengen in gärenden und faulenden Stoffen vorkommen. Die weibliche Geschlechtsöffnung liegt in der Mitte des Körpers oder etwas mehr nach vorn; die männliche, mit einem einfachen hornigen Begattungsorgan versehen, weit nach hinten am Beginn des Schwanzendes. Der ründliche, entzündliche Mund ist unbewaffnet, der Darm gerade, meist mit einem zweibellartigen didern Schlundstüpe versehen. Eierstock und Hoden bilden einen einfachen Schlauch. Die bekannten Eßigälchen und Kleisterälchen, sowie die im Mutterkorn und im rostigen Getreide vorkommenden Würmer gehören dieser Familie an. Die Eier entwickeln sich meist im Leibe der Mutter, so daß sie lebendige Junge gebären. Sie leben nach jahrelanger Anstrodnung durch Befestigung wieder auf.

Familie der Spulwürmer (Ascarida). Mund dreieckig, mit Antänen am Eingange des Schlundes, zuweilen auch mit Lastwürschen. Eierstöcke doppelt. Männliche Geschlechtsöffnung nahe dem spitzigen Schwanzende. Hierher gehört der unserer abgebildeten Art (Pferdespulwurm, *Ascaris*, Taf. 29, Fig. 35) ähnliche, gemeine Menschenpulwurm (*Ascaris lumbricoides*), der bis zu 40 Centimeter lang wird, vorzugsweise im Dünndarme lebt, am häufigsten bei Kindern von 5–15 Jahren ist, zuweilen auswandert, nur ausnahmsweise in andere Darmregionen oder Organe eindringt, nur selten ernstliche Beschwerden macht, leicht sich abtreiben läßt (Semen cinas — Wüstenkaspern von Artemision und das daraus bereitete Santonin). Er producirt Millionen von Eiern, die mit dem Kothe abgehen. Wie er in den Menschen gelangt, ist unbekannt. Zu derselben Familie gehört der Nadenwurm oder Spischschwanz (*Oxyuris vermicularis*, Fig. 36). Die Weibchen werden bis 1 Centimeter, die höchst seltenen Männchen, die einen stumpfen eingerollten Schwanz haben, nicht halb so lang. Sie finden sich in Massen im Mastdarme der Kinder, wandern abends im After und den benachbarten Theilen umher und verursachen unerträgliches Kipeln. Klystiere mit Kaltwasser wirken vortrefflich dagegen. Wie sie in den Menschen kommen, ist unbekannt.

In die Familie der Fadenwürmer (*Filaria*) mit rundem, knotenlosem Munde und sehr langem, fadenförmigen Körper gehört der Fadenwurm der Tropen-gegenenden (*Filaria medinensis*), welcher sich in die Haut einbohrt und dort Geschwüre bildet, die endlich, wenn der Wurm seine Brut abgeben will, aufbrechen. Man widelt ihn dann durch höchst langames Aufwinden heraus und hütet sich sehr, ihn zu zerreißen, da seine Leibeshöhle eine ätzende Flüssigkeit enthält, welche auf das Geschwür vergiftend einwirkt. Der Wurm soll die geschlechtsreife Form eines in dem Süden besonders im Brackwasser lebenden Aelchens (*Urolabes*) sein.

Zur Familie der Pfahlwürmer (*Strongylida*),

wie die Männchen einen glockenförmigen Schirm als Copulationsapparat und die Weibchen einfache Eierstöcke besitzen, gehört der Niesenwurm (*Eastrostrongylus*), welcher in den Nieren des Schweins, und auch in höchst seltenen Fällen des Menschen vorkommt, eine Länge von mehreren Fuß erreicht und durch seine Zerstörung stets den Tod des Individuums herbeiführt. Der Wurm kommt auch bei manchen Fleischfressern und Hausthieren vor, ist aber immer selten. — Zu derselben Familie gehört ein im Dünndarme der Esel, besonders Nordafrikaner, lebender Wurm, der Blutwurm (*Anchylostomum duodenale*). Das Weibchen wird bis 18 Millimeter, das Männchen halb so lang; das Thier hat eine runde, bauchige, harte Mundspitze mit klauenartigen Zähnen darin, beißt damit die Darmwand an, saugt Blut und verursacht hartnäckige und selbst tödliche Blutungen. An der Einwanderung unbefallen.

Familie der Peitschenwürmer (*Trichocephalida*). Vordertheil des Körpers fadenförmig oder wenigstens verdünnt; Hinterleib bider, beim Männchen spiralsförmig eingerollt. Hierher gehört der ganz unfähliche Peitschen- oder Haarwurm (*Trichocephalus asper*, Fig. 37), der den Dick- und Dünndarm des Menschen bewohnt. Das fast gleichlange Männchen hat einen spiralsförmig eingerollten Leib, während das abgebildete Weibchen gestreckt ist. Häufig. Einwanderung unbekannt.

Zu derselben Familie gehört aber auch die höchst schädliche *Trichina*, die von dem Schweine auf den Menschen übergepflanzt wird. Die Geschichte dieses Wurms, das im weiblichen Geschlechte ausgewachsen 3 Millimeter, im männlichen halb so lang wird, beruht auf passiver Wanderung aus einem Thiere in das andere. In dem einen Wirththiere lebt der Wurm als geschlechtslose Muskeltrichine eingekapselt in den Muskeln, vorzugsweise in denen des Kehlkopfes oder der Augen, dann aber in allen Muskeln ohne Ausnahme. Man sieht dann stechnadelkopfgroße, weißliche Pünktchen, bei stark inficirten Thieren zu Millionen in den Muskeln, die sich bei genauerer Untersuchung als meist ovale Kapseln darstellen, in welchen der Wurm eingerollt liegt (*Trichinenkapseln*, links mit dem Wurm, rechts verlast, Fig. 33). In diesen Kapseln liegt der Wurm lebend gewiß Monate, vielleicht Jahre. Wird er während dieser Zeit nicht befreit, so stirbt er ab und die Kapsel fällt sich zu treibiger Masse. Wird aber das Thier (Maulwurf, Mäuse und ganz besonders Ratten) von einem Schweine, z. B. gefressen (der gewöhnliche Ansteckungsfall), so wird das Fleisch im Magen des Schweins verdaulich, die Kapseln lösen sich auf und die Trichinen werden im Darne frei. Sie entwickeln sich in wenigen Tagen, begatten sich und gebären Junge. Diese bohren sich in die Darmwandungen und die Blutgefäße ein, gelangen in die Muskeln, freffen die Muskelsubstanz, rollen sich dann spiralsförmig zusammen und puppen sich dann in der Kapsel ein, die theils von ihnen, theils von dem Muskel geliefert wird. Der Zeitpunkt, zu dem die Muskeltrichinen einwandern und freffen, ist die Zeit der Erkrankung — Schmerzen in den Muskeln, rheumatischen ähnlich, Heiserkeit, Fieber, bei massenhafter Einwanderung typhusähnliche Zustände und Letztes. Vom Schweine auf den Menschen setzt sich der Wurm fort; die Muskeltrichine des Schweins wird *Trichina* (*Trichina spiralis*, reifes Weibchen, Fig. 34) beim Menschen, und ihre Jungen wandern in die Muskeln desselben ein. Man hat Erkrankungen vieler Personen mit häufigen Todesfällen nach dem Genusse eines inficirten Schweins beobachtet. Mit der Ein-

der Trichinen hören die Krankheitserscheinungen. Um die Epidemie zu verhüten, ist zweierlei: 1. Abhaltung der Schweine von Zutter und Exkreten, wo sie Ratten und deren Leichname fressen; 2. Abhaltung der Menschen vom Genuß von Fleisch. Da die Trichinen sehr zählebiger Natur sind, ist es zu ihrer Abtödtung vollkommenen Durchfrieren der Schweinefleisches. Am gefährlichsten sind die Trichinen in der Leber und rohe Schinken.

Klasse der Saitenwürmer (Gordiaceae).
Saitenwürmer ohne Darm und After. Schmarotzer, vorwiegend in Insekten. Geschlechter männlich und weiblich.

Der Körper ist meist sehr lang im Verhältniß zur Breite. Die Anatomie ist noch nicht vollständig aufgeklärt. Der Mund öffnet sich entweder unmittelbar oder mittelst einer kurzen Speiseröhre in die Leibeshöhle, in welchem eigentümlichen Zellkörper ausgefüllt ist. Die Saitenwürmer (Gordida) entstehen aus dem Eiern abgelegten birnförmigen Eiern, welche mit einem Stiel versehen, zwei Reihen von Stacheln und kurz zungenförmigem Hinterende. Sie bewegen sich mit diesen Waffen in Wasserinsekten Larven, welche eine weitere Metamorphose und Auswanderung durchlaufen ist unbekannt. Die erwachsenen Saitenwürmer finden sich in Insekten, besonders Heuschrecken, Wanzen, Käfern, Schmetterlingen, in der Leibeshöhle und treten wieder aus, um sich zu begatten. Der Körper ist einem dünnen Drabte ähnlich. Andere Saitenwürmer sind länger, und von weißer Farbe, leben in Wasser, verlassen dieselben, um in feuchter Erde zu leben, erzeugen Junge mit einfachem Stiel, deren Fortleben unbekannt. Noch andere, mit Stacheln versehen (Sphaerulida) leben in Humus.

Klasse der Kraken (Acanthocephali).

Der Mund noch Darm. Ein einstälpbarer, durch den besetzter Rüssel zum Einbohren. Der After getrennt.

Die Ordnung enthält nur eine einzige Gattung (Acanthocephalus), deren Arten aber sehr zahlreich sind, welche die größte Art, ein Wurm, der zur Länge von 1½ Fuß erreicht (Echinocanthus gigas, Taf. 29, Fig. 38), in dem Darmsystem einheimischen Schweine, der wilden wie domestischen, ziemlich häufig vorkommt. Die Kraken haben schlauchförmigen quergemerkelten Körper, vorn einen Hakenrüssel zeigt, der, wie schon bemerkt, in eine Scheide zurückgestülpt werden kann, in Reihen gestellten Haken sind rückwärts und dienen besonders als Halter, sowie zum Zerschneiden der Darmwände und Gewebe des Körpers. Der Rüssel sowie seine Scheide werden von eigenen Muskeln bewegt. Zwischen der Oberhaut und der Leber liegt ein Netz weitmäschiger, wandungsloser Zellen, die in einer meist rötlich gefärbten weichen Substanz eingebettet sind und den Schleimkanälen entsprechen. Mit diesem Kanalsysteme stehen zwei bandartige Organe, die sogenannten Lemniscen, in Verbindung, welche von der Rüsselscheide aus in die Leibeshöhle hineinragen und die ebenfalls von wandungslosen Kanälen durchzogen sind. Verdauungs- und sonstige innere Organe fehlen durchaus. Geschlechter sind getrennt. Die kleineren Männchen besitzen zwei ovale Hoden, deren Ausführungsgänge durch eigentümliche Drüsen hindurch in eine

schiefe napfförmige Tasche münden, welche sich auf die weibliche Geschlechtsöffnung bei der Begattung aufstülpt. Die großen Weibchen zeigen an der Rüsselscheide ein frei herabhängendes Band, an welchem die Eierstöcke hervorsprossen, um sich später loszulösen und in die Bauchhöhle zu fallen. In diesen losen Eierstöcken entwickeln sich die langen Eier, die meistens eine faserige Hülle besitzen und dadurch ein eigentümliches Aussehen erhalten. Die ausführenden Geschlechtsorgane bestehen aus einem mit trichterförmiger Mündung in die Leibeshöhle mündenden Schlauche, welcher äußerst beweglich ist, die reifen Eier förmlich einschludt und nach außen befördert. Die Embryonen sind mit Haken bewaffnet, bohren sich in verschiedene Wassertiere ein, kaspeln sich in diesen ersten Wobuthieren ein, erlangen ihre Reife und leben dann als ausgebildete Würmer im Darmsystem derjenigen Thiere, welche den ersten Wirth gefressen haben.

Klasse der Plattwürmer (Platyolmia).

(Tafel 29, Figur 25 bis 30, 39 bis 42 und Tafel 30, Figur 1 bis 22.)

Würmer ohne Kopf und Borsten, mit plattem, mehr oder minder gestrecktem Körper, meist Zwitter und großentheils Schmarotzer.

Der Körper ist bald breit, blattartig, bald mehr schnurförmig und läßt nur dann Gliederungen erkennen, wenn die Tendenz zur Bildung besonderer, als Ketten zusammenhängender Individuen vorhanden ist. Nur höchst selten sieht man eine eigentliche Leibeshöhle, meist sind die Organe im Parenchym eingebettet.

Die Haut ist bei vielen zeitlebens, bei andern nur im jugendlichen Alter, seltener zu keiner Zeit mit Wimperhaaren besetzt und zeigt meist einzelne Drüsenzellen, sowie bei einigen sogenannte Nesselorgane, d. h. in die Haut gestellte, leicht losgehende feste Körperchen oder Stäbchen, welche bei den Polypen besonders entwickelt sind, aber auch bei einigen Radtschneden des Meeres vorkommen. Oft finden sich besondere Haft- und Bewegungsorgane, Warzen, Sängnapfe, Haken — aber niemals Bewegungsborsten, wie bei den Borstenwürmern. Die Bewegung geschieht theils durch die Wirkung der Wimperhaare, theils durch Zusammenziehungen des Körpers, dessen Hautmuskelschlauch oft sehr entwickelt ist.

Das Nervensystem ist verschieden gestaltet, besteht aber immerhin wenigstens aus zwei etwas seitlich gelegenen obern Schlundganglien (Hirnganglien), die durch einen Ring unter dem Schlunde vereinigt sind, wenn es überhaupt vorhanden ist; denn bei einigen (Bandwürmern, Balanoglossus) ist es noch durchaus unbekannt. Am ausgebildetsten ist es aber bei den Egel, wo ein vollständiges Bauchmark mit obern und untern Schlundganglien besteht; bei den Schnurwürmern weichen die beiden Stränge, welche das Bauchmark bilden und bei den Egel erkennbar sind, zur Seite und trennen sich ganz, und bei den andern sind die Seitenstränge nur sehr kurz und von gewöhnlichen Nerven wenig verschieden.

Die Sinnesorgane sind im ganzen wenig ausgebildet. Den meisten Schmarotzern geben sie ganz ab; bei vielen finden sich Lappenanhangs des Körpers oder Taststäbchen, kryallhelle brüchige Stäbchen an bestimmten Stellen der Haut; die Augen, wenn vorhanden, sind meist in der Mehrzahl und in pigmentirten Gruben angebracht; Ohrbläschen mit Ohrsteinen darin, einfach oder doppelt, nur bei wenigen entwickelt.

Das Verdauungssystem fehlt einigen, die nur durch Aufsaugung mittels der Haut leben, gänzlich; bei andern hat es noch eine vordere Öffnung, während

ein After fehlt. Bei vielen ist er sehr einfach, bei andern äußerst verästelt; der Mund bald bewaffnet, bald nackt. Ebenso wenig wie für dieses System läßt sich etwas Allgemeines für die Organe der Atmung, des Kreislaufs und der Fortpflanzung sagen — wir werden diese bei den einzelnen Ordnungen in Betracht ziehen. Dagegen läßt sich behaupten, daß die Schleifenläufe, freilich in verschiedenen Modificationen, allgemein vorkommen und von jeder Verbindung mit den Geschlechtsorganen losgelöst sind, so daß sie nur als Absonderungsorgane und zum Austausch der Flüssigkeiten thätig sein können.

Die Plattwürmer leben entweder frei, meist im Meere, oder als Außen- und Innenschmarotzer. Am Boden feststehende Typen sind nicht bekannt. Nur höchst wenige leben auf dem Lande, in feuchter Erde oder feuchten Wäldern. Alle, welche im erwachsenen Zustande Wimpern auf dem Körper haben, leben frei schwimmend oder kriechend; bei allen andern zeigt sich die Tendenz zum Parasitismus mehr oder minder ausgebildet. Hiernach kann man zwei Unterklassen unterscheiden.

Unterklasse der Wimperwürmer (Vibrantia).

Im erwachsenen Zustande Wimperhaare auf dem Körper. Leben frei.

Ordnung der Schnurwürmer (Nemertida).

Körper lang, schnurförmig; gerader Darm mit Mund und After; selbständiger, einstälpbarer Rüssel; meist getrennte Geschlechter.

Der Körper ist platt wie eine Schnur, glatt und durchaus mit stimmernenden Wimpern bedeckt, seine Contractilität außerordentlich groß. Das Nervensystem besteht bei der höhern Familie aus zwei seitlichen, meist ziemlich bedeutenden Knoten, die aus mehreren Aufschwellungen zusammengesetzt sind und durch einen breiten Verbindungsstrang auf der Bauchseite vereinigt werden. Von diesen Knoten aus strahlen Nerven nach vorn und zwei ziemlich bedeutende Hauptnervenstränge laufen längs den Seiten des Körpers nach hinten. Die häufig fehlenden Augen finden sich am vordern Ende des Kopfes und außer ihnen meist noch zwei seitliche Gruben, welche mit größern Wimperhaaren versehen sind als die übrige Hautoberfläche, deren Bedeutung für die Ökonomie des Thiers aber noch nicht enträthelt ist. Der Verdauungsapparat ist einfach gestaltet; der Mund bildet eine Längspalte, die in einen geräumigen Darmlanal führt, der ganz gerade verläuft, viele ringförmige Einschnürungen besitzt und ebenfalls nach hinten in einem After endet. Ueber dem Darmlanal und unabhängig von demselben ist eine am vordern Ende des Körpers geöffnete Röhre angebracht, welche einen oft bedeutend langen Rüssel enthält, der nach außen hervorgestülpt werden kann und an dessen Grunde sich eine dolschähnliche Waffe befindet, mit welcher wahrscheinlich die Beute durchbohrt und dann ausgesogen wird. Das Gefäßsystem besteht aus zwei seitlichen und einem mittlern, auf der Rückenfläche verlaufenden Stamme, in denen eine lebhafteste Stimmerbewegung bemerkt werden kann und die sich vorn und hinten durch Querschlingen vereinigen. Bei einigen Gattungen ist das Blut, welches diese Gefäße führen, gelb oder roth gefärbt.

Die Geschlechtsorgane bestehen aus einfachen Säcken oder Schläuchen, die auf der äußern Fläche des Darmlanals aussitzen und die bei dem einen Individuum Eier, bei dem andern Samen erzeugen. Die entwickelten Eier fallen in seitliche Räume und scheinen

durch Oeffnungen an den Seiten nach außen zu gelangen. Begattungsorgane hat man nicht gesehen. Die Eier werden in Schnüren gelegt, welche sich in ihnen aus jedem Dotter, dem ein oder zwei meist eiförmig in einer Gallerthülle eingeschlossen sind, bilden. Die Eier sind meist runder, mit Wimpern versehen. In einiger Zeit die Gallerthülle durchdringend, bewegen sie sich in ihrem Innern und lassen wahrnehmen, der sich bald schärfer abgrenzt, wurmförmige Bewegungen macht. Erst wenn der Wurmkörper die stimmernde Hülle durchdrungen hat, schreift er zurück, während er sich in die Hülle ausdehnt. Bei einigen andern Gattungen ist der Entwicklungsvorgang im Innern der Eier, jedoch lebendige Junge gebären und andern ist der Larvenzustand weit länger, jedoch innerhalb einer höchst eigenthümlichen Gestalt eines Zesthutes (Piliolum) der der Schnurwurm entsteht, der nur sehr selten der Larvenkörper in sich aufnimmt.

Man kennt nur sehr wenige Schnurwürmer. Der Rüssel (Prohynchus) mit sehr langen Wimpern ist der Rüsselschnurwurm (Nemertis) per. Wir gehen auf die verschiedenen Arten, die man unterschieden hat, nicht weiter ein (Borlasia) erreichen eine ungemeine Länge, stülpen sich leicht und haben große Contractilität. Die abgebildete Art von Meckelia (Meckelia, Taf. 29, Fig. 39) ist im Meere nicht selten.

Ordnung der Strudelwürmer (Turbellaria).

Körper breit und platt. Darm mit After. Meist Zwitter. Keine Larvenstadien.

Die Familie der Kleinmäuler (Turbellaria) die sich in süßen Gewässern findet, ist die vorzuziehende Ordnung an und bildet die Hauptgruppe dieser. Diese kleinen Würmer, die sich auch durch Knospen und Theilung vermehren, haben keinen vorstreckbaren Rüssel, aber einen geraden und endständigen After und in der Regel sehr ähnliche Mundorgane ähnlich denen der Strudelwürmer. Ihren Augenpunkten fehlen die Medien; Nervensystem, Gefäßsystem und Spüren entbehren.

Die übrigen Familien kann man in zwei Ordnungen theilen. Die eine, Rhabdocoela, hat einen geraden, schlauchförmigen Darm ohne After, liegt auf der Bauchseite, oft in der Mitte des Körpers selbst mehr nach hinten und führt bald zu röhrenförmigen, ovalen oder kreisförmigen Schlingen, wie bei der abgebildeten, im Süßwasser lebenden vergrößerten Art (Monocelis agilis, Taf. 40), in einen muskulösen, mehr oder minder langen Schlauch, der aus dem Munde als Rüssel hervorstreckt werden kann. Sie wohnen meist in süßen Gewässern und haben, außer den in ihrem Baue sehr verwickelten Geschlechtsorganen, besondere Dotterstöcke, nämlich drüsenartige Organe, in welchen sich die Dottertheile bilden, welche in Bläschen zugefügt werden. Geschlechtsöffnung.

Die Unterordnung der Dendrocoela ist vor den vorigen durch den sehr breiten, eckig geplatteten Körper, durch meist deprimierte Einschnürungen und durch den Umstand auszuzeichnen, daß der Darm baumförmig im Körper verläuft.

seife wie bei vielen Saugwürmern. Nervensystem u. s. w. sind meistens höher entwickelt, und tentakelähnliche Fortsätze, wodurch die flachen Nadschneden ähnlich sehen. Im Meere häufige und große Arten; einige im Süßwasser sehr wenige im feuchten Boden, sogar in den von Gewächshäusern. Der Schlund ist eine Höhle vorstreckbar. Die abgebildete Art *Polycelis laevigata*, (Fig. 41.) die Schnurwürmer durch die Organisation des Systems, Kreislaufs und ihre Larven, welche sich den Borstenwürmern nähern, tritt eine, welche man hier erwähnen kann, durch die Entwicklung mit den Stachelhäutern, durch den Überzug mit den Schnurwürmern und die Kiemen mit den Seecheiden in einige. Wir meinen die Eichelwürmer (*Balanus*). Das Thier wühlt mittels eines rüsselartigen, aber mit dem Darne nicht in Verbindung stehenden Fortsatzes im Sande. Hinter diesem, an den Tragenden Theile liegt der Mund, durch den der gerade Darm führt, dessen Anfang durch die Kiemen communicirt. Die Larve ist als *Tornaria* bekannt und wurde früher als eines Stachelhäuters angesehen.

Klasse der Napfwürmer (*Cotylidea*).

Alter stets wimperlose Haut trägt tiefe oder Gruben, womit die Thiere festhalten können. Meist Schmarotzer.

Die sind nach Bildung und Fortpflanzung verschieden, das es geeigneter erscheint, sie nach den zu behandeln. Während die Egel sich den Kiemen und namentlich den Erdwürmern durch die Organisation vielfach anschließen, sind die anderen, wie dem Schmarotzerleben angepasste Kiemenwürmer und die Bandwürmer noch mehr Schmarotzthum verändert.

Ordnung der Egel (*Hirudinea*).

Die flache Plattwürmer mit derber Haut, oben, hinten, oder hinten und vorn Saugnapf, entwickeltem Nervensystem und Kreislauf, meist Zwitter.

Die Ordnung begreift meist lange, schlaffe, rundlich abgeplattete Würmer, die eine schlüpfrige Haut besitzen und auf der Oberfläche sehr feine Runzeln zeigen, welche indess den durch die ganze angeordneten Gliederungen nur in Ausnahmefällen entsprechen. Der Körper ist meist nach hinten hinwärtig, nach hinten breiter und trägt an dem vorderen Theile stets einen breiten, muskulösen Saugnapf, welcher zum Anheften dient. Das dünnere Hinterende ist niemals als eigentlicher Kopf abgesetzt, bei den meisten Gattungen ebenfalls einen breiten Saugnapf aus zwei seitlichen Lippen gebildet, in dessen Grunde sich der Mund befindet. Der Schlund fehlt alle sonstigen Bewegungsorgane, jede Spur von Fußstummeln oder Borsten; die Fortbewegung geschieht beim Kriechen nach Art der Spannwürmer durch abwechselndes Anheften der Saugnäpfe an schlängelnde Windungen beim Schwimmen. Das Nervensystem ist sehr entwickelt; es finden sich Querschnitte, welche die Knoten des Bauchmarkes verbinden. Bei der am niedrigsten stehenden Gattung der Weichegel sieht man indessen das Nervensystem in ähnlicher Weise wie bei den Schnurwürmern angeordnet, indem nur zwei seitliche Knoten

existiren, die durch eine dünne, unter dem Schlund herziehende Schlinge verbunden sind und zwei seitliche Nerven nach hinten schicken, die keine Knoten zu besitzen scheinen. Zum Tasten dient besonders das vordere Kopfsende; Augen finden sich bei allen frei lebenden Egel in der Zahl von zwei bis zehn, fehlen aber den Schmarotzenden Gattungen.

Die Egel leben hauptsächlich von dem Blute anderer Thiere und besitzen zu diesem Endzweck in der Mundhöhle meist hornige Waffen, womit sie die Haut anbohren, um nachher zu saugen. Bei den Blutegeln findet man im Grunde des vordern Saugnapfes drei harte bogenförmige Kieferwülste, die auf ihrer Schneidefläche mit kleinen, hornigen, knollenförmigen Zähnen besetzt sind und beim Anbohren so vorgehoben werden, daß sie einen dreieckigen Stern bilden. Jeder Kiefer wirkt auf die Haut wie eine Säge. Der Blutegel bewegt diese Vogensäge unter beständigem Aufdrücken so lange hin und her, bis er die Haut durchbohrt hat, wo er dann die Kiefer zurückzieht und das Blut durch abwechselnde Ausdehnung und Zusammenziehung des muskulösen Schlundes aufpumpt. Bei den Kiemenegeln finden sich nur zwei Kiefer vor, bei den Rüsseliegeln dagegen eine Schlundröhre, ähnlich derjenigen der Sohlenwürmer. Der auf den muskulösen Schlund folgende Darm ist meistens durch mehr oder minder starke Einschnürungen in einzelne Säcke getheilt und zeigt noch außerdem in häufigen Fällen im hintern Theile des Körpers gelegene Blindsäcke, welche zuweilen verästelt sind. Der Mastdarm ist von dem übrigen Darne meist durch eine enge Klappe getrennt und öffnet sich mit einem engen After, unmittelbar vor dem Saugnapfe des Hinterrandes an der Rückenfläche. In dem Blutgefäßsysteme findet sich bald rothes, bald farbloses Blut, und man unterscheidet als wesentliche contractile Stämme zwei seitliche Längsgefäße, ein Rücken- und ein Bauchgefäß, die vorn und hinten durch weite Querbogen und in den Körperringeln durch feinere Zwischenäste miteinander in Verbindung stehen. An den Seiten des Körpers sieht man meist eine Anzahl von sehr feinen Oeffnungen, welche in rundliche Säcke, die mit schleimförmigen, lebhaft stimmernden Kanälen in Verbindung stehen, einmünden. Diese Schleimkanäle haben auch innere Oeffnungen und zum Theil drüsige Wandungen, stehen aber zu den Geschlechtsorganen in keiner Beziehung.

Sämmtliche Egel sind, mit Ausnahme einiger, Hermaphroditen und pflanzen sich nur durch Eier, nicht durch Knospung oder Theilung fort. Die Geschlechtsöffnungen liegen auf der Bauchseite meist in der Nähe des Mundes unmittelbar hintereinander. Die vordere männliche Oeffnung führt in ein zweibellförmiges Säckchen, aus welchem das lange fadenförmige Begattungsorgan hervorgestreckt werden kann. In jedem Ringel des Vorderleibes liegt ein Paar Hoden, welche mit langen, an den Seiten hinlaufenden Samenängängen in Verbindung stehen. Die weiblichen Geschlechtsorgane bestehen aus zwei bohnenförmigen Eierstöcken, die in einen kurzen Eileiter und einen flaschenförmigen, nach außen mündenden Eibehälter sich fortsetzen.

Die Entwicklung der Egel ist höchst eigenthümlich. Bei den eierlegenden Egel schwimmt am Vordertheile des Leibes ein gallertartiger Stoff aus, welcher eine Art Gürtel darstellt. Der Wurm legt die Eier in diesen Gürtel, zieht sich dann aus demselben heraus, die Oeffnungen des Gürtels schnürren zusammen, und es ist so eine hornartige Eikapfel gebildet, welche an Wasserpflanzen angeliebt wird und die man mit den Cocons der Seidenraupen verglichen hat. Die Cocons der Blutegel sind von bedeutender Größe und ent-

halten stets viele Eier. Diese entwickeln nach vorausgegangener Zureichung zuerst eine innere Höhlung mit einem nach außen mündenden Schlunde, der bei vielen beständige Schlundbewegungen macht und sogar die benachbarten Eier, welche in ihrer Entwicklung zurückgeblieben sind, verschlingt. Die Anlage des Bauchmarkes bildet eine Art Primitivstreifen, entfernt ähnlich, aber nicht homolog demjenigen der Wirbelthiere, und auch nicht demjenigen der Gliederthiere, womit man ihn zusammenstellt hat.

Den Uebergang zu den Zimmerwürmern bilden die Weichegel (*Malacobdellida*). Ihr Körper ist mit Zimmerhaaren besetzt, abgeplattet, vorn stumpf, hinten mit einem großen Saugnapf versehen; der Mund weich, unbewaffnet, mit kleinen Wurzeln besetzt; der Darmanal gerade, ohne Blindfäde und Verzweigungen; das Nervensystem besteht aus zwei seitlichen Stämmen und zwei seitlichen Schlundnoten. Die Geschlechter sind getrennt; äußere Begattungsorgane fehlen ganz. Sie schmagen auf Seemuscheln.

Die Familie der Rüsselegel (*Clepsinida*) hat einen hinten breiten, vorn sehr schmalen Körper, mit einem breiten, hintern Saugnapf, einen vorstreckbaren Rüssel ohne Bewaffnung und einen mit langen Blinddärmen versehenen Darmanal. Sie leben hauptsächlich in süßen Wassern, wo man sie an Wasserpflanzen kriechend antrifft, und nähren sich vom Blute der Wasserinsekten. *Clepsine*, die wir Taf. 29, Fig. 30 abbilden, ist häufig in Bächen und Gräben.

Die Familie der Blutegel (*Hirudinida*) hat einen mehr gleichförmig breiten Körper, zuweilen mit deutlichen Ringeln, und außer dem großen hintern Saugnapf einen vordern Mundnapf, welcher bald permanent ist, bald auch, wie bei dem medicinischen Blutegel, durch Ausdehnung der lippenförmigen Umgebung des Mundes gebildet werden kann. Der Mund ist stets ohne Rüssel, bei einigen mit Kiemen bewaffnet, bei andern nur mit einem fleischigen Wulste versehen. Zu dieser Familie gehört der gewöhnliche Blutegel (*Sanguisuga*), in Mitteleuropa, Kleinasien und Ostindien einheimisch, der zum Blutsaugen am Menschen benutzt wird; der Rüssel (*Haemopsis sanguisorba*, Fig. 28), und viele auf Fischen (*Piscicola*) und auf Krebsen (*Branchiobdella*) schmarnagende Würmer. Die meisten Blutegel lauern im Versteck auf die Thiere, welche zur Tränke kommen, andere heften sich an die äußere Haut oder in leicht zugänglichen Höhlen (Mund- und Kiemenhöhlen) an. Zum medicinischen Gebrauche werden eine Menge von Arten und Varietäten in verschiedenen Ländern benutzt; bei uns wesentlich drei verschiedene Varietäten. Man fängt sie in Bächen und Gräben, transportirt sie in frischen Beuteln von Leinwand, die man von Zeit zu Zeit in Wasser taucht; züchtet sie in Leichen, füttert sie alle sechs Monate mit Blut, das man in Beuteln in das Wasser hängt, oder mit Froschlisch, Kaulquappen und jungen Fröschen. Unmittelbar nach dem Saugen entleert man sie durch Druck von hinten nach vorn. Manche auf Fischen schmarnagende Blutegel zeigen deutliche Gliederung (*Albione*, Fig. 29). In den feuchten Wäldern Südafriens und den Inseln gibt es Landblutegel, die sich besonders an die Beine der Wanderer anfangen und eine wahre Landplage sind.

Ordnung der Saugwürmer (*Trematoda*).

Weichhäutige, platte Würmer mit einem oder mehreren Saugnäpfen, asterlosem Darm, einfachen seitlichen Schleisengefäßen, ohne Kreislauf und Athemorgane. Außen- oder Innenschmarotzer. Meist Zwitter.

Die Haut ist weich, sehr dehnbar und in ihr finden sich meist eigenthümliche Kalkkörperchen von schalenförmiger Gestalt, die concentrische Ringe zeigen wie in blinden Nerven der Schleisengefäße liegen. Die Haut und der ganze Körper sind äußerst contractil und von einem massenförmigen Muskelgewebe durchzogen. Zum Anheften besitzen die Saugwürmer einen oder mehrere Saugnäpfe, welche oft noch von den übrigen Gerüsten und innern Gelen unterläßt werden, niemals aber solche Gelenröhren, wie die Bandwürmer haben. Bei einigen Gattungen enthält der am vordern Ende des Leibes gelegene, meist kleinere Saugnapf zugleich den Mund. Die übrigen Saugnäpfe sind un durchbohrt, auf der Bauchfläche oder an dem Hinterende des Leibes angebracht und manchmal selbst in großer Anzahl vorhanden. Diese hintern Saugnäpfe sind dann zuweilen mit eigenthümlichen Horngerüsten und Gelen versehen, die innerhalb der Saugnäpfe selbst angebracht sind. Bei vielen Saugwürmern kommen auch nur Sauggruben vor, die zuweilen zu einem förmlich geritterten Ringe an der Bauchfläche zusammenfließen. Mittels dieser Saugnäpfe und Horngerüste heften sich die Saugwürmer sowohl an den innern als an den äußern Organen anderer Thiere sehr fest und entgehen dadurch auch ziemlich leicht der Nachforschung. Bei vielen kommen auf der hintern Warzen, Stachelkreuze u. s. w. besonders am Vorderende vor. Das Nervensystem besteht aus zwei feinen, durch einen schmalen Faden vereinigten Ästen und liegt bei den Gattungen, die einen vordern Mund haben, auf der Bauchseite des Schlundes, bei den übrigen an der entsprechenden Stelle. Die beiden Seitenfäden, welche nach hinten gehen, sind nur dünn und zart, lassen sich aber meist durch den ganzen Körper verfolgen. Sinnesorgane fehlen durchaus, nur bei einigen Larven oder ammenartigen Wesen hat man Pigmentflecke gesehen, deren Bedeutung als rudimentäre Augen indeß noch sehr zweifelhaft ist. Die Verdauungsorgane der Saugwürmer sind fast immer deutlich entwickelt, nur bei einigen wenigen rudimentär. Am dem Vorderende des Leibes in der Mittellinie meist etwas auf der Bauchseite, seltener am After, befindet sich der Mund, der in einen bald längern, bald kürzern, meist geraden, zuweilen geschlangelten Schlund übergeht; zuweilen findet sich noch ein kleinerer muskulöser Schlundkopf, niemals aber ein eigentlicher Magen. Am Ende des Schlundes theilt sich nämlich der Darm in zwei gabelförmige Äste, die meistens blind endigen, bei den Einsäckern aber in der Mitte zusammenlaufen, so daß der Darmanal einen förmlichen Kreis bildet. Nur bei einigen wenigen und in ihrem ganzen Verbalten sehr abweichenden Saugwürmern findet sich ein einfacher gerader Darmanal, der aber stets asterlos ist. In den meisten Fällen sind die gabelförmigen Darmschläuche einfache blinde Enden von meist gleicher Weite, oft aber gehen von den beiden Hauptstämmen sehr viele verzweigte Nebenäste aus, die sich durch den ganzen Körper verbreiten und sehr verzweigte Gefäßbäume bilden, welche indeß überall blinde Enden besitzen. Die den Schleisenkanälen der übrigen Würmer homologen Gefäße bestehen aus zwei seitlichen, vielfach gewundenen und zuweilen selbst zurückgebogenen Ästen, die am Hinterende des Körpers meist in eine gemeinschaftliche Blase sich vereinigen und mit einer Oeffnung nach außen münden. Im Innern finden sich hier und da Zimmeradern oder Zimmerüberzüge, in den Endästen des Rückenmarkes, das die feinsten Kanäle bildet, die erwähnten Kalkconcretionen. Die Junction scheint hier wesentlich Aussonderung zu sein.

Plattwürmer, mit alleiniger Ausnahme einiger, sind Hermaphroditen und pflanzen Fortpflanzung und geschlechtliche Zeugung fort. Die Geschlechtstheile nehmen meistens den vorderen Theil des Leibes ein und haben merkwürdigerweise verschiedene Bildungsstätten für die einzelnen Eier. Das Reimbläschen bildet sich in dem im Leibe gelegenen eiförmigen Behälter, oder, dessen kurzer Ausführungsgang in den vorderen Theil des schlauchförmigen Uterus mündet; den ebenfalls die Ausführungsgänge vieler traubenförmiger Blindfäden, der Dotterkapseln, welche die Dottersubstanz gebildet wird. Uterus und Reimbläschen treten in dem schlauchförmigen, dem sogenannten Uterus, erst zur eigentlichen Eier zusammen. Der meist gewundene Uterusschlauch mündet gegen den Vorderrand des Körpers hinter dem neben dem männlichen Begattungsorganen auch nach außen. Jeder Saugwurm besitzt zwei Hoden, die meistens hinter den Hoden und von welchen zwei Samenleiter zu einer in ein inneres Samenbläschen, welches den Grund des Uterusschlauchs mündet, die in ein äußeres Samenbläschen, welches den langen Gang in das Begattungsorgan bildet. Es ist auf diese Weise sowohl Begattung als auch die Selbstfruchtbarkeit in einem Individuum erzeugten Eier bewahrt. Die Eier der Saugwürmer haben eine eiförmige Schale, die zuweilen mit einem Stachel umgeben ist; sie sind meist eiförmig, bräunlich, und in einigen Gattungen so unverbältnismäßig klein, daß sie für besondere Organe ansehbar. Die Art des Lebens und der Fortpflanzung man zwei Unterordnungen.

Unterordnung der Vielstöcher (Polystomida oder Monogenea).

Die Vielstöcher auf Wasserthieren mit zwei Saugnapfen oder Saugscheiben, großen, seltsam gestalteten Eiern, die Generationswechsel fortspflanzen. Die einfachsten Gastapparate stehen an dem vorderen Ende des Thiers und sind meist sehr compact, mit harten Chitineisen, haben u. s. w. Bald finden es Saugnapfe, die festesten sein können, zuweilen in Menge aufbewahrt, bald Stacheln, zu denen sich noch Saugnapfen an dem vorderen Ende des Körpers, haben u. s. w. Nur bei einigen wenigen hat man den Generationswechsel in einem besondern Organ (Prothylus), bei den meisten geht die Fortpflanzung durch große, hartschalige Eier von selbst vor sich (dreieckig, ankerartig u. s. w.), ist immer dadurch ausgezeichnet, daß die Eier in einen langen, biegsamen Faden um die Kiemen der Fische z. B. gewickelt und so das Ei festhält. Solche Eier sind in sehr geringer Zahl gelegt. Das auskriechende Junge sieht zwar den Eltern ähnlich, unterscheidet sich aber immerhin durch die Färbung, Mangel der Geschlechtsorgane. Die Thiere leben vorzugsweise an den Kiemen, seltener der Meerkrebse, einige wenige auch von außen zugänglichen Höhlen, wie die häufige einheimische Art (Polystomum) in der Harnblase der Frösche im ge-

schlechtsreifen Zustande, dagegen in der Jugend auf den Kiemen der Kaulquappen, von wo die Würmchen beim Verschwinden der Kiemen auswandern. Wir bilden zwei Arten ab; die eine, durch einen großen hinteren, mit einem Chitineisen gestützten und zwei kleine vordere Saugnapfe ausgezeichnet, lebt auf See-fischen (Dreiloch, Tristomacoccina, Taf. 30, Fig. 1), die andere, ein wahres Doppelthier, auf den Kiemen unserer Weisfische (Doppelwurm, Diplozoon paradoxum, Taf. 29, Fig. 42). Die Lebensgeschichte dieses Doppelwurms ist höchst seltsam. Als ungeschlechtig einfacher Wurm kriecht er aus dem Ei, läßt aber durch die eigenthümlichen hinteren, quer gestützten Haftstücken und die vordern kleinen Saugnapfe die Zusammengehörigkeit mit dem Doppelwurm erkennen. Jede Diporpa (so wurde das Junge genannt) hat in der Mitte des Bauches noch einen fleischigen Saugnapf und auf der Rücken- und Seiten Seite zwei Zapfen. Zwei Diporpen legen sich so zusammen, daß die erste mit ihrem Saugnapf den Zapfen der zweiten ergreift. Dann drehen sich beide so zurük, daß auch die zweite mit ihrem Saugnapf den Zapfen der ersten fassen kann. Sobald dies geschehen, verwachsen die beiden Individuen völlig und werden nun erst geschlechtsreif.

Unterordnung der Doppelsöcher (Distomida oder Digenea).

Innenschmarotzer mit höchstens zwei Saugnapfen, vielen kleinen Eiern und Generationswechsel.

Der vordere Saugnapf, der stets vorhanden, meist aber der kleinere ist, umfaßt den Mund, der hintere, der nur selten fehlt (Monostomum), findet sich in der Mitte des Leibes oder mehr nach vorn, selten am hinteren Ende (Amphistomum), und dann sehr groß, so daß dadurch der Uebergang zu der vorigen Unterordnung gebildet wird. Chitineisen und Haken sind niemals in den Saugnapfen entwickelt. Die geschlechtsreifen Thiere enthalten oft ungeheure Massen von Eiern, die sich zuweilen noch im Innern des Eileiters ausbilden, so daß die Thiere lebendige Junge gebären. Die meisten Doppelsöcher bewohnen innere, von außen zugängliche Höhlen, von welchen aus Eier und Junge leicht in das Freie gelangen können (Darm, Harnblase, Lunge u. s. w.), einige Arten freilich finden sich in geschlossenen Systemen, aus welchen die Jungen nur durch Durchbohrung der Wände aus- und einwandern können. So leben von den im Menschen einheimischen Thieren, zu welchen auch der in den Schafen so häufige, hier abgebildete Leberegel (Distoma hepaticum, Taf. 30, Fig. 2) gehört, der bei den Schafen die Leberfäule erzeugt, einige in den Gallengängen (außer dem Leberegel noch Distoma lanceolatum und crassum), eine andere Art (D. heterophyes), wesentlich in Nordafrika einheimisch, im Dünndarm, aber eine höchst merkwürdige Art, wo das größte Männchen das Weibchen in einem Halbkreis eingeschlossen mit sich herumträgt (D. haematobium), in dem Blute der Gefäße, besonders in der Pfortader der ägyptischen Felle. Wie sie dort hinein- und wie die Eier oder Jungen aus der Pfortader herauskommen, ist noch nicht erforscht.

Im allgemeinen ist die Lebensentwicklung der Doppelsöcher diese. Aus dem kleinen hartschaligen, meist mit einem Deckel aufspringenden Ei entsteht eine Larve, die in den meisten Fällen, wie bei dem Leberegel, einen vollständigen (Larve des Leberegels, Distoma hepaticum, Taf. 30, Fig. 3) oder auch einen

unvollständigen Himmelerüberzug besitzt, mit welchem sie umherzuschwimmen kann. Die hier abgebildete Larve hat ein kreisförmiges Auge (?) hinter einem Stirnfortsatz, andere haben zwei Pigmentflecke, die später verschwinden. Ist sieht man schon im Hintertheile dieser Larve die Anlage eines neuen Individuums. Nach einigem Umherzuschwimmen schlüpft die Larve in irgendeinem Wasserthier ein, wirft die Hülle ab und erscheint nun als ein verkümmertes Wurm, mehr oder minder in Form eines Schlangens. Man hat die am wenigsten verkümmerten Würmer, die noch einen kurzen Darm, einen muskulösen Schlundlopf und mehr oder minder entwickelte Schleisengefäße besitzen, Medien genannt. Von ihnen aus zieht sich eine Kette zunehmender Verkümmern, wodurch der Schlundlopf und der Darm sowie die Schleisengefäße zu Grunde gehen, bis zu Schläuchen, in welchen man nichts als eine mehr oder minder contractile Hülle und einen Beleg von innerem Protoplasma unterscheiden kann. Diese Wurmschläuche hat man Sporocysten genannt, wie man sieht, den Wurm in der höchsten Potenz der Verkümmern dar, wo er nichts mehr ist als innere Brutstätte. Man hat infolge der für den Generationswechsel angenommenen Nomenclatur diese verkümmerten Wurmindividuen, in welchen sich die Jungen auf ungeschlechtliche Weise durch Knospung erzeugen, unter dem Namen der Ammen zusammengefaßt. In allen diesen Ammen bilden sich aber die Jungen auf folgende Art. Die Hölzchen des Schlangens, oder bei den mit Verdauungsorganen versehenen Ammen nur ein Theil desselben, meistens der hintere, füllt sich mit körnigen Protoplasmaaballen an, die niemals die Charaktere eines Eies an sich tragen und nach und nach zu einem wurmförmigen Wesen auswachsen, das man schon lange kannte und unter dem Namen *Cercaria* bald den Infusorien anreichte, bald selbst mit den Samen-thieren zusammenbrachte (*Cercaria armata*, Taf. 30, Fig. 4). Es bestehen nämlich die fast mikroskopischen Cercarien nach ihrer vollständigen Ausbildung innerhalb des Schlangens aus einem Vorderkörper, der meistens einen oder zwei Saugnapfe, Verdauungskanal, Wassergefäße u. s. w. besitzt, zuweilen vorn am Kopfe mit Hornspitzen versehen ist und einen vollständigen Saugwurmfuß darstellt, und einem schwanzförmigen Anhang, welcher bei den meisten einfach, bei einer bekannten Art doppelt ist. Sobald die Cercarien so weit entwickelt sind, so brechen sie aus ihrer Amme, aus dem Keimfischlauche, hervor (bei den Medien meist durch eine eigene Geburtsöffnung, bei den Sporocysten durch Plaken des Schlangens) und schwimmen mit Hilfe ihres Schwanzes in dem Wasser umher, in welchem sie sich äußerst leicht unter den feinsten Strömungen und Windungen umhermanövern. Man braucht im Sommer nur einige Wasserschnecken in einem Glase mit reinem Wasser zu sammeln, ihnen zur Beförderung des Austritts der Cercarien die Schale abzunehmen und ihre Haut an verschiedenen Stellen einzuritzen, um bald lebhaft bewegte Wollen im Wasser zu sehen, die unter dem Mikroskope als Schwärme von Cercarien erscheinen. Viele dieser Würmer sind nun darauf angewiesen, sich in Insektenlarven oder andern Thieren, Schnecken u. s. w., welche das Wasser bewohnen, von außen her einzubohren und deren Leibesöffnungen zu bewohnen. Man hat diesen Act des Einbohrens selbst beobachtet, wobei die Stachelkränze oder die spitzen Stirnwaffen den sie besitzenden Arten, wie die abgebildete, wesentliche Dienste leisten. Beim Hineinschlüpfen in die Insektenlarve verlieren die Cercarien ihren Schwanzanhang

und erscheinen nun schon in der Form von Saugwürmern. Sie ziehen sich nun zusammen, schütten einen glasähnlichen Stoff aus und bilden sich so zu Puppenhüllen, in welcher sie durch Entwicklung ihrer vorher kaum angelegten Geschlechtstheile ihrer weiteren Ausbildung entgegengehen. Gewiß erfolgt dies erst, wenn die Wirththiere von Raubthieren, Fischen, Insekten, Vögeln und Säugethieren gefressen wurden. Im Magen und Darm dieser Thiere kriechen die eingepuppten Cercarien als entwickelte Doppellöcher aus. In dem hier skizzirten, gewöhnlichen Leben der Doppellöcher findet sich also zuerst wenigstens eine Zwischengeneration, diejenige der verkümmerten Würmer oder Ammen, welche durch innere Knospung Junge, d. h. Cercarien erzeugen. Hier können aber noch Zwischengenerationen eingeschoben werden, denn man hat constatirt, daß Medien wieder Medien durch innere Knospung bilden können, und andererseits gibt es Sporocysten, welche normal und regelmäßig Sporocysten treiben, so daß statt eines einfachen Schlangens ein vielfach verzweigtes Netz oder Filz von Schläuchen erzeugt wird, die alle wieder Knospen treiben und im Innern Cercarien erzeugen. Sodann sind in dem Lebenszyklus der Doppellöcher mehrere Veränderungen vorzuziehen.

1) Auswanderung der Eier und active Einwanderung der Larven in ein neues Wirththier, wo sich die Ammen bilden; 2) active Auswanderung der Cercarien und active Einwanderung derselben in ein neues Wirththier; 3) passive Auswanderung und Einwanderung der eingepuppten Cercarien in ein neues Wirththier durch Geißelbewegungen des bisherigen Wirthes. Man hat von vielen Arten besonders den letzten Theil des Lebenszyklus auf das genaueste constatirt, zugleich aber auch gefunden, daß viele Abweichungen vorkommen müssen, indem z. B. viele Cercarien nicht schwimmen, also auch keine activen Wanderungen vornehmen können, andere sich an Wasserpflanzen anheften u. s. w. Ebenso können einzelne Zwischenstadien übersprungen werden, wie z. B. die Bildung von Ammen, die Eimpuppung, aber im ganzen das gegebene Bild das vorwiegende.

Ordnung der Bandwürmer (Cestoda).

Mund- und darmlose, schmarotzende Plattwürmer, mit Hestorganen am Vorderende des gestreckten Leibes, der sich bis zur Schwanzspitze zweigeltaltiger Individuen theilt. Endg. Zwitter.

In der ganzen Ordnung läßt sich mit besonderer Leichtigkeit die Bildung von Individuen aus Segmenten (Zoniten oder Metameren) nachweisen. Es gibt Bandwürmer (*Caryophyllaeus*), die nur ein Individuum ohne Spur von Segmentation darstellen, andere (*Ligula*), welche nur schwache Querverwurzeln als Andeutung einer Segmentation zeigen, noch andere, bei welchen einzelne Glieder mit besonderer Structur versehen sind (*Bohricocephalus*), die sich aber nicht in Gruppen ab lösen, wieder andere, wo diese Glieder nach der Geschlechtstheile sich lösen und als Geschlechtsthiere fortleben, während der sogenannte Keim im Darne zurückbleibt (*Taenia*), und endlich gibt es Bandwürmer, wo diese Geschlechtsthiere sich lösen, ehe sie reif sind, und erst bei selbständigem Leben in dieser Weise gewinnen (*Echinobothrium*).

Wir gehen von den häufigsten Formen aus, von der Bandwurm eine Colonie, einen Thierstock bildet, bestehend aus zwei Arten von Individuen:

1) Ein einziges Individuum, der sogenannte Kopf, den wir den Scolex nennen, geschlechtslos, mit Fort-

das aus seinem hintern Ende die Geviduen sprossen läßt.
 eiche Geschlechtsindividuen, die wir Proennen, mehr oder minder zu selbständigem idualisiert, ohne Haftapparate, nur mit rganen.
 haftlich sind nur zwei Dinge: die Haut, ohne Wimperhaare, mit zahlreichen, aber idelten, gekreuzten Muskelfasern, vielfachen en, die überall darin zerstreut liegen, äußerst egen äußere Agentien, höchst endosmotisch, absoluten Mangel von Verdauungssystem er Art die Thiere sich nur durch Austausch e umgebenden Flüssigkeiten ernähren, und sleimantälen homologen Gefäße, vier zwei seitlich verlaufende Röhren, welche eiche Queräste miteinander in Verbindung ntern flimmern, in ihren letzten Verdie Kalkkörperchen der Haut herbergen sten Gliede nach außen münden.
 er trägt die Haftapparate, meistens Saughulich vier, Taf. 30, Fig. 15), oft zu sonHäutern, Anhängen u. s. w. entwickelt. öhlichen Fällen sind die Saugnapfe rund, ft, muskulös. Meist steht zwischen ihnen onischer Fortsatz, Postellum genannt, mit chen oder doppelten Kranz von Haken teristischer Form (Fig. 8, 9, 13, 22). n Fällen finden sich statt der Saugzwei oder vier Sauggruben (Fig. 17 a), mit Hakenreihen besetzte Rüssel, die in eiden zurückgezogen werden können. Im en sich meist Schleifenantäle, sonst nur ein ndegewebe. Ob ein Nervensystem existirt, weifelhaft.
 iterende beginnt die Oliederung. Die den sind um so reifer, je weiter sie vom ert sind, aus dem sie durch Sprossung af. 30, Fig. 10, der Sägebandwurm rra) im Huredarm. Der Scoler isolirt, ert Fig. 22 a, während b und c Stadien andwurms mit der allmählichen Sprossung iden darstellen). Diese enthalten im Zustande ie vollständig ausgebildeten, hermaphroditischlechtsorgane. Die männlichen bestehen ichen, im Gewebe zerstreuten Hodenbläschen, nen Gängen, wie Traubenbeeren, hängen. e vereinigen sich in einen Samenleiter, der Geschlechtsöffnung sich hinbegibt und in itelpbaren Fortsatz, den Cirrus, endet, welBegattungsorgan ist und meist in einem ftedt ist. Die weiblichen Organe bestehen einfachen oder doppelten Eierode und aus n, die mit ihren ausführenden Kanälen zu nden. An dieser Stelle bildet sich das Ei, n in den sogenannten Uterus übertritt, der in starfgewundener Schlauch ist (Bothrioceoder vielfältig verästelte, von einem Mittelgebende Blindschläuche besetzt (Taenia). Von us geht eine Scheide, die aber zu eng ist, er passiren zu lassen, in den Cirrusbeutel, sich öffnet. Die Proglottiden begatten sich elbst oder wechselseitig, und die Eier werden e) die Zerstörung der Proglottiden frei und 16 reife Proglottiden von Taenia us; Fig. 18 mehrere von Bothriocephalus). schlechtsreifen Bandwürmer leben nur im ie Proglottiden oder Bänder von Proglottie sich lösen, gehen also mit den Excreach außen. Sie kriechen besonders auf

feuchten Gegenständen herum und können so schon in den Darm von Thieren gelangen, die sich von faulenden Stoffen nähren. Außerdem sind die hartschaligen Eier außerordentlich hartlebig und bleiben, nach dem Tode und der Zersetzung der Proglottiden, selbst in Jauche u. s. w. vollkommen lebensfähig. Meist entwickelt sich schon der Embryo im Ei der Proglottide, in andern Fällen erst lange nachher. So sieht man in dem abgebildeten Ei (Fig. 11) drei Hüllen, a, b, c, und im Innern erst den Embryo d. Dieser besteht aus einem Klümpchen körniger Dottersubstanz, ist aber immer mit drei Paar Haken bewaffnet (Fig. 7 a ein Embryo, sehr stark vergrößert; b, c, d je ein Haken aus jedem Paare bei noch stärkerer Vergrößerung). Sobald das Ei in den Darm des ersten Wirthes gekommen ist, wird der Embryo frei, in einzelnen Fällen, wie bei Bothriocephalus, schlüpft er aber im Wasser aus und schwimmt in diesem mit langen Fimrierhaaren umher. Der freie Embryo arbeitet sich nun durch die Darmwände seines Wirthes mittels seiner Haken, die er zum Stemmen und Bohren braucht, durch und folgt in den Geweben den lodern Stellen oder dringt auch in die Blutgefäße ein, um mit dem Blute im Körper zu kreisen. Am passenden Orte angelommen, pupirt sich der Embryo ein und wird ein Blasenwurm (Cysticercus); durch den Reiz, den er ausübt, wird eine kleine Entzündung erregt und eine Hülle von den Theilen ausgekewicht; der Embryo selbst höhlt sich im Innern aus und wirft die Haken ab, die meist im untern Theile sitzen bleiben und noch erkennbar sind. Auf dem Grunde der Höhle wächst nun ein Zapfen hervor, anfangs unförmlich, hohl im Innern, der sich bald flaschenförmig gestaltet und mehr und mehr die Form des Scoler mit seinen vier Saugnapfen, dem Hakenrüssel und den Gefäßen ausarbeitet, aber in der Art, daß der Zapfen wie ein Handbüchsfinger nach innen eingestülpt erscheint. So ist nun eine Blase mit einem nach innen in dieselbe zurückgestülpten Scoler vorhanden: der Blasenwurm (Cysticercus) oder die Finne. Taf. 30, Fig. 6 zeigt eine solche Blase b mit dem eingestülpten Scoler, der sich in Gestalt einer kreisförmigen Vertiefung a gewahren läßt; Fig. 5 zeigt den Scoler ausgestülpt; a die mit Wasser gefüllte Blase, c der geringelte Hals, d das Kopfende des Scoler. Fig. 12 zeigt, stärker vergrößert, einen andern ausgestülpten Blasenwurm; a der Hakenrüssel, b die Saugnapfe, c die Stelle, wo sich später der Scoler vom Halse d und der Blase e trennen wird. Fig. 8 zeigt einen Blasenwurm aus der Lungenhöhle der Wegschnecken (Limax), der das Eigenthümliche hat, daß die nicht mit Wasser gefüllte Blase sich um den Scoler wie ein Doppelsack herumlegt. a Außenschicht, b Innenschicht des Sacks, c Saugnapfe, lang und schmal, d Rüsselscheide, e Hals des Scoler, f die abgeworfenen sechs Haken des Embryo, die an dem Sade sessigen, g der Rüssel mit seinen Hakenkränzen. Fig. 9 zeigt denselben Wurm aus seinem Sade, der nun ein cylindrischer Anhang wird, hervorgestülpt; dieselben Buchstaben haben dieselbe Bedeutung.

Die so gebildeten Finnen können jahrelang an den Orten leben bleiben, wo sie sich angesiedelt haben. Sie wachsen oft zu bedeutender Größe heran; bei einigen Arten findet eine Vermehrung durch Knospung statt, auf die wir bei denselben zurückkommen werden; die meisten bleiben einsam. Sie finden sich, je nach der Art, fast in allen Organen, im Zellgewebe, in der Leber, im Gehirn, den Augen u. s. w. Nach Jahren sterben sie ab; das Wasser der Blase wird dann großentheils aufgesaugt und die ganze Finne verjettet und verkreidet.

Wird aber das Bohnthier von einem andern gefressen, so wird die Blase im Magen verdaut, der Scolex löst sich ab, schießt sich hinten, setzt sich im Darne fest und läßt nun Proglottiden sprossen, welche geschlechtsreif werden und sich lösen.

Dies ist der gewöhnliche Lebenscyclus der Bandwürmer. Die Modificationen können wir bei den einzelnen Arten studiren, welche im Menschen und den Hausthieren vorkommen. Bei den Fischen namentlich kommen mehrere Familien vor, welche theils wieder in Raubfischen, theils in Vögeln und Säugethieren ihre Entwidlung erreichen, die gänzlich ungeliederten Kettenwürmer (Caryophyllida), die nur gerungelten Riemenwürmer (Ligulida), die Bierträhler (Tetrathyrida) mit vier großen, selbständig bewegten Saugnapfen, oft gestielt, oder mit ebenso viel Halentrüffeln. Beim Menschen sind zwei Familien vertreten: die eigentlichen Bandwürmer (Taenia), mit selbständig werdenden Proglottiden, vier runden, sitzenden Saugnapfen, kurzem Halentrüffel. Zu diesen gehört der gewöhnliche Kürbisbandwurm, *Taenia solium* (Scolex, Taf. 30, Fig. 13; a der doppelte Halentrüffel, b die Saugnapfe; Fig. 14; reife Proglottide mit der Uterusverzweigung in der Mitte; a der ausgestülpte Cirrus). Er wird 2—3 Meter lang, mit 7—800 Gliedern, der Cirrus meist abwechselnd am Rande, die ausgebildeten Proglottiden korbähnlich lang, der Uterus mit Mittelfraum und etwa einem Duzend Baumröhren jederseits. Er stammt von der Finne des Schweins (*Cysticercus cellulosae*) und kommt überall vor, wo man rohes Schweinefleisch ißt, besonders häufig bei Meßgern, Köchen u. s. w. Zuweilen hat man auch Finnen beim Menschen gefunden. Seltener und weit hartnäckiger ist der schwarze Bandwurm (*Taenia mediocanellata* Fig. 15 und 16), der bis 4 Meter lang wird, weit größere, fettere Glieder hat, die breiter sind und häufigere Nebensäße des Uterus zeigen. Die Saugnapfe sind größer, zwischen ihnen schwarzer Farbstoff abgelagert, der Halentrüffel, welchen der Blasenbandwurm besitzt, geht später verloren. Die dazu gehörige Finne (*Cysticercus mediocanellatae*) im Zellgewebe der Muskeln des Rinds. Der Wurm kommt im Darne derjenigen Bevölkerungen vor, die rohes Rindfleisch essen, besonders häufig in Aestrien.

Im Zustande als Blasenwurm ist für den Menschen besonders gefährlich der Hälftenwurm (*Echinococcus*), bei welchem eine eigenthümliche Knospung eintritt. Die zuerst gebildete Blase treibt Knospen, die sich als Blasen abschüren und in denen Kopfzapfen entstehen. Die Tochterblasen schnüren sich ab und erzeugen neue Knospen, sobald die Geschwulst, mit vielen Generationen, die ineinandergeschachtelt sind, eine ungeheure Größe erreichen kann. Zuletzt, aber erst nach langen Jahren, veröden die Blasen, die am häufigsten in der Leber und Lunge, aber auch sonst in allen andern Organen sich finden. Besonders in Island ist die *Echinococcus*-krankheit eine Landplage, an der wenigstens zwei Procent der Insulaner sterben. Die Blasen finden sich auch in Wiederkäuern. Der

Bandwurm (*Taenia echinococcus*), der nur 4 Millimeter lang wird, lebt im Darne des Hundes oft in großen Mengen. Der Mensch bekommt den Blasenwurm durch den Hundestoth.

Eine andere Knospungsart kommt bei dem Drehwurm oder der Quese (*Coenurus cerebralis*) vor. Der Blasenwurm setzt sich in dem Hirn der Schädeltener der Minder fest. Die Blase treibt Knospen, welche nichts anderes als Köpfe sind (Taf. 30, Fig. 19 End einer Blase mit ausgestülpten Köpfen; Fig. 20 mit ausgestülpten Köpfen; Fig. 21 ein Scolex, losgerissen und stark vergrößert; a Halentrüffel, b Saugnapfe). Die durchsichtige, mit Serum gefüllte Blase wachst im Gehirn, bewegt sich selbst als Ganzes umher und treibt stets neue Scolexknospen, sobald sie wie ein diden Stednabelköpfen besetztes Kissen aussteht. So herangewachsen, drückt sie das Gehirn zusammen und erzeugt die bekannte Drehkrankheit, bis das Thier erliegt. Der ausgebildete Bandwurm (*Taenia coenurus*), der eine Länge von 1 Fuß erreicht, lebt im Darne der Wölfe und Hunde. Drehkranke Thiere sollen natürlich am leichtesten dem Raubthiere zum Opfer fallen.

Die Familie der Grubenköpfe (*Bothriocephalus*), die keinen Halentrüffel und nur zwei seitliche Gruben, keine Saugnapfe, am Kopfe hat, ist beim Menschen durch den Schweigerbandwurm (*Bothriocephalus latus*) vertreten, der in Rußland, Polen, Schweden, Holland und besonders häufig in der Schweiz vorkommt. Er wird bis 8 Meter lang, erhält bis zu 10000 Gliedern und ist zuweilen mehrfach vorhanden. Er unterscheidet sich leicht von den andern Bandwürmern durch die breiten, kurzen Glieder (Fig. 18), in deren Mitte sich die Geschlechtöffnung mit dem Cirrus befindet, umgeben von einer Rosette angefügter Schlingen des Uterus, und durch den abgeplatteten, zungenförmigen Kopf mit seitlichen sehr flachen Gruben (Fig. 17). Es gehen nie einzelne Proglottiden, sondern stets nur mehr oder minder lange, zusammenhängende Stüde ab. Er läßt sich am leichtesten abtreiben, besonders durch Farnkraut, während der schwarze Bandwurm eher dem Kiste weicht. Aus den runden Eiern kommen Embryonen, welche mittels einer Umkleidung von langen Himmelsbaaren lebhaft im Wasser schwimmen. Ob die Grubenköpfe unmittelbar mit dem Wasser in den Darne des Menschen gelangen und sich dort mit Ueberdringung des Blasenstadiums direct in den Bandwurm verwandeln, oder ob sie erst, wie die übrigen Bandwürmer, in einem Wassertiere als Blasenwürmer leben, ist unbekannt. Man weiß deshalb nicht, wie sich vor der Einwanderung der Grubenköpfe schützen, während dies hinsichtlich der Bandwürmer sehr leicht ist. Man esse kein Fleisch, weder Schweine- noch Rindfleisch, welches nicht durch und durch der Hitze ausgelegt wurde, welche die Finnen umgewandelt tödtet.

Wir setzen zum Schluß eine Liste der bekanntesten Band- und Blasenwürmer nebst den Thieren dar, in welchen sie leben.

Blasenwurm.

- Coenurus cerebralis*, Quese; Schaf, Rind.
- Echinococcus veterinorum*, Hälftenwurm; Mensch.
- Cysticercus cellulosae*, Finne; Schwein.
- » *mediocanellatae*; Rind.
- » *pisiformis*; Gase (Leber).
- » *fasciolaris*; Maus.
- » *tenuicollis*; Wiederkäuer.
- » *longicollis*; Feldmaus.

Bandwurm.

- Taenia coenurus*; Wolf, Hund.
- Taenia echinococcus*; Hund.
- Taenia solium*; Mensch.
- » *mediocanellata*; Mensch.
- » *serrata*; Hund.
- » *crassicolis*; Kape.
- » *marginata*; Hund, Wolf.
- » *crassiceps*; Fuchs.

und Klasse der Stachelhäuter.

(Echinodermata.)

Figur 34 bis 39 und Tafel 32, Figur 1 bis 10.)

nglich symmetrische, später meist fünf-
adig gebaute Meeresthiere mit ver-
rutskelet, selbständig ausgebildetem
eigenthümlichen Schwellfüßchen
(ra) als wesentlichsten Bewegungs-
Geischlechter meist getrennt.

erform ist sehr mannichfaltig und geht von
stalt bis zu der einer platten Scheibe oder
s oder bis zur Walzenform in allen nur
Zwischengestalten vor. Bei den angehe-
ngen wird die Körperform becherartig und
en sich Mund und After auf der obern, vom
lehrten Körperfläche. Bei den Kugeln und
nen wird der Mund stets auf der untern,
äche, angetroffen, während bei der Walzen-
Stellung des Mundes an dem einen Ende
nd hinten deutlich bezeichnet. Die Stellung
inner vorhandenen After's wechselt dann
aber kann man, durch besondere Anordnung
the und der Geschlechtsorgane, den oralen
l von dem entgegengesetzten aboralen unter-
Die Bewegung ist nicht so mannichfaltig,
rn Klassen. Kein erwachsener Stachelhäuter
schwimmen, obgleich alle nur in dem
n. Sie kriechen vielmehr meistens mit
hen Saugfüßen, die man Ambulacren nennt,
loden des Wassers umher. Nur einigen
en diese Saugfüße ab und sie behelfen sich
windende Bewegungen ihres wurmförmig-
oder durch Umklammerung mittels beweg-
len und Ranken. Eine ganze Familie der
er bleibt zeitlebens durch einen mehr oder
gen Stiel an den Boden geheftet und bietet
glödenförmigen Körper sowie die oft ge-
me, welche den Mund umstehen, eine große
in ihrer äußern Gestalt mit den Polypen
genz gibt es in der ganzen Klasse der
n keine socialen Thierformen; alle leben
Individuen und pflanzen sich nur durch
e Zeugung fort.

t der Echinodermen besteht aus einem dichten
l, welches meist eine leberartige Festigkeit
tallaklagerungen, welche darin vorkommen
nchmal bis auf kleine Ueberreste die Leber-
h verdrängen, sind in einfachster Form bei
nten Seewalzen (Holothuria) vorhanden.
ie meist unregelmäßige, nebartige Körper,
ei einer andern Familie einen förmlichen
oder After tragen, welcher aus der Haut
und dem Thiere beim Angreifen eine ge-
gleit gibt. Es scheinen diese Angelhalen,
Willkür bewegt werden können, von Wich-
as Kriechen des Thiers im Sande zu sein.
sich übrigens nur bei den Gattungen wurm-
stachelhäuter, welchen andere Bewegungs-
s zwar namentlich die Saugfüße abgehen.
unlie der Seesterne rücken die unregul-
artigen Kalkkörperchen in der Haut so nahe
daß schon ein förmliches, freilich nur aus
täden zusammengefügtes, nach alten Rich-
bewegliches Skelet entsteht, das in gewisser
einem Kettenpanzer nicht unähnlich sieht.
äußern Panzerringen, welche den Körper
ers die Strahlen desselben zusammensetzen,
innen hin Querbalken, die gelenkartig mit-
runden sind und in der Mitte unter einem
ammenstoßen, sodaß an der Bauchfläche der

Arme eine tiefe Rinne, die sogenannte Bauchrinne,
gebildet wird. Zwischen diesen Stücken befinden sich
einzelne Oeffnungen, durch welche die zum Kriechen
dienenden und in der Bauchrinne gelegenen Saugfüße
nach außen hervortreten können. Man kann sich auf
diese Weise das Skelet der Seesterne als aus ein-
zelnen geschlossenen Panzerringen bestehend vorstellen,
welche Ringe nicht vollkommen rund, sondern auf der
Bauchfläche nach innen eingedrückt sind. Außer diesen
Ringen sind in der Haut der See- und Schlangen-
sterne eine Menge von Stacheln eingepflanzt, deren
Basis in die Lederhaut eingesenkt und beweglich ist,
sodaß diese Kalkstacheln zugleich als Stützen und zur
Wehre benutzt werden können. Bei den Schlangen-
sternen nehmen die Panzerringe an den Armen die
Gestalt von Tafeln an und lassen so die Lederhaut bis
auf die Fugen der Tafeln verschwinden. Noch weiter
geht diese Tafelung bei den Seeigeln; hier ist der
ganze Körper von einer Schale umhüllt, welche aus
einzelnen, meist fünf- oder sechseckigen Tafelchen zusam-
mengelegt ist und nur eine Oeffnung für den Mund
und eine für den After übrigläßt. Es sind diese
Tafelchen aus Kalkneße gebildet, welche noch mittels
organischer Isfermasse durchwebt sind. In der Nähe
des Mundes und des After's stehen diese Tafelchen oft
nur in mittelbarem beweglichen Zusammenhange, indem
sie in die lederartige Haut gleichsam eingelegt sind.
Bei den versteinigerten Seeigeln fallen deshalb diese be-
weglichen Tafeln leicht heraus, während die übrigen
Tafeln des Körpers, fest miteinander verbunden, eine
einzig Schale bilden. Auf besondern Hödern dieser
Schale sind meistens mehr oder minder große beweg-
liche Stacheln eingepflanzt, welche ebenfalls aus Kalk-
masse, und zwar aus einem einzigen Stücke bestehen
und hauptsächlich zum Stützen des Körpers bei der
Bewegung dienen. Außer den Stacheln findet man
noch eigenthümliche Greiforgane, Pedicellarien genannt,
die aus einem langen Kalkstiele und einer drei- oder
viertklappigen Zange bestehen, welche beständig geöffnet
und wieder geschlossen wird. Diese Pedicellarien, die
man früher für Schmarotzer hielt, stehen auf besondern
kleinen Höderchen, besonders häufig in der Nähe des
Mundes bei Seeigeln und Seesternen und scheinen
zum Ergreifen von Nahrungstoffen bestimmt. Sie
erscheinen schon früh bei den Embryonen und zeichnen
sich dann durch ihre plumpe Gestalt aus. Später wird
der Stiel länger, und nun schwanken diese Zangen auf
dem Stiele beständig hin und her, während ihre obern
Bäden auf- und zuschlappen. Selbst nach dem Tode des
Thiers dauern diese Bewegungen der Pedicellarien
noch eine geraume Zeit fort.

In gleicher Weise wie das Skelet der Seeigel, ist
auch dasjenige der Seelilien (Crinioidea) zusam-
gefügtes, welche besonders in den ältern Schichten der
Erde häufig vorkommen. Der Stiel dieser Thiere,
womit sie unbeweglich feststehen, wird aus scheibenförm-
igen Stücken aufgebaut, die wie Münzen aufeinander-
liegen, während der becherförmige Körper aus
einzelnen Tafeln gebildet ist. Die obere Fläche dieses
Körpers ist mit weicher leberartiger Haut überzogen,
während die Arme mit ihren Nebenarmen und Zweigen,
die an dem Rande des Beckers stehen, wieder in ähn-
licher Weise wie die Säule des Stiels aus einzelnen
Tafelstücken aufgebaut sind. Bei der Betrachtung der
Gattungen, Familien und Ordnungen werden wir auf
diese Verhältnisse näher eingehen müssen.

Die Bewegungsorgane der Stachelhäuter sind
ziemlich übereinstimmend bei allen gebildet. Bei den
wurmformigen sind deutliche Muskelmassen entwickelt,
welche äußerst energische Zusammenziehungen des Kör-

pers bewirken können. Bei den übrigen sieht man diese Muskeln nur an den speciellen Bewegungsorganen entwickelt, und hier auch oft in ausgezeichnete Weise. Die Saugfüßchen (Ambulacra), welche mit Ausnahme einer einzigen Familie allen Stachelhäutern zukommen, sind die wesentlichsten Bewegungs- und Tastorgane derselben. Es sind hohle, wurmförmige Organe, welche durch Oeffnungen des Skelets oder der Haut hervorgestreckt werden können und eine außerordentliche Ausdehnbarkeit besitzen. Bei einigen Familien sind die Saugfüßchen nur sehr klein und kurz, pfriemenförmig, ohne endständigen Saugnapf, zuweilen selbst verästelt und scheinen hauptsächlich nur als Tastorgane benutzt werden zu können. Sie stehen dann auch nur auf der Bauchseite des Körpers und können nicht durch eigene Oeffnungen in das Innere zurückgezogen werden. Bei den Seesternen, den Seeigeln und den eigentlichen Meerwalzen dagegen bilden diese Saugfüßchen lange verbbäutige Cylinder, die an ihrer Spitze mit einem förmlichen Saugnapfe versehen sind, welcher noch obenein durch einen porösen Kalkring in seiner Form gestützt wird. Diese Saugfüße treten durch eigene Löcher hervor, welche entweder in der Haut oder in den Tafeln und zwischen den Ringen der Schale oder, wie bei den Seesternen und Seeigeln, in eigenen vom Munde auslaufenden Rinnen angebracht sind, und werden von den Thieren als Tast- und Bewegungsorgane benutzt. Sie sind in ungemein großer Anzahl vorhanden, und es gewährt ein eigenthümliches Schauspiel, bei einem lebenden Seeigel die Bewegung dieser Füßchen zu sehen. Nach allen Seiten tasten sie herum, indem sie sich so sehr verlängern, daß sie nur wie ein dünnes Haar erscheinen. Eine Saugheibe nach der andern setzt sich an, saugt sich fest, und indem nun eine Menge dieser Füßchen sich verkürzen, ziehen sie den Körper wie an eben so vielen Zugseilen weiter. Seeigel und Seeesterne klettern auf diese Weise mit größter Leichtigkeit an den glatteiten Glaswänden umher und heften sich so fest, daß man eher die Saugfüßchen zerreißt, als sie durch Gewalt ablöst.

Das Nervensystem besteht aus einem fünfstrahligen Ringe, der nahe dem Munde den Anfang des Verdauungskanales umgibt und in Nerven ausstrahlt, welche längs den Ambulacralzonen oder -Rinnen verlaufen. Eigentliche Ganglien hat man noch nicht nachgewiesen, andererseits aber dargethan, daß die Nerven in eigenthümlicher Verbindung mit dem Gefäßsystem stehen müssen, da sie hohl sind und Flüssigkeiten führen. Sinnesorgane sind nur höchst sparsam entwickelt. Wirkliche zusammengesetzte Augen mit vider rother Pigmentlage hat man nur an der Spitze der Arme der Seesterne nachgewiesen; bei den Seeigeln ruhen in Vertiefungen bestimmter Tafeln am aboralen Pole, die man deshalb auch Augentafeln genannt hat, kleine Pigmentsflecke. Bei Seeiwalzen hat man ebensolche Flecke an den Fühlern nachgewiesen. Als Tastorgane finden sich hohle konische Fühler unter den Augen der Seesterne, und strahlig gefaltete, oft verzweigte Tentakeln um den Mund der Seeiwalzen.

Die Verdauungsorgane der Stachelhäuter bieten ziemlich mannichfaltige Gestalten dar. Fast bei allen befindet sich der Mund in der Achse des Körpers, bei den wurmförmigen am vordern Ende, bei den übrigen in der Mitte oder vorn an der Bauchfläche als rundliche oder fünfsidige Oeffnung. Nur bei einigen Seeigeln erscheint der Mund aus der centralen Stellung gewichen und mehr nach vorn hingedrückt; aber dann stets in solcher Weise, daß diese Abweichung in der Fortsetzung des unpaaren Strahls liegt und dadurch die Mittellinie angedeutet wird, welche den Körper in

zwei Hälften trennt. Bei den wurmförmigen Stachelhäutern ist der Mund von einem Fühlertrage, welcher meist verästelt erscheint und in die Hülle des Körpers zurückgezogen werden kann, um diese Fühlertränge im Gegensatz zur Haut äußerst weich und zart und in der Lage der Tastorgane, wie man sich leicht bei Berührung der Thiere überzeugen kann. Bei den Seeigeln ist der Mund in der Mitte einer sehr bedeutenden beweglichen Hautausbuchtung nur mit den schon erwähnten Pericardien verbunden. Bei den Seesternen sind in dieser Haut mit harten Kalkstücken besetzte Warzen vorhanden, die die Function von Zähnen ausüben. Der weitest entwickelte Kauapparat zeigt sich bei den Seeigeln, nämlich bei den Seeigeln und bei den Scheibenigeln. Bei letzteren ist der Kauapparat aus dreieckigen Kalkstücken, je zwei zu einem V-förmigen Stücke, an dessen Spitze gegen den Mittelpunkt der Mundöffnung gerichtet ist. An dieser vordern Spitze sind die Stücke eingeseut, welche wirkliche Zähne darstellen. Im ruhenden Zustande sind die Zähne so zusammen, daß sie eine fünfseitige Hülle bilden, welche den Mund gänzlich schließt. Bei den Seeigeln ist der Kauapparat der eigentlichen Seeigelkalkgerüste, aus 15 Stücken zusammengefügter, hier den Schlund, der von dem Munde nach oben in die Höhe steigt. Diese Kalkstücke sind einander beweglich und besitzen einen sehr starken Muskelapparat, der ihre Bewegungen bewirkt.

Der Darmkanal selbst, welcher von der Mundöffnung ausgeht, ist je nach der Körpergestalt verschieden gebildet. Bei den Seeigeln windet sich der von dem centralen Punkte des Körpers gelegene Mittelspindel des unpaaren Strahls gegenüber auf der Bauchseite der Mund, sodas demnach Mund und After einer Fläche befinden. Bei den Seeesternen führt die Mundöffnung unmittelbar in den Magenfad, der seitliche Ausbuchtungen besitzt. Bei den wahren Seesternen sind die Seitenäste, die oft noch auf beiden Seiten förmliche Anhänge haben, in die Strahlen hineingezogen. Bei den Schlangenseesternen bilden sich oder minder verästelte seitliche Säcke, in welche selbst liegen und nicht in die Mittellinie eingehen. Den Schlangenseesternen fehlt der After, sodas die Ausscheidungsmittel durch den Mund ausgeführt werden müssen. Bei den meisten Seesternen ist der After vorhanden, und dann stets auf der Bauchseite der Mund gegenüber angebracht. Bei den Seeigeln ist ein langer gewundener Darmkanal, der dem Munde ausgeht, in fast stets gleich durch den Körper windet und entweder auf der Rückenfläche oder in der Mittellinie des Körpers zum mittlern Strahle gegenüber endet. Bei den verschiedenen Seeigeln jede Abweichung in dieser Richtung, sodas der After bald bald seitlich auf der Oberfläche, bald auf der Unterfläche, aber stets dem mittlern Strahle gegenüber liegt. Bei den wurmförmigen Stachelhäutern ist an dem einen, der After an dem andern Ende; meist indeß ist der gleichmächtige After in dem Körper, und zwar in zwei Seiten gebogen.

Bei den meisten findet sich im Centrum ein herzartiges Centralorgan, welches in der

liegt und verschiedene Gefäßringe miteinander, die in ähnlicher Weise wie das Nervengewebe den Darm umgeben und Zweige den Ambulacra nach aussenden. Einer dieser Gefäßringe ist das Nervensystem selbst. Mit dem eigentlichen Darm aber, das ein opalisirendes Blut enthält, ein complicirtes Wassergefäßsystem in Verbindung, welches nach außen meist durch eine von einem hohlen durchgezogene, deshalb schwammig aussehende Platte (Madreporenplatte) communicirt. Die Madreporenplatte setzt sich nach innen in eine mehr oder weniger schwammig verästelte Kanal fort, der die verschiedenen Wassergefäßsysteme miteinander verbindet und sie speist. Nur bei den Stachelhäutern werden die Wassergefäße aus der Leibeswand gespeist. Die peripherischen Wassergefäße sind meist von einem Gefäßringe um den Mund und die Hauptstämme in die Strahlen, welche auf beiden Seiten verlaufen. Mit jedem Fühler und Mundfühler steht ein besonderes Bläschen in Verbindung, welches durch ein Aestchen des Wassergefäßsystems gespeist wird. Die Bläschen dienen hauptsächlich der Entfaltung der Fühler selbst, indem bei der Anziehung der Bläschen das Wasser von außen aus in die Fühler hineingedrückt und gestreckt wird, während bei der Ausdehnung des Fühlers das Wasser aus den Fühlern zurückgedrückt wird. Bei vielen finden sich noch größere, sogenannte Sammelbläschen als Sammel für die rüchströmende Flüssigkeit. Abgesonderte Athemorgane kommen nur bei den Stachelhäutern und bei den Seeigeln vor. In den letzteren finden sich auf der äußeren Bauchwand im Umkreise des Mundes baumartig verzweigte Lappchen, welche frei in das Wasser ragen und deren innere Höhle mit der Leibeswand directer Verbindung steht, so daß das Gewebe innen und außen vom Wasser umspült wird. Die Seequalen sind die sogenannten Kiemen thiere im Innern des Körpers angebracht und sind in einem zweiflügeligen hohlen Baume, der in die Leibeswand des Darms, unmittelbar vor dem Mund, eine Kiole mündet. Der eine Ast dieser Kieme liegt an dem Darne, der andere, die Kieme, an der äußeren Leibeswand an. Die Kieme besteht aus zwei Zweigen, welche innen mit feinsten Faltflügelüberzügen versehen sind, befinden sich in steter wurmförmiger Bewegung, die selbst nach der Zerstückelung des Thiers noch an das Wasser, welches die Kiemen anfüllt, wird. Der Kieme eingefogen und wieder ausgesproßt, oft mit Gewalt, daß ein großer Theil der Eingeweide hervorgedrückt wird. Wahrscheinlich sind diese Organe eher den Schleimkanälen der Stachelhäuter. Ausnahme einiger Stachelhäuter sind bei allen Stachelhäutern die Geschlechter getrennt. Es gibt männliche und weibliche Individuen, die in der äußeren Gestalt keine Merkmale darbieten; auch in ihrer Fortpflanzung gleichen sich die männlichen und weiblichen Individuen durchaus und lassen sich nur in der Fortpflanzung unterscheiden. Sie bilden eine oder lappige Schläuche, welche meistens durch kurze Ausführungsgänge sich nach außen öffnen, aber an sehr verschiedenen Orten angebracht sind. In den meisten Thieren geben frei schwimmende Larven doch gibt es auch Arten, wo die Jungen in Brutbehältern aufgezogen werden oder durch Fortziehung der Mutter beschützt werden, so daß ihre freie Bewegung stattfindet.

Die Larvenformen oft höchst seltsam. Wir können die Larvenformen nur bei den einzelnen Ordnungen andeuten. Die Stachelhäuter leben in allen Meeren oft in großen Mengen zusammen, stets auf dem Boden und an den Küsten umherkriechend.

Von vielen Seeigeln werden zur Fortpflanzungszeit die strobiliförmigen Eierstöcke gegessen. Mehrere Arten von Seequalen des Indischen Meeres sind unter dem Namen Trepang ein gesuchter Lekerbissen der Chinesen und dadurch ein bedeutender Handelsartikel. Sonst braucht man sie nur, besonders die Seeesterne, als Düng auf Feldern, die Kalksalze bedürfen.

Ordnung der Seequalen (Holothurida).

Meist walzenförmiger Körper mit Mund und After an beiden Enden. Haut mit zerstreuten Kalkkörpern. Mund von einem Tentakelkranz umgeben.

Der strahlige Bau ist nur durch den Tentakelkranz und die Vertheilung der Wassergefäße im Innern angedeutet. Meist unterscheidet man deutlich eine Bauch- und Rückenfläche, und bei einigen Gattungen geht dies so weit, daß der Körper eine förmliche Bauchhöhle hat, welche mit den Fühlern besetzt ist, während auf der mit Kalkschuppen eingehüllten Rückenfläche Mund und After von stacheligen Schuppen umgeben sich zeigen (*Cuvieria squamata*, Taf. 31, Fig. 35). Ein aus 10—15 Kalkplatten zusammengefügter Ring umgibt den Schlund. An ihn heften sich die Längsmuskeln des Körpers; er stützt zugleich das Wassergefäßsystem. Die Tentakeln sind einfach, getheilt, schüsselförmig und in Form von Scheiben mit Einkerbungen, oder baum- und blumenkrobenförmig.

Bei den meisten Seequalen entsteht aus dem Ei eine seltsame, einem Wappenschilde mit Einkerbungen nicht unähnliche Larvenform, die mit dem Namen *Auricularia* bezeichnet worden ist und die sogar durch eine eigene Puppenform, wobei indessen das Thier noch schwimmt, in der Weise in die definitive Seequal übergeht, daß kein Theil des Larvenkörpers abgeworfen wird. Die Entwicklung ist besonders bei den Stachelhäutern (Synapta) genau verfolgt. Bei einigen andern Arten scheint indessen die Larvenform zu fehlen.

Die Familie der Seequalen (Holothurida) hat kurze Saugfüßchen, ganz denen der Seeigel ähnlich, welche meist in Reihen stehen und durch Spalten der Haut hervorgestreckt werden können. Der Darmkanal im Innern ist S-förmig gewunden und an seinem hinteren Ende mit einer baumartig verzweigten Kieme in Verbindung. In der Gefangenschaft ziehen sich diese Thiere oft mit solcher Energie zusammen, daß sie einen großen Theil des Darmkanals mit der Kieme losreißen und durch den After entleeren. Es sollen sich indessen diese Theile später wiedererzeugen. In den südlichen Meeren kommt eine Gattung vor, der Trepang, welcher in großen Massen gefischt und besonders nach China als stärkendes Heilmittel verkauft wird. Die Seequalen finden sich in allen Meeren ungemein häufig an dem Boden kriechend, wo sie sich besonders von Schalthieren nähren. Die abgebildete Art ist häufig im Mittelmeere (*Seequalze*, *Holothuria tubulosa*, Fig. 36).

Bei den Stachelhäutern (Synaptida) fehlen die Saugfüßchen durchaus und sind durch eigenthümliche Kalkanker ersetzt, welche die Haut rauh machen. Ebenso fehlen innere Kiemen oder eigene Respirationorgane, indem das Wasser durch Spalten in die Leibeshöhle tritt. Der Darmkanal ist gerade, der After am entgegengelegten Leibesende. Die Thiere schnüren in der Gefangenschaft ein Stück nach dem andern ihres Leibes

ab, so daß endlich nur der Kalkring mit den Tentakeln übrigbleibt. Die abgebildete Art lebt im Sande der Küste des Oceans vergraben (*Synapta inhaerens*, Fig. 34). Eine bei Triest vorkommende Art (*Synapta digitata*) ist als Wobnthier der einzigen bekannten Schmarotzerschnecke (*Entoconcha mirabilis*) berühmt geworden.

Ordnung der Seeigel (Echinoidea).

Hautskelet größtentheils aus unbeweglich miteinander verbundenen Kalkplatten als Schale gebildet, auf welcher bewegliche Stacheln sitzen. Füßchen durch Löcher der Kalkplatten (Ambulacrallonen) hervortretend. Stets ein After.

Die Seeigel haben einen runden, herzförmigen oder abgeplatteten Körper, welcher gänzlich aus eingelenkten Täfelchen zusammengesetzt ist, die zwischen sich nur zwei Oeffnungen, eine stets auf der Unterseite gelegene für den Mund, eine zweite für den After lassen. Man unterscheidet auf dieser Schale selbst fünf Hauptabtheilungen, welche theils durch die Eden des Mundes, theils aber ganz besonders durch die Fühlergänge angezeigt sind. An bestimmten Stellen nämlich zeigen die einzelnen Platten sehr charakteristisch gebildete feine Oeffnungen, welche zu dem Durchtritte der hauptsächlichsten Bewegungsorgane des Seeigels, der Saugfüßchen oder Ambulacren, bestimmt sind. Es stehen diese Oeffnungen stets in Reihen, welche bald von dem Munde ausgehend nach oben gegen den Gipfel der Schale hin zusammenfließen und dort einen fünfstrahligen Stern bilden, bald auch nur sich auf der obren Fläche zeigen, wo sie dann in einer fünfstrahligen Rosette zusammenstehen. Die gegenseitige Stellung und Zahl dieser feinen Löcher, ihre Verbindung oder Isolirung bieten sehr wichtige Merkmale für die Gattungen und Arten dar. Man unterscheidet hiernach auf den Schalen, deren Theile sich nach der Fünfzahl wiederholen, die Ambulacralfelder, welche diese Poren enthalten, und die dazwischenliegenden Interambulacralfelder. Dem Munde gegenüber auf der Rückenseite des Seeigels befindet sich meistens der After, welcher keinem einzigen dieser Thiere fehlt und welcher dann den Mittelpunkt für die Rosette oder den Stern der Fühlergänge bildet. Der After ist meistens von beweglichen Platten eingefast, welche bei den fossilen Seeigeln leicht ausfallen. Außerdem findet sich in seinem Umriffe eine Rosette von Platten, deren jede deutlich durchbohrt ist, zum Durchtritte der Producte der Zeugungsorgane. Selbst in den Fällen, wo der After nicht im Mittelpunkte der Scheide liegt, sondern mehr nach hinten gerückt ist, selbst in diesen Fällen bilden, nur mit Ausnahme einer einzigen Gruppe, die Genitalplatten auf der Mitte des Rückens einen Mittelpunkt mit fünf oder vier Oeffnungen, von welchem die Fühlergänge ausgehen. Die Geschlechtsorgane liegen nämlich bei den Seeigeln in einem vier- oder fünfstrahligen Stern von Traubensäden an dem Rücken der Schale, und ihre Ausführgänge befinden sich in den erwähnten Genitalplatten. In den Eden des Sterns, durch welche diese Platten gebildet werden, sieht man meist noch andere feinere Oeffnungen, in welchen die rothen Augenflecken eingebettet sind. Die Madreporplatte liegt stets in der Nähe des aboralen Poles, und meist ist es eine Genitalplatte, welche porös wird.

Auf den Täfelchen, welche die Schalen der Seeigel zusammensetzen, stehen noch verschiedene Gebilde, welche besondere Beachtung verdienen. Dies sind einerseits

die Stacheln, kalkige, bewegliche Stacheln, die von der Dide eines Haars bis zu der eines Fingers und durch Gestalt, Structur und Anordnung charakteristisch sind. Es stehen nämlich diese Stacheln stets auf runden Knötchen, welchen an dem untern Ende eine hohle Gelenkfläche ansetzt, so daß sie auf einem förmlichen Kugelhügel stehen können. Im Umriffe dieses Kugelhüfles bilden sich Bänder, welche den Stachel umgeben. Je bedeutender die Stacheln, desto größer sind die Zapfenhöcker, welche sie tragen, jedoch bei den Seeigeln, wo sehr bedeutend große Stacheln vorkommen, auch auf der Oberfläche der Schale zu sehen, welche meist noch einen besonderen Fortsatz tragen und oft auch auf ihrer Spitze eine besondere Befestigung mittels eines Sehnenbandes aufweisen. Deren Verhalten dieser Höcker und der großen und kleinen, deren Höckerchen der Oberfläche nur ein raubcs Ansehen geben, alles das ist zum Vortheil zur Bestimmung der Gattungen zu benutzen. Bei den Herzigeln kommen auch stachellose Streifen vor, welche mit Stacheln besetzt sind. Die zweite Art von eigenthümlichen Gebilden, Plicellarien, die besonders in der Nähe des Mundes stehen, wurden schon früher erwähnt.

Die Entwidlung der Seeigel aus dem Ei meistens durch eine Larvenform vor sich, in ihrer Aehnlichkeit mit einer Staffelei bezeichnet hat und die aus einer mit dem gemeinamen Grundform dadurch entsteht, in welcher Winzern besetzten Eden zu langen Fortsätzen, welche mit steifen Kalkstäben gefüllt sind, diese pyramidalen Larvenform, an dem Munde sich befindet, entsteht durch die Wassergefäße der Seeigel in einer Lage, die die Abzahnung nicht derjenigen entspricht, die in der Pyramide entspricht. Die Auszahnung der Wassergefäße aus, welche über dem Munde sich befindet, die Stachelhäuter, wie später, die Seeigel spielen. Der knospenartige Seeigel allmählich die Larve, von welcher der Seeigel das Darme, die Arme mit ihrem Kalkskelet und die Haut abgeworfen und nicht in den Larvenver aufgenommen werden. Merkwürdiges ist die Seeigel diese Larvenform mit dem jungen der Schlangensterne gemein, bei welchen die Abweichungen der Form sich befinden. Die Seeigeln ist keine Larvenmetamorphose vorhanden.

Die Seeigel finden sich vorzugsweise in warmen und in geringen Meerestiefen. Einige in Höhlungen in den Felsen aus.

Die Familie der Herzigel (*Spatangidae*) herzförmige Gestalt, an welcher man deutlich eine mittlere Achse unterscheidet, die in zwei symmetrische Hälften theilt. In der zahnlosen Mund liegt selten in der Mitte, sondern vorn, der After an dem hinteren Ende der Unterseite ihm gegenüber, so daß auch auf der Mittellinie sehr deutlich angezeigt ist. Die Fühlergänge sind meistens auf dem Gipfel der Scheide vereinigt, bei einer Gruppe aber vollkommen getrennt. Der hintere unpaare Fühlergang liegt in der tiefen Rinne, wodurch die herzförmige Gestalt wird, und unterscheidet sich in seiner Form von den übrigen. Meist finden sich nur vier Stacheln und auch nur vier Eierstöcke im Innern. In der Schale finden sich nur feine, haarförmige Stacheln, sondern Zonen (*Semitaes* oder *Fasciolen*), in welchen die Stacheln fehlen. Die Gattung *Diadema* so weit bekannt, einen besondern Charakter

der Pyramide. Die Thiere leben meist Sand und Schlamm. Die abgebildete Art, *Spatangus purpureus*, Taf. 31, Fig. 37) Nordsee.

Die der Kugelform (Cassidulida) hat einen eiförmigen Körper, der meist ziemlich sehr feine Stacheln, die auf zerstreuten den. Die Fühlergänge sind bald blattförmigen Schildförmigen, bald reihenförmigen, wie sein. Der Mund steht in der Mitte der etwas mehr nach vorn, der After am an der Unterseite, jedoch bei der sonst erstalt der Thiers die Mittelachse oft sehr. Der Mund ist gänzlich unbewaffnet. Eine jetzt lebende Art aus Australien ab *Scleolites recens*, Taf. 32, Fig. 10), welche würdig ist, daß sie auch fossil im Tertiär vorkommt, und eine andere Art, die in der vorkommt (*Cassidulus lapis cancri*, Taf. 31,

die der Schildförmigen (Clypeastroida) be- von meist scheibenförmiger Gestalt, deren und mit seinen Höckerchen besetzt ist, welche arze, haarartige Stacheln tragen. Diese überall gleich. Der Mund befindet sich der Unterseite und ist mit fünf einfachen pramidaler Form bewaffnet; der After da- maß auf der obern Fläche des Scheitels, auf der untern Fläche mehr oder minder nde und dem mittlern Strahle entgegen- blergänge bilden auf der Rückenfläche einen en Blättern zusammengefügten Stern, dem reuplatte mit fünf Geschlechtsöffnungen st dient. Die abgebildete Art (*Schild- ster rosaceus*, Fig. 39) aus dem Süd-

der Pyramidenförmigen (Galeritida) hat r regelmäßige Form, die derjenigen der ert, aber der After steht außerhalb des er Seite oder unten. Die Fühlergänge Die fossilen Gattungen, von denen wir Kreide charakteristische Form abbilden *Albogalerus*, Taf. 32, Fig. 1), besitzen arat; die lebenden nicht.

gentlichen Seeigel (Cidarida) ist der g, der Mund in der Mitte der Unter- bald ganz nackten, bald mit Wörzchen gelegen. Der After liegt dem Munde der Mitte des Rückens in einer Rosette, inf Genitalplatten gebildet ist, die mit alten abwechseln. Die Madreporplatten paaren Genitalplatte verschmolzen. Der ist äußerst complicirt und wird durch linge der Schale an seinem Plage gehal- lergänge sind schmal und gehen von dem um After, meist in etwas geschlängelter Auf den Felsen zwischen den Fühlern nde Höcker angebracht, welche in Reihen e Stacheln tragen. Bei den zahlreichen eelche sich in dieser Familie finden, hat mehrere Gruppen unterschieden, so die (eigentliche Cidariden), bei denen auf hale sehr dicke auf dem Gipfel durchbohrte bei Reihen geordnet stehen, die ungemein nge, oft keulenförmige Stacheln tragen, rgänge sehr eng sind. Wir bilden aus eine fossile, für den obern Jura charak- ab (*Hemicidaritis crenularis*, Fig. ructur der ihrer Stacheln beraubten Schale wie eine lebende Art mit dicken keulen-

förmigen Stacheln (*Seeigel*, *Echinometra mamillata*, Fig. 3).

Eine andere Gruppe bilden die an den europäischen Küsten so häufigen eigentlichen Seeigel (Echiniden), die eine weit dünnere Schale besitzen, mit kleinern Höckern und dünnen spitzigen Stacheln.

Ordnung der Seesterne (Asterida).

Körper abgeplattet, scheibenförmig, fünf- edig oder strahlig. Mund auf der Mitte der Unterseite. Madreporenplatte und After, wenn letzterer vorhanden, dorsal.

Die Ordnung begreift nur plattgedrückte Thiere mit scheibenförmigen, fünfseitigen Körper und mehr oder minder ausgezackten Armen, welche von der Körperscheibe nur unvollständig getrennt sind. Der Mund befindet sich auf der Unterseite der Scheibe im Mittelpunkte, der After (wenn ein solcher vorhanden ist, denn bei vielen Gattungen fehlt er) stets gegenüber auf der Rückenseite. Die Körperhaut ist leberartig; das Kalkskelet aus einzelnen losen Panzerringen zusammengesetzt, die eine große Beweglichkeit und Biegsamkeit des ganzen Körpers gestatten; die Strahlen dieser Panzerringe beginnen an dem Munde und laufen fünfseitig nach den Seiten aus. Auf der Unterseite der Scheibe, und je nach den Familien auch der Arme, sind in den Strahlen entsprechende Ringe angebracht, welche die Saugfüßchen beherbergen, die fast ganz in die Rinne zurückgezogen werden können. Die Entwicklung ist sogar innerhalb der Familie verschieden.

In der Familie der Sonnensterne oder Medusen- haupter (Euryalida) sind die Arme vollständig von der Scheibe abgesetzt und ohne Rinne auf der Bauch- fläche. Die Körperorgane befinden sich nur in der Scheibe, welche rund ist und auf ihrer Oberfläche keine Afteröffnung zeigt. Der Mund befindet sich auf der Mitte der Unterseite; auf derselben Seite gegen den Rand hin die Madreporenplatte. Die Arme sind stets verästelt, äußerst biegsam und meistens mit Ranken versehen, welche sich spiralförmig aufrollen. Es finden sich diese Medusenköpfe besonders in den südlichen Meeren, aber stets nur selten. Die Entwicklung ist unbekannt (*Medusenköpfe*, *Euryale caput Medusae*, Taf. 32, Fig. 6).

Eine zweite Familie ist die der Schlangensterne (Ophiurida). Der Körper stellt eine rundliche oder fünfseitige Scheibe dar, mit fünf langen, stets unver- ästelten Armen, wodurch sie sich wesentlich von der vorigen Familie unterscheiden; auch ihnen fehlt stets ein After und die Madreporenplatte verschwindet bei den Erwachsenen fast gänzlich. Die langen Arme, welche keine Bauchfurchen haben, sind meist mit Stacheln oder Warzen in Querreihen besetzt und schlangenartig biegsam. Die Füßchen werden aus seitlichen Fächern an den Armen entwickelt. Die Entwicklung der Jungen beruht auf der Larvenform des Pluteus — es gibt aber auch lebendig gebärende Schlangensterne, bei welchen das Larvengerüste ganz rudimentär bleibt. Die abgebildete Art (*Schlangensterne*, *Ophiothrix fragilis*, Fig. 5) sehr häufig in allen europäischen Meeren.

In der Familie der eigentlichen Seesterne (Aste- rida) ist der Körper zuweilen nur fünfseitig oder in fünf kurze Arme ausgezogen, in welche Einsätze des Magens hineinragen, die sich oft noch verästeln. Nur selten sind diese Strahlen zahlreicher, und in diesem Falle wechselt oft ihre Anzahl in derselben Art bei einzelnen Individuen. Vom Munde aus ziehen sich die Bauchfurchen, aus welchen die Füßchen hervor- treten, durch die ganze Länge der Arme. Die einen

mit zwei Füßchenreihen haben keinen After, während die mit vier Reihen einen solchen auf der Rückenfläche besitzen. Die Entwicklung ist sehr mannichfaltig und bis jetzt noch nicht so weit aufgeklärt, daß man sie in Beziehung zu den erwachsenen Formen bringen könnte. Man kennt bis jetzt zwei freischwimmende Larvenformen, die man Bipinnaria und Brachiolaria genannt hat, eine Larvenform mit Saugnapfen, womit sich die Jungen an die Mutter anheften, und endlich gibt es auch Seesterne, die lebende Junge ohne Metamorphose gebären. Die abgebildete vielarmige Art (Sonnenstern, *Solaster papposus*, Fig. 4) häufig im Ocean.

Die Ordnung der Seelilien (Crinoidea) ist fast ganz aus der heutigen Schöpfung verschwunden, während sie in den früheren einen ausgezeichneten Rang einnahm und in den ältesten Zeiten nebst den Seesternen allein die Klasse der Stachelhäuter überhaupt repräsentirte. Die meisten dieser Thiere saßen auf langen beweglichen Stielen fest und hatten in ihrer äußern Gestalt viel Aehnlichkeit mit Polypen, so daß sie in der That von ältern Forschern unter diese gestellt wurden. Der Körper ist becherförmig, die untere dem Stiele zugewandte Fläche aus einzelnen Kalktafeln gebildet, welche in der Mitte eine Höhle für die Eingeweide lassen. Die obere Fläche des Bechers ist von einer lederartigen Haut überwölbt, in welcher sich mitten der Mund und zur Seite der After befindet. An dem Rande des Körpers stehen Arme, welche von den Tafeln, die den Becher bilden, ausgehen, meist sehr beweglich sind, eufaltet und zusammengelegt werden können und zum Ergreifen der Beute dienen. Diese Arme sind aus vielen einzelnen Stücken zusammenge setzt und tragen oft wieder besondere Aeste, Zweige und Ranken, die auf den einzelnen Gliedern der Arme eingelenkt sind. Der Körper mit seinen zusammengelegten Armen hat besonders bei einigen kurzarmigen Arten ganz die Form einer Viskentnospe auf langen Stengel.

Eine normale Seelilie kann man als zusammengesetzt aus vier einzelnen Theilen ansehen: die Wurzel, womit das Thier an den Boden befestigt ist, wird von einer kalkigen Masse gebildet, ähnlich der Grundmasse, an der die Polypen aufsitzen. Sie erscheint meist als eine Ausbuchtung ohne weitere specielle Ausbildung. Auf dieser Wurzel erhebt sich der Stiel oder die Säule, zusammenge setzt aus einzelnen, meist runden oder säufedigen Gliedern, welche gewöhnlich eine mittlere centrale Oeffnung besitzen, durch die ein Kanal nach unten sich erstreckt, der hauptsächlich nur für die bewegende Fasermaße des Stiels bestimmt scheint. Die Tafeln des Stiels haben meist auf beiden Seiten Kerben und Vorsprünge, die ineinandergreifen und oft die Figur eines säufstrahligen Sterns bilden. Diese isolirten Tafeln, die man auch Trochiten oder Entrochiten genannt hat, finden sich häufig in den Schichten der Erde vor, während wohlerhaltene Seelilien in ganzer Gestalt seltener sind. Bei vielen Gattungen trägt der Stiel seitliche Ranken, die andern fehlen; bei andern verkümmert er oder zeigt sich nur als knospenartiges Rudiment. Der Körper oder Becher der Seelilien besteht aus einzelnen Stücken, welche man je nach der Entfernung oder der Nähe des Stiels und der Arme ziemlich ungewöhnlichweise Bedenglieder, Hüftglieder, Schulterglieder u. s. w. genannt hat. Diese Tafeln bilden mehrere übereinanderliegende, sich erweiternde Kreise, auf deren äußerstem die Arme eingelenkt sind. Dieser sind fünf oder zehn, die sich aber oft noch vielfältig in Aeste spalten. Auf ihrer innern Seite zeigen die Arme eine Rinne, welche von der weichen Hautbedeckung überzogen ist und auf der die kleinen Saugfüße angebracht sind. Der

Becher ist durch eine mehr oder weniger geschlossene, auf welcher sich der After befindet, und der ecentrische After befindet sich in der Mitte der Arme und den dort angebrachten Saugfüßen.

Man kann unter den lebenden Seelilien unterscheiden: die eine begreift die gestielten Seelilien (Encrinida), von welchen jetzt durch die Untersuchungen viele Arten bekannt gemacht sind, welche in der That nur sehr kleine, tausend Füden und mehr, besonders in den Zonen des Oceans. Wir bilden aus der eine fossile Art ab, die für den Vergleich ristisch ist (*Encrinus liliiformis*, Fig. 5).

Die Familie der ungestielten Seelilien (Comatulida), ist aus Thieren, die im erwachsenen Alter vollkommen fest auf dem Boden noch jetzt in untern Meeren vorkommen. Diese Seelilien haben einen abgeplatteten Körper, der aus einzelnen Tafeln besteht, die auf einer Bauchfläche sich zwei Arme, eine mittlere, der Mund, eine seitliche, stehende, der After. Die zehn Arme dieser Thiere besitzen, sind an dem Rande des Bechers eingelenkt und aus Tafeln gebildet, auf welchen zweizeilige bewegliche Fortsätze, die Mittelglieder dieser Arme und Anhängel, sind sehr geschickt an Meerestpflanzen befestigt und sehr beweglich sind, wobei ihm sehr behülflich sind, welche auf einer Rinne der Fläche der Arme stehen. Die abgebildete Seelilie im Mittelmeere (Haarstern, *Comatula*, Fig. 7).

Die Entwicklung ist jetzt ziemlich bekannt und wirft ein großes Licht auf die Entwicklung überhaupt. In der That entsteht aus der Haarstern eine ovale Larve mit querschnittsähnlichem Wimperbusch und großer, welcher allmählich die Kalkplatten des Stiels sich zeigen. Indem nun nach und nach die innere Skelet mehr auswächst, die Querschnittsfläche selbst anlegt und die Wimperreihen sich bilden, wird aus dem Ganzen ein Wesen, das sich nicht unähnlich sieht und sich selbst hervorsticht, die Arme hervor, und so wird aus der Larve eine feststehende Seelilie, die sich in den Busch abbilden (*Pentacrinus europaeus*). Nachdem die Seelilie bis zu einer gewissen Größe herangewachsen ist, trennt sie sich von der Erde ein Haarstern. Die jetzigen Haarsternen, also dieselben Entwicklungsstadien, die in der Entwicklung überhaupt in der Erdgeschichte

Kreis der Darmgeßel. (Coelenterata.)

Die Verdauungshöhle setzt sich unmittelbar oder durch Spalten aus den von Höhlen und Kanälen fort, die den Körper durchziehen.

Die ursprüngliche Grundform dieser Thiere ist ein Cylinders, der in der Mitte einer blind endenden Verdauungshöhle aus zwei Schichten zusammenge setzt ist, die Ektoderm, welche meist ursprünglich aus Mund und Nesselorganen besteht, und die Entoderm, welche die verdauende Höhle auskleidet, deren Verzweigungen fortsetzt, wenn die

Grundform, die nur eine Achse erkennen durch den Mund und die Verdauungsorganen ist, entwickelt sich nun in den eine symmetrisch bilaterale Form, die erhalten, aber immer in der Weise, daß durch die Verdauungshöhle kenntlich bleibt, bei andern in eine radiäre Strahlenform indem sich die meisten Organe strahlig um allen. Bei dieser radiären Anordnung sind vier und sechs und ihre Multiplen maßemals wie bei den Stachelhäutern die

äußern Haut kommen fast ganz allgemein organen vor, welche sich auch bei Strudel: in einigen nackten Mürkschnecken vorfinden. sie sich oft in ungewöhnlichem Grade ent: an besondern Körperstellen, z. B. Jang: rordentlich angehäuft. Sie bestehen aus l, welche im Innern einen Faden birgt, erührung hervorgehoben wird und als verewundet. Das Neßeln der Quallen, die Seebädern so unangenehm werden, rührt Organen her.

auungsorgane sind eigenthümlich gespränglich ein axialer Blindfad, wie die Hydra und den ähnlichen Wesen das Leben eibt, verästelt sich der hintere Theil bei ausgeht in Kanäle über, welche den Körper achziger Anordnung durchziehen, bei vielen desselben in Ringkanälen sich vereinigen, bei enden, oder wenn Thierhöde gebildet sind, ungschöhlen der einzelnen Thiere miteinander zugleich ein Neß von Ernährungskanälen lonie in ihrer Gesamtheit bilden. Auf der ruse der Ausbildung erhält zwar der vor: auende Theil dieses Gastrovaskularsystems, sad, eine eigene Wandung; er steht aber auch mit dem Kanalsystem durch weite Oeffnungen in Verbindung, sodas auch dann die Re: Verdauung unmittelbar in das Gastrovaskular: egeführt werden.

stem und Sinnesorgane sind bei zwei ch gar nicht nachgewiesen, bei den beiden r zum Theil und in sehr beschränkter Aus: Bei den meisten kommen sehr verschieden fähler, Arme u. s. w. vor, die meist um den tellt sind, meistens zwar zum Haschen der ten, aber auch als Tastorgane gelten müssen. den geschlechtliche Vermehrung, und bei den d sogar die Geschlechter getrennt; einige sind, penquallen, Zwitter. Außerdem kommen aber Kreise so mannichfache Formen der Vermeh:) ungeschlechtige Zeugung vor; innere und öpenbildung, Theilung u. s. w. Ebenso häufig ie Bildung von Thierstöden durch Erzeugung en, welche sich nicht ablösen, sondern mit gern in organischer Verbindung bleiben, und t kommt ein Polymorphismus der Indivi: der Weise vor, daß für die verschiedenen t, besonders Ernährung und Fortpflanzung gestaltete Individuen sich bilden, welche dem gegenüber dieselbe Rolle spielen, wie die n Organe im Körper der Einzelwesen.

Meeresthiere sind Wasserthiere und mit höchst usnahmen Meeresthiere. Im Haushalte der ielen einige Klassen derselben von Urzeiten ebendende Rolle, und man kann wol sagen, Gebirge ihnen ihre Entstehung verdanken. ann bei den Darmgefäßlern zwei Reihen en, die Reihe der Quallen mit meist weichem

Körper (Rippenquallen und Quallenpolypen) und die Reihe der stielbildenden Cölenteraten (Koralienpolypen und Schwammthiere).

Klasse der Rippenquallen (Ctenophora).

(Tafel 32, Figur 19, 20 und 23.)

Freischwimmende, gallertartige Einzelthiere von bilateralem Typus, mit in Reihen gestellten Schwimmblättchen als Bewegungsorgane. Im Meere lebende Zwitter, ohne ungeschlechtige Vermehrung.

Die Rippenquallen haben einen meist eiförmigen oder gürtenartigen, zuweilen sehr in die Breite gezogenen Körper, an dessen vordern Ende sich der Mund, an dem hintern der After befindet. Die Bewegungsorgane und die Gefäße sind meist so angebracht, daß sie wie Radien einer durch Mund und After gelegten Achse erscheinen, während Magen und Nervenknoten den bilateralen Typus herstellen. Bei manchen Rippenquallen wird der symmetrische Typus noch deutlicher, indem der Körper seitlich ausgezogen wird und zuweilen selbst in ein langes Querband sich fortsetzt, in dessen Mitte die Verdauungsorgane liegen.

Die Haut der Rippenquallen ist stets nackt und zuweilen, ähnlich wie bei den Armpolypen, mit Hautorganen besetzt, aus welchen ein steifes Härchen hervorragt. Außer diesen nur mikroskopischen Organen zeigen sich auf der Oberfläche des Körpers stets rippenartige Linien, auf welchen die Schwimmoorgane angebracht sind. Diese bestehen aus langen, etwas steifen, in Querlinien aufgestellten Haaren, die zuweilen an ihrer Basis vereinigt sind und wie ebenso viel auf der Rippe angebrachte Lappchen zum Schwimmen vor- und rückwärts bewegt werden. Sie hängen sowohl einzeln als in ihrer Gesamtheit von dem Willen des Thiers ab. Die Körpersubstanz besteht aus einer homogenen Gallertmasse, in welcher sich verzweigte, varicöse Nervenfasern, welche fast geradlinig längs den Schwimmblättchenreihen verlaufen, und vielstrahlige Nervenzellen, aber keine Nervenstämmen untercheiden lassen. Außerdem kommen deutliche Nistelfasern vor von sonderbarer, pinselähnlicher Gestalt. Der Nervenknoten, den man früher unterscheiden wollte, ist aus Zellen ohne Fasern gebildet. Der Mund befindet sich in der Achse des Körpers und führt entweder unmittelbar oder durch eine längere Verengung in eine weitere Höhle, den Magen, welcher nach hinten zu sich wieder verengert und durch zwei seitliche Spalten in eine trichterförmige Höhle ausmündet, welche zugleich zur Aufnahme des Wassers bestimmt ist. Bei den meisten Rippenquallen ist der Mund mit zwei sehr langen und äußerst contractilen, verästelten Fangfäden bewaffnet, die meistens in besondern Höhlen oder Scheiden neben dem Magen liegen und dort sich in beständiger, wurmförmiger Bewegung befinden. Diese Fangarme sind mit Neßel- und Giftorganen besetzt und werden, wie es scheint, nur zum Tasten und Umstricken der Beute benutzt. Von dem Trichter aus, worin der Magen mündet, entspringen acht Radialgefäße, welche längs den Rippen der Schwimmblättchen hinlaufen und in ihrem Innern Kletterbewegung zeigen. In beiden Seiten dieser Radialgefäße finden sich verzweigte Blindfäden, in welchen sich einerseits die Eier, andererseits die Samenthiere erzeugen. Die Eier entwickeln sich in einfacher Weise; bei denjenigen Rippenquallen, welche Mundschirme besitzen, sprossen diese Theile erst später hervor. Alle leben im Meere und sind entweder glasbell durchsichtig oder mit zarten Farben geschmückt.

Man hat vier Ordnungen unterschieden: die Lappenquallen (Lobata) mit Schirmklappen vor dem Munde und ungleich langen Schwimmbälkenträgern. Hierher gehört die abgebildete, im norwegischen Meere häufige, oft handlange Art (Bolinia norvegica, Taf. 32, Fig. 19). Die Handquallen, (Cestida) mit seillich verlängertem Körper; eine Art, der Venusgürtel (Cesum Veneris), im Mittelmeere, wird bis 1 Meter lang. Die Kürbisquallen (Saccata), mit engem Maul, kugelförmigem Körper, langen, in Säde einziehbaren Fangfäden; die abgebildete Art (Cydippe pileus, Fig. 23) aus der Nordsee. Die Gurtenquallen (Beroida), mit weitem Maul, ohne Fangfäden; die abgebildete Art aus dem Mittelmeere (Berus Forskalii, Fig. 20).

Klasse der Quallenpolypen (Hydrozoa).

(Tafel 32, Figur 21, 22 und Tafel 33, Figur 1 bis 12.)

Körper keulen- oder glodenförmig; meist mit Fangfäden um den Mund. Gewöhnlich Radialkanäle von der Magenhöhle aus. Fest-sitzende oder schwimmende Wesen, Einzelthiere oder Colonien, meist mit Generationswechsel oder Knospenbildung.

Die meisten Thiere, welche dieser Klasse angehören, erscheinen unter zweierlei Formen: derjenigen eines keulenförmigen Polypen, um dessen Mund meist Fangarme stehen, und derjenigen einer Qualle oder Meduse von Gloden- oder Schirmgestalt. Wir betrachten zuerst diese Formen gesondert.

Die Form, welche wir mit dem Namen der Armpolypen bezeichnen, umfaßt Thiere von weichem Körperbau, die meistens in Colonien zusammenleben und deren Mund von einer veränderlichen Zahl wimperloser, rundlicher, sehr ausdehnbarer Fühler umgeben ist. Viele Gattungen haben einen Polypenstod, der entweder nur eine Incurstation oder verästelte Bäumchen bildet, die glodenförmige Zellen tragen, in welche sich meist die einzelnen Polypenleiber zurückziehen können. Diese Polypenstöcke sind dann äußerst zart, papierartig oder hornig und biegsam; sie bilden niemals größere Massen oder Korallen, wie die eigentlichen Korallenpolypen.

In der weichen Haut der Armpolypen finden sich Nesselorgane, welche aus einem mit Widerhaken versehenen Bläschen bestehen, das einen fleberigen Faden hervorschnellt, welcher sich beim Erhaschen der Beute um dieselbe schlingt. Die Bläschen reißen sich bei dieser Gelegenheit aus der Haut los, und ihre Berührung tödtet unausbleiblich die kleinen Thierchen, welche von den Armen erfaßt waren. Die Fangarme selbst sind stets rundlich und bei einigen Gattungen scheinbar aus einem grobzelligen Gewebe gebildet, während sie bei andern hohl sind und diese Höhlen mit der Magenhöhle in Verbindung stehen. Nervensystem und Sinnesorgane hat man noch bei keinem Armpolypen entdeckt. Der Mund, der in der Mitte des Fühlerkreises sich befindet, führt in eine einfache Verdauungshöhle über, welche zwar von eigenthümlichen Zellen des Endoderms ausgekleidet, aber nicht von der Leibeswandung getrennt ist. Bei den einfachen Armpolypen ist die Verdauungshöhle nach unten blind geschlossen, während bei den gesellschaftlichen Gattungen sie nach unten in eine Röhre übergeht, welche in ein für alle Individuen des Stodds gemeinschaftliches Netz von Röhren mündet. In allen diesen Röhren wird die Ernährungsflüssigkeit durch zarte Wimpern umgetrieben. Die unverdauten Stoffe werden bei allen durch den Mund ausgeworfen.

Die Schirmquallen oder Medusen sind meistens gallertartige Thiere von mehr oder minder scheibenförmigem, zuweilen glodenförmigem Körper, dessen freier, meist mit Fäden belegter Rand durch wechselnde klappende Zusammenziehungen und Ausdehnungen als Schwimmmorgan dient. An der unteren Fläche dieses meist glasartig durchsichtigen Körpers befindet sich der Mund oder die seine Stelle vertretenden Saugorgane, oft von stielartigen Verlängerungen umgeben, sodas der ganze Körper einigermaßen einem Hutpilze ähnlich sieht.

Alle Quallen sind nackt und ihr aus einer oft theerharten Zellensubstanz zusammengefügter Körper von einer zarten Oberhaut bedeckt, in welcher sich meist ähnliche Nesselorgane finden, wie wir sie schon bei den Polypen kennen lernten. Die Gänge der Seitenkanäle kennen diese nesselnde Eigenschaft oft aus eigener schmerzlicher Erfahrung. Der scheibenförmige Körper selbst zeigt stets in der Anordnung aller seiner Organe einen streng regelmäßig strahligen Latus, so das man jede Qualle in je vier oder sechs vollkommen gleiche Segmente verpalten kann. Nach diesen Zahlen geordnet zeigen sich dann auch bei den meisten diesen Thiere an dem Rande angebracht, oft außerordentlich lange contractile Fäden, welche offenbar als Fühlhaken benutzt werden.

Als Nervensystem und Sinnesorgane hat man mit Recht eigenthümliche Körper gedeutet, welche an dem Rande der Scheibe meistens in sechs- oder achtfach eingebettet liegen. Es bestehen diese Nesselhaken aus einem lapfelartigen Bläschen, in welchem ein runder oder ediger kristallinischer Kern enthalten ist. In einigen Gattungen sind diese Bläschen von einem leuchtend gefärbten Pigment umgeben, was sie für Augen ansprechen ließ, während ihre Zusammensetzung aus einem kristallinischen Kerne, der in einem Bläschen eingeschlossen liegt, eher darin die erste Bildung des Hörgorgans erkennen lassen dürfte.

Die Verdauungsorgane sind in eigenthümlicher Weise gestaltet. Meist ist ein einfacher Mund vorhanden, der zuweilen nur von einem Randsaume umgeben, in den gewöhnlichen Fällen aber von Fangarmen der verschiedensten Gestalt umstellt ist. Oft besitzen diese Fangarme Randsaume, die wie eine Krone gefaltet sind, und oft ist der Magen lang ausgezogen, so das er wie ein Schwengel in der Glode hängt, oder in einen kreuzförmigen Spalt verwandelt, der wie das Jabot eines Hemdes von vorspringenden Kransen umgeben ist. Bei einigen wenigen Gattungen findet sich keine einzelne Mundöffnung, sondern je nach Saugmündungen, die entweder auf einem einfachen Mittelstiele oder auf vielfachen Fühlern, die oft noch verästelt sind, sich nach außen öffnen. Die feinen Röhren, welche von diesen Saugmündungen austreten, führen ebenso wie der einfache Mund in eine größere oder kleinere Magenhöhle, welche meist eine gewisse Anzahl von strahlig gestellten Nebensäden besitzt. Aus diesen Nebensäden entspringen Gefäße in bestimmter Zahl, welche strahlig nach dem Rande zufließen und dort entweder in ein Randgefäß oder in ein dachziegeltes Mäschennetz von feinem Gefäßen übergehen. Der ganze Körper wird auf diese Art von der Ernährungsflüssigkeit durchzogen, und nicht selten sieht man sogar noch unverdaute Reste kleiner Thierchen in diesen Kanälen.

Die Geschlechtsorgane zeigen sich in der Form bandförmiger Drüsen, welche bald als Streifen an dem untern Rande der Scheibe auf den Radialkanälen oft in bedeutend großer Zahl, bald an dem Magen selbst, bald in eigenen nach außen geöffneten Stielen

er Magenöhle in Form gekrauter Fransen sind und einzelne Säcken enthalten, in dem einen Geschlecht die Samenthierchen, deren die Eier sich entwikkeln.

Die Formen, welche wir hier charakterisirt nun entweder für sich bestehen, oder in den meisten Weisen sich miteinander combiniren. Man unterscheidet verschiedene Ordnungen und selbst unterscheiden.

Unterklasse der Armpolypen.

g der Meerschirme (Lucernarida).

Verdauungshöhle mit Scheidewänden.

Die Meerschirme, durchsichtige, mit einem runden Stiele oder Polypen in der Form eines Sonnenrades, entweder nur acht einfache oder selbst nur getheilte dicke Fächer besitzen, welche durch fächerförmige Zwischenhaut verbunden sind. An dieser Fächer bemerkt man eigenthümliche und Nesselhaufen. Die Verdauungshöhle ist endlich kurz und öffnet sich nach hinten so in die Verdauungshöhle, welche vier Scheidewände in vier Theile theilt. Die Eierstöcke, welche ganz den gewöhnlichen Polypen ähnlich sind, erstrecken sich bis weit hervor in die schirmförmige Verbreitung der Tentakeln. Man findet Vertiefungen dieser Familie an den nördlichen Ozeanen. Sie bilden einen Uebergang zwischen Korallenpolypen einerseits und den Quallen andererseits. Ihre Entwicklung ist noch nicht hinreichend bekannt.

g der Armpolypen (Hydrida).

Verdauungshöhle ohne Scheidewände; Arme; Körper keulenförmig.

Die Meerschirme der Süßwasserpolypen (Hydrida) entstammen ursprünglich aus der Gattung Hydra, deren wir vorzüglich häufig an Wasserinsektenwurzeln finden. Das Thier ist ganz nackt, mit langen Armen versehen, die es auch zum Umherklettern auf Wasserpflanzen gebraucht. Es gleich es sich gewöhnlich mit seinem Kopfe ruhig auf Beute lauert. Die Fangarme sind hohl und ihre Höhle steht mit der den Körper des Thiers bildenden Verdauungshöhle in Verbindung. Sie können ungemein verlängert werden, dienen durch ihre Nessel- und Haftorgane zur Beute, die besonders in Wasserfliegenlarven, kleinen Würmlarven und dergleichen Thierchen besteht. Die Thiere sind ungeheuer gefräßig und pflanzen dem Futter lebhaft durch Knospen fort, die an den Leibeshälften hervorprossen. Ihr Leben ist, ihre Reproduktionskraft ungemein groß, und sie sind in der Lage, ihre Stüde wieder zu selbstständigen Thieren zu entwickeln. Die hervorprossenden Knospen stehen mit der Leibeshöhle in Verbindung, schneiden sich vollständig ab, sobald ihre Arme entwickelt sind. Die Eier knospenzeugend pflanzen sich die Thiere auf geschlechtlichem Wege fort. Unmittelbar nach der Befruchtung bilden sich warzenförmige Knospen, welche sich ausbilden, mit Samenthierchen besetzt sind, die durch Öffnen der Spitze entleeren; es entstehen die Eier. Die Eier bilden sich am Grunde der Knospe durch eigenthümliche Umänderung einer Zelle. Sie erhalten eine dicke, zuweilen mit Stacheln besetzte Hülle. Durch diese Eier, die an Wasserpflanzen hängend den Winter überdauern, wird die Gattung im Frühjahr wieder neu belebt. Die abgebildete, schön grüne Art ist die Hydra viridis, Taf. 33, Fig. 7).

Unterklasse der Quallenpolypen (Hydromedusae).

Die Körpergestalt der Geschlechtsthiere stets schirm- oder glodenförmig, meist frei beweglich. Meist Zwischengenerationen ungeschlechtlicher, durch Knospen sich fortpflanzen-der, polypenähnlicher Wesen.

Ordnung der Schwimmpolypen (Siphonophora).

Schwimmende Thierstöcke, meist aus polymorphen Individuen zusammengesetzt.

An einem gemeinsamen hohlen Stamme, der meist höchst contractil ist und in welchem die Ernährungsflüssigkeit circulirt, hängen meist verschieden gestaltete, durch Knospung gebildete Individuen, bald in Gruppen vertheilt, bald mehr gemeinsam. Stets ausgebildet sind Nährthiere; keulenförmige Polypen ohne Arme, nur zuweilen mit etwas ausgezacktem Mundrande und centraler Verdauungshöhle, die durch einen Stiel sich in die Höhle des Stammes fortsetzt. Meist haben diese Nährthiere mit sehr complicirt gebildeten Nesselkapseln besetzte Fangläden. Zuweilen findet sich, wie bei der Segelqualle (*Velella cyanea*, Taf. 33, Fig. 5), auf der untern Fläche ein großer Nährpolyp im Mittelpunkt, umgeben von vielen kleineren. Eine zweite Klasse von Individuen bilden die Bewegungsthiere, gewöhnlich in Gestalt von Gloden mit Radialkanälen, Schwimmhaut, aber stets ohne Mundkörper, die bald reihenweise, bald nur paarweise am vordern Ende des Stammes stehen. Bei der abgebildeten Art aus dem Mittelmeere, wo dieses der Fall ist (*Praya diphyes*, Fig. 1), hat zugleich jede am Stamme befestigte Gruppe noch eine besondere Schwimmglocke. Zuweilen gibt es statt dieser Bewegungsthiere nur hydrostatische Apparate, wie bei den Segelqualen oder den so furchtbar nesselnden Seefläsen (*Physalia utriculus*, Fig. 2) aus dem südlichen Theile des Ozeans. Die Geschlechtsthiere endlich können sehr verschieden gestaltet sein. Sie können Knospen, Büschchen u. s. w. vorstellen, welche sich nicht vom Stamme lösen oder so als Individuen organisiert sind, daß sie förmliche Medusen darstellen mit Glode, Radialkanälen und Geschlechtsorganen. Alle diese Knospen sind eingeschlechtlich, niemals hermaphroditisch, und zuweilen ist auch die ganze Colonie nur eines Geschlechts. Die Geschlechtsknospen sitzen bald isolirt am Stamme, bald mit den Nährindividuen in einer Gruppe, bald selbst auf dem Stiel der letztern. Außerdem kommen noch verkümmerte Individuen vor, als polypenähnliche Laster ohne Mund, als inorpelige Deckstücke u. s. w., so daß die Mannichfaltigkeit der Bildung und Zusammensetzung sehr groß ist.

Die Thierstöcke, welche fast nur in südlichen Meeren vorkommen, sind das reizend Schönste, was man sehen kann. Sie entwikkeln sich aus Eiern, in welchen sehr bald nach der ersten Anlage des Individuums eine Knospung weitere Vermehrung und Differenzirung bedingt.

Wir haben aus den verschiedenen Familien drei Haupttypen abgebildet: die Segelqualle (*Velella cyanea*, Fig. 3 von oben; Fig. 4 von der Seite; Fig. 5 von unten). Die Grundlage, auf deren Unterseite viele verkümmerte Individuen als Tentakeln am Rande, ein großes Nährthier in der Mitte und darum herum kleinere Nährthiere mit Geschlechtsknospen an den Stielen sitzen, besteht aus einem inorpeligen Gerüste mit Luftkammern, auf welchem schief eine dreieckige

steife Lamelle steht. Die Seeblase (*Physalia utriculus*, Fig. 2), das Kriegsschiff der Matrosen, in tropischen Meeren mit einer großen, einem Weinschlauche ähnlichen Luftblase ohne Schwimmbloden; endlich eine Doppelqualle (*Praya diphyes*, Fig. 1) mit zwei Colonialschwimmblasen am Ende und Gruppen mit Schwimmblasen und helmartigen Dedrüsen an dem langen contractilen Stamme.

Ordnung der Quallen (*Medusida*).

Polypen festliegend, Medusen schwimmend; erstere meist Stöcke bildend, letztere freie Einzelthiere.

Die Fortpflanzungsverhältnisse namentlich sind äußerst vielgestaltig in dieser Ordnung, und zwar kann man dieselben sich etwa in folgender Weise ordnen:

1) Gibt es eine Anzahl von Wesen, welche sich ohne Zwischengeneration direct in derselben Form fortpflanzen.

Bei einigen Medusen geschieht dies auf geschlechtlichem Wege. Die Eier entwickeln sich, erhalten einen Zitterüberzug, schwärmen als Larven ein wenig umher, bilden den Schirm und die übrigen Organe aus und werden den Aeltern ähnliche Medusen.

Ähnliches geschieht bei manchen Polypenformen. Das mit einem Zitterüberzuge ausgezeichnete Ei (*Planula*) setzt sich fest, öffnet die Verdauungshöhle und läßt die Arme sprossen.

Die directe Fortpflanzung kann auch als Knospung vor sich gehen. An den Darmgefäßhöfen der Qualle, sei es am Rande des Schirms (Zaf. 33, Fig. 12: *Sarsia prolifera*), an den Radialkanälen, an den Magen, den Kanälen des Magenstiels u. s. w., entstehen Knospen, welche anfänglich einer Beule gleichen. In derselben ist als Fortsetzung der Darmgefäßhöhle der Mutter eine Höhle, die sich zum Magen der Knospe umgestaltet. Diese öffnet sich durch Vorprossung der Arme, Ausbildung des Schirms, und hängt schließlich nur noch mit der Spitze der Schirmwölbung an dem Mutterthiere fest, von dem sie sich löst. Die Knospe ist der Mutter ähnlich, nur in einem Falle hat man bis jetzt Knospen beobachtet, die der Mutter unähnlich sind.

Die Knospung bei den Polypen findet in derselben Weise statt, wie bei den Armpolypen, meist aber bleiben die gleichgestalteten Knospen sitzen, sobald Stöcke gebildet werden.

In seltenen Fällen vermehren sich Quallen und Polypen durch Theilung.

2) Meistens pflanzen sich die Thiere in der Art fort, daß zwei Formen miteinander abwechseln; die Quallenform und die Polypenform. Wir geben, um diesen Wechsel verständlich zu machen, den Entwicklungsengang der in der Nord- und Ostsee häufigen Ohrenqualle (*Aurelia aurita*, Fig. 9).

Die Quallen sind getrennten Geschlechts, ihre Eier entwickeln sich in besondern Bruttaschen. Nachdem sie den Furchungsproceß durchlaufen haben, bilden sie sich zu einem ovalen infusorienartigen Wesen um, das an dem vordern dideren Ende eine seichte Grube besitzt und einen Ueberzug von Zitterhaaren hat. In diesem Zustande verlassen die Jungen die Bruttaschen und schwimmen frei in dem Wasser umher, setzen sich aber nach einiger Zeit mit der bemerkten Grube fest und geben nun weitere Veränderungen ein. Sie werden eulindrisch, das freie Ende wulstet sich auf und läßt bald in der Mitte die runde Mundöffnung erkennen. Später zeigen sich um diese Mundöffnung zwei, dann vier, dann acht kurze Fortsätze, sodas

Thier etwa die Gestalt einer Kurbel hat, die mit ihrem freien gezahnten Ende ein Rad umdreht. Die Fortsätze wachsen allmählich zu langen Armen aus und nun ist das Thier ein vollkommener Armeleier von großer Gefäßigkeit, der mit seinem stumpfen Ende festsetzt und sein Leben eine Zeit lang in diesem Zustande fortsetzt, um später durch Knospung wieder Ohrenquallen zu erzeugen. Diese Medusengattung geschieht aber gerade bei der *Aurelia* in der Art, daß sich am vordern Ende ein Segment quer abhebt, dessen Rand sich einkerbt. Während hinter dem quer gebildeten Segmente ein zweites, drittes und so fort sich bildet, wächst das Ganze zusehends und stellt nun einen stets dider werdenden Zapfen dar, der aus einer Menge von schüsselförmigen Scheiben besteht, deren Kerben in Fortsätze auswachsen und sich so schon als junge Medusen darstellen. Man hat diese Zapfen *Strobila* genannt. Sobald eine Meduse reif geworden ist, läßt sie sich los und schwimmt in noch nicht vollständig ausgebildeter Form als Qualle davon.

Bei einigen ähnlichen Gattungen, wo ebenfalls ein nader, dem Stöckpolypen ähnlicher Polyp existirt, sprossen die jungen Medusen nicht in der Weise des Polypentörpers, sondern zur Seite hervor; die Polypen bleiben aber auch hier einfach; die entstehenden Medusen gehören den höhern Formen an.

In den meisten Fällen aber bilden die Polypen Colonien, die sich durch Sprossung festsehnender Arme vergrößern und von Zeit zu Zeit Medusen ebenfalls durch Knospung hervorbringen, die aber dann nicht den niederen Quallenformen angehören. Diese Polypen sind bald nackt, bald mit zarthäutigen Wänden umgeben, bald finden sich, wie bei der abgetheilten Art, dem Glodenpolypen (*Campanularia dichotoma*, Fig. 6), Bechergellen an den Nesten der Stämme, welche die Thiere sich zurückziehen können. Bei den nackten oder röhren Polypen entstehen die Medusen als freie Knospen und Geschlechtsthiere; bei den Glodenpolypen werden häufig sogenannte Bruttaschen gebildet, d. h. verhäuterte Individuen ohne Darm, in welchen aber Eier oder Samen sich erzeugen und in dem auch die Quallen sich so weit entwickeln, daß sie als solche fortleben können.

Die Quallen selbst, die so ungemein zahlreich in Arten und Gattungen sind und in oft ungeheuren Massen im Meere sich finden, lassen sich bei weitem noch nicht alle auf ihre Polypenform zurückführen und müssen deshalb besonders behandelt werden.

Unterordnung der Lappenquallen (*Acraspida*).

Der Rand des Schirms ist durch Einschnitte in Lappen getheilt. Die gefärbten Randkörper (Sinnesorgane) liegen unter den Lappen. Von der Mitte der untern Schirmfläche hängt ein Magenstiel herab, in die Verdauungshöhle enthält. Der Mund ist meist von armartigen Verlängerungen umgeben. Die Geschlechtstheile bilden meist lebhafte gefärbte Krausen, die in besondern Ausbuchtungen (meist vier) zwischen den Mundarmen an der Unterfläche der Schirmfläche angebracht sind. Die Glode zieht sich röhrenförmig angebrachte starke Muskelfasern zusammen. Sie entstehen meist aus Einsiedelpolypen; einige pflanzen sich ohne Zwischengeneration fort.

Man hat mehrere Familien unterschieden, auf die wir nicht näher eingehen können. Zu dieser Gruppe

ornblumenquallen (*Cyanea chrysaora*, 21) und die Ohrquallen (*Aurelia aurita*, g. 9) beide häufig in nördlichen Meeren. Besondere Stellung nehmen die in südlichen Gewässern wurzelquallen ein (*Rhizostoma* Cuv., Fig. 22), bei welchen von der im Stiele Magenöhle wieder verästelte Kanäle aus auf der Spitze der Arme mit sehr feinen sich öffnen.

ung der Einquallen (Haplomorpha).

nd der Glode ist ganz, aber meist feln und wie bei den folgenden mit Randkörpern ohne Bedeckung und e besetzt. Am Rande der Glode übergespannte, in der Mitte durch Membran (Velum). Geschlechtsorgane und Kanäle oder dem Magen. Sie sich alle ohne Zwischengeneration ternden Larven.

Die Thiere dieser Abtheilung in der Druch mit der folgenden Unterordnung über schließen sie sich durch die Fortpflanzung le vorübergehende an. Die Glode ist meist d fest; die Farben wenig vorstehend. Hier: Mittelmeere die Nesselqualle (*Geryonia* is, Taf. 33, Fig. 10) die sich durch den stiel- rprung der Scheibe auszeichnet, der am ganz kleinen Magenad trägt, in dem ein er Vorsprung sich findet und von welchem Kanäle längs des Stiels zur Scheibe gehen.

nung der Radtaugen (Craspedota).

örper stets farblos, meist unregelmäßig theilt, oft ganz fehlend. Velum idelt. Geschlechtsorgane an den Ranten, am Rande, am Magen. Häufige g. Entwickeln sich alle mit Zwischen- on von meist-geselligen Polypen und en- oder Krillartknochen derselben. eist sehr tief, becherförmig.

ben eine der gewöhnlichsten Polypenformen (Glodenpolyp, *Campanularia dichotoma*, Fig. 6). Unter den durch Knospung ent- Quallen hat man eine Menge von Gattungen lien unterschieden. Wir bilden einige Arten ste (*Sarsia prolifera*, Fig. 12) zeichnet den ungemein verlängerten Magen aus, e ein Schwengel in der Glode hängt, sowie Umstand, daß sie Knospen am Rande er- einer andern ist im Gegentheil der Magen dicht mit den vier Gruppen der Genital- fekt (*Bougainvillia britannica*, Fig. 8); bei en liegen die Geschlechtsorgane im Gegen- Radialkanälen, und zwar an deren Ende sis diademata, Fig. 11).

lasse der Korallenhiere (Anthozoa).

(Tafel 32, Figur 11 bis 18.)

gefäßler mit differenzirtem Magen- durch Spalten mit den Ernährungs- communicirt. Die den Magenad de Höhle durch strahlig gestellte wände, an welchen sich die Geschlechts- entwikkeln, in Kammern getheilt.

allenhiere bilden eine nach höchst einfachem nd in sehr übereinstimmenden Formen ent-

widelte Klasse, die sich durch den cylindrischen Körper, den in der Mitte eines meist stummerlosen Fühler- kranzes stehenden Mund und die mit eigenen Wänden versehene Verdauungshöhle, welche nach hinten sich in die Verdauungshöhle öffnet, durch die innern Geschlechtstheile, die in bandartigen Streifen auf den Scheidewänden der Kammern angelagert sind, und durch die meist außerordentlich entwickelten hornigen oder kalkigen Korallenstöcke, welche ihren gemeinschaftlichen Colonien als Boden und Umhüllung dienen, vor allen übrigen Thieren auszeichnen. Wir können die Thiere, welche diese Colonien bewohnen oder selbständig sind, als Polypen bezeichnen.

Die äußere Haut der Polypen ist bei denjenigen Thieren, welche in Korallenstöcken haufen und sich in eine schützende Röhre zurückziehen können, äußerst weich und zart und nur in höchst seltenen, vielleicht noch der Bestätigung bedürftigen Fällen dürrig mit feinen Wimperhaaren besetzt. Bei den nackten Polypen erlangt die Haut, besonders am Leibe, eine lederartige Festigkeit und bildet einen unten geschlossenen Sad, in welchen die Fühler oder Tentakeln zurückgezogen werden können. In der Haut oder den Fühlern, zuweilen selbst in innern Organen finden sich stets Nesselorgane, glashelle Bläschen, welche nebst einem langen Spiralfaden eine ägerte Flüssigkeit hervorschnellen, die ein Brennen auf der Haut erzeugt.

Von besonderer Wichtigkeit erscheint die Bildung der kalkigen Korallenstöcke, welche besonders in südlichen Meeren feste Massen von bedeutender Größe und Härte bilden, während in nördlichen Breiten hauptsächlich nur nackte oder mit schwammartigen Stöcken versehene Polypen vorkommen. Untersucht man die chemische Zusammensetzung dieser Polypenstöcke, so findet man, daß sie größtentheils aus reinem kohlensauren Kalk bestehen, dem oft etwas kohlensaure Thonerde beigemengt ist. Nur bei wenigen Gattungen erscheinen sie hornig.

Untersucht man die Polypenstöcke näher, so sieht man, daß auch in den zusammengefügten Colonien jedes Thier eine eigene Zelle hat, welche sich nach unten zur Röhre verlängert und sich in gemeinschaftliche Kanäle fortsetzt, die ein Röhrensystem bilden, das mit der verlängerten Leibeshöhle eines jeden Individuums zusammenhängt. Bei den toten und fossilen Polypenstöcken, bei welchen die organische Substanz verschwunden ist, kann man diese Disposition der gemeinschaftlichen Kanäle noch sehr wohl verfolgen. Bei vielen Polypen fließen indeß die Röhren und Zellen, welche den einzelnen Thieren angehören, mehr oder minder ineinander über oder werden durch dazwischen entwickelte Substanz in solcher Weise ineinander verschmolzen, daß manchmal die Unterscheidung jeder einzelnen Zelle schwierig wird. Mag auch die Gestalt des Polypenstods selbst sein, welche sie wolle, so zeigen doch die Zellen stets eine einfache, runde oder strahlige Gestalt und wiederholen in dieser Weise den Typus, nach welchem der ganze Leib des Thiers gebaut ist.

Die Bildung eines Polypenstods beginnt mit einer Inkrustation desjenigen Körpers, auf welchem der junge Polyp sich festsetzt, ist also offenbar eine Auschwümpung der Basis des Polypenleibes. Man hat diese Auschwümpung das Fußblatt oder Oberhautblatt genannt, da sie sich gleichsam wie ein Blättchen Wachs an die Gegenstände anschniegt, auf welchen sich der Polyp festsetzt. Häufig beschränkt sich dieses Fußblatt auf die beschriebene Ausdehnung, in andern Fällen erhebt es sich am Rande und umgibt wie ein dünnes Ziruißblatt den untern Theil des Polypenstods, zuweilen auch vergrößert sich dieses Fußblatt durch stets

neuf aufgelegte Schichten in der Mitte, sodaß es anfangs eine kegelförmige Warze bildet, die nach und nach zu einem Stamme oder einem verästelten Baume auswächst. Auf diese Weise bildet sich das Fußblatt bei einigen Familien, wie namentlich bei dem echten Korall, zu einer innern Achse aus, die durchaus keine Zellen enthält und um welche herum die gemeinschaftliche Masse ergossen ist, in deren Zellen die einzelnen Polypen sitzen und welche von den gemeinschaftlichen Rändern durchzogen ist. Diese Achsenstöße wachsen stets wie alle Fußblätter durch Auflage neuer Schichten auf der den Polypen zugewandten Seite.

Die Bildung von Kalkzellen, in welchen die Polypen stecken, ist verwickelter. In manchen Fällen bilden sich keine zusammenhängenden Kalkmassen, sondern nur einzelne, meist warzig krystallinische Kalknadeln (Spicula), sodaß die verkalkete Haut (Ektoderm) unter dem Messer knirscht (Alcyonium). In den meisten Fällen aber schieben diese Kalkbildungen zusammen und stellen nun den Korallenstod vor, in dessen Kalkzellen, die aber von Haut überzogen sind, die Polypen sitzen und sich zurückziehen können. Von diesen Kalkzellen aus ziehen die von dem Entoderm der Polypen ausgeleiteten Ernährungsrohren durch den Korallenstod.

Als äußere Schicht der einzelnen Polypenzellen kann man in den meisten Fällen ein Kalkblatt unterscheiden, welches das Resultat der Verfeinerung der äußersten Hautschicht des Thiers ist. Meist bildet dieses Blatt eine kegelförmige Dute oder ein längeres Rohr, nur zuweilen, wie bei den Orgellkorallen, constituit es für sich allein die röhrenförmige Zelle der Polypen. Man hat dieses Blatt, welches meistens an der Basis der Polypenstöße und als Umhüllung der einzelnen Zellen sich bemerkbar macht, das Mauerblatt genannt. Durch Vereinigung und Verschmelzung der Mauerblätter auf ihrer äußern Seite und durch Verdickung ihrer Masse bildet sich jene Zwischensubstanz, welche besonders bei den schwammigen Polypenstöcken die einzelnen Zellen miteinander verbindet.

Schon in der Charakteristik der Thierklasse bemerkten wir, daß die innern Geschlechtstheile der Polypen in traufenden, bandartigen Streifen angeordnet seien, welche stets eine strahlige Gruppierung um den Magenstod und tiefer hinab darbieten. Die Verfeinerung dieser hautartigen Falten, welche in das Innere der Leibeshöhle hineinragen, bildet nun die Strahlen, die wir meist in den Zellen der Polypenstöße erblicken. Es unterscheiden sich diese Strahlen von außen nach innen, entsprechend den häutigen Falten und Geschlechtstrafen, welche bald weniger, bald mehr vorspringen. So sieht man denn in den Zellen der Polypenstöße zuweilen nur kurze Blätterstrahlen, die den Rand der geräumigen Zellenhöhle füllen, während in den meisten Fällen wenigstens die Hauptstrahlen in der Mitte sich treffen und zu einer Säule zusammenschmelzen, die bald aus den gewundenen Blättern der einzelnen Strahlen, bald aus einer schwammigen Zusammenschmelzung derselben besteht. Zuweilen wächst die Säule, welche die Achse der Zelle einnimmt, sich verlängert fort, während die Scheidewände oder Strahlen in ihrem Wachsthum zurückbleiben. Die Säule bildet dann ein mittleres unabhängiges Stäbchen im Centrum der strahligen Zelle. Meistens wachsen auch von der Säule aus den Strahlen correspondirende Blätter entgegen, welche eine innere Krone bilden, deren nach der Peripherie gewendete Ränder bald frei bleiben, bald sich mit den von der Mauer aus hereinwachsenden Strahlen verbinden. An den Stellen, wo die Strahlen oder diese Kronenblätter das äußere Mauerblatt erreichen, wird

dieses oft durchbrochen, sodaß die Strahlen sich über die Umgebung der Zelle hinaus fortsetzen.

In Beziehung auf die Anordnung, Gruppierung und relative Ausbildung aller Theile, welche einen Polypenstod und dessen Zellen bilden helfen, herrscht eine sehr große Mannichfaltigkeit, auf die wir nicht näher eingehen können.

Von eigentlichen Bewegungsorganen kann bei den sesshaften Polypen nicht wohl die Rede sein, und auch diejenigen freien Stöße, welche im Sande oder im Schlamm stecken, und diejenigen, welche im Meere schwimmen, entbehren jeglichen differenzirten Bewegungsorgans. Nur die freien Einzelpolypen, wie die Saccanomen, besitzen einen breiten, scheibenförmigen Fuß, mit welchem sie sich anfangen und hin- und hergleiten können. Wohl aber besitzen die Polypen theils ein sehr ausgebildetes Fasergerüst, das ihre einzelnen Leibestheile zusammenzieht und andererseits einziehbare Tentakeln, welche eine große Bewegbarkeit besitzen. Bei allen Polypen ohne Ausnahme steht die Höhlung der Tentakeln in Verbindung mit der Leibeshöhle, und die Entfaltung scheint zum Theil dadurch bewirkt zu werden, daß von der Leibeshöhle aus Flüssigkeit in ihre Höhlung eingepreßt wird.

Ogleich die Polypen namentlich in den Fühlern eine große Empfindlichkeit zeigen, so ist es doch noch nicht gelungen, Nerven oder Sinnesorgane bei ihnen wahrzunehmen. Auch die Verdauungsorgane stehen auf einer sehr niedern Stufe der Entwidlung. Der runde, zuweilen auf einem Knopfe in der Mitte der Fühler angebrachte Mund führt in eine weite Magentasche, welche sich nach hinten frei durch offene Spalten in die Darmgefäßhöhle öffnet, sodaß Wasser und Nahrungstoffe gemeinschaftlich durch diese hintern Oeffnungen in diese Höhle übergehen. Diese ist durch häutige Blätter, welche in dem untern Theile meist nach innen zu frei sind, oben sich an die Magenwand ansetzen und auf ihrem freien getrauten Rande die männlichen oder weiblichen Geschlechtsorgane tragen, in eine große Anzahl von Taschen oder Kammern zerfällt. Bei den gemeinschaftlich lebenden Polypen geht die Darmgefäßhöhle, in welcher der Nahrungssaft mit Wasser vermischt beständig hin- und hercirculirt, in ein Netz von Gefäßen über, welches sich in der gemeinschaftlichen Masse des Polypenstod-artigen Falten und mit allen übrigen Polypen in direkter Communication steht. Der Strom der Flüssigkeit, welcher durch diese Gefäße läuft, wird durch zarte flimmernde Wimpern bedingt und geht an der einen Seite der Fühler bis an deren Spitze, um auf der andern Seite wieder hinabzugleiten. Da die Polypen die Oeffnungen der Magenhöhle gegen die Darmgefäßhöhle hin nach Belieben durch Zusammenziehung schließen können, so hängt es auch von ihrem Willen ab, welche Stoffe sie in die Leibeshöhle überleiten, welche durch den Mund wieder auswerfen wollen.

Von besondern Athmungs- und Kreislauforganen kann keine Rede sein.

Die Geschlechter sind meist getrennt; bei den sich bildenden Korallen kommen sowohl eingeschlechtige Stöße als auch solche vor, wo ein ganzer Stod männlich, ein anderer weiblich ist. Nur bei wenigen Arten kommen außer geschlechtlichen Polypen solche vor, die nur zur Ernährung bestimmt scheinen. Die Eier und Samen entwickeln sich in dem Ueberzuge der Scheidewände, treten dann in den Darmgefäßraum über und werden durch den Mund ausgeworfen. Die aus den hüllenlosen Eiern unmittelbar entstehenden Jungen sind meist höchst einfache Wesen, aus einem doppelstängigen Zellenkörper zusammengesetzt, der überall mit flimmer-

ist und wie ein Infusorium im Wasser. Diese Larvenform (Planula genannt) lebt; der Mund bricht durch, die Tentakeln bei den meisten Actinien aber entwickelt im Darmgefäßraume bis zur Bildung einer Anzahl von Fühlern. Bei diesen ist noch besonders bemerkenswerth, daß die Anordnung der Fühler sich erst secundär lateral-symmetrisch entwickelt.

Lebthliche Vermehrung findet durch Theilung und Knospung statt. Bei der erstern trennen sich Individuen selten ganz; meist bleiben sie minder vereinigt, zuweilen so, daß sie in Knospenöffnungen besitzen. Die Knospung äußert sich, nach sehr wechselnden Normen, durch Ausläufer oder Stolonen (Zoanthus), Knospen aus der Basis oder der Seitenflächen einzelner Polypen. Je nach der mehr oder minder bestimmten Norm, in welcher die Knospen mit dem Mutterthiere in Verbindung bleiben, sich die verschiedenen Formen der Korallen, feder-, baum-, rosen-, schwammförmige

Lebthiere ohne Ausnahme leben im Meere, die beweglichsten schwimmend (Arachnactis); über Wasser im Schlamme stehend, andere fußen auf dem Boden festgeheftet, unfähig, je den Ort zu ändern. Diese sind besonders Veranlassung zu jenen Vorfällen, welche in den südlichen Meeren unter dem Namen Korallenriffe bekannt sind. In den Breiten sind es hauptsächlich nackte und ungehepene, Saccanemonen, welche die Klasse re-

In den Meeren der gemäßigten Zone neben den nackten Polypen noch solche mit Polypenstüben, in welchen Kalknadeln vorkommen. Erst in dem Mittelmeere kommen wahre Korallenriffe vor, die indeß nur rasenförmige Ausbildungen. Die eigentliche Zone der Korallenriffe erstreckt sich am 30. Grade nördlicher Breite und hört unterhalb des 25. Grades südlicher Breite auf. Sie also eine Art Gürtel um die Erde, die innerhalb einer Temperatur von 20 Grad Celsius Felsboden begünstigt besonders ihre Entwicklung. Während Schlamm und Sand ihnen hinderlich, in der genannten Ausdehnung aber sind Strecken von den Productionen der Polypen, und wenn man die Geschichte der Erde verfolgt, so findet man, daß früher die Korallenriffe eine weit größere Ausdehnung hatten und daß mächtige Gebirgszüge zum Theil von ihnen aufgebaut sind.

Man unterscheidet jetzt der Form nach drei verschiedene Arten von Korallenriffen. Die Atolls oder Ringriffe bestehen aus einem schmalen, mehr oder weniger regelmäßig geträumten Streifen festen Bodens, einen innern See, eine Lagune umschließend, deren zerbrochener Korallenmassen besteht, die allmählich wieder verlitet und in einen fruchtbaren Boden verwandelt sind, welcher kaum über das Meereshorizont hervorragt und meist zuerst mit Kokospalmen besetzt. Zuweilen ist die Lagune in eine oder mehrere Inseln gänzlich abgeschlossen, die, die außen herum; meist aber zeigt sie mehrere Einschnitte, durch welche das Wasser mit dem Meere in Verbindung steht. Die Lagunen sind meist nicht bedeutend, höchstens 1000 Faden, und bieten einen sichern Untergrund. Die Insel selbst ist ein wahrer Sammelplatz von festsitzenden und schwimmenden Seethieren aller Art,

welche sich hierher vor der Brandung und der Strömung des freien Meeres flüchten. Nach außen hin findet sich meist schon in geringer Entfernung von dem Riffe eine bedeutende Tiefe, jedoch dieses eine fast senkrecht aus der Tiefe aufsteigende Mauer bildet. Die Atollriffe unterscheiden sich nur dadurch von den Atolls, daß im Innern der Lagune sich eine Insel aus anstehenden Felsen und festem Lande befindet, welche, wie durch einen Festungsgraben, durch einen mehr oder minder breiten Lagunenkanal von dem wie ein Gürtel sie umgebenden Riffe getrennt ist. Dieser Lagunenkanal ist meist nur von geringer Tiefe, zuweilen aber von sehr bedeutender Breite, und die Atollriffe, welche gürtelförmig das Land umziehen und den Lagunenkanal von der See abheben, besitzen oft eine ungeheure Ausdehnung. So hat das Atollriff, das sich an der Küste von Neucaledonien findet, eine Länge von 400 englischen Meilen, und dasjenige der australischen Küste erstreckt sich mit geringen Unterbrechungen durch etwa 15 Breitengrade. Endlich die dritte Art von Riffen wird durch die sogenannten Küstenriffe gebildet, welche sich nur dadurch von den Atollriffen unterscheiden, daß sich zwischen ihnen und dem festen Lande kein Lagunenkanal hinzieht, sondern daß sie sich unmittelbar an die Küsten anlehnen.

Die Nahrung besteht bei den größern Arten aus Thieren, die sie erhaschen; in den Aquarien aus Fleisch; bei den kleinern Arten aus kleinen thierischen und pflanzlichen Partikeln, welche durch die Strömung ihnen zugeführt werden. Das Entfalten und Schließen ihrer Arme, wie überhaupt ihre ganzen Lebenserscheinungen, sind meist äußerst träge; doch bemerkt man deutlich Empfindlichkeit gegen das Licht und gegen Verührungen oder Wasserströmungen, welche plötzliches Zurückziehen in die Zelle verursachen. Die Korallenriffe selbst dienen einer Anzahl von Muscheln, Schnecken, Würmern und Fischen zum Wohnort und Schlupfwinkel, und viele dieser Thiere nähren sich auch von den Polypen, indem sie dieselben mit ihren scharfen Zungen und Kiefern abtragen oder auch die Zellen selbst zwischen den Zähnen zermalmen. Die Korallenriffe werden zu Schmutz verarbeitet oder zu Kalk gebrannt und als Baumaterial benutzt.

Ordnung der Achtstrahler (Octactinia).

Acht gefiederte Tentakeln.

Unter der großen Anzahl von Familien heben wir nur einige hervor. Die Seefedern (Pennatulida) sind nicht angewachsen, sondern schwimmen oder stehen mit dem polypenlosen Ende des Stammes im Sand oder Schlamm. Bei der abgebildeten, im Mittelmeere nicht seltenen Art (Seegurke, *Veretillum cymnorum*, Taf. 32, Fig. 14) stehen die Polypen unregelmäßig auf dem halbweichen Stamm; bei andern, den Seefedern, in Reihen, bald im Kreise wie auf einer Wölde. Der Polypenstiel ist biegsam. Bei den Rindenkorallen (Gorgonida) besteht ein festes Achsenskelet, bald hornig (Gorgonia), bald abwechselnd aus hornigen und kalkigen Gliedern zusammengesetzt (Isis), bald kalkig (Corallium). Die Rinde, in deren Zellen die Thiere stecken, enthält die gemeinsamen Kanäle und Höhlungen. Hierher gehört die Gabelkoralle (*Corallium rubrum*) mit rothem, dichten Achsenskelet aus Kalk, die als Schmutz verarbeitet wird. Wir bilden Fig. 12 einen ganzen Polypenstiel, Fig. 13 einige Polypen vergrößert ab. Ihre Heimat ist das Mittelmeer, wo sie besonders an der afrikanischen Küste in Riffen und Spalten der Felsen wächst und mit eigenen Instru-

menten und Schleppnetzen abgerissen wird, was stets eine langwierige Operation ist, da sie sich bis in eine Tiefe von 700 Fuß anbaute und die größten Stöcke meist nur in dunkeln seitlichen Spalten der Felsen sich finden. Der Fang beschäftigt 2—300 kleine Schiffe, mit einem jährlichen Umschlag von etwa 2 Millionen Franken.

Zu derselben Ordnung gehören noch die Seekerte (Alcyonida) mit fleischigem Polypenstode, in welchem Kalkspicula zerstreut sind, und die Orgellkorallen (Fubiporida) mit röhrenförmigen Zellen ohne Längsscheidewände.

Ordnung der Sechßstrahler (Hexactinia oder Zoantharia).

Sechß oder mehr Tentakeln, die meist einfach sind.

Eine Gruppe (Antipatharia) gleicht durchaus den Rindenkorallen. Die Achse ist hornig oder kieselig. Eine zweite große Gruppe ist diejenige der Seeanemonen (Malacodermata oder Actinida) oder Meeressesseln. In ausgedehntem Zustande bildet der Körper dieser Polypen stets einen auf beiden Seiten abgeflachten Cylinders von größerer oder geringerer Höhe. Die untere Fläche des Cylinders wird von einer Saugscheibe gebildet, womit sie sich so fest an Steine, Felsen, Muscheln festsaugen, daß es oft kaum möglich ist, sie ohne Zerreißung loszutrennen. Am besten gelingt dies noch durch das Unterschieben einer dünnen breiten Klinge. Sie kriechen langsam mittels ihrer Saugscheiben fort und halten sich besonders gern in geringerer Tiefe auf. In solchen Meeren, welche bedeutende Ebbe und Flut haben, wohnen viele Arten vorzugsweise an der Grenze der letztern in Wassertümpeln, die auf den Felsen zurückbleiben. Die Fühler sind äußerst verschieden gestaltet und gestellt; bald in einer, bald in vielfachen Reihen, in einfachem Kreise oder auf einem fächerförmigen ausstrahlbaren Sterne. Bei den einen sind sie sehr lang, dünn und wurmförmig, bei andern kurz und dick, bei einigen verästelt und ausgezackt. Die Meeressesseln sind äußerst gefräßige Thiere, welche von Muscheln, Schnecken und Krustenthieren leben, deren im Magen ausgefogene Schalen durch den Mund wieder ausgeworfen werden, was oft mit so vieler Energie geschieht, daß der ganze, weite, faltige Magenack aus dem Munde hervorgepumpt wird. Bei der Berührung ziehen sie sich mit großer Lebhaftigkeit zusammen und speien das im Innern enthaltene Wasser durch den Mund oder durch eigene Oeffnungen an dem Grunde der Tentakel aus. Sie prangen meist in den lebhaftesten Farben, und besonders zeichnen sich die Fühler durch brennende Tinten aus. Sie haben ein äußerst zähes Leben und lassen sich jahrelang in Aquarien halten. Wir bilden eine Art mit zackigen Fühlern (*Phyllactis praetexta*, Taf. 32, Fig. 15), eine andere mit blumenblattähnlichen Tentakeln (*Seeanemone*, *Actinoloba dianthus*, Fig. 16) und eine Art mit runden Fühlern ab, die auch noch dadurch ausgezeichnet ist, daß ihr die Fußscheibe fehlt (*Edwardsia callimorpha*, Fig. 17).

Die zahlreichste Gruppe wird von den stoffbildenden Korallen (*Zoantharia sclerodermica*) gebildet. Bei ihnen findet sich stets ein verästeltes Skelet mit mehr oder minder verästelten Scheidewänden der Kammern; sie sind es, welche die Riffe bauen und durch die Erhaltung ihrer Korallenstöcke ein wesentliches Moment in der Geschichte der Erde darstellen. Man hat je nach der Bildung der Kelche mit oder ohne Querböden, äußere Poren oder ganze Umwallungen u. s. w. eine

Menge von Familien unterschieden, auf weiter eingehen können. Wir bilden eine Gruppe eine baumartig verzweigte im Mittelmeere kleine Rassen bilden (*Dendrophyllia rama*, Fig. 18), im der Südsee, die große Massen bildet durch unvollkommene Theilung der Individuen die Zellen in mäandrisch verschmolzen sind (*Windungskoralle*, *cerebriformis*, Fig. 11).

Klasse der Schwämme (Porifera) (Tafel 33, Figuren 2.)

Feststehende Individuen aus einfachen Zellgebilden bestehend aus Horn-, Kalk- oder Kieselstücken, ursprünglich aus Faser bestehendes Skelet ausstrahlendem innerer Höhlen auskleidend einer Mündung zusammengefaßt.

Der lebenden Grundsubstanz wegsach gebildet ist, wurden die Schwämme Urthieren oder selbst den Pflanzen vergleichbar. Seit hat Hädel sehr wahrscheinlich die den Darmgefäßlern zuzuzählen jetzt noch gewichtige Bedenken entgegen wir sie diesen an.

Die ursprüngliche embryonale Form besteht aus einem Wesen, dessen Zellschichten, Ectoderm und Entoderm fest ist und an einem Ende eine Oeffnung in eine innere Blindhöhle führt. Die Grundform, von welcher noch andere gehen, Gastrula genannt und die sowohl morphologisch dem Grunde der später die Function einer Auswurfsoeffnung als Oculum bezeichnet. Die Gastrula Oberfläche Wimpern besitzt, setzt sich mit welcher dem Oculum gegenübersteht, aus der Centralhöhle seitliche Kanäle, geöffnet, mit Wimperbesatz ausgekleidet, welchen der Strom von außen nach in Kiesel- oder Hornnadeln des Skelets aus und nun besteht ein solcher aus einer Masse, auf deren Oberfläche Oeffnungen (Poren) sich befinden, in ein System verzweigter Röhren in welche führt, die das Wasser mit den Röhren die Porenröhren erhält und im Stromculum austreibt. Oft bleiben die Röhren durch Anosung kann sich dieses ein aber vervielfältigen, und diese Anosung verschiedene Verhältnisse. Bald sind sie in Individuen, die nur durch die Basis bald mehr oder minder verschmolzen, in den höchsten Graden der Verschmelzung sind verschwinden und die ganze Colonie in eine Masse dar, mit zerstreuten Oculis Oeffnungen, die durch ein höchst aus von nehförmigen Kanälen zusammengefaßt abgebildet, stabförmigen Art von *Axinella polypoides*, Taf. 33, Fig. 1. Die Zellen, welche die Gewebe zwischen noch keine Zellhaut und sind einander verbunden, daß sie ähnlich Urthieren durch Bildung von Fortsätzen und umherkriechen. Die Außenhaut bildet meist eine zusammengefloßene Gewebe ohne Abgrenzung der Zellen.

erzieht, die höchst mannichfaltig durch Anwesenheit zu complicirten Gebilden und d. sodas z. B. die elegantesten Spitzent nachgeahmt werden (Euplectella). In nicht (Entoderm) erscheinen als besonders Zellen mit langen Schwingbaaren (Geißelchen) oft die Kanäle ganz anstreifen, besonders Erweiterungen, Geißelkanälern. Die Innenzellen ernähren sich wie wenn sie mit dem Wasserstrom eingeführte Nahrung aufnehmen. Die Fortpflanzung geschieht durch Eizellen und Samenzellen, welche sich im Gewebe bilden, sowie durch Keimkugeln. Jedes Stück eines Schwammes kann einen neuen Schwamm auswachsen. Eine ziemlich große Anzahl von Ordnungen (neun), der derselben Familien unterschieden, auf der weiter eingehen können und wobei die Substanz (Fleischschwämme, Lederschwämme, Hornschwämme, Kalkschwämme) oder bei Wässern die Anordnung der Nadeln und nachgebend sind. Fast alle Schwämme leeren; nur die Süßwasserschwämme (Spongiae) und Seen. Für die menschliche Delle nur die Hornschwämme (*Cerao spongiae*) sind, welche die verschiedenen Arten von Menschen (*Spongia officinalis*) liefern. Die in solchen Badeschwämmen, die man durch Netze oder selbst mit langen Dreizaden wird besonders schaumhaft in Adriatischen Meere, jetzt aber auch bei den Amerikanern.

Kreis der Urthiere.

(Protozoa.)

Die thierische Wesen ohne vollständig entwickelte Gewebe und Organe.

Einem passenden Charakteristik dieser Wesen geben. Die niedersten sind nur belebte Materie ohne irgendwelche bestimmte Vertheilung wechselnden Form, ohne Ausgewählter Gewebe oder Organe, während bei den niedrigeren sich schon vielfache Differenzirungen lassen, die indessen nie so weit gehen, als bei höheren Nervenystem, Sinnesorgane, Athemwerkzeuge u. s. w. zweifellos hinzugefügt Hauptmasse der Thiere, häufig sogar die Thiere aus Sarkode, organischer, gleichförmiger mehr oder weniger weich und flüssig oder in welcher durch Körnchen sich innere Strömungen lassen, während die äußere Form wird. Bei den niedersten dieser Wesen muß wenig unentschieden lassen, ob man mit Pflanzen zu thun hat, und in ihnen den gleichen Boden erkennen, von welchem aus sich in ihren weiteren Stufen getrennten Reiche abheben. Bei den höheren Protozoen freilich, kann man wieder im Zweifel sein, ob es als niederste Entwicklungsstufe den Würmern soll, da hier offenbar bedeutende innere Differenzirungen statt haben, wodurch Verdauungs- und Geschlechtsorgane werden. Der Uebergang von den niederen ausgebildeten Formen sind aber so viele, daß hält, Scheidelinien zu ziehen. Die Urthiere sind mikroskopisch und fallen ungeheurer Massenanhäufung in das Unbegreifliche.

Klasse der Infusioenthierchen (Infusoria).

(Tafel 33, Figur 13, 14, 16 bis 21.)

Körper von definirter Form aus zwei Schichten zusammengefaßt. Bewegungsorgane Geißeln, Wimpern oder Borsten.

Die Körperoberfläche der meisten Infusorien besteht aus einer festen Schicht der weichen, gelatinösen, mit Körnchen durchwebten Substanz, aus welcher ihr ganzer Organismus aufgebaut ist, und die wir unter dem Namen Sarkode kennen gelernt haben. Manchmal ist diese Hautschicht auf dem größten Theile des Körperumfangs oder selbst vollständig nackt, in den meisten Fällen jedoch stehen darauf Wimperhaare entweder zerstreut oder in regelmäßigen Reihen, besonders aber in häufiger Anzahl in der Umgebung des Mundes entwickelt und nach dem Willen des Thiers bewegt. Sie dienen entweder als Schwimmorgane oder zum Erregen von Strubeln und Wirbeln im Wasser, wodurch kleine Körperchen mit fortgerissen und dem Infusioenthierchen zugeführt werden. Bei einigen Gattungen bilden sich diese Wimperhaare zu beweglichen Borsten, Griffeln und Haken aus, sodas bei den höchsten organisirten Thieren dieser Klasse ziemlich verschiedene Arten von Bewegungsorganen vorkommen können. Bei andern finden sich statt der Wimpern undulirende Membranen oder auch lange Geißeln, die peitschenförmig hin- und herbewegt werden können. Außerdem stehen in der Hautschicht oft noch glashelle Stäbchen, welche einen steifen Faden austreten (Trichocysten) und den Nesselzellen ähnlich sind. Durch chemische Mittel läßt sich bei den meisten noch eine structurlose Oberhautschicht (Cuticula) ablösen, die aber in andern Fällen deutlicher wird und dann sich zu einem Panzer gestaltet. Dieser ist oft nur eine einfache Gallertkapsel, die ein einziges oder viele Individuen gemeinschaftlich umfaßt, bald eine mehr oder minder hornige Kapsel, die auf Wasserpflanzen festhält und in welche sich das Thier ganz oder theilweise zurückziehen kann. Bei den frei beweglichen Infusorien hat der hornige oder leberartige Panzer die Gestalt eines Schildchens, welches den Rücken deckt und meist mehr oder minder biegsam ist, oder die einer geschlossenen Blase, die vorn eine Oeffnung besitzt; eine einzige Familie hat kieselige und unverbrennliche Panzer. Man hat noch bei keinem Infusorium eine abgeordnete Nervenmasse oder Sinnesorgane wahrnehmen können. Zwar entdeckt man bei vielen derselben, und am häufigsten bei den niedrigsten Formen, einen meist hochroth gefärbten Fleck, der mit großer Sicherheit für ein Auge angesprochen wurde. Bei einigen Arten findet man auch zwei oder drei solcher Flecke; vergebens aber hat man in der Nähe dieser Pigmentflecke nach einer Nervenmasse oder auch nach einem lichtbrechenden Körper gesucht, und die Entdeckung, daß viele Pflanzensporen, deren Keimen und Auswachsen in Wasserfäden man später ganz sicher beobachtete, ebenfalls solche augenartige rothe Flecken hatten, bewies zur Genüge, daß hier von einem Auge keine Rede sein könne. Im Gegentheil dürfte man aus dem Vorkommen eines rötlichen runden Flecks bei bewegten Organismen von grüner Farbe eher auf die pflanzliche Natur schließen. Nichtsdestoweniger bemerkt man, daß alle, auch die vollkommen augenlosen Infusorien, wenigstens Licht und Dunkel sehr wohl empfinden, daß sie mit ihrer Körperoberfläche tasten und nicht ohne Auswahl Nahrung einnehmen.

Die Aufnahme der Nahrungstoffe findet in sehr verschiedener Weise statt. Manche Infusorien enthalten gänzlich einer jeden Oeffnung an dem Körper, wodurch feste Stoffe eingeführt werden könnten. Die

Körpersubstanz ist indessen nicht so weich, wie bei den Rhizopoden, sodas, wie bei diesen, durch Eindringen in die Masse selbst die Aufnahme fremder Körper geschehen könnte. Die mundlosen Infusorien ernähren sich demnach nur durch Einsaugen flüssiger Stoffe in die gelatinöse Körpermasse. Oft sammeln sich diese Flüssigkeiten in blasenförmigen Räumen im Innern des Gewebes an, welche zwar später spurlos verschwinden, die man aber doch, einer verkehrten Ansicht zufolge, als ebenso viele Magenblasen betrachtet hat. — Diejenigen Infusorien, welche eine Mundöffnung besitzen, nähren sich besonders von festen Stoffen, mikroskopischen Thieren und Pflanzen, die sie stets in der Nähe ihrer Wohnorte finden. Unschädliche aus dem Pflanzen- und Thierreich entnommene Farbstoffe mit Karmin oder Indigo werden von den meisten Arten mit Leichtigkeit in großer Menge verschluckt, sodas man nach einer solchen Mahlzeit die Farbstoffe im Innern des Körpers erkliden kann. Seit dem vorigen Jahrhundert schon hat man diese sinnreiche Fütterungsmethode der Infusorien benutzt, um über ihre innere Organisation Aufschlüsse zu erhalten. Der Mund der Infusorien befindet sich entweder am vordern Leibesende, wo er meist eine runde Oeffnung darstellt, oder auf der Bauchfläche mehr oder minder weit nach hinten gerückt in Gestalt einer ovalen oder selbst spiralförmig gewundenen Spalte. Er ist von wimpernden Lippen begrenzt, die in einzelnen Fällen selbst klappenartig verlängert sind und meist ein- und ausgeklüppelt werden können, sodas der Mund oft nur im Acte des Fressens zur Anschauung kommt. Die Mundhöhle setzt sich trichterförmig nach innen fort und ist bei einigen wenigen Gattungen mit bornartigen Stäben bewaffnet, welche einen cylindrischen Korb, ganz ähnlich einer Fischgabel, bilden, der allerdings beim Fassen der Beute thätig ist. Im übrigen ist die Mundhöhle stets mit zarten Wimpern ausgekleidet, die sich auch durch den Schlund fortsetzen, der bald gerade, bald mehr oder minder gewunden in das weiche Parenchym des Körpers hineinragt. Kleine Nahrungspartikel werden durch den Strudel, den die Wimpern des Schlundes erregen, in eine rundliche Kugel zusammengeballt und diese Kugel zuletzt durch den Schlund in das nachgiebige Körpergewebe hineingepreßt. Starre Körper, wie namentlich Stüde mikroskopischer Pflanzen, werden sehr häufig in das Körpergewebe hineingerieben und steden dann an irgendeiner Stelle in der gallertartigen Substanz. Meist zeigt sich ein heller blasenartiger Hof um diese in das Körpergewebe hineingeriebenen Nahrungstoffe. Aufgenommene Flüssigkeiten bilden einen hellen blasenartigen Tropfen, und häufig gewahrt man, das nahe stehende Tropfen dieser Art ineinanderfließen; ein sicherer Beweis, das sie nicht durch häutige Wände voneinander getrennt sind. Beim lebhaften Fressen von Infusorien, welche lange gefungert haben, erscheint der Körper oft ganz angefüllt mit solchen Nahrungskugeln, und wenn man Sorge trägt, verschiedene Farben nacheinander zu füttern, so sieht man leicht, das die betreffenden Farbstoffe durchaus unregelmäßig und nicht in der Reihenfolge ihrer Aufnahme durch den Körper vertheilt sind. Neuerdings hat man bei einigen Arten Erscheinungen beobachtet, welche die innere Höhle des Körpers als eine wirklich begrenzte, aber sehr ausdehnbare Darmhöhle auffassen lassen. Die unverdaulichen Stoffe werden bei vielen Infusorien durch den Mund wieder ausgeworfen, bei andern durch eine Afterstelle hinausgepreßt, welche sich meist am hintern Theile des Körpers befindet.

In dem Körper aller Infusorien findet man bei genauerer Untersuchung einen oder mehrere helle Räume,

welche sich abwechselnd ausdehnen und zusammenziehen, aber keine eigenen Wandungen zu besitzen scheinen. Vielleicht dürfte die Anwesenheit dieser räumlichen Räume ebenso wol wie Contractilität der äußern Leibeswandungen für einen Beweis der thierischen Natur eines Organismus gelten können. Reichtum sind diese Räume rund und zuweilen in solcher Zahl vorhanden, das sie in ein einziges langes Gefäß zusammenfließen. Bei manchen Gattungen erscheinen sie in Gestalt vielstrahliger, in gefäßartige Kanäle auslaufender Sterne, und bei den Zusammenziehungen verschwinden abwechselnd die Strahlen oder der Mundraum. Obgleich diese Räume stets an bestimmten Stellen wiedererscheinen, so sind sie doch sicher mündungslos, da man bei beständigen Zusammenziehungen sowohl einzelne Räume sich theilen, als auch im Beginn der Ausdehnung dieselben einzeln austreten und später in eine große Blase zusammenfließen sieht. Jedensfalls sind diese blasenartigen Räume wenig dichte Stellen des Körpergewebes, an welchen sich dasselbe durchdringende Flüssigkeit sammelt, um durch eine Zusammenziehung wieder in das schwammige Gewebe hinausgetrieben zu werden, sodas hierdurch eine erste, wenn auch höchst unvollkommene Spur eines Kreislaufs der Säfte hergeleitet wird. Vielleicht auch haben diese contractilen Blasen eine feine Oeffnung nach außen, sodas bei deren Zusammenziehen Flüssigkeit aus dem Körper hinausgepreßt, bei ihrer Ausdehnung Wasser von außen aufgenommen würde.

Die Fortpflanzung der Infusorien geschieht auf mannichfache Weise. Häufig findet sich als Einleitung dazu Cystenbildung. Das Thier kugelt sich zusammen, schließt eine glashelle Masse aus, die es als eine Kapfel umgibt, und geht nun in dieser Erde zu weiterer Ausbildung entgegen. Nicht minder oft findet aber auch die Cystenbildung zum Schutze vor äußern Unbilden, z. B. beim Eintrocknen des Wassers statt. Vielfältig hat man auch Conjugation als Fortpflanzungsart beobachtet. Die Thiere legen sich zusammen mit gleichnamigen Theilen, z. B. Mund gegen Mund, und verschmelzen allmählich zu einem einzigen Individuum. Die ungeschlechtliche Fortpflanzung, den bisher betrachteten niedern Thieren ähnlich, besteht aus Theilung, die in verschiedener Richtung, als Längs- und Querteilung, zuweilen selbst in schiefer Richtung eintreten kann. Sodann durch äußere Knospung. In manchen Fällen bleiben die Knospen sitzen, sodas Thier gebildet werden, wie z. B. Zoothamnium (Zol. Fig. 18); in andern Fällen lösen sich die Knospen ab, wozu sie gemeinlich besondere Wimpertränge erhalten, die später schwinden.

Noch nicht vollständig aufgeklärt ist eine Fortpflanzungsart, welche von vielen Beobachtern als ungeschlechtliche aufgefaßt wird. In den meisten Infusorien beobachtet man einen festern Kern (Nucleus) von kugelförmiger oder Scheibenform, oft aber auch sehr scheinbar gestaltet, als gebogenes Band, Stab, Rosenkranz u. dgl. Dieser Kern ist meistens gelblich oder bräunlich, fest und entwickelt in seinem Innern Keime, die sich schließlich zu Embryonen ausbilden, welche oft eine von den Mutterthiere sehr abweichende Gestalt haben. In diesem Ende wird der Kern entweder hohl, und enthält dann Kugeln oder Eier, die zu Spröhlingsen auswachsen, wie dies z. B. bei der abgebildeten, mit Kern und Spröhlingsen vollgestopften Stylonichia (Fig. 13) der Fall ist, oder der Kern theilt sich selbst in Segmente, die zu Embryonen auswachsen. In vielen Infusorien findet sich nun noch außer dem Nucleus ein Nucleolus, d. h. ein kleinerer fester Körper, der dicke Wände hat

in inneren Höhle stabförmige Gebilde oder erzeugt, die man um so eher für Sars, als die Einleitung zur Eibildung eine ist. Dieser Ansicht nach wäre der Nucleus, der Nucleolus Hode; in dessen sind doch nicht alle Zweifel gelöst, um so mehr, weil vielen Infusorien gänzlich abgeheben aus den Infusorien die Gattung: *Vibrio* u. s. w.) sowie die Kugelthiere als Pflanzen aus. Die nadten oder mit e versehenen Monaden sind ebenfalls et, daß keiner ihrer Charaktere der Aufpflanzen widerspricht. Nur die *Nembata*, zu denen die oft in Massen voromna *viridis* gehört, dürften durch die große ihres Körpers auf den Rang als Thiere, während der Besitz einer Geißel, Augenpunktes sowol pflanzlichen als organischen zusteht und die Abcheidung off und Aufnahme von Kohlensäure für sprechen würde.

in diese Auscheidungen an, so fällt die mundlosen Infusorien, welche man aus zweifelhaften Organismen gemacht hat, so man behält nur Infusorien mit Mund, deren verschiedene Stellung die Klaffen mag.

ung der Bauchwimperer (*Hypotricha*) te oder gepanzerte Thierchen ein, bei welf der Bauchseite, wo auch der Mund steht, befinden, zu denen sich Grifsel, Borsten gesellen, mit welchen die Thiere in Massen er umherlaufen. Wir bilden eine nadte Bauchseite ab (*Stylonychia mytilus*), in welcher der Körper fast mit Jungen versehen, die Schildpanzer mit einem Stachel geziert ist (*atarrita*, Fig. 16), wie sie auf den Borsten aßerpflanze umherpaziert.

tzwimperer (*Holotricha*) haben über den per fast gleichmäßige Wimpern, meist in elkt und stets viel länger als der Körper. eibildeten Art (*Prorodon griseus*, Fig. r schiffartige Mund, der beim Schwimmen hinten getragen wird, wie in der Figur, irten Falten bestehende Krause. Zu dieser gehören auch die durch Parasitismus des palinen, welche durchaus keine Verdauungs: am Hinterende eine undulirende Membran abgebildete Art (*Opalina polymorpha*), bt im Darne des Frosches.

pelwimperer (*Heterotricha*) haben zarte uf dem ganzen Körper und außerdem noch um weit größere, oft borstenähnliche Wimpern. dete Art ist sowol durch die Gestalt als auch sentanzähnlichen Nucleus auffallend. (*Tromenchen*, *Stentor polymorphus*, Fig 17.) eizwimperer (*Peritricha*) zeigen einen mperlosen Körper mit einem Wimperkreis Spirale von Wimpern. Sie sitzen meist nthierchen, *Vorticellida*), einige aber leben enläufe, *Trichodinida*); die festigenden besitzen, meist zusammenziehbar, seltener steif. Wir einer Gattung, welche baumsförmig verslonien bildet, deren Stiel durch Muskeln wird, zwei Einzelthiere ab, die auf gemein. Zweige sitzen (*Zoothamnium nutans*,

iselwimpern (*Cilioflagellata*) sind meist lebende und dann lebhaft leuchtende Thiere

mit starrem Kieselpanzer, der oft seltsam in Hörner und Spizen ausgezogen ist. Die Wimpern stehen in einem Querschlitz des Panzers und aus dem Munde ragt eine lange Geißel hervor. Die abgebildete Art (*Peridinium tripos*, Fig. 20) sehr häufig in der Nord- und Ostsee.

Als Anhang können wir hier der Leuchtthierchen (*Noctiluca*) erwähnen, welche, zu Millionen in der Nordsee und dem Ocean vereinigt, häufig für sich allein das Leuchten des Meerwassers bedingen. Die Thiere bestehen aus einer etwas abgeplatteten Blase, die von Sartosträngen in ähnlicher Weise erfüllt ist, wie das Innere mancher Infusorien. Sie schwimmen mittels einer diden Geißel, an deren Basis eine Vertiefung sich befindet, welche mit den Anfängen der Sartostränge erfüllt ist. Hier wird die Nahrung in ähnlicher Weise aufgenommen wie bei der folgenden Klasse. Die abgebildete Art (Leuchtthierchen, *Noctiluca miliaris*, Fig. 21) aus der Nordsee.

Wir erwähnen auch hier der Gregarinen, die wohl ausgebildete Zellen mit Hülle, Inhalt und Kern darstellen, sich durch Theilung vermehren und nur als Schmarotzer angetroffen werden.

Klasse der Wurzelsüßer (*Rhizopoda*).

(Tafel 33, Figur 15, 22 bis 30.)

Die Körpersubstanz besteht wesentlich aus Sartoide, die sich durch veränderliche, einziehbare, von Körnerströmungen durchsetzte Fortsätze (Scheinfüße, Pseudopodien) bewegt und ernährt. Sie besitzen meist noch Kerne und eine bestimmte Körperform.

Von differenzirten Organen zur Ausübung bestimmter Functionen ist keine Spur zu sehen. Sämmtliche Lebenserscheinungen gehören der Sartoide an, einer mehr oder minder festen Grundsubstanz, die große Neigung zur Bildung von Hohlräumen (*Vacuolen*) zeigt, mehr oder minder weich ist, häufig leicht zerfließt und in ihrer Masse meist Körnern zeigt, welche in beständigen Strömungen durch Zusammenziehungen der Masse in sich gehalten werden. Oft zeigt sich Tendenz zu peripherischer Verdichtung, so daß dann eine Rindenschicht von der innern flüssigern Masse unterschieden werden kann; doch ist diese Scheidung nicht durchgeführt und die Rindenschicht geht allmählich in die innere Substanz über. Bewegung und Ernährung wird vorzugsweise durch höchst veränderliche Fortsätze (Scheinfüße, Pseudopodien) bedingt, welche bald nur an bestimmten Orten, bald an jeder Stelle des Körpers hervortreten, mit innerer Körnerströmung sich vergrößern, verästeln, zusammenschmelzen (Beweis, daß keine Hautschicht vorhanden), sich wieder trennen, zurückziehen und bald sehr fein, bald dider oder selbst blattartig erscheinen. Mittels dieser Gestaltveränderungen schiebt sich der Körper, wie ein langsam fließender Kleister, nach verschiedenen Richtungen hin. Weist wird auch durch diese Scheinfüße die Ernährung in der Art bewerkstelligt, daß sie sich um die Beute herumschmelzen, dieselbe allmählich in die Masse des Körpers hineinziehen, um dann, wenn die Substanz derselben aufgenommen ist, die unverdaulichen Reste an einer bestimmten Stelle wieder auszuscheiden und auszustößen. Oft aber geschieht auch die Aufnahme in der Art, daß sich die Pseudopodien wie Saugröhren an die Beute anlegen und nun durch den Körnerstrom allmählich die organische Substanz derselben in den Körper des Wurzelsüßers hinüberfließt.

Bei den meisten hat man in der Sarkode zerstreute oder auch einzelne Kerne beobachtet; bei einigen auch pulsirende Hohlräume, in ähnlicher Weise gestaltet, wie bei den Infusorien. Die meisten bauen festere Gerüste, Schalen, Hüllen, Stacheln, deren Anordnung oft äußerst zierlich ist.

Fortpflanzung durch Theilung kommt bei den nackten Formen ganz allgemein, vielleicht auch bei manchen Schalenträgern vor; bei vielen hat man im Innern Kugeln von besonderer Färbung beobachtet, welche zur Fortpflanzung in Beziehung stehen mögen. Viele pflanzen sich auch, nach vorheriger Einkapselung, zuweilen auch ohne diese, durch sogenannte Schwärmsporen, ähnlich den niedersten Pflanzen, fort. Das ganze eingekapselte Thier zerfällt dann meist in einzelne zellenartige Körper, welche schließlich aus dem Innern hervorbrechen und mittels einer oder selbst mehrerer Geißeln im Wasser umherzuschwimmen, später aber die Geißeln verlieren und nun nur noch mittels Pseudopodien sich bewegen.

Alle sind mikroskopisch. Die meisten leben im Meere, andere im Süßwasser, höchst wenige in feuchter Erde, im Moor und Schlamm. Viele häufen sich in ungeheuren Massen an und bilden durch ihre Schalen ganze Schichten.

Unterklasse der Meerqualster (Radiolaria).

Bestimmte Körperform. Im Innern eine von Sarkode umgebene und theilweise ausgefüllte Centralkapsel.

Die Centralkapsel besteht aus einer festen, durchsichtigen Masse, in welcher kugelförmige, kernlose und durchsichtige Körper stets sich finden, zwischen welchen Sarkode angehäuft ist. Zuweilen finden sich in dieser netzartig gebildeten Sarkode Zellkerne, Zelltröpfchen, große Blasen mit Kernen, Zellen und Concretionen. Die Sarkode ist auch um die Centralkapsel herum ergossen und schied von hier aus die Pseudopodien. Diese äußere Sarkode enthält auch gelbe, mit deutlicher Membran versehene Zellen, welche in Tochterzellen zerfallen können. Das Skelet besteht entweder aus einer durchsichtigen, knorpelartigen, organischen Substanz oder aus Kiesel Erde. Es ist häufig aus Nadeln gebildet, die bald den Körper durchsetzen, bald nur an der Peripherie sich befinden und häufig in streng geometrischen Formen angeordnet sind. Sehr häufig finden sich auch gegitterte Schalen in Gestalt von Kugeln, Körben u. s. w., mit welchen die Nadeln und Stacheln in der verschiedensten Weise verumben sind.

Radiolarien finden sich in allen Meeren, einige auch im Süßwasser; die ersten oft schwimmend oder am Meeresboden kriechend. Ihre Schalen bilden an einigen Orten, freilich nicht für sich allein, Schichten von feinem, mehrlartigem Sande, sogenanntes Bergmehl, und sind manche fossile Lagerstätten aus den Tertiärzeiten bekannt (Santa-Fiore in Sicilien, Barbadoes, Nicobaren u. s. w.).

Man hat einkapselige (Monozoa) und mehrkapselige (Polyzoa) unterschieden. Die ersten stellen ein Einzellthier dar; sie haben die mannichfachen Formen. Wir bilden eine Art aus dem Mittelmeere ab, bei welcher die Scheinfüße aus allen Poren der becherförmigen, mit einer neunsadigen Oeffnung versehenen Witterschale hervortreten (Carpocanium diademum, Taf. 33, Fig. 26), sowie zwei Witterschalen ohne lebende Substanz, die auch fossil gefunden werden und von welchen die eine nur einen Stachel am Ende und mehrere Einschnürungen der

gegitterten Schale zeigt (Eucyrtidium galea, Fig. 28), während die andere starke, regelmäßig gestellte Strahlenstacheln mit großen Oeffnungen der kugelförmigen Witterschale aufzuweisen hat (Leukothierchen, Halimonia echinaster, Fig. 29).

Aus der weit weniger formenreichen Gruppe der mehrkapseligen Radiolarien bilden wir eine im Mittelmeer häufige, nackte Art ohne Skelet ab, bei welcher die Centrallängen in Reihen gelagert sind, so daß das Ganze einer durch Einschnürungen abgetheilten Kugel gleicht (Collozoum inerme, Fig. 27).

Unterklasse der eigentlichen Wurzelfüßer (Rhizopoda genuina).

Keine Centralkapsel; Körper nur aus Sarkode gebildet, aber meist mit Kernen und auch öfter mit pulsirenden Räumen. Keine Schwärmsporen.

Nur bei wenigen Formen ist die Rindenschicht sehr und durchsichtiger, sonst ist sogar meist gar kein Unterschied zwischen der innern Masse und der äußern wahrzunehmen. Die Sarkode ist sonst ganz wie bei den vorigen gestaltet. Einige sind nackt; die meisten aber besitzen eine Schale, die, wenn sie anorganische Stoffe enthält, stets aus tohlenjaurem Kalle gebildet ist. Feste Nadeln oder Stacheln in geometrischer Anordnung kommen niemals vor, dagegen mannichfache, von der Kugel ausgehende Gestalten bis zu schon gewundenen Gehäusen, die man früher sogar den Ammoniten ähnlich hielt. Diese Schalen sind bald einfach, bald aus mehreren zusammenmündenden Kammern gebildet, so daß zusammengefügter Thierkörper stehen (Polythalamia). Die Aneinanderreihung dieser Kammern geschieht in sehr verschiedener Weise, bald unregelmäßig, bald in der Längsachse, in Schmelwindungen, auf zwei abwechselnden Reihen u. s. w. Die Wandungen der Schalen sind ebenfalls verschieden gebaut; bei der einen sind sie fest, ohne fächerartige Poren, die Scheinfüße treten dann durch eine gemeinsame Oeffnung aus; bei den andern sind sie fächerartig durchlöchert, so daß die feinen Pseudopodien durch diese Oeffnungen hervortreten können, woher dann auch diese schalentragenden Wesen Foraminiferen genannt wurden.

Die Rhizopoden, die theils im Süßwasser, besonders aber im Meere vorkommen, spielen eine bedeutende Rolle im Haushalte der Natur als wesentliche Zerstörer des im Meerwasser aufgelösten tohlenjauren Kalles. Sie haben ganze Gebirge aufgebaut durch massenhafte Anhäufungen, und thun dies noch. Man findet an vielen Stellen des Meeresgrundes eine Art Krebelschlamm von großer Mächtigkeit, welcher nur aus lebenden Rhizopoden, mit Moneren gemischt, gebildet ist und der beim Trocknen selbst durch die Art der Schalen, welche sich darin finden, als Krebelschlamm anerkannt werden muß.

Man kann nackte, einkammerige und vielkammerige unterscheiden. Da mehrere Tausende von Arten (fossil und lebende zusammengezeichnet) bekannt sind, so darf es nicht wundern, daß man eine Menge von Familien unterschieden hat. Wir bilden von den vielkammerigen mit durchbohrter Schale eine Art ab (Rotalia veneta, durch einen Irrthum in einigen Exemplaren des Atlas als Miliola bezeichnet, Taf. 33, Fig. 22), welche die Pseudopodien aus den Poren der Schale ausgestreckt hat; eine zweite (Textularia picta, Fig. 24), bei welcher die an Breite wachsenden Kammern in zwei Reihen stehen, und endlich eine dritte mit unregelmäßig zusammengehaften runden Kammern,

die in der fossilen Kreide sowohl als in der jetzt auf dem Meeresgrunde zwischen Europa und Nordamerika in einer Tiefe von 10000 Fuß sich bildenden Kreide besonders häufig ist (*Globigerina bulloides*, Fig. 23). Von den im Süßwasser lebenden ungepanzerten und einfaulen Formen bilden wir ebenfalls drei Typen ab, welche verschiedene Charaktere zeigen. Bei dem Sontenthieren (*Actinophrys sol*, Fig. 25) zeigt der ganze, deutlich in eine Rindenschicht und innere Masse getheilte Körper zellige Aufstrebungen und lange, aber biegsame Stacheln. Hier finden sich äußere, pulsirende Räume (bei dem abgebildeten Exemplare ist einer rechts vergetrieben); die Stacheln dienen zum Ausstrichen der Beute, die dann von ausgetriebenen Pseudopodien eingeschlossen und in den Körper gezogen wird. Die zweite Gattung, *Amoeba princeps* (Fig. 30), deren Arten man fast in allen Gewässern findet, streckt nur wenige breite Scheinfüße aus, die aber an allen Körpergegenden vorgestreckt werden können, während die dritte Art, die nur selten vorkommt, *Plagiophrys cylindrica* (Fig. 15), die feinen Pseudopodien, die im Holzschnitte unrichtigerweise wie Haare dargestellt sind, nur an dem einen Körperende hervortreten läßt.


Klasse der Moneren (Monera).

(Tafel 33, Figur 31, 33 und 34.)

Körpergestalt unbestimmt, veränderlich; ohne Kerne und contractile Räume. Fort-

pflanzung durch Theilung oder Schwärmsporen.

Wesen, die auf der unbestimmten Grenze zwischen Thier und Pflanze stehen, nur aus Eartode bestehen und deshalb auch von manchen Forschern als ein eigenes Zwischenreich, der Protisten, betrachtet werden. Einige, die im Meere schwimmen, strahlen noch vielfache Pseudopodien nach allen Richtungen aus (*Protophyxa aurantiaca*, Fig. 33). Bei diesen und verwandten Arten hat man auch ähnliche Vorgänge wie bei Infusorien gesehen (Conjugation, Einkapselung, Bildung von Schwärmsporen), was neben der Theilung eine andere Form der Fortpflanzung bildet. Dem weiter abgebildeten Wesen, *Bathybius Haeckelii* (Fig. 31), welches gewissermaßen als Urschleim, ohne bestimmte Gestalt, ohne Differenzierung innerer Theile, ohne Scheinfüße, an vielen Stellen den Meeresgrund in dicken Massen überzieht, haben viele Forscher das Leben abgesprochen, indem sie es für Eartodemassen halten, hervorgegangen aus der Zerfetzung von Rhizopoden und ähnlichen Geschöpfen; die Schleimpilze endlich (*Myxomyceta*), von denen wir eine Art abbilden (*Trichia varia*, Fig. 34), werden jetzt wol allgemein zu den Pflanzen gestellt, während ihr genauester Forscher sie noch ihrer innern Bildung und Fortpflanzung wegen den Thieren zurechnen wollte.



B o t a n i k.

Bearbeitet

von

Dr. Moriz Willkomm,

Professor der Botanik an der Universität zu Prag.

~~~~~

Vierte Klasse. Mit Geschlechtsorganen tragendem Vorkeim versehene Stämmförmige Pflanzen (Cormophyta prothallionata) . . . . .

Fünfte Klasse. Scheinfrüchtige Samenpflanzen ohne Kotyledonen (Nothocarpae acotyledoneae) . . . . .

Sechste Klasse. Scheinfrüchtige Samenpflanzen mit Kotyledonen (Nothocarpae cotyledoneae) . . . . .

Siebente Klasse. Samenpflanzen mit echten Früchten und einsamenslappigem Keim (Teleocarpae monocotyledoneae) . . . . .

Achte Klasse. Samenpflanzen mit echten Früchten und zweisamenslappigem Keim (Teleocarpae dicotyledoneae) . . . . .

III. Pflanzengeographie . . . . .

Schlüssel der Klassen des Linne'schen Systems . . . . .



## Einleitung.

Der Botaniker oder Pflanzenkunde ist derjenige Wissenschaftler, welcher, wie Linné sich ausdrückte „*sophia botanica*“ (1751) sehr richtig „Erkenntniß“ (cognitio) der Gewächse und der Forschung hat. Unter Erkenntniß verstehen wir aber in der gegenwärtigen Zeit nicht bloß die „Kenntniß“ von dessen Verhältnissen, sondern auch, ja vorzugsweise die Gesetze, welche seiner Entstehung Grunde liegen, und ist es ein lebendiger Wissenschaftler, der die Kunde von dessen innerem Aufbau, Fortpflanzung und Tod. So ist der Botanik eine sehr vielseitige Aufgabe, die hat sich nämlich zu beschäftigen: 1) mit dem inneren Baue und Entwicklungsgeschichte des Pflanzenkörpers (Anatomie und aller seiner Glieder Morphologie der Pflanzen); 2) mit den Ursachen der Pflanzen und den Gesetzen, welche seinen Fortleben bedingt werden (Physiologie der Pflanzen); 3) mit der Beschreibung, Benennung, Unterordnung (Klassifikation) der zahllosen Pflanzen (Arten oder Species), aus denen die Pflanzengemeinschaft der Erde in der Gegenwart zusammengefaßt ist (der Vergangenheit „vorweltlicher“ Pflanzenwelt); 4) mit der geographischen Verbreitung der Pflanzen (Pflanzengeographie); endlich 5) mit der Geschichte der Pflanzenwelt in den Anfängen bis auf die Gegenwart (Paläontologie der Pflanzen und paläontologische Botanik). Morphologie und Physiologie pflegen die allgemeine, die übrigen Disciplinen der Botanik oder speciellere Botanik bezeichnet zu werden. Die Botanik theilt man in die allgemeine und in die angewandte. Letztere hat es bloß mit den Nutzpflanzen zu thun, welche den Menschen Schaden zu bringen

Hohlräume nennt man Zellen und betrachtet sie, da alle Theile (Glieder) der Pflanze, z. B. Wurzeln, Stamm, Blätter u. s. w. aus solchen Zellen zusammengesetzt sind, als die Grund- oder Elementarorgane der Pflanzen. Die meisten Pflanzen bestehen aus vielen Tausenden, ja Millionen oder Milliarden von Zellen (z. B. ein Baum); es gibt aber auch Gewächse, welche nur aus verhältnismäßig wenigen Zellen zusammengesetzt sind (z. B. die Fadenalgen und Schimmelpilze, deren Körper bloß eine einfache oder verzweigte Reihe von Zellen ist, s. Taf. 5, Fig. 2), oder gar aus einer einzigen Zelle bestehen, z. B. die mikroskopisch kleinen Diatomeen (Taf. 7, Fig. 2). Einzelne, isolirte Zellen kommen aber auch bei den vollkommenen Pflanzen vor. So besteht der Meeresstaub (Pollin) der weitaus meisten Pflanzen aus isolirten Zellen (Pollenkörnern). In allen diesen Fällen tritt die Zelle als Individuum auf. Aber selbst in den zahllosen Zellen, welche in den verschiedenen Zellen, sogenannten Zellgewebe, zusammengesetzten Pflanzentheilen läßt jede einzelne Zelle ein individuelles Leben erkennen, weshalb man jeden solchen Pflanzentheil und folglich auch jede vielzellige Pflanze als aus zahllosen Individuen zusammengesetzt ansehen kann: eine Anschauungsweise, welche auch deshalb gerechtfertigt erscheint, weil jede Pflanze bei ihrer ersten Entstehung aus einer einzigen Zelle (der Eizelle) hervorgeht.

Die überwiegende Mehrzahl der Pflanzenzellen zeigt schon im jugendlichen Zustande einen concentrisch-schaligen Bau. Eine solche Zelle besteht nämlich in der Richtung von außen nach innen: 1) aus einer festen dehnbaren Haut (Zellhaut, Zellmembran, Zellwand), 2) aus einem der Innenseite dieser Haut dicht anliegenden weichen, schleimig-gallertartigen Sade (Protoplasmasad, Primordialschlauch), 3) aus einem in diesem Sade eingeschlossenen linsenförmigen Körper (Zellkern, Cytoblast), und 4) aus einer wässrigen und wasserhellen, ebenfalls vom Protoplasmasad umschlossenen Flüssigkeit (Zellsaft). Die Endothel der Zellhaut ist Cellulose, eine nur aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff zusammengesetzte chemische Verbindung, diejenige des inneren weichen Sades und des Zellkernes Protoplasma, d. h. ein Gemenge verschiedener Stoffe, unter denen jedoch stets Protein- oder Eiweißstoffe eine hervorragende Rolle spielen und deshalb immer stickstoffhaltig; dagegen besteht der Zellsaft aus Wasser und darin gelösten organischen und unorganischen Substanzen. Dieser fehlt anfangs ganz; die jugendliche Zelle erscheint als ein fester, von einer äußerst zarten Cellulosemembran umkleideter Protoplasmaclumpen, in dessen Centrum der Zellkern eingebettet liegt (Taf. 1, Fig. 1: fünf Zellen aus einer ganz jungen Wurzel der Maifrone, stark vergrößert). In dem Maße, als sich die Zelle vergrößert, bildet sich im Protoplasma der Zellsaft aus (zunächst in Form heller Tropfen, die später zusammenfließen, Fig. 2), durch den zuletzt der Protoplasmaclumpen in den bereits erwähnten Protoplasmasad verwandelt wird. Der Zellkern zieht sich dann gewöhnlich in die Masse des Protoplasma zurück; er wird „wand-

## Erster Theil.

Morphologie und Physiologie der Pflanzen oder allgemeine Botanik.

(Tafel 1-4.)

Die Zellen und Zellgewebe.

Man findet in irgend einem zarten, membranösen Gewebe ein recht dünnes Blumenblatt, einen dünnen Abschnitt eines Apfels u. s. w. so wird man finden, daß der Gewebe aus einer gleichartig dichten Masse (Zellgewebe) aus einer Menge kleiner bestimmter aber sehr verschiedener Form ist (z. B. Taf. 2, Fig. 24). Diese

ständig". Infolge dessen beginnt nun wieder, wahr- scheinlich in allen Zellen, ein Strömen des Proto- plasmas. Die aus leicht verschiebbaren, von Wasser- kugeln umgebenen Theilchen (Moleculen) bestehende Masse des Protoplasmas beginnt nämlich eine Bewegung zu zeigen, indem von dem Protoplasmasaße aus stärkere und schwächere Stränge oder Fäden entspringen, welche den mit Zellsaft erfüllten Hohlraum der Zelle in allen möglichen Richtungen durchziehen, sich bald miteinander verbinden (anastomosiren), bald wieder voneinander trennen und deren feintörnige Masse in Bewegung erscheint (Fig. 3: eine Zelle aus einem jungen Haare der Kürbispflanze). Seltener als diese „anastomosirende“ Strömung des Protoplasmas kommt die „rotirende“ vor, wo ein ungetheilter Protoplasmaström unauflös- lich in einer und derselben Richtung der Innenwand der Zelle entlang sich bewegt (bis jetzt nur in Zellen gewisser Wasserpflanzen beobachtet). Der Zweck der Protoplasmaströmung ist noch unbekannt, ihre Ursache noch nicht genügend erforscht. — Der Protoplasma- körper (später Protoplasmasaß) ist, da nur proto- plasmaphaltige Zellen neue Zellen zu erzeugen und Pflanzenstoffe aus anorganischen Substanzen zu bilden vermögen, der wichtigere Bestandtheil der Zelle; von ihm wird auch die Cellulosemembran erzeugt, indem deren Substanz im Protoplasma in Form von überaus kleinen Moleculen sich bildet, welche aus der Oberfläche des Protoplasmakörpers hervortreten und sich anein- anderlagern zu einer festen Membran werden. Auch der Zellsaft scheidet sich aus dem Protoplasma aus, desgleichen entfällt in ihm durch Ansammlung gewisser Theilchen auf einem bestimmten Punkte der Zellkern. Der Protoplasmakörper muß also bei der Entstehung einer Zelle zuerst vorhanden sein, und das ist in der That der Fall. Deshalb ist seiner Substanz auch der Name „Protoplasma“, d. h. Urbildungsstoff, gegeben worden.

Jede jugendliche Zelle hat das Bestreben, sich zu vergrößern, zu wachsen. Die Ausdehnung der Zell- wand erfolgt durch Einlagerung neuer vom Protoplasma ausgeschiedener Cellulosemoleculen zwischen die bereits vorhandenen. Je nachdem die Zellmembran sich an allen Punkten gleichmäßig ausdehnt oder ihre Aus- dehnung nur in einer oder zwei Richtungen oder ganz unregelmäßig geschieht, wird auch die Form der Zelle sehr wesentlich verändert, oft so bedeutend, daß die ausgewachsene Zelle der jugendlichen nicht im geringsten gleicht. So entstehen durch die Verschiedenartigkeit der Ausdehnung kugelige, ellipsoide (Fig. 4, 5), sternförmige (Fig. 13, aus dem Mark einer Simse), unregelmäßig verzweigte (Fig. 11, 12, aus der Rinde des Lärchenbaums), spindelförmige (Fig. 9, Bastzelle aus der Lärchenrinde) und andere Zellenformen. Aber auch durch den gegenseitigen Druck, welchen benachbarte Zellen bei ihrer Vergrößerung aufeinander ausüben müssen, wird die Form der Zelle vielfach abgeändert. Durch solchen entstehen polyedrische von rhombischen oder trapezoidischen Flächen begrenzte Formen (Fig. 6), oder mehrflächige Prismen, oder die Form der Bienen- zelle (Fig. 7), oder langgestreckte laufige Röhren mit zugespitzten oder schief abgestutzten Enden (Fig. 8). Zellen von der Form der Fig. 6 und 7 oder diesen ähnliche nennt man parenchymatische (aus solchen Zellen zusammengesetztes Gewebe Parenchym), Zellen von der Form von Fig. 8 prozenchymatische (aus solchen bestehendes Gewebe Prozenchym), während man kugelige, ellipsoide und andere mit gebogenen Flächen ausgebildete Zellen, die sich in geschlossenen Geweben nur stellenweise berühren können, als meren- chymatische (aus solchen gebildetes Gewebe als

Merenchym) zu bezeichnen pflegt. Zum Parenchym rechnet man auch aus ganz unregelmäßigen Zellen bestehendes Gewebe, z. B. das sogenannte Schwamm- förmige (Fig. 14). Spindelförmige Zellen (Fig. 9) sind auch pleurenchymatische, und künftighin Vereinigungen solcher (z. B. im Baste vieler Pflanzen) Pleurenchym genannt worden.

Während die wachsende Zelle ihre Haut an der Verdickung zugleich dieselbe durch Ein- und Auslassen von Cellulosemoleculen. Nur selten erfolgt diese Ver- dickung gleichmäßig, gewöhnlich geschieht sie ungleich- mäßig, ja sehr häufig nur an einzelnen Punkten, die in der Richtung von Schraubenlinien. So entstehen Zellen, deren Innenfläche mit erhabenen Leisten, Rippen, Bändern besetzt erscheint (Fig. 23), oder die Wand von außen unter dem Mikroskop wie von runden Löchern oder von queren Spalten durchbrochen aus- sieht (Fig. 22, 24, 26). Zellen der letzten Art nennt man getüpfelte (früher, wo man ihnen für durchlöcherig hielt, poröse) und, wenn die Zelle d. h. die unverdickte gebliebenen Stellen, sehr klein und punktirte, während Zellen mit leisten- oder ring- förmiger Verdickung je nach deren Gestaltung Ring-, Spiral- und Netzfaserzellen genannt werden. Eine sehr eigenthümliche Verdickungs- art findet bei den Zellen mit behöftsten Tüpfeln (Fig. 25, 27), bei den Gitterzellen (Fig. 21) und den Siebröhren (Fig. 20) statt. Erstere entstehen von der Fläche gesehen bei starker Vergrößerung runden, hellen Tüpfeln bestreut, welche von zwei concentrischen Kreislagen umgeben sind. Diese behöftsten Tüpfel entstehen so, daß, wie man nur auf einen durch die Tüpfel- führung Querschnitt der Zellwand sehen kann, zwei aneinanderliegenden Zellen sich kleine linienförmige Hohlräume (Tüpfelräume) befinden, deren durch- sichtige Zellwand hindurchschimmernder Natur als eine den Tüpfel, d. h. die unverdickte gebliebene Zell- umgebende Kreislage erscheint (Fig. 19, oben rechts). Seltener als runde kommen spaltenförmige Tüpfel vor (Fig. 27). Die Gitterzellen und Siebröhren sind dadurch ausgezeichnet, daß die Verdickung ihrer Wand von großen, runden oder querlänglichen oder ganz unregelmäßigen Tüpfeln durchbrochen ist, welche mit einem engmaschigen Fasergerüst besetzt sind und daher wie gegittert (Fig. 21, eine Zelle aus der Lärchenrinde, mit einem Gittertüpfel) oder schwächerer Vergrößerung, wie ein Sieb (Fig. 20, Siebröhre aus dem Kürbistengel). — Zellen mit sehr stark verdickter Wand, bei denen der Innenraum (das „Lumen“) oft außerordentlich klein ist (Fig. 9, 11, 43), erscheint die Wand im Querschnitt oft deutlich geschichtet (Fig. 10, 11, 15, 43). Die Schichtung, welche der Zellwand einen concentri- schalen Bau verleiht, ist nicht, wie man früher annahm, das Resultat einer periodisch erfolgten Ablagerung von Cellulosefibrillen, sondern, wie die neuesten Forschungen ergeben haben, durch die Ausbildung („Differenzirung“) wasserärmerer und wasserreicherer Schichten innerhalb der gesammten Verdickungsmasse nach deren Verdickung entstanden. Sind solche stark verdickte Zellen gegeben, so bilden die Tüpfel Kanäle (Tüpfelkanäle), von dem Lumen der Zelle her sich durch die ganze Ver- dickungsmasse hindurch oder tief in dieselbe hin- erstrecken (Fig. 10, 16, 17, 43). Besteht ein Gewebe aus solchen Zellen, so laufen die Tüpfelkanäle durch einen Zelle auf diejenigen der benachbarten (correspondirenden mit denselben: correspondirende Tüpfelkanäle, Fig. 10, 17, 43). Diese selbst an sich schon eine Einrichtung hat ihren guten Grund. Solange

stthätig sind, d. h. solange sie noch einen Protoplasma enthalten, findet zwischen ihnen Stoffwechsel statt, mit andern Worten, treten und Gase aus der einen Zelle in die

Bei dünnwandigen, z. B. bei allen jungen Leber Stoffwechsel sehr leicht, indem die und Gase durch die Wandungen der Zellen gehen („diffundiren“). Bei starker Verdickung d., mit welcher sehr häufig auch eine Vertheilung verbunden ist, würde der Uebertritt leiten aus einer Zelle in die andere un-; durch correspondirende Lückenkanäle, durch die dünnen unverdickt gebliebenen Zellhaut geschieden sind, ist aber die Mög- den, daß auch zwischen solchen Zellen der von Flüssigkeiten und Gasen ungehindert ann. Noch ist zu bemerken, daß bei be- In die zarte den Lückenraum umschließende später häufig aufgelöst (resorbiert) wird. eben wirkliche Löcher in den Zellwänden, e die Lumina der miteinander verbundenen (dergelagerten) Zellen in offene Communica-

wir in der jugendlichen Zelle nur den Plasma vertheilten Zellsaft antreffen, erscheint (steht, aber noch lebensstthätige Zelle mit sehr n Inhaltsstoffen angefüllt. Und wir theils feste Körper, theils flüssige Stoffe renraum der Zelle, erstere durch das Mitro- e meist nur durch bestimmte Veränderungen nischer Einwirkungen (durch „Reactionen“)

Unter den festen Inhaltsstoffen spielen ophyll-, Stärke- und Aleuronkörner olle. Die Chlorophyll- (Blattgrün-) Körner mittelbar aus dem Protoplasma, indem Körner zerfällt, welche eine grüne Farbe an- Auf dem Vorhandensein des Chlorophylls grüne Farbe aller Pflanzentheile, indem in den unmittelbar unter der Oberhaut (i. s. s. kommen den Körnern durch die durchsichtigen fetten Zellhäute hindurchschimmert. In größter sei man die Chlorophyllkörner in den Zellen

(Gewebe der Blätter (Fig. 32, eine Zelle ichtennabel, stark vergrößert). Gleich dem a sind die Chlorophyllkörner sehr veränder- ngeordnet, aber stets stoffhaltig; ihre Auf- ie Zerlegung der von den Blättern aus der onommenen Kohlensäure zu bewirken und heidung des freigewordenen Sauerstoffs, eber in die Luft abgegeben wird, aus dem enen Kohlenstoff mit Hülfe des von den ausgenommenen und bis zu den Blättern ungenen rohen Nahrungsaftes, welcher eben- seine Bestandtheile zerlegt wird, Stärke, r organischen, einen pflanzlichen Stoff, zu ie Stärke ist das erste Product des „As- process“, d. h. der chemischen Vorgänge, e die von der Pflanze aus Boden und Luft nenen anorganischen Stoffe zerlegt und in übergeführt werden. Diesen Proceß, auf ie gesammte Ernährung und das Wachsthum ze beruht, leiten die Chlorophyllkörner ein halten denselben auch im Verein mit dem eibenden Protoplasma anderer Zellen, durch eber andere organische Stoffe, z. B. Cellulose, werden. Die Chlorophyll- und protoplasmazellen haben folglich eine höchst wichtige Auf- erfüllen: sie sind die eigentlichen chemischen ien der Pflanze und stehen auch im regsten sel untereinander. Die zunächst im Innern

der Chlorophyllkörner entstehende Stärke tritt in gelöster Form — und zwar während der Nacht — wieder aus denselben heraus, um von Zelle zu Zelle auf dem Wege der Diffusion weitergeschafft zu werden. Sie gestaltet sich auf diesem oft langen Wege wiederholt zu festen Körnern, welche sich dann wieder auflösen und an der blauen Farbe, welche die Stärke stets mit Zerkleinerung sofort annimmt, als Stärkekörner leicht erkannt werden können. In größeren Körnern wird aber diese Substanz bleibend nur in bestimmten Zellen (z. B. in dem Zellgewebe der Knollen, Zwiebeln, im Marke der Palmen, in den Markstrahlen der Laubhölzer, in den Samen der Getreidearten u. s. w.) aufgespeichert, um im nächsten Frühling wieder aufgelöst und unmittelbar als Nährstoff, sei es für den keimenden Samen, sei es für die austreibenden Knospen verwendet zu werden. Solche Stärke besteht immer aus größeren Körnern, welche unter sehr verschiedenen Formen auftreten (Fig. 31). Die meisten lassen einen concentrisch-schaligen Bau erkennen mit gewöhnlich excentrisch gelagertem Kern (Fig. 31, d aus der Kartoffel und e aus der Galgantwurzel), andere enthalten eine sprunghafte Hohlung (a, b, c aus der Bohne), noch andere erscheinen aus mehreren soliden Körnern zusammenge- (f aus der Safforawurzel). Das Aleuron oder Klebermehl entsteht gleich dem Chlorophyll unmittelbar aus dem Protoplasma, ist aber in der Regel farblos, wenigstens niemals grün. Es zeigt dieselbe chemische Zusammensetzung wie das Protoplasma, kommt gewöhnlich in sehr kleinen edigen Körnern (Fig. 29 b), seltener in größeren Körnern oder gar in Form von Kristallen (Kristalloiden, Fig. 30) vor und findet sich vorzugsweise in den Zellen der Kotyledonen oder des Eiweißkörpers (s. unten) der Samen, doch auch — wenigstens während des Winters — in den Knospen, in der Rinde und den Wurzeln vieler Pflanzen. Es spielt gleich den aufgespeicherten Stärkekörnern die Rolle eines „Reservestoffs“, d. h. ist für die auf den Winter folgende Vegetationsperiode bestimmt, wo es ebenfalls aufgelöst wird, um andere Stoffe zu bilden. Das Klebermehl kommt nicht selten in Gesellschaft von Stärkekörnern vor (z. B. in dem Samen der Bohne, Fig. 29), häufiger im Verein mit fettem Oel oder Pflanzenfett, welches in allen ölhaltigen Samen, aber auch in andern Pflanzentheilen (in größter Menge z. B. im Fruchtfleisch der Oliven) enthalten ist, ebenfalls als Reservestoff auftritt, als solcher in Samen häufig das dort fehlende Stärkemehl ersetzt, indem es gleich diesem nur aus Kohlen-, Wasser- und Sauerstoff besteht. Die aus den genannten Elementen sehr verschiedenartig zusammengefügten fetten Oele kommen in der lebenden Zelle als kleine im Zellsaft suspendirte oder zwischen Aleuronkörnern eingebettete Tropfen vor. Außer diesen für die Ernährung und das Wachsthum der Pflanze höchst wichtigen Stoffen werden als feste Inhaltsstoffe der Zellen noch Kristalle verschiedener anorganischer und organischer Salze gefunden. Am häufigsten sind die Kristalle des oxalsauren Kalks, welche sich namentlich in fleischig-saftigen Geweben vorfinden und gewöhnlich als feine zweispitzige Nadeln oder sogenannte „Nadeln“ (Fig. 34), seltener als Kristallbrüsen (Fig. 33) auftreten. Ihre Bestimmung ist unbekannt. Endlich ist als fester Zelleninhaltsstoff noch das Kautschuk zu erwähnen, welches in den Milchsaften vieler Pflanzen in Form äußerst kleiner farbloser Kugeln vorkommt und für das Leben der Pflanze bedeutungslos zu sein scheint. Unter den flüssigen Zelleninhaltsstoffen, welche für sich allein oder untereinander gemengt, oder im Zellsaft gelöst auftreten, sind der Zucker und Glycerin



die häufigsten und wol auch wichtigsten. Der Zuder kommt in zwei Hauptarten vor, als gährungs-fähiger (Trauben- oder Fruchtzuder) und als nicht gährungs-fähiger (Mohrzuder). Letzterer, in den Stengeln und Blättern aller Gräser, ferner in manchen Wurzeln (Kunkelrübe, Mohrrübe, Zuderwurzel) enthalten, spielt ebenfalls die Rolle eines Reservestoffes, während der Traubenzuder eine vorübergehende (transitorische) Bildung ist, indem er z. B. aus gelöster Stärke entsteht und bald wieder in andere organische Stoffe übergeführt wird. Er tritt z. B. in allen schon entwickelten Keimen, in den austreibenden Knospen, im Frühlings-saße der Birken, Ahorne und andern Bäumen auf. Aehnlich verhält sich der namentlich in Wurzeln, Rinde und Knospen vorkommende Gerbstoff, welcher häufig in einer und derselben Zelle mit Stärke abwechselt und oft die Grundlage rother Färbungen bildet, z. B. aller bei der Entfaltung rothgefärbten oder auch im Herbst sich roth färbenden Blätter. Zuder und Gerbstoff sind nur aus Kohlen-, Wasser- und Sauerstoff zusammengesetzt. Häufig vorkommende flüssige Zellen-inhaltsstoffe sind endlich die ätherischen Oele, sauerstoffarme oder bloß aus Kohlen- und Wasserstoff bestehende Substanzen, welche als Ausscheidungsproducte der Pflanzen betrachtet werden müssen und auf deren Verbrennung an der Außenseite der Pflanzen der aromatische Geruch sehr vieler Gewächse, auch der Duft vieler Blumen, beruht. Durch Ausnahme von Sauerstoff aus der Luft entstehen aus ätherischen Oelen oft Harze; dagegen wird die Mehrzahl der im Innern von Pflanzen (in der Rinde, im Holze vieler Bäume) vorkommenden Harze durch Verwandlung der Zellmembranen in Harz gebildet. Auf dieselbe Weise entstehen auch die weniger verbreiteten Gummiarten, während die balsame Auflösungen von Harz in ätherischem Del zu sein scheinen. Alle diese Stoffe, ferner die Farbstoffe (z. B. Indigo), die Alkaloide, stickstoffhaltige, zum Theil äußerst giftige Substanzen, u. a. sind als bloße Ausscheidungs- und Zersetzungsproducte zu betrachten und für das Leben der Pflanze wol gleichgültig. Schließlich mögen hier noch einige Stoffe Erwähnung finden, welche nicht als Zelleninhaltsstoffe auftreten, sondern theils in die Zellwand eingelagert, theils an der Außenfläche von Pflanzentheilen ausgeschieden und dieser eingelagert erscheinen. Es sind der Holzstoff (Lignin), Korkstoff (Suberin), das Wachs, der kohlen-saure Kalk und die Kiesel-erde. Die beiden zuerst genannten Stoffe sind Umwandlungsproducte der Cellulose; aus ihnen besteht in der Hauptsache die Wand der Zellen des Holzes und Korks. Das Wachs ist ein Ausscheidungsproduct; es bildet als äußerst feines Pulver die bläulich-weißen, abwiszbaren Ueberzüge (den „Reiß“) der Pflaumen und anderer Früchte und tritt auch als kleienartiger weißer Ueberzug (z. B. an den Früchten von *Myrica cerifera*) oder gar als dicke Schicht (an dem Stamme der Wachspalme) auf. Kohlen-saurer Kalk scheint in geringer Menge fein zertheilt in allen Zellwänden vorzukommen, während die Kiesel-erde bei vielen Pflanzen theils die Oberhautzellen überzieht, theils der Wandung dieser, seltener anderer Zellen in Form kleiner Schuppen eingelagert erscheint. Durch „vertiefelte“ Oberhautzellen sind namentlich die Schachtelhalme und die Gräser ausgezeichnet.

Nicht alle protoplasmahaltigen Zellen erzeugen die im Vorstehenden genannten Stoffe, viele derselben dienen auch bloß der Zellenvermehrung, d. h. erzeugen in ihrem innern Raume neue Zellen, welche man als „Tochterzellen“ im Gegensatz zu der sie erzeugenden Zelle, der „Mutterzelle“, bezeichnet. Die

Bildung von Tochterzellen geschieht durch Theilung des Inhalts der Mutterzelle. Die Theilung entsteht, bilden sich dann als neue Zellen gebildet werden, welche schon vorhandene Zellkerne vererben und neue Zellkerne entstehen. Dieser Vorgang ist in den Fig. 35—38 erläutert. Fig. 35 zeigt die Bildung der Sporen (Zertheilung) in einem Schachtelhalme, Fig. 37 und 38 die der Pollenzellen (Pollenkörner) bei der Bildung eines Liliengewächses. Viel seltener ist die Zellenbildung“ beobachtet. Bei der Bildung einer Mutterzelle eine Anzahl von Tochterzellen, in ein Theil des Protoplasma der Mutterzelle, worauf sich jedes solche Protoplasma einer Cellulosemembran umgibt (Fig. 39) bildet sich ein Becherpilz, *Peiza*, während im ersten Falle der gesamte Inhalt der Mutterzelle in die Tochterzellen übergeht, in dem zweiten Falle in die Tochterzellen über, bleibt aber unverändert und geht bloß ein Theil des Inhalts in die Tochterzellen über. Auf der Bildung durch Theilung beruht auch die Entstehung des Gewebes, ein Vorgang, der aus dem Vorstehenden ersichtlich ist. Bei der Bildung des Gewebes theilt sich die Mutterzelle nach vorausgehender Bildung von zwei Zellkernen zwischen diesen in zwei Theile, welche wieder zu neuen Mutterzellen die sich in derselben Weise in zwei Theile theilt, durch solche wiederholte Zweitheilung in die einzigen Zelle (Urmutterzelle) ein ganzes Gewebe oder Tausenden von Zellen bestehendes Gewebe gehen. Bei der Bildung der Gewebe zwischen zwei benachbarten Zellen besteht die Zellwand beider Zellen gemeinschaftlich. Erst später bildet sich durch „Zertheilung“ Schichten in der je zwei Zellenräume trennende eine Mittelschicht (Mittellamelle) aus, welche „scheint“ jede Zelle von einer eigenen Zellwand und von der Nachbarzelle durch eine Zellwand (Fig. 42 m), welche man lange Zeit als Zellwand zwischen Zellen gebildet hat. Häufig aber die wachsenden Gewebeschichten mehr abgerundet, indem sie sich abrunden, so zwischen ihnen kleine Hohlräume (Fig. 44) Interzellulargänge. Dergleichen kommen auch in sehr geschlossenen, aus dicht zusammengeordneten Zellen bestehenden Geweben vor, wie in sehr eng sind (Fig. 15 i, 43 i). Sehr häufig sind Interzellulargänge im Meristem, stern- und schwammförmigen, vorhanden. Häufig finden sich auch größere, von ungeschlossenen Hohlräumen im Zellgewebe, Behälter ätherischer Oele, Harz (Fig. 19 u. 20) Gummi, Balsam u. s. w. oder von Luft in Interzellulargänge und Räume eines Gewebes in Communication.

Das Zellgewebe tritt je nach der Art der Zellen unter sehr verschiedenen Formen und zu sehr verschiedenen Zwecken. Bei allen Geweben lassen sich drei Hauptarten von Zellgeweben unterscheiden: Hautgewebe, Cambiumgewebe, jedes Pflanzenglied, z. B. ein Blatt, im ersten Entwickelung aus einem sehr dünnen, wandigen, von Protoplasma strömenden Zellgewebe (Urgewebe (Urpflanze) zusammengesetzt: Urgewebe (Urpflanze) aus dem Zellgewebe (Urpflanze). Die Zellen des Pflanzentheils gelegenen Zellen sind aber bald in Hautgewebe, während

b Streckung von Zellen der Längsachse des Pflanzens parallel Reiben und Stränge dünnwandiger zu bilden, Cambiumstränge. Der noch übrige Theil des Gewebes verwandelt sich später in Grundgewebe. c Hautgewebe gehören die Oberhaut und der l. Ersterer besteht aus eng zusammenschließenden, platten Zellen, und ist an allen grünen und mit Luft in Berührung befindlichen Pflanzentheilen, wess an den Blättern mit Spaltöffnungen versehen, d. h. spaltenförmigen Interzellulargängen, je nach außen durch gewöhnlich zwei contractile rnförmige, stets chlorophyllhaltige Zellen begrenzt und durch deren Ausdehnung oder Zusammen geschlossen oder geöffnet werden können (Fig. 45). r jeder Spaltöffnung liegt ein kleiner Interzellular- i, die Athmungshöhle (Fig. 46 a), in welche zwischen den sie umgebenden Zellen befindlichen cellulargänge ausmünden. Die Spaltöffnungen die nach außen mündenden Oeffnungen des ge- nten „Interzellularsystems“ und bestimmt, die Gase Luft (Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenstoff) in die nge einzulassen, sowie in der Pflanze durch deren ntilationsproceß frei gewordene Gase in die Luft uscheiden, Vorgänge, welche man als Athmungs- ceß (Respiration) der Pflanzen bezeichnet hat. Zellen der Oberhaut sind an allen grünen Pflanzen- en noch mit einem zarten, continuirlichen Häutchen ogen, der Cuticula (Fig. 46 c). Auf der aut kommen zahlreiche Anhangsgebilde vor, welche s bloße Verlängerungen einzelner Oberhautzellen, z. B. die einfachen Haare (Taf. 2, Fig. 1), s Längsreihen, wie die gegliederten Haare (Fig. 2 3), theils ästige Zellen, wie die Gabelhaare 2 5), theils aus vielen Zellen zusammengesetzte iter, wie die Sternhaare (Fig. 6 und 8), ästige re (Fig. 7), die Sternschuppen (Fig. 9) und ren (Fig. 10). Gegliederte Haare mit einem kleinen Zellen zusammengesetzten Köpfchen an ihrer pe (Fig. 3) werden geknospte Haare, und wenn s Köpfchen als eine ätherische Oel ober einen igen Stoff auscheidende Drüse auftritt, Drüsen- enannt. Steife, aus didmanbigen, oft verholzten n bestehende Haare heißen Borsten; eine Modi- ion derselben sind die Brennhaare der Nesseln . 4), wo die einzellige den brennendcharften Saft itende Borste einem Zellentkörperchen aufliegt, wel- jene Flüssigkeit ausscheidet und folglich als Drüse itt. Zu den Anhangsgebilden der Oberhaut ge- n auch die Stacheln (z. B. diejenigen der Rosen), nde, aus vielen verholzten Zellen zusammengesetzte lde, welche sich mit glatter Grundfläche ablösen r, nicht aber die Dornen, worunter man in der mschaft verläummerte, in eine stehende Spitze aus- nde Aeste oder Zweige von Holzpflanzen versteht. en bestehen deshalb wie jeder Baumzweig aus e, Holz und Mark. Haarförmige Anhangsgebilde ren auch an den jüngsten Wurzeln vor. Diese selhaare sind stets Ausdehnungen einzelner Ober- zellen (Fig. 15 w h und Fig. 16) und bestimmt, im Boden befindliche Nahrungsfähigkeit aufzu- en. — Bei allen Holzgewächsen wird die Ober- der Zweige später (oft schon im ersten Jahre) i Entwicklung von Rork zerstört, indem in den hautgellen Tochterzellen entstehen, welche ein an Stelle der durch sie zersprengten Oberhautzellen ndes Gewebe bilden. Das ausgebildete Rorkgewebe ht aus fest zusammenschließenden, elastisch-dün- ndigen, meist tafelförmig abgeplatteten, bräunlichen, rüstlichen Zellen (Fig. 11, 12, Rork der Birke im ical- und Horizontalschnitt), und hat jedenfalls

die Bestimmung, die Verdunstung des in dem Pflanzen- theil befindlichen Wassers zu verhindern, da Rork bekanntlich das Wasser nicht oder nur sehr langsam durchdringen läßt. Nicht immer entwickelt sich der Rork bloß in den Oberhautzellen; oft sind auch die innern Schichten der Rinde der Sitz der Rorkbildung. Dann entsteht eine sogenannte Rorkle, d. h. eine auf- reißende Rinde, indem die vor den Rorkgewebepartien gelegenen Theile des Rindengewebes dann vertrocknen und aufreißen. Fig. 24 zeigt diese innere Rork- bildung auf dem Querschnitt eines jungen Zweigs der schwarzen Johannisbeere (e ist die noch intacte Oberhaut, a r die äußere, i r die innere Schicht des Rindengewebes, k ausgebildetes Rorkgewebe, j k eine Schicht junger, in der Entwidlung begriffener Rork- zellen). Endlich bildet sich Rorkgewebe auch infolge oberflächlicher Rinderverletzungen, wo es die Wund- flächen bedeckt (deren Vernarbung bewirkt).

Aus dem Cambiumgewebe gehen die Gefäße, Holz- und Bastzellen hervor. Unter Gefäßen versteht man lange enge oder weite Röhren, welche aus Reiben von Cambiumzellen infolge der Resorption (Auflösung) der die Zellen trennenden Scheidewände entstehen. Je nach der Ausbildungsweise der Ver- dickungsmasse der Zellwände unterscheidet man Ring- und Spiralgefäße (Taf. 1, Fig. 23), Treppengefäße (Fig. 26, 27) und getüpfelte Gefäße (Fig. 24, 25). In den Ring- und Spiralgefäßen sind die Querwände immer völlig verschwunden, in den Treppen- und Tüpfelgefäßen dagegen noch vorhanden, aber von Spalten oder Löchern durchbrochen und stets schief ge- stellt (Fig. 25, 27). Aus kurzen Zellen zusammengesetzte Tüpfelgefäße, welche an den Stellen der Querwände Einschnürungen zeigen, heißen trum- oder rosenkranz- förmige Gefäße (Fig. 24 b). Die Gefäße, welche an ihren Enden gewöhnlich geschlossen, seltener (nur Tüpfel- und Treppengefäße) durch Spalten und Löcher mit einem anstoßenden Gefäß in Communication stehen, kommen in der Regel zu mehreren aneinanderliegend und mit Holz- und Bastzellen zu Bündeln oder Strängen vereinigt vor: Gefäßbündel (Fibro-Bastalstränge, Leitbündel). Taf. 2, Fig. 14 zeigt ein Gefäßbündel im Quer- und Längsschnitt (a, Gefäße, b, Bastzellen, c, Holzzellen). Die Gefäßbündel verzweigen sich häufig, besonders in den Blättern, wo ihre feinsten Zweige oft ein feinmaschiges, bei durchfallendem Licht aus feinen hellen Linien zusammengesetztes Netzwerk bilden, während die stärkern Zweige als Blattnerven oder Blatttrippen aus der untern Fläche des Blattes hervor- treten. Alle Gefäßbündel einer Pflanze stehen mit- einander in Verbindung; sie bilden ein die ganze Pflanze durchziehendes, bis in die feinsten Wurzels- fäsern und bis in die Blätter, Blüthenheile und Früchte dringendes System, welches vorzüglich der Verbreitung der Säfte in der Pflanze dient. Die Holzzellen sind einfache Zellen, deren Wand nach mäßiger Ver- dickung durch Umwandlung der Cellulose in Lignin erfolgt, worauf diese Zellen nur noch Luft (Gas) ent- halten. Ihre Form ist am häufigsten proscampmatif (Taf. 2, Fig. 14 c), seltener parenchymatif (Taf. 1, Fig. 16). Sie sind gewöhnlich getüpfelt, bei den Nadelhölzern stets mit groben bedisten Tüpfeln ver- sehen (Taf. 1, Fig. 18). Die Bastzellen, eben- falls einfache, meist langgestreckte Zellen, sind theils didwandig, aber dabei biegsam (Bastfasern, Taf. 1, Fig. 9), theils dünnwandig, mit weitem Lumen (Cam- bisformzellen), der Form nach gewöhnlich pleurechym- matif, bisweilen unregelmäßig verzweigt (Taf. 1, Fig. 11, 12), bald mit Tüpfellinien versehen (Taf. 1, Fig. 10), bald ohne solche. Sie führen lange Zeit

Saft und enthalten oft Krystalle und Alkaloide. Zu dem Bastgewebe sind auch die oben geschilberten Siebröhren und Gitterzellen zu rechnen, von denen die erstern aus Zellenreihen hervorgehen. — Die Gefäßbündel werden bei vielen Pflanzen von Milchsaftgefäßen begleitet, d. h. langen dünnwandigen, oft vielfach sich verzweigenden Röhren, welche mit einem gefärbten, am häufigsten milchweißen Saft erfüllt sind (so bei allen „milchenden“ Pflanzen, z. B. dem Salat, den Wolfsmilcharten), der sich in ihnen in strömender Bewegung befindet. Bisweilen bilden diese Gefäße, welche durch Verschmelzung vieler Zellen entstehen sollen, förmliche Adern (Zaf. 1, Fig. 28, aus dem Stengelknoten der Aderfaulstiel). Der Milchsaft enthält stets Kautschuk, oft Alkaloide, Harze, Gerbstoffe (z. B. der rothgelbe des Schöllkrauts), Stärkekörnchen u. s. w.; seine Bestimmung ist unbekannt.

Das Grundgewebe besteht gewöhnlich aus parenchymatischen oder merenchymatischen, seltener prosenchymatischen Zellen, welche bald dünn-, bald dickwandig, gestülpt oder ungestülpt sind und gewöhnlich Interzellulargänge zwischen sich haben. Es erfüllt in den Blättern den Zwischenraum zwischen der Oberhaut und den Gefäßbündeln, bildet in den Stämmen und Ästen das Mark und das unter der Haut gelegene Gewebe der Rinde, ferner den größten Theil des Gewebes der Knollen, Fruchtschalen und der Samen. Seine Zellen dienen vorzugsweise dem Assimilationsproceß, viele auch als Behälter für Reservestoffe. Grundgewebezellen der letztern Kategorie haben oft knorpelige, quellbare Wände (Collenchymzellen, z. B. Zaf. 1, Fig. 15, aus den Samenlappen der Lupine). In gewissen Pflanzentheilen verholzt das Grundgewebe sehr bald und dient dann nur durch die Härte und Festigkeit seiner dann immer sehr stark verdickten Zellwände. Aus solchem verholzten Grundgewebe (Sklerenchym) bestehen z. B. die Nußschalen und die Steinerne der Kirichen, Pflaumen, Aprikosen, Pfirsichen und Mandeln.

## II. Bau und Gestalt des Pflanzenkörpers und seiner Glieder.

Nur bei den unvollkommensten Gewächsen ist der Pflanzenkörper eine ungegliederte Masse (z. B. bei vielen Pilzen, Flechten und Algen), bei den meisten zerfällt derselbe in verschieden geformte und verschiednen organisirte Theile, welche seine Glieder bilden. Als solche sind zu bezeichnen: die Wurzeln, der Stamm mit seinen Ästen, die Blätter, die Blüten, Früchte, Samen. Den Stamm nennt man auch die „Achse“ der Pflanze, weil an ihm die Blätter u. s. w. angeheftet erscheinen, und spricht demgemäß von Achsen- und peripherischen oder Blattgebilden. Die Blüten und insofern sie aus diesen hervorgehen, auch die Früchte sind zusammengelegte Glieder, indem sie aus Achsen- und Blattgebilden bestehen, desgleichen die Knospen aller Samenpflanzen.

Die Wurzeln sind gewöhnlich von Erde bedeckt und besitzen im allgemeinen eine dem Mittelpunkt der Erde zustrebende Wachstumsrichtung. Ihre Enden sind von einer mehrschichtigen Parenchymhülle umgeben, der Wurzelhaube (früher als Wurzelschirmmähnen bezeichnet), welche zum Schutz der garten Spitze, wo die Bildung neuer Zellen stattfindet, bestimmt ist (Zaf. 2, Fig. 15 b, w). Oberhalb dieser Hülle erscheint der jüngste Theil der Wurzel mit den schon erwähnten, oft einen dichten Filz bildenden Wurzelhaaren besetzt (Fig. 15 a, b, w h). Im Längs- und Querschnitt erscheint die Wurzel, wenigstens zweifachenlappiger Pflanzen, aus einer Rinde, welche in eine äußere (Fig. 15 b,

a r) und eine innere (i r) zerfällt, aus dem cylindrischen Gefäßbündelkörper (g) und dem Mark zusammengelegt; letzteres pflegt bei allen Wurzeln sehr eng zu sein. Die Wurzeln vermögen keine Blätter zu treiben, sondern bloß Nebenwurzeln, durch deren Bildung sie sich verzweigen. Wohl aber werden die verholzten Wurzeln der Laubbäume besätigt, Knospen zu entwickeln, aus denen unter Umständen oberirdische Sprossen (Wurzelsprossen, Wurzelaußschläge, Wurzelbrut) hervorgehen können. Die durch unmittelbare Verlängerung des Wurzelschens des Keims (f. Samen) entstandene Wurzel, welche als eine nach unten gerichtete Fortsetzung des Stammes erscheint, wird Haupt-, und sie stark entwickelt, Pfahlwurzel genannt. Wurzeln, welche aus dem Stamme entspringen, heißen Adventivwurzeln. Zu ihnen gehören alle Luftpflanzen, welche aus Stämmen und Ästen hervorstechen, so in die Luft hinaustragen und oft eigentümlich organisch sind (z. B. bei den Orchideen und Aroiden der Tropen) die Kletterwurzeln des Epheu, die Stützorgane gewisser tropischer Blumen (vgl. Zaf. 19, Fig. 9) aus Adventivwurzeln ist auch die Faserwurzel der Getreidepflanzen und vieler andern Gräser, sowie die Zwiebel- und Knollengewächse (Zaf. 3, Fig. 10, 11, 16) zusammengelegt. Die Wurzeln sind entweder ein-, zwei- oder vieljähriger Dauer.

Der Stamm oder die Achse unterscheidet sich von der Wurzel durch die entgegengesetzte Wachstumsrichtung und durch das Vermögen, unterhalb seiner freien Spitze (Scheitel) Blätter hervorzutreiben, aus welcher die Spitze in eine Knospe (End- oder Terminalknospe) umgewandelt wird oder werden kann. In jeder Blattachse (Blattwinkel) vermögen sich ebenfalls Knospen (Achselknospen) zu entwickeln. Da jede Knospe sich zu einer neuen Achse auszubilden vermag (f. unten), so besitzt eine mit Endknospen und Achselknospen versehene Achse das Vermögen, sich nicht allein zu verlängern, sondern (durch Streckung der Achselknospen) Nebenachsen, d. h. Äste zu entwickeln und sich so ein „Achsensystem“ umzugestalten. Eine über den Stamm sich erhebende Achse wird, wenn sie von mehrjähriger Dauer ist, Stamm, wenn von einjähriger Dauer Stengel genannt, eine unter dem Boden bleibende Rhizom (auch Wurzelstod). Die Rhizome sind oft den Wurzeln ähnlich (Zaf. 3, Fig. 6—9), unterscheiden sich aber von jenen durch die angegebenen Merkmale der Achse, und werden je nach ihrer äußern, sehr verschiedenen Form geringelt (Fig. 6), beschuppt (Fig. 7), gegliedert (Fig. 8), mit Scheibenblättern besetzt (Fig. 9) u. s. w. genannt. Sie sind stets von mehrjähriger Dauer und besitzen nur Adventivwurzeln. Zu den unterirdischen Achsen gehören auch die Knollen (Fig. 12, 13, 14, 15), kugelige oder längliche fleischige Gebilde, welche Adventivwurzeln treiben und entweder eine einzige Knospe (Endknospe) oder (z. B. die Kartoffelknollen) mehrere in die Oberfläche eingesenkte Knospen (Augen) besitzen. Die Zwiebeln dagegen (Fig. 10, 11) hat richtiger als eine Modifikation der Knospen zu betrachten (f. unten). Der Stamm oder Stengel hat meist die Form eines Cylinders oder eines sehr in die Länge gezogenen Kegels und ist meist rund, doch häufig auch kantig (drei-, vier- und mehrkantig); seine Form lehnen bei den Nebenachsen oder Ästen wieder. Als Achsen sind aus Gliedern (Internodien) zusammenge setzt, welche durch „Knoten“ (nodi) getrennt sind. Man nennt man diejenigen Stellen, wo ein Blatt oder ein Blattquirl (Wirtel) an der Achse sitzt, mag nun diese Stelle wirklich knotig verdickt sein (z. B. bei dem Stängeln, Kletterstengel) oder nicht. Aus sehr deutlichen Internodien ist z. B. die sogenannte Quadenwurzel



Abgesehen des Sandhafers (Zaf. 3, Fig. 9) und einige des Sandenkrants (Fig. 8) zusammengefasst. langgestreckten Internodien bestehende Achsen nennt solche mit „entwickelten“, aus kurzen scheibenförmigen Internodien zusammengefasste solche mit „unentwickelten“ Internodien. Die Gliederung der Achse scheidet diese ebenfalls scharf von den Wurzeln. Der Bau der Achse ist in den großen natürlichen Familien des Pflanzenreichs sehr verschieden. Hier nur der Bau der Achse bei den Samenpflanzen (merogamen Linne's) erörtert werden. Dieser ist nützlich verschieden in den Abtheilungen der einsamigen (monotylen), zweisamenlappigen (ditotylen) nachstammigen (gymnospermen) Gewächsen. Zu den monotylen Gewächsen gehören unter andern die Erbsen, Mohrkraut, Liliengewächse, Palmen u. a. ein querdurchschnittener Lilien- oder Maistengel zeigt der Schnittfläche unter der Oberhaut eine mehr weniger breite, aus Grundgewebe bestehende Rinde, auf ein markiges, auch aus parenchymatischen Zellen dieses Gewebe folgt, in welchem zahlreiche Gefäßstrahlen gestreut angeordnet liegen (Zaf. 2, Fig. 30). sehr ähnliche Ansicht gewährt ein querdurchschnittener Buchstabe oder Palmstamm, nur dass hier das engewebe weniger deutlich entwickelt ist und die Rinde nach außen hin viel dichter zusammenhängt (Fig. 31). Im Längsschnitt betrachtet man die bindfadenförmigen Gefäßbündel bei allen entwickelten Internodien zusammengefassten Achsen eilinig, parallel nebeneinander verlaufen und sich in den Knoten verzweigen und hier oft dicke Gesteile bilden; dagegen bei allen aus unentwickelten Internodien bestehenden (z. B. den meisten Palmen, den Schwertlilienrhizomen, Fig. 33) in nach eingekrümmten Bogenlinien aufsteigen und sich unter der Rinde vielfach verzweigen. Daher liegen hier der Rinde die Gefäßbündel dicht aneinander an, oft ineinander geauetlicht. Das Holz der einen und anderer monotyler Bäume besteht aus eilinfadenförmigen verhehlten Gefäßbündeln (deshalb choly genannt). Dasselbe ist natürlich unter der e am dichtesten und härtesten, im Centrum des Stammes dagegen am lockersten und weichsten. Die ditotylen Gefäßbündel sind geschlossen d. h. von andigen Bastfasern umgeben, welche sehr bald verrotten und dann eine Verdickung des Bündels nicht gestatten. Innerhalb dieser Bastzellenscheide n die eigentlichen Gefäße, die Holzzellen und den röhren ähnliche Bastgewebzellen (Fig. 32, die m weiten Zellen sind Gefäße). Die Achse der ditotylen zeigt auf dem Querschnitte immer Kreis von Gefäßbündeln (Fig. 18, 19, 21, 27), den das Grundgewebe in das Mark (Fig. 18 a) der Rinde (b) abgetheilt wird, welche beide durch wischen den Gefäßbündeln befindlichen Markstrahlen inden werden. Durch sämmtliche Gefäßbündel ch erstreckt sich der Cambium- oder Verdickungs- (d), richtiger Verdickungscylinder, da diese aus ungsgewebe bestehende Zone die Achse der Länge durchzieht und bis in die Wurzelspitze hinabreicht, o bis in die Endknospe und überhaupt in jeder de, indem sich der Gefäßbündelkörper der Achse der Wurzel und der ihn durchziehende Cambium- der in ebenso viele Tochterstränge theilt als Neben- in und Nebenachsen (zunächst Knospen) gebildet n. Jedes Achsengefäßbündel der Ditotylenonien sich deshalb ununterbrochen oder auch periodisch den, indem der innerhalb des Gefäßbündels be- de Theil des Cambiumcylinders nach innen zu Gefäß- und Holzzellen, nach außen hin neue

Bastgewebzellen bildet. Durch den Cambiumcylinder wird folglich die Achse verdickt und zwar so lange als die Pflanze lebt, z. B. bei den Bäumen jahrhundert, ja jahrtausendlang. In allen Zonen, wo ein Unterschied zwischen warmer und kalter Jahreszeit stattfindet, ist der Cambiumcylinder der Stämme nur während ersterer thätig; der Stamm, d. h. der Gefäßbündelkörper, wird hier folglich periodisch verdickt und dies bewirkt, daß der Holzkörper aller unserer Bäume (auch die Nadelbölzer stimmen in dieser Beziehung mit den ditotylen Holzgewächsen überein) auf dem Querschnitt aus concentrischen Zonen zusammengefasst erscheint, welche bekanntlich Jahrringe genannt werden, weil in der Regel in jedem Jahre (Sommer) sich ein solcher bildet (Fig. 27). Natürlich sind auch diese Holzzyklen Epilinder und keine Ringe. Durch den Cambiumcylinder wird jedes Achsengefäßbündel in einen größeren innern Theil, den Holztheil, und einen kleineren äußern, den Basttheil, abgetrennt. Ersterer besteht nur aus Gefäßen und Holzzellen, letzterer aus Bastgewebe (Fig. 12; das Bastgewebe aus den dicke wandigen Zellen gebildet). Mit zunehmendem Alter entstehen innerhalb der Gefäßbündel Spalten, welche sich mit Grundgewebe anfüllen; kleine oder secundäre Markstrahlen (Fig. 19, b). Dieselben reichen aus dem Holztheile bis in den Basttheil (Holz- und Bast- oder Rinden- Markstrahlen, Fig. 27). Die Holztheile sämmtlicher Gefäßbündel bilden im Verein mit den großen und kleinen Markstrahlen den Holzkörper, dessen innerste das Mark umgebende Schicht die Kernscheide genannt wird (Fig. 19, a). Das Holz ist bei den einzelnen Holzarten sehr verschieden zusammengefasst, enthält aber stets Gefäße und zeigt daher auf dem Querschnitt unter dem Mikroskop große (Gefäße) und kleine (Holzzellen) Zellräume vor (Zaf. 3, Fig. 2, 3, 4). Das Bastgewebe enthält immer Cambium, häufig Siroböhren und Bastfasern. Letztere sind bündelförmig vereinigt und bilden bei manchen ditotylen Bäumen, z. B. bei den Linden, geschichtete Massen, welche auf dem Querschnitt der Achse keilförmig in das Gewebe der Rinde hineinragen (Zaf. 2, Fig. 25, b). Auf dem Längsschnitte erscheinen diese Schichten aus netzförmig verzweigten Bastfaserbündeln zusammengefasst (Fig. 26). Der Längsverlauf der Gefäßbündel in ditotylen Achsen ist entweder geradlinig (in allen aus entwickelten Internodien bestehenden Stengeln), oder hin und her gebogen (in allen Holzstämmen). Die dann zwischen den Gefäßbündeln vorhandenen Spalten werden von den Markstrahlen ausgefüllt, welche sich rechtwinklig mit den senkrechten Elementen des Holz- und Bastgewebes kreuzen (Fig. 28; a Oberhaut, b c Zellenscheiden des Rindengewebes, d Bastgewebe, e Cambiumcylinder, f Holzkörper, g Mark- oder Kernscheide, h Mark m Markstrahl, i Gefäße). Die Markstrahlen bestehen aus mauerförmigen, aus meist didiamandigen und getupfelten Zellen zusammengefügtem Gewebe (Fig. 29). In ditotylen Stengeln verzweigen sich die Gefäßbündel, welche hier oft nur eine schmale von sehr breiten Markstrahlen durchbrochene Zone bilden, die ein weites Mark einschließt (Fig. 21), oft innerhalb der Knoten, sodas complicirte Geflechte entstehen, besonders um den Ursprung der Aeste (z. B. im Stengel der gemeinen Saubistel, Fig. 23). Die Gefäßbündel der Stengel enthalten meist nur Ring-, Spiral- und Netzfäße (Fig. 13; a b Zellenformen, c Gefäßformen), während im Holze der Stämme vorzüglich getupfelte Gefäße vorkommen. Die Rinde der ditotylen Achsen pflegt aus mehreren Schichten von Grundgewebe, von denen die innere, an die Bastseide des Gefäßbündelkörpers grenzende gewöhnlich Chlorophyll enthält, (deshalb

Grünschicht genannt, wenigstens bei den Bäumen) zu bestehen, während das Mark meist aus einer Form von Grundgewebzellen zusammengesetzt ist. Bei den Holzgewächsen sind die Basttheile der Gefäßbündel mit dem Gewebe der Rinde innerlich verwachsen und bilden deshalb scheinbar die innerste Schicht der Rinde (deren Bastschicht), mit der sie sich auch im Frühling, wo der Cambiumcylinder von Saft strotzt, von dem Holzkörper abschälen lassen. — Als Beispiel für den Bau der Gymnospermen möge der Stamm der Nadelhölzer dienen. Sein Bau stimmt mit dem des Laubholzstammes bezüglich der allgemeinen Zusammenfassung und der Bildung der Jahrringe des Holzkörpers überein, unterscheidet sich aber wesentlich dadurch, daß 1. das Holz mit Ausnahme der Kernscheide, welche Spiralgefäße enthält, nur aus sprossendynamischen, mit großen behöfteten Tüpfeln versehenen Holzzellen und aus Markstrahlen besteht (Taf. 1, Fig. 18; in Markstrahl, Taf. 3, Fig. 5); 2. daß die Holzbündel geradlinig verlaufen; 3. daß nur kleine Markstrahlen vorkommen, welche zwischen den senkrechten Holzzellen hindurchgehen. In den Markstrahlen kommen häufig Harzgänge vor. (Taf. 1, Fig. 19). Auf dem Querschnitte des Stammes erscheint das Holzgewebe viel regelmäßiger, weil es nur aus einer Zellenform besteht (Taf. 3, Fig. 1, in der Mitte ein Markstrahl). Die Jahrringe pflegen bei dem Nadelholz scharf markirt zu sein als bei dem Laubholz, was darauf beruht, daß die gegen Ende des Sommers gebildeten Holzzellen in radialer Richtung zusammengeedrückt und viel dickwandiger sind als die vorher entstandenen (Taf. 3, Fig. 2). Uebrigens sind auch bei den Laubhölzern die zuletzt gebildeten Holzzellen jedes Jahrrings radial zusammengeedrückt (Fig. 2, 3, 4, Grenze der Jahrringe).

Die Nebenzachsen (Aeste) stimmen bezüglich ihres Baues in allen Abtheilungen der Samenpflanzen mit der Hauptachse im allgemeinen überein. Sie gehen aus Knospen durch einfache Streckung von deren Achse hervor. Alle Knospen enthalten nämlich eine unentwickelte Achse, an welcher die unterhalb ihres nackten Scheitels hervorgesprißten Blattgebilde sitzen (Taf. 3, Fig. 17, 20, 21). Man unterscheidet Laub- oder Zweigknospen (solche, deren Blattgebilde sich zu gewöhnlichen Blättern entfalten, aus denen folglich durch die Streckung der Achse ein beblätterter Sproß entsteht: Fig. 18, 20, 21, 31), gemischte Knospen (solche, welche außer Blättern auch Blüthenknospen an ihrer Achse tragen: Fig. 17) und Blüthenknospen (solche, welche entweder aus einer einzigen unentwickelten Blüthe bestehen oder viele Blüten enthalten.) Die Blattknospen der Bäume, wenigstens derjenigen, welche im Herbst die alten Blätter abwerfen, sind gewöhnlich mit einer schützenden Dede von derben Schnuppen umhüllt (Fig. 26, 28, 29, 32, 26), seltener nackt (Fig. 30); auf dem Querschnitt betrachtet erscheinen die an ihrer Achse sitzenden, unentwickelten Blätter stets in einer bestimmten Weise zusammengefaltelt und zueinander gelagert (Fig. 19, 25, 27). Meist sind diese Knospen sitzend (Fig. 18, 26, 32, 36), selten gestielt (Fig. 24). Ihrer Stellung nach sind die Knospen entweder end- oder achselständig oder Adventivknospen, d. h. an beliebigen Stellen der Achse hervorgebrochen. Eine unverkennbare Ähnlichkeit hinsichtlich des Baues haben mit den Knospen die Zwiebeln, nur daß bei ihnen die Achse als eine niedergebrückte halbkugelige Masse (Zwiebelstuck, Fig. 11, a), die Blätter als fleischige, dicke sich concentrisch umschließende Schalen (Fig. 11) oder Schnuppen (Fig. 10) ausgebildet sind und aus der untern Fläche der Achse zahlreiche Adventivwurzeln hervorbrechen, welche zusammen eine Faserwurzel bilden.

Häufig entwickeln sich zwischen den Tochter- oder Brutzwiebeln (Fig. 11, b) Knospe der Zwiebelachse verlängert sich, die Blüten entwickeln sich. Die aus Knospen hervorgehenden Blätter sind sehr verschiedenartig gestaltet. Bei den Holzgewächsen kommen namentlich zwei Arten und Kurz- und Langzweige. Erstere sind in der Regel und haben entferntestehende Seiten (Fig. 32), letztere sind kurz, dick, gedrückt oder knospenartig (Fig. 34) und haben Seiten; sondern bloß eine Endknospe. Sie sind aus mehreren sehr kurzen Jahrestrieben, deren Knospe bezeichnet werden (Fig. 34) bestehen z. B. bei den Eschenzweigen aus drei Jahrestrieben. Der gezeichnete Zweig zeigt die innere Zusammenfassung, ist die Achse, r' die Bastschicht, r und r' die Rinde. An den Zweigen der endständigen Sträucher macht sich unter, selten nach der Knospe, ein bestimmt geformter, oft sehr bemerkbar, die Blattnarbe, d. h. die Stelle, an der das Blatt gesessen hat, in dessen Achse entstanden ist (Fig. 34 und 35, n, Fig. 34, Blattnarbe befindet sich oft auf dem Ende des Zweiges: das Blatt, richtiger Knospe, 34, k, h, 35). Eigenthümliche Formen tragen die Dornen, welche nicht selten aus den Achsen entstehen (Fig. 23), die Ausläufer (z. B. bei den Kletterpflanzen) und Wurzelsprossen (z. B. bei den Wurzelsprossern). Die Blätter entstehen immer unterhalb einer Achse und zwar schon bei deren Entstehung, wo dieselbe noch aus Urparenchym besteht, zeigt eine solche junge blattbildende Längsschnitt vergrößert; die unterhalb der gerundeten Scheitels befindlichen Blatttragungen sind ebenso viele in der Entwicklung, der dunkle Körper im Centrum ist das Blattgewebe, aus welchem später die Blätter werden. Ähnlich geschieht die Bildung (und zwar sowohl gewöhnlicher, als auch der Fruchtblätter) in jeder noch ganz jungen Blüthe. Die ausgebildeten Blätter zerfallen in die gewöhnlichen meist grün gefärbten, der pflanzlichen dienenden Blattgebilde, Nebenblätter und Deck-, Vor- oder Hochblätter der Laubblätter und Blüten (s. Blüthen). Die Laubblätter sind an der Achse angeheftet, entweder gestielt oder bald einzeln (abwechselnd) gestellt, bald quirl(wirtel)ständig. Ihre Form ist sehr verschieden, im allgemeinen entweder einfach oder zusammengesetzt. Ein einfaches Blatt besteht aus einer einzigen mit dem Stiel innig verbundene Blattspreite, Blattfläche, Blattstiel (Fig. 1 und 2 auf Taf. 4, ein einfaches Blatt gegen aus mehreren (mindestens zwei) Blättchen, welche mit einem ihnen gemeinsamen Blattstiel durch Verlebung (Articulation) verbunden sind, z. B. Fig. 7 auf Taf. 4. Eine ganz und ganzrandig sein (Fig. 1), ganzrandig (Fig. 2), gezähnt, gekerbt, gelappt u. s. w., ferner gelappt (Fig. 3, ein gelapptes ganzrandiges Blatt), oder ganzrandig (Fig. 4).



andtheiliges Blatt mit eingeschnittenen Theilstücken), der zerschnitten (Fig. 6, ein fiederförmiges Blatt) u. s. m. Die Hauptformen des zusammengefügten Blattes sind das gefingerte (Fig. 5) und das gefiederte (Fig. 7, ein paarig gefiedertes Blatt mit in eine Widel-  
 infle auslaufendem gemeinschaftlichen Blattstiel, von  
 ner Widel). Fig. 8 ist ein doppeltgefiedertes Blatt;  
 3 gibt auch drei- bis vierfach gefiederte, ebenso doppelt-  
 fächerig- und mehrfach fiederförmige und fiedertheilige  
 Blätter. Ihrer Structur nach sind die Blätter bald  
 lecherförmig, dann (die meisten Blätter), bald massig,  
 dickig, saftig (z. B. die Blätter des Hauslauchs,  
 der Aloe, der Faserflume) und dann oft von mehreren  
 Lücken begrenzt. Die breiten dünnen Blätter zeigen  
 oft einen senkrecht durch die Blattfläche geführten  
 Einschnitt unter dem Mitrost ein sehr überein-  
 stimmenden Bau, namentlich bei den dicotylen Gewächsen.  
 Sie bestehen nämlich aus einer oberen und unteren (der  
 obern und untern Fläche des horizontal gerichteten  
 Blattes entsprechenden) Oberhaut und zwei Schichten  
 in Chlorophyllhaltigem Grundgewebe, deren obere aus  
 streckten sehr zusammenziehenden, die untere dagegen  
 aus meristematischen, sehr locker verbundenen und weite  
 intercellulargänge und Räume zwischen sich lassenden  
 Zellen gebildet ist (Taf. 2, Fig. 34: o e, obere, u e  
 untere Epidermis oder Oberhaut, o p obere, u p untere  
 Parenchymschicht, s p Spaltöffnung). In der untern  
 dem Gewebsschicht verlaufen stets die Gefäßbündel,  
 welche aus der Achse durch den Stiel in die Blattfläche  
 treten und sich hier in bestimmter aber höchst ver-  
 schiedener Weise verzweigen, z. B. fiederförmig (Taf.  
 2, Fig. 1, 2, 5, 6, fiedernervige Blattflächen, oder  
 handförmig (Fig. 4, handnervige Blattfläche). Die  
 Blüthezeit (das Leben) der Laubblätter dauert ent-  
 weder eine Vegetationsperiode (d. h. einen Sommer)  
 oder mehrere Jahre, in welchem Falle die Blätter eine  
 beträchtliche Consistenz zu bekommen pflegen. Pflanzen  
 mit solchen mehrere Jahre lebensfähig bleibenden  
 Blättern heißen, weil sie im Sommer und Winter  
 Blätter haben, immergrüne (z. B. die Nadelhölzer, die  
 wintergrünen Gewächse, der Epheu, die Myrthe), im Gegen-  
 satz zu den sommergrünen d. h. denjenigen, welche alle  
 Jahre ihre Blätter erneuern und nur vom Frühling  
 bis Herbst beblättert erscheinen. — Neben oder Alter-  
 blätter (stipulae) sind meist kleine Blattgebilde, welche  
 die Bestimmung haben, ein sich entwickelndes Laubblatt  
 zu umhüllen, zu bedecken und folglich zu schützen. Das  
 Laubblatt befindet sich daher immer zwischen zwei solchen  
 Blattgebilden, welche entweder neben dem Blattstiele  
 stehen (Taf. 3, Fig. 38), oder an den Blattstiel ange-  
 schlossen sind (Fig. 37). Bei manchen Blättern erschei-  
 nen Nebenblätter in dornige Gebilde (Stipularbornen)  
 umgewandelt (z. B. bei der Robinie oder sogenannten  
 Lacie). Eine sehr eigenthümliche Nebenblattbildung  
 ist die Gelenkscheide (auch Stiefelschen, ocreae) der  
 Stängelgewächse (Fig. 39). Sie besteht aus zwei  
 Stengel umfassenden und miteinander verwachsenen,  
 über eine den Stengel umhüllende Scheide bildenden  
 Nebenblättern. Ein ganz anderes Gebilde ist das  
 Laubhäutchen (ligula) der Gräser (Fig. 40) und anderer  
 monokotyler Pflanzen, ein zartes verschieden geform-  
 tes meist farbloses Zipfelchen, welches quer über die  
 Laubfläche an deren Basis gespannt erscheint. Seine  
 Bestimmung ist unbekannt. — Die Deckblätter  
 (bracteae) sind zum Schutz der unter ihrer Decke (in  
 der Achsel) sich entwickelnden Blüten oder Blüten-  
 sprossen bestimmt. Sie haben meist ein zarteres Gefüge  
 als die Laubblätter, von denen sie sich außerdem bald  
 durch eine andere Form, bald durch andere oft prächtige  
 Färbung (z. B. rothe, blaue, violette, gelbe, weiße)

unterscheiden. Nicht selten bilden Kreise von vielen  
 kleinen oder unter sich verwachsenen Blättern förmliche  
 Hüllen von stern-, scheiben-, schüsself-, becher-, fuge-  
 förmiger und anderer Gestalt um ganze Blütengruppen  
 oder auch um Früchte.

Die Blüte (bos) ist ein aus Achsen- und Blatt-  
 gebilden zusammengesetzter Apparat, zur Erzeugung  
 keimfähigen Samens, also bestimmt für die Fort-  
 pflanzung des Gewächses zu sorgen. Eine vollständige  
 Blüte besteht aus der Blütenachse (Blütenboden, thalamus,  
 torus) und den an oder auf derselben eingefügten  
 Blütenblättern, welche vier über- oder umeinander stehende  
 Kreise bilden: den Kelch, die Blumentrone, die Staub-  
 gefäße und den oder die Stempel (Taf. 4, Fig. 27,  
 eine Lindenblüte, vergrößert von oben gesehen: im  
 Centrum der einzigen Stempel, sodann ein Kreis zahl-  
 reicher Staubgefäße, hierauf 5 Blumentronenblätter und  
 5 kürzere mit diesen abwechselnde Kelchblätter). Un-  
 vollständig ist die Blüte, wenn einer oder mehrere  
 dieser Blattkreise fehlen (z. B. bei Fig. 31, Blüte von  
 Aristolochia Clematitis, wo bloß eine einfache Blüten-  
 hülle vorhanden ist). Vollkommen heißt die Blüte, wenn sie  
 keimfähigen Samen herorzubringen vermag, d. h. wenn  
 sie Stempel und Staubgefäße enthält, unvollkommen,  
 wenn der Stempel oder die Staubgefäße fehlen. Sind  
 beiderlei Organe vorhanden, so ist die Blüte zugleich  
 eine Zwitterblüte; enthält sie nur Staubgefäße, so  
 wird sie eine männliche, wenn nur Stempel, eine  
 weibliche genannt. Fehlen beiderlei „Geschlechtsorgane“,  
 so ist sie geschlechtslos.

Die Blüten sind bei jeder Pflanze in bestimmter  
 Weise angeordnet, im allgemeinen entweder end- oder  
 achsel- oder seitenständig (an der Seite einer Achse  
 neben einem Blatte oder demselben gegenüberstehend).  
 Bildet der blüthentragende Theil einer Achse eine be-  
 stimmte geformte, von den nicht blüthentragenden Theilen  
 mehr oder weniger abgegrenzte Gruppe, so heißt derselbe  
 ein Blütenstand (inflorescentia). Solche Blütenstände  
 sind z. B. die Aehre, Traube, Dolde, das Köpfchen,  
 Köpfchen, der Zapfen u. s. m. (Fig. 9 bis 26). Die Blüten-  
 stände zerfallen in begrenzte und unbegrenzte. Bei ersterem  
 steht eine Blüte (die älteste) an der Spitze (am Ende)  
 der die Blüten tragenden Achse (der Blütenstands-  
 spindel); um dieselbe herum entwickeln sich entweder  
 unmittelbar Blüten (jüngere) oder Nebenachsen, welche  
 wieder durch eine Blüte „geschlossen“ werden, um  
 welche herum dann Blüten oder Nebenachsen dritter  
 Ordnung entstehen u. s. f. (z. B. Fig. 24, eine „dicho-  
 tomische“ d. h. gabeltheilige „Trugdolde“). Bei den  
 begrenzten Blütenständen muß folglich das Aufblühen  
 der einzelnen Blüten von der Mitte des ganzen Blüten-  
 standes nach dessen Peripherie hin erfolgen: centrifugal.  
 Bei den unbegrenzten Blütenständen stehen die ältesten  
 Blüten an der Basis, die jüngsten gegen das Ende  
 hin der Spindel, welche in der Regel in eine nackte  
 sterile Spitze ausläuft; das Aufblühen der einzelnen  
 Blüten erfolgt hier also von unten nach oben (z. B.  
 bei der Traube, Fig. 11) oder, wenn die Spindel verkürzt  
 und infolge dessen die Blüten auf eine Ebene  
 reducirt sind, wie bei der Dolde (Fig. 23), oder wenn  
 die Blüten wegen verschiedener Länge ihrer Stiele in  
 eine Ebene zu liegen kommen, wie bei der Doldentraube  
 (Fig. 10), von außen nach innen: centripetal. Zu  
 den unbegrenzten Blütenständen gehören: die Aehre  
 (spica), welche sich von der Traube (racemus) bloß  
 durch sitzende Blätter unterscheidet, die Doldentraube  
 (corymbus, Fig. 10), eine Modification der Traube;  
 Das Köpfchen (amentum, Fig. 12, vom Haselnuß-  
 strauch), aus eingeschlehtigen, oft hüllenlosen Blüten be-  
 stehend, welche unter meist schuppenförmigen Brakteen

sitzen; der Kolben (spadix, Fig. 13, von *Arum maculatum*), eine fleischige Spindel, auf welcher eingeschlechtliche meist hüllenlose Blüten untereinander gemengt oder voneinander gesondert eingefügt sind; der Blütenquirle (verticillus) aus sitzenden oder gestielten Blüten (Fig. 9, von *Myriophyllum*, wo mehrere Quirle längs einer Achse übereinander eingefügt sind); die einfache und die zusammengesetzte (Fig. 23) Dolden (umbella; wo gestielte Blüten auf einer solchen verkürzten Spindel beisammenstehen; das Köpfchen (capitulum), von der Dolden nur durch sitzende Blätter verschieden, und das Blütenkörbchen (calathium, Fig. 14—22). Bei diesem Blütenstande sitzen gewöhnlich sehr kleine Blüten dicht zusammengebrängt auf einer verkürzten Spindel, welche flach, scheibenförmig (Fig. 15), kegelförmig, (Fig. 16, 17), walzenförmig (Fig. 22), kugelig, halbkugelig, convex oder concav und von einem oder mehreren Kreisen kleiner, meist schuppenförmiger, oft sehr eigenthümlich geformter und häufig untereinander verwachsener Brakteen umgeben ist, die zusammen die Korbhülle oder der Hüllkelch genannt werden (Fig. 15, 18, 19, 21). Die verkürzte Spindel (der Fruchtboden, receptaculum) ist entweder nackt (Fig. 15, 17) oder zwischen den Blüten mit Haaren, Borsten oder steifen Blättchen (Spreublättchen, Fig. 16, 22, a) besetzt. Die darauf eingefügten Blüten sind entweder Zwitterblüten oder eingeschlechtliche, selten geschlechtslose. Im ersten Falle haben alle Blüten gleichgeformte Blumenkrone, z. B. bandförmige (Fig. 14, 19), oder trichterförmige (Fig. 22), im zweiten pflegen eingeschlechtliche oder geschlechtslose nur in der Peripherie des Fruchtbodens vorzukommen und entweder jungen(band)förmige Blumenkrone (Fig. 18) oder trichterförmige (Fig. 21) zu besitzen, welche zusammengekommen den „Strahl“ des Blütenkörbchens bilden, während die übrigen Blüten dann gewöhnlich Zwitterblüten mit röhriger oder trichterförmiger Blumenkrone sind und dann zusammen die „Scheibe“ genannt werden (Fig. 18, 21). — Zu den begrenzten Blütenständen gehören die Trugdolden (cyma), welche unter sehr verschiedenen Formen auftritt, am häufigsten als gabeltheilige (dichasium, Fig. 24), der Büschel (fasciculus, Fig. 25), der Knäuel (glomerulus), aus kleinen sitzenden, dicht gedrängten Blüten bestehend, die Wickeltraube (cin-ninnus, cyma scorpioides, Fig. 26, vom Bergiß-meinrich) und Wickelähre (wenn die Blüten sitzend sind) u. a. m. Straußförmige oder längliche Gruppirungen von Blütenständen, z. B. von Trugbalden, Trauben, Köpfchen, Körbchen, werden Rispen (panicula) genannt. Noch ist zu erwähnen, daß die Blütenstände entweder end- oder achselständig, und bald mit Deckblättern versehen (Fig. 10, 23, 24), bald ohne solche oder nackt (Fig. 13, 29) sind.

Der Blütenboden wird bald nur von dem Ende des Blütenstiels gebildet (Fig. 38) oder er ist convex, halbkugelig, kegelförmig, walzenförmig. In allen diesen Fällen sind die Kreise der Blütenhüllblätter und Staubgefäße unter dem oder den Stempeln oder „hypogynisch“ eingefügt (Fig. 27, 30, 38). Der Blütenboden kann aber auch als eine flache oder concave Scheibe oder gar als ein trugförmiger oder hohler Körper ausgebildet sein. Dann pflegen die Kelchblätter mit dem Rande des Blütenbodens verwachsen, dagegen die Blumenkronenblätter und Staubgefäße auf dem Rande des Blütenbodens, d. h. an der Grenze zwischen diesem und dem Kelche eingefügt zu sein (Fig. 28, Durchschnitt einer einfachen Rose). Und da der oder die Stempel das Centrum des scheibenförmigen Blütenbodens einnehmen, so werden die Staubgefäße und Blumenblätter um die Stempel, oder bei einem hohlen

Blütenboden, welcher die Stempel wenigstens um die Griffel herumrandet, „perigonisch“ eingefügt sein. Häufig ist der Blütenboden mit dem Fruchtknoten, d. h. den werdenden Theile des Stempels, innig verbunden, so daß der Fruchtknoten unterhalb der Stempel „unterständig“, und sind die Staubgefäße scheinbar auf dem Fruchtknoten „epigynisch“ eingefügt (Fig. 29, *Narcissus*, *Arifolochia*). Der Kelch (calyx) bildet die Blumenkrone (corolla) die innere Hülle der Blüten. Ersterer ist mitunter doppelt: er äußert ein Außenkelch (epicalyx). Letzterer ist manchmal auch aus mehreren Kreisen gebildet. Hat eine Blüte nur eine Blüte, so nennt man dieselbe Perigon (perigon bei *Narcissus* und *Arifolochia*). Alle Blüten entstehen entweder aus getrennten Blättern (z. B. Fig. 27 und dem Spindelbaum, Fig. 14) aus untereinander verwachsenen Blättern (z. B. die Blumenkrone von *Primula*, Fig. 15). Blütenhüllen sind ferner entweder theilweise alle ihre Blätter oder Abtheilungen verwachsen und Größe (Fig. 27, 29, 30, 34, 38), Form (Fig. 31, 33, 35, 36, 37). Die merkwürdigen Formen der unregelmäßigen Blumenkrone, und zwar der verwachsenblättrigen bandförmigen (Fig. 14, 18), die zweifache die maßirte und gespornte (Fig. 35); die trenntblätterigen ist die schmetterlingsförmige eine der auffallendsten. Der Kelch ist gewöhnlich als die Blumenkrone (Fig. 27, 36, 38) grün gefärbt und von krautiger Beschaffenheit, aber größer als die Blumenkrone, oder auch unter Färbung, z. B. beim Stachelbeere gleich unregelmäßig und zwar helmförmig. Bei dieser Pflanze sind die Blumenblätter unter dem obern gewölbten Kelchblatt als gestielte hohle Kapuzen ausgebildet. Solche hohle Blumenblätter, desgleichen schalenförmige Verlängerungen der Blumenblätter, Perigonblätter sondern stets Nektar (Nectar) eine süße Flüssigkeit, die oft auch an der Blüthenheile ausgeschieden wird. In man früher dergleichen hohle Blüthenblätter (nectaria).

Die Staubgefäße (stamina) bestehen aus einem Stiel, dem Staubfaden (sacculus) auf oder an demselben befindlichen (anthera), z. B. Fig. 44. Letzterer ist eine Theil, weil er den befruchtenden Blüthen (anthera) enthält, welcher in seinem Innern der Staubbeutel besteht nämlich aus zwei oder mehreren ein einziges oder mehrere mit Pollen gefüllte Fächer enthalten und sich zu einer Längsspalte, bald mit Löchern oder Spalten den Pollen zu entleeren (zu „vertheilen“). Die Antherenhälften werden durch das Nectivum zusammengehalten, welches eine unmittelbare Verlängerung des Filaments (Fig. 45), selten einen auf dem Staubfaden geballten bildet (Fig. 46). Ist der Staubfaden ganz getrennt und besteht aus einem Magneten (Fig. 44). Fehlt der Staubfaden ganz, so ist die Blüthe sitzend (Fig. 32). Der Pollen besteht aus isolirten Zellen (Pollenkörnern) verschiedener Form; seltener sind die Zellen einander verklebt und bilden bestimmte

maßen (Pollinarien), wie z. B. bei den Orchideen. Die Pollenkörner haben gewöhnlich eine doppelhäutige Wandung und sind mit einem stickstoffreichen granulösen Schleim (fovilla) angefüllt. Die äußere Haut ist dick und starr, die innere dünn und sehr dehnbar. In der äußeren sind gewöhnlich Löcher oder Spalten vorhanden, durch welche die innere oft blasenförmig hervorragt (Fig. 47, 48). Die äußere ist bisweilen mit vorragenden Leisten, Höckern, Stacheln u. s. w. besetzt, oft von sehr zierlicher Sculptur (z. B. Fig. 49). — Zwischen der Blumentrone und den Staubgefäßen befindet sich in manchen Blüten ein Kreis eigenthümlich geformter, oft auch Nektar aussondernder Blattgebilde, zusammen Nebentrone (paracolla) genannt, z. B. bei der Passionsblume (Zaf. 28, Fig. 17). Dahin gehört auch der sogenannte Becher (scyphus) in der Blume der Marjolle (Fig. 29). — Der Stempel (pistillum) besteht aus dem Fruchtknoten (ovarium), dem Griffel (stylus) und der Narbe (stigma). Der Fruchtknoten bildet den untern verdickten Theil des Stempels und trägt — gewöhnlich auf seiner Spitze — eine oder mehrere Griffel, d. h. faden- oder stielartige, selten blattartige Gebilde, welche mit einer einfachen oder gelappten, gespaltenen, getheilten u. s. w. Narbe endigen (Fig. 39, 41). Bisweilen ist der Griffel seitenständig oder — bei einem vierlappigen Fruchtknoten — grundständig (Fig. 40), häufig fehlt er ganz; dann sitzt die Narbe unmittelbar auf oder an dem Fruchtknoten. Letzterer ist innen hohl und zwar entweder mit einer einzigen Höhlung versehen oder durch Scheidewände in Fächer eingetheilt (Fig. 42, Querschnitt eines zehnfüßigen Fruchtknoten). In seinem Hohlraum oder in den Fächern sind die Samenknochen (Pflanzeneier), die sich nach gegebener Befruchtung in keimhaltige Samen umgestalten, in bestimmter Weise befestigt. Die Narbe besteht aus einem lockern Zellgewebe, welches zur Zeit, wo die Befruchtung erfolgen soll, eine flüchtige zuckerhaltige Substanz ausscheidet. Die Stempel sind entweder reine Blattgebilde oder gleichzeitig Achsen- und Blattgebilde. Jeder oberständige Stempel ist ein Blattgebilde; er besteht entweder aus einem einzigen, zusammengekrümmten und mit seinen Rändern verwachsenen Blatte (Fruchtblatt, Karpellblatt) oder aus mehreren solchen zusammengewachsenen Blättern. Dann pflügt die Zahl der Griffel oder Narben die Anzahl der Karpellblätter anzugeben (z. B. Fig. 41). Ein unterständiger Fruchtknoten ist dagegen größtentheils ein Achsengebilde, denn er wird in der Hauptsache von dem hohl entwickelten Blütenboden gebildet, in welchem die Karpellblätter eingewachsen sind. Letztere bilden auch hier stets den obersten Griffel und Narben. Ist ein conarischer Blütenboden mit dem Fruchtknoten innig verwachsen, so erscheint letzterer zur Hälfte unterhalb, zur Hälfte oberhalb (innerhalb) der Blütenhüllen: halb unterständiger Fruchtknoten. Einfache, aus einem Karpellblatt gebildete Stempel kommen gewöhnlich in Mehrzahl, oft zu vielen, ja zu Hunderten (z. B. bei manchen Ranunculgewächsen) in einer Hülle vor. Bisweilen befindet sich unter einem oberständigen Stempel eine Nektar absondernde Scheibe (discus hypogynus), welche dann oft auch die Staubgefäße trägt (z. B. bei Evonymus, Fig. 30). — Noch sind die Verwachsungen zu erwähnen, welche bei den Staubgefäßen und Stempeln vorkommen. Bei erstern können entweder die Staubfäden oder die Staubbeutel verwachsen sein; im letztern Falle bilden diese eine Röhre, durch welche sich der Griffel des Stempels hindurch erstreckt (Fig. 20). Selten kommt eine Verwachsung der Staubbeutel mit dem Griffel vor, der dann als ein fleischiges voluminöses Organ entwickelt zu sein pflegt (bei allen Orchideen,

desgleichen bei Aristolochia, Fig. 32). Sehr häufig sind Verwachsungen einfacher Blattstiele zu einem scheinbar einzigen (zusammengesetzten) Stempel.

Die in dem Fruchtknoten befindlichen Samenknochen müssen befruchtet werden, wenn sie sich in keimhaltige und keimfähige Samen umwandeln sollen. Die Befruchtung wird eingeleitet durch Uebertragung des Blütenstaubs auf die Narbe. Hier dehnt sich die innere Haut der Pollenkörner durch Einwirkung der Narbenfeuchtigkeit aus und tritt schlauchförmig durch die Oeffnungen der äußeren heraus (Fig. 50). Diese Pollenschläuche dringen hierauf durch das um diese Zeit aufgelockerte Gewebe des Griffels in die Fruchtknotenhöhle oder in deren Fächer, ja bis in die Samenknochen hinein (Fig. 51, Längsdurchschnitt eines Stempels zur Zeit der Befruchtung, schematisch). Letztere, nur aus Grundgewebe bestehend, enthalten in ihrem Innern eine große Zelle, den Keimsack (Fig. 51, c, 52, Samenknoche von *Lamium purpureum*) und sind gewöhnlich von zwei Häuten umgeben (Knochenhäuten), welche an der Spitze der Samenknochen von einem auf den Keimsack zuführenden Kanal (Knochenmund, Mikropyle) durchbrochen erscheinen. Durch diesen Kanal bringen die Pollenschläuche in die Samenknochen (d. h. in eine Knoche nur je ein Pollenschlauch) und legen sich an den Keimsack an, in dessen Scheitelgegend sich dann zwei Zellen, die Keimbläschen, befinden (Fig. 53, oberer Theil des Keimsacks von *Lamium purpureum* im Moment der Befruchtung). Durch diese Verührung wird die eine der beiden Zellen, und zwar die zweite, vom Pollenschlauche entferntere, befruchtet; d. h. veranlaßt, sich schlauchförmig nach unten auszudehnen und in ihrem untern Ende eine Zelle zu bilden, wodurch ein kleiner kugelförmiger Zellenkörper entsteht, das Keimförmchen (Embryoförmchen), die erste Grundlage des Keimes (Fig. 54, ein frei präparirter Keimsack, Fig. 55, der untere Theil desselben von derselben Pflanze). Während oder schon vor der Bildung des Keimförmchens füllt sich der Keimsack mit einem nährstoffreichen Zellgewebe (Endosperm, Fig. 54, 55) an, welches für die Ernährung des sich entwickelnden Keimes zu sorgen hat. Indem nun das Keimförmchen zum wirklichen Keime (embryo) sich ausbildet und die Knochenhäute zur Samenschale werden, gestaltet sich die befruchtete Samenknoche, zugleich an Umfang zunehmend und ihre Form verändernd, zum Samen (semen) um. Dieser besteht entweder nur aus der Samenschale und dem Keime (z. B. bei der Bohne, Fig. 59, halbirt Bohne) oder enthält außer dem Keime noch einen „Eiweißkörper“ (Sameneiweiß), welcher den Keim entweder umschließt oder demselben seitlich anliegt (z. B. bei den Getreidearten, Fig. 56, a Eiweiß, b Keim) oder von ihm umschlossen wird und immer ein Nest des Endosperms ist. Seine Zellen sind stets mit Reservestoffen erfüllt. Der ausgebildete Keim besteht aus dem Knospen oder Federchen (plumula), dem Würzelchen (radicula) und dem Achsentheil oder Stengelchen (caudiculus, hypostyles Stiel), an welchem die Samenlappen (Kotyledonen) befestigt sind (Fig. 59, c isolirter Bohnenkeim ohne Kotyledonen, b Bohnenkeim mit dem einen Samenlappen in der halbirt Bohne liegend). Die Mehrzahl der Pflanzen hat zwei Kotyledonen am Keime (zweifamellappige Gewächse), welche dann stets gegenständig sind, manche (nur eine Anzahl von Nadelbälzern) haben mehr als zwei, stets wirtelförmig gestellte Samenlappen, ziemlich viele dagegen besitzen nur einen (einfamellappige Gewächse). Dann ist der Samenlappen rings um die Achse des Keimes angewachsen und erscheint als ein sehr verschieden geformtes, hohles den Keim mehr oder weniger mantelförmig umschließen-





n nun chemische Umbildungen der gelöststen Stoffe Neubildungen ein, die hier nicht weiter verfolgt werden können und deren Endresultat theils die Bildung von Protoplasma, theils von neuen Zellen ist. In den Kotlebdenen oder im Einkeißkörper aufgeführten Reservestoffe werden also aufgelöst und zur Ernährung des Keimes verwendet, während sich derselbe zu einer neuen Pflanze entwickelt. Die Ausdehnung des Keimes beginnt in dem Wurzelschen und hört der Entfaltung des Knospphens auf. Durch die Bildung des Wurzelschens wird die Samenschale zerlegt und zwar stets an der Stelle des ehemaligen Zungenmundes; hier tritt das Wurzelschen hervor, senkt in den Boden und entwickelt sich zur Hauptwurzel, es verkrümmt und wird durch eine Seitenwurzel st. Durch die Streckung des hypototypen Gliedes von der Mehrzahl der zweisamenlappigen Pflanzen die beiden Kotlebdenen über den Boden emporragen, worauf sie sich ausbreiten, grün färben, Spaltungen bekommen und die Rolle der Blätter so lange an, bis die ersten Blätter durch Entfaltung des Knospphens gebildet sind (Taf. 4, Fig. 60). Dasselbe nicht bei der Mehrzahl der Nadelhölzer (Fig. 61, apfelförmige einer Nichte), wo sich die Kotlebdenen zustersförmig ausbreiten. Bei allen einsamenlappigen Gewächsen dagegen und auch bei einigen zweisamenlappigen (z. B. bei den Eichen, Weiden) bleiben oder die Samenlappen innerhalb der Samenschale festlich unter dem Boden und spielen bloß die Rolle von Nährstoffbehältern. Bei den einsamenlappigen bricht das aus übereinander gestülpten Blatteln bestehende Knospphen aus dem Kotlebden heraus tritt als ein spitzer Keil aus dem Boden hervor (z. 57, leimendes Maistorn im Längsdurchschnitt). lange die Keimpflanze ihre ersten Blätter noch nicht entwickelt hat, wird sie bloß durch die Reservestoffe der Kotlebden oder des Einkeißkörpers ernährt; sowie aber die Blätter des Knospphens entfaltet sind, ist sie selbständig geworden, d. h. im Stande, sich von den Stoffen des Bodens der Luft zu ernähren, indem sie dieselben „assimilirt“. Die im Boden wurzelnde und mit Laubblättern versehene Pflanze ernährt sich bloß von unorganischen Stoffen. Nächst dem Wasser, welches sie vorzugsweise aus dem Boden entnimmt, und der Kohlensäure, welche sie vorzüglich aus der Luft erhält, sind Ammoniak, Stickstoff, Schwefelsäure, phosphorhaltige und kieselige Salze (Verbindungen dieser Säuren mit Kalk, Magnesium, Magnesia u. s. w.), endlich Eisenverbindungen die wichtigsten. Alle diese mineralischen Stoffe können nur dem Boden entnommen werden; der Luft wird außer Kohlensäure noch Sauerstoff, Stickstoffgas aufgenommen, letzteres jedoch nach dem Erfordernisse von der Pflanze nicht verarbeitet. Bei der Verbrennung einer Pflanze werden der Kohlenstoff, der stets die Hauptmasse jeder Pflanzensubstanz bildet, desgleichen das Wasser und der Stickstoff zerstört (abrannt), während die andern genannten Stoffe als Asche zurückbleiben; deshalb werden die letztern auch „Aschenbestandtheile“ der Pflanzen genannt. Dieselben sind im aufgelösten oder im Wasser löslichen Zustande im Boden sein oder in einen solchen Zustand übergeführt (aufgelöst) werden, sollen sie mit dem Wasser von den Wurzeln aufgenommen werden. Das Wasser, welches von den Mineralstoffen scheint Säuren zu enthalten, welche von den Wurzeln selbst ausgeschieden werden (vorzüglich Kohlen- und Oxalsäure). Die Aufnahme der flüssigen Bodennahrung wird durch die Wurzelsche bewirkt. Diese sind deshalb mit den den Boden umgebenden (Sand- und Erdschichten) innig verbunden. (Taf. 2, Fig. 17). Die Gase der Atmosphäre

werden von den Blättern und zwar durch die Spaltöffnungen aufgenommen. Auch vermögen die Blätter und alle mit einer Oberhaut überzogenen oberirdischen Pflanzentheile trostbar flüssiges Wasser (Regen, Thau) durch die Membranen der Oberhautzellen aufzusaugen. Die von den Wurzeln aufgesaugte Nährflüssigkeit des Bodens wird nun als roher Nahrungsaft durch die Achse und deren Verzweigungen, und zwar innerhalb des Holztheiles der Gefäßbündel bis in die Blätter emporgeführt, woselbst sie mit den Gasen der Atmosphäre in Berührung kommt. Durch die Thätigkeit des Chlorophylls (s. o. S. 5) wird die Kohlensäure der Luft unter der Mitwirkung von Licht und Wärme zerlegt. Auch der rohe Nahrungsaft, welcher schon unterwegs vielfache Veränderungen erlitten hat, wird in seine Bestandtheile zerlegt und nun aus diesem und dem freigewordenen Kohlenstoff der Kohlensäure unter dem oxydierenden Einflusse des aus der Luft aufgenommenen Sauerstoffs eine bildungsfähige (plastische) Flüssigkeit hergestellt, aus welcher theils Protoplasma, theils die Wurzelsche neuer Zellen (Cellulose), theils Reservestoffe zu entstehen vermögen. Dieser Bildungsaft wird aus den Blättern durch gewisse Bastgewebzellen der Gefäßbündel (Leitzellen) in die Achse geleitet und circulirt hier innerhalb des Bastgewebes, sich im allgemeinen nach unten zu bis in die Wurzeln verbreitend, überhaupt aber überallhin (daher auch aufwärts) zu den über den assimilirenden Blättern befindlichen Pflanzengliedern, z. B. Blüten und Früchten) dringend, wo seine Gegenwart zur Ernährung bereits vorhanden oder zur Bildung neuen Zellgewebes notwendig ist. Alle diese Vorgänge zusammengekommen bilden die Saftbewegung in der Pflanze. Die bei derselben thätigen Kräfte sind noch nicht genügend ermittelt; jedoch ist so viel gewiß, daß bei dem mit bedeutender Gewalt erfolgenden Aufsteigen des rohen Nahrungsaftes eine von unten her wirkende Wurzeldruckkraft und eine durch die Verdunstungen des Wassers in den Blättern eingeleitete abwärts laufende Kraft die Hauptrolle spielen, während bei der Circulation des Bildungsaftes vorzüglich chemische Kräfte (Anziehungen) thätig zu sein scheinen. Die Umwandlung der von außen aufgenommenen anorganischen Stoffe in Pflanzensubstanz, welche durch die Thätigkeit des Chlorophylls eingeleitet und im Grundgewebe der Rinde u. s. w. vollendet wird, heißt die Assimilation. In den Blättern geht dieselbe Hand in Hand mit der Respiration (Athmung), d. h. der Aufnahme und Ausscheidung von Kohlensäure und Sauerstoff, ein Vorgang, welcher für das Leben der Pflanze ebenso wichtig ist, als das Athmen für das Leben der Thiere. Und zwar werden am Tage, besonders im Sonnenlicht, durch die Blätter große Mengen von Kohlensäure aus der Luft aufgenommen und große Mengen von Sauerstoffgas in die Luft ausgeathmet; bei Nacht ist der Proceß ein umgekehrter, doch sind die Mengen von Sauerstoff, die dann die Pflanze der Luft entnimmt, und die Mengen von Kohlensäure, welche sie ausscheidet, viel geringer als am Tage. Durch die vorzugsweise von den Blättern unterhaltene Verdunstung von Wasser oder den Proceß der Transpiration werden der Luft auch sehr bedeutende Mengen von Wasser zugeführt. Hierdurch und durch die Sauerstoffausscheidung tragen die Pflanzen wesentlich zur Verbesserung der Luft bei, machen sie für Menschen und Thiere angenehmer zu athmen und für deren Nahrungsbereitung zuträglich. Deshalb ist die Waldluft so angenehm, so frisch und gesund, die Luft in großen Städten dagegen so ungesund. — Gleichzeitig mit der Assimilation, als deren Endresultat die Ablagerung von Reservestoffen

in Samen, Stamm, Wurzeln und Knospen zu bezeichnen ist, erfolgt die Secretion, d. h. die Ausscheidung oder Ablagerung von Stoffen, welche für das Leben der Pflanze gleichgültig zu sein scheinen, für den Menschen aber oft von hoher Bedeutung sind, z. B. Wachs, Gummi, ätherische Oele, Harze, Balsame, Farbstoffe, Kautschuk, Alkaloide u. f. w.

Durch die Ernährung wird das Wachstum der Pflanze ermöglicht. Dasselbe besteht theils in der Bildung neuer Pflanzenglieder (neuer Blätter, Knospen, Nebenachsen, Wurzeln, Blüten u. f. w.), theils in der Vergrößerung bereits vorhandener (Verdickung der Wurzeln und Achsen durch Verdickung der Gefäßbündel und besonders des Holzkörpers, Vergrößerung des Fruchtknotens bei dessen Umwandlung in die Frucht u. a. m.). Das Wachsen beruht theils auf der Bildung neuer Zellen, theils auf der Ausdehnung bereits vorhandener oder der neugebildeten Zellen und auf der Verdickung von deren Membranen. Die Pflanzenglieder wachsen in verschiedener Weise. Bei den Wurzeln und Achsen ist der Sitz der Neubildung von Zellen in den Spitzen und innerhalb des Cambiumcylinders, bei den Blättern (im weitesten Sinne) vorzüglich in deren Basis. Achsen und Wurzeln haben im allgemeinen ein unbegrenztes, die Blätter ein begrenztes Wachstum, denn ein Blatt vergrößert sich in der Regel nicht mehr, nachdem es sich völlig ausgebildet hat. Das Wachstum ist ferner verschieden während der einzelnen Jahres- und Tageszeiten. Während es — bei allen ausdauernden, d. h. viele Jahre lebenden Pflanzen, z. B. den Bäumen — im Winter ganz ruht oder wenigstens zu ruhen scheint (die Wurzeln wachsen auch im Winter), steigert sich das Wachstum im Frühling im Verhältniß als die Wärme steigt und die Tage länger werden und verlangsamt sich wieder im hohen Sommer und namentlich gegen den Herbst hin, bis es im Spätherbst oder schon früher ganz aufhört. Während der Vegetationsperiode, d. h. vom Frühling bis Herbst (bei den blattwechselnden Bäumen und Sträuchern vom Laubaussbruch bis zum Laubabfall), ist das Wachstum bei Tage reger als bei Nacht, in den Vormittagsstunden intensiver als in den Nachmittagsstunden. Die Erscheinungen des Wachstums (ebenso der Ernährung und des Keimens) lassen also eine gewisse Periodicität erkennen, welche vorzüglich in den Einflüssen der Außenwelt, in dem Gange der Temperatur, dem Wechsel von Tag und Nacht u. f. w. begründet ist. Das Leben der Pflanze ist, weil sie im Boden wurzelt und sich daher nicht, wie die Mehrzahl der Thiere, von ihrer Geburtsstätte fortbewegen kann, von der sie umgebenden Natur (von den Standortverhältnissen) gänzlich abhängig. Diese Abhängigkeit des Pflanzenlebens tritt auch bei dessen wichtigster Aufgabe, bei der Fortpflanzung, auffallend hervor. Die Forschungen der Kreuzer haben überzeugend dargethan, daß die Uebertragung von Blütenstaub einer Zwitterblüte auf deren Narbe keinen Erfolg hat, d. h. eine Befruchtung der in dem Fruchtknoten befindlichen Samentknospen nicht bewirkt (wenigstens bei der Mehrzahl der bisher in dieser Beziehung beobachteten Pflanzen), sondern daß eine Befruchtung nur dann eintritt, wenn der Pollen der einen Blüte auf die Narbe einer andern Blüte gelangt (also durch Kreuzung). Abgesehen von den Pflanzen mit eingeschlechtigen Blüten, bei denen eine Selbstbefruchtung nicht vorkommen kann, hat die Natur durch die verschiedenartigsten Einrichtungen der Blüten, welche hier nicht erörtert werden können, die Selbstbefruchtung unmöglich zu machen gesucht. Die Uebertragung des Pollens aus einer Blüte in die andere wird nun vorzüglich durch Insekten vermittelt (bei Pflanzen mit ein-

geschlechtigen Blüten auch durch den Thier, es im Wasser schwimmende Gewächse, durch die Bewegung des Wassers). Die Fortpflanzung durch Bildung feinsamigen Samens, ist jedoch von Wind und Wetter, theils von der Pflanze, die Vorgänge der Befruchtung und Keimung

Bezüglich der Lebensdauer zerfallen die Pflanzen in einjährige, zweijährige und vieljährige. In monokarpische, rhizokarpische oder polycarpische, caulokarpische oder Holzgewächse. In den monokarpischen Pflanzen bleiben nur eine Vegetationsperiode lebendig, die höchstens sechs Monate oder ein Jahr im Frühling aus ihren Samen hervorkommt, im Herbst, nachdem sie wieder zu Grunde gegangen sind, gänzlich zu Grunde (daher Samenmonokarpische). Die zweijährigen Pflanzen (bienniale) haben zwei Vegetationsperioden (einen Blätterbüschel), im zweiten Jahre bilden sie eine neue, entwicklungsfähige Achse, und gehen durch die Keimung der Samen, spätestens im dritten Jahre, zu Grunde. Dasselbe tritt bei den polycarpischen Gewächsen ein, nur daß diese in der Pflanzentkörper eine Reihe von Jahren leben, bevor sie zu Grunde gehen. Die Zahl der Jahre ist beschränkt (zu ihnen gehört z. B. die sogenannte hundertjährige Aloe, Agave americana, welche nur einmal, gleich den zwei- und einjährigen, bei allen drei Kategorien tritt). Bei der Erzeugung des Samens, man könnte sagen, bei der Erneuerung der Pflanze, ein. Die perennirenden Pflanzen sind krautartige Rhizome, welche alljährlich im Frühling Knospen oberirdische Achsen entwickeln. Bei der Erzeugung von Samen zu Grunde gehen die blüthenzeugenden Achsen der einjährigen Gewächse. Aber die Rhizome bleiben die Lebensdauer ist unbestimmt. Bei den Rhizomen, welche in Halbsträucher, Sträucher zerfallen, bleibt nicht allein der unterirdische Theil des Pflanzentkörpers, sondern auch oberirdische, der Stamm mit seinen Seitenästen, bisweilen Jahrtausende, lebendig. Bei den Samen zieht hier den Tod der ganzen Pflanze der oberirdischen Achse nicht nach sich; man pflegt diejenigen Achsen, welche nicht haben, zu vertrocknen. Die Rhizome nicht nur einmal, sondern viele Male, in den Jahren ihres Lebens; doch tritt bei den Sträuchern die Entwicklung von Blüten in der Reihe von Jahren ein, also erst, nachdem Zeit bloße Ernährungsorgane gebildet haben. Die Rhizome der naturgemäße, ist bei allen Rhizomen, sondern ein mehr oder weniger Absterben. Bei den Bäumen umfassen die Rhizome, welches sich bei ihnen theils im unterirdischen Theil, theils in einer Seitenachse (Hohlwerden des Stammes) und in einen viele Jahre langen Zeitraum.

## Zweiter Theil.

Systematik und Pflanzengeographie  
oder specielle Botanik  
(Gierzyk Teil. 5-31.)

### I. Eintheilung der Pflanzen.

Um eine wissenschaftliche Eintheilung der zahllosen Pflanzenformen, welche in der Natur vorkommen, zu ermöglichen und im verstandenen oder verstandenen Schichten begraben liegen, zu ermöglichen, ist es nöthig, die Pflanzenformen in



Gattungen (genera) abzugrenzen und die unterbenen Arten und Gattungen mit bestimmten Namen zu belegen, wie dies zuerst Linné (geb. 1707, 1778) streng durchgeführt hat. Alle Pflanzenviduen, welche bezüglich ihrer äußern und innern Gestalt und ihrer Lebensäußerungen übereinstimmen durch ihre Samen wieder Individuen von derselben Gestalt hervorbringen, bilden zusammen eine Art, Arten, welche morphologisch bezüglich der wichtigen Organe, d. h. der Fortpflanzungsorgane, eine Vereinstimmung oder wenigstens große Ähnlichkeit zeigen, bilden zusammen eine Gattung und sind untereinander verwandt. So bilden z. B. alle Eichenarten die Gattung Eiche (*Quercus*). Die Arten haben gewisse Merkmale, welche sich unverändert vererben (oder sollen dergleichen wenigstens haben) und durch welche sich verwandte Arten voneinander unterscheiden: spezifische Merkmale. Andere Merkmale sind häufiger konstant und ihre Abänderungen, welche bald erblich auftreten, bald nicht, bedingen Abarten (varietates), Spielarten (variationes), Rassen u. s. w.: Zahl dieser Abänderungen ist namentlich bei den Kulturgewächsen sehr groß. Ueber ihre Entstehungen und auch über den Ursprung der Arten haben Darwin's Untersuchungen interessante Aufschlüsse gegeben, worauf nicht eingegangen werden kann.

Eine auf bestimmten Grundlagen beruhende Anordnung der Pflanzengattungen heißt ein Pflanzensystem, und zwar ein natürliches, wenn die Verwandtschaft, d. h. die Ähnlichkeit oder Uebereinstimmung in der Gestalt und Entwicklungsweise der verschiedenen Theile der Pflanze wichtigsten Organe, als Princip der Anordnung zu Grunde gelegt wird, dagegen ein künstliches, wenn die Einteilung der Gattungen in bestimmte Kategorien auf willkürlich gewählte Merkmale eines oder mehrerer Organe (z. B. auf die Zahl der Staubgefäße und Stempel) gegründet und die natürliche Verwandtschaft der Pflanzengattungen dabei ganz außer Acht gelassen ist. Im natürlichen System werden verwandte Gattungen in Familien oder Ordnungen (*ordines naturales*), verwandte Familien und Ordnungen in Klassen (*classes*), verwandte Klassen und Ordnungen in Abtheilungen (*divisiones*) u. s. w. gebracht und Familien, sowie in jeder Familie die Gattungen, in der Reihenfolge gestellt, in welcher entweder mit den einfachsten, unvollkommenen Gewächsen begonnen und dann Schritt zu den höhern, vollkommenern emporsteigen oder der umgekehrte Weg eingeschlagen wird. In dem natürlichen Systeme wird also methodus verfahren, weshalb dasselbe auch *methodus naturalis* genannt worden ist. Ein solches System hat deshalb eine höhere Bedeutung als ein künstliches, welches bloß als ein Pflanzenregistrar betrachtet werden kann. Unter den zu verschiedenen Zeit aufgestellten künstlichen Systemen ist das Linné'sche Sexualsystem (*systema sexuale*, so genannt, weil in demselben vorzüglich die Verhältnisse der Geschlechtsorgane (Einteilungsprinzipie benutzt sind) das berühmteste und jedenfalls auch beste. Hier eine Uebersicht seiner Abtheilungen und Klassen.

#### Uebersicht der Abtheilungen und Klassen des Linné'schen Systems.

Pflanzen mit deutlichen Befruchtungsorganen (pl. *phanerogamae*).

A. Mit Zwitterblüthen versehene (pl. *monoclinae*).

a. Staubgefäße frei, nicht verwachsen.

α. Staubfäden von gleicher Länge.

1. Klasse. Monandria, Einmännigkeit, mit 1 Staubgefäß in jeder Blüte.

2. Klasse. Diandria, Zweimännigkeit, mit 2 Staubgefäßen in jeder Blüte.

3. » Triandria, Dreimännigkeit, mit 3 Staubgefäßen in jeder Blüte.

4. » Tetrandria, Viermännigkeit, mit 4 Staubgefäßen in jeder Blüte.

5. » Pentandria, Fünfmännigkeit, mit 5 Staubgefäßen in jeder Blüte.

6. » Hexandria, Sechsmännigkeit, mit 6 Staubgefäßen in jeder Blüte.

7. » Heptandria, Siebenmännigkeit, mit 7 Staubgefäßen in jeder Blüte.

8. » Octandria, Achtmännigkeit, mit 8 Staubgefäßen in jeder Blüte.

9. » Enneandria, Neunmännigkeit, mit 9 Staubgefäßen in jeder Blüte.

10. » Decandria, Zehnmännigkeit, mit 10 Staubgefäßen in jeder Blüte.

11. » Dodecandria, Zwölfmännigkeit, mit 12 Staubgefäßen in jeder Blüte.

12. » Icosandria, Zwanzigmännigkeit, mit 20—100 und mehr Staubgefäßen, welche auf dem Kelche (perigonisch) eingefügt sind.

13. » Polyandria, Vielmännigkeit, 20—100 und mehr Staubgefäße, welche im Grunde der Blüte (hypogynisch) eingefügt sind.

β. Zwei Staubfäden kürzer als die übrigen.

14. Klasse. Didynamia, Zweimännigkeit, 2 lange und 2 kurze Staubfäden in jeder Blüte.

15. » Tetradynamia, Viermännigkeit, 4 lange und 2 kurze Staubfäden in jeder Blüte.

b. Die Staubfäden oder Staubbeutel verwachsen.

16. Klasse. Monadelphia, Einbrüdrigkeit. Alle Staubfäden einer Blüte in ein Bündel (einen Cylinder) verwachsen.

17. » Diadelphia, Zweibrüdrigkeit. Staubfäden in 2 Gruppen (Bündel) verwachsen.

18. » Polyadelphia, Vielbrüdrigkeit. 3 oder mehr Gruppen (Bündel) verwachsener Staubfäden in jeder Blüte.

19. » Syngenesia, die Staubbeutel (stets 5) in einen Cylinder verwachsen, die Staubfäden frei.

c. Die Staubfäden mit dem Stempel verwachsen.

20. Klasse. Gynandria, Mannweibigkeit.

B. Blüten eingeschlechtig (pl. *diclinae*).

21. Klasse. Monoecia, Einhäusigkeit. Männliche und weibliche Blüten auf einem Individuum.

22. » Dioecia, Zweihäusigkeit. Männliche und weibliche Blüten auf zwei Individuen (männliche und weibliche Pflanzen).

23. » Polygamia, Vielehe. Eingeschlechtige und Zwitterblüten auf einem oder mehreren Individuen gemengt vorkommend.

II. Pflanzen mit verborgenen oder undeutlichen oder gar keinen Befruchtungsorganen (pl. *cryptogamae*).

24. Klasse. Cryptogamia.



### 3. Unterlasse. Mit getrenntblättriger Blumenkrone (Dialypetalae). 25 Ordnungen.

Dieses System zerfällt also in 2 Reiche, 4 Abtheilungen, 8 Klassen und 68 Ordnungen. Letztern sind ca 300 Familien subordinirt.

## II. Schilderung der wichtigeren Ordnungen und Familien des Pflanzenreichs.

### Erste Klasse.

#### Pilzartige Sporenpflanzen (Myceliatae).

(Tafel 5 und 6.)

1. Ordnung Pilze (Fungi). Pilze sind Chlorophylllose Lagerpflanzen, welche sich von organischen Stoffen nähren. Wegen des Mangels an Chlorophyll können sie nämlich nicht assimiliren, müssen daher ihre Nahrung aus organischen, pflanzlichen oder thierischen Stoffen nehmen. Deshalb wachsen die Pilze theils auf oder in Pflanzen und Thieren (lebenden und todtten), eils auf oder in pflanzlichen oder thierischen Substanzen (z. B. Brot, frische, getrocknete und eingemachte Früchte, Fruchtsäfte, Stroh, Laub; Milch, Fleisch und Leichspeisen, Dünger, Excremente u. s. w.) oder weigeltens in einem mit organischen Stoffen gemengten Boden. Indem die Pilze der organischen Unterlage, auf oder in welcher sie vegetiren (ihrem Substrat), die ihrer Ernährung nöthigen Stoffe entziehen, wirken sie chemisch zerlegend auf das Substrat ein und veranlassen dessen theilweise oder gänzliche Zerstörung, die als als Fäulniß, bald als Verwesung auftritt. Sehr viele Pilze, welche sich auf Pflanzen- und Thierleichen, auf pflanzlichen und thierischen Abfällen, auf Excrementen u. s. w. ansiedeln, sind deshalb sehr nützlich u. nennen, indem dieselben deren rasche Zersetzung herbeiführen und verhindern, daß durch langsames Faulen die Luft verpestet werde. Diejenigen Pilze dagegen, welche sich auf oder in lebenden Pflanzen und Thieren mit Einschluß des Menschen) ansiedeln und durch ihre chemisch zerlegenden oder gar mechanisch zerstörende Einwirkung Erkrankten, ja den Tod ihrer Wirtspflanzen und -thiere zu veranlassen vermögen, können sehr schädlich werden. Solche Pilze nennt man Schmarogerpilze oder parasitische.

Die neuern Forschungen haben ergeben, daß die Pilze nicht durch Urzeugung entstehen, wie früher wenigstens bezüglich der niedrigeren allgemein angenommen wurde, sondern nur aus ihren Sporen. Diese sind bei der Mehrzahl einzellig, bei vielen jedoch aus zwei und mehr Zellen zusammengesetzt. Bei der sogenannten Keimung reifen die Sporen (und dies gilt von den Fortpflanzungszellen fast aller Sporengewächse) Schläuche oderäden (Keimschläuche, Keimäden, Taf. 5, Fig. 1h, d, 6a, 9d), welche sich verzweigend bald ein unentwickeltes geformtes Geflecht, bald einen bestimmten geordneten Loder oder dicht gewebten Körper bilden, das Mycelium. Dieses entwickelt die Sporen entweder mittelbar, indem sich z. B. einzelne Zweige (Schlauchäden) in Sporen abknüpfen (Fig. 4a, 8a, 12), oder direct Sporenbehälter (Sporenfrüchte, Sporangien), von wo die Sporen entstehen und welche sich endlich in bestimmter Weise öffnen (Fig. 1d, 3a), oder es wächst aus dem Mycelium ein bestimmter geformter, aus verästigten Schlauchzellen zusammengesetzter Körper hervor Sporenträger, Fruchtträger), welcher die Sporen entweder an seiner Oberfläche oder im Innern (dann oft in Schlauchzellen oder Sporenschläuchen, Fig. 8c, 9h) erzeugt. Ein solcher Fruchtträger ist z. B. der meist eiförmige Hut vieler Fleischnpilze (Taf. 6, Fig. 1—11). Die Sporen selbst zerfallen in Samen-, Dauer-

oder Wintersporen, stets doppelthäutige Sporen, welche erst nach einer Periode der Ruhe zu Keimen vermögen, z. B. im nächsten Frühling; in Sommer-sporen oder Conidien, stets einzellige und meist nur eine Haut besitzende, welche sofort keimen können, nachdem sie reif geworden sind, und in Schwärm-sporen (Zoosporen), von den Conidien nur dadurch unterschieden, daß, bevor sie keimen, sie im Wasser oder in Flüssigkeiten eine Zeit lang munter umherzuschwimmen, wobei ihnen wimperartige Anhänge als Ruder dienen (Taf. 5, Fig. 4c, 11). Viele Pilze bringen in verschiedenen Stadien ihrer Entwicklung ganz verschiedene geformte Sporen oder Sporenfrüchte hervor oder bilden Sporen und Conidien erzeugende Formen, die sehr voneinander abweichen, oft so sehr, daß sie früher für ganz eigene unverwandte Arten, ja sogar Gattungen gehalten worden sind. So findet sich häufig auf feuchtem Brot und eingemachten Früchten ein flockiger Schimmel, der sich bald mit graugrünen kurzgestielten Köpfchen bedeckt: der graugrüne Brotschimmel (*Aspergillus glaucus*). Die gestielten Köpfchen sind Conidienträger (Fig. 1a). Die kugelförmigen Conidien haben eine feinstachelige Haut (h, keimende Conidie). Später entwickelt oft dasselbe Mycelium am Ende niederliegenden Zweige größere, zellige, orangefarbene Kugeln (c, e), welche zuletzt aufplatzen und zahlreich längliche Schlauchzellen entleeren (d, f), in deren jeder 8 Sporen eingeschlossen sind. Diese einen dunklen Kern (g) enthaltenden Sporen keimen in gewöhnlicher Weise (h), der Keimschlauch gliedert sich in Zellen (i) und wird, sich verzweigend, zu einem Mycelium, welches zunächst wieder die Conidienform entwickelt. Die Kapselform mit Sporenschläuchen ist lange für einen eigenen Pilz (*Eurotium herbariorum*) gehalten worden. Beide Fruchtformen wechseln miteinander ab (steht in Generationswechsel). Wahrscheinlich ist auch der graugrüne Finkelschimmel (*Penicillium glaucum*), der gemeinste auf allen möglichen Körpern und Substanzen vorkommende Schimmel (Fig. 2), die Conidienform irgendeines höhern oder, was noch wahrscheinlicher, vieler höhern Pilze. — Die Zellen der Pilze sind fast immer schlauchförmig; ihre Wandung besteht nicht aus Cellulose, sondern einem eigenthümlichen Stoffe (Kungin), ihr Inhalt ist immer ziemlich reich an Sticksstoff. Nur bei wenigen Pilzen verholzt die Zellwand (z. B. bei den holzigen, viele Jahrzehnte altverwendenden Löcherpilzen), die meisten Pilze sind sehr vergänglich. Die Mehrzahl derselben ist sehr klein, ja sehr viele sind nur durch das Mikroskop zu erkennen.

Die Pilze bilden die größte Gruppe unter allen Sporengewächsen und sind in allen Zonen reichlich vertreten. Sie zerfallen nach der neuesten Klassifikation von de Vary in folgende vier Gruppen (Unterordnungen):

a. Algenpilze (Phycomycetes). Meist sehr gängliche Pilze, deren Mycelium aus einer einzigen sich vielfach verzweigenden Schlauchzelle besteht, welche an ihren Enden Samenporen bildet und auch Schwärm-sporen zu erzeugen vermag. Viele Schmarogten in lebenden Pflanzen, andere vegetiren auf oder in organischen abgestorbenen Körpern, einige im Wasser auf todtten und lebenden Thieren. Letztere zeigen viel Ähnlichkeit mit gewissen Algen. Alle sind mikroskopisch. Hierher gehören mehrere der sogenannten Schimmel, z. B. der gemeine Kropfschimmel (*Mucor Mucedo*, Taf. 5, Fig. 3), ferner der Pilz der Rotbfäule (*Xenodochus ligniperda*, Fig. 12), der Kartoffelpilz (*Ponospora infestans*, Fig. 4) u. a. Die Bildung der Samenporen geschieht bei vielen dieser Pilze infolge einer geschlechtlichen Zeugung, indem zwei benachbarte



Zweige des Myceliums je einen Ast entwickeln, der sich in eine blasige Zelle umgestaltet. Indem die eine dieser Zellen sich an die andere anlegt (Fig. 10 a), wol gar einen schnabelartigen Fortsatz in dieselbe treibt (Fig. 10 b, c), wird diese befruchtet, d. h. befähigt, in ihrem Innern eine Spore zu bilden (Fig. 10 c). Dagegen bilden sich die Schwärmsporen immer ohne vorhergegangene Zeugung bald in sporenförmigen Zellen (Fig. 4 a b c), bald in kugeligen kapselartigen Behältern (Fig. 11). Außer den die Samenporen erzeugenden Mycelien kommen bei vielen Algenpilzen auch sogenannte Conidienformen vor, d. h. Mycelien, welche unmittelbar an bestimmten Zweigen kleine kugelige Fortpflanzungszellen entwickeln (Fig. 3 d). — Fig. 3. Der gemeine Ruospschimmel (*Mucor Mucedo*), häufig auf faulem Obst, verderbenden Speisen, Zuckersäften, Mist, graugrüne Röschen bildend. a Myceliumszweig mit einer aufspringenden Sporenfrucht, b Sporen, c gekeimte Spore, d Conidien bildender Myceliumszweig, e gekeimte Conidien. — Fig. 4. Der Kartoffelschimmel (*Peronospora infestans*), dessen Mycelium in den Blättern, Stengeln und Knollen der Kartoffelpflanze schwarzroth und die seit 1843 beobachtete Kartoffelkrankheit verursacht. a sporenerzeugende Zweige des im Gewebe eines Kartoffelblattes wuchernden Myceliums, zu einer Spaltöffnung herausgewachsen, b abgefallene Sporen, deren Inhalt zur Bildung von Schwärmsporen sich getheilt hat, c Schwärmspore, d gekeimte Schwärmsporen, e keimende Schwärmspore, deren Keimischlauch in die Oberhaut eines Kartoffelblattes eingedrungen ist, f Zelle einer nachfaulen Kartoffelknolle mit dem Mycelium des Schmarozers, dessen Schläuche die Stärkekörner umstriden und aussaugen. — Fig. 12. Kleines Stückchen rothfaulen Eichenholzes im Längsschnitt, mit dem Mycelium des *Xenodocheus ligniperda*, dessen Schläuche sich stellenweise in Sporenreihen abgesehnürt haben.

b. Unterhautpilze (Hypodermii). Lauter Schmarozerpilze, welche im Innern von Pflanzen vegetiren und ihre Sporen oder Sporenfrüchte unter der Oberhaut ihrer Nährpflanze entwickeln; daher der Name. Zuletzt durchbrechen die Sporen oder Sporenfrüchte die Haut und erscheinen an deren Außenfläche als pulverige Häufchen, Striche, Streifen oder als bestimmt geformte Fruchtkörper. Derjenige Theil der Nährpflanze, in welchem sich die Sporen entwickeln, wird immer mehr oder weniger zerstört. Die Hypodermier zerfallen in die Brand- und Rostpilze.

Die Brandpilze (*Ustilagines*) haben dunkelfarbige, in Menge gesehen schwarzbraune einzellige Sporen, welche als ein schwarzer Staub die durch ihre Entwicklung zerstörten Pflanzentheile bedecken oder innerlich anfüllen. Hierher gehören die Brandformen der Getreidearten: der Flug- oder Ruchbrand (*Ustilago Carbo*), welcher Hafer und Gerste so häufig befallt, der Beulenbrand des Mais (*Ustilago Maydis*), der Hirsebrand (*Ustilago destruens*), der Stengelbrand des Roggens (*Urocystis occulta*) und der Faul-, Schmier- oder Steinbrand (*Tilletia Caries*). Bei allen diesen Brandpilzen bringen die äußerst feinen Keimischläuche der Sporen in die junge Pflanze an deren Stengelbasis ein und bilden ein feinfädiges farbloses Mycelium, welches mit der Pflanze in ihr emporwächst und endlich in bestimmten Theilen (z. B. in dem Fruchtknoten) die Sporen in verschiedener Weise bildet. Fig. 5 zeigt bei a b c Sporen des Weizen-Faulbrands in verschiedenen Stadien der Keimung. Am Ende des Keimischlauchs entwickeln sich hier fadenförmige secundäre Sporen oder Sporidien (b, c), welche abfallen und seine Keimsäden treiben (d), wol auch längliche Sporidien zwei-

ter Ordnung bilden (e), die ebenfalls die Sporidien vermögen sich die Brandform des Sommers sehr rasch zu verbreiten; auch eigentlichen Sporen (Samensporen) das nächste Jahr zum andern zu erhalten.

Die Rostpilze (*Uredines*) unterscheiden sich von den Brandpilzen zunächst durch ihre meist runden Sporen, eine Farbe, welche von der in den Myceliumschläuchen in Form der vorfindenden orangegelben Oelen abweicht, nimmt ihr Mycelium immer nur einen kleinen Raum innerhalb der Nährpflanze ein und sich unmittelbar an den Stellen entwickelt, wo die Schläuche eingedrungen sind und hier die Fruchtkörper bildet. Letztere sind bei vielen Rostpilzen in verschiedener Form, Entwicklungsgeweise und hiermit steht eine große Vielgestaltigkeit in Verbindung. Dies gilt besonders von *Puccinia*, zu der der gemeine Streifenrost (*Puccinia graminis*) der Getreidearten gehört. Hier sind die Samenporen zweifach, nämlich in Menge gesehen schwarzbraun, beim Keimen (im Frühlinge) lange, keimförmige Schläuche, deren Aestchen an den Stellen, wo sie die Oberhaut durchbrechen, die Keimischläuche bilden, ein sogenanntes Promycelium. Die rothgelb gefärbten Sporidien keimen in Keimischläuche dringen aber nur in die Oberhaut (Berberis vulgaris) ein, wo sie ein Mycelium bilden, aus dem sich ein befeuchteter Keimischlauch in die Oberhaut durchbrechender Früchte bildet, ein sogenanntes Aecidium (*Aecidium Berberidis*). „Wecherrost“ erzeugt aufrechte Aecidien. Die Sporen (c) zweier Aecidien im Querschnitt (d) drei Sporen stark vergrößert. 3. Aecidien geht diejenige sogenannte Spore voraus, welche winzig kleine, aber unbekannte Körnchen (Spermatien) enthält, welche die Keimischläuche der Aecidiensporen vermehren (z. B. bei den Gräsern oder Getreidearten einzubringen wird der Weizen befallen), und so die Spaltöffnungen (g), und veranlassen die Bildung des Rost, d. h. rothgelbe pulverige Fruchtkörper in den Blättern, Stengeln und Spelzen. Die Keimischläuche durch die Oberhaut hervorgebracht, welche einzellig sind und auf langer Zeit bestehen. Diese Rostform ist als eigener Rost beschrieben worden. Die Uredines, wobei sie lange Schläuche entwickeln, breiten dieselbe Rostform sehr schnell aus. Gegen Ende desselben oder am Anfang desselben breiten dieselben Mycelien endlich die dicken zweizelligen Samenporen (f), und so die bisher rothgelben Streifen schwarzbraun in die *Puccinia* umgewandelt. Rostpilze sind eines so complicirten Entwicklungszyklus fähig, dass sie selbst die Aecidien, andern wieder die Rostpilze können sehr schädlich sein, im allgemeinen weniger gefährlich als die Brandpilze.

c. Basidiumpilze (*Basidiomycetes*) sind durch charakteristisch, daß sich ihre Fruchtkörper am Ende von Stielen (Stippen) entwickeln, welche sich aus einer bald an der Basis im Innern eines oft sehr großen Fruchtkörpers befindlichen Gewebeschicht (Hymenium) herausheben und an deren Ende die Sporen bilden.

Die Hutpilze (*Hymenomycetes*) sind im Boden, seltener in der Rinde von Bäumen oder in totem und faulem Holz

v., bei den bodenbewohnenden aus fleischigen Fasern gebildet (Zaf. 6, Fig. 1a), bald als gestielter (Fig. 1 b c), bald als oft seitlich angewachsener Hut (Fig. 4), hige oder häutige, unbestimmt geformte (Hautschwamm), bald anders geformt, an ihr selten der obern Fläche mit Lamellen, idern Vorprüngen oder mit Höhren und en, welche mit dem „Hymenium“, dem iden Apparat, überzogen oder ausgekleidet ymenium besteht aus einer Schicht sentzschellen, von denen die einen steril (Sastysen), die andern fruchtbar sind und an ie Wafiden mit den Sporen entwickeln

Die Hymenomyces sind meist große opische Formen sowie parasitische Arten ihnen wenige.

Blätters oder Blättchenpilz (Agarichite Gattung der Pilze (über 1000 Arten). Hut gestielt, flach oder conver, auf der mit radial verlaufenden sentredten Larnern) besetzt (Zaf. 6, Fig. 1, 2), welche enium überzogen sind. Der ganze Fruchtzungen oft von einer weissen fleischigen fien (Fig. 6, 9 links), welche später durch des Huts zerrissen wird und dann als e (volva) am Grunde des Stiels zurück rechts). Oft auch die untere Hutfäche einer dünnen Membran (Schleier) bedekt, atrande und am Stiele befestigt ist. Nach en erscheint entweder der Stiel unterhalb r mit einer Manschette (Ring) versehen ) oder am Rande des Huts mit fleischigen sen) besetzt (Fig. 1, 11). Stüde der alle bleiben oft auch in Form weisser WarOberfläche des Huts zurück (Fig. 9, 11). der Champignon (A. campestris). Stiel walzig, ohne Wulst, weislich, 1—3 Zoll is oder bräunlich, beschuppt, anfangs sehr ter ziemlich flach; Blätter anfangs weis, roth. Ein sehr wohlnehmender gesunfer auf Wiesen, Miedern, auf Gartenboden, hölzen vom Frühling bis zum Spätherbst in den Mistbeeten künstlich gezüchtet wird. - phalloides, ein sehr giftiger Pilz, durch e Lamellen, einen Wulst und oben hohlen biden.

er gebüschelte Blätterpilz (A. fasciculat flach (b, im Durchschnitt), odergelb, n Lamellen, Stiel dünn, hohl, weis. In jeln gesellig an Baumstöden (besonders in rn), im Späthommer und Herbst, giftig, it dem eßbaren Stodschwämmchen (A. erweichelt werden, welches auch an Baumg wachsend vorkommt, sich aber durch einen , in der Mitte mit einem gelblichen zackeichneten Hut und bräunlichweiße oder aschlen unterseidet.

Der Kaiserpilz (A. caesareus). Von und Größe des Fliegenpilzes; aber Hut farbig hochroth, mit einigen großen weis; Lamellen und Stiel gelblich. Höchst der Pilz, unter Eichen und Kastanien in and Süddeutschland.

Der Fliegenpilz (A. muscarius). Hut reit, scharlachroth mit vielen weissen Waren und Stiel weis, letzterer mit dider Wulst i fleischigen Schuppen besetzt, 2—6 Zoll giftig, gemein in sandigen Wäldern. den frischen, wol auch den getrockneten

Pilz, in Stüde zerschnitten und mit Milch übergossen zum Töden der Stubensfliegen, woher der Name.

Fig. 19. Der tödliche Blätterpilz (A. deliciosus), auch Reizker. Hut 1—4 Zoll breit, anfangs fast halbkugelig, dann conver und in der Mitte vertieft, zuletzt fast trichterförmig, oberseits gelb bis orangeroth oder grünlich mit concentrischen Zonen, unterseits ziegelroth, Lamellen und Stiel weis. Fleisch einen dottergelben Milchsaft enthaltend, färbt sich beim Schneiden oder Drücken grünlich oder bläulich. Dennoch ein eßbarer und sehr wohlnehmender Pilz, aber leicht zu vertauschen mit dem giftigen Birkenreizker (A. torminosus): Hutrund einwärts gerollt, Blätter blas fleischfarben, Fleisch mit weissem Milchsaft, Stiel länger, hohl. Beide Pilze wachsen gern in Birkenwäldern.

Gattung Faltenpilz (Cantharellus). Stiel in den Hut übergehend oder fehlend, Unterseite des Huts mit fleischigen an den Stiel hinablaufenden verzweigten Falten besetzt. Hierher gehört der gelbe Pfifferling, Eierschwamm oder Gelbhühnchen (C. cibarius), ein eßbarer, überall in Wäldern häufig wachsender Pilz von etwas scharfem Geschmack und schön orangegelber Farbe (Fig. 5).

Gattung Thränenschwamm (Merulius). Hymenium an neßförmig verbundenen Falten der obern Fläche des ungefielten Huts (Fig. 14). Der Hausschwamm (M. lacrymans), berüchtigt als Zerstörer des Holzwerks in Häusern. Hut fleischig-saftig, unbestimmt geformt, weis, mit weislichmüigen Mäandern, aus denen bei feuchter Luft eine übelriechende Flüssigkeit tropfenweise herausfließt. Sporen rosenroth.

Gattung Stachelpilz (Hydnum). Hut scheibenförmig, oft nur halb ausgebildet, ungefielt oder gestielt, bisweilen verzweigt, fleischig, unterseits mit weichen, selten harten Stacheln oder Zarsen, welche vom Hymenium überzogen sind. — Fig. 8. Der wohlriechende Stachelpilz (H. suaveolens), ein schöner, doch ungenießbarer, im Herbst in Gebirgsnadelwäldern vorkommender Pilz mit oberseits weisem, violett gestreutem Hut und violetten Stacheln. Nicht angenehm, wie Heu.

Gattung Löcherpilz (Polyporus). Hut meist ungefielt, seitlich an Baumstämme angewachsen, seltener gestielt, unterseits von feinen Löchern siebartig durchbohrt, Substanz meist hart, holzig oder korkig, von langer Dauer, selten fleischig. — Fig. 4. Der Zundereschwamm (P. fomentarius), besonders an Stämmen der Rothbuche, liefert den bekannten Feuer-, Zünd- oder Wundschwamm. Eine sehr verwandte Art ist der so häufig an Nesselbäumen vorkommende P. igniarius. — Fig. 15. Der vielköpfige oder doldige Löcherpilz (P. umbellatus), auch Zelttheune und Stodmorchel, ein in Buchenwäldern ziemlich selten vorkommender Erdpilz mit fleischigem, didem, vielfach verzweigtem Stod, dessen Zweige kleine braune Hüte tragen. Sehr wohlnehmend.

Gattung der Röhrenpilze (Boletus). Hut meist fleischig, gestielt, unterseits mit edigen Löchern, den Ausmündungen kantiger Röhren (Fig. 20 b). Fast lauter Erdschwämme. — Fig. 20. Der eßbare Röhrenpilz oder Steinpilz (B. edulis), auch Herrenpilz. Hut 1—3 Zoll breit, dunkelschwarzbraun, Unterseite weislich, Stiel sehr did, fleischig, weis. In Nadelwäldern. Verwandte eßbare Arten: der Kuhpilz (B. bovinus), Butter- oder Semmelpilz (B. confluens) u. a. m.; giftige: der Hegenpilz (B. luridus), von dem ihm ähnlichen Steinpilz durch innerlich karminrothe Hymeniumröhren, violetten, roth geaderten Stiel und beim Schneiden blan anlaufendes Fleisch verschieden; der Satanspilz (B. Satanas), mit blut- oder braunrothen Mündungen der Röhren; in Laubwäldern.

Die Bauchpilze (Gasteromycetes) entwickeln die Basidien im Innern des ebenfalls sehr verschieden geformten Fruchtkörpers, welcher im allgemeinen Peridium genannt wird (im engeren Sinne heißt nur die äußere derbe Haut so). Das Innere, Gleba genannt, bildet eine Menge in Kammern abgetheilte Behälter, deren Innenfläche mit einer Hymeniumschicht, Paraphysen und Basidien überzogen ist (wenigstens bei den vollkommensten Bauchpilzen). Zuletzt platzt die Peridie (meist am Scheitel) und läßt die reifen Sporen, welche als dunkles Pulver die Kammern der Gleba anfüllen, entweichen. Größe und Wohnort der Bauchpilze ist sehr verschieden, kein einziger essbar.

Fig. 24. Der gemeine Bovist oder Pulverpilz (*Lycoperdon verrucosum*). Häufig auf Aedern, Wiesen, Grasplätzen, Triften. Fruchtkörper anfangs fleischschwammig, weiß, zuletzt leberbraun, dünnhäutig, innerlich mit dem schwarzbraunen Sporenpulver erfüllt, welches von einer feinfaserigen Masse (dem capillitium), Nesten des innern Gewebes, durchdrungen ist. Diese Masse ist als blutungsstillendes Mittel angewendet worden. Verwandt ist der besonders gern in Weinbergen wachsende Riesenbovist (*Bovista gigantea*), welcher oft über 1 Fuß Durchmesser erlangt.

Fig. 23. Der Gitterschwamm (*Clathrus cancellatus*). Ein sehr merkwürdiger und schöner Pilz, dessen eiförmiger Fruchtkörper gitterförmig durchbrochen und äußerlich scharlachroth gefärbt ist. Er steht anfangs in einer weißen fleischigen Hülle, welche nach seinem Durchbruch manschettenförmig deren Fuß umgibt, und gleicht deshalb in seiner Jugend einem Ei. Die Gleba sitzt dem Scheitel der Innenfläche des Gitters an und zerfällt endlich zu einer mit den Sporen gemengten abtropfenden Schmiere. Nahe verwandt mit diesem südeuropäischen Pilze ist der auch in Deutschland in Wäldern vorkommende Gitterschwamm (*Phallus impudicus*), auch Giftmorchel und Eichelchwamm, welcher anfangs auch in einer Hülle steht und wie ein Ei aussieht (Hereneier) und einen salzigen auf hohem hohlen Stiele stehenden kegelförmigen grünen, oben durchbohrten Trichter trägt, von dem die Gleba mit den Sporen als eine entseßlich aasartig stinkende Schmiere abfließt.

Fig. 13. Der Topfpilz (*Cyathus Olla*). Kleiner auf altem Holz wachsender Pilz, in dessen trichterförmiger Höhlung linienförmige gestielte Körperchen befestigt sind, welche die Basidien enthalten.

d. Schlauchpilze (Ascomycetes). Die Samensporen entwickeln sich in Schlauchzellen (asci, daher Schlauchsporen, Askosporen), welche bald keulenförmig, bald blasig sind und sich zuletzt am Scheitel öffnen. Die Sporenschläuche bilden sich nur selten unmittelbar aus den Fäden des Myceliums; gewöhnlich sind sie in einen Fruchtkörper eingeschlossen oder auf dessen Oberfläche mit Paraphysen in ein Hymenium zusammengestellt. Die meisten Schlauchpilze sind klein, ja mikroskopisch, viele Schmarotzer. Größte Abtheilung der Pilze, zu welcher unter andern die Aspfasseln, Kern- und Scheibenpilze gehören.

Die Trüffeln (*Tuberacei*). Unterirdische Pilze, die an ihrem den Boden oft weit durchwuchernden Mycelium knollige oft ansehnlich große Fruchtkörper hervorbringen, welche aus einer dicken oft fleischigen Hülle (Peridie) und einem innern Fasergewebe bestehen, dessen Zweigen von blasigen Sporenschläuchen angeschwollen. Sporen einzellig, meist stabelig.

Fig. 18. Gemeine Trüffel (*Tuber cibarium*). Bis zur Größe einer Faust, fleischig, wohlriechend, außen und innen schwärzlich, findet sich in manchen Gegenden (um den Harz, in Böhmen, Italien, beson-

ders aber in Frankreich im District Périgord) in Büchern, namentlich Eichenwäldungen, in lehmigen, thonigen Boden, etwa  $\frac{1}{2}$  Elle unter der Oberfläche, wird durch Hunde und Schweine aufgespürt und im Winter gegraben.

e. Die Kernpilze (*Pyrenomycetes*). Sporenschläuche meist keulenförmig, 8 bald einz., bald mehrzellige Sporen enthaltend, in flaschenförmigen, selten kugelförmigen (Perithezien) eingeschlossen, welche sich zuletzt am Scheitel öffnen und nur selten unmittelbar vom Mycelium gebildet werden (dann stehen sie einzeln oder trichterförmig auf dem Myceliumsfäden), sondern gewöhnlich mehreren oder vielen in einen bestimmt geformten Fruchtkörper (stroma) eingeschlossen sind, der aus dem Mycelium hervortritt. Größte Abtheilung der Schlauchpilze, meist kleine, zum Theil mikroskopische Pilze, welche, worunter eine Anzahl parasitisch.

Taf. 5, Fig. 7. Der gemeine Wehlthau (*Leucosiphia communis*) und Fig. 8, der Traubenpilz (*Tuckermia*). Die Wehlthaufrüchte sind „epiphyte“ Schmarotzer, d. h. bewohnen die Außenfläche ihrer Wirtspflanze, an welche sich ihr gegliedertes Mycelium durch Saugwarzen (Haustorien) festklammert (Fig. 8 a). Dieses entwickelt aufstrebende Zweige, welche sich in Conidienreihen abtheilen (Fig. 8 a) und später einzelnstehende Perithezien (Fig. 7 b), welche durch schlechtige Zeugung entstehen (Fig. 7 a) und blasig mit einzelligen Sporen gefüllte Schläuche (Fig. 7 c) enthalten. Der gemeine Wehlthau bildet weißliche oder schimmelartige Ueberzüge, welche nach der Entwicklung der Perithezien dunkel punctirt erscheinen, an den verschiedensten Pflanzen, welche durch ihn vollständig zerstört werden (am häufigsten werden Getreide von ihm befallen); der Traubenpilz dagegen kommt nur an den Blättern und Beeren des Weinstocks vor und ist die Ursache der berüchtigten Traubentrunkheit, welche namentlich auf Madeira sowie in Süd- und Westeuropa ungeheure Verwüstungen angerichtet hat und ganz Weinplantagen zu vernichten vermag.

Taf. 5, Fig. 9. Der Mutterkornpilz (*Claviceps purpurea*). Das giftige Mutterkorn (a, nat. Gr.) ist kein Auswuchs und keine Degeneration des Getreidekorns, sondern ein Pilz, welcher sich aus den in die Blüten des Roggens und anderer Gräser eingebrachten fadenförmigen Sporen (k) seiner vollkommensten Fructificationsform (f) entwickelt. Durch Reimung dieser Sporen entsteht nämlich ein schimmelartiges Mycelium (*Sphaecelia segetum*), welches allmählich einen Fruchtknoten zerstörenden falgig-ringeligen Körper bildet (b), in dessen Höhlungen auf Basidien gefüllte Conidien abgeknüpft werden (c). Von solchen knüpft sich der „Honigthau“, eine süßliche, überflüssige, klebrige Flüssigkeit, welche von der *Sphaecelia* abgeschieden wird. Allmählich bildet sich dieser Pilz zum Mutterkorn (*Sclerotium clavus*) aus, einem „Zanmycelium“. Nachdem dies abgefallen ist und eine Zeitlang im Boden gelegen hat, brechen aus ihm kugelförmige Körperchen hervor (e), die sich zu kleinen Pilzen mit rothen Stielen und gelblichen Köpfchen (f) entwickeln. *Claviceps purpurea*. Die Köpfe sind Fruchtkörper, welche unter ihren Wärgen (g) Perithezien mit zahlreichen Sporenschläuchen enthalten (h). In jedem der letztern sind 8 fadenförmige Sporen (i, k). Durch Reimung der Conidien (d) vermag sich das Mutterkorn (die *Sphaecelia*) während der Blütezeit des Roggens rasch zu verbreiten.

Taf. 6, Fig. 16. Der Holzkeulenpilz (*Hypomyces polymorphus*). Fruchtkörper holzig, hart, verzweigt, oft geweihförmig, bis über 1 Fuß lang, schwärzlich mit dunkelfarbenen Spitzen, zuletzt schwarz



zahlreich, kleine Hütterchen an den d. (Fig. 17, Längsschnitt, schwach verten Baumstämmen im Herbst. — Fig. 25, Jenschors (Hysterium Fraxini). My: Rinde abgestorbener Eschenzweige, wo die Fruchtkörper entwideln, welche spä Rinde hervorbrechen und als schwarze Büscheln erscheinen. — Fig. 27—29. gelbpilz (Sphaeria fusca). An faulender ifig; 27: natürliche Größe, 28: ein Per: ängsschnitt, vergrößert, 29: Sporen: Saftsfäden, stark vergrößert.

Spilze (Discomycetes) unterscheiden Kernpilzen dadurch, daß die Sporen: Paraphysen gemengt Hymenien bilden, ersläche des sehr verschieden geformten, bald sehr kleinen Sporenträgers über: er gehören unter andere die fleischigen ie Morcheln, Becherpilze u. s. w.

3. 10. Der gelbe Keulenpilz (Clas: Fruchtkörper fleischig, strauchartig ver: gelb, zerbrechlich. In Buchenwäldern, indt: der Hirschschwamm (C. Botrytis), menshofartig gebildet, hell: bis dottergelb, lshmedend, und der Ziegenbart (Spa: , strauchartig verworrene Massen bildend, nit abgeplatteten trausen Zweigen, eben: de in Nadelwäldern. — Fig. 21. Die orchel (Helvella esculenta). Gut 2 — unregelmäßig gefaltet, schwarzbraun, von im überzogen, auf einem kurzen, diden, lichen Stiele. — Fig. 22. Die Spitz: orchella esculenta). Gut anfangs kugelig, rmig, bräunlich, bis 5 Zoll lang, neß: , hohl, in den Gruben das Hymenium el hohl, weißlich. Beide esbar, in Wäl: en Stellen, besonders auf Kalkboden. — Der Becherpilz (Peziza Acatubulum). kugelig, hohl mit weiter Mündung, an che das Hymenium tragend, hellbraun. In äldern auf feuchtem Boden, selten. Die en sind sehr klein, mehrere schmarozen, orpha auf dem Lärchenbaum, den sie zum bringen vermag.

Scheibenpilzen sollen nach den neuesten For: m M. Rees) auch die Hefe: oder Gä: gehören, von welchen bisher als ziemlich nimen wurde, daß sie aus den Sporen oder rschiedener sogenannter Schimmelpilze (be: or: und Penicilliumarten) entstanden, wenn rungsfähige Flüssigkeiten gerieten. Diese n aus kugeligen, sehr stichstoffreichen Zellen, arch Sprossung vermehren (Taf. 5, Fig. 13, erwirken (erregen) den Gärungsproceß und b bei innern Krankheiten des Menschen und ine wichtige Rolle zu spielen, vorausgesetzt, Darmfleisch u. s. w. bei Cholera, Ruhr, ) andern Krankheiten aufgefundenen, durch sich vermehrenden Zellen wirklich Gärungs: Fig. 14 zeigt bei a einen Pilzfaden aus , welcher dergleichen Fesseln entwickelt, elue derselben, bei c und d sogenannte e, welche nach Gallier aus den Sporen pilzen hervorgehen soll. Von allen übr: unterscheiden sich die stets mikroskopisch epilze durch den völligen Mangel des My:

ang. Schleimpilze (Myxomycetes). Noch , vielleicht richtiger zum Thierreich zu stellende n von pilzähnlicher Gestalt, doch ohne My:

celium, welche nicht aus Zellen, sondern bloß aus Proto: plasma bestehen und sich oft langsam fortbewegen. Ver: mehrung durch Sporen, aus denen bewegliche Schwär: mer ausschlüpfen. Hierher gehört z. B. die Kohllüte der Gerber (Aethalium septicum), eine gefrösartige bis handgroß werdende gelbliche, gallertartige Masse, welche in der Gerberlothe vorkommt.

## Zweite Klasse.

### Algenähnliche Sporengewächse (Phycoidae).

(Zafet 7.)

3. Ordnung. Flechten (Lichenes). Lagerpfla: zen, deren Körper gleich dem Fruchtkörper der Pilze aus verfilzten Schlauchzellen besteht und welche sich gleich den Kern- und Scheibenpilzen, denen sehr viele Flech: ten zum Verwechseln ähnlich sehen, durch Absporen fortpflanzen, aber dadurch von allen Pilzen untersch: den sind, daß ihr Gewebe chlorophyllhaltige Zellen (Gonidien) enthält und daß sie sich von unorganischen Stoffen ernähren, also zu assimilieren vermögen. Da: von machen nur wenige Flechten eine Ausnahme, in: dem diese auf Moosen oder auf andern Flechten schma: rozen. Die Mehrzahl der Flechten vegetirt an der Luft und nimmt aus dieser die ihnen nöthige Nahrung (hauptsächlich Kohlensäure); die Unterlage, auf welcher die Flechten wachsen (der Erdboden, Baumstämme, Breterwände, Bäume, Schindeldächer, Steine, Mauern, Felsen, Glasscheiben), dient ihnen als bloße Stütze; nur die auf Kalkstein wachsenden Krustenflechten, deren Gewebe stets kalkhaltig ist, müssen den Kalk durch Auf: lösung in Säure (Kohlen- oder Oxalsäure) in sich auf: nehmen können.

Der Flechtenkörper besteht aus einem dem Mycelium der Pilze entsprechenden, verschiednen, oft unbestimmt geformten Vegetationsorgane, dem Thallus, und aus den aus diesem sich entwickelnden, von ihm getragenen Früchten, den Apothecien, deren Bau theils den Perithectien der Kernpilze, theils den Fruchtkörpern der Scheibenpilze, insbesondere der Pezizen entspricht. Auch kommen bei den Flechten häufig Spermogonien mit Spermation vor. Die Sporen sind meist mehrzellig. Das Gewebe des Thallus ist entweder aus mehreren Schichten verschiednen geformter Schlauchzellen zusam: gesetzt, in welchem Falle die immer kugeligen Gonidien eine bestimmte Schicht (stratum gonimicum) bilden (heteromerischer Thallus), oder ziemlich gleichmäßig aus Schlauchzellen und Gonidien gemengt (homomerischer Thallus). Er erscheint bald als eine fest aufgewachsene dünne oder dicke Kruste (Krustenflechten), bald als ein der Unterlage aufliegendes, nur im Mittelpunkt oder durch Wurzelsafern (Rhizinen) befestigtes, am Rande gelapptes laubartiges Gebilde (Laubflech: ten), bald als ein aufrechtes verzweigtes Strauchlein (Strauchflechten), bald als eine schlaff herabhän: gende bartförmige Masse (Bartflechten). In trocke: nem Zustande ist der Thallus hart, knorpelig, oft sehr zerbrechlich und sind seine Schlauchzellen undurchsichtig, im feuchten dagegen werden letztere durchsichtig und biegsam und lassen die meist grün oder gelb, selten anders gefärbten Gonidien durchschimmern. Deshalb verändern viele Flechten beim Frucht: oder Trocke: werden ihre Farbe und sind im feuchten Zustande stets weich und biegsam, bisweilen gallertartig (Gallertflech: ten). Manche Flechten enthalten eine starckähnliche nahrhafte Substanz (z. B. das isländische Moos, die Renthierrflechte u. a.), viele einen Bitterstoff, einige Farbstoffe (z. B. die Orseille und Ladinusflechte); keine ist giftig.

a. Geschlossenfrüchtige Flechten (L. angio-

corpi). Apothecien meist kugelig oder warzenförmig, zuletzt fast am Scheitel mit einem Loch öffnend, in inneren flachensförmigen Höhlungen Sporenschläuche und Paraphysen enthaltend (Taf. 7, Fig. 10 c). Meist Krustenflechten. — Fig. 10. Die gemeine Wargenflechte (*Pertusaria communis*), eine weißgraue, an Steinen und Baumrinde häufig vorkommende Krustenflechte (a nat. Gr., b vergr., c Längsdurchschnitt eines Apothecium mit 2 Perithezien).

b. Nadtfrüchtige Flechten (L. gymnocarpi). Apothecien scheiben-, schüssel-, becher-, kopf-, rinnen- oder buchtstabenförmig, auf der obern (oft convergen und von einem erhabenen Rande umgebenen) Fläche Hymenien von Sporenschläuchen und Paraphysen tragend (Fig. 12 b).

Fig. 11. Die Becherflechte (*Cladonia coccifera*), eine auf Heideboden wachsende grauweisse Flechte, aus deren kräftigem Thallus sich becherförmige Zweige (Podetien) erheben, die an ihrem Rande die kugelförmigen rothen Apothecien tragen. — Fig. 14. Das Kien-thiermoos (*Cladonia rangiferina*), eine grauweisse Strauchflechte, auf Heide- und Moorboden wachsend, besonders im Norden weite Strecken, bald allein, bald im Verein mit einer andern Strauchflechte, dem isländischen Moos (*Cetraria islandica*), bedeckend. Beide Flechten wegen Stärkegehalt nahrhaft, die zweite sehr bitter und schleimig, wird bekanntlich gegen Lungenleiden und Katarrhe angewendet. — Fig. 15. Die gemeine Bartflechte (*Usnea barbata*), an Baumstämmen, besonders in höhern Gebirgslagen, sehr häufig mit großen tellerförmigen Apothecien. araugrün.

Fig. 12. Die Linden-Schüsselflechte (*Parmelia tiliaacea*), eine an Baumstämmen, besonders Linden, wachsende Laubflechte von weißgrüner Farbe mit braunen schüsselförmigen Früchten. — Fig. 13. Die Schriftflechte (*Opegrapha scripta*), eine Krustenflechte, gemein an glattrindigen Baumstämmen, mit schwarzen, buchstabenförmigen, rinnigen Apothecien. — Fig. 16. Die Pilzflechte (*Baeomyces roseus*), eine auf Heideboden, in Hohlwegen auf Lehm u. s. w. in Wäldern häufig vorkommende Flechte mit grünweißem Krustenthallus und rosenrothen kugeligen Früchten auf Bodetien.

eine Vermehrung durch Zweitheilung (Desmidieen), doch kommt auch bei der Bildung von Samensporen inselnde Copulation vor, worauf hier nicht eingegangen. Die Mehrzahl der Algen ist kommen auch zahlreiche Algengestalten, besonders stehenden Gewässern vor. Besonders lebhaft grün gefärbten Süßwasser, bekannte fiodige Schlamm, welche die Leiche oft auf weite Strecken hin, den sinkt und im Frühjahr wieder aus des Wassers sich erhebt. Die Rume die größten lederartigen, meist einzeln Arten Tange genannt zu weiten möglichen Farben; viele von ihnen tiefsten Purpurroth und Violett. Algen iodhaltig; die Tange werden deshalben benützt. — Die Algen bilden theilung unter den Sporengewächsen, die größte, und zerfallen in eine Anzahl Familien. Die Beschränktheit des Körpers einige Repräsentanten der Pflanzenkörper vorzuführen.

Taf. 7, Fig. 1 und 2. Stäbchenalgen; und zwar Fig. 1 *Diatoma flocculosum*, Fig. 2 *Cyclotella viridis*, b *Frustulia viridula*. Die Stäbchenalge ist vergrößert. Die Diatomeen sind mitreife, Algen von laub-, stab-, spindel-, kegelförmiger Gestalt, welche bald einzeln schwimmen und sich dann scheinbar bald zu Colonien vereinigt (Fig. 1). Gegenstände angeheftet sind. Häufig in reinen Wässern, Torfgräben, auch im Seewasser eine Fadenalge (*Zygnema quatuordecim*) b ein Stück Faden stark vergrößert. Der Körper besteht aus aneinandergerückten, jebe ein Spiralband von Chlorophyll. — Fig. 4. Eine Gallertalge (*Gelidium viridis*). Zu den einzelligen Algen gehören gallertweichen Kugelszellen bestehend, zur Theilung vermehren. An Baumstümpfen. — Fig. 5. Die Froschlaischalg (*Bacillaria moniliforme*). Eine zierliche, schleimige Quellen und Bächen an Steinen häufig schön grüner, olivengrüner oder fadenförmig, welche dem bloßen Auge wie aus Leuchtstein zusammengefügt erscheint (s. nat. hist. das Mikroskop zeigt, daß sie aus einem quirlförmig angeordneten Asthöcker bestehen). — Fig. 6 *Plocamium purpureum* und *Agardhiella subulnacea*, die beiden letzteren der Nordsee, sind Repräsentanten der durch die Farbe und Form sehr eigenthümlichen, ausgezeichneten Gruppe der Blumenträger. — Fig. 6, b ein Stück vergrößert mit *Agardhiella sanguinea* ahmen die Meerestiere der Form von Blättern den See nach. — Fig. 7. Der Blasentang (*Enteromorpha flexilis*), einer der verbreitetsten Meeresalgen und Ostsee gemein, hält sich durch verästelte luftfüllende Räume (Schwimmblätter) schwebend. Textur lederartig, grünlich braun. Die Endlappen tragen zahlreich, welchen die Fructificationsorgane sitzen. Der schwimmende Beerenstrang (*Sargassum muticum*) hält sich im Meerwasser schwebend, stielte beerenförmige Luftbehälter, welche in tiefen Meere im Verein mit anderen Tangmassen die große Sargassobank bilden.

## Dritte Klasse.

mit geschlechtlosem Vorkerne verschiedene Stammsporenpflanzen (Cormophyta procambryonata).

(Zaf. 7.)

5. Ordnung. Armleuchtergewächse (Characeae). niedergetauchte, chlorophyllreiche Wassergewächse, welche mittels Rhizoiden (Haare) im Schlaume wurzeln, aus nem einfachen oder verzweigten, knottig gegliederten, mit quirlförmig angeordneten Blättern besetzten Stengel bestehen und sich durch geschlechtlich erzeugte Sporen fortpflanzen, nebenbei (wenigstens manche Arten) auch noch durch Brutknospen (Brutkörper) vermehren (Zaf. 7, Fig. 34). Ihr Stamm besteht entweder aus einer Reihe langgestreckter Epilimbenzellen (Nella), oder es sind um einen arilen Strang solcher Zellen gestreckte Rindenzellen in spiralförmiger Richtung gewunden (Chara, Fig. 34, 35). Die Blätter (nach andern Aeste) bestehen bald nur aus einer Elle, bald aus mehreren und erscheinen dann gefiedert (Fig. 34). Am Grunde der Blätter sitzen die Fruchtscheidungsorgane, theils männliche (Antheridien), kapselförmige, höchst complicirte Gebilde, welche zahlreiche Spermatozyten entwickeln, theils weibliche (Spermatokospen), keulenförmige Organe, welche eine große Zelle einschließen, die sich infolge der Befruchtung durch die Spermatozyten zu einer Samenpore entwickelt. Die imende Spore bildet bei Chara einen Vorkeim, aus dem später die neue Pflanze hervormacht, während bei Nella sich unmittelbar aus dem Keimförmchen der Spore eine neue Pflanze entwickelt. Die Characeen bilden somit den Uebergang von den Thalophyten zu den Cormophyten. Sie wachsen in stehenden, namentlich süßen Gewässern. Manche Arten erreichen mehrere Fuß Länge, viele zeichnen sich durch Auscheidung von tolnen Kalk aus und werden dann sehr zerbrechlich. — (Fig. 34. Der gemeine Armleuchter (Chara vulgaris), in stehenden Wässern häufig. Fig. 35 ein Blattnoten nebst ausstehendem Antheridium, vergrößert.)

6. und 7. Ordnung. Lebermoose (Hepaticae) und Laubmoose (Musci). Vielzellige, chlorophyllreiche, daher meist schön grün gefärbte Stammsporengewächse, der Mehrzahl nach mit deutlich beblätterter Stängel, welche an ihrem Stamm, oft erst nach mehrbrüchigem Vegetiren, männliche (Antheridien) und weibliche (Archegonien) Geschlechtsorgane entwickeln, orauf aus der befruchteten Eizelle des Archegoniums ein eigenthümliches, mit dem Mooskörper gar nicht orminisch verbundenes, doch von ihm ernährtes Gebilde das Sporogonium hervorgeht, das sich zu der die einzelligen Sporen enthaltenden Frucht weiter entwickelt. Antheridien und Archegonien sind oft mit verdickten geformten, bisweilen sogar bunt gefärbten Hüllstücken umgeben oder voneinander getrennt, sodas den Läten der Stammpflanzen ähnliche Gebilde entstehen (Aesblüten). Die Moose ernähren sich ausschließlich in anorganischen Stoffen und wachsen der Mehrzahl nach auf feuchter Erde, an schattigen Felswänden und ausmüllamen, auf Steinblöden, seltener auf dürrern, nassen Boden, am seltensten im Wasser.

Die Lebermoose haben der Mehrzahl nach eine gelige, gewöhnlich mit vier Klappen trennweise aufspringende, bisweilen auch mit mehrern Zähnen sich öffnende Frucht (Sporentapfel, Taf. 7, Fig. 24), seltener eine keulenförmige, zweiflappige (Fig. 23) oder eine gelige, geschlossen bleibende Frucht (Riccia). Bei der Entwicklung aus der Eizelle durchbricht dieselbe eine Scheidewand des Archegoniums, welches meist eine Scheide am Grunde der Frucht (Fig. 23) oder seltener vorhanden und dann immer sehr zarten weichen Fruchtstiel (Fig. 24 b) zurückbleibt. Die Frucht

ist immer unverhüllt (nadt). Die keulenweise oder mit Zähnen aufspringenden Sporentapfeln enthalten stets elastische, schlauchförmige, mit einer oder zwei Spiralfasern ausgekleidete Zellen, welche beim Aufspringen der Frucht sich plötzlich ausstrecken und die Sporen fort-schnellen (Schleudern, Clatieren, Fig. 20; stark vergr.). Die Lebermoose zerfallen in laubartige (H. frondosae) und beblätterte (H. foliosae oder Jungermanniaceae). Bei erstern ist der Körper noch nicht deutlich in Stamm und Blätter differenzirt, sondern bildet ein bald unregelmäßig, bald regelmäßig gelapptes oder zertheiltes Laub (Fig. 17, 18, 22, 24), während bei letztern der meist gabeltheilige Stengel mit vielen äußerst zart gebauten, gewöhnlich zweiflügel angeordneten Blättern besetzt erscheint (Fig. 23). Aus der keimenden Spore geht gewöhnlich unmittelbar die neue Pflanze hervor, nur wenige Lebermoose bilden zunächst einen laubartigen Vorkeim. — Fig. 17. Die gewimperte Riccia (Riccia ciliata), a nat. Gr., b vergrößert. Auf Leichschlamm, hin und wieder. — Fig. 22, 23. Das Hornmoos (Anthoceros laevis), mit schotenförmigen Früchten, deren Sporen an einem Stiele sitzen, ohne Schleudern. Auf feuchten Aedern, selten (22 nat. Gr., 23 vergr.). — Fig. 18—21. Das gemeine Lebermoos (Marchantia polymorpha), an feinem Wassertrögen, Bachrändern, quelligen Orten, auf feuchter Gartenerde, Gewächshäusern häufig. 18 weibliche, 21 männliche Pflanze in nat. Größe. Bei beiden sind die Fortpflanzungsorgane an getheilten Scheiben (receptacula) befestigt, bei der weiblichen Pflanze diese Scheiben concav, sternförmig gefaltet, an ihrer untern Seite die Archegonien und später die Kapseln tragend (Fig. 19, vergr.); bei der männlichen sind die Scheiben flach, leicht gekerbt und tragen die Antheridien in sternförmiger Gruppe auf der obern Fläche (Fig. 21 b, vergr.); der aus Versehen gezeichnete Stiel ist wegzubehalten. Fig. 20, Schleuder mit Sporen, stark vergr. — Fig. 24. Der Ohnerv (Aneura palmata), an faulen Baumstümpfen, auf feuchtem Lehm-boden in schattigen Wäldern (a nat. Gr., b vergr.). — Fig. 25, 26. Die breitblättrige Jungermannia (Jungermannia platyphylla), an schattigen Bäumen und Felsen, lodere Klauen bildend. Die untere Seite dieses Lebermooses ist mit Nebenblättern besetzt (Fig. 26, vergr.).

Die Laubmoose unterscheiden sich von den Lebermoosen durch die mit einer Mütze (calyptra) verschiedene Sporentapfel, welche sich meist mit einem Dedel öffnet und deshalb Büchse (theca) genannt wird, durch den verben, meist rothbraunen Fruchtstiel (Vorste, seta), durch den Mangel der Schleudern, durch ihren viel verdickten Bau und dadurch, daß bei allen aus der keimenden Spore zunächst ein consernuarartiger Vorkeim (proembryo oder protomeina) entsteht, aus dessen Knospen der beblätterte Moosstengel hervormacht. Nur wenige Gruppen von Laubmoosen haben eine geschlossen bleibende Frucht (Phascum), oder eine mit Klappen aufspringende (Andreaea, Fig. 28), oder eine nadt, gleich den Lebermoosen. Das letztere ist bei den Torf- oder Wassermoosen (Sphagnum) der Fall, welche überhaupt manches mit den Lebermoosen gemein haben. Diese auf Torfboden und an nassen Waldstellen gesellig wachsenden Moose, aus deren abgestorbenen und verholzten Stengeln der Torf oft ausschließlich besteht (der Stachtorf), ausgezeichnet durch einen sehr merkwürdigen Zellenbau, der sie zur Aufsaugung und Festhaltung des Wassers befähigt, haben meist eine bleiche, gelbgrüne oder strohgelbe oder bräunliche, seltener röthliche bis purpurrothe und violette Farbe und bilden weiche, elastische Klauen. Fig. 29 zeigt eine der gemeinsten



ten (*Sphagnum subsecundum*), Fig. 30 dessen aufgesprungene Kapsel vergrößert. — Fig. 27. Das Alpenmoos (*Andreaea alpina*), klein, schwarzgrün, in dichten Polstern auf Steinblöcken in Hochgebirgen. Fig. 28 die aufgesprungenen Frucht, vergrr. — Fig. 31. Das glänzende Astmoos (*Hypnum splendens*). In Wäldern auf schattigem, feuchtem Boden (Fig. 32, a die Büsche mit der Nüße, vergrr.). Bei den Astmoosen, welche vorzugsweise den Moosteppich unserer Nadelwälder bilden, sowie bei sehr vielen andern ist die Mündung der Büsche mit hygroskopischen Zähnen (Mundbesatz) versehen, welche erst nach dem Abspringen des Deckels sichtbar werden und sich dann ausbreiten (Fig. 32, b stark vergrr., c drei Sporen, ebenso). — Fig. 33. Der Widertthon (*Polytrichum juniperifolium*), häufig auf feuchtem, undurchlassendem Boden in Wäldern. Bei dieser Gattung ist die Nüße mit abwärts gerichteten Haaren bedekt, die Büsche vierkantig und mit einem geschnäbelten Deckel versehen (Fig. 33, vergrr.). Die Mündung hat einen aus 32 oder 64 Zähnen bestehenden Mundbesatz und ist durch eine horizontale zarte Haut (Zwerchfell) geschlossen. Die Widertthonarten sind zweihäusige Pflanzen, die männlichen Individuen tragen kleine, schön rothe, rosettenförmige Blüten an der Spitze des stets einfachen Stengels.

#### Vierte Klasse.

Alle Geschlechtsorgane tragendem Vorklein verschiedene Stammsporenpflanzen (Cormophyta prothallionata).

(Tafel 8 und 9.)

8. Ordnung. Farn (Filices). Ausdauernde (sehr selten einjährige) Gefäßsporenpflanzen mit meist unterirdischen, seltener oberirdischen reichbeblätterten Stämmen und chlorophyllreichen, daher gewöhnlich schön grün gefärbten, zusammengelegten oder zertheilten, selten einfachen und ganzen Blättern, welche anfangs meist uhrfederartig zusammenengerollt sind und von denen entweder alle oder nur einzelne von bestimmter Form zahlreiche Sporenkapseln an ihrer untern Fläche, selten an beiden entwickeln. Vorklein als zweilappiges Laub ausgebildet, an dessen unterer Fläche Anteridien und Archegonien neben zahlreichen Wurzelhaaren stehen. Aus der durch die mit bewimpertem Schweiß versehenen Spermatozoiden der Anteridien befruchteten Eizelle des Archegoniums entwickelt sich das erste Blatt der neuen Pflanze (Taf. 8, Fig. 7 f). Die Farn vegetiren insgesammt an der Luft und wurzeln entweder im Boden oder sind durch zahlreiche Adventivwurzeln an Baumstämmen und Felswände angeheftet. Sie ernähren sich nur von anorganischen Stoffen, lieben der Mehrzahl nach einen feuchten und schattigen Standort und sind vorzüglich Bewohner der wärmern Zonen. Die Farne zerfallen in folgende 8 Familien:

Fam. 1. Echte Farn (Polypodiaceae). Sporenkapseln mit zarter, aus einer einfachen Zellschicht bestehenden Wandung und einem verticalen, unvollständigen, elastischen Ringe, welcher durch einen Querspalz aufreißt und die Kapsel öffnet (Taf. 8, Fig. 1 b). Die Sporen sind meist tetradrisch, die Kapseln zusammengebrückt, oft gestielt, gelblich oder bräunlich. Die Polypodiaceen, zu denen die Mehrzahl der Farne gehört, sind meist Kräuter mit kriechenden unter- oder oberirdischen, reich mit braunen Schuppen (Sporenbältern) bedekten Stämmen, seltener aufrechte Bäume (Baumfarn) mit palmenartiger Krone, großen fiedersförmig zusammengelegten oder zertheilten Blättern an ihrer Spitze, ihre Blätter (Wedel) in der Regel ein- bis dreifach fiedersförmig oder fiederschnittig oder auch gefiedert, selten einfach und ganz (Taf. 8, Fig. 9), die

Ab schnitte oder Fiedern von gabel- oder fiedersförmig, die Stiele der Blätter meist von zierlicher Bildung (Fig. 7 g) bezeugt. Die Sporenkapseln stehen in bestimmten Gruppen (Fruchthäuschen, sori), welche (Fig. 1 a) oder mit einer zarten Membran bald ganz, bald nur theilweise bedekt sind (Fig. 7 a). Nade Fruchthäuschen haben 1-2 Stielen Polypodium, Ceterach, Gymnomorphaceen die Gattungen *Asplenium*, *Asplenium*, *Adiantum*, *Pteris* und *Scolopendrium*.

Taf. 8, Fig. 1. Der gemeine Farn (Polypodium vulgare), mit  $\frac{1}{2}$  bis 1 Fuß lang fiedersförmig fiedersförmigen Blättern und nach unten gerichteten Fruchthäuschen (a), wächst in Gärten und einem großen Theil Europas an Felsen und Baumstämmen, und hat einen kriechenden, bespinnneten Stamm, welcher unter dem Namen (Rad. Polypodii s. Filiculae dulcis) als Heilmittel officinell ist.

Fig. 2. Der Buchenfarn (*Polypodium pteris*), ein in Laubwäldern, besonders in Buchenbeständen sehr häufig vorkommendes, seltens Farnkraut mit kriechendem, verästelt sich brechenden Blattstielen, doppeltfiedersförmigen und fiederspaltigen Blattabschnitten, die untere Seite mit punktförmigen braunen Punkten besetzt ist.

Fig. 3. Der gemeine Streifenfarn (*Polypodium Trichomanes*), in Feld- und Mauerritzen hat ein saferiges Rhizom und büschelförmig 4-6 Zoll lange, einfach gefiederte Blätter mit schwarzem Stiel und sehr verdichteten Blättchen. Die Fruchthäuschen bilden, in Arten von *Asplenium*, längliche, quere, von der einen Seite her mit einem kleinen Deckel bedekt sind (Fig. 3 a).

Fig. 4. Die Mauerrauhe (*Asplenium muricatum*), an ähnlichen Orten wie der vorhergehende und gleich diesem ehemals officinell, hat zweifach fiederschnittige Blätter, deren übriges sehr verschieden geformte, fächerförmig gruppierten Fruchthäuschen (Fig. 4 a).

Fig. 5 zeigt eine Art der zierlichen Farn (*Asplenium*), bei welcher die Fruchthäuschen in Blättchen des meist sehr zusammengelegten, verborgenen unter umgeschlagenen Blättern, zuletzt braunen Lappchen des Randes gleich als Schleier dienen. Hierher gehören die Südeuropa und schon in Süddeutschland in schattigen und steinigen Orten wachsenden (*Adiantum Capillus Veneris*), dessen Krone unsere Abbildung zeigt ein Stück eines in unsern Gewächshäusern sehr cultivirten Brasilien in natürlicher Größe.

Fig. 6. Der weibliche Farn (*Asplenium Filix femina*), wol das gemeinste der wachsenden Farnkräuter, hat doppelt bis dreifach fiederschnittige Blätter, welche 1-3 Fuß lang und fiedersförmig Büschel an Ufern und in feuchten Wäldern bilden. Die fiederschnittigen tragen winkelförmige Fruchthäuschen, welche anfangs von einem nierenförmigen Schleier (6 b) verhüllt sind, später, worauf die ganze untere Seite der braunen Sporenkapseln bedekt erscheint.

Fig. 7. Der männliche Farn (*Aspidium Filix mas*) unterscheidet sich von dem vorhergehenden durch die breiteren, un-

Schnitte der Blätter und die rundlichen, welche mit einem nierenförmig-rundlichen Schleier bedeckt sind (7 a, b), hülischen Orten in ganz Europa. Sein Stod dient als Mittel gegen den Wund:

Der Adlerfarrrn (*Pteris aquilina*), ein Farrrn in Wäldern auf trockenem und orboden häufig vorkommendes, gefellig arrntraut mit aufrechtem, mehrblättrigem, hohem Stengel, dessen zwei- bis dreittigen Blätter längs der Ränder gestielte (h) entwickeln, die von dem schmalen, Schleier bedeckt sind (a). Der Name rautz, welches in Gegenden, wo es massen- zu Streu und Dinger benutzt wird, kommt daß die Gefäßbündel des Stengels auf a Querschnitt eine Gruppe bilden, die dem Doppeladlers bisweilen ziemlich ähnlich

Die Hirschzunge (*Scolopendrium officinale*) einfache und ungetheilte Blätter aus- welche mit Einschluss des spreublärtigen 1 1/2 F. Länge erreichen und zu beiden Mittelrippe schiefe, parallele, streifenförmige en mit dünnem, bald verschwindendem vickeln; wächst hin und wieder in Deutsch- er in West- und Südeuropa an schattigen Mauern und war früher officinell.

Epytheaceen (*Cyatheaaceae*). Meist der wärmern Zonen, unterscheiden sich von diaceen, denen sie sehr ähnlich sind, durch digen und schiefe gestellten breiten Ring der lu (Taf. 9, Fig. 4). In Europa fehlen ganz, mehrere werden häufig in den Ge- n kultivirt.

Fig. 1—4. *Alsophila armata*, ein stattlicher Brastliens mit 7—8 F. langen, dreifach gen Blättern, deren Zipfel die von geglie- n umgebenen Fruchthäuschen (3) in zwei der untern Fläche tragen. Die Blattstiele ern Theil stachelig, nach oben hin dicht mit n Spreuschuppen besetzt. Bei manchen Epa- B, dem auf Sumatra wachsenden Balan- a, ist der Stamm mit langen Haaren be- als blutungstillendes Mittel (paleae Ci- awar, Paku Kidang) Verwendung finden.

7. *Balanium arborescens*, ein Baumsfarrrn mit Stiele mit 10 F. hohem Stamm b fiederschnittigen Wedeln, deren Abschnitte ndern nackte Fruchthäuschen tragen (Fig. 7). ist ein Querschnitt des Stammes abgebil- die seltamen hufeisenförmigen Gefäßbündel

Hautfarrrn (*Hymenophylleae*). Kleine er mit garten, aus einer einzigen Zellschicht Blättern. Sporenkapseln zart, mit vollstän- sen oder queren Ringe (Fig. 11), mit einem aufspringend, innerhalb einer becher- oder en zarten Hülle an einem oft weit hervor- Stiele (receptaculum) befestigt (Fig. 9 und 7 von wenigen gabeltheiligen Nerven durch- sche sich in den Spitzen der Blattzipfel um- um Fruchträger verlängern. Mit Ausnahme i weißlichen Europa vorkommender Arten sind 7rrn Bewohner der wärmern Zonen, wo sie an Baumstämmen und Felsen wachsen. gt einen im tropischen Amerika heimischen (*Trichomanes Bancroftii*) in natürlicher

Fam. 4. *Gleicheniaceae* (*Gleicheniaceae*). Farrrn- trüder mit meist gabeltheiligem Stengel und mehrfach gefiederten oder fiederschnittigen Blättern, an deren un- terer Fläche nackte, mit einem vollständigen queren Ringe versehene, mittels eines Längspaltess aufspringende Kapseln sitzen. Bewohner der Tropengegenden, beson- ders der südlichen Halbkugel, Chinas und Japans.

Fam. 5. Spaltfarrrn (*Schizaeaceae*). Sporen- kapseln sitzend, mit einem endständigen, bedelförmigen Ringe versehen (Fig. 13), mit einem Längspalt auf- springend. Farrrntrüder der Tropengegenden und Nord- amerikas mit sehr verschieden geformten Blättern, von denen gewöhnlich nur einzelne eigentümlich geformte fruchtbar sind. Fig. 12, 13. *Schizaea bifida*, ein in Neuseeland und Nordaustralien wachsender Spaltfarrrn mit langgestielten, 6—18 Zoll langen Blättern.

Fam. 6. Traubenfarrrn (*Osmundaceae*). Sporen- kapseln zart, sitzend, mit einem gipfelförmigen queren, aber nur halb ausgebildeten Ringe, mit einem Längs- spalt zweiflappig aufspringend (Fig. 16). Farrrntrüder mit aufrechtem beblätterten Stengel und gefiederten Blättern, von denen die obersten die Sporenkapseln entwickeln, welche, die zusammengezogenen Fiedern dicht bedeckend, traubenförmig angeordnet erscheinen (Fig. 15). Fig. 14 zeigt den obern Theil des in Europa an sumpfigen Waldstellen vorkommenden Königsfarrrn (*Osmunda regalis*), welcher bisweilen manns hoch wird, stark ver- kleinert. Die Fruchttrauben und das Mark des Wurzel- stods waren früher officinell.

Fam. 7. Marattiaceen (*Marattiaceae*). Sporen- kapseln derbwandig, lederartig, ohne Ring, entweder einzeln, frei, mit einer Längspalte nach innen auf- spaltend oder unter sich verwachsen, ein mehrfächeriges Fruchthäuschen bildend, dessen Fächer sich mit einem Längspalt oder einem Loche öffnen. Stattliche, zum Theil baumartige Farrrn mit verschieden geformten, bis- weilen sehr großen mehrfach gefiederten Blättern, welche am Rande oder der untern Fläche die Sporenkapseln oder Fruchthäuschen tragen. Bewohner der Tropen- gegenden und der südlichen Halbkugel.

Fam. 8. Aehrenfarrrn (*Ophioglossaeae*). Sporen- kapseln derbwandig, lederartig, ohne Ring, mit einem Querspalt klappenartig aufspringend (Fig. 18), sitzend, ährenförmig gruppiert. Farrrntrüder mit faserigem oder knolligem Wurzelstod, der nur wenige Blätter (oft nur eins) entwickelt. Blätter in zwei einfache oder verschie- den zerschnittene Segmente getheilt, von denen das obere die Kapseln an den Rändern entwickelt und deshalb immer stark zusammengezogen ist. — Fig. 17. Diese Familie besteht nur aus den Gattungen *Ophioglossum* und *Botrychium*. Die gemeine Ratterzunge (*Ophioglossum vulgatum*), auf trodenen Grasplätzen wach- send, hat ungetheilte Blattsegmente, von denen das obere eine schwächte spize Fruchthöhle bildet. — Taf. 8, Fig. 10. Die Mondraute (*Botrychium Lunaria*), mit fiederschnittigen Blattsegmenten und deshalb verz- zweigter Fruchthöhle, wächst an ähnlichen Orten. Beide waren früher officinell.

Die Farrrn bilden die größte Abtheilung der Gefäß- sporenpflanzen und kommen namentlich in den Tropen- gegenden in vielen Gattungen und Tausenden von Ar- ten vor. Viel massenhafter müssen diese Pflanzen aber in jener fernern Periode der Bildung unserer Erdrinde, welche mit der Entstehung der Steinkohlenformation endete, aufgetreten sein, da die Steinkohlen großen- theils aus den verkohlten Resten von Farrrn, nament- lich von Baumsfarrrn, bestehen.

9. Ordnung. Schwachtelbalme (*Equisetaceae*). Ausdauernde krautartige Gewächse mit gegliederten ober- und unterirdischen Achsen, deren Glieder hohl und deren

Knoten mit gezähnten oder zerschlitzten Scheiden besetzt sind, die ihrerseits aus einem Kreise unter sich verwachsener kleiner Blätter bestehen. Die unterirdischen Achsen entwickeln an ihren Knoten Adventivwurzeln und Knospen, aus welchen die oberirdischen Stengel hervorragen (Taf. 9, Fig. 19). Letztere sind entweder einfach oder quirlförmig (Fig. 20) und tragen entweder eine einzige Fruchtblähre an ihrer Spitze oder solche auch an den Spitzen der Äste (dann gewöhnlich nur der obersten), welche wieder entweder einfach oder mit Seitenzweiglein besetzt, übrigens ebenso wie der Stengel gebaut sind. Die Fruchtblähren bestehen aus übereinandergestellten Wirteln von gestielten schildförmigen Schuppen mit sechseckigem Schild (Fig. 21), an deren unterer (innerer) Fläche sackförmige Sporenbehälter angebracht sind, welche schließlich anspalten und die kugelförmigen, meist graugrün gefärbten Sporen als ein feines Pulver ansstreuen. Jede Spore ist von zwei elastischen Fäden (Eclateren, Schleudern) umschlossen, welche beim Ausplatzen der Sporenfäden sich ausdehnen und dadurch die Spore fortzuschleudern (Fig. 22). Die keimende Spore entwickelt einen unregelmäßig gelappten Vorkeim, welcher entweder nur Antheridien oder Archegonien hervorbringt. Die Vorkeime der Schachtelhalme sind also zweifachig. Auch hier wird die Eizelle des Archegoniums durch die mit einem spiralförmig gewundenen und gewimperten Schweif versehenen Spermatozoen der Antheridien befruchtet und wächst hierauf aus derselben die erste Achse der neuen Pflanze hervor. — Nach der Fruchtentwicklung zerfallen die Schachtelhalme 1) in solche, welche zweierlei Stengel, fruchttragende, zur Zeit der Fruchtentwicklung stets einfache, und unsprößbare, immer quirlförmige Stengel hervorbringen, und 2) in solche, bei denen die Stengel alle gleichgestaltet, bald einfach, bald verzweigt sind und Fruchtblähren an ihrer Spitze oder an den Achsen zu entwickeln vermögen. Zu den erstern gehört der in Fig. 19 — 22 abgebildete Aderschachtelbaum (*Equisetum arvense*), auch Schachtelalm, Pferde-, Katzen- und Dummel genannt, bekanntlich ein sehr lästiges Unkraut mergeliger und thoniger Acker; zu der zweiten Gruppe der hin und wieder in Teichen wachsende, immer unverzweigte Polierschachtelhalme (*E. hyemale*), dessen harte Stengel zum Polieren der Wäbelen benutzt werden. — Die Schachtelhalme lieben der Mehrzahl nach einen nassen, sumpfigen Boden, viele wachsen auch in stehenden Wässern. Nahe verwandt mit ihnen scheinen die kammartigen Calamiten der Vorwelt gewesen zu sein, deren gegliederte und cannelirte Stämme theils verholzt, theils versteinert in den Schichten der Steinkohlen- und Buntsandsteinformation gefunden werden.

10. Ordnung. Bärlappgewächse (*Lycopodiaceae*). Ausdauernde Gefäßsporenpflanzen mit kriechendem und wurzelndem, selten aufrechtem, gabeltheiligem Stengel, welcher mit kleinen nadel- oder schuppenförmigen Blättern besetzt ist und deshalb sehr häufig ein moosähnliches Ansehen hat. Die Sporenkapseln stehen entweder unter dachziegelförmig sich deckenden Bracteen in endständigen Aehren (Taf. 9, Fig. 23) oder befinden sich in den Winkeln der oberen Blätter des Stengels oder der Äste. Bei den eigentlichen Bärlappen (*Lycopodium*) hat man bisher nur eine Form von Sporen in den mit einem Querspalz sich öffnenden Kapseln (Fig. 24) gefunden, welche man noch nicht hat zum Keimen bringen können, bei andern (*Selaginella*) befinden sich in der einen Kapsel wenige große Sporen (Makrosporen), in der andern viele kleine Sporen (Mikrosporen). Letztere erzeugen Antheridien, durch welche das einzige Archegonium, das sich an dem inner-

halb der keimenden Makrospore sich bildenden und endlich deren Hülle zer sprengenden Vorkeim entwickelt, befruchtet wird. Aus der befruchteten Eizelle des Archegoniums entwickelt sich auch hier die neue Pflanze. — Fig. 23 zeigt einen Theil des in trockenen Pflanzendern und auf Seideboden häufig wachsenden gemeinen Bärlapps (*Lycopodium clavatum*) in natürlicher Größe. Seine ein feines schwefelgelbes Pulver bildenden Sporen werden bekanntlich unter dem Namen Samen Lycopodii zum Bestreuen der Billen und anderer Hautstellen (als Einstreupulver) benutzt, sowie, da sie sich an der Lichtflamme entzünden und explosiren, zur Hervorbringung von Theaterblitzen, weshalb sie auch die Namen Blispulver und Herzmehl erhalten haben. Den Lycopodien sind die in verholzten, oft riesigen Stämmen in der Steincohlenformation verkommenen Schuppenbäume (*Lepidodendron*) offenbar nahe verwandt gewesen. Zu den Lycopodiaceen wird auch die Gattung der Brausenkräuter (*Isaetes*) gerechnet, aus Grasbüscheln ähnlichen Pflanzen bestehend, welche der Mehrzahl nach in stehenden Gewässern wie ein Sumpfboden wachsen und innerhalb der klaffen Scheiden Kapseln mit Makro- und Mikrosporen tragen, die sich ebenso wie bei *Selaginella* verhalten.

11. Ordnung. Wurzelfrüchtler (*Rhizocarpaceae*) oder Wasserfarne (*Hydropterides*). Ausdauernde, auf dem Grunde flacher Gewässer kriechende oder in Schlamm wurzelnde, oder einjährige, auf der Oberfläche stehender Wasser frei schwimmende Pflanzen, deren Früchte an der Basis der Blätter oder zwischen den Wurzelfasern sitzen. Wie bei *Isaetes* und *Selaginella* kommen bei diesen Gewässern Makro- und Mikrosporen vor, welche entweder in einer und derselben Frucht oder in besondern Früchten eingeschlossen sind. Das erste ist z. B. bei dem in Fig. 25 in natürlicher Größe abgebildeten Willenkraut (*Pilularia globifera*) der Fall, wo jede der kugelförmigen Früchte vier vertical gestellte Fächer enthält (Fig. 26 im Längs-, Fig. 27 im Querschnitt, vergrößert) und in jedem Fache an einer an dessen peripherischer Seite vom Scheitel zur Basis verlaufenden Längswand eine Menge bläsender Sporen sitzen, die unter Makro-, oben Mikrosporen enthalten (Fig. 28 zeigt einen Theil einer solchen Walle mit Mikrosporenfäden, stark vergrößert). Jede der kugelförmigen Mikrosporen erzeugt ein Spermatozoid mit gewundenem Schweif. Bei der Keimung der Makrosporen aller Rhizocarpaceen bildet sich im Scheitel der Spore ein kleiner Vorkeim, welcher warzenförmig aus dem Spalt der ausplatzen Spore hervortritt und im Archegonium entwickelt, nach dessen Befruchtung unter- und innerhalb des Vorkeims bereits entstandener Keim sich zu einer neuen Pflanze weiter entwickelt. Die gekleinerte Makrospore der Rhizocarpaceen hat deshalb schon viele Aehnlichkeit mit dem keimbaltigen Samen der höhern Pflanzen, namentlich der Monokotyledonen, wo der Keim auch umhüllt ist von seinem Kotyledon, der freilich, wie bei allen Samenpflanzen, innerhalb der Samenhülle eingeschlossen liegt und keiner Befruchtung bedarf, um sich zu einer neuen Pflanze zu entwickeln. Die Wurzelfrüchtler sind seltene und dabei sehr verschiedene Gewächse. In Deutschland kommen nur drei zu drei verschiedenen Gattungen gehörende Arten vor, nämlich außer dem Willenkraut, welches im Schlamme von Teichrändern und in Sümpfen wächst, noch die zerblättrige Marsilie (*Marsilea quadrifolia*), in stehenden Gewässern West- und Süddeutschlands auf dem Ufer umherkriechend, und die schwimmende Salvinie (*Salvinia natans*), in Teichen hin und wieder schwimmend. Bei letzterer befinden sich die Makro- und Mikrosporen in besondern Früchten.



## Fünfte Klasse.

ichtige Samenpflanzen ohne Keimledonen (Nothocarpaceae acotyledoneae).

(Tafel 17.) \*

ung. Wurzelblätter (Rhizantheseae), nicht grün gefärbte Schmarogergewächse, Blätter, mit eingeschlegelten Blättern, fast ganz und gar aus Grundgewebe bestehend nur von wenigen, noch dazu sehr unentwickelten Gefäßbündeln durchzogen ist. Blätter gänzlich entbehrenden Rhizantheseen sind gewissermaßen die Formen der Fleischeigenen sind die Blätter als fleischig, zelig gedrängt stehende Schuppen entwickelt (Cytinus). Die Blätter besitzen ein entzündet ausgebildetes Perigon und sind meist von Haften jedoch riesengroß. Hier tritt die ganze Pflanze nur in einer einwurzel unmittelbar ausfinden Blume, in Wäldern Javas und Sumatras vor. *Arnoldi* (Taf. 17, Fig. 7) einen Durchbruch erreichen soll. Auch die übrigen Rhizantheseen auf Wurzeln und haben daher den Namen „erhalten“. Sie bestehen entweder nur von Schuppenblättern umgebenen Blume (*mansia*, Fig. 6) oder sind fleischig durch nackte Blütenstände (*Cytinus*, *Cynomorphora*). Ihre Blüten sind bald mit einem abt, bald hüllenlos, ihre Staubgefäße sind sehr unvollkommen, letztere oft mit dem und den Blütenhüllen verschmolzen. Am meisten sind aber die immer sehr kleinen anfrucht, indem dieselben gewöhnlich keinen oder keinen Keim und nur sehr selten Spuren zu nehmen lassen, sondern aus einer Endosperm, Sameneiweiß) bestehen, welche in dem Embryo umschließt und deshalb apen gleicht. Die Rhizantheseen bewohnen nach die Tropengegenden, wenige kommen Europa vor. Sie zerfallen in die drei Balanophoreen, Cytineen und Rafflesiaceen gehören die auf Taf. 17 abgebildeten *Brugmansia* Zippelii in  $\frac{1}{2}$  nat. Größe, auf Java heimisch. Perigon und Blume ein Thierfell behaart, gelblich, Schuppenbrunde violett. — Fig. 7 *Rafflesia Arnoldi*, steht, rechts im Knospenzustande. a und b kammrigen Staubbeutel im Längs- und vergrößert. c ein Theil der den halben Fruchtnoten bedeckenden Schuppe mit zwei Samentknochen aus den innern Hohlfruchtnoten, vergrößert. Die ganze Pflanze ist verbreitet im aufgeblühten Zustande einen Nagelgeruch. Die ganze Blume gestaltet in Fruchtkörper um, welcher zahllose äußerlich in Form eines braunen an Pilzsporen Pulvers in seinen Höhlungen enthält. Die sind so fremdartig und zugleich in jeder unvollkommen organisierte Pflanzenformen, daß sie keinen Ueberbleibsel einer untergegangenen Vegetation, nicht unberechtigt erscheint.

## Sechste Klasse.

iche Samenpflanzen mit Keimledonen (Nothocarpaceae cotyledoneae).

(Tafel 15–17.)

ung. Palmen- oder Zapfenfarne (Cycloggewächse von palmenartigem Ansehen,

welche wegen der Verlängerung ihres stets einfachen Stammes durch eine Gipfelnöse und wegen der schneckenhausförmigen Einrollung der Abschnitte der fiedertheiligen Blätter an die Baumfarne erinnern, hinsichtlich des anatomischen Baues des Holzes und der Verdickung des Stammes aber und besonders wegen ihrer zapfenförmigen Blüten und Scheinfrüchte den Coniferen am nächsten verwandt sind. Die Cycadeen sind kleine zweihäufige Bäume mit einfachem dicken säulenförmigen Stamme, dessen Oberfläche mit den Narben der abgefallenen Blätter bedeckt ist (Taf. 17, Fig. 4). Letztere bilden an der Spitze um die beschuppte Endknospe herum eine Krone, wie die Blätter der Palmen und Baumfarne, sind oft sehr lang, fiederschnittig oder fiederspaltig und von holziger Beschaffenheit. Zwischen den Blättern stehen lederartige Schuppen, welche auch die Endknospe umhüllen. Sowol die männlichen als die weiblichen Blüten sind von zapfenförmiger Gestalt und entwickeln sich an der Spitze des Stammes zwischen den jüngsten Blättern. Die männlichen Zapfen bestehen aus an eine centrale Spindel angehefteten verschiednen geformten lederartigen Schuppenblättern (Staubblättern), deren untere Seite mit zahlreichen halbtugelförmigen Antherenschälern besetzt ist (Fig. 11 b); die weiblichen, oft eine bedeutende Größe erreichenden Zapfen sind ähnlich gebildet, und tragen bald in Querschnitten flacher Schuppenblätter (Fig. 4 c), bald an der innern Seite gekrümmter schildförmiger Schuppen große nackte Samentknochen. Aus diesen gehen große Samen mit fleischig-saftiger Außenschale und fester oft steinharter Innenschale hervor, die des halb saftigen Steinfrüchten (z. B. Kirichen) gleichen. Sie enthalten einen großen Eizkörper, welcher einen deutlich ausgebildeten mit zwei Keimledonen versehenen Embryo umschließt (Fig. 4 g). Der samenträgende Zapfen bildet eine große kugelige oder walzenförmige Scheinfrucht.

Die Cycadeen sind ebenfalls eine Pflanzengruppe, welche mehr der Vorwelt als der Gegenwart anzugehören scheint. In der That müssen die Cycadeen in früheren Perioden der Erdentwickelung viel häufiger gewesen sein als gegenwärtig, da die Zahl der bis jetzt aufgefundenen fossilen Cycademarten viel größer als die der gegenwärtig lebenden ist. Von letztern kennt man etwa 60 Arten, von denen die Hälfte das tropische Amerika bewohnt, 10 in Südafrika, 11 in Australien vorkommen und die übrigen von Madagascar durch Ostindien und den Indischen Archipel bis China und Japan verbreitet sind. Das Mark der Cycadeenstämme ist reich an Stärkemehl. Von mehreren Arten, besonders von *Cycas circinnalis* und *C. revoluta* wird aus diesem Marke Sago bereitet, welcher einen Theil des in den Handel kommenden „echten“ Sago liefert. Beide Arten werden in Gewächshäusern häufig cultivirt, namentlich die zweite, da deren glänzengrüne Blätter unter dem Namen „Palmenzweige“ in vielen Gegenden einen beliebten Schmuck der Gärten bilden. Fig. 4 gibt ein Bild von *Cycas circinnalis*, welche in Ostindien sowie auf den indischen und australischen Inseln wild wächst und dort auch als Sagobaum angebaut wird. a männlicher Zapfen in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b eine Schuppe desselben in nat. Gr., c Staubbeutel, vergr., d weiblicher Zapfen, stark verkleinert, e Samentknochen tragende Schuppe desselben in nat. Gr., f Samentknochen durchschnitten, vergr., g reife Frucht, nat. Gr., h Keim in nat. Gr.

14. Ordnung. Zapfenträger (Coniferae). Immergrüne, selten sommergrüne Bäume und Sträucher mit einfachen, ganzen und ganzrandigen, gewöhn-

ein Versehen bei der Nummerierung der Tafeln sind dieselben die morphologischen Gewächse enthalten, hinter die Gewächse gekommen.

sich steifen lederartigen, abwechselnden oder quirlförmigen, gedrängt stehenden Blättern, eingeschlechtigen kätzchen- oder knospenförmigen Blüten und holzigen Zapfen, selten beeren- oder steinfruchtartigen Scheinfrüchten, welche nackte Samen enthalten. Die männlichen Blüten bestehen nur aus einer Anzahl sehr verschieden und eigenthümlich gebildeter Staubblätter, welche alternirend oder quirlförmig an den Stiel-, spindel-, feulen- oder kugelförmigen Blütenboden angeheftet sind, die weiblichen aus ähnlich angeordneten meist schuppenförmigen Fruchtblättern, welche entweder unmittelbar nackte Samentknochen tragen (z. B. bei *Cupressus*, Taf. 16, Fig. 3 b) oder aus ihrer Basis eine die Samentknochen tragende Schuppe entwickeln (z. B. bei den Tannen, Taf. 15, Fig. 3 b). Die Pollenkörner bestehen aus mehreren ineinander geschachtelten Zellen und sind gewöhnlich mit zwei Flagen versehen, welche als Flugorgane bei der Verbreitung durch den Wind dienen (Taf. 15, Fig. 5 e). Die nackten Samentknochen besitzen nur eine Haut und einen weiten Knospenmund, der oft griffelartig verlängert und mit einer weiten Mündung versehen erscheint (Taf. 15, Fig. 5 d, die beiden hängenden Samentknochen der Länge nach durchschnitten, Taf. 16, Fig. 3 d, aufrechte Samentknoche im Längsschnitt). Samen mit lederartiger oder holziger Schale, welche oft in einen häutigen Flügel (Flugorgan) ausgebreitet ist (Taf. 15, Fig. 5 f), und mit großem Eiweißkörper, welcher den mit zwei bis vielen Kotyledonen versehenen Keim umschließt. Letzterer erhebt beim Keimen infolge bedeutender Streckung des hypophyten Gliedes die Kotyledonen über den Boden empor, die sich dann ausbreiten (wenn viele, sternförmig). Die Samen reifen entweder im Herbst nach der Blütezeit oder erst nach anderthalb bis zwei Jahren (Coniferen mit ein- und zweijähriger Samenreife).

Die wegen ihres zum Bauen und als Heizungs-material sehr nugharen Holzes und wegen ihres reichen Gehalts an ätherischem Del und Harz für den Menschen überaus wichtigen Coniferen lieben ein gefelliges Vorkommen und vermögen daher große Waldungen zu bilden. Trotz ihrer Häufigkeit sind jedoch die Coniferen gleich den Cycadeen als eine im langsamen Aussterben begriffene Pflanzengruppe anzusehen, welche mehr der Vor- als Jetztwelt angehört. In der That scheinen die Coniferen in jenen Perioden der Erdrindenbildung, wo die Schichten der Trias abgelagert worden, sowie in der viel späteren miocenen Periode, wo die Braunkohlenlager entstanden, den vorherrschenden Bestandtheil der gesammten damaligen Vegetation gebildet zu haben, während die Cycadeen theils schon in der der Trias vorhergehenden Formation (der permischen), theils in der auf die Trias folgenden (dem untern Jura) zur Herrschaft gelangten.

A. Samentknochen hängend: echte Zapfenbäume oder Nadelhölzer.

Fam. 1. Schmutdtannenartige (*Araucariaceae*). Zweihäufige immergrüne Bäume mit Quirlfäden, einzelstehenden Blättern, nackten (unbeschnittenen) Knospen, je 12—20 Anthereinfäden an jedem Staubblatte, großen aufrechten Zapfen, je 1 Samentknoche an jeder Fruchtschuppe, welche die Samentknoche umschließt (Taf. 15, Fig. 1 b), und zweijähriger Samenreife. — Die *Araucarien* sind der Mehrzahl nach prächtige Coniferen von oft riesenhaften Dimensionen und theils in Südamerika, theils in Australien heimisch. Man kennt nur eine Gattung mit 7 Arten.

Taf. 15, Fig. 1. Die Chilitanne (*Araucaria imbricata*), ein auf den Anden von Chile (namentlich im Lande der *Araucaner*: *Indianer*) und in Westpatago-

nien wachsender Baum, dessen 150 Fuß hoch werden und kugelförmige große Zapfen mit 1 Zoll langen Samen tragen. Die dichtgedrängten Blätter sind flach, dreieckig zugespitzt, a Staubblatt vergr., b Fruchtschuppe.

Fig. 2. Die säulenförmige *Araucaria columnaris*, ein prächtiger von 150—200 Fuß Höhe mit kugelförmigen, dachziegelförmig gedachten Nadelblättern und eiförmigen bis 6 Zoll Wächst in Neu-Caledonien, wo er gebildet. a Zweig des männlichen Baums, b Zweig des weiblichen mit je nat. Größe; c und d Fruchtschuppe und Blüte, e Staubbeutel. — Bekannt ist die in unsern Gärten kultivirte Norfolk-Tanne (*A. excelsa*) von 200 bis 220 Fuß Höhe erreicht.

Fam. 2. Tannenartige Nadelhölzer (*Abies*). Einhäufige, meist immergrüne Sträucher mit Quirlfäden, beschuppte kugelförmigen einzeln, paarweise oder gekleideten Blättern, je 2 Anthereinfäden an jedem und je 2 Samentknochen an flachen, mit Fruchtblättern hervorgewachsenen Schuppen, später in die holzigen Zapfenschuppe zurückbleiben oder ganz vertümmern. Samen reife verschieden. — Hierher gehören die Tannen und Fichten (*Abies*), die Cedern (*Cedrus*) und der Kiefer (*Pinus*). In ganz Europa kennt man 6 Gattungen und in Asien insgesammt der nördlichen Halbkugel 12.

Taf. 15, Fig. 3. Die Weiß-Tanne (*Abies pectinata*) und Fig. 4 die Kiefer (*Pinus excelsa*). Die Gattung *Pinus* nur aus Bäumen, deren Zweige mit gedrängt stehenden Nadeln von mehrjähriger Dauer besetzt sind. Männliche Blüten zwischend den Nadeln der vorjährigen im walzenförmig, an der obern Seite mit vorjähriger Triebe, besonders des Spitzes recht. Zapfenschuppen flach, dünn, deckend, anfangs fest zusammenhängend, einanderweibend. Samen geflügelt, im Herbst nach der Blütezeit. — Die *Pinus* Mittel- und Westeuropa verbreitet, unter andere Nadelhölzer gemengt oder namentlich Buchen- Wälder eingesprengt, allein Waldungen bildend (Schwarzwald, Pyrenäen) wird bis 170 Fuß hoch. Zweigen zweijährig kammförmig gefaltet, oberseits dunkelgrüne, unterseits weißliche Streifen gezeichnete Nadeln, gelblich grüne weibliche Blätter und aufrecht 4—6 Zoll Länge, über deren breiten nach außen umgebogenen Spitzen die bleibenden Fruchtblätter hervorstehen. Die Samenreife lösen sich die Fruchtblätter von den Schuppen von der Spindel los, der Spindel bloß die Spindel bleibt stehen. (Allgemein a Samen, b Samenschuppe.) — Die Mittel- und Nordeuropa verbreitet, in den Gebirgen für sich allein oder mit anderen Bäumen bildend, ein bis 150 Fuß hoch werdender Baum, der sich von der vorhergehenden durch die lanzettliche Spitze, rings um die Spitze gleichfarbig grüne Nadeln, purpurfarbene (auch die männlichen sind anfangs mit...

1 Schuppen sich zur Zeit der Samenreife, sondern die Samen ausfliegen lassen. 1 entleerten Zapfen bleiben noch lange fallen endlich ganz ab. (Zweig mit männlichen und Zapfen in nat. Gr., a oberer Theil einer Staubblatt, c Samentknospen tragende gr.; d Samen und Flügel in nat. Gr.) Die gemeine Kiefer oder Föhre (*Pinus*). Die Gattung *Pinus* besteht aus immergrünen und Sträuchern, deren Nadeln vom 1. Jahre an zu zweien, dreien, vierten oder ungeraden, am Grunde umgeben von einer Leiste, welche die sich entwickelnden Nadeln umhüllt. Diese Nadelpaare oder Nadelzweige bis fächerförmige Kurztriebe, die an den Achsen der einzelnstehenden Nadeln im ersten Lebensjahre gebildeten Achse entstehen sind planconvergent (bei je 2) oder kantig (bei je 3—5). Die männlichen sind dichtgedrängt um vorjährige Triebe herum, an der Spitze der im Mai entwickelten einzeln oder zu mehreren quirlförmig, bestehen bei den meisten Kiefernarten aus ihrer Spitze hin verdickten und hier mit außen gewendeten Schild (Prophyll), auf eine Vertiefung oder Erhabenheit (Nabel), endigenden Samenträgern (a, b, c), welche erst zusammenfließen und erst im zweiten der Blütezeit oder noch später auseinanderbrauchen die meist geflügelten Samen aus den engen nicht zerfallenden Zapfen entstehen. Die gemeine Kiefer ist durch fast ganz verbreitet und bildet namentlich im Norden in Ebenen große Waldungen. Ihre Nadeln weiß und sind auf der planen Fläche bläulich, auf der convexen sattgrün, die Zapfen kegelförmig, klein (2 Zoll lang), graugelb. Dieser gemeinen Kiefer, Lärche und Wald-Berlin. Bekannte andere Arten dieser Gattung sind die Schwarzkiefer (*P. Laricio*), die südberühmte Pinie (*P. Pinia*), deren kegelförmige ungeflügelte Samen mit ebener Nabel (Nuss) enthalten, die ebenfalls ebene, geflügelte Samen (Zürbelsüsse) hervorbringende Kiefer (*P. Cembra*) und die nordamerikanische Kiefer (*P. Strobus*). Die beiden letzten Arten haben zu fünf gestellte Nadeln.

Die gemeine Lärche (*Larix europaea*). Der Gattung *Larix* sind sämmtlich sommergrüne mit jarten hellgrünen Nadeln, welche im Frühling entwickeln und im Herbst abfallen. Im Frühling erscheinenden Nadeln stehen in Büschelförmigen Kurztrieben. Aus den endständigen und benachbarten Büscheln der Zweige wachsen röhrenförmige Langtriebe (Johannistriebe) bestehend aus größeren Nadeln hervor, in deren Achsen Knospen bilden, die sich in neue Kurztriebe gestalten und daher im nächsten Frühling neue Nadelbüschel entfalten. Männliche Blüten grünlich, gelb, in großer Anzahl an der unteren Seite der Zweige, größer, länglich, von zerstreuter Farbe, an der oberen Seite der Zweige klein, sitzend, aufrecht, verhalten sich wie die weiblichen, bleiben nach dem Ausfliegen der Samen jahrelang an den Zweigen; Samen geflügelt, einjährig. — Die gemeine Lärche ist in Europa und Karpaten heimisch, findet sich aber auch und verwildert in ganz Mitteleuropa und westlichen Rußland. Der Stamm wird bis hoch, die Verzweigung ist unregelmäßig quirlig,

die weiblichen Blüten sind purpurroth, die Zapfen 1—2 Zoll lang, kahl, hellbraun. Das harzreiche Holz ist ein vorzügliches dauerhaftes Bauholz, aus dem flüssigen Harz wird der venetianische Terpentin bereitet. — Nahe verwandt ist die in Ostrußland und Sibirien heimische sibirische Lärche (*L. sibirica*), von der europäischen vorzüglich durch anders gestaltete hellgrüne weibliche Blüten und silbige Zapfen verschieden.

Fig. 7. Die Libanon-Ceder (*Cedrus Libani*). Die Cedern stehen den Lärchen sehr nahe und unterscheiden sich von diesen nur durch die mehrjährigen Nadeln (sind also immergrüne Bäume), durch die größeren anders gebildeten Zapfen, deren lederartige Schuppen zur Reifezeit von der Spinde abfallen und durch die zwei- bis dreijährige Samenreife. — Die berühmte Libanon-Ceder wächst nicht allein auf dem Libanon, wo sie fast ausgestorben ist (Fig. 7 zeigt eine Gruppe alter Cedern von dort), sondern auch auf dem sibirischen Taurus, wo sie große Wälder bildet. Wahrscheinlich ist auch die auf dem großen Atlas von Marokko vorkommende Ceder (*C. atlantica*) eine bloße Varietät der Libanon-Ceder. Dieser Baum, welcher über 2500 Jahre Alter zu erreichen vermag, bildet mit seinen horizontal ausgestreckten Aesten im Alter eine mächtige Krone. Der Stamm wird höchstens 80 Fuß hoch, aber sehr stark. Die Nadeln sind  $\frac{1}{2}$  — 1 Zoll lang, die Zapfen eiförmig, gestielt, 4—5 Zoll lang,  $\frac{1}{2}$  Zoll breit, graubraun, von Harz überflössen. a ein zapfentragender Zweig, sehr verkleinert. Häufiger als die Libanon-Ceder wird in den Gärten und Gewächshäusern die Himalajaceder (*C. Deodara*) cultivirt, ein in den Gebirgen von Nepal und Kaschmir wachsender und dort große Waldungen bildender prächtiger Baum mit hängenden Aesten, dessen Stamm bis 150 Fuß Höhe und bis 30 Fuß Umfang zu erreichen vermag und anerkanntermaßen das beste Bauholz, sowie einen vorzüglichen Terpentin liefert.

Jam. 3. Zwittertannen (*Dammara*). Ein- und zweihäufige immergrüne Bäume mit zerstreut angeordneten Aesten, nackten Knospen, breiten oder pfriemenförmigen steifen Blättern, 2 bis viele Aehrenfächer tragenden Staubbeuteln und 1—9 Samentknospen am Grunde schlafschuppiger Fruchtblätter. Zapfen eiförmig oder kegelförmig, Samen geflügelt (oft doppelt geflügelt), Samenreife ein- bis zweijährig. — Man kennt 4 Gattungen mit 12 Arten, von denen die meisten in Australien, wenige in Asien und Nordamerika vorkommen.

Taf. 16, Fig. 1. Die Mammutfichte (*Wellingtonia oder Sequoia gigantea*). Dieser 1832 entdeckte, in der Sierra Nevada Californiens in einer Höhe von 5000 Fuß über dem Meere wachsende Baum erreicht unter allen bekannten Coniferen die riesigsten Dimensionen und das höchste Alter, nämlich über 3000 Jahre bei einer Stammhöhe von 320 und einem Stammumfang (am Grunde) von 96 Fuß. Die gebrängt stehenden Blätter sind  $\frac{1}{4}$  —  $\frac{1}{2}$  Zoll lang, pfriemenförmig, mit breiter Basis angeheftet und herablaufend (a, nat. Gr., b, vergr.), die eiförmigen Zapfen nur  $\frac{1}{2}$  — 2 Zoll lang (c, nat. Gr.), die Samen klein, doppelt geflügelt (e, nat. Gr.), die Rinde des Stammes dagegen bei den ältesten Bäumen 12—15 Zoll dick und zimtbraun, das Holz weiß und weich.

Fig. 2. Die Dammaranne oder Kaurifichte (*Dammara australis*), ein kolossaler Baum Neuseelands, dessen Samen bei einer Höhe von 180 Fuß einen Durchmesser von 15—17 Fuß erreicht und bis 800 Jahre alt wird. Blätter abwechselnd, gedrängt, eilanzettförmig,  $\frac{1}{2}$  —  $1\frac{1}{2}$  Zoll lang, 3—6 Linien breit, dick lederartig, steif, glänzend braungrün; Zapfen kegelförmig, 2—3 Zoll stark, auf starkem Stiel, aufrecht. Die





Dammartanne bildet zerstreute Baumgruppen, nie zusammenhängende Wälder, und wegen ihres vorzüglichen Holzes und Harzes (Kauribarz), welches zu Läden und Zirknissen verwendet wird, eine Hauptrolle des Wohlstandes für die Ansebler Neuseelands. Das Harz schmilzt von selbst aus allen Theilen des Baums aus, weshalb dessen Aeste und Zweige von Harztropfen starren, und sammeln sich unter den Wurzeln im Boden zu großen Klumpen (bis zu 100 Pfund) an. Es ist balsamisch-wohlfriechend und brennt mit ruhender Flamme.

B. Samenknoſpen aufrecht, unmittelbar in offenen Fruchtblättern sitzend.

Fam. 4. Cypressenartige Coniferen (Cupressineae). Ein- und zweihäufige Bäume und Sträucher mit zerstreuten Nadeln, nackten Knoſpen, kleinen nadel- oder schuppenförmigen meist sehr gedrängt stehenden Blättern, 2 bis vielen Antherenfäden an den schuppen- oder schildförmigen Staubblättern, 2 bis vielen Samenknoſpen am Grunde der verschieden geformten Fruchtblätter und kleinen aufspringenden Holzzapfen oder geschlossen bleibenden beerenartigen Steinfrüchten. Samen meist ungelügelt, Samentreife ein- bis zweijährig. — Bildet nächst den Abietineen die größte Abtheilung der Coniferen, indem bis jetzt 18 Gattungen mit 107 Arten bekannt sind. Die meisten bewohnen Amerika und Asien, ziemlich viele Australien, nur wenige Europa und Afrika.

Zaf. 16, Fig. 3. Gemeine Cypresse (Cupressus fastigiata). Einhäufiger Baum mit aufrechten, vielfach verzweigten, eine dichte schmalkegelförmige Krone bildenden Aesten. Blätter sehr klein, schuppenförmig, eiraufenförmig, am Rücken convex gefaltet, graugrün, kreuzweis gegenständig, dachziegelförmig-vierreihig; Zweige deshalb vierkantig. Männliche Blüten als sehr kleine endständige Köpfchen ausgebildet, aus schuppenförmigen, kreuzweis gegenständigen Staubblättern bestehend, welche 4 kugelige Antherenfäden am Grunde tragen (a, vergl.). Weibliche Blüten endständig, kugelig, aus kreuzweis gegenständigen Fruchtblättern mit vielen Samenknoſpen gebildet (b, vergl.; c, Samenknoſpe, d, dieselbe im Längsschnitt, vergl.). Zapfen kugelig-zugig, aus schildförmigen Samenträgern (den ehemaligen umgestalteten Fruchtblättern) zusammengeſetzt (e, nat. Gr.); Samen 3 — 4kantig, mit schmalem flügelartigen Saum (f, g, umgelegt im Längsschnitt, vergl.). — Ursprünglich im Orient heimisch hat sich die Cypresse über alle um das mittelländische Meer herum gelegenen Länder verbreitet, wo sie als Ziergeholz und namentlich als Symbol der Trauer auf den Friedhöfen der Christen, Juden und Mohamedaner cultivirt wird. Sie erreicht bis 80 Fuß Höhe, über 2000 Jahre Alter und besteht ein fast unzerstörbares, wohlfriechendes Holz. Man kennt von der Gattung Cupressus 19 Arten, von denen die meisten in Californien und Mexico zu Hause sind, mehrere in Ostindien und China. Zu letztern gehört die berühmte durch Fortune nach Europa gebrachte chinesische Trauercypresse (C. funebris) mit stiellich hängenden zusammengebrühten Zweigen, welche jetzt in den europäischen Gärten und Gewächshäusern häufig angebaut wird.

Fig. 4. Der orientalische Lebensbaum (Thuja oder Biota orientalis). Die Gattung Thuja unterscheidet sich von Cupressus besonders durch die Zapfen, welche aus flachen (nicht schildförmigen) Samenträgern zusammengeſetzt und sehr klein sind. Ihre Arten sind zweihäufige Bäume und Sträucher mit zusammengebrühten Zweigen, welche mit kreuzweis gegenständig-

gen, vierreihigen Schuppenblättern von veränderlicher Gestalt (die randständigen sind anders geformt als die an den breiten Flächen der Zweige stehenden) besetzt sind. Der orientalische Lebensbaum, ein kleiner, in China und Japan einheimischer, bei uns häufig cultivirter Baum, hat eisförmige bläulich bereifte nur aus 6 Fruchtschuppen bestehende Zapfen (a, nat. Gr., wie auch der Zweig) und keine Deldrüſen am Rücken der Blätter. Viel häufiger wird in den europäischen Gärten der abendländische Lebensbaum (Taxus baccata) angebaut, ein in Nordamerika wachsender, den bis 50 Fuß hoch werdender, gegen Frost viel weniger empfindlicher Baum, welcher mit einer Deldrüse versehene Blätter und kleinere hellbraune untere Zapfen trägt.

Fig. 5. Der gemeine Wachholder (Juniperus communis). Die Wachholdergattung hat zur Frucht eine Scheinbeere (Beerenzapfen), welche durch gegenseitige Verschmelzung der Fruchtblätter der weiblichen Blüte entsteht. Diese ist knospenförmig, und von ihm Fruchtblättern (höchstens 6) tragen nur die 3 obersten am Grunde ihrer innern Fläche eine aufrechte Samenknoſpe (c, d im Längsschnitt, schwach vergl.). Die Samentreife ist zweijährig. Die männlichen Blüten sind ebenfalls klein, kugelig oder oval, aus dachziegelförmig sich deckenden schuppenförmigen Staubblättern gebildet, welche an ihrer innern Seite 3 — 6 kugelige Antherenfäden tragen (e, f, Staubblatt von beiden Seiten, vergl.). Die Wachholderarten sind zweihäufige Sträucher und Bäume. Bezüglich der Blätter unterscheiden sie in solche mit drei quirlförmig gestellten spitzen Nadeln und in solche mit schuppenförmigen gedrängt stehenden Blättern. Letztere sehen den Cypressen etwas zum Verwechseln ähnlich. Zu erstern gehört der gemeine, durch ganz Europa verbreitete Wachholder, dessen kugelige erbsengroße Scheinbeeren im zweiten Herbst schwarz und hechtblau bereift sind und wegen ihres Zudeckgehalts in geistige Gärung übergeführt werden können (bei der Bereitung des holländischen Genever und des englischen Gin). Außerdem dienen die Wachholderbeeren sammt den Nadeln als Aderungsmittel bei ansteckenden Krankheiten. (Fig. k, beerentragender Zweig, etwas verkleinert, a männliche, b weibliche Blüte in fast nat. Gr., h und i Same mit den daranhängenden Delbehältern von der flachen Innenseite und der kantigen Rückenseite aus gesehen, vergl.; k sich entwickelnde Scheinfrucht, g reife Scheinfrucht im Längsdurchschnitt, vergl.) Es gibt noch Wachholderarten, welche an den einen Zweigen nadeln, an den andern schuppenförmige Blätter haben. Zu diesen gehören der in Südamerika heimische und hin und wieder angepflanzte Sadez oder Seendbaum (J. Sabina) und der virginische Wachholder oder der virginische Cedre (J. virginiana) in Nordamerika, deren rothbraunes feines Holz allgemein zu Kleinfirn verwendet wird. Beide Arten enthalten in ihren Blättern ein in der Heilunde Verwendung findendes ätherisches Öl von eigenthümlicher Wirkung. Im ganzen kennt man 35 Wachholderarten.

15. Ordnung. Scheinfrüchtige Samenspflanzungen mit steinfrucht- oder beerenartigen Früchten (Gymnospermae). Immergrüne, selten sommergrüne ein- oder zweihäufige, selbst zwittrblütige Holzpflanzen von sehr verschiedener Größe und Gestalt, deren weibliche Blüten aus einer nackten, von Bracteen oder selbst Blütenhüllen umgebenen, oft stempelartig gebildeten Samenknoſpe bestehen, aus welcher sich eine beeren- oder steinfruchtartige Scheinfrucht entwickelt. Zur Ordnung gesellt sich die drei Familien der Lignales, Gnetales und Loranthales.

**Fam. 1. Eibengewächse (Taxineae).** Zweihäufige Bäume und Sträucher mit zerstreut angeordneten, abwechselnd gestellten nadel-, schuppenförmigen oder breiten Blättern von meist mehrjähriger Dauer, kegelförmigen, nur aus Staubblättern zusammengesetzten männlichen Blüten und knospenförmigen, von acten am Grunde umringten einzeln stehenden oder tenförmig um eine Spinzel gruppierten aufrechten meknospen. Samen mit knochenarter oder krustentiger Schale, oft von einer fleischig-saftigen Hülle (amenmantel), welche von dem Grunde der Samensche aus sich entwickelt, umgeben. Keim mit 2 Keblenen. Man kennt 10 Gattungen mit 79 Arten. In Europa findet sich nur der gemeine Eiben: (Taxus baccata, Taf. 16, Fig. 6, nat. Gr.). Immergrüner Baum oder Strauch mit zweiförmig geordneten nadelförmigen, oberseits glänzend dunkelmen, unterseits matt hellgrünen Blättern. Männliche Blüten kegelförmig, gestielt, aus gestielten Schilde:ppen mit 5—6 Antherenfächern unter dem hilde zusammengefasst, am Grunde der Schuppen:tern umgeben (a, b, verg.). Samentnospen einzeln:nd, ebenfalls von Schuppen umgeben (c verg., m Längsschnitt), Scheinfrüchte anfangs fast eichel:mig (d, verg.), später nach Entwickelung des fleig:gen bebrothen, oben offen bleibenden Samenmantels b der Basis der Samentnospe beerenartig (f im rchschnitt verg.). Samen violett, einen großen eichkörper mit kleinem Keim enthaltend (g im Längs:chnitt, verg.), sammt den Blättern giftig. Der her durch ganz Europa verbreitete Eibenbaum ist erall selten geworden und als eine im Aussterben rgriffene Holzart zu betrachten. Er wird sehr alt; ältesten in Englands Parken stehenden Eibenbäume gen über 2000 Jahre alt sein. Wegen des überaus ghamen Wuchses erreicht aber dieser Baum keine en Dimensionen. Er ist eine schattenliebende art, verträgt den Schnitt sehr gut (daher die er so beliebten Taxusheiden, Taxuswände und ussfiguren) und besitzt ein schweres, feines, roth:unes, harzloses Holz.

Unter den ausländischen Taxineen ist besonders die ppe der *Phyllocladaceen* interessant. Sie gleichen ren ihrer breiten Blätter den distotylen Laubholz:men. Eine der merkwürdigsten Arten ist der nglobaum (*Salisburia adiantifolia*, Taf. 17, . 1, Zweig in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr.), ein stattlicher, bloß mergrüner Baum Chinas und Japans mit eigem:lich zweilappigen graugrünen, zuletzt lederartigen lättern. Männliche Blüten gestielt, ährenförmig, ubblätter mit 2 Antherenfächern, der gewöhnlichen m des Staubgefäßes schon sehr ähnlich (a verg.); mentnospen einzeln oder traubig auf achselständigen elen (b nat. Gr.), Scheinfrüchte nussartig, kegelförmig, sell im Durchmesser, ihr Kern essbar, ölhaltig. — . 2 zeigt einen männliche Blüten tragenden Zweig r verwandten Pflanze, des in Bantienensland nstehenden *Phyllocladus rhomboidalis*, mit theibischen llocladien (a weiblicher Blütenstand mit 2 Samen:pen; b und c sind Samentnospen, die zweite im ghschnitt von einer chilenischen Taxinee, dem *Podop:pus chilensis*, verg.).

**Fam. 2. Gnetaceen (Gnetaceae).** Einhäufige oder ihäufige Bäume, Sträucher und Halbsträucher von : verschiedener Bildung mit männlichen und weib:nen Blüten, von denen die letztern aus einer von igonartigen Hüllen umgebenen Samentnospe be:nen, deren innere Haut in eine griffelförmige oben ne Höhre mit narbenartig verbreiteter Mündung :gehebt ist. Scheinfrucht nuss- oder beerenartig.

Hierher gehören die Arten der Gattung Meertraube (*Ephedra*), equisetenförmige Halbsträucher und Strä:cher, von denen einige am Strande der entropäischen Meere und in Sudenropa vorkommen. — Zu den Gnetaceen wird auch die *Welwitschia mirabilis* (Fig. 3, sehr verll.) gerechnet, obwohl dieselbe von den andern Gewächsen dieser Familie sehr abweicht und richtiger den *Lycopn* einer besondern Familie bildet. Diese von Welwitsch im J. 1860 im west:lichen Südafrika entdeckte Wunderpflanze ist sozu:sagen ein in den Boden versenkter verkürzter Baum:stamm mit starker Wurzel, der nach oben in einen zweitheiligen Trichter endet und hier mit 2 gegen:ständigen riesigen Lederblättern besetzt ist, die dem Boden aufliegen und die vergrößerten Kotlebenen sein sollen. Im Umkreise des Trichters entspringen verzweigte Aeste, welche scharladrothe Zapfen tragen (b sehr verll.), von denen die einen Zwitter:, die andern weibliche Blüten tragen. Die Staubbeutel sind dreifächrig, die vierkantigen Samen breit geflügelt. Das in heißem Wüstensand wachsende Gewächs soll über 100 Jahre alt werden, sein Stamm ist nur 2 Fuß lang, der Trichter misst aber bis 14 Fuß im Umfang und die beiden Blätter werden bis 6 Fuß lang. Die ganze Pflanze schmilzt Harz aus.

**Fam. 3. Mistelartige Gewächse (Loranthaceae).** Auf Bäumen schwarzenbe immergrüne Sträucher mit lederartigen Blättern und Zwitter- oder eingeschlechten Blüten, welche bald unvollständig und unansehnlich, bald mit einer doppelten oft schon gefärbten Hülle (Kelsch und Blumentroue) beagt sind. Bei den Zwitterblüthen sind die Staubgefäße, bei den weiblichen das Perigon oder der Kelsch mit der centralen Samentnospe zu einem Schein:pistill verwachsen, aus dem eine fleischig-saftige Scheinbeere entsteht. Die meisten Loranthaceen sind Tropenpflanzen, viele von ihnen prangen mit prächtig gefärbten Blumen. In Europa kommen nur wenige Arten vor, von denen die meisten der Mistelgattung (*Viscum*) angehören.

Taf. 17, Fig. 5. Die gemeine Mistel (*Viscum album*). Gabeltheilig verzweigter, auf den Aesten verschiedener Bäume schwarzenber, grüner Strauch mit gegenständigen Lederblättern und in den Gabeltheilungen befnächtigen Knäueln von kleinen gelblichen Blüten, aus denen kegelförmige erbsengroße weiße Schein:beeren hervorgehen. Letztere enthalten einen überaus zähen Schleim, welcher als Vogelkleeim benannt wird (a ein Zweig in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b Blüte etwas größer, c Samen, verg., d Scheinbeere, zerhschnitten, verll.).

#### Siebente Klasse.

**Samenpflanzen mit echten Früchten und einsamenlappigem Keime (Teleocarpae monocotyledoneae).**

(Tafel 10—14.)

Von den zu dieser Klasse gehörenden Ordnungen und Familien können hier nur die bemerkenswertheften berührt werden.

I. Ordnung der Spelzenblüthler (*Glumaceae*). Blüten hüllensles, seltener mit rudimentärem Perigon, zwischen 2 eigenthümlichen Deckblättern (Spelzen) oder bloß unter einem solchen. Frucht oberständig, eine einsamige Schalefrucht (Carpopsie).

**Fam. 1. Die Gräser (Gramineae).** Krautartige Gewächse mit Faserwurzel oder verschiednen gesformten Rhizomen und knotigen oft knieförmig aufsteigenden, meist einfachen Stengeln (Halmen), seltener strauch: und baumartige Pflanzen mit heiligen, schlanken, knotigen, verzweigten Stämmen (z. B. die Bambusarten). Achsenglieder (Internodien) gewöhnlich hohl, seltener solid, die untern verkürzt, die übrigen meist lang gestreckt. Blätter alternirend zweireihig, mit zusammen-

gerolltem Blattstiel, welcher rings um einen Knoten angewachsen ist und das darüber befindliche Ahsenglied als eine auf der einen Seite aufgeschlagte Scheide umgibt (Taf. 10, Fig. 5 a). Wo sich die meist schmale, stets ganze und ganzrandige Blattspreite von dem Blattstiel abgrenzt, befindet sich das Blatthäutchen (ligula), ein querüber gespanntes zartcs, verschieden geformtes Häutchen oder an seiner Stelle eine Reihe von Haaren oder Haarbüschem. Blüten klein und unscheinbar, meist zwittrig, aus 2 Deckblättern (Blüten- oder Kronenspelzen) bestehend, zwischen denen sich meist 3 (selten 2) Staubgefäße und ein Stempel, umgeben von 2 bis 3 kleinen fleischigen Schüppchen befinden (Fig. 6 a). Die beiden Kronenspelzen sind eine über der andern an der Blütenachse befestigt, die untere (äußere) umfaßt die obere (innere). Erstere läuft häufig an der Spitze oder am Rücken in eine Vorste (Granne) aus (Fig. 2 b), die innere ist zarter gebaut und vor dem Ausblühen in den Hohlraum der äußern meist kahnförmig gestalteten eingefügt. Staubfäden haarfein, hängen zur Blütezeit zwischen den geöffneten Spelzen heraus, Staubbeutel quer auf liegend. Fruchtknoten oberständig, einsäuerig, 1 Samenknoche enthaltend, mit 2 feber- oder pinselförmigen Narben. Je eine oder mehrere solcher Blüten sind von 2 Hüllblättern, den Kelch- oder Balgspelzen, umgeben und bilden mit diesen zusammen ein Aehrchen (spicula). Je nach der Anzahl der Blüten unterscheidet man einblütige (Fig. 9 b), zweiblütige (Fig. 7 a), drei-, vier-, fünf-, vielblütige (Fig. 6) Aehrchen. Solche Aehrchen sind entweder in eine Aehre gestellt (z. B. beim Roggen, Fig. 5, beim Taumelloch, Fig. 6), oder in eine Rispe (Fig. 1, 2, 7), oder in eine Rispen- oder Scheinähre (Fig. 3 und 4). Die Frucht der Gräser ist eine einsamige Schafsrucht, ihr Samen innig mit dem dünnen Fruchtgehäuse verwachsen. Der Samenkern besteht aus einem großen Eiweißkörper (dem Mehlkörper der Getreidekörner) und einem kleinen diesem festlich angebrachten Keime (Fig. 5 d, Roggenkorn im Längsdurchschnitt, vergl.). Der Keim ist von dem hohl entwickelten Kotlebon mantelartig umschlossen und aus dem Kegel des Keimpfens (Federchens), welcher aus übereinandergestülpten Hüllkegeln (den Blattanlagen) besteht, aus dem Ahsentheil, rings um welchen herum der Kotlebon angewachsen ist, und dem kegelförmigen Wurzelschen nebst mehreren höckerförmigen Nebenwurzeln zusammengesetzt (Fig. 5 c, Roggenkeim im Längsdurchschnitt, vergl., c derselbe von vorn gesehen, unverlezt, vergl.). Beim Keimen schiebt sich das Federchen aus einem Schlitze des Kotlebon hervor und tritt, sich verlängern, als ein zusammengeroßtes spitzes Blatt aus der Erdoberfläche heraus, das Wurzelschen verkümmert, während die Nebenwurzeln sich ausdehnen und den Anfang der spätern Faserwurzel bilden (Fig. 5 f, aus dem Kotlebon hervorgetretener Keim des Roggenkorns, vergl.; der Blattkegel des Federchens ist abgeschnitten). — Die Gräser bilden eine der größten und natürlichsten Familien des Gewächsreichs und sind über die ganze Erde, besonders aber durch die gemäßigte Zone der nördlichen Halbkugel verbreitet. Sie lieben einen trockenen oder frischen Boden, enthalten vor der Blütezeit in den Halmen und Blattcheiden Zucker (daher auch „Süßgräser“ genannt), in ihrem Samen Stärke; mehl und in der Oberhaut der Blätter und Halme Kieselerde. Es gehören zu ihnen unsere sämtlichen Getreidearten (Cerealien, Halmfrüchte), viele nahrungsfähige Futtergräser (die Wiesengräser), verschiedene Handelspflanzen (z. B. das Zuckerrohr) und viele Unkrautpflanzen. Die Gräser sind deshalb eine der

für den Menschen wichtigsten Pflanzengruppen, die wir kennen gegen 3500 Arten.

Taf. 10, Fig. 1. Der gemeine Reis (*Panicum miliaceum*), ein einblütiges, aus dem Orient stammendes Gras, welches Körner halber, die von den verhärteten eng umschlossen werden, auf 2-4 Fuß hoch, in Blättern weich behaart. Aehrchen aus 2 mit einer dritten Spelze (Andersart) (Blüten-) neben der Blüte. a Jungreis, nat. Gr., b Aehrchen von der breiten Seite, d Geschlechtsorgane, e der Spelzen, f Narbe, g Frucht, h Schnitt (alle Fig. vergl., e stark vergrößert).

Fig. 2. Der Reis (*Oryza*) ist eine heimische, in stehenden Wässern auf überschwemmbarem Boden in gebaute Getreidepflanze mit 3-4 Fuß Halm, welcher größtentheils von den Blattcheiden umhüllt ist. Aehrchen aus 2 Spelzen, einblütig, in lockere, lederartige, nervig gestreift, außen begrannt oder unbegrannt, Frucht weich, glasig, von den verhärteten. Der Reis gehört zu den ältesten Kulturpflanzen, wurde in China, wo seine Körner ausschließliche Nahrung der niederen Klassen (wie auch in Japan), schon im 3. Jahrtausend v. Chr. angebaut und ist in ganz Asien vorherrschend gebaute Cerealienpflanze. Er verbreitete sich seine Cultur zunächst in die Vereinigten Staaten Nordamerikas (im 18. Jahrh.) und von hier aus über die ganze Welt. In Südeuropa wird der Reis in der lombardischen Ebene und in der Provinz Valencia im großen cultivirt, in den übrigen Ländern der Welt dient er allein als Nahrungsmittel, indem er auch Spiritus (in Verbindung mit Zuckerrohr) und einigen Palmen der Gattung *Coccothrinax* (die Palmweiden) nur ein geringes Futtergras ist. Es ist eine Rispe (d. h. eine Rispe mit verticillierten Aehren) eigentlich dreiblütig, doch ist die Fruchtbarkeit mit nur 2 Staubgefäßen, die seitlich auf einzelne begrannnte Spelzen scheinen (a Aehrchen, vergl.).

Fig. 3. Das Ruchgras (*Anthoxanthum odoratum*) ist ein auf trockenen und moorigen Böden wachsendes, im ersten Frühling zu blühendes, ausdauerndes Gras, welches einen aromatischen Geruch (daher Ruchgras) nur ein geringes Futtergras ist. Es ist eine Rispe (d. h. eine Rispe mit verticillierten Aehren) eigentlich dreiblütig, doch ist die Fruchtbarkeit mit nur 2 Staubgefäßen, die seitlich auf einzelne begrannnte Spelzen scheinen (a Aehrchen, vergl.).

Fig. 4. Der Kolbenhirse (*Pennisetum glaucum*) ist ein einblütiges, wahrscheinlich aus China mit dem Reis eingeführtes Gras, welches zuerst aus Italien gebrachtes, dann in die Provinz Valencia, wo es die Kolbenhirse ähnlichen, doch ist die Fruchtbarkeit mit nur 2 Staubgefäßen, die seitlich auf einzelne begrannnte Spelzen scheinen (a Aehrchen, vergl.).



Fig. 5. Der gemeine Roggen (*Secale cereale*), bekanntes Getreidegras von unbekannter Herkunft, welches als Winter- (zweijährige) und Sommergetreide (einhährige Pflanze) gebaut wird und einblütige begrannte, in eine zweizeilige Aehre gestellte Aehrchen besitzt (blühende Aehre, verll., a Blattstheide in nat. Gr., b Frucht oder Roggenform, c Keim von vorn, d Frucht im Längsschnitt, e Keim im Längsschnitt, alles vergr., f entwickelter Keim). Die verwandte Gattung der Weizen (*Triticum*) unterscheidet sich durch zwei- bis dreiblättrige Aehrchen, die Gattung der Gersten (*Hordeum*) dadurch, daß je 3 einblütige Aehrchen an den Zähnen der die Aehre durchziehenden Spindel sitzen. Alle diese Kulturgräser, deren Anbau uralte ist, sind von unbekannter Herkunft, stammen aber wahrscheinlich insgesammt aus Asien.

Fig. 6. Der Taumelkohl (*Lolium temulentum*), einjähriges Aehrengras mit vielblättrigen Aehrchen, welche mit ihrer Krante der Spindel zugekehrt und bloß mit einer Kelchspitze versehen sind, welche länger ist als das ganze Aehrchen, dessen Blüten bald begrannt, bald unbegrannt sind. Hat giftige Körner, deren Mehl dem Getreidemehl beigemengt das Brot vergiften kann. Wächst als Unkraut unter dem Getreide, besonders auf nassem Boden.

Fig. 7. Der Mais oder der türkische Weizen (*Zea Mays*), einjähriges in Südamerika heimisches und dort seit unbekannter Zeit angebautes Getreidegras mit sehrhartem markigen, bisweilen bis 16 Fuß hoch werdenden Stalm, dessen Mark zuderbartig ist, breiten glänzendgrünen Blättern und eingeschlechtigen Blüten, von denen die männlichen in zweiblättrigen Aehrchen geordnet eine große Rispe (Zahne) am Ende des Halms bilden, während die weiblichen um eine fleischige blattwinkelständige Spindel gestellt sind, die in viele Hüllblätter eingewickelt ist und so als ein grünlieferförmiges feimbehaartes silberglänzendes Griffelbüschelförmig herabhängt. Dieser weibliche Blütenstand entwickelt sich zu dem bekannten Maiskolben, an welchem die großen rundlichen Körner zu Hunderten reihenweis angeordnet sitzen. Der Mais wird gegenwärtig nicht allein in allen warmen Ländern, sondern auch in der gemäßigten Zone, daher auch in Deutschland in vielen Gegenden im großen angebaut; die Körner liefern ein sehr weißes Mehl, die Blätter und Stengel ein vortreffliches Viehfutter. (Abbild.: oberer Theil einer blühenden Pflanze, sehr verkleinert; a männliches Aehrchen, b weibliche Blüten, c Kelben, verll., d Frucht im Längsschnitt, vergr.)

Fig. 8. Das gemeine Bambusrohr (*Bambusa arundinacea*), baumartiges, in Ostindien und Südostasien heimisches Rohrgras, dessen Stämme bis 60 Fuß Höhe und 4—6 Zoll Stärke erreichen und vielfach verzweigt sind. Blätter lanzettförmig gedrängt stehend, zweizeilig, Aehrchen vielblütig, aus unbegrannten Zwitter- und männlichen Blüten bestehend, in Rispen gruppiert. In den Knoten dieses ganze Waldwuchs bildenden und in China, Japan und dem südlichen Asien auch viel angebauten Rohrgrases, dessen dünnere Aeste die bekannten Bambusrohrstöcke liefern, erzeugt sich eine eigenthümliche kaltsame Masse (Tabaschir), welche im ganzen Orient als Heilmittel in hohem Ansehen steht und früher auch in Europa officinell war. Die Stämme dienen in Südasiem, China und Japan allgemein als Baumaterial, die Blätter werden zum Einpacken, z. B. des Thees, und zu Matten gebreut. Ähnliche baumartige Rohrgräser kommen auch in Südamerika vor.

Fig. 9. Das Zuderrohr (*Saccharum officinarum*),

eine angeblich aus Westasien stammende Grasart mit gegliedertem, viele Wurzelstößen entwickelndem Rhizom, aus welchem alljährlich mehrere einfache, vielknotige, bis 12 Fuß Höhe und unten bis 2 Zoll Dicke erreichende, mit einem lodern saftigen zuderreichen Mark erfüllte Halme hervortreiben, die zweizeilig mit 4 bis 5 Fuß langen und bis 2 Zoll breiten am Rande schneidenden scharfen Blättern besetzt sind und zur Blütezeit eine mächtige bis 2 Fuß lange pyramidale Rispe zahlloser von langen seidenglänzenden Haaren umringter zweiblättriger Aehrchen tragen. Die untere Blüte besteht nur aus einer Spelze, ist daher taub (b). Dieses schöne Gewächs wird gegenwärtig in allen Tropenländern, besonders in Ost- und Westindien, doch auch in der wärmern gemäßigten Zone hin und wieder angebaut, z. B. in Südspanien, Südportugal und auf Sicilien. Zur Gewinnung des Rohrjunders wird vorzüglich der untere, das meiste, saftigste und süßeste Mark enthaltende Theil des Halms beunzt. (a Stücken des Halms in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b Aehrchen, vergr.)

Fig. 10. Das Pampasgras (*Gynerium argenteum*), prachtvolles, in den weiten Ebenen der südamerikanischen Pampas wachsendes und seit einer Reihe von Jahren in unsern Gärten eingeführtes ausdauerndes Gras, dessen starke weißlichgrüne Blätter einen großen fast Mannshöhe erreichenden Busch bilden, aus welchem sich zur Blütezeit mehrere steif aufrechte einfache Halme mit mehrere Fuß langen strauchförmigen, dichten Rispen von behaarten, silberweiß glänzenden, fünf- bis sechsblättrigen Aehrchen erheben.

Jam. 2. Die Scheingräser (*Cyperaceae*). Sie unterscheiden sich von den Süßgräsern durch den knotenlosen, oft dreikantigen Stengel, durch dreireihig angeordnete Blätter ohne Blathäutchen, deren Stiel eine oft nur sehr kurze geschlossene Scheide bildet, durch die anders gebildeten Blüten und ihr vorzugsweises Vorkommen auf nassem und sumpfigem Boden. Blüten zwitterlich oder eingeschlechtig, hüllenlos oder von einem Perigon, oder von Vorhöfen und Haaren umgeben, von einer einzigen speifenförmigen Deckschwuppe gestützt, in Aehrchen, Aehren, Ährchen, Büschel gestellt, welche oft wieder trugdolbig oder rispig gruppiert sind. Drei Staubgefäße mit haarfeinen Filamenten, deren Spitze an das eine Ende des Staubbeutelchens befestigt ist. Oberständiger einfacherer Fruchtknoten mit oder ohne Griffel und 2 oder 3 fedrigen Narben. Einsamige Schalkfrucht, oft dreikantig, mit harter, oft dicker Schale, kleinem Einweiskörper und in diesem eingeschlossenen Keime. — Die Cyperaceen sind ebenfalls über die ganze Erde verbreitet, ihre meisten Gattungen jedoch in der Aequatorial- und Tropenzone heimisch. Dagegen zeichnen sich einige in der gemäßigten und kalten Zone verbreitete Gattungen (z. B. die Gattung der Rietgräser, *Carex*) durch großen Reichthum an Arten und Individuen aus. In den heißen Ländern besteht der Graswuchs der feuchten und sumpfigen Niederungen oft ausschließlich aus Cyperaceen. Allen mangelt der Jnder, dagegen enthalten viele saure Säfte, weshalb die Scheingräser nur ein schlechtes Viehfutter gewähren und die einheimischen von den Landwirthen als „Sauergräser“ bezeichnet werden. Nutzpflanzen enthält diese Familie nur wenige.

Taf. 10, Fig. 11. Das gemeine Vollgras (*Eriophorum latifolium*). Die Vollgräser wachsen auf torfhaltigem, nassem und sumpfigem Boden und haben ihren Namen von den seidenglänzenden Vollenhaaren erhalten, von denen die Staubgefäße der zwitterlichen in eiförmige Aehren gestellten Blüten umgeben sind, und welche, indem sie sich nach der Blüte

zeit bedeutend verlängern, den fruchttragenden Aehren das Ansehen glänzender Wollknoten verleihen. Die Stengel des Wollgrases sind rund, wenig beblättert und tragen bald nur eine, bald viele trugdoldig angeordnete Aehren. In letztern gehört das hier abgebildete, in Mittel- und Nordeuropa häufig vorkommende breitblättrige Wollgras. (Blühende und fruchttragende Aehre in natürlicher Größe, a Blüte, b Frucht im Querschnitt, vergl.)

Fig. 12. Die Erdnuß (*Cyperus esculentus*). Die Gattung der Cypergräser, deren zahlreiche Arten vorzüglich in der wärmern Zone verbreitet sind, zeichnet sich durch vielblättrige zweizeilige Aehren aus, welche gebüschelt und trugdoldig angeordnet an der Spitze des dreikantigen beblätterten Stängels, von Hüllblättern umgeben, stehen und Zweitelblättern enthalten. Die Erdnuß, eine in Südeuropa und Nordafrika heimische und dort wie auch in der Rheingegend und anderwärts im südlichen Mitteleuropa angebaute Pflanze trägt an ihren Rhizomen unregelmäßig geformte mehrfache eßbare Knollen, welche zu Confect und Getränken benutzt werden. (Die ganze Pflanze sehr verkleinert, daneben eine Aehre in nat. Gr.)

Fig. 13. Die Papierstaude der Älten (*Papyrus antiquorum*). Ein stattliches, an den Ufern des Nil, aber auch in Sicilien an Fufspuren wachsendes, in unsern Gärten und Gewächshäusern in Wasser häufig cultivirtes Gewächs mit schlanken stumpf dreikantigen bis mannshohen blattlosen Stengeln, welche einen Schopf von schmalen Blättern und von dünnen bis fußlangen Stielen mit sechs- bis achtblättrigen Aehren tragen und am Grunde von scheibigen linealen Blättern umgeben sind. Aus dem Mark der Halme wurde das Papier der alten Ägypter bereitet, der triebende dicke Wurzelstock dagegen als Nahrungsmittel benutzt.

II. Ordnung der Kolbenblütigen (*Spadiciflorae*). Blüten eingeschlechtig, selten zwittrig, hüllenlos oder mit Perigon, einem oft von einem oder mehreren Scheidenblättern umgeben, seltener nackten Kolben eingefügt. — Die niedrigsten Glieder dieser Gruppe sind als die unvollkommensten Monotyledonen zu betrachten, während die höchst entwickelten weit vollkommener organisierte Gewächse sind als die Spelzenblütler.

Fam. 1. Wasserlinsen (*Lemnaceae*). Kleine auf dem Wasser frei schwimmende Pflänzchen mit blattartigem aber blattlosem Stämme, welche eine oder mehrere in das Wasser hinabhängende einfache Wurzeln entwickeln und eingeschlechtige hüllenlose auf 1 Stangeispeiß oder 1 Stempel reducirte Blüten in einem ver-schwindend kleinen Kolben tragen, der in eine trug-schalenartige Scheide eingeschlossen ist. Frucht eine ein- oder mehrsamige nicht aufspringende Schlauch-frucht. Die Wasserlinsen bedecken stehende Gewässer oft als grüner Ueberzug und geben ein gutes Futter für Enten (daher auch Entengrün genannt) und Schweine ab. Manche Arten bestehen blos aus Grund-gewebe ohne Gefäßbündel und sind daher als die un-vollkommensten Samenpflanzen anzusehen.

Taf. 11, Fig. 14. Die hederige Teichlinse (*Lemna gibba*), halbkugelig, 2—3 Linien breit (a ganze Pflanze in nat. Gr. b, Blüte mit der trugschalenartigen Scheide, dem Fruchtknoten und 2 Staubblättern, stark vergr., c die ganze große Interzellularräume enthaltende Pflanze senkrecht durchgeschnitten mit dem Kolben, vergl.).

Fam. 2. Wasserriemenartige (*Zosteraceae*). In salzigen Wassern, besonders im heißen Meerwasser vegetierende, im Schlamm wurzelnde Pflanzen mit linealen oder riemenartigen Blättern und blattartigen, von der Blattscheide umhüllten Kolben, an denen nackte

Staubgefäße und Stempel sitzen. Rußartige einjährige Frucht mit einkeisligem Samen.

Taf. 10, Fig. 15 Der Meer-Wasserriemen oder das Seegras (*Zostera marina*), an allen europäischen Küsten wachsend, wird getrocknet zum Ausstopfen der Kissen, Matratzen und als Verwundungsmittel benutzt. a unfruchtbare, b fruchtbare Pflanze, vergr.; c ein bel-beitragender Zweig in nat. Gr., d Stempel, f Frucht, g Same, vergr.; h Kolben von *Zostera minor*, vergl.

Fam. 3. Laichkräuter (*Potamogetonaceae*). Schwimmende oder untergetauchte Gewächse mit beblättertem Stengel und gestielten endständigen, am Grunde des Stiels von dünnhäutigen Scheidenblättern umgebenen Kolben, welche mit einem vierblättrigen Perigon re-sebene Zweitelblättern tragen. Frucht wie bei der ri-gen Familie. Hierher gehört das gemeine Laich-kräut (*Potamogeton natans*), häufig in Teichen, an deren Wasserpiegel die länglichen oder elliptischen langgestielten Blätter schwimmen, während die Aehren über dem Wasserpiegel hervorragen.

Fam. 4. Arumgewächse (*Aroideae*). Ausdauernde Kräuter und Stauden mit knolligen oder kriechenden fleischigen Rhizomen, selten kletternde Sträucher mit Luftwurzeln. Blätter sehr verschieden geformt, groß und saftvoll, gewöhnlich langgestielt mit dem häufig pfeil- oder spießförmiger nicht selten gelappter oder getheilte Blattspitze, grundständig, oder einer oberirdischen Achse abwechselnd stehend. Kelch meist grüne, selten achsel- oder seitenständig, gewöhnlich am Grunde oder ganz und gar von einem großblüthlich geformten, oft schön gefärbten Scheidenblatt umhüllt, selten nackt, entweder ganz oder nur am Grunde mit sitzenden Blüten bedekt. Letztere eingeschlechtig oder zwittrig, nackt, selten mit einem Perigon versehen. Frucht beeren-, selten schlauchfruchtartig; ein- oder mehrsamig, ein- oder wenigsamig, Samen mit lederartiger oder dünner Schale und mehligem Eiweiß, selten einkeislig. — Die Aroideen bilden eine große Familie, deren meiste Arten innerhalb der Tropen vorkommen, wo sie namentlich auf dem feuchten Boden schattiger Urwälder wachsen oder schwammig-artig an Baumstämmen mittels Luftwurzeln angewachsen sind oder an solchen emporklettern. Die Aroideen der Tropenländer prägen zum Theil mit prachtvoll gefärbten Blättern (wie die Caladien), oder mit schon an sich eigenthümlich geformten (die Arten von *Draconium*, *Philodendron*, *Pothos*), oder mit riesig großen (*Calasia*, *Caladium*); viele sind deshalb zu Zierpflanzen in Gewächshäusern und Zimmer geworden und werden sogenannte Blattschmuckpflanzen hochgeschätzt. In Europa kommen nur wenige Arten vor. Die Knollen enthalten viel Stärkemehl, die Beeren meist einen sehr giftigen Stoff. Die Aroideen der Tropen verleiht der dortigen Vegetation das Gepräge der üppigsten Fülle und Pracht.

Taf. 11, Fig. 3. Der gemeine Aroonstab (*Arun-maculatum*), ein in schattigen Laubwäldern Mitteleuropas wachsendes Knollengewächs mit langgestielten pfeilförmigen, glänzendgrünen (bisweilen dunkel gefleckten) Blättern und grundständigem gestielten, von einem hellgrünen Scheidenblatt fast ganz umhüllten Kolben, der am Grunde Fruchtknoten, darüber hängende Warzen, weiter oben sitzende Staubbeutel und darüber wieder spitzige Warzen trägt und sodann in ein violettbraune Keule ausläuft. Beeren rot. Gr. früher officinell. (Ganze Pflanze in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr. a Kolbe in nat. Gr. b Staubbeutel, c derselbe vergrößert, d Fruchtknoten, e derselbe im Durchschnitt, vergl.).

Fig. 4. Das Schlangenkraut (*Calla palustris*).

ein in Mittel- und Nordamerika an Teichrändern, in Wassergräben und Sümpfen vorkommendes Rhizomgewächs mit langgestielten herzeiförmigen Blättern und nadtem Stengel, welcher an der Spitze einen ganz mit nackten Zwitterblüthen bedeckten Kolben trägt, der an der Basis von einem breiten inwendig schön weissen Scheidenblatt umgeben ist. Beeren scharlachroth. War früher ebenfalls officinell. (Abgebildet: der Stengel mit dem Kolben in nat. Gr., a Blüte, b und c Stabgefäße, vergr.)

Fig. 5. *Caladium Argyrites* und Fig. 7 *Caladium giganteum*. Die Caladien sind saftvolle Tropengewächse mit knolligen Wurzelstöcken, den Arumarten ähnlich, von denen sie sich dadurch unterscheiden, daß die Kolben gänzlich mit Blüten bedeckt sind, und zwar zu unterst mit Fruchtknoten, in der Mitte mit staubbeutelartigen Hervorragungen oder Warzen, am oberen Theil mit Staubbeutel. Viele Caladien haben prächtig gefärbte oder gefleckte Blätter (z. B. silberfarbene gepunktete das als Blattpflanze sehr beliebte *C. Argyrites*, vom Amazonenstrom, hier in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr. abgebildet), andere riesengroße, z. B. das in Yucatan's Urwäldern heimische *C. giganteum*, dessen Blattstiele länger als ein Mann sind.

Fig. 6. Die Taroopflanze (*Colocasia macrorrhiza*), eine riesige Aroides mit kurzem baumartigen Holzstamm und dickstieligen Pfeilblättern, deren Spreite bis 3 Fuß lang ist, wird auf den Sandwicheinseln wegen ihrer mehrfachen Rhizome als Nahrungspflanze angebaut. Denselben Zweck dient auf andern Inseln der Südee das ähnliche doch minder große *Caladium esculentum*.

Fig. 8. Der gefingerte *Botchos* (*Pothos digitata*), ein mit Luftwurzeln kletternder Strauch des tropischen Südamerica, hier in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr. abgebildet, besitzt langgestielte fingerförmig getheilte Blätter und achselständige kurzgestielte, über und über mit von einem Perigon umhüllten Zwitterblüthen bedeckte Kolben (a einzelne Blüte, b Staubblatt von außen, c Fruchtknoten, vergr., d Blüte im Längsschnitt, stärker vergr.).

Fig. 9. Der *Kalmus* (*Acorus Calamus*), aus dem Orient stammendes, doch längst in fast ganz Europa einheimisch gewordenes, in Teichen und Lachen wachsendes Rhizomgewächs, dessen aromatischer kriechender fleischeriger Wurzelstock bekanntlich als Arznei und Gewürz und überdies als Confect dient. Blätter und Stengel sind breit lineal, sehr lang, aus der Seite des Stengels bricht der nackte ganz mit Zwitterblüthen bedeckte Kolben hervor. (Abgebildet: die ganze Pflanze, sehr verkleinert, a Kolben in nat. Gr., b Blüte von oben gesehen, c dieselbe von der Seite, vergr.)

Fig. 5. Rohrkolbengewächse (*Typhaceae*). Einhäusige perennirende Sümpfpflanzen mit langen schmalen säbelförmigen Blättern und einfachen, selten verzweigten Stengeln, welche männliche und weibliche Blüten in gesonderten walzen- oder kegelförmigen Kolben tragen. Blüten auf die Geschlechtsorgane reducirt, von Borsten umgeben, männliche aus 3 Staubgefäßen, weibliche aus einem gestieltem Fruchtknoten mit oft langer Narbe bestehend. Kleine einsamige bald- oder steinfruchtartige Frucht, Same dünnhäutig, eiweißhaltig.

Taf. 11, Fig. 2. Der breitblättrige Rohr- oder Teichkolben (*Typha latifolia*), in stehenden Gewässern häufig, macht 6—9 Fuß hohe Stengel, die an der Spitze zwei walzige aneinanderstoßende Kolben tragen, von denen der obere männliche, der untere weibliche Blüten enthält. Letzterer wird zuletzt gelbbraun und färbt sich schwarzbraun. Die feinen Blütenhaare werden als Einstreupulver bei runden

Hautstellen gebräunt. (Abgebildet: die kolbentragende Spitze des Stengels in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., a weibliche, b männliche Blüte, vergr.)

Tam. 6. Pandanengewächse (*Pandaneae*). Zweihäufige, aufrechte, niederliegende oder kletternde Bäume und Sträucher der Tropenländer mit anfangs einfachem walzenförmigen, später verästelttem Stamme, welcher zahlreiche Luftwurzeln entwickelt und schließlich auf einem Gerüst von Luftwurzeln steht und dessen Gipfel sowie das Ende der Aeste eine stielliche, an die Palmen erinnernde Krone langer einfacher, oft dornig gefäugter Blätter trägt. Männliche Blüten in ähren-; weibliche in zapfenförmige Kolben gestellt, Staubfäden und Fruchtknoten verwachsen, ohne Hüllen, Kolben am Grunde von mehreren oder vielen oft schön gefärbten Hüllblättern umgeben. Früchte steinfruchtartig mit trodener faseriger Mittelschicht oder beerenartig, ein- oder vielkammig, untereinander zu einem großen kegelförmigen oder länglichen Fruchtkörper (Fruchtstand) verwachsen, bei manchen Arten eßbar. Samen mit fleischigem Eiweiß. — Die Pandaneen sind vorzüglich über die Inseln des Indischen Archipels und des Großen Oceans verbreitet. Dort wird namentlich der mit äußerst wohlriechenden Blumen begabte *Pandanus odoratissimus* seiner eßbaren Früchte halber allgemein angebaut. (Taf. 14, Fig. 1 *Pandanus litoralis* von den Dandaineln, sehr verkleinert; Fig. 15 ein Fruchtkörper in nat. Gr.)

Tam. 7. Kreisblütler (*Cyclanthaceae*). Palmenartige einhäufige Holzgewächse der Tropenländer mit einfachem, meist verkürztem Stamme und einer großen Krone fiederschnittiger oder fächerförmiger Blätter, an deren Grumbe gestielte ährenförmige, über und über mit quirlständigen Blüten bedeckte, von großen Hüllblättern umgebene Kolben stehen. Blüten mit Perigon, männliche mit 2 bis vielen freien Staubgefäßen, weibliche mit oberständigem Fruchtknoten, langem oder fehlendem Griffel, getheilte oder ganze Narbe. Vornachbarte Fruchtknoten häufig verwachsen. Steinfrucht- oder beerenartige, ein- oder wenigkammige Frucht, von den verhärteten Schuppen der Blütenhülle umschlossen. Samen eiweißhaltig. — Die durch das äquatoriale Südamerika und Westindien zerstreuten *Cyclantheen* wurden früher zu den Palmen gerechnet, zu denen sie allerdings den Uebergang von den Kolbenblüthigen bilden.

Taf. 14, Fig. 2. Die großfruchtige Eisenbeinpalm (*Phytolophas macrocarpa*), eine an Flussufern in Peru und Kengranada wachsende Art mit verkürztem Stamme, 6—10 Fuß langen fiederschnittigen Blättern, keulenförmigen Kolben und großen kegelförmigen Früchten, welche vier knollenförmige Samen mit eiweißreichem und eiweißharten Eiweißkörper enthalten. Aus letztem, unter dem Namen vegetabilisches Eisenblei bekannt, werden Stodknöpfe und allerhand Bijouterien verfertigt. (Fig. 2 ganze Pflanze, sehr verkleinert; Fig. 16 b Frucht von *Phytolophas Ruizii* im Querschnitt in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., a Samen daraus im Längsschnitt mit dem Keime.)

III. Ordnung der Pflanzenfürsten (*Principes*). Besteht bloß aus der Familie der Palmen (*Palmae*). Holzgewächse der Aequatorial-, Tropen- und subtropischen Zone beider Hemisphären von meist baumartigem Wuchs, mit aufrechtem säulenförmigen gewöhnlich einfachen Stamme, der eine gewaltige Krone großer Blätter trägt, seltener mit verkürztem oder unterirdisch kriechendem oder kletterndem und verzweigtem Stamme, in letztem Falle bisweilen einzeln und entfernt stehende Blätter tragend. Der aufrechte Stamm hat



stets eine Faserwurzel, ist walzig oder nach oben zu verdickt oder (selten) in der Mitte bandig aufgetrieben, glatt, knotig, geringelt oder schuppigrauh, bei wenigen Palmen nach oben gabeltheilig-ästig, mehrere Blättertronea tragend; der Kletternde ist aus langgestreckten Internodien zusammengeflocht, mit einzeln stehenden Blättern besetzt, ästig und oft seilförmig, stets glattrindig und knotig. Blätter von mehrjähriger Dauer, sich aus der Endknospe alljährlich erneuernd, spiralig gestellt, sehr groß, mit scheibigem holzigem Blattstiel, fiedertheilig und fiederschnittig (scheinbar gefiedert), oder fächerförmig, dann oft hand- oder fingerförmig zertheilt, Lappen oder Abschnitte meist gefaltet, steif und hart. Blattstiele am Rande oft dornig, Scheibe groß, den Stamm oft ganz umfassend, nicht selten aus einem Wastbündelgestlecht bestehend. Blüten eingeschlechtig, selten zwitтерlich, an verzweigten schwächlichen holzigen Kolben sitzend, diese oft sehr groß, zwischen den Blättern aus lederartigen, zusammengefalteten Scheidenblättern, die sie anfangs ganz umschließen, hervorbrechend. Blüten sehr zahlreich, aber unansehnlich, jede von einem oder mehreren Deckblättchen gestützt, mit persistentem, aus 2 alternirenden Kreisen von je 3 Blättern bestehendem Perigon, 6 selten 3 oder vielen, oft monodelphischen Staubgefäßen und 3 bald getrennten, bald zusammengebackenen oberständigen Stempeln; Fruchtnoten ein- bis dreifächerig (wenn aus 3 verwachsenen bestehend). Steinfrucht mit lederartiger, faseriger oder fleischiger Außenhülle und ein- bis dreifamiger Steinlern oder beerenartige ein- bis dreifamige Frucht; Samen mit großem, den an der Perispermie gelegenen kleinen Keim umschließenden Eiweißkörper. — Die Palmen gehören zu den stolzeften, imponirendsten Pflanzenformen der Erde und sind zugleich höchst nuzbare Gewächse, indem fast jeder Theil technisch verwertbar ist. Viele erreichen eine sehr bedeutende Stammhöhe und prägen mit kolossalen Kronen riesiger Fieder- oder Fächerblätter. Ihr Blütenreichtum und ihre Fruchtproduction ist geradezu fabelhaft, bei manchen kommen bis 200000 Blüten an einem einzigen Kolben vor, welche dann ebenfalls eine riesenmäßige Größe erreichen. Die meisten Palmen wachsen im tropischen Amerika. Linné kannte bloß 15 Arten, während bis 1863 deren schon 681 bekannt waren. Auch hat man schon viele vorweltliche Palmen im versteinten oder verkohlten Zustande aufgefunden, besonders in den Schichten der Tertiärperiode. Die Palmen zerfallen in glattrindige und in solche mit beschuppten oder gepanzerten Früchten (Taf. 14, Fig. 13), außerdem in eine Anzahl Tribus oder Unterfamilien.

Taf. 13, Fig. 2. Die Dumpalme (*Hyphaene thebaica*), eine der wenigen Palmen, deren Stamm sich gabelförmig verzweigt und sich dadurch der Form der Drachenbäume nähert, wächst in Oberägypten, Abyssinien, Arabien und Arabien. Stamm bis 30 Fuß hoch, Blüten gelblich, Steinfrüchte mit fleischig-faseriger Hülle, essbar.

Fig. 3. Die Dattelpalme (*Phoenix dactylifera*), uralter Culturbaum, vom nordwestlichen Indien durch Westasien und Nordafrika bis Südeuropa und bis auf die Canarischen Inseln verbreitet und namentlich in den Oasen der afrikanischen Wüsten im größten Maßstabe angebaut, erreicht bis 70 Fuß Höhe und besitzt bis 10 Fuß lange Blätter. Blüten zweihäufig. Männliche Kolben groß, weibliche verhältnismäßig klein, obwohl ein einzelner bis 200 Früchte zu erzeugen vermag. Letztere, die bekannten Datteln, bilden das Hauptnahrungsmittel der Wüstenbewohner, werden frisch und getrocknet gegessen und auch als Entzündung

milderndes Mittel angewendet. (s. Taf. 14, Fig. 3.) Kolben mit seinem Scheidenblatt, ist eine unreife Frucht, c dieselbe gewaschen, nat. Gr.)

Fig. 4. Die Iwergpalme (*Chamaedorea*), die einzige in Europa (Südeuropa) wachsende, aber auch in Nordamerika vorkommende Palmenart, ist gewöhnlich stammas reichstämmig, sodaß sie mit ihren verhältnismäßig kleinen Fächerblättern einen abgerundeten Stamm bildet, dessen Fuß hohen Busch bildet, kann aber auch ein Standortsverhältnissen auch zu einem Baum von 10 bis 25 Fuß Höhe mit zertheiltem Blüten ebenfalls zweihäufig, Steinfrucht fleischig, ungenießbar. Die jungen Pflänzchen als Salat oder Kohl genossen, aus den Blättern Matten, Zierathen und Körbe verfertigt (s. B. in Südportugal).

Taf. 14, Fig. 3. Die mexicanische (*Chamaedorea Schiedeana*), eine kleine, unsere Gewächshäuser häufig cultivirte Palme mit kaum zollstarkem, aber dicken und höherem, knotigerringeltem, glattrindigen, etwas entfernt stehenden Fiederblättern, die die kleinen verzweigten, zuletzt abwärts gebogenen Kolben stehen; wächst in Mexico und benutzbar zu Stöden benutzt, welche man in Bambusrohrstöde ausgibt.

Fig. 4. Die Sagopalme (*Metroxylon*), auf den Molukken und Sundainseln sehr häufig angebaut, gehört zu den kleinsten Palmen. Ihr Stamm wird nur bei uns kultivirt, trägt aber eine gewaltige Krone von langen Fiederblättern, deren bis 4½ bis 2 Zoll breit werdende Fiederabschnitte schwach dornig gezähnt sind. Kolben aus bis 3 Fuß langen außen schwach hervorstechend, vielfach verzweigt, aufrecht stehenden, wolligen Schuppen bedeckt. Aus dem mehrfachen Marke dieser und anderer Arten derselben Gattung die echte Sago (Palmenjage) gewonnen. Stamm vermag bis 800 Pfund zu wiegen. Auch wird aus dem Marke Brot bei uns kultivirt (nat. Gr.).

Fig. 5. Die Kokospalme (*Cocos*), verhältnismäßig Palme, deren Vaterland wahrscheinlich in Amerika (wo die Gattung *Cocos* ausschließlich vorkommt) ist, und welche schon seit geraumer Zeit in den Tropenländern rings um die Erde baum angebaut wird, besonders aber in den Inseln des Großen Oceans, deren Hauptnahrungsmittel gehört zu den stolzeften und nuzbarsten. Die Pflanze ist schlank, höchstens 1 Fuß stark gewachsen, bis 100 Fuß hoch, die Fiederblätter bis 3 Fuß lang, die Fiedelabschnitte bis 30 dreieckige Aeste. Letztere weißlich, wohlriechenden Blüten bedeckt. Mehrzahl männlich, nur wenige weiblich, noch trägt eine einzige Kokospalme eine solche Frucht. Die Größe eines Mannstempels, die Steinfrüchte mit wider faseriger Hülle, dreieckig, am Scheitel mit 3 keulenförmigen, genannten Kokosnuß ist ihr Steinfrucht. Ihr Innenraum mit einer wässerigen Flüssigkeit, die Kokosmilch, später die Kokoswasser, welcher angenehmer Geschmack. Aus diesem wird das Kokosöl gewonnen.

auscheiden. Palmenwein oder sogenannter den Fasern der Fruchthülle verfertigt man aus und Flechtwerk von unverwüthlicher der beinhaltenen Ruffchale Knöpfe, Gefäße fachen. Das Holz des Stammes dient als Heizmaterial, die Blätter werden zur Verfertigen Matten, Hüten, Sonnenschirmen u. s. w., le zu Spazierstöcken, die an Gerbstoff reiche zum Schwarzfärben, die scheidigen zu Sieben, das saftige Mark der End-Gemüse benutzt; kurz, es gibt keinen Palme, welcher nicht benutzbar wäre.

Die schwarzernige Delpalme (*Elaeis*), eine im Flußgebiet des Amazonas flüssen wachsende, durch einen meist niedrigen 12 Fuß Länge erreichenden Stamme te Palme, welche bis 20 fast ebenso lange Blätter trägt, unterhalb deren die von umhüllten Kolben hervorbrechen. Diese sind weicht (der weibliche besitzt bis 100 Zweige),  $\frac{1}{2}$  Fuß lang. Das orangenfarbige Fleisch ist eiförmigen, durch gegenseitigen Druck ständigen Steinfrucht enthält ein fettes als Leuchtmaterial in Lampen benutzt ist wichtiger als diese amerikanische Delie im tropischen Westafrika heimische und den Maßstab angebaute Delpalme von Guineaensis), welche einen aufrechten, sehr den Stamm mit bis 15 Fuß langen Blättern und deren kolossale Fruchtstößen bis 800 u 1—3 Zoll Länge tragen und bis liegen. Das aus diesen Früchten gepreßte in neuerer Zeit ein sehr wichtiger Handelsorden; es wird alljährlich in Hunderten Ladungen nach England ausgeführt und zur Fabrication von Lichtkerzen verwendet. Die ostindische Fächerpalme (*Corypha*), eine prachtvolle Palme mit 60—70 Fuß in Stamme und einer majestätischen Blätter 0—40 Fuß Durchmesser, wird nicht selten Gewächshäusern kultiviert. Die riesigen haben im Vaterlande der Palmen bis zu armide Stiele, und unter ihrem fast Fächer sollen bis vier Männer Schutz gegen in. Die kolossalen, vielfach verzweigten stehen aufrecht, einen riesigen pyramidalen bildend. Aus dem harten holzigen Kern großen Steinfrüchte werden in Ostindien Kerthen verfertigt, die jungen Blätter bl benutzt.

Die brasilianische Weinpalme (*Mauritia*), eine riesige, durch Schlankheit des bei 100 bis 150 Fuß Höhe nur 2 Fuß durch eine imposante Krone langgestielter (Stiel 8—10 Fuß lang, Fächer 10—15 Durchmesser) ausgezeichnete, an Flußufern Palme, aus deren Saft (theils des Stammes der Früchte) ein süßes weinartiges Getränk wird. Die an gewaltigen, abwärts Kolben befindlichen Früchte sind von der Hühnerreis und gleich denen der Sagopalm. Zwischen der Schuppenhülle und liegt ein röthliches, Zuder und Del entziehbares Fleisch. — Verwandt mit dieser ist die durch H. von Humboldt bekannt gewordene Fächerpalme vom Orinoco), deren Stamm wider, aber nicht so hoch (bloß) wird, und den Guarani-Indianern alles sie zu ihrem Leben brauchen, indem alle und Producte benutzbar sind.

Fig. 9. Die Palmyrapalme (*Borassus flabelliformis*), eine der am weitesten verbreiteten Palmen der Alten Welt (von Arabien bis Bengalen, wo sie namentlich an der Malabar- und Koromandelküste große Waldungen bildet, und bis Borneo, Celebes und Amboina) und eine der in unsern Gewächshäusern am häufigsten cultivirten Fächerpalmen, erreicht auch bis 100 Fuß Höhe und trägt eine kugelige Krone von bis 10 Fuß langen Blättern. Sie ist vielleicht die nutzbarste Palme (ein indisches Lehrgebieth zählt 801 nützliche Anwendungen auf) und wird deshalb auch im großen Maßstabe in ungeheurer Menge angebaut. Besonders liefert diese Palme viel Ledy und Jaggoryzuder, wovon z. B. aus Ceylon jährlich viele tausend Centner ausgeführt werden. Der Saft zu beiben wird aus den Kolbenscheiden gewonnen. Die Früchte sind große dreieckige Steinfrüchte (Fig. 14, nat. Gr.), die Blüten zweifachig.

Fig. 10. Die brasilianische Wachspalme (*Copernicia cerifera*), eine höchst malerische Palme mit mäßig hohem, durch die stehen bleibenden Basen der abbrechenden Blätter beschupptem Stamme und kugelig dichter Krone schüsselförmiger langstieliger Fächerblätter, welche Wachs ausschweizen, wächst in den innern Provinzen Brasiliens. — Viel mehr vegetabilisches Wachs als diese Palme liefert die riesige, in Columbia wachsende Klopstockia *cerifera*, eine mit Fiederblättern begabte Palme, deren Stamm bis 200 Fuß hoch wird, sowie die auf dem Andesgebirge zwischen 7930 und 9700 Fuß Meereshöhe vorkommende *Ceroxylon andicola*, deren fast ebenso große Höhe erreichender, ganz mit einer dicken Wachsschicht überzogener Stamm nach oben hin eine Anschwellung zeigt.

Andere bemerkenswerthe Palmen mit einfachem Stamme und mit einer Blätterkrone sind: die Betelpalme (*Areca catechu*), 60 Fuß hoch, mit Fiederblättern, deren Samen (Betelnüsse) von den Malaien in Blätter des Betelpfeffers eingewickelt und mit Kalk vermischt gekaut werden, um den Athem wohltuend zu machen, den Mund siegelförmig und die Zähne schwarz zu färben. Das Blätterz dieser in Ostasien allgemein angebauten, sowie einer andern, der auf den Antillen heimischen *A. oleracea*, werden als Kohl verspeist. Fig. 12 zeigt die Frucht einer dritten Art, der in Ostindien heimischen *A. triandra*, in nat. Gr. — Die Zuckerpalme (*Arenga saccharifera*), eine in Ostindien und auf den indischen Inseln wachsende Palme mit Fiederblättern, enthält in den männlichen Kolben einen zuckerreichen Saft. Aus dem Mark wird Sago bereitet, aus den Fasern der Blattstiele Tauwerk.

Fig. 11. Die ostindische Rohrpalme (*Calamus equestris*). Die Gattung *Calamus* besteht aus Holzpalmgewächsen mit schlanken, knietig-gegliederten, aus langgestreckten Internodien zusammengesetzten Stämmen, welche oft mehrere hundert Fuß Länge erreichen, sich vielfach verzweigen und an den Zweigen mit einzeln und entfernt stehenden Fiederblättern besetzt sind. Diese eigenthümlichen, den übrigen Palmen so unähnlichen Gewächse treten als riesige Schlingpflanzen in den Wäldern des tropischen Asien auf und bilden oft undurchdringliche Gestecke. Die schlanken Aeste, deren Internodien oft sehr lang gestreckt sind, werden zu Stöcken benutzt (die sogenannten spanischen Rohre), noch schwächere zu Rohrseilen und andern Flechtwerk. Die Stämme der hier abgebildeten Rohrpalme erreichen bis 180 Fuß Länge, die von *C. rotang* sollen bis über 500 Fuß lang werden. Die Blattstiele, Stiele und Mittelrippen der Blätter sind meist mit

starken Stacheln bedeckt, wodurch die natürlichen Ge-  
flechte dieser Palmen noch undurchdringlicher werden.

IV. Ordnung der Bananengewächse (Scitamineae).  
Großblättrige, saftvolle Stauden der Tropen Gegenden,  
manche von riesiger Größe und baumförmigem Wuchs,  
doch ohne wirklichen Holzstamm. Blätter einfach, un-  
zertheilt, ganzrandig, fiedernervig, mit scheidigem Stiel.  
Blüten zwittrlich, mit unterständigem Fruchtknoten,  
unregelmäßig geformtem Perigon, oder mit Kelch und  
Blumentrone; Blütenstände von scheidigen Deckblättern  
umhüllt. Vielsamige Kapsel oder Beere. Samen  
mit Eiweißkörper, welcher den Keim einschließt.

Fam. 1. Pisanggewächse (Musaceae). Große  
krautige Stauden mit meist verkürztem (unterirdischem)  
Stamme und oberirdischem bisweilen baumartigem  
Scheinstamme, welcher aus den sich gegenseitig um-  
fassenden Scheiden alternirend zweizeiliger Blätter ge-  
bildet wird. Solche baumartige Formen (z. B. der  
gemeine Pisang, Taf. 12, Fig. 3) erinnern durch ihre  
mächtige Blätterkrone an Palmen. Blütenstand zu-  
sammengesetzt, ährig, bei diclinischen Blüten an der  
Spitze männlich, sonst weiblich, meist mit zweizeilig  
angeordneten, oft prachtvoll gefärbten scheidigen Deck-  
blättern. Perigon blumentronenartig, aus 6 in 2  
alternirende Kreise geordneten, verschiednen großen  
Blättern zusammengesetzt, oft zweilippig. Staubgefäße  
6, das hintere unfruchtbar oder fehlend, mit breiten  
Filamenten. Beeren- oder steinfruchtartige, dreifächerige,  
ein- bis vielsamige Frucht.

Taf. 12, Fig. 3. Der gemeine Pisang (*Musa  
paradisica*), ein stolzes Gewächs von baumförmigem  
Wuchs mit riesengroßen (bis 12 Fuß langen und bis  
2 Fuß breiten), im Alter der Quere nach spaltenden  
Blättern und gipfelförmigem, solbenartigem, bis 4 Fuß  
langem überhängendem, aus Blütenwirbeln zusammen-  
gesetztem und in einen stumpfen nadten Kegel endi-  
gendem Blütenstande, wird in allen Tropengegenden  
wegen seiner eßbaren Früchte in vielen Varietäten  
(allein auf den Philippinen in mehr als 70) ange-  
baut. Die Spitze der dicken Blütenstands- und Blätter-  
spindel ist purpurbau, die theils männlichen, theils zwittrlichen  
Blüten sind gelblichweiß, die scheidigen Deckblätter  
violett, die Früchte dreieckig, fast halsförmig, bis  
1 Fuß lang und bis 3 Zoll dick, fast samenlos. Sie  
bilden die tägliche Nahrung der Tropenbewohner, in-  
dem sie halb und ganz reif, roh und gekocht oder in  
Butter gebraten gegessen werden. Auch bereitet man  
aus ihren gegorenem Saft eine Art Wein. Eine  
einzige Pflanze vermag über einen Centner Früchte zu  
liefern. Nach der Fruchtentwidelung stirbt der ganze  
Stamm bis auf das Rhizom ab. Auch die übrigen  
Theile der Pflanze werden zu verschiedenen Zwecken  
benutzt. Als das Vaterland wird Ostindien angegeben,  
doch findet sich die Pflanze nirgends mehr wild. (a  
männliche Blüte, b zwittrblüte, c Geschlechtsorgane,  
verf. d Frucht von *Musa coccinea* im Querschnitt,  
e Same derselben Art im Querschnitt, f Keim daraus,  
nat. Gr.) — Eine verwandte Riesen- und Pracht-  
pflanze ist der „Baum der Reisenden“ (*Ravenala mada-  
gascariensis*), aus dessen bis 10 Fuß hohem Schein-  
stamme sich eine fächerförmige Krone zweizeilig ange-  
ordneter Riesenblätter erhebt, deren dicke Scheiden so  
viel Wasser erhalten, daß beim Anbohren dasselbe in  
einem Strahl heranspritzt.

Fam. 2. Blumenrohrartige Pflanzen (Can-  
naceae). Stattliche Stauden des tropischen Amerika  
mit kriechendem oder knolligem Rhizom und oberirdi-  
schen aufrechten, bisweilen ästigen Stengeln, welche  
mit großen scheidigen, zweizeilig gestellten Blättern  
besetzt sind und mit einem ähren- oder rispenförmigen

Blütenstande endigen. Blüten (s. Taf. 12, Fig. 1)  
mäßig, mit dreiblättrigem Kelch und zweilippigen,  
aus 6 in 2 Reihen geraden, mehr oder weniger ver-  
wachsenden, stehenden Blumentrone. Das eine ist als  
abwärts gebogene Lippe (labellum) an welche das  
einzige Staubgefäß anheftet. Beeren- oder steinfruchtartige Frucht.

Taf. 12, Fig. 1. Das indische (Canna indica), beliebte  
Pflanzen- oder Heilgewächs mit 3—5 Fuß hohem  
Stengel und Blättern. (Blatt und Blütenstand in nat. Gr.)  
— Zu den blühenden gehört auch die Pfeilwurze (*Marsip-  
pites*), ein in Ostindien heimisches und angedom-  
tes Gewächs, deren starkmehlreiche Wurzel das als  
Krautmehl berühmte Arrowroot liefert.

Fam. 3. Ingwergewächse (Zingiberaceae).  
Stattliche perennirende Stauden mit knolligem  
Rhizom, ohne oder mit sehr kurzen Stielen der  
zweizeilig angeordneten Blätter. Blütenstände mit  
zweizeilig gestellten Blättern, bald aus dem Rhizom  
steigend, ährig oder rispig. Kelch mäßig, oft zweilippig,  
aus 6 in 2 Reihen nach unten meist röhrig verwach-  
senen, stehenden Staubblättern. Staubbeutel bis auf eine  
ähnliche Gebilde verwandelt, das einzige beutel-  
tragende dem lippenförmigen Staubblatt opponirt.  
Griffel lang, den Fächern des Staubbeutels befeuch-  
tend durchgehend. Frucht kapselartig, mit 2  
springenden, selten beerenartigen, Samenmantel  
umhüllt. — Die überzahl der Zingiberaceen, von denen  
man in Ostindien, Amerika und Neuholland zu Hause  
findet, wächst in Ostindien, die übrigen in Amerika  
und Neuholland zu Hause.

Taf. 12, Fig. 4. Der gemeine Ingwer (*Zingiber  
officinale*), ein in Ostindien heimisches, in Ostindien  
angebautes Gewächs mit knolligem, kriechendem,  
dicke, knolligem, gegliedertem, welches die bekannte  
Ingwermurzel bildet. Stengel 3—4 Fuß hoch, Blätter  
2½ Zoll breit, grundständige Blätter lang, Blüten  
gelblichweiß, wachsende Deckblätter, nat. Gr., b  
Blüten. Zu dieser Familie gehört die Gelbe  
(*Curcuma longa*), deren lange geringelte Rhizome  
gelbe Farbe enthalten, und die Zedoaria (*Curcuma  
Zedoaria*), deren bandförmige Rhizome officinell  
waren, desgleichen die als Wurze benutzte  
Galgantwurzel, der Alpina Galanga. Alle diese Arten  
zu Hause.

V. Ordnung der Mannweibigen (Orchidaceae).  
Staubbeutel mit dem Stempel verwachsen. Name  
(vgl. die 20. Klasse des Linné). Die wichtigste  
Familie dieser Ordnung. Orchideen (Orchidaceae).  
Krautartige, im Boden wurzelnd, mit Rhizomen  
sehen (Orchidideen), theils mittel- oder rosen-  
rothartig an Baumstämmen oder Felsen die Nahrung  
aus der Luft ziehend (epiphytisch); erstere mit  
beblättertem Stengel, die Blüten einzeln oder ähren-  
förmig an der Spitze trägt, letztere grünlich  
knollig ausgebildeten Rhizomen (Scheinknollen,  
pseudobulbi), die die Blätter tragen und nadte  
Blütenstiele.



lässe, selten aus der Spitze, sowie zahlreiche Luftwurzeln entwickeln. Blätter abwechselnd, mit scheideförmigem Grunde, einfach ganz und ganzrandig, Blätter ritterlich, von einem scheideigen Deckblatt gestützt, mit niederständigem Fruchtknoten und unregelmäßigem, oft eiförmigem, aus 6 in 2 alternirende Kreise geordneten Blättern bestehendem Perigon. Die drei äußeren Blätter ziemlich oder ganz gleich in Form, Größe und Ordnung, von den drei innern das mittlere (untere) etwas eigenthümlich, oft höchst merkwürdig gebildet, die seitlichen (labellum) genannt (Taf. 12, Fig. 6, a, b). Griffel innerhalb des Perigons als fleischige, verbiedene geförnte Säule (Griffelsäule) ausgebildet, mit welcher die beiden Fächer des einzigen Staubbeutels sehr selten 2 Staubbeutel) verwachsen sind. In jedem Staubbeutel befindet sich eine Pollenmasse (pollinarium) von fleischigem Ansehen, oft keulenförmig und gestielt (Fig. 12, c, d). Frucht kapselartig, selten fleischig, mit 3 Klappen aufspringend, viele sehr kleine (staubtrüge) Samen enthaltend, welche von einem dünnhäutigen Samenmantel umgeben sind (Fig. 12, e). — Die Orchideen, eine sehr große Familie, sind besonders in der Tropenregion verbreitet, wo die pseudoparasitischen ausnehmend vorkommen, doch gibt es auch zahlreiche Erdorchideen in der gemäßigten Zone und selbst in der kalten finden sich einige. Fast alle haben schon gefärbte Blumen, besonders aber zeichnen sich viele der pseudoparasitischen durch Anmuth oder eigenthümlichkeit der Form, durch Größe und durch Reichthum der Farben aus (z. B. die Gattungen Stanopea, Colleya, Aërides, Dendrobium, Coelogyne, -ycaste u. a.). Diese Bewohner der tropischen Urwälder sind zu den größten Zierden unserer Warmhäuser geworden, wo sie in hängenden Körbchen, in Töpfen, an Holz- und Korbstücken kultivirt werden. Viele Orchideen haben einen süßlichen, nach Vanille riechenden Blumen Duft.

Taf. 12, Fig. 5. Das weiße Anabentkraut (*Platanthera bifolia*), auf Waldwiesen im Juni oft häufig, mit weißen langgestreckten Blüten, hat sehr angenehmen süß duftenden Blumen. (Abbildung in  $\frac{1}{3}$  nat. Gr., a Blüte von vorn in nat. Gr.)

Fig. 6. Das gefledtblättrige Anabentkraut, (Lutskablume (*Orchis maculata*)), auch eine verbreitete Waldpflanze, besitzt schwarzgefleckte Blätter und purpurne Blumen (a Blume von der Seite, b von vorn, c Griffelsäule von vorn, d Pollenmasse, e Samen; alle Figuren vergr.). Die Knollen mehrerer Orchideen sind sehr als *Tubera Salep officinell*.

Fig. 7. Die Vanille (*Vanilla planifolia*), eine pseudoparasitische, kletternde Orchidee der Wälder Mexicos, mit gelb und weiß gefleckten Blumen, bringt eine schotenartige, meist violettbraune, höchst angenehme aromatische duftende und schmeckende, fleischige Kapseln hervor, welche die echte Vanille des Handels bilden (bühnender, b fruchttragender Zweig in nat. Gr., Griffelsäule, c Lippe, vergr.).

VI. Ordnung der Schwerblättrigen Gewächse (*Scitaceae*). Krautartige oder strauchige, sehr verschieden gestaltete ausdauernde Gewächse mit schwerblättrigen oder linealen Blättern und verschieden geformten Blüten, welche aus einem unterständigen Fruchtknoten und einem meist regelmässigen, sechsblättrigen, in alternirende Kreise geordneten, getrennt oder verbiedentblättrigen Perigon bestehen. Frucht kapselartig, beerenartig, mehrsamig.

Taf. 1. Ananasgewächse (*Bromeliaceae*). Strauchartige Gewächse der Tropenländer Amerikas mit verkürztem Stämme und spiralförmig gestellten großblüthigen Schwerblättern, welche am Rande

oft dornig gezähnt sind. Blütenstand endständig, ähren- oder traubenförmig, seltener rispig, oft von prächtig gefärbten Deckblättern umgeben oder mit solchen besetzt. Blüten meist zwittrlich, Perigon röhrig, ähnelnd oft leldartig, Staubgefäße 6, der Röhre des Perigons eingefügt, Griffel mit dreilappiger, gedrehter Narbe. Frucht vielamig, Samen mit fleischigem Eiweiß. Viele Bromeliaceen sind gleich den pseudoparasitischen Orchideen mittels Luftwurzeln an Felsen und Stämmen von Bäumen angeheftet, sie bilden mit erstem und mit Kreiden den Hauptbestand der amerikanischen Urwälder.

Taf. 12, Fig. 2. Die Ananas (*Bromelia Ananas*), eine in allen Tropenländern und seit geraumer Zeit auch in der gemäßigten Zone in besonders konstruirten Treibhäusern (Ananashäusern) angebaute Pflanze von unbekannter Herkunft (in Ostindien ist ihre Cultur uralte), welche im Boden wurzelt und unterhalb des kurzen Stamm stehenden Blätterkopfes die dicht zusammengebrängten Blüten entwickelt, durch deren Verschmelzung ein großer kugelförmiger Fruchtkörper von zuletzt goldgelber Farbe entsteht, die sogenannte, wegen ihres Wohlgeruchs und Wohlgeschmacks berühmte Ananasfrucht. Die einzelnen warzenförmigen Abtheilungen der Frucht bestehen aus den einzelnen Blüten, deren Perigone nach der Blütezeit fleischig und saftig werden und mit dem Fruchtknoten zu einer Scheinbeere verschmelzen. (Abbildung zeigt den oberen Theil des fruchttragenden Samens in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., a Blüte, b Frucht im Längsschnitt, nat. Gr.)

Taf. 2. Schwerblüthengewächse (*Iridaceae*). Veremirende Kräuter mit knolligen oder fleischigen Rhizomen oder mit zwiebeligen Knollen, letztere stengellos, grundständige Blätter und Blüten entwickelnd, erstere mit beblättertem Blütenstengel. Blätter schwertförmig oder lineal, ganzrandig. Perigonblätter nach unten zu röhrig verwachsen, Staubgefäße 3, dem Grund der äußeren Perigonblätter angewachsen, Griffel mit 3 blumenblattförmigen Narben. Dreifächerige, dreilappige, vielamige Kapsel, Samen mit fleischigem Eiweiß. — Bewohner der gemäßigten und subtropischen Zone beider Hemisphären, die meisten in Südafrika heimisch. Fast alle prägen mit schön gefärbten Blumen.

Taf. 11, Fig. 10. Die Siegwurz, der Schwertel (*Gladiolus communis*), beliebt in Südeuropa heimische Zierpflanze unserer Gärten mit knolligem Rhizom und einseitigwendiger Aehre fast zweiflüßiger purpurner Blüten. (Abbildung a in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., c Perigon, b Geschlechtsorgane, wenig größer, d Narbe, nat. Gr.)

Fig. 11. Die weiße florentinische Schwertlilie (*Iris florentina*), in Italien heimisch, dort und in Frankreich wegen ihres officinellen, nach Weizen duftenden (daher Weizenwurz genannten) Rhizoms angebaut, hat weiße Blumen, deren äußere, wie bei allen Irisarten aus- und abwärts gebogene Blätter mit einem gelben Bart fleischiger Falteln geziert sind (a oberer Theil des Stengels, b unterer Theil und Rhizom in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., c Narbe und Staubgefäß in nat. Gr.). Eine sehr verbreitete Zierpflanze unserer Gärten ist die deutsche Schwertlilie (*I. germanica*) mit großen violetten Blumen. An Ufern von Gewässern kommt häufig die mit goldgelben Blumen prangende Wasser-Schwertlilie (*I. pseudacorus*) in ganz Europa vor. Beider Rhizom war früher auch officinell.

Fig. 12. Der Safran (*Crocus sativus*), ein im Orient heimisches, dort sowie in Oesterreich, Ungarn, Italien, Frankreich, Spanien und England im großen angebautes Knollengewächs, welches im Herbst sein

violetten Blumen entwickelt und dessen gelbroth gefärbte Narben den bekannten, als Gewürz und Arzneimittel hochgeschätzten Safran bilden. Die meisten Arten der Gattung *Crocus* blühen im ersten Frühling; mehrere, wie die goldgelb blühende *C. luteus* und *C. susianus* und der violett, blau, weiß oder geschetzt blühende *C. vernus* gehören zu den ersten Frühlingsblumen unserer Gärten und sind allgemein verbreitete und beliebte Zierpflanzen geworden. (Abgebildet: die ganze Pflanze in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., a Narben, schwach vergr.)

Fam. 3. *Agaveen* (Agaveae). Riesige Stauden des tropischen Amerika von an die Aloë (s. Liliengewächse) erinnerndem Habitus mit verkürztem Stamm, welcher einen großen Blätterbüschel trägt und gleich diesem von vieljähriger Dauer ist, aber nur einmal Blüten entwickelt und dann sammt der Wurzel abstirbt. Blätter schwertförmig, meist dick und fleischig, Blüten an der Spitze eines oft riesigen, binnen wenigen Monaten sich entwickelnden, beschuppten Schafts ähren-, trauben- oder rispenförmig angeordnet mit regelmäßigem sechsheiligen Perigon, 6 Staubgefäßen und 1 Griffel. Frucht eine dreifächerige, aufspringende, viele flache Samen enthaltende Kapfel.

Taf. 13, Fig. 1. Die amerikanische Agave oder sogenannte hundertjährige Aloë (*Agave americana*), ein in Mexico heimisches, aber seit Jahrhunderten in Südeuropa und Nordafrika als Heilpflanze cultivirtes und daselbst völlig verwildertes Riesengewächs mit dicken, steifen, bis 6 Fuß langen, stehenden und dornig gezähnten blaugrünen Schwertblättern, aus deren Mitte endlich ein bis 30 Fuß Höhe erreichender Schaft emporsteigt, der einen gewaltigen Candelaber wohlriechender, bis 3 Zoll langer gelber, viel Honig aussondernder Blüten trägt. Blüht in ihrem Vaterlande, wie auch in Südenropa, schon im 8. bis 10. Jahre, in unsern Gewächshäusern nicht leicht vor dem 70. Jahre und überhaupt äußerst selten. Aus den gähnen Bastfasern der Blätter werden dauerhafte Seile und Flechtwerk aller Art, aus dem zuderhaltigen Saft ein weinartiges Getränk (*pulque*) bereitet. Auch das Papier der alten Mexicaner war aus Agavefasern verfertigt (a Blüte, b Fruchtknoten nach der Blütezeit, c im Durchschnitt, verfl.).

Fam. 4. *Amaryllisartige Pflanzen* (Amaryllidaceae). Ausdauernde Zwiebelgewächse mit blüthentragenden, nackten Schaften und grundständigen Blättern, selten stengelstrebende Kräuter oder auch kurzstämmige Holzgewächse mit Faserwurzel. Blätter lineal oder schwertförmig, ganzrandig, Blüthenschaft zusammengebrückt oder zweischneidig, Blüten einzeln endständig oder in einfacher Dolde, von häutigen Scheidenblättern umgeben. Perigon regelmäßig verwachsenblättrig, Röhre dem unterständigen Fruchtknoten angewachsen. Staubgefäße 6, in der Perigonröhre eingefügt, Griffel einfach mit ungetheilter oder dreilappiger Narbe. Dreifächerige vielsamige Kapfel, selten Beere. — Schönblühende saftvolle Gewächse, von denen die Mehrzahl in den Tropengegenden, der subtropischen und wärmern gemäßigten Zone zu Hause sind. Diese Familie hat unsern Gärten und Gewächshäusern viele schöne Zierpflanzen geliefert.

Taf. 13, Fig. 9. Die gemeine gelbe Narzisse (*Narcissus Pseudonarcissus*), wächst in Mittel- und Süddeutschland auf Wiesen wild und wird häufig zur Zierde angepflanzt. Bei der Gattung *Narcissus* ist das Innere der Blume mit einem becher- oder röhrenförmigen Gebilde, dem sogenannten Honigbecher (*scyphus*) versehen, welcher als durch Verwachsung von 6 Nebentränenblättern entstanden angesehen wird.

Bei der gemeinen Narzisse ist dieser Becher lang und bei der im Orient heimischen und cultivirten einblumigen weißen Narzisse dagegen sehr kurz und roth gerändert, bei der mehrblütigen, in Südeuropa als Tazette (*N. tazetta*), von welcher namentlich als Topfgewächs cultivirte eine Blütendolde in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr. zeigt. Die der weißen Narzisse ist giftig.

Fig. 11. Die ziegelrothe Amaryllis (*Amaryllis rutila*). Die Gattung *Amaryllis* unterscheidet sich von *Narcissus* durch den seitlich neben dem hervorsprossenden Blüthenschaft, durch den Becher des Honigbechers und die aufsteigenden Ähren. Ihre Arten prangen sämmtlich mit großem, gefärbten, bisweilen beinahe zweiflügeligen Blüthen, in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr. abgebildet, wachsend, aus dem tropischen Südamerika, *A. reginae*, welche dem tropischen Südamerika, wird in den Gärten in zahllosen Varietäten cultivirt, zu den schönsten Frühlingszierden unter *A. formosissima* mit zweiflügeligen, prächtigen rothen Blumen, eine alte Zierpflanze, in Südamerika heimisch.

Fig. 12. Das Schneeglöckchen (*Galanthus*) und Fig. 13 der Märzbecher (*Leucojum*) auch großes Schneeglöckchen genannt, sind bekannte Frühlingsblumen, von denen die ersten in Landwäldern Mittel- und Südeuropas kommt, während erstgenannte Pflanze in Gärten angetroffen wird und wild nur in England und Südeuropa wächst.

VII. Ordnung der Schlammwurzler. Im Schlamme wachsende Sumpfpflanzen mit faserigem oder knolligem Rhizom, breiten Blättern und zwittrigen Blüten, welche mit Kelch und Blumenkrone selten hülllos sind. Fruchtknoten unständig, Frucht verschieden. — Hierbei Familien der Alismaceen, Butomeen und der ersten der ersteren der Froschlöffel (*Alisma*) und das Pfeilkraut (*Sagittaria sagittifolia*) durch ganz Europa verbreitete Gewächse; die Familie die schöne Wasserviole (*Butomus*), zur dritten Familie der Froschbiss (*Ranunculus ranunculus*) mit nierenförmigen, auf schwimmenden Blättern, und die alerische Schere (*Stratiotes aloides*) mit starrer, sägigen Schwertblättern. Ein Glied der vierten Familie ist auch die merkwürdige Vallonee, von welcher Fig. 1 auf Taf. 11 ein verkleinertes Bild gibt. Diese in stehenden Wässern wachsende Pflanze ist zweiflügelig und sowohl als die weibliche stengellos. Letztere ist zwischen den linealen Blättern lange, zusammengeworfene Stiele mit einer Blüte (e, vergr.), während die männliche (d) die Blüten (d, vergr.) hervorbringt. Wenn sich öffnen, dehnt sich der Stiel der männlichen lange aus, bis die Blüte den Wasserstand, worauf sie sich entfaltet. Um diese Zeit dehnen sich die männlichen Blüten von selbst los, und der Wasserpiegel emporgehoben und von der Bewegung fortgetrieben. Stößt eine männliche Blüte zufällig an eine weibliche, so plagen die Stiele und die weibliche wird befruchtet, worauf der Stiel wieder zusammenzieht und unter dem Wasser die Frucht zu reifen. In den Zellen der mittlern Gewebsschicht der Blüte das Protoplasma fortwährend in Bewegung.

VIII. Ordnung der Kronenblütler (Coronariae). Äuter, Stränder und Bäume, deren meist zwittrliche Blüten aus einem gewöhnlich regelmäßigen, rennt- oder verwachsenblättrigen Perigon, 6 (selten der 12) Staubgefäßen und einem Stempel bestehen, den Fruchtknoten in der Regel ober-, selten unterständig ist. Frucht eine mehrsamige Kapsel oder eine, Samen mit einem den Keim umschließenden Perisperm. Die wichtigsten Familien dieser Gruppe sind:

Fam. 1. Die Simfengewächse (Juncaceae). Den heimgläsern ähnliche, meist ausdauernde Kräuter mit als beblätterten, theils blattlosen runden Stengeln, malen grasähnlichen oder schmalen walrigen oder stengelförmigen Blättern und kleinen unheimbaren, ist braunen, in Knäuel, Büschel und Trugbolzen tellen Blüten, die aus einem sechsblättrigen Perigon, 6 Staubgefäßen und einem oberständigen freien Stempel mit 3 federförmigen Narben zusammengesetzt d. Dreifächerige, mit 3 Klappen aufspringende samige Kapsel. — Hierher gehören die Simsen (*Juncus*), der Mehrzahl nach Stumpfgrasgewächse und Wegergräser, manche mit röhri gen und gegliederten Ästern, und die Gainsimsen (*Luzula*), auf trockenen Boden wachsend. Wiesen- und Waldpflanzen mit den, am Rande lang behaarten Blättern. Aus der Marke der mit runden blattlosen Stengeln versehenen Simsen (dem Wiesenmarke) verfertigt man hin d. wieder künstliche Blumen.

Zaf. 10, Fig. 14. Die haarige Gainsims (*Luzula pilosa*), wächst häufig auf Waldwiesen und in Wäldern und blüht im ersten Frühlinge (a Blüten- stempel mit Dedblättern, b Blüte entfaltet, c Kapsel stengelstängel, d Samen; vergl.).

Fam. 2. Zeitlosgewächse (Colchicaceae). Ständernde Kräuter mit zwiebeligem, knolligem oder stielstielstieligem Rhizom, grundständige Blätter und lüten oder beblätterte Blütenstengel entwikelnd. Blätter bald schmal, lineal, bald breit und dann bis- weilen der Länge nach spaltig, am Grunde scheibig. lüten regelmä ßig, meist zwittrlich, mit sechsblättrigen oder sechsblättrigem Perigon. Staubgefä ße 6, mit nach unten aufspringenden Beuteln. Fruchtknoten ober- stielig, dreifächerig, mit 3 bisweilen verwachsenen rüßeln. Dreifächerige, vielstämige, wandspaltig auf- ringende Kapsel, Samen mit häutiger Schale. — Die Colchicaceen sind über die ganze Erde zerstreut, besonders aber in der gemäßigten und subtropischen Zone namentlich Nordamerikas und Südafrikas heimi- sch. Fast alle enthalten in den Rhizomen und Samen einen scharfen und betäubend-giftigen Stoff.

Zaf. 13, Fig. 14 und 15. Die Herbstzeitlose (*Colchicum autumnale*). Ein aus leuchten Wiesen in Mitteleuropa, oft in großer Menge beisammenwachsende Pflanze mit einem tief im Boden stehenden zwiebel- artigen braunschwarzen Knollen, welcher im Herbst grundständige nackte Blüten und im folgenden Früh- jahr die tulpenartigen Blätter hervorbringt, zwischen denen die grüne, einer Tulpenstielose gleichende Kapsel ist. Die Gestalt der Blumen erinnert an *Crocus*, ihre Farbe ist hellrosa oder lilal, selten weiß. Die 3 reien Griffel sind sehr lang, fadenförmig. Knollen und Samen sind officinell. (Fig. 14 blühende, 15 fruchtbare Pflanze, verll. a, b Staubgefä ß, vergl.).

Fig. 16. Der schwarze Berner (*Veratrum nigrum*). Die Gattung *Veratrum* besteht aus stielstiel- Stauden mit faserigem Wurzelstiel, beblättertem, in eine zusammengelegte rüßige Blütentraube endigenden Stengel und alternierenden großen und breiten fülligen Blättern. Das Perigon der Blüten, von denen die

sich zuerst entwikelnden zwittrlich, die spätern männ- lich sind, ist tief sechsblättrig ohne Nöhre, die 3 Griffel sind sehr kurz. *V. nigrum*, in den österreichischen Alpen wild wachsend und häufig als Pflanze culti- viert, wird 3—4 Fuß hoch und besitzt schwarz-purpurne Blüten (a eine Traube in nat. Gr., b Blüte, c Kapsel, schwach vergr.). Die Rhizome einer andern in den Alpen, Karpaten, Süden und andern Hoch- gebirgen wachsenden Art, des mit größeren, aber schmutzig weißen oder grünlichen Blüten begabten *V. album*, der sogenannten weißen Nieswurz, sind officinell.

Fam. 3. Liliengewächse (Liliaceae). Rhizom- oder Zwiebelgewächse, selten Holzpflanzen von palmen- förmigem Wuchs mit meist kurzem, einfachem oder verzweigtem Stamme und am Ende des Stammes oder seiner Äste büschelförmig gruppierten Blättern, unterscheiden sich von den Colchicaceen, denen sie sonst sehr ähnlich sind, durch die nach innen aufspringenden Staubbeutel, den einzigen Griffel mit ganzer oder dreilappiger Narbe und die sechsblättrig aufspringende Kapsel. — Die Liliaceen bilden eine große, meist aus schönblühenden Pflanzen bestehende Familie, welche eine große Anzahl von Pflanzengruppen, auch Nies- und Arzneipflanzen geliefert hat. Sie sind über die ganze Erde verbreitet, vorzugsweise aber in der wärmern gemäßigten und subtropischen Zone der nördlichen Hemisphäre zu Hause und zerfallen in mehrere Unter- familien und Gruppen.

Zaf. 12, Fig. 8. Die Baumliilie (*Yucca gloriosa*), ein in unsern Gewächshäusern häufig cultivirtes, in Südenropa im Freien gedeihendes Prachtgewächs Süd- amerikas, in welchem der monotypische Typus seine größte morphologische Vollkommenheit erreicht, bildet einen meist einfachen, bis 12 Fuß Höhe erreichenden Stamm, der eine stolze Krone dicker Schwertblätter trägt. Aus ihrer Mitte sproßt der die großen hän- genden liliartigen weißen Blumen in einer mächtigen pyramidalen Rispe tragende Blütenstengel hervor, welcher bis 4 Fuß lang wird.

Fig. 9. Die Aloe von Socotora (*Aloe soco- torina*). Die artenreiche, namentlich in Südafrika heimische Gattung Aloe besteht aus Holzpflanzen mit verkürztem unterirdischen oder längerem oberirdischen, dann oft verzweigtem Stamme, dessen Ende oder Äste einen aus spirallig gestellten Blättern zusammen- gesetzten Büschel tragen. Blätter dickfleischig, füllig, von mehrjähriger Dauer, oft am Rande dornig ge- zähnt und dornspitzig oder über und über mit perl- weißen erhabenen Papillen besetzt (Perlalo) oder der Quere nach mit weißen Papillen und Flecken gebändert. Aus diesen Blättertrüben brechen die beschuppten Blütenstengel hervor, welche eine meist lange Traube ziemlich kleiner Blüten mit röhri gem, über dem Grunde oft bauchig aufgetriebenem, an der Mündung sechs- spaltigem Perigon tragen. Aus dem Saße der Blätter mehrerer Arten wird der außerordentlich bittere und als Arzneimittel hochgeschätzte, unter dem Namen Aloë- gummi bekannte Extract bereit. In diesen Arten gehört die hier sehr verkleinert abgebildete, welche auf der Insel Socotora heimisch ist und rüßliche Blüten besitzt (a eine Blüte in nat. Gr. von *A. virens*).

Fig. 10. Die Türkenbundliilie (*Lilium Martagon*). Die Gattung Lilium besteht aus Zwiebelgewächsen mit schuppiger Zwiebel, welche alljährlich einen reich be- blättrten Blütenstengel treibt, der in eine Traube von meist ansehnlichen und schön gefärbten Blüten endigt. Letztere besitzen ein eblättriges Perigon. Der mit blaß purpurnen Blumen prangende Türkenbund (wegen der rückwärts gekrümmten Blätter, welche den



Blumen die Figur eines Turbans verleihen, so genannt) wächst wild in Laubwäldern Mittel- und Südeuropas. Bekannte Zierpflanzen unserer Gärten sind die im Orient heimische weiße Lilie (*L. candidum*), die auch in Deutschland wild vorkommende Feuerlilie (*L. bulbiferum*), die chinesische Tigerlilie (*L. tigrinum*) u. a.

Fig. 11. Die Kaiserkrone (*Fritillaria imperialis*), ein stattliches Zwiebelgewächs des Orients, welches zu unsern beliebtesten Frühlingszierpflanzen gehört und sich durch die mit opalisirenden Nektartropfen erfüllten Honiggruben am Grunde der Perigonblätter auszeichnet. Durch das Vorhandensein solcher Honiggruben, sowie durch die nur äußerlich beschuppte, innen compacte Zwiebel unterscheidet sich die Gattung *Fritillaria* von *Lilium* (a Kapsel, b Perigonblatt mit Nektargrube, c Samen, ganz, im Längs- und Querschnitt; alle Fig. verkleinert).

Fig. 12. Die Meerzwiebel (*Scilla maritima*), ein in Südeuropa und Nordafrika heimisches Zwiebelgewächs, welches officinell ist und häufig als Topfpflanze (namentlich von den Bauern) cultivirt wird. Die sehr groß werdende perennirende, von braunen Häuten umschlossene Zwiebel tritt mehr oder weniger über den Boden hervor und entwickelt nach der Blütezeit (im Herbst oder erst im folgenden Frühling) einen Büschel breiter Blätter, die oft sehr lang werden. Im Spätsommer wächst der nackte, oft bis 2 Fuß hoch werdende Blütenstängel hervor, der in eine lange Traube schmutziggelber Blüten endet (a Perigon aufgeschnitten und ausgebreitet, c Stempel, f Samen, nat. Gr.; b Staubgefäße, e Fruchtknoten im Querschnitt, vergr.). — Verschiedene Arten der meist durch blaue Blumen ausgezeichneten Gattung *Scilla* sind beliebte Zierpflanzen (z. B. *Scilla sibirica* und *amoena*). Ferner gehören zu den Liliaceen die Tulpen (*Tulipa*), Taglilien (*Hemerocallis*), Hyacinthen (*Hyacinthus*), Traubenhyacinthen (*Muscari*) und die Laucharten (*Allium*), z. B. die gemeine Gartenzwiebel (*A. Cepa*) und der Knoblauch (*A. sativum*).

Fam. 4. Spargelgewächse (*Asparagaceae*). Kräuter, Sträucher und Bäume, welche den Liliaceen sehr nahe stehen, sich aber von ihnen durch ihre Frucht, eine mehrsamige saftige Beere, unterscheiden. Blüten meist zwittrig, mit oberständigem Stengel und verwachsenblättrigem, gewöhnlich gloden- oder trichterförmigem Perigon.

Taf. 13, Fig. 5. Der Drachenbaum (*Dracaena Draco*), ein auf den Canarischen Inseln heimischer Baum, dessen Stamm durch den hier ununterbrochen thätig bleibenden Verdickungs Cylinder befähigt wird, sich gleich dem Stamme der gymnospermen und dikotylen Bäume, solange als der Baum lebt, zu verviden. Da nun der Drachenbaum zu denjenigen Bäumen gehört, welche die längste Lebensdauer zu erreichen vermögen, so wird sein Stamm allmählich unförmlich dick. Der älteste bekannte Drachenbaum bei Drotava auf Teneriffa, welchen der Sturm vom 2. Januar 1868 umbrach und dessen Alter auf mehr als 5000 Jahre geschätzt worden ist, maß im Jahre 1830 am Boden 55 Fuß im Umfange. Der Stamm des Drachenbaums ist anfangs einfach und gleicht dann wegen der endständigen Blätterkrone einer Palme oder Yucca. Später verzweigt er sich dichotomisch und erlangt dadurch zuletzt eine sehr umfangreiche Krone. Blätter schwertförmig, Blüten grünlichweiß, denen des gemeinen Spargels nicht unähnlich, bilden endständige, aufrechte, aus zusammengefügten Trauben bestehende Rispen. Beeren roth. Das aus dem Stamme auschwitzende braune, zerrieben blutrothe Harz ist als Drachenblut (*Sanguis draconis*) officinell.

Fig. 6. Der gemeine Spargel (*Asparagus officinalis*), ein aus dem Orient stammendes in unsern Mitteleuropas verwildertes und sehr bautes Rhizomgewächs, treibt im Frühling beschuppte, bleiche Sprossen (die man „Spargel“), welche sich später zu den schwachen, holzigen, verzweigten Blütenstängeln entwickeln. Die feinen nadelförmigen Blätter sind klein und stehen in dichten Büscheln. Die eigentlichen Blätter jenseits der Schuppen, in deren Achsel die nadelförmigen Blätter sich entwickeln haben. Dergleichen Blätter sind aber viel größer und breiter entwickelt, wie bei der zu den Spargaceen gehörenden Gattung *Muscicora* (*Ruscus*), der, bei uns, sich die Blüten an der obern oder unteren Seite der steifen leberartigen Phyllocladon entwickeln. Die Blüten des Spargels sind eingeschlechtig, die Beeren roth (a Blüte, b Beere, nat. Gr.).

Fig. 7. Das Maiblümchen (*Philomatula majalis*), bekannte, wegen der sehr ihrer weißen Glodenblüten allgemein beliebte blühende, in ganz Mittel- und Südeuropa vorkommende und häufig zur Zierde angebaute Pflanze, welche ein Rhizom besitzt und immer grün bleibt, neben denen der nackte Blütenstängel bricht. (1/2 nat. Gr., a Blüte, b Frucht, nat. Gr.).

Fig. 8. Die Einbeere (*Paris quadrifida*), Giftpflanze unserer Wälder, welche durch die in der Mitte Europas verbreitet ist. Besitzt ein Rhizom, welches die stets einfachen, endständigen Blüten mit 4, selten 3 oder 5 förmig gestellten Blättern versehenen Stängel Perigon grünlichgelb, vier-, selten fünfzählige Blüthe 8, selten 10, Fruchtknoten mit 4, selten 5 Beeren vogelfirschengroß, reif glänzend schwarz. (1/2 nat. Gr., b Staubbeutel, c Stempel, nat. Gr.).

Fam. 5. Dioscoreen (*Dioscoreaceae*). Kräuter mit knolligem Rhizom, selten mit verkürztem Stamme, sämtlich mit schlingenden Ästen, breiten naderartigen Blättern, bis hinförmig gelappten Blüten, freien, in Achsel oder ährenförmige Trauben stehenden Blüten. Perigon regelmäÙig, sechs- oder siebenzählig, 6, Fruchtknoten unterständig, 3, selten eine mehrsamige Beere oder Kapsel. — Die Tropenländer und der wärmern Theile der Erde, welche habituell den mit Ranken kletternden, breitblättrigen und zweihäufigen Efeu ähnlichen, vorhergehenden Familie ähneln und durch die Schmeerwurze (*Tamus communis*) in Südtirol und der Schweiz als Schlingpflanze mit herzförmigen Blättern und Beeren, repräsentirt sind. Zu dieser Familie gehören die Giftpflanze oder *Ignavia* (*Squilla*), Taf. 11, Fig. 13, ein Knollenkraut, welches wegen seiner kleinen Pfund schwere erreichenden, bandförmigen Blätter in allen Tropenländern angebaut wird.

#### Achte Klasse.

Saucepflanzen mit echten Früchten und Keime (*Teleocarpae dicotyledonae*) (Tafel 18–23.)

#### Erste Unterklasse.

Dicotyledonen ohne Blumenkrone. Blüten bald ohne jegliche Hülle, bald mit schleimigen Hüllen bestehend, bald mit fleischigen Hüllen (Schuppen, Borsten, etc.)

einem verwachsenen oder getrenntblättrigen aber niemals mit Kelch und Blumenkrone

erste Ordnung dieser Abtheilung enthält un- sehr unvollkommen organisirte Wasser- z. B. die in Reichen, Flüssen und Bächen häufig vorkommenden Arten der Gattungen *Ceratophyllum* (Callitriche), Hornblatt (*Ceratophyllum* u. a., auf welche hier nicht näher eingegangen kann.

Ordnung der Pfefferartigen Pflanzen (Piperaceae). Sträucher und Kräuter der Tropen mit hüllenlosen Blüten, welche Nehren oder Weiden. Samen mit einem Eiweißkörper, welcher die Oberfläche den wohl erhaltenen Embryosack umschließt, in welchem der Keim eingeschlossen liegt. Die Piperaceae besteht aus fleischigen Kräutern, Sträuchern, deren Stämme wegen der angeordneten Gefäßbündel hinsichtlich ihres Baues sehr an die Monokotyledonen erinnern. Desgleichen ähneln viele Piperaceen durch entloften und ihre eingeschlehtigen, auf einzeln Staubbeutel oder Fruchtknoten reducirten Aroideen. Fruchtknoten einsächerig, mit oder ohne fleischige, selten gelappte Narbe. Die Piperaceae ist grundständigen, aufrechten Samenknospe, welche fleischige oder saftlose einfache Beere.

Fig. 1. Der schwarze Pfeffer (*Piper nigrum*). Der schwarze Pfeffer (*Piper nigrum*) ist ein blüthen- und fruchttragender Zweig in der Blüthe. (a eine Blüte von vorn, in der Mitte der Blüte, zu beiden Seiten ein Staubgefäß, im Durchschnitt, vergl.). Der auf den Seiten und in Spindeln heimische und angebaute Pfeffer ist ein mittels Kriechwurzeln kletternder Strauch mit gegliederten Ästen, abwechselnden gegenständlichen Blättern und den Blättern gegenüber stehenden schwachen Nehren. Die reifen schwarzen Beeren unreif und getrocknet den schwarzen Pfeffer, geschält den weißen Pfeffer. — Andere Arten sind der Cubebeppfeffer (*P. Cubeba*), dessen langgestielte Beeren als Cubebe gegen angewandt werden, und der Betelpfeffer (*P. betel*), dessen Blätter mit der Betelnuß zusammen gerollt (s. Palmen).

Ordnung der Kätzchentragern (Amentaceae). Diese mit eingeschlehtigen naden oder von Perigon umgebenen Blüten, von denen die männlichen in Kätzchen gestellt sind. Weibliche Blüten sind einzeln oder auch in Kätzchen gestellt, Samen ohne Eiweißkörper.

1. Weidengewächse (*Salicaceae*). Zweigige Bäume und Sträucher, deren männliche und weibliche Blüten in Kätzchen geordnet sind. Blüten sitzen auf einem Deckblatt (Kätzchenschuppe) sitzend, (nur bei den Pappeln) von einem becherförmigen Perigon umgeben. Fruchtknoten einsächerig, Frucht eine einsächerige viel-samige, mit einem auffpringenden Kapsel. Samen klein, mit einem langgestielten Haarschopf. Blätter abwechselnd, ganz oder gelappt, mit zwei abfallenden, eben bleibenden Nebenblättern am Grunde sitzend. — Diese Familie besteht nur aus den Weiden (*Salix*) und der Pappeln (*Populus*), deren zahlreiche Arten namentlich in der Zone der nördlichen Halbkugel verbreitet sind. In vielen Arten beider Gattungen entwickeln sich die Kätzchen lange vor dem Laubaussbruch, bei anderen nach der Blütezeit (die weiblichen nach dem Laubaussbruch) ganz ab. Gattung der

Weiden: Kätzchenschuppen ganz, Staubgefäße 2—3, langgestielt, neben denselben (ebenso neben dem Fruchtknoten) honigabsondernde Drüsen; Blätter stets ungetheilt. Gattung der Pappeln: Kätzchenschuppen gezähnt oder zerklüftet, Staubgefäße viele kurzgestielt, ebenso wie der Fruchtknoten von einem rudimentären becherförmigen Perigon umgeben; Blätter breit, oft gelappt.

Taf. 18, Fig. 2. Die Sahlweide (*Salix Caprea*), bekannter Strauch und Baum unserer Wälder, der im ersten Frühling vor dem Laubaussbruch blüht und dessen männliche Kätzchen vor dem Aufblühen mit seidenglänzenden weißen Haaren dicht bedeckt sind (Balmweiden). Ist durch ganz Europa verbreitet. (a weiblicher, b männlicher Blütenzweig, c beblätterter Zweig, alle drei in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr.; d männliche Blüte, e weibliche Blüte, f Kapsel, vergl.) Andere bekannte Weidenarten sind: Die weiße oder Silberweide (*S. alba*), die Bruchweide (*S. fragilis*), die Korbweide (*S. viminalis*), die Purpurweide (*S. purpurea*) u. a. m. Die Weidenrinde enthält einen fiebervertreibend wirkenden Stoff, das Salicin; die schlanken Ruthen vieler Arten (besonders von *S. alba*, *fragilis*, *purpurea* und *amygdalina*) liefern vorzügliches Material für Korbflechterei.

Fig. 3. Die Espe, Aspe oder Zitterpappel (*Populus tremula*), ein in fast ganz Europa in Wäldern und Heiden wachsender Baum, welcher seine graubhaarigen Kätzchen ebenfalls im ersten Frühling vor dem Laubaussbruch entwickelt und langgestielte rundliche Blätter trägt, die im leisen Luftzug sich zitternd bewegen. Staubbeutel und Narben purpurroth. (a Zweig mit einem männlichen, b ein anderer mit 2 weiblichen Kätzchen, c, d beblätterte Zweige, alle drei in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., e, f männliche Blüte, g weibliche, vergl.) — Andere bekannte Arten sind die Schwarzpappel (*P. nigra*), die italienische oder Pyramidenpappel (*P. dilatata*), welche manche Botaniker für eine bloße Varietät der vorhergehenden Art halten, die Silberpappel (*P. alba*), die in Nordamerika heimische Balsampappel (*P. balsamifera*) u. a.

2. Birkenartige (*Betulaceae*). Einhäufige Bäume und Sträucher der gemäßigten und kalten Zone vorzüglich der nördlichen Halbkugel, deren männliche Blüten in walzenförmige oder längliche Kätzchen, deren weibliche Blüten dagegen in schwächliche Nehren gestellt sind und welche einsamige Kätzchen als Früchte hervorbringen. Die männlichen Kätzchen bilden sich immer schon während des Sommers aus; sie sind aus schildförmigen Schuppen zusammengesetzt, unter denen (an deren Stiel) 2—3 von kleinen Perigonblättern umringte Blüten stehen. Die weiblichen, bald auch schon im Sommer, bald erst im nächsten Frühling zur Blütezeit sich entwickelnden Nehren bestehen aus flachen Deckschuppen, unter denen 2—3 nackte Stempel liegen. Blätter gestielt, ganz, selten zertheilt, meist gesägt, sehr selten ganzrandig. Die *Betulaceae* sind durch ein wohlriechendes Wachsharz ausgezeichnet, welches oft (z. B. bei den meisten Birken und bei der Schwarz-erle) an den Blättern, Knospen und Zweigen bald als klebriger Ueberzug, bald in Form kleiner weißer Warzen ausgeschieden wird und z. B. dem jungen Birkenlaub das glänzende Grün und den aromatischen Wohlgeruch verleiht. Diese Familie besteht auch nur aus 2 Gattungen, den Birken (*Betula*) und Erlen (*Alnus*).

Gattung der Birken: Kätzchen und Nehren auf verschiedenen Zweigen, nur erstere bereits während des Winters vorhanden, männliche Blüten von 2 ver-





de bildet. Diese Rorkschicht wird von dem selbst nach einer längern Reihe von Jahren, doch ist ein solcher gänzlich abgestorbener technischer Zweck nicht tauglich. Vielmehr Rork noch frisch sein, weshalb den Bäumen gewissen Turnus ihre Rorkhülle gewaltsam (abgeschält) wird. Bei gehöriger Vorsicht diese Operation dem Baume nicht, vielmehr durch die Bildung einer neuen Rorkschicht welche nach einer Reihe von Jahren wieder werden kann. (a blühender, b fruchtender Zweig in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr.; c männliche, d Blüten, vergl.)

Die gemeine Hasel, der Haselnuß (Corylus Avellana). Die Gattung Corylus, wenigen Arten verkennend, unterscheidet sich durch die vor dem Laubaussbruch sich den Blüten, durch die gedrungnen Räßchen, den im Sommer vor der Blütezeit gebildet und unter ihren Schuppen hüllenlose Staubtragen, durch die in Änospen eingeschlossenen Blüten, deren rothe federförmige Narben zeit einen kleinen Pinsel auf der Spitze einer Änospe bilden, und durch die blattartige zerfropula, welche bald ebenso lang, bald länger Ruß, aber immer offen ist. Der gemeine auch ist durch ganz Europa verbreitet. (a blühender Zweig in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b Räßchenschuppe mit Staubgefäßen, c einzelne weibliche Blüten mit Deckblatt, d dieselbe nach der Blütezeit, e Blüten im Querschnitt, vergl.; f Früchte in

o. Die Rothbuche (Fagus sylvatica), beschöner Waldbaum des mittlern und westlichen dessen säulenförmiger glattrindiger Stamm bis Höhe erreicht. Blätter fast ganzrandig, jung gewimpert. Blüten mit dem Laubaussbruch, männliche in kugeligen, langgestielten, Räßchen mit becherförmigem, mehrspaltigem und vielen Staubgefäßen, weibliche an der Zweige zu wenigen beisammen, von fadenförmigen Staubblättern umgeben, mit oberständigen und 2 fadenförmigen Griffeln. Rüsse drei— von einer gemeinsamen, durch Vergrößerung die Deckblätter tragenden Blütenachse ent- Cupula völlig umschlossen, welche anwendig ist und zuletzt kreuzweise mit 4 Klappen t. Die Rüsse (Buchedern, Bucheln) enthalten schmedendes Öl in reichlicher Menge. tragender Zweig, b Keimpflanze in  $\frac{1}{2}$  nat. Blatt einer in Gärten häufig angepflanzten, der farnblättrigen Bude; d männliche Staubgefäß, vergl.; e aufgesprungene Cupula, b im Querschnitt, nat. Gr.)

1. Die Edelkastanie (Castanea vesca). Baum des südlichen Europa, welcher dorten bildet, aber auch, wie in Süddeutschland, schmedenden und nahrhaften Rüsse (Kastanonen) wegen, als Obstbaum angepflanzt mit der Rothbuche die geschlossene, mit (hier längern und steifern) Stacheln bedeckte, appenartig aufspringende Cupula gemein, untet sich aber von jenem Baum durch die langen ständigen Blütenähren, welche an ihrem Grunde von Deckblättern umringte Gruppen von je Blüten tragen, sonst aber mit männlichen Blüten sind. Die Edelkastanie wird sehr alt, bildet eniger hohe und dicke Stämme mit umfangreichschattender Krone. Ihr dem Eichenholz oft verwandtes Holz eignet sich vorzüglich zu

Jasdanben. (a blühender Zweig in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b männliche, c weibliche Blüten, d Fruchtknoten im Querschnitt, vergl.; e junge Cupula, f Frucht, verfl.)

Fam. 6. Hornbaumartige Pflanzen (Carpineae). Einhäufige Bäume und Sträucher, den Cupuliferen nahe verwandt, von denen sie sich besonders durch den Ban der männlichen Räßchen sowie dadurch unterscheiden, daß eine jede der kleinen Rüsse nur von einem einzigen, blattartigen oder häutigen offenen, oder einen geschlossenen Schlauch bildenden Deckblatt umgeben ist. Männliche Räßchen dicht, walzig, mit einer nackten, aus zahlreichen Staubgefäßen bestehenden Blüte unter jeder Schuppe, weibliche Blüten in schwächtigen gestielten endständigen Aehren, jede einzelne mit einem Deckblatt versehen, welches bei Carpinus flach und offen, bei Ostrya schlauchförmig ist. Fruchtknoten von einem rudimentären Perigon umgeben, mit 2 fadenförmigen Griffeln. Die vergrößerten, die Rüsse tragenden oder umschließenden Bracteen bilden hängende Fruchtschägen, welche bei Ostrya die Form eines Hopfenzapfens besitzen, weshalb die einzige in Süd- und Südosteuropa heimische Art dieser Gattung Hopfenbuche (O. carpinifolia) genannt wird. Wichtiger als dieser Baum ist der in ganz Mitteleuropa heimische Hornbaum (Carpinus Betulus), auch Weiß- und Hagebuche genannt (Zaf. 18, Fig. 12, a fruchttragender Zweig, b blütentragender in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr.; c männliche Blüte, d Staubgefäße, e weibliche Blüten, f Fruchtknoten im Längsschnitt, vergl.; g Frucht in nat. Gr.), dessen weißes, hartes und dauerhaftes Holz ein vorzügliches Werk- und Schirholz ist.

III. Ordnung der Nesselgewächse (Urticinae). Kräuter, Sträucher und Bäume mit zwittrigen oder eingeschlechtigen (oft polygamischen) Blüten, welche in der Regel ein schlauchartiges Perigon, sowie Staubgefäße und einen oberständigen Stempel besitzen und in Aehren, Büschel, Knäuel, Rispen gestellt, selten einer fleischigen offenen oder hohlen Achse eingefügt sind. Frucht verschiednen, Samen meist eiweißhaltig.

Fam. 1. Nesselartige (Urticaceae). Einjährige oder perennirende Kräuter, seltener Sträucher mit einfachen, fieder- oder handnervigen, ganzen oder fieder- bis handförmig zertheilten Blättern und persistenten Nebenblättern. Blüten polygamisch oder zweihäufig, in Knäueln, welche oft ähren- oder rispenförmig gruppiert sind, mit zwei- bis fünfblättrigem Perigon, 4—5 Staubgefäßen, deren Filamente beim Aufblühen elastisch hervorschnellen, einsächerigem, bei weiblichen Blüten von einem eng anliegenden, verwachsenblättrigen Perigon umschlossenem Fruchtknoten und pinselförmiger Narbe. Kleine einsamige Schließfrucht, Samen mit fleischigem Eiweiß. Die eigentlichen Nessel (Urtica) sind mit Brennborsten bedekt.

Zaf. 19, Fig. 1. Die große Nessel (Urtica dioica). Bekannte, oft über mannshoch werdende Pflanze mit (wie bei allen Nesselarten) vierkantigem Stengel und kreuzweis gegenständigen Blättern, welche sich von der kleinen, auf Gartenbeeten so häufig als Unkraut vorkommenden Nessel (U. urens) durch ihre Größe, ihr Rhizom (die kleine Nessel ist einjährig), die zweihäufigen Blüten und die hängenden Blütenrispen, welche viel länger als die Blattstiele sind, unterscheidet. Aus den Bastfasern des Stengels dieser in ganz Europa wachsenden Pflanze wurde ehemals das Nesselstuch verfertigt. (a männliche, b weibliche Pflanze in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., c männliche, d weibliche Blüte, e leptere geöffnet; vergl.)

Fam. 2. Hanfsähnliche Pflanzen (Cannabineae). Zweihäufige Kräuter mit aufrechten oder windenden

Achsen, welche sich von den Urticaceen vorzüglich durch ihre einkeimigen Samen und den gekrümmten Keim unterscheiden. Hierher gehören der Hopfen und der Hanf.

Taf. 19, Fig. 2. Der Hopfen (*Mumulus Lupulus*), im Orient heimisch, aber in ganz Europa in Heden und Gebüschen verwildert vorkommendes und in vielen Gegenden in großem Maßstabe angebautes Rhizomgewächs mit sehr lang werdenden schlingenden Stengeln und gegenständigen, handförmig gelappten Blättern, welche sammt dem kantigen Stengel sehr scharfhaarig sind. Männliche Blüten in end- und achselständigen Rispen, weibliche in gestielten kurzen Aehren, aus welchen die bekannten hängenden Hopfenzapfen hervorgehen. Letztere enthalten aus ihren blattartigen Schuppen (Dedblättern) und den darunter liegenden Früchtchen ein gelbliches Mehl, das Lupulin, jenen aromatischen Bitterstoff, der dem Bier sein Arom verleiht, weshalb die Hopfenzapfen für die Bierbereitung unentbehrlich sind. Aus diesem Grunde ist der Hopfen eine so wichtige Kulturpflanze geworden. (a männliche, b weibliche zapfentragende Pflanze in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr.; c männliche Blüte, d weiblicher Blütenstand, e einzelne weibliche Blüten, f Samen im Durchschnitt, verggr.)

Fig. 3. Der Hanf (*Cannabis sativa*) ist in Mittel- und Asien heimisch und wird wegen seiner vorzüglich haltbaren Gewebefasern fast überall, besonders in den Ländern der gemäßigten Zone angebaut. Er ist einjährig, die männliche Pflanze (Femelhans) wird höher als die weibliche (Mastelhanf). Bei ersterer bilden die Blüten eine oft lange beblätterte Rispe, bei letzterer stehen sie gebüschelt in den Blattachseln. Die ganze Pflanze besitzt einen unangenehmen, fast betäubenden Geruch. Ihre Samen enthalten viel fettes, aber uarotisch wirkendes Oel. (a und b Stengelspitze der männlichen und weiblichen Pflanze, sehr veröl.; c männliche, d weibliche Blüte, e fruchttragende Schuppe, f Frucht im Durchschnitt, verggr.) Der als Decorationspflanze in den Gärten so häufig cultivirte Riesenhanf, dessen daumendick werdende Stengel gänzlich verholzen, ist bloß eine große Form des gemeinen Hanfs und scheint mit der in Indien wild wachsenden Pflanze identisch zu sein.

Fam. 3. Maulbeerähnliche Gewächse (Morace). Eig: oder zweibändige Bäume und Sträucher, seltener Kränzer, bald mit, bald ohne Milchsaft. Blätter abwechselnd, einfach, ungetheilt oder handförmig gelappt, mit Nebenblättern. Männliche Blüten in gestielten Köpfchen, Aehren oder Kolben mit feldartigem Perigon und 2—4 Staubgefäßen, weibliche in dichten Aehren oder auf einem kugeligen Receptaculum, mit feldartigem Perigon oder hüllenlos und oberständigem Stempel; selten beiderlei Blüten auf oder in einem fleischigen Receptaculum vereinigt. Die kleinen einsamigen Schließ- oder Schlangfrüchte des ganzen weiblichen Blütenstandes gewöhnlich durch die sie umhüllenden fleischig-saftig gewordenen und untereinander verwachsenen Perigone zu einem einzigen Fruchtkörper (Scheinfrucht) vereinigt oder innerhalb der hohlen oder concaven vergrößerten fleischigen Blütenstandsrippe (receptaculum) eingeschlossen. Samen mit oder ohne Eiweiß. — Die Moreen sind der Mehrzahl nach Bewohner der Tropenländer und der wärmern gemäßigten Zone.

Taf. 19, Fig. 4. Der gemeine Feigenbaum (*Ficus Carica*). Bei der Gattung *Ficus* sind die männlichen und weiblichen Blüten zusammen in einem birn- oder kirschenförmigen hohlen, am Scheitel durchbohrten Receptaculum eingeschlossen, welches aus einer Blattachsel entspringt und sich vergrößernd allmählich zur

sogenannten Feigenfrucht wird, in deren Mitte die eigentlichen Früchte (Schließfrüchte) als Körner eingebettet liegen. Die Gattung *Ficus* ist eine sehr artenreiche; die meisten kommen in den Tropenländern vor, und die Zusammensetzung des Waldes eines Landes theil nehmen. Viele sind immergrüne Bäume, erreichen ein hohes Alter und eine reiche Frucht enthalten in den krautigen Theilen einen Milchsaft. Der wegen seiner wohlschmeckenden und haften Scheinfrüchte seit den ältesten Zeiten gemeine Feigenbaum ist wahrscheinlich in Asien heimisch und kommt in den Mittelmeerländern verwildert vor. Man kennt von ihm eine große Zahl von Ab- und Spielarten. (a männliche Zweig in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b junger männlicher Längsschnitt in nat. Gr., c weibliche Blüte in Längsschnitt, d Keim, verggr.)

Fig. 5. Der Banianenbaum (*Ficus religiosa*) ist in Ostindien heimisch und dort seit Jahrhunderten für heilig gehalten, ist merkwürdig theils in enormen Größe, welche er erlangt, theils anders wegen der aus dem Stamme an den entspringenden feldförmigen Luftwurzeln, die unten wachsend endlich in den Boden festsitzen, die breitästige Krone gleich Säulen. Die Blätter dieses immergrünen Feigenbaums sind elliptisch, die kugeligen ungenießbaren Früchte in Trauben, aus dem Milchsaft wird Wein bereitet. — Ein Verwandter des Banianenbaums so häufig als Gewächshaus- und Zimmerpflanze vorkommend (*Ficus elastica*), auch fast ebenfalls Kautschuk gewonnen wird. Ferner die Sykomore (*F. Sycomorus*) ist in Afrika heimisch, aus deren leichtem, dauerhaftem Holze die Särgen der Mumien gemacht und deren Scheinfrüchte ebenfalls genutzt werden können.

Fig. 6. Der Brotfruchtbaum (*Artocarpus coccinea*), auf den Inseln des Stillen Ozeans heimisch und dort allgemein angebaut, ist eine Pflanze mit eingeschnitten gelappten Blättern, die männlichen Blüten hängende Kolben bilden, die weiblichen auf einem aufrechten kugelförmigen Receptaculum vereinigt sind. Aus dem weiblichen Receptaculum entsteht durch Verschmelzung der fleischigen Perigone die kugelige und kopfgroße Scheinfrucht, welche das Hauptnahrungsmittel der Inselanwohner bildet, indem das marlige Fleisch unreifen Früchte gebaden eine Brotkruste abgibt. Das weiche leichte Holz wird zum Bau benutzt und aus dem Bast werden Kleber, Seile (a blüthen- und fruchttragender Zweig in nat. Gr., b männliche Blüte, schwach verggr., c weibliche Blüte in nat. Gr., d Längsschnitt derselben,  $\frac{1}{2}$  nat. Gr.) des Brotfruchtbaums sind der durch A. von Humboldt bekannt gewordene Kubbbaum (*Galeria latifolia*) von Columbien, dessen Milchsaft trüblich und wegen seines höchst giftigen, brennenden Safts seit Jahrhunderten berüchtigte Urheilmittel (*Antiaris toxicaria*), bezüglich der Java die übertriebensten Fabeln lange Zeit geglaubt sind.

Fig. 7. Der schwarze Maulbeerbaum (*Morus nigra*). Die bekannte Maulbeere ist eine Pflanze, die durch Verschmelzung der Perigone der Blüten zu einem kugeligen weiblichen Blütenstande eine kugelige Scheinfrucht bildet. Die Maulbeere ist eine häufige Gewächse und im tropischen und subtropischen Klima heimisch.

nen heimisch. Sie enthalten einen wässerigen Saft. Ihre männlichen Blüten stehen in Aehren. — Der schwarze Maulbeerbaum soll aus Persien stammen; trägt sehr saftige, angenehm süßschmeckende Scheinfrüchte. (a männlicher Blütenstand, b weibliche in nat. Gr., c männliche, d weibliche Blüte, vergl.; e Scheinfrucht, nat. Gr., f eigentliche Frucht, vergl.) wichtiger ist der aus China stammende weiße Maulbeerbaum (*M. alba*), weil dessen Blätter das beste Futter für die gemeine Seidenraupe (*Bombyx Mori*) liefern. Deshalb wird dieser nur mittelgroße Baum, dessen weiße Scheinfrüchte süß, aber fade schmecken, überall, wo Seidenraupenzucht getrieben wird, in diesem Maßstabe angepflanzt.

Fig. 8. *Dorstenia Contrayerva*, eine in wäldern wachsende krautartige Pflanze, deren Rhizom aber officinell war. Die Arten der Gattung *Dorstenia*, sämtlich perennirende Kräuter der heißen Zone, sind dadurch ausgezeichnet, daß ihre männlichen und weiblichen Blüten in die Oberfläche eines fleischigen, aus einer concave und gelappten Scheibe ausgebildeten Receptaculum eingesenkt sind, welches von einem grundständigen Stiel getragen wird. Die Dorstenien finden daher die nächsten Verwandten der Feigenbäume, denn das Receptaculum unterscheidet sich von der Feige nur dadurch, daß es offen ist. (a blüthentragendes Receptaculum in nat. Gr., b dasselbe im Querschnitt, c ein Stückchen mit einer weiblichen und einer männlichen Blüte, vergl.)

Sam. 4. Rüsterartige (*Ulmaceae*). Bäume mit Büscheln gestellten, vor dem Laubaussbruch sich entwickelnden polygamischen Blüten, aus deren oberständigen Fruchtknoten eine Hängelfrucht (einsamige, von einem häutigen Flügelraum umgebene Nußfrucht) entsteht. Die wichtigste und zugleich die einzige der Gattung, die gemäßigten Zone bewohnenden Gattungen, in welcher in Europa Arten vorkommen, ist die Gattung der Rüster oder Ulmen (*Ulmus*): Blätter wechselständig, gestielt, mit abfallenden Nebenblättern, laubspitze am Grunde schiefe, ungleich, am Rande doppelt gesägt, fiedernervig; Blüten mit glodenartigen, feldartigen Perigon, Staubfäden vorstehend, Staubbeutel dunkelviolett, Fruchtknoten mit 2 langen Narben. Die Früchte reifen vor der Ausbildung der Aehren. Samen ohne Eiweiß.

Taf. 19, Fig. 9. Der Flatterruster (*Ulmus alba*), ein im nördlichen Mitteleuropa heimischer, aber nicht häufiger und nur vereinzelt vorkommender Waldbaum, unterscheidet sich durch die lang gestielten, lockere, unregelmäßige Büschel bildenden Blüten und die kleinen hängenden Früchte mit am Rande wimpertem Flügel von dem viel häufigeren Berg- oder gemeinen Rüster (*U. montana* und *U. campestris*). Beide haben fast gleiche Blüten und Früchte, welche deshalb dichte, kugelige Büschel bilden und viel größere Laubblätter. Der Berg- oder gemeine Rüster ist in den Gebirgen Mitteleuropas und in ganz Nordeuropa zu Hause und durch seine, aber sehr scharfhaarigen Blätter ausgezeichnet, während der mit diesem oft verwechselte Flatterruster, welcher die, aber oberseits glatte Blätter besitzt, dem östlichen Europas angehört und sich nordwärts nur bis Estland erstreckt. Jedoch ist eine Varietät desselben, deren ihr forstigen Rinde als Korrruster bezeichnet, bis nach Schweden verbreitet. (a blühender und blüthenloser, b fruchthager Zweig des Flatterrusters  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., c Staubbeutel, d männliche Blüte, e Frucht, vergl.; f Frucht des Berg- oder gemeinen Rüsters  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., g Querschnitt des Samens, vergl.)

IV Ordnung der Spinatartigen oder Gemü-

pflanzen (*Oleraceae*). Kräuter, selten Sträucher und Halbsträucher mit einfachen Blättern und mit verschieden angeordneten Zweigen, selten eingeschlechtigen Blüten, welche stets ein regelmäßiges Perigon besitzen. Fruchtknoten oberständig, Frucht verschieden, oft vom stehenbleibenden Perigon umgeben, Samen mit Eiweiß und meist excentrisch darin gelegenem Keim.

Sam. 1. Rüdterichgewächse (*Polygonaceae*). Blätter meist abwechselnd, am Grunde mit häutigen Nebenblättern, welche oft in eine aufrechte, den Stengel umfassende, cylindrische oder trichterförmige Lute (*Gelenkscheide*, Stiefelchen) verwachsen sind. Stengel und Aeste oft knötig-gegliedert. Blüten meist zwittrig, in Aehren, Quirlen oder Traugolden, selten einzeln mit oft corollinisch gefärbtem Perigon. Staubgefäße perigonisch oder einer hypogynischen Scheibe eingesenkt, frei. Ein einziger Stempel, aus dessen einsamerigen Fruchtknoten eine einsamige, zusammengebrückte oder edige, bisweilen gestielte Scheinfrucht entsteht, deren Same ein mehliges Eiweiß besitzt. — Die Polygonaceen sind über die ganze Erde verbreitet.

Taf. 19, Fig. 10. Der Sauerampfer (*Rumex acetosa*), bekannte, auf Wiesen und in Grasgärten wachsende Rhizom-pflanze, deren saftige Stengel und Blätter angenehm säuerlich schmecken und jung als spinatähnliches Gemüse benutzt werden können. Häufiger macht man eine solche Verwendung von den Blättern des sogenannten englischen Spinats (*R. Patientia*), welcher viel größer als der gemeine Sauerampfer wird und bezüglich seiner Blätter dem überall auf Schutt und bebautem Boden vorkommenden stumpfblättrigen Ampfer (*R. obtusifolius*) gleicht, dessen Rhizom officinell ist. Die Gattung *Rumex* zeichnet sich durch ihr aus 6 in 2 alternirende Kreise gestellten Blättern bestehendes Perigon aus, dessen innere stets größere Blätter nach der Blütezeit sich noch vergrößern und in sogenannte Klappen verwandeln, welche, indem sie sich emporheben, die dreikantige Frucht umhüllen. Die 3 äußeren Perigonblätter schlagen sich häufig abwärts (Fig. c). Die Blüten stehen in oft rüspig gruppierten Quirlähren. Bei manchen Arten, wie z. B. dem gemeinen Sauerampfer, sind die Blüten eingeschlechtig und zweihäufig (a männliche Blüte ohne Staubgefäße, b Staubgefäß, c fruchthager Zweig, d weibliche Blüte, vergl.).

Fig. 11. Der Buchweizen oder das Heidekorn (*Polygonum Fagopyrum*), eine einjährige, aus dem westlichen Asien stammende Kulturpflanze, welche wegen ihrer wehrreichen Samen auf Sandboden, wo sie am besten gedeiht, in Nord- und Mitteleuropa häufig angebaut wird, hat, gleich allen übrigen Rüdterichen (*Polygonumarten*), einen knötigen, an den Knoten mit Gelenkscheiden versehenen Stengel, unterscheidet sich aber von den meisten Rüdterichen durch die herzförmigen Blätter und die in kurze stäuförmig gruppierte Trauben geordneten Blüten, welche ein röthlich-weißes Perigon, 8 Staubgefäße und einen dreihelligen Griffel besitzen. (Abgebildet: die ganze Pflanze, verkleinert, a Blüte, b Frucht, c diese im Querschnitt, vergl.)

Fig. 12. Der Garten-Rhabarber (*Rheum undulatum*). Die Gattung *Rheum* unterscheidet sich von der ihr zunächst stehenden Gattung *Rumex* durch das einreihig-sechsbliättrige Perigon, 9 Staubgefäße und die dreikantige, an den Rändern gestielte, vom Perigon nicht umhüllte Frucht. Ihre Arten sind stiellose, perennirende Stauden mit fleischig-saftigen Rhizomen, daumensdicken, oft über mannshohen Stengeln, großen Blättern und mächtigen, aus blüthenreichen Quirlähren zusammengesetzten Strauchrispen. Fast alle Arten wachsen in den Gebirgen Mittelasien, viele in Sibirien.



rien. Zu letztern gehört der wegen seiner großen weißen Sträuche und schön gewellten Blätter als Decorationspflanze so häufig cultivirte Garten-Rhabarber (abgebildet: ein Blatt und ein Rispenzweig, ersteres sehr verll.). Die fingerbiden saftigen Stiele der grundständigen Blätter dieser und anderer Arten (besonders von *Rh. Emodi*) können wie Spargel zubereitet werden. — Die officinelle Rhabarberwurzel kommt von einer noch nicht bekannten chinesischen Art. Lange hat man den in Tibet und Nepal heimischen handblättrigen Rhabarber (*Rh. palmatum*), von dem Fig. 1 auf Taf. 20 ein sehr verkleinertes Bild gibt (a Blüte, b Stempel, c Frucht in nat. Gr.), für die Stammpflanze dieser wichtigen Droge gehalten.

Fam. 2. Meldenartige Gewächse (Chenopodiaceae). Kräuter, Halbsträucher und Sträucher mit abwechselnden, nebenblattlosen, einfachen, fetten oder saftigen Blättern und kleinen unscheinbaren, knäufelförmig angeordneten Blüten, welche ein felschartiges Perigon, 3—5 Staubgefäße und einen freien Stempel besitzen. Das nach der Blütezeit stehen bleibende und sich vergrößernde Perigon umhüllt gewöhnlich vertrocknet oder fleischig oder holzig geworden die kleine einsamige Schlauchfrucht. Seltener ist die Frucht beerenartig. Samen meist zusammengebrückt rund, mit mehligem Eiweiß und gekrümmtem, das Eiweiß umschließendem Keim. Die Blütenknäuel sind oft zu langen schweifartigen Rispen gruppiert, seltener stehen sie einzeln in den Blattachseln. — Die Chenopodiaceen sind besonders in der gemäßigten Zone zu Hause und lieben fetten bebauten, viele auch salzhaltigen Boden, Sand und Schutt. Viele treten daher als Unkräuter und Schutzpflanzen (z. B. die Melden) oder als Salzsteppengewächse auf. Von bekannten Kulturpflanzen gehören hierher der Spinat (*Spinacia oleracea*), die Gartenmelde (*Atriplex hortensis*) und die Runkelrübe (*Beta vulgaris*).

Taf. 20, Fig. 2. Der Erdbeerspinat (*Blitum virgatum*), einjährige, in Südeuropa heimische Pflanze mit stigem Stengel, dessen Zweige zuletzt ruthenförmig verlängert sind und dann auf dem Boden niedergestreckt zu liegen pflegen, besitzt achselständige Blütenknäuel, welche sich in rotthe erdbeersförmige süßlich schmeckende Scheinbeeren verwandeln, indem die Perigone fleischig werden und gegenseitig verschmelzen. Die fruchttragende Pflanze sieht hübsch aus, weshalb der Erdbeerspinat bisweilen zur Zierde angebaut wird. Seine Blätter können wie Spinat benutzt werden. (a ganze Pflanze, sehr verll.; b Blatt mit einer Scheinfrucht in nat. Gr., c, d Frucht und Samen, vergr.)

Fam. 3. Amarantartige Pflanzen (Amarantaceae). Unterscheiden sich von der vorhergehenden Familie durch das trodenhäutige, bald gefärbte, bald bleiche oder grünliche Perigon, welches ebenfalls stehen bleibt, und die mit je 3 häufig gefärbten Deckblättern versehenen Blüten, welche sehr klein und theils zwittrig, theils eingeschlechtig (meist polygamisch) sind. Frucht oft ringsum aufspringend (Büchsenfrucht), häufiger eine gewöhnliche Schlauchfrucht, selten beerenartig. — Die Amarantaceen sind Bewohner der warmen und gemäßigten Zone beider Hemisphären. Sie haben uns eine Anzahl schöner Zierpflanzen geliefert, wie die Fuchsschwanzarten (*Amarantus*), den Hahnenkamm (*Celosia cristata*) und den Kugelamarant (*Gomphrena globosa*).

Taf. 20, Fig. 3. Der Garten-Fuchsschwanz (*Amarantus caudatus*), einjährige, aus Asien stammende Zierpflanze mit zahllosen kleinen braunrothen Blüten, welche im Verein mit ebenso gefärbten spelszenähnlichen

Deckblättern dicht gedrängt eine dide lang- Rispe am Ende des Stengels bilden, aus achseln kleinere Blütensträube betreiben. Pflanze, sehr verll., b Blüte, c Büchsenfrucht, d Samen im Durchschn.

Fam. 4. Kermesbeerartige Pflanzen (Rubiaceae). Saftvolle Stauden oder Bäume mit abwechselnden ganzrandigen ährig oder traubig angeordneten Zweigen aus einem felschartigen, inwendig corolligen Perigon, 4—10 freien Staubgefäßen und ständigen, aus vielen einschlechtigen, stellen Carpellien zusammengefügten Fruchtblättern. Spaltfrucht mit einamigen, bald schlauchfrucht-, bald füsigen Fruchtblättern. Samen mit mehligem, vom in gegebenem Eiweiß. — Gewächse der tropischen Zone beider Hemisphären.

Taf. 20, Fig. 9. Die gemeine Kermes (Phytolacca decandra), aus Nordamerika in Südeuropa verwilderte Staude, die hoch werden Stengeln, großen blauen und fleischfarbigen Blüten. Die Blätter enthalten einen blutgrothen scharfen Saft, welcher in der Färberei und zur Schminkefabrikation benutzt wird. (a oder war officinell. Von einer anderen bekannt gewordenen Art, der Kermes (Ph. esculenta), können die Blätter als Gemüse benutzt werden. (a blühender Zweig in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b Trauben in nat. Gr., c d Einzelbeere, e dieselbe im Durchschn.)

V. Ordnung der Thymeläen (Thymelaeaceae) und Sträucher mit einfachen meist unpaarigen Blättern und zwittrlichen selten corollinischen Perigon besitzen. Aus der Fruchtknoten entwickelt sich eine Beere mit ein Nüßchen.

Fam. 1. Lorbeerartige Gewächse (Lauraceae) wärmern Zonen, wo sie besonders in der Vorkommen, mit nebenblattlosen lehrartigen Blättern und trauben-, ährigen rispenförmig angeordneten Blüten, die in 2 Reihen (4—6) unter sich verwickelt steht. Staubgefäße auf einer fleischigen des Perigons bildenden Scheibe, welche viele, mit nach oben verbreiterten, oft 2 große Drüsen tragendem fächerigem Staubbeutel, dessen Fächer sich öffnen. Beere oder Steinfrucht, von Blütenstiel oder dem erweiterten Nüßchen oder vom stehenbleibenden Perigon mit Samen ohne Eiweiß.

Taf. 20, Fig. 4. Der Zimmtbäumchen (Zeylanicum), aus Ceylon und in der liefert die edle Zimmtinde, wird in der Die gelblichen Blüten sind wohlriechend. Beeren schwarz. Aus den Blättern kann ein ätherisches Oel gewonnen werden. (a blühender Zweig in nat. Gr.; b zwei Blüten in nat. Gr.; c Staubgefäße, vergr.; d Fruchtknoten, vergr.) Eine schlechtere aber häufiger gebrauchte Zimmtinde, der Kanneel, kommt aus Ceylon und Cochinchina wachsenden Cinnamomum.

Fig. 5. Die Alligatorbirne (Anacardium occidentale), ein schöner Baum Westindiens, aus Südamerika, wo er auch viel angebaut wird, besonders wegen der essbaren Frucht, welche die Form einer Birne hat.

Kopfes eines neugeborenen Kindes erreicht. Ihr Inneres ist gelblich oder braungrün, die Schale und harten großen fleischernen Samen befindliches, von grünen Adern durchzogenes, butterähnliches Fleisch wird in den genannten Ländern allgemein Obst gegessen. Die Samen enthalten einen ersten, dann an der Luft blutroth werdenden Saft. *l* Samenstand, *b* Blatt, beide in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr.; darüber *e*, *c* Stempel, *f* Staubgefäß, vergl., *d* Frucht, *g* Same im Querschnitt in  $\frac{1}{6}$  nat. Gr.)

g. 6. Der gemeine Lorbeer (*Laurus nobilis*), beirgswälder Südeuropas, Nordafrikas und der griechischen Inseln wachsender Baum mit gelblichweißen, riechenden Blüten und blauchwarzen Beeren. *l* und *b* Beeren sind officinell, dienen auch als Arznei. Die Zweige benutzt man zu Kränzen, welche den ältesten Zeiten als Ehrenzeichen für Krieger, Künste und Künstler gebildet haben. (*a*, *b* blüthenfruchttragender Zweig in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., *c* männliche Blüte, *e* Staubgefäß, vergl.)

7. Der Laurineen gehören ferner der im südöstlichen Asien heimische Campherbaum (*Camphora officinarum*), dessen Holz der Kampher durch Destillation gewonnen wird, und der amerikanische Sassafrasbaum (*Sassafras officinale*), dessen knorrige Wurzel das nützliche Sassafrasholz und die Sassafraskrinde liefert.

m. 2. Muskatbäume (*Myristicaceae*). Diese Gattung besteht aus der den Tropenländern angehörigen Gattung *Myristica*. Immergrüne Bäume oder Sträucher, den Laurineen ähnlich, von denen sie namentlich durch ihre Frucht unterscheiden, deren Hülle mit 2, seltener 4 Klappen aufspringt, deren einziger großer Same von einem zerklüftigen Samenmantel umgeben ist und einen eingekehlten Eiweißkörper enthält. Blüten eingeteilt, zwiebaufig, Staubgefäße verwachsen. Stempel

st. 20, Fig. 7. Der gemeine Muskatnussbaum (*Myristica moschata*), ein schöner, bis 70 Fuß erreichender Baum der östlichen Inseln des indischen Archipels, wo er noch jetzt große Wälder bildet, liefert die Muskatnuss und Muskatblüte. Erstere er aus dem Samen herausgeschälte und getrocknete Hülle, letztere der getrocknete (im frischen Zustande adrothe) Samenmantel. Die Blätter und Früchte bläulichgelb, letztere über 2 Zoll dick. Aus den unteren werden das Muskatöl und die Muskat bereitet. (*a* blüthen-, *b* fruchttragender Zweig, nat. Gr., *c* männliche, *d* weibliche Blüte, aufspringend, in nat. Gr.; *e* Keim, vergl.)

n. 3. Kellerschälähnliche Gewächse (*Daphnoideae*). Sträucher oder kleine Bäume, selten Kräuter zerstreut oder gegenständigen nebenblattlosen bandigen Blättern und meist zwittrigen, einzeln oder in Büscheln, Ähren, Köpfen gruppirten, welche ein verwaschenblättriges corollinisch geformtes Perigon, 2—10 der Perigonröhre eingefügte Staubgefäße und einen oberständigen Stempel besitzen. *l* amige Stein- oder Nussfrucht, Same mit spärlichem Eiweiß und geradem Keim. — Die Daphnoideen sind in die wärmere gemäßigte und subtropische Zone, namentlich der südlichen Halbkugel, verbreitet, in der nördlichen Zone kommen nur wenige Arten vor.

af. 20, Fig. 8. Der Kellerschäl (*Daphne genkwa*), ein in Wäldern Mitteleuropas auf dem brauchbaren Boden wachsender und häufig als giftig cultivirter Strauch, der seine purpurothen riechenden, aus Seitenknospen der Zweige hervorkommenden Blüten im ersten Frühling vor der Entung der Blätter öffnet. Die scharlachrothen beeren-

artigen Steinfrüchte reifen im Spätsommer und enthalten einen brennend-scharfen blasenziehenden Saft, der sich auch in der weichen Rinde der jüngeren ruthenförmigen Zweige findet. Diese wird deshalb als „Seidelbast“ zu Fontainen verwendet. (*a* blühender und fruchttragender Zweig in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., *c* Staubgefäß, *d* Fruchtknoten im Längsschnitt, vergl., *b* Steinfrucht, *e* Blüte, aufgeschnitten, nat. Gr., *g* Same im Querschnitt, etwas vergl.)

VI. Ordnung der Schlangengewächse (Serpentariae). Rhizomgewächse oder Sträucher mit abwechselnden einfachen Blättern und zwittrigen und eingeschlechtigen Blüten, welche ein corollinisch Perigon besitzen und deren Staubgefäße entweder unter sich in einer Mittelsäule oder mit dem Griffel verwachsen sind. Frucht eine mehrfächerige vielkammerige Kapsel, selten Beere. Samen mit Eiweiß und geradem Keim.

Jam. 1. Kannenträger (*Nepenthes*). Die einzige Gattung dieser Familie (*Nepenthes*) besteht aus in Java und Madagaskar heimischen Halbsträuchern und Sträuchern mit niederliegenden oder rankenden Ästen, deren nebenblattlose Blätter einen stengelumfassenden, blattartig verbreiteten, in eine Ranke auslaufenden Stiel besitzen, welcher an seinem Ende oft einen durch die dedelartig ausgebildete Blattspitze genau verschließbaren Schlauch trägt. Dieser mit seiner Mündung stets nach oben gekehrt, oft mehrere Zoll lange Schlauch fällt sich auf eine noch nicht hinreichend erklärte Weise während der Nacht, wo der Dedel ausfließt, mit trübem Wasser. Deshalb werden diese merkwürdigen in Sümpfen wachsenden Pflanzen zu einer großen Wohlthat für die Reisenden in jenen heißen Gegenden. Die Blüten sind eingeschlechtlich, klein, in Ähren, Trauben oder Rispen gestellt und unscheinbar, die Schläuche dagegen oft prächtig gefärbt. Das Perigon ist vierblättrig, die Staubgefäße sind verwachsen (ihrebeutel bilden ein Köpfchen), der Fruchtknoten ist frei, oberständig, die Frucht eine lederartige, vierfächerige, an den Näthen aufspringende Kapsel.

Laf. 20, Fig. 10. Der gemeine Kannenträger (*Nepenthes distillatoria*) aus Ceylon. (Ein schlängelnder Zweig in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr.)

Jam. 2. Osterluzeigewächse (*Aristolochiaceae*). Stauden mit kriechendem oder knolligem Rhizom oder kletternde Sträucher. Blätter zweizeilig, einfach, breit, ganzrandig, bald mit einem bald ohne Nebenblatt. Blüten achselständig, einzeln oder gebüschelt oder traubig, mit unterständigem Fruchtknoten und oft selbstsam geformtem röhrenförmigen zwelfspinnigen seltener regelmäßigen Perigon. Staubgefäße 6—12, meist auf die Staubbeutel reducirt, und an den kurzen diden Schläuchen, von einer stacheligen Narbe gekrönten Griffel angewachsen, selten frei. Frucht kapsel-, seltener beerenartig, drei- bis sechsfächerig, vielkammerig. — Die Aristolochiaceen bewohnen der Mehrzahl nach das tropische Südamerika, die übrigen sind durch das tropische Asien, die Mittelerranzone und das gemäßigte Europa und Nordamerika zerstreut.

Laf. 20, Fig. 11. Die gemeine Osterluzei (*Aristolochia Clematitis*), ein perennirendes, in Mitteleuropa heimisches, früher officinelles Kraut mit gelblichen Blumen. (Blüthentragender Theil des Stengels in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., *b* Fruchtknoten mit dem aufgeschwungenen bandigen Theil des Perigons, *c* Narbe von oben mit den 6 an den Griffeln angewachsenen Staubbeuteln, vergl.)

Fig. 12. Der Pfeifen- oder Tabakspfeifenstrauch (*Aristolochia Siphon*), aus Nordamerika stammendes Schlinggewächs mit großen schönen herzförmigen Blättern, welches in unsern Gärten allgemein zu Lauben und Wandbelleiden verwendet wird, hat seinen



Namen von der an einen Tabakspfeifenkopf erinnernden Form seiner grünen Blüten erhalten. (a Blatt, sehr verkleinert, darunter eine Frucht in nat. Gr., b Blütenstand verкл., c Blume im Längsschnitt, nat. Gr., d Griffel und Staubbeutel, e Fruchtknoten im Querschnitt, f Same; vergl.)

Zu der Gattung *Aristolochia* gehört auch die nordamerikanische Pflanze, welche die officinelle Schlangenzunge liefert (*Aristolochia Serpentaria*), sowie die in unsern Wäldern vorkommende, im ersten Frühling blühende Haselwurz (*Asarum europaeum*), ein niedriges Kraut mit gestielten nierenförmigen Blättern und einzelnstehenden braunen aromatischen Blüten von regelmäßiger Bildung, welche 12 freie Staubgefäße enthalten.

### Zweite Unterklasse.

Dikotyledonen mit ganzblättriger Blumenkrone (Gamopetalae).

Blüten in der Regel mit doppelter Hülle, Kelch und Blumenkrone, letztere immer, ersterer oft verwachsenblättrig.

1. Ordnung der Haufblütler (Aggregatae). Blüten klein, zahlreich, in Köpfchen oder dichtblütige gabeltheilige Trugdolben zusammengedrängt. Fruchtknoten unterständig, Kelch rudimentär, kleine einsamige nicht auffpringende Schalefrucht, Samen mit oder ohne Eiweiß. — Kräuter, Sträucher, selten Bäume mit einfachen nebenblattlosen Blättern.

Fam. 1. Valerianengewächse (Valerianeae). Rhizomgewächse, selten einjährige oder halbsträuchige Pflanzen, mit gegenständigen ganzen oder fiederteiligen Stengel- und Astblättern und in zusammengesetzte gabeltheilige, oft büschel- oder köpfchenförmige Trugdolben gestellten, meist zwittrlichen Blüten. Kelch als gezählter oder einwärts gerollter Saum entwickelt, Blumenkrone röhrig oder trichterförmig, bisweilen mit fast zweilippigem Saume oder am Grunde gespornt, Staubgefäße 1—3 in der Höhle der Blumenkrone eingefügt. Fruchtknoten dreifächerig mit 2 leeren Fächern und einem fadenförmigen Griffel. Schalefrüchtchen oft von den in fiederige Vorsten anwachsenden Kelchzähnen gekrönt. Samen ohne Eiweiß. — Die Valerianen sind über die ganze Erde verbreitet, doch vorzüglich in der gemäßigten Zone der nördlichen Halbkugel, namentlich in den Mittelmeerländern und dem taurisch-kaukasischen Gebiet zu Hause.

Taf. 21, Fig. 1. Der gemeine Valerian (*Valeriana officinalis*), eine perennirende, an Vach-, Fluß- und Teichufern sowie an feuchtem Gerölle freier Berggruppen in fast ganz Europa vorkommende Pflanze, deren aromatisches Rhizom als wirksames Heilmittel gegen Krämpfe und andere Krankheiten von alters her officinell ist. Blüten röthlichweiß, aromatisch, in großen schirmförmigen Trugdolben. (a, b ganze Pflanze, sehr verкл., c Fruchtknoten mit Kelch, d Frucht mit dem zur Federkrone angewachsenen Kelche, e Blüte, vergl.) — Zu den Valerianen gehört auch der in vielen Gegenden Deutschlands angebaute Kapuzien-salat (*Valerianella olitoria*), ein kleines einjähriges Kraut mit wiederholt gabeltheiligen Stengeln, kleinen bläulichen Blüten und Fruchtknoten ohne Federkrone, welches auf Aedern als Unkraut wächst. Benutzt werden die büschelförmig gestellten länglichen saftigen Grundblätter.

Fam. 2. Kardenartige Gewächse (Dipsaceae). Kräuter und Halbsträucher mit gegenständigen Blättern, welche häufig fieder- oder leierförmig getheilt sind. Blüten zwittrlich, gewöhnlich in ein Blütenkörbchen gestellt (s. oben S. 12), eine jede mit einer besondern den

Fruchtknoten eng umschließenden, der Länge nach gesuchten oder grubig durchbrochenen Hülle (involucellum) versehen. Kelch rand- oder becherförmig, sein Saum oft in 4—5 lange Vorsten ausgedehnt. Blumenkrone röhrig oder trichterförmig, mit unregelmäßiger oder fünfspaltiger Saune. Staubgefäße 4, dem Grunde der Blumenkrone röhre eingefügt, frei. Schließfrucht von dem Involucellum umschlossen, Same mit Eiweiß. — Gewächse der gemäßigten und subtropischen Zone beider Hemisphären. Zu ihnen gehört die Gattung der Knopfbäume (*Scabiosa*), von deren Arten mehrere auf unsern Wiesen und Feldern vorkommen (z. B. *Sc. arvensis*, *Sc. succisa*, der Teufelsabbiss), die Familie ist benannt nach der Gattung der Karden disteln (*Dipsacus*), meist zweijährigen Kräutern, deren Blätter und Stengel oft stachelig sind.

Taf. 21, Fig. 2. Die Weberlinde (*Dipsacus fullonum*). Die länglichen Blütenköpfe dieser aus dem Orient stammenden Pflanze werden wegen ihrer zur Blütezeit verholzenden und dann stiellos zerfallenden Blätter (Spreublätter), die zwischen den Wintern jedes Jahr und diese überragen, zum Aufsteigen oder Jagen, „Kardätschen“ der rohen Welle gebraucht, welche diese Pflanze in vielen Gegenden angebaut wird, gebildet: der obere Theil des blühenden Stengels in Köpfchen, durchgeschnitten, in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr. 1. Blumenkrone, d Griffel, e, f Fruchtknoten mit Frucht mit dem Hüllchen, g Frucht allein in nat. Gr.

Fam. 3. Korbblütler (Compositae). Kränzel, seltener Halbsträucher, Sträucher oder gar Bäume mit abwechselnden, selten gegen- oder querscheidigen gegen- nebenblattlosen Blättern und in Blütenkörbchen gestellten Blüten, welche bald alle Zwitterblüten sind und keine Blumenkrone von gleicher Form besitzen, bald nur die äußeren oder polygamisch. In letztem Falle haben die Randblüten gewöhnlich eine anders geformte Blumenkrone als die übrigen das Receptaculum bedeckenden Blüten (Scheibenblüten). Kelch rudimentär, als borstiger, fiederiger, borstiger, schuppiger oder spreublätteriger Saum ausgebildet, oft nach der Blütezeit sich vergrößert und auf der kleinen einsamigen Schließfrucht (Samen) als Flugorgan (Samentrone) stehenbleibend. Blumenkrone röhrig, trichterförmig, zungen- (Labiell-) förmig oder zweilippig. Staubgefäße 5, in der Mitte der Blumenkrone röhre eingefügt, frei. Stachelig in einen Cylinder verwachsen, durch welchen die Zwitterblüten der fadenförmigen Griffel hindurchgeht; Achen, 2, behaart. Blütenkörbchen mit sehr verschieden geformter Bracteenhülle (Korbhülle, Hüllkelch, gemeinschaftlicher Kelch), und Scheiben-, halbkugel-, leier-, walzenförmigen, convergen oder ebenen, nach dem spreublätterigen Fruchtboden (receptaculum), bald einzeln an der Spitze des Stengels, bald traubig doldentraubig, trugdolbenförmig oder rispig geordnet. — Die Compositen sind die größte Familie des Pflanzenreichs und über die ganze Erde durch alle Zonen und Regionen verbreitet, in größter Menge jedoch auf den Inseln und Gebirgen der tropischen und subtropischen Zone, nächst dem in der gemäßigten Zone, besonders Nordamerikas vorhanden. Man kennt ungefähr 10000 Arten. Sie zerfallen in mehrere Unterfamilien nach einer großen Zahl von Gruppen und Untergruppen.

a. Röhrchenblütler (Tubuliflorae). Alle oder meistens die Scheibenblüten röhrig-trichterig, Randblüten wenn eingeschlechtig oder geschlechtslos, mit zungenförmiger oder unregelmäßig trichterförmiger Blumenkrone, einen Strahl (radius) bildend. Die ganze Abtheilung zerfällt in fünf Hauptgruppen.

Taf. 21, Fig. 3. Die Feldkamille (*Matricaria inodora*), bekannte einjährige Arzneypflanze, welche

ant unter der Saat in fast ganz Europa vor-  
einen weißen Strahl und eine gelbe Scheibe  
nd sich von ähnlichen Arten durch den fege-  
naden, inwendig hohlen Fruchtboden unter-  
(a die ganze Pflanze in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr.,  
en: c Strahlblüte, d Stempel, e Korbhülle  
boden, g Frucht, h im Querschnitt, verg.;  
n nat. Gr.)

. Das Wohlverleib (*Arnica montana*),  
des, auf moorigen Wiesen Mitteleuropas,  
in Gebirgsgegenden wachsendes, heilkräftiges  
ansehnlichem Blütenkörbchen und goldgelben  
nd Scheibenblüten. (a die ganze Pflanze in  $\frac{1}{2}$   
b Scheibenblüte, verg.; c Strahlblüte in nat.  
arbe, e ein Drüsenhaar des Stengels, verg.)

Der Huslatti (*Tussilago Farfara*), aus-  
auf thönigem oder merzeligem feuchten Boden  
uropa vorkommendes Kraut, welches im ersten  
blüht und ebenfalls eine Arzneipflanze ist.  
eben auf weißfilzigen mit grünen Schuppen  
Stengeln, welche sich vor den grundständigen,  
weißfilzigen Blättern entwickeln, Strahl- und  
blüten goldgelb, erstere mit sehr schmaler Zunge.  
de Pflanze in  $\frac{1}{2}$ , b blättertragende in  $\frac{1}{2}$ ,  
c Korbhülle und Fruchtboden, d Strahl-  
blüte, verg.)

. Das Gänseblümchen, Maßliebchen  
(*Primula verensis*), allgemein verbreitete, perennirende  
der Wiesen und Grasplätze von Mittel- und  
uropa, auch in Südeuropa als Gebirgspflanze  
nd, blüht fast das ganze Jahr. Scheiben-  
bl, Zungen der Strahlblüten weiß, oft mit  
eigen. Eine Gartenvarietät, bei welcher alle  
Zungenblüten von weißer oder rother Farbe  
elt sind, ist das sogenannte Tausendschön  
nuntrocknen. (Ganze Pflanze in nat. Gr.,  
bchen senkrecht durchschnitten, b Scheiben-  
Strahlblüte mit abgechnittener Zunge, verg.)  
Gänseblümchen ähnlich, aber viel größer  
Theilen, ist die weiße Wucherblume  
(*Primula vulgaris*), auch Käseblume, große  
Johanniskblume, Orakelblume  
e, welche auf Wiesen und Aedern wächst und  
se Strahlblüten von den Mädchen als Liebes-  
aupt werden.

Der Vermut (*Artemisia Absinthium*).  
reiche Gattung *Artemisia* hat kleine traubig  
g angeordnete Blütenkörbchen ohne Strahl-  
ndblüten fadenförmig und weiblich zu sein  
während die zwittrlichen Scheibenblüten eine  
sternförmige Gestalt besitzen. Seltener sind  
en von letzterer Form und zwittrlich, z. B.  
igen Arten, deren kleine noch unaufgeblühte  
im zerriebenen Zustand den sogenannten  
men (*Flores Cinnae*) bilden, welcher gegen  
erwärmer, besonders gegen den Spulwurm  
et wird. Diese Arten wachsen im weissen  
Südeuropa und Nordafrika. Diejenige Art,  
n echten levantinischen Wurmsamen liefert  
wächst in Turkestan. Eine in Mittel- und  
uropa sehr verbreitete Art ist der gemeine  
(*A. vulgaris*), dessen Rhizom für ein Mittel-  
leppie gilt. Seine handförmig-fiedertheiligen  
nd oberseits kahl und dunkelgrün, unterseits  
Dadurch und durch die kleinen länglichen  
braune Blüten enthaltenden Körbchen unter-  
sch diese Art von dem viel niedrigeren Ver-  
en Blätter auf beiden Seiten graufilzig sind,  
a halbkugelige hängende Körbchen gelbe Blüten  
Diese in Mittel- und Südeuropa auf Sand-

boden vorkommende und häufig angebaute Pflanze ist  
in allen Theilen sehr bitter und deshalb als magen-  
stärkendes Mittel bekannt. Ihre Blütenkörbchen und  
Blätter werden zur Vereitung des namentlich in  
Frankreich sehr beliebten Absinthiqueurs benutzt.  
(a blütentragende Spitze des Stengels in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr.,  
b Blatt in nat. Gr., c Blütenkörbchen, d Frucht-  
boden mit einer Strahl- und einer Scheibenblüte, verg.)  
Andere, als Küchenkräuter benutzte, aus Asien stammende  
Arten sind der Drachant oder Dragun (*A. Dracunculus*)  
und die Eberraute (*A. Abrotanum*). Letztere  
ist ein Strauch.

Fig. 8. Die Eberwurz (*Carlina acaulis*), eine auf  
trockenen kahlen Hügeln in Mittel- und Südeuropa  
wachsende, distelartige Pflanze, gehört wie alle so ge-  
nannten Disteln (Arten der Gattungen *Carduus*,  
*Cirsium*, *Onopordon* u. a.) zu der Gruppe der Cynareen  
oder artischokenähnlichen Compositen, welche sich durch  
knotted Verdickung des Griffels und meist aneinander-  
liegende, einen keulenförmigen Körper bildende Narben  
auszeichnen und gewöhnlich lanter röhrige Zwitter-  
blüten in jedem Blütenkörbchen haben. Bei der Gattung  
*Carlina* sind die innersten Blätter des Hüllkelchs als  
zungenförmige, weiße oder gelbe glänzende, blumen-  
blattartige aber steife trockene Schuppen ausgebildet,  
welche einen Strahlenkranz um jedes Körbchen herum  
bilden. Die Eberwurz ist gewöhnlich stengellos, weß-  
halb der große Blütenkorb im Centrum der Blatt-  
rosette zu sitzen pflegt. Ihr Rhizom galt früher für  
sehr heilkräftig. (a ganze Pflanze in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr.,  
c Blüte in nat. Gr., d Frucht, e im Querschnitt,  
schwach verg.)

Fig. 9. Das Cardobenediktenkraut (*Cnicus  
Benedictus*), eine ebenfalls zu den Cynareen gehörende  
einjährige Pflanze aus Südeuropa, welche officinell ist.  
Blüten gelb, Körbchen von den obersten Blättern um-  
hüllt, innerste Blätter des Hüllkelchs mit laminaförmig  
eingeschnittenem Anhang. (a oberer Theil der Pflanze  
in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., daneben ein interessantes Stengelblatt,  
b Blüte, c Korbhülle, d Frucht mit Pappus, verg.)

Fig. 10. Die Riesenkugeldistel (*Echinops  
gigantea*), eine prächtige baumartige Distel des  
tropischen Ostafrika, welche in der Alpenregion der  
Gebirge Abyssiniens wächst und dort bis über 13000 Fuß  
Höhe vorkommt. Die Blütenköpfe halten 6—8 Zoll im  
Durchmesser, sind aus hochrothen Trichterblumen  
zusammengesetzt und sehr honigreich. Die europäischen  
und asiatischen Verwandten dieses hier in starker Ver-  
kleinerung abgebildeten Tropengewächses sind stattdes,  
bis über mannshohe Stauden mit kugelförmigen  
1—2 Zoll starken Blütenköpfen von blauer oder weiß-  
licher Farbe. Allen Kugeldisteln fehlt die gemeinsame  
Korbhülle, indem jede einzelne der ziemlich großen, auf  
einem kugelförmigen Receptaculum stehenden Blüten von  
einer besonders aus vielen verschieden geformten  
Schuppen bestehenden Hülle umgeben ist.

Die Gruppe der Cynareen ist benannt nach der  
Gattung der Artischoken (*Cynara*), ausdauernden  
Kräutern mit meist dornigen fiedertheiligen Blättern  
und großen Blütenkörbchen, deren Hüllschuppen in  
Dornen auslaufen oder unbewehrt sind. Letzteres ist  
der Fall bei der gemeinen Artischoke (*C. Scolymus*),  
einer im südwestlichen Deutschland und in Südeuropa  
angebauten Pflanze, deren saftgroße Blütenköpfe vor  
dem Aufblühen als Gemüse benutzt werden.

b. Lippenblütige (*Labiataeflorae*). Die kleinste  
Abtheilung, lanter exotische Compositen mit Lippen-  
blumen enthaltend.

c. Zungenblütler (*Liguliflorae*). Alle Blüten  
zwittrlich, mit zungenförmiger Blumentrone.

Fig. 11. Die Cichorie (Cichorium Intybus), gehört gleich den folgenden zwei Arten zu der nach ihr benannten Gruppe der Cichoriaceen, von denen die meisten einen weißen, bisweilen giftigen Milchsaft (z. B. *Lactuca virosa*, der Gifflattich) in ihren krautigen Theilen enthalten. Die Cichorie, ein Rhizomgewächs, findet sich als Unkraut auf bebautem Boden, auf Schutt und an Wegen und breitet nur vormittags die himmelblauen Zungenblüten ihrer Körbchen aus. Sie wird in vielen Gegenden wegen ihres als Kaffeesurrogat dienenden Rhizoms angebaut. (a ganze Pflanze, sehr verkl., b Wurzelstock, desgl., c Blüte in nat. Gr., d Stempel, e Frucht, etwas vergr.) Zu derselben Gattung gehört der Endivienalat (Cichorium Endivia), welcher namentlich in Frankreich und Südeuropa beliebt ist.

Fig. 12. Das Pfaffenröhrlein (*Taraxacum officinale*), auch Hund- und Maiblume genannt, ist eine der ersten im Frühling blühenden Compositen und dann wegen ihrer goldgelben Blütenkörbchen eine wahre Zierde der Grasgärten und Brachäcker. Aus dem auf nachtem hohlen Schaft stehenden Körbchen entwickelt sich eine zierliche kugelförmige Federkrone, indem die Fruchtschen einen gestielten haarigen Pappus tragen. Das milchende Rhizom dieser ein gutes Futter für Rühе gewährenden Pflanze ist officinell. (Die ganze Pflanze in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., a fruchttragendes Körbchen, b Fruchtboden mit einer Frucht, c derselbe mit einer Blüte, alle Fig. verkl.; d Blüte in nat. Gr., e Frucht, vergr.)

Fig. 13. Die Schwarzwurzel (*Scorzonera hispanica*), eine in Südeuropa heimische Pflanze, welche wegen ihres fleischigen gleich Spargel genießbaren Rhizoms häufig als Gemüsepflanze angebaut wird. Die gelben Blumen duften nach Vanille. (a oberer und unterer Theil der Pflanze in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b Blüte, c Frucht, d Facette des Fruchtbodens, e Frucht im Querschnitt, vergr.)

Zu den Cichoriaceen gehören ferner: der gemeine oder Staudensalat (*Lactuca sativa*), welcher in zahllosen Abarten seit undenklichen Zeiten gebaut wird, die Hahnenwurz (*Tragopogon porrifolius*), die Sau- oder Gänsefistel (*Sonchus oleraceus*), ein verbreitetes Unkraut, u. a. m.

II. Ordnung der Glockenblumigen (Campanulinales). Blüten verschiedenartig angeordnet, zwittrliche oder eingeschlechtige. Fruchtknoten unterständig, Kelch verwachsen- oder getrenntblättrig, krautig, Blumenkrone meist glodig oder trichterig, Staubgefäße meist fünf, im Grunde der Blumenkroneöhre eingefügt. Ein einziger Griffel. Kapseln, Beeren oder Nußfrucht.

Unter den hierher gehörigen Familien sind besonders bemerkenswerth die Glockenblättrigen (Campanulaceae) und die Kürbisgewächse (Cucurbitaceae). Obgleich der erstern die bekannten blauen und lilafarbenen Glockenblumen unserer Wiesen und Gärten (Arten der Gattung Campanula). Die Kürbisgewächse sind der Mehrzahl nach Bewohner der Tropengegenden und meist Kräuter, ihre Stengel gewöhnlich mit Ranken versehen, mittels derer sie zu klettern oder kriechen vermögen. Blätter abwechselnd, handnervig und oft handlappig, ohne Nebenblätter, Blüten eingeschlechtig, meist zweihäusig, Kelch mit der Blumenkrone verwachsen, Staubgefäße frei oder monadelphisch, Frucht fleischig-saftig, dreifächerig, viel-samig, oft beerenartig. — Die meisten bei uns angebauten Kürbisgewächse sind Arten der Gattungen Cucurbita oder Cucumis. Zu ersterer, welche ölige Ranken und am Rande wulstig verbildete Samen hat, gehören der gemeine Kürbis (*Cucurbita Pepo*) und der Flaschenkürbis

(*C. Lagenaria*), zu letzterer, bei deren Frucht die Samen scharfzahnig im Gurt und die Samen (Cucumis sativus), die Melon und die auf

Taf. 22, Fig. 1 abgebildete Kürbis (*Cucumis Citrullus*), welche jedoch nicht zu dieser Gattung bildet. Diese gleich den Gurken und im tropischen Asien heimische Pflanze bildet eine förmige und lüßisgroße Frucht, deren bald gelbes oder weißes Fleisch so leicht zu dünne süßliche, sehr erfrischende Saft wird, wie Wasser hervorfließt. Die in das Innere betteten Samen sind schwarz, die Blüten weiß. Die Wassermelone (auch Arbutus genannt) viel Wärme und Wasser, macht aber wenig an den Boden. Sie wird deshalb in den Ländern (in Europa noch in Ungarn) im Freistade angebaut. (Abgebildet: a Blüthenstand des Stengels in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b, c Staubgefäße, vergr.; d Samen im Querschnitt, verkl.)

Fig. 2. Der Kürbis- oder Karibis (*Carica Papaya*), ein in allen Tropenländern gebauter kleiner Baum, dessen Stengel stets unter 20 Fuß Höhe erreicht und eine Krone von gestielten Blättern trägt. Deshalb werden diesem ditrophen Gewächs gewissermaßen die Palmen. Die Blütenstände entspringen aus den Achseln und sind bei dem männlichen Baum bei dem weiblichen Trauben. Die männlichen sind trichterförmig,  $\frac{1}{2}$  Zoll lang, enthalten 10 Staubgefäße, die weiblichen sind gelb. Die Frucht gleicht einem Kürbis, ist dieses blasgelbes süßes Fleisch. (Die ganze Pflanze, sehr verkl.; a weibliche Blüte, b Querschnitt der Frucht, verkl.)

III. Ordnung der Quirlblättrigen (Rutales). Blätter gegen- oder quirlständig mit oder ohne ähnlichen Nebenblättern. Blüten in Trauben, Quirlen, Köpfchen, Rispen, Fruchtknoten meist einzeln oder gefaltet, oft rudimentäre Krone röhrenförmig oder trichterförmig, frei, in der Röhre der Blumenkrone oft fruchtig, Steinfrucht, Beere oder Kapsel, oft voluminösem Eimeiß.

Jam. 1. Chinabaumartige (Celastraceae). Bäume, Sträucher und Kräuter der Tropen gegen- oder quirlständigen meist leuchtend farbenen Blättern. Blüten bald einzeln, förmig in den Blattwinkeln, bald in corymbösen, Köpfchen oder (oft großen) Trauben; vier- bis fünftheilig, Blumenkrone meist vier- bis fünf, Frucht meist vier- bis fünfklappig aufspringende viel-samige Kapseln oder Steinfrucht.

Taf. 22, Fig. 3. Die Brechwurzel (*Ipecacuanha*), ein in den Wäldern Brasiliens heimisches Rhizomgewächs, dessen dünner geringelter Stengel als Brechmittel angewandt wird. Die Pflanze ist eine Krone aus Wurzel ist. Blüten klein, weiß, in corymbösen Köpfchen. (a Blüthenstand in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b Blüte, c Stengel, vergr. in nat. Gr.)

Fig. 4. Der Kaffeebaum (*Coffea Arabica*), ein in den Tropenländern, besonders auf den Inseln im großen Maßstabe angebauter Baum, dessen Quirlblüten entwickeln sich in  $\frac{1}{2}$  Zoll lange Steinfrüchte von rother, zuletzt violetter Farbe, welche



pergamentartiger citrongelber Schale ent- aus jedem Kern herausgeschälte ebenfalls auf der ebenen Seite mit einer längs- renne hornige Eiweißkörper ist die rohe in kommende „Kaffeebohne“. (Abgeb. ein Früchtchen tragender Zweig in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., von welcher die obere Hälfte der fleischigen hntitten ist, verfl.; b Blüte, geöffnet, in

Der Chinarindenbaum (*Cinchona Con-* Die artenreiche Gattung *Cinchona* gehört dem tropischen Südamerika an, wo die der Mehrzahl nach in der nebelreichen Wal- ladeskette wachsen. Es sind schon belaubte Bäume, deren meist weiße, oft sehr an- stehen meist in zu großen Rispen vereinigt stehen. Die Frucht ist eine Kapsel. Manche erreichen riesige Größe. Die Rinde aller Alkaloide (*Cinchonin*, *Chinin*) von fieberer- Wirkung, besonders aber diejenige einer Arten, zu denen auch die hier in  $\frac{1}{2}$  gebildete *C. Condaminea* gehört. (a Blumen- schnitten, nat. Gr.; b Kapseln in  $\frac{2}{3}$  nat. Gr., verg.)

Krappartige Pflanzen (*Rubiaceae*). einer Halbsträucher, mit meist dünnen gegen- ständigen Blättern und kleinen weißen oder Trugdolben, seltener einzeln gestellten denen sich bei der Mehrzahl eine in- ige Hälften sich theilende Spaltfrucht, bei e beerenartige Frucht entwickelt. Kelch ge- dimentär, Blumentrone mit vierlappigem r vier Staubgefäßen. — Die Rubiaceen ie ganze Erde verbreitet und besonders in n gemäßigten Zone beider Hemisphären

Fig. 6. Der Krapp oder die Färber- (*Alchemilla tinctorum*), ein im Orient und Süd- wachsendes, dort sowie in Frankreich, den n, in Algerien und anderwärts im großen egebauten Kraut, dessen holziges kriechendes es Rhizom einen scharlachrothen Farbstoff h) enthält, der namentlich zum Rothfärben olle und des Luchs verwendet wird. Stoff ist aus verschiedenen Pigmenten zu- pt, unter denen das neuerdings auch zur ation benutzte „Alizarin“ die wichtigste Die Krapppflanze hat mit kleinen Stacheln tränder und Stengelstacheln und gelbe Blüten. eile der ganzen Pflanze in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr.) Zu iceen gehören auch die Labkräuter (Gattung *Galium*) unserer Wiesen, Felder , das lästige Klebkraut (*Galium Aparine*) lannte aromatische zur Vereitung des „Mai- nentbehrliche Waldmeister (*Asperula*

nung der Weißblattartige (*Capri-* Blätter einfach, ohne Nebenblätter, Blüten mit ganz oder halb unterständigem Frucht- re oder beerenförmige Steinfrucht. Samen jem, den Keim umschließendem Eiweiß.

. Hedentirschenartige (*Lonicereae*). seltener Bäume, sehr selten Kräuter mit gen Blättern. Staubgefäße fünf, in der Blumentrone eingesägt, frei. Mehrkernige ie Steinfrucht.

2, Fig. 7. Das Gartengeißblatt (*Caprifolium*). Die Arten der Gattung *Lonicera* n solche mit schlingenden Stämmen und quirlförmig gruppierten Blüten, welche eine

langröhrlige zweiflippige Blumentrone besitzen, und in solche mit aufrechten Stämmen und zu je zwei in den Blattwinkeln auf einem gemeinsamen Stiel stehenden Blüten, deren Blumentrone trichterförmig ist und deren Fruchtknoten oft verwachsen sind. Erstere werden Geiß- blatte, letztere Hedentirschen genannt. — Das Gartengeißblatt mit weißen röhrlig angebauchten honigreichen wohlriechenden Blumen, ein allgemein beliebter, zu Lauben und Wandbekleidungen verwen- deter Schlingstrauch, stammt aus dem südöstlichen Europa (Abgeb.: ein Blüthenzweig in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr.) Unter den Hedentirschen werden namentlich *L. tatarica* aus Asien (Blüten hellroth oder weiß, Beeren mennigroth) und *L. coerulesca* aus Mitteleuropa (Blüten gelblichweiß, Beeren verwachsen, blaubeudet) häufig als Ziersträucher cultivirt. — Zu den Loniceren gehören ferner: der gemeine Schneeball (*Viburnum opulus*), der Stein- lorber (*Viburnum Tinus*), der schwarze Flieder oder gemeine Hollunder (*Sambucus nigra*) und der Traubenhollunder (*Sambucus racemosa*). Bei *Viburnum* und *Sambucus* stehen die Blüten in zu- sammengesetzten Trugdolben, *Viburnum* hat aber ganze, *Sambucus* dagegen fiederschnittige Blätter. Bei dem in unsern Wäldern und Gebüsch wild wachsenden gemeinen Schneeball sind die peripherischen Blüten der schirmförmigen Trugdolben geschlechtslos und mit großen weißen radförmigen Blumentronen versehen, beim Gartenschneeball dagegen alle Blüten in geschlechtslose und großblumige umgewandelt, weshalb hier der Blüten- stand eine kugelige Form erhalt. *Sambucus nigra* hat langgestielte schirmförmige Trugdolben, weiße Blüten und schwarze Beeren, *S. racemosa* turzgestielte kuge- lige Trugdolben, gelbgrüne Blüten und scharlachrothe Beeren. — Zu den Loniceren gehören endlich auch die den Namen Linne's tragenden nordische *Linnaea* (*Linnaea borealis*), ein in Schweden und anderwärts im Norden, aber auch in den Alpen und sogar in Norddeutschlands Ebenen (bei Berlin) wachsender, niederliegender Zwergstrauch mit wohlriechenden weißen Glodenblumen, und das moschusduftende Bisamkraut (*Adoxa Moschatellina*), ein unter Gebüsch an schattigen feuchten Plätzen wachsendes Kräutlein mit grünlichen kopfförmig angeordneten Blüten und getheilten Blättern, welches im April oder Mai blüht.

Fam. 2. Heidelbeerartige (*Vaccinieae*). Sträucher und Halbsträucher mit abwechselnden ganzen Blättern und regelmässigen einzelnstehenden oder traubig an- geordneten Blüten, deren Staubgefäße (acht bis zehn) einem neltarabschendernden Diskus im Grunde der meist frug- oder glodenförmigen Blumentrone eingesägt sind. Mehrsamige Beere.

Taf. 22, Fig. 8. Die Preiselbeere (*Vaccinium Vitis idaea*), auch Kröns- und Strichbeere genannt, bekannter immergrüner Kleinstrauch mit weißen Gloden- blüten und scharlachrothen Beeren; wächst auf Heide- boden in lichten Nadelwäldern in fast ganz Europa. (Abgeb. die ganze Pflanze in  $\frac{2}{3}$  nat. Gr.; a Staub- gefäße und Griffel, b ein Staubbeutel mit seinen beiden stielartigen Anhängen, c Stengel, verg.; d Beeren, e im Querschnitt, nat. Gr.; f Samen durchschnitten, verg.) — Eine andere immergrüne und rothfrüchtige Art ist die Moos- oder Krabnsbeere (*V. Oxycoc- cos*), welche sich durch im Moose kriechende faden- förmige Stengel, kleinere zweifarbig (unterseits weiß- liche) Blätter, einzeln stehende langgestielte Blüten mit viertheiliger kreuzförmiger rother Blumentrone und größere purpurrethe Beeren von der Preiselbeere unter- scheidet. Wächst auf Torfmooren in Mittel- und be- sonders häufig in Nordeuropa. — Zur Gattung *Vaccinium* gehören ferner die bekannte Heidel- oder

Schwarzbeere (*V. Myrtillus*) und die Blau- oder Rauschbeere (*V. uliginosum*), welche beide die Blätter im Herbst verlieren. Erstgenannte Art hat lantige grüne Stämmchen und Aeste, feingefägte Blätter und wächst vorzugsweise auf trockenem oder frischem Waldboden, während die zweite Art runde zimtbraune Stämmchen und ganzrandige Blätter besitzt und nur auf Torfmoorboden vorkommt. Die blaubeusetzten Beeren dieser zweiten viel größer werdenden Art sollen in Menge genossen Kopfschmerzen und Schwindel bewirken.

V. Ordnung der heideartigen Pflanzen (*Ericinae*). Halbsträucher, Sträucher und Bäume, selten Sträucher mit einfachen ganzen nebenblattlosen Blättern und meist regelmäßigen Zwitterblüthen, welche einen oberständigen Fruchtknoten besitzen. Kapselfrucht, selten Beerenfrucht, mit einkehlhaltigen Samen. — Unter den hierher gehörigen Familien ist die wichtigste diejenige der

Heidesträucher (*Ericaceae*). Immergrüne Pflanzen mit meist kleinen nadel- oder schuppenförmigen, selten großen breiten Blättern, welche abwechselnd gegen- oder quirlständig angeordnet sind. Blüten achsel- oder gipfelständig, oft große Rispen bildend, mit vier- bis fünftheiligem Kelche und röhren-, gloden-, trichter- oder trugförmiger, bisweilen fast zweiflipperiger Blumentrone, welche sammt den Staubgefäßen (vier bis zehn) auf einem fleischigen Diskus eingefügt ist. Staubbeutel geschwänzt oder begrannet, mit Löchern aufspringend. Fruchtknoten mehrfächerig, Griffel fadenförmig. — Die *Ericaceen* sind zwar über die ganze Erde verbreitet, doch sehr ungleich vertheilt. Von den über 500 Arten der Gattung *Erica* wachsen die meisten am Cap der guten Hoffnung, während die breitblättrigen und großblumigen *Rhododendron*s und *Azaleen* vorzüglich das gemäßigte und kalte Nordamerika und die Hochgebirge des tropischen Asien bewohnen. Unter den europäischen *Ericaceen* ist das gemeine Heidekraut (*Calluna vulgaris*) von den Ericen durch den corollinisch gefärbten Kelch, welcher die Blumentrone an Größe übertrifft, verschieden, auf sandigem trockenen Boden über weite Strecken Landes in dichtem Bestande verbreitet. Dasselbe bildet oft die alleinige Bodendecke in den sogenannten „Kiefernheiden“. Als Repräsentanten der breitblättrigen *Ericaceen* sind abgebildet:

Taf. 22, Fig. 9. Die indische *Azalee* (*Azalea indica*), bekannt, allgemein beliebter Zierstrauch unserer Kalthäuser und Zimmer, dessen trichterförmig-zweiflipperige Blumen in allen Nuancen von Roth und Weiß und von der verschiedensten Größe und Form vorkommen. Die Heimat dieses schönen, schon seit geraumer Zeit zu einer Modespflanze gewordenen Gewächses ist China. Die Abbildung stellt eine Varietät mit gekräuselten Blumen dar (*A. indica crispiflora*). Den *Azaleen* verwandt sind die *Asprosen* (*Rhododendron*). Zwei in den Alpen und Pyrenäen wachsende kleine Arten (*Rh. hirsutum* und *ferrugineum*), mit hellpurpurrothen kopsförmig zusammengedrängten Blüten sind die berühmten Alpenrosen der Schweiz.

Fig. 10. Der Erdbeerbaum (*Arbutus Unedo*), ein baumartig werdender, im südlichen und westlichen Europa heimischer Strauch mit weißen Blüten, aus deren Fruchtknoten sich eine kugelige scharlachrothe Beere von erdbeerartigem Ansehen und säuerlich-süßem Geschmack entwickelt. In Menge genossen wirken diese Beeren beräuschend. (a blüthentragender Zweig, b Theil einer Fruchttraube, in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr.; c, d Staubgefäß von vorn und von der Seite, verg.; e Frucht im Querschnitt, nat. Gr.; f Samen im Längsschnitt, verg.)

Fig. 11. Die Bärentraube (*Arctostaphylos Uva arsi*), niederliegender Kleinstrauch vom Ansehen der

Preiselbeere mit weißen Blüten und scharlachrothen ungenießbaren Beeren; b West- und Südeuropa, war früher essbar; h fruchttragender Zweig in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr.; c Querschnitt, e Spitze eines Blattes, f Längsschnitt, verg.)

Zu den *Ericaceen* gehört auch der in Mittel- und namentlich Nordamerika häufige Sumpfsporst oder wilde Rose (*Rubus palustre*), dessen einen narlosigen Kelch und deshalb giftigen Blätter sich gewöhnlich zu bedienem pflegen, um das Sumpfsporst zu machen. Blätter schmal, am Rand unterseits braunfälig, Blätter in endständigen Rispen, Kapselfrucht braun.

VI. Ordnung der nüsschenträgerigen Blüthler (*Labiatorae nuculiferae*). Zweiflipperig, seltener regelmäsig; Frucht viertheilig, mit grundständigem Griffel; selten ganz, mehrfächerig, mit endständigen vier einsamigen Nüssen zerfallende oder mehrfächerige Beere oder mehrkernige Frucht mit oder ohne Einweiss.

Zam. 1. Lippenblüthler (*Labiatorae*). Halbsträucher, selten Sträucher, mit viertheiligem gegenständigen einfachen Blättern und in Scheinquirlen oder gegenständigen Rispen einzeln gestellten Zwitterblüthen aus einem regelmäfigen oder zweiflipperigen röhrigen Blumentrone mit zwei, selten drei Saamen, vier zweimähtigen, seltener dreimähtigen und einem tief viertheiligen oder zweiflipperigen Griffel bestehen. Die Frucht theilt sich in vier Theile, welche die Samen enthalten. Die Labiaten, eine der natürlichsten Familien, welche in der warmen Zone der Erde vorkommen, fallen, sind über die ganze Erde verbreitet, aber in der wärmern gemäßigten Zone häufiger. Halbsträucher zu Hause, so z. B. in den Ländern, wo namentlich die halbhülsenartigen Früchte vorkommen. Alle sind reich an ätherischen Oelen und aromatischen Pflanzen. Viele der Gewürz- und Heilpflanzen Verwendung.

Taf. 22, Fig. 12. Der Bienenweide (*Salvia officinalis*), eine durch ganz Europa verbreitete Pflanze, welche auf kalkigem Boden, hat purpurne blühende Halbschalen von den Bienen häufig besucht. (Abgeb. ein Theil der Pflanze in nat. Gr. verg.)

Fig. 13. Der Gundermann (*Glechoma hederacea*) häufig vorkommende Unkraut, Schuttpflanze mit wurzelnden Stengeln und Ausläufern, Blüthenzweigen und violett-blauen aromatischen Blättern zu Kräuterkäsen verwendet werden und ehemals für die Schwindsucht galten. (Abgeb. ein Zweig in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., a Blumentrone, aufgethan, b Theil von vorn, c von hinten gesehen, d Stempel, verg.)

Fig. 14. Der Rosmarin (*Rosmarinus officinalis*) ein in Südeuropa als Winterholz in belaubten Hügeln vorkommender Strauch mit weißen Blüten und zurückgestellten zweiflipperigen Blättern. Diese Pflanze ist ein Topfgewächs kultiviert, ihre aromatischen Blüthen sind officinell. (Abgeb. ein Zweig in nat. Gr., a Blüthe, b Kelch mit Frucht, verg.; c, d des Rosmarins sind die zahlreichsten Salvia, zu denen z. B. die bekannte

is) gehört, ein ebenfalls in Südeuropa einheimischer Halbstrauch, dessen runzelige Blätter officinell sind. Er wird aus ihnen das wohlriechende Salbeilöl gewonnen. Auf Wiesen in fast ganz Europa findet sich weissen sehr häufig die früher auch officinell gewesene, durch große blaue Blumen ausgezeichnete Pfefferminze (S. pratensis), ein perennirendes Kraut.

Fig. 15. Der Thymian (Thymus vulgaris), ein nur handhoher Halbstrauch, welcher in Südeuropa auf dünnen sonnigen Hügeln in Menge vorkommt und als Küchengewürz- und Heilpflanze in unsern Gärten häufig angebaut wird. Die Blätter sind weiß, mit rothen punktförmigen Drüsen bestreut. blühender Zweig in nat. Gr., b Blüte, c Kelch von unten dargestellt, um den im Schlund befindlichen Haarkranz, welcher der Gattung Thymus eigen ist, sichtbar zu machen; d Kelch vom Rücken aus gesehen, vergr. — Zur Gattung Thymus gehört auch der Feldkümmel oder Quendel (Th. Serpyllum), eine allgemein verteilte, an trockenen Hügeln und Uferstrichen, felsigen u. s. w. wachsende sehr aromatische Pflanze mit länglichen Blättern und rothen löffel zusammenhängenden Blüten. Ihr Kraut ist bekanntlich auch officinell.

Zu den Labiaten gehören ferner: die Pfefferminze (Mentha piperita), die Krauseminze (trauschblättrige Varietäten verschiedener Menthaarten), das Pfefferminzkräutchen (Satureja hortensis), der Majoran (Origanum Majorana), der Majoran (Hysopus officinalis), die Zitronenmelisse (Melissa officinalis und Nepeta hirtensis), der Lavendel (Lavandula Spica), das Basilienkraut (Ocimum Basilicum) u. a. m.

Fam. 2. Eisenkrautähnliche Pflanzen (Veronaceae). Bäume, Sträucher und Kräuter mit gegenständigen oder abwechselnden, einfachen oder zusammengesetzten Blättern und in Aehren, Köpfchen, Trauben oder Trugdolden gestellten Zwitterblüthen. Kelch röhrig, Blumenkrone meist zweilappig, Staubgefäße gewöhnlich vier, zweifächrig, seltener zwei oder fünf, Fruchtknoten einzig, zweifächrig, Steinfrucht oder Beere. — Die Veronaceen gehören fast ganz den Tropenländern an, nur wenige kommen in Europa vor, in Deutschland nur das gemeine Eisenkraut (Verbena officinalis), welche an mäßigen Plätzen wachsende, perennirende Pflanze, welche früher officinell war. Die in unsern Gärten so häufig zur Zierde angepflanzten Verbenen sind Varietäten der in Südbrasilien und den La Plata Staaten heimischen V. chamaedrifolia und V. tenera.

Taf. 22, Fig. 16. Der Reuschbaum (Vilex Agnus castus), ein schöner in Südeuropa und Nordafrika wild wachsender Strauch mit gegenständigen fingerförmig zusammengefügten graugrünen Blättern und safranfarbenen Lippenblüthen in Quirlähren, wird nicht allein als Ziergeheiß in unsern Kalthäusern cultivirt, eine Samen waren früher officinell. (Abgeb. ein blühender Zweig in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., a Blüte in nat. Gr., Blumenkrone, c, d Beere im Längs- und Querschnitt, Samen, vergr.)

Zu den Verbenaceen gehört auch der in Ostindien heimische und dort ganze Wälder bildende Leucaena (Leucaena grandis), ein sehr groß werdender Baum, dessen äußerst hartes und festes Holz für das beste Schiffbauholz gilt.

Fam. 3. Aushblättrige Gewächse (Asperifoliae). Sträucher, seltener Halbsträucher und Sträucher, mit abwechselnden, einfachen, nebenblattlosen gewöhnlich bart- oder rauhhaarigen Blättern und meist in Quirlähren oder Widelähren gestellten, seltener blattunterschiedlichen Zwitterblüthen. Kelch röhrig,

Blumenkrone gewöhnlich regelmäßig trichter-, teller- oder radförmig selten zweilappig, Staubgefäße fünf, der Röhre eingesügt, zwischen oder über ihnen oft hohle Gewölbschuppen (forrices), welche den Schlund der Blumenkrone mehr oder weniger verschließen. Fruchtknoten und Frucht wie bei den Labiaten, aber die Narbe löffelförmig, die Nüsschen anders, oft sehr eigenthümlich geformt. Samen meist ohne Eiweiß. — Die Asperifoliae, eine große Familie, sind vorzüglich in der gemäßigten Zone beider Hemisphären verbreitet; zwischen den Wendekreisen und in der kalten Zone kommen nur wenige Arten vor. Sie zeichnen sich durch Reichthum an schleimigen Stoffen aus.

Taf. 23, Fig. 1. Der Voretsch oder das Gurkenkraut (Borago officinalis) hat seinen zweiten Vulgarnamen deshalb erhalten, weil seine saftvollen Blätter zerrieben wie frische Gurken riechen und auch gurkenähnlich schmecken, weshalb dieselben auch bisweilen dem Salat beigemengt werden. Der Voretsch ist ein einjähriges, in Südeuropa wild wachsendes, großblättriges Kraut mit sehr rauhhaarigen Blättern und schönen azurblauen Sternblüthen, in deren Mitte die fünf aneinanderliegenden Staubbeutel mit den hornartigen Fortsätzen ihrer Filamente einen dunkelvioletten Kelch bilden, welcher von den weissen Gewölbschuppen umringt ist. (Abgeb. ein blühender Zweig in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., a ein Blumenkronenzipfel mit einer Gewölbschuppe und zwei Staubgefäßen, b der Schlund der Blumenkrone von unten gesehen, c Staubgefäß, d Nüsschen, vergr.)

Fig. 2. Die Alcanthawurzel (Alcanthaeae tinctoria), halbsträuchige Pflanze des Orients und Südeuropas, deren holziges Rhizom einen rothen Farbstoff (Alcanthaeae roth) enthält, welcher zu Schminkefabrikation und Färben benutzt wird. Blüten dunkelblau. (a die ganze Pflanze in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b Blüte von der Seite gesehen, c Nüsschen, vergr.)

Zu den Asperifolien gehören ferner von wildwachsenden einheimischen Pflanzen: das Bergfarnkraut (Myosotis palustris), das Lungenkraut (Pulmonaria officinalis), die Ochsenzunge (Achillea officinalis), die Hundszunge (Cynoglossum officinale), der Ackersteinfarn oder die Bauernschminke (Lithospermum arvense), das Weintell oder die Schwarzwurzel (Symphytum officinale) u. a. m.

Die andern Familien der Nuculiferen (z. B. die Globularien und Selaginellen) können hier nicht berücksichtigt werden.

VII. Ordnung der Lippenfrüchtigen Lippenblütler (Labialiflorae capsuliferae). Unterscheiden sich von den Pflanzen der vorhergehenden Ordnung besonders durch die Frucht, welche bei den meisten eine mehrsamige aufspringende Kapsel, sehr selten eine Beere ist. — Unter den hierher gehörigen Familien sind folgende vier die bemerkenswerthesten.

Fam. 1. Acanthaceen (Acanthaceae). Kräuter und Holzgewächse mit knotig gegliederten Stengeln, gegen- oder röhrenständigen Blättern und achsel- oder endständigen Zwitterblüthen, welche von einem größeren und zwei kleineren Deckblättern gestützt und in Aehren, Trauben oder Büschel gestellt sind. Kelch fünfblätterig, Blumenkrone röhrig, zwei- oder vierlappig. Staubgefäße vier, zweifächrig, nebst einem fünften rudimentären. Aus dem zweifächrigen Fruchtknoten entsteht eine zweifächrige, einsamige, elastisch mit zwei Klappen aufspringende Kapsel. Samen ohne Eiweiß. — Die Acanthaceen bewohnen fast ausschließlich die Tropenländer, nur wenige Arten kommen in der subtroptischen und wärmern gemäßigten Zone vor. Zu letztern gehört der auf Taf. 23, Fig. 3 stark verkleinert ab-



bildete weichblättrige *Acanthus* (*Acanthus mollis*), eine sehr stattliche, in den mediterranen Ländern heimische saftvolle Staude mit röhrlisch-weißen Blumen, deren schöngestaltete, oft zwei Fuß hoch werdende Wurzelblätter den Bildhauern des antiken Griechenland das Vorbild zu der Blätterverzierung des ionischen Säulencapitals gegeben haben. (a Blüte von der Seite gesehen in nat. Gr., b dieselbe von vorn, verfl.)

Den Acanthaceen verwandte Gewächse sind die nur in der heißen Zone vorkommenden Gesneraceen, zu welchen viele schöne Zierpflanzen unserer Warmhäuser und Zimmer gehören, z. B. die formen- und farbenreichen Arten von *Gloxinia*, *Achimenes*, *Aeschynanthus*, *Gesnera* u. a.

Fam. 2. *Bignoniaceen* (*Bignoniaceae*), Bäume und Sträucher häufig mit schlingenden und windenden Stämmen und Aesten, selten Kräuter. Blätter gegen- oder quirlständig, einfach oder zusammengesetzt (gefingert oder gefiedert, oft mehrfach gefiedert), meist ranfentragend. Blüten zwittrig, in gipfel- oder achselständigen Aehren, Trauben, Rispen, seltener einzeln, mit zweilippigem oder zweitheiligem Kelch, kurzröhriger zweilippig-trichterförmiger fünfklappiger Blumenkrone, fünf Staubgefäßen, von denen eins meist steril, und einem freien Stempel. Biersamige, ein- bis vierfächerige, mit Klappen aufspringende Kapsel. Samen zusammengebrückt, meist breit geflügelt, ohne Eingeiß. — Die Bignoniaceen sind ausschließlich Tropengewächse und bilden mit ihren meist prächtig gefärbten Blumen eine charakteristische Zierde der tropischen Wälder. Die meisten wachsen in Amerika. Die artenreichsten Gattungen sind *Bignonia* (fast lauter Schlingsträucher), *Tecoma* und *Jacaranda*.

Taf. 23, Fig. 4. Der Carobenbaum (*Jacaranda tomentosa*), ein großer schönblaublauer Baum Brasiliens mit prächtigen violetten Blumen von 1½ Zoll Länge, soll einer der Bäume sein, von denen das Jacarandaholz (Palissanderholz der Franzosen) abstammt. So viel ist sicher, daß dieses geschätzte Möbelholz aus Brasilien kommt und das Holz von Bignoniaceen ist. (Abgeb. ein Zweig in ½ nat. Gr.) — Eine andere bemerkenswerthe Art ist der auch in Deutschland nicht selten angepflanzte Trompetenbaum (*Catalpa bignonioides*) aus dem subtropischen Nordamerika, ein stattlicher Baum mit großen herzförmigen Blättern und mächtigen Rispen weißer, gelb und roth gefleckter Glockenblumen mit zweilippigem Saume. Die Kapsel hat die Form einer langen Schote.

Fam. 3. *Wästenblättrige oder braunwurzartige Pflanzen* (*Personatae* oder *Scrophularineae*). Unterscheiden sich von den vorhergehenden Familien besonders durch den fleischigen Eingeißkörper ihrer Samen. Kräuter und Holzgewächse mit alternirenden, gegen- oder quirlständigen, einfachen, ganzen oder zertheilten Blättern, deren Stiel am Grunde bisweilen in einem nebenblattartigen Fortsatz erweitert ist. Blütenstand und Blütenbau ähnlich wie bei den Bignoniaceen, Blumenkrone meist zweilippig, oft nazirt (s. Taf. 4, Fig. 35) und am Grunde geornet. Staubgefäße meist vier, zweimächtig, bisweilen mit einem fünften sterilen, selten zwei. Frucht eine zweifächerige, mit Klappen, Zähnen oder Löchern aufspringende, viel-samige Kapsel, selten eine Beere. — Die Scrophularineen, die größte Familie dieser Ordnung, sind über die ganze Erde verbreitet, jedoch am häufigsten in der wärmern gemäßigten Zone beider Hemisphären. Diese Familie enthält zahlreiche Gift- und Arzneipflanzen, auch hat sie eine Menge schönblühender Ziergewächse geliefert.

Taf. 23, Fig. 5. Die Königsferze (*Verbascum*

*Thapsus*). Stattliche Staude mit einfachen, rechten Stengel, welcher sammt den aus ihm herablaufenden Blättern mit einem dicken, weißlichen Filz bedekt ist und in eine dicht zusammengedrängte Blütenende. (1—1½ Zoll breit) goldgelb, Staubgefäße von 1½ Zoll Länge, die drei kürzern weißwollig, der vier längere gelblich. Wächst an sonnigen, feuchten, weichen Mitteln- und Südeuropa. (Abgeb. ein Stengel in ½ nat. Gr., a Blüte in nat. Gr., b ein kürzerer, c ein längerer Stengel mit Kelch in nat. Gr.) — Häufiger findet man die formen und V. phlomoides an ähnlichen Orten. Von allen dreien werden die Blumen der beiden Blumen anderer Kräuter (Lungkraut, Schlüssel) zu sogenanntem „Brutheer“ oder „des dicken wolligen weichen Filzes werden auch „Wollkräuter“ genannt.

Fig. 6. Das Gnadenkraut (*Gnaphalium*) eine in Wassergräben, an Fluß- und in sumpfigen Wiesenstellen in Mittel- und Südeuropa wachsende, doch nicht häufige Gift- und Arzneipflanze mit gelben, weißgelben oder gelblich-weißen Blumen, welche einen viertheiligen Kelch haben und nur zwei Staubgefäße enthalten. (Abgeb. eine Pflanze in ½ nat. Gr., b, c Staubgefäße und hintere, d Stengel, e Blumenkrone in nat. Gr., vergl.)

Fig. 7. Der rothe Fingerhut (*Digitalis purpurea*) bekannte Gift-, Arznei- und Zierpflanze, welche in waldigen Bergen in Mittel- und Südeuropa massenhaft in Nadelwäldern des Oberlandes vorkommt. (Abgeb. eine Pflanze in ½ nat. Gr., a, b ganze Pflanze in nat. Gr., c Staubgefäß, vergl.; d Kelch und Stempel in nat. Gr., e Kapsel im Querschnitt, f Samen im Längsschnitt, vergl.)

Fig. 8. Das Sumpfläufelkraut (*Elephantopus palustris*), ein in Sümpfen, an überflutheten Stellen und Teichufern wachsendes Arznei- und Ziergewächs mit aufrechten, fleischigen Stengeln und Blättern und kleinen, weißen, in allen Theilen einer Pflanze vorhandenen, welche dem Rindvieh, wenn es die Pflanze frisst, giftig wirken sollen. (Abgeb. eine Pflanze in ½ nat. Gr., links oben der Kelch, geöffnet.) — In Wäldern auf feuchten Stellen, wo die Pflanze in großer Menge vorkommt, kommt ebenso häufig das um die Hölzer und Moos wachsende Waldläufelkraut (*Elephantopus scaber*) vor, welches ähnliche Eigenschaften besitzt. (Abgeb. eine Pflanze in ½ nat. Gr., vergl.)

Fig. 9. Der breitblättrige Ehrenpreis (*Veronica Teucrium*). Die artenreiche Gattung ist durch radförmige Blumenkrone und zweilippigen Saume und bloß zwei Staubgefäße durch eine zusammengebrückte am Grunde geornete Kapsel ausgezeichnet. Die Blüten stehen einzeln in den Blattwinkeln, oder in Aehren und Trauben, welche entweder aus den Achseln oder aus den Winkeln der oberen Blätter springen. Zu den Arten der letzteren gehört die hier in ½ nat. Gr. abgebildete *Veronica officinalis*, eine in Mittel- und Südeuropa vorkommende, officinell war. Sie hat, wie die meisten Arten, blaue Blumen und ist ausdauernd. (Abgeb. eine Pflanze in ½ nat. Gr., vergl.) — Verschiedene Arten von *Veronica* sind in Mitteleuropa und Asien mit

ngeln und langen blütenreichen endständigen Trau-  
(*V. longifolia*, *tubiflora*, *incana* u. a.) sind beliebte  
Pflanzen unserer Gärten geworden.

Zu den Personaten gehören ferner: das Garten-  
zenmaul (*Antirrhinum majus*), eine sehr häufig  
hier angebaute südeuropäische Pflanze mit großen  
purpurothen, weißen oder gefleckten Mästenblumen;  
Leintraut oder der Frauenflachs (*Linaria  
catenaria*), überall wildwachsend, mit großen gelben ge-  
meinen Mästenblumen; die verschiedenen in Wäldern,  
Wiesen und Aedern vorkommenden Arten von  
Nacht- oder Ruhweizen (*Melampyrum*), und von  
Hippertopf oder Pfennigkraut (*Rhinanthus*), die  
in feuchten Orten, Flussufern u. s. w. wachsende Braun-  
traut (*Scrophularia nodosa*), die als Pfierpfanz be-  
trachtet wird, und als Pfierpfanz (Arten von *Calceolaria*,  
mexicanische theils einjährige, theils Holzgewächse)  
viele andere exotische Pfierpflanzen des freien Lan-  
des und der Gewächshäuser.

Jam. 4. Sommerwurzartige (*Orobanchaceae*).  
Schmarogergewächse mit meist einfachen Stengeln, welche  
häufig oder fleischigen Schuppenblättern besetzt  
sind und meist in eine Aehre oder Traube von Zwi-  
terblüthen mit mehrblättrigem oder tief gespaltenem  
Kelch und röhrig-zweilippiger Blumentrone endigen.  
Staubgefäße vier, zweimächtig, Kapsel vielkammig, Samen  
klein, einseitig. Die Orobanchen ernähren sich  
von den Säften anderer Pflanzen, an deren Wurzeln  
sie sich anheften. Sie haben, wie alle echten  
Schmarogern, keine grüne, sondern bleich braun, röth-  
lich, bläulich u. s. w. gefärbte Stengel und Blätter  
und sind der Mehrzahl nach durch die gemäßigte Zone  
des nördlichen Halbkugels verbreitet.

Taf. 23, Fig. 10. Die röthliche Sommerwurz  
(*Orobancha rubens*), eine in Deutschland auf Kalk-  
steinen ziemlich verbreitete, auf blauem und gelbem  
grünlicher schmarogende Pflanze mit braunen Stengel  
und röthlichen Blüten. (Abgeb. die ganze Pflanze  
 $\frac{1}{2}$  nat. Gr., a Kelch mit Deckblättern und Stempel,  
b Blüthe.)

Fig. 11. Die Schuppenwurz (*Lathraea Squa-  
ria*), ein fleischiges, in schattigen Laubwäldern vor-  
kommendes, fast ganz unter dem abgefallenen Laub  
graben Gewächs, welches im ersten Frühling blüht  
in purpurne Blumen: in einseitigen mit häutigen  
bleichweißen Deckblättern dicht besetzten Aehren trägt.  
Stengel und Wurzelstock bleich, letzterer dicht mit  
fleischigen dachziegelständigen Schuppen besetzt. (Abgeb.  
die ganze Pflanze in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., a Blumentrone ge-  
öffnet, schwach vergr.; b Kelch mit der Kapsel, c diese  
in, e aufgesprungen, nat. Gr.; d Stempel, f Staub-  
gefäße, vergr.)

VIII. Ordnung der Röhrenblütler (*Tubiflorae*).  
Kräuter, Sträucher, Bäume mit meist alternirenden  
fadenförmigen nebenblattofen Blättern und mit gewöhnlich  
einfachen Zwitterblüthen, welche aus einem fünf-  
lappigen, selten fünfblätterigen Kelch und einer röhrigen,  
trichter-, gloden- oder tellerförmigen Blumentrone be-  
stehen, in deren Röhre die Staubgefäße (in der Regel  
6) eingefügt sind. Fruchtknoten oberständig mit  
einem Griffel; Frucht eine vielkammige Kapsel oder  
eine, selten eine Steinfrucht. Samen mit den Keim  
schließendem Eikeisphäer. — Die wichtigsten Gat-  
tungen sind folgende zwei:

Jam. 1. Windengewächse (*Convolvulaceae*).  
Kräuter oder Halbsträucher, oft mit Knollen und win-  
denden Stengeln, selten Sträucher oder Bäume, Blät-  
ter ganz oder gelappt, oft peil- oder spießförmig,  
in den Achseln einzeln oder in Trauben, Dolben, Ris-  
pen, mit Deckblättern, welche bisweilen dem Kelch an-

gewachsen sind; Kelch stehbleibend, meist getheilt,  
Blumentrone trichterförmig oder röhrig, vor dem Auf-  
blühen meist gefaltet; zusammengekehrt. Fruchtknoten  
auf hypogynischer netzartabsondernder Scheibe. Kapsel  
zwei- bis vierfächerig, mit ein- bis zweifachen Nadeln,  
bisweilen nicht aufspringend, trocken. — Die Winden-  
gewächse sind vorzüglich in der heißen, nur wenige in  
der gemäßigten Zone zu Hause. Sie enthalten fast  
alle einen milchigen Saft und in ihren Wurzeln und  
Knollen einen drastisch purgirenden wirksamen Stoff,  
weshalb einige zu Arzneipflanzen geworden sind. Zu  
diesen gehört die auf

Taf. 23, Fig. 14 abgebildete Jalape (*Ipomaea  
purga*), eine in feuchten Gebirgswäldern Mexicos  
wachsende Knollenpflanze mit prächtig purpurothen  
Trichterblüthen, deren schwarzbraune bis saftgroße  
Knollen einen heftig purgirend wirkenden Milchsaft  
enthalten. (Abgeb. ein Theil der blühenden Pflanze,  
a ein Knollen in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b Narbe vergr.,  
c Querschnitt des Knollens, vergr.) Verschiedene nord-  
 und südamerikanische, meist einjährige Arten der Gat-  
tung *Ipomaea* mit hochschlingenden Stengeln und  
prächtigen großen azurnen, blauen und violetten Blu-  
men werden als Trichterwinden in unsern Gärten  
angebaut. Dagegen gehört die ebenfalls sehr häufig  
gebaute, aus Südeuropa stammende dreifarbige  
Winde (*Blumen* groß, blau mit weißem Schlund und  
gelber Röhre) zur Gattung *Convolvulus* (*C. tricolor*).  
Eine Art dieser Gattung ist auch die überall als Un-  
kraut unter Getreide und an wüsten Plätzen wachsende  
Kerwinde (*C. arvensis*). Zu den Windengewächsen  
gehört endlich auch die in den Tropenländern und auch  
hin und wieder in Südeuropa angebaute Batate  
(*Batatas edulis*), deren längliche mehrfache zuckerhaltige  
Knollen gekocht wie Kartoffeln genossen werden.

Eine mit den Convolvulaceen verwandte kleine  
Familie ist die der Flachsseideartigen (*Cuscutaceae*),  
welche aus lauter Schmarogergewächsen mit fadenfö-  
rmigen bleichen blattofen Stengeln und in Knäueln  
stehenden kleinen fleischigen Blüthen von meist bleicher  
Farbe besteht. Eine durch ganz Europa verbreitete  
Art, die gemeine Flachsseide (*Cuscuta Epilinum*),  
kommt häufig auf Flachseldern vor, wo sie durch Um-  
schlingen und Ausfüllen der Flachsblätter bisweilen  
nicht unbeträchtlichen Schaden verursacht.

Jam. 2. Tollkrautartige (*Solanaceae*). Kräuter  
und Holzgewächse mit wässerigem Saft, abwechselnden  
nebenblattofen einfachen ganzen oder fiedertheiligen  
Blättern und meist regelmäßigen Zwitterblüthen, welche  
bald in begrenzte Inflorescenzen (Scheinolden, Widels-  
trauben, Rispen), bald einzeln gestellt sind. Letztere,  
wie auch ganze Blütenstände sind oft seitenständig und  
zwar bald neben dem Blattwinkel stehend, bald durch  
Scheinachsenbildung blattgegenständig. Kelch meist steh-  
bleibend, oft nach der Blüthezeit sich vergrößernd und  
dann später die Frucht mehr oder weniger umhüllend,  
Blumentrone rad-, gloden-, trichter- oder präsentir-  
tellerförmig. Staubbeutel mit Spalten oder einem  
endständigen Loch aufspringend, bisweilen zusammen-  
geengt oder verklebt (scheinbar einblüthig). Stengel  
am Grunde häufig von einem unterständigen Diskus  
umgeben, aus zwei Fruchtblättern gebildet, wirklich  
oder scheinbar vierfächerig, mit centram ofters gabel-  
theiligen Samenträger, viele Samenknospen enthaltend.  
Frucht eine zwei- bis vierfächerige Kapsel oder Beere,  
erstere verschieden aufspringend; Samen zahlreich mit  
hornigem Eikeis und einwärts gekrümmtem oder geboge-  
nem Keim. — Die Solanaceen sind zwar über die ganze  
Erde verbreitet, doch vorzugsweise in den Tropenlän-  
dern, besonders Amerikas heimisch. Dort kommen viele





stengelloses Knollengewächs von giftigen, aber mit schön purpurrothen, sehr wohlriechenden von eigenthümlichem Baue, wächst in den Alpen und Voralpen sehr häufig eine beliebte Topfpflanze geworden. ganze Pflanze in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., a Schlundblumentrone mit Staubgefäßen, b, c Staubstempel mit Kelch, e aufgesprungene Kapsel, u im Längsschnitt, mit dem Samenträger,

Enzianartige (Gentianaceae). Unter von den Primulaceen, mit denen sie habet manche Aehnlichkeit haben, vorzüglich eiförmige Narbe des Griffels und die zwar rige aber mit zwei Klappen (selten gar ingende Kapsel mit randständigen Samen: Kräuter und Stauden, selten Sträucher, in bitterm Saft, gegen- oder rosettenförmig abwechselnd gestellten nebenblattlosen, ganzrandigen Blättern und meist endständigen Trugdolden oder einzeln stehenden Kelch meist frei und stehensbleibend, Blumen- gloden: oder trichterförmig, Staubgefäße Verbreitung wie bei den Primulaceen.

Fig. 7. Der gelbe Enzian (*Gentiana lutea*), an kräuterreichen Stellen der oberer Hochgebirge Mitteleuropas wachsende großen der Länge nach gefalteten Grund: einem einfachen Stengel, welcher in eine raube gelber Blüten endigt, steht bei allen hnerm als Heilpflanze in großem Ansehen. der fleischige Wurzelstock (*Radix Gentianae*). Die Blütenquirle sind von je zwei gegenlätttern umhüllt und voneinander getrennt. Blütenraube in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b Grund: Theil des Wurzelstocks, sehr verkl.)

Der blaue Wiesenenzian (*Gentiana lutea*), eine auf sumpfigen moorigen Wiesen Europa vorkommende Pflanze mit einfachen Blättern und großen blauen Trich: war ehemals auch officinell. (Abgeb. die Stengels in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr.)

Gentianeen gehört auch das heilkräftige Aidenkraut (*Erythraea Centaureum*) und der Fieberklee (*Menyanthes trifoliata*). In Sümpfen wachsend, ist durch die dreilättter und die weißen Blüten mit zierlich Blumenfröhenlappen ausgezeichnet.

Apocynen (Apocynaceae). Bäume, seltener Kräuter mit meist milchigem Saft, meist randständigen, nebenblattlosen, einfachen Blättern und meist trugdoldig angeordneten einzeln stehenden regelmäßigen Zwitter: taubbeutel der Narbe anhängend, mit oft i geformtem Mittelband. Fruchtnoten aus: ten oder verwachsenen Blättern bestehend, beide verbindenden Griffel, welcher nach ordigt und sonst verschiednenartig gestaltet öblich mit einer kurz zweispaltigen Narbe ucht selten kapsel: oder beerenartig, gewöhn: ei getrennten Balgfrüchten bestehend, welche it einem Haarschopf versehene, eiweißhaltige isstehen. — Die Apocynen gehören fast ch den Tropenländern an, nur wenige kom: er gemäßigten Zone vor. Der Milchsaft giftig.

Fig. 9. Der Oleander (*Nerium Oleander*), immergrün, bei uns allgemein als Topfpflan: zogener Strauch des südlichen Europa und Afrika, wo er gleich unsern Weiden an

Stäusen in Menge wächst. Die großen rosenrothen (bisweilen weißen) Blumen hauchen einen starken betäubend (narkotisch) wirkenden Wohlgeruch aus, der Milchsaft ist scharf giftig. (Abgeb. eine Zweigspitze in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., a Stempel, b Staubgefäße, c Samen, vergl.)

Fig. 10. Das Winter: oder Sinngrün (*Vincetoxicum*), immergrünes Holzgewächs mit krautigen kriechenden, rautenförmigen Stengeln, lederartigen Blättern und im Frühling sich entwickelnden, einzelnstehenden, zarten blauen Blumen, wächst in Mitteleuropa auf steinigem Boden unter Gebüsch und in Wäldern und wird häufig als Zierpflanze in Gärten und auf Gräbern cultivirt. Ist als herba *Pervinae officinell*. (a die ganze Pflanze in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b Blüte im Längsschnitt in nat. Gr., c Staubgefäß, d Stempel, e Frucht, vergl.)

Fam. 4. Schwalbenwurzähnliche (Asclepiadeae). Unterscheiden sich von den Apocynen, denen sie am nächsten stehen, durch die zu wachsförmigen Pollinarien vereinigten Pollenkörner und den scheibenartigen voluminösen Narbentrichter, welcher die Spigen der beiden vollkommen getrennten aus je einem Carpellarblatt bestehenden Stempel verbindet. An den fünf Ecken des Narbenträgers sind an Drüsen (*retinacula*) je zwei gestielte Pollinarien angeheftet, die zu zwei benachbarten zweifächerigen Staubbeuteln gehören, deren Mittelband nach oben in einen Fortsatz ausläuft. Staubfäden in eine Röhre verwachsen, Schlund der Blumentrone mit einem Kranz Nebentränenblätter versehen. Frucht und Samen wie bei den Apocynen. — Die Asclepiadeen enthalten meist auch einen weißen, oft giftigen Milchsaft und sind zum Theil Sträucher und Kräuter mit schlingenden Ästen. Sie wachsen ebenfalls vorzugsweise in den warmen Ländern.

Taf. 24, Fig. 11. Die Seidenpflanze (*Asclepias syriaca*). Schöne, im Orient heimische, in unsern Gärten häufig zur Zierde gebaute Staude mit bis mannshoch werdenden Stengeln und hellpurpurrothen Blüten in dichter endständiger Dolden. (Abgeb. Ende des Stengels in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., a Blüte von der Seite in nat. Gr., b Staubgefäße, c Same, vergl.) — Zu den Asclepiadeen gehört auch die beliebte Wachs: oder Porzellanblume (*Hoya carnosa*) aus dem tropischen Asien.

Den Asclepiadeen und Apocynen verwandt ist die ganz tropische Familie der Loganiaceen, zu denen der Krähenaugenbaum (*Strychnos Nux vomica*) gehört, dessen Samen die äußerst giftigen Brechnüsse oder Krähenaugen (*nucis vomicae*) sind. Der Saft verschiedener anderer Strychnosarten wird von den Indianern Guianas zur Bereitung des berüchtigten Curare: Pfeilgiftes mit verwendet.

Fam. 5. Delbäumgewächse (Oleaceae). Holzgewächse mit wässerigem Saft, gegenständigen einfachen, ganzrandigen, nebenblattlosen Blättern, in Trauben oder Rispen gestellten regelmäßigen Zwitter: blüthen, welche aus einem vierpaltigen stehensbleibenden Kelch, einer viertheiligen trichter: präsentirteller: oder glodenförmigen Blumentrone, zwei Staubgefäßen und einem Stempel bestehen und eine Steinfrucht, Beere oder Kapsel zur Frucht haben. Samen wenige, mit Eiweiß. — Bewohnen die gemäßigte und tropische Zone.

Taf. 24, Fig. 12. Der gemeine Delbaum, Olivenbaum (*Olea europaea*), ein in allen am Mitteländischen Meer liegenden Ländern, besonders in Griechenland, Italien, Südfrankreich, Spanien und Portugal allgemein cultivirter immergrüner Baum von zweifelhaftem Vaterlande, aus dessen kleinen gelblich: weißen Blüten sich kirschen: oder pflaumenförmige, reif

schwarze Steinfrüchte entwickeln, deren saftiges grünes Fleisch das bekannte Baum- oder Olivenöl liefert. Wird sehr alt, liefert ein schönes sehr dauerhaftes Nutzholz. (Abgeb. ein blühender und ein fruchttragender Zweig in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., a Blüte von oben, b Kelch mit Stempel, verg.; c Frucht in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., d im Querschnitt.) — Zu den Oleaceen gehören der Liguster (*Ligustrum vulgare*) und die verschiedenen überall als Ziergehölze angebauten Springen oder türkische Hollunder (*Syringa vulgaris*, *persica*, *chinensis*).

Fam. 6. Jasminartige (*Jasminaceae*). Unterscheiden sich von den Oleaceen durch den fünfspaltigen Kelch und die fünfklappige Blumenkrone, sowie durch die andere Richtung der Samen und Beschaffenheit des Sameneiweißes. Blätter meist zusammengekehrt (dreizählig oder unpaarig gefiedert), selten einfach. Sonst stimmen sie mit den Oleaceen überein. Sie sind der Mehrzahl nach im tropischen Asien zu Hause.

Zaf. 24, Fig. 13. Der echte Jasmin (*Jasminum officinale*), ein aufrechter Strauch mit wohlriechenden weißen Blumen, war früher officinell, wird häufig in Gewächshäusern gezogen. Der gemeine oder unedle Jasmin gehört zu einer ganz andern Familie (s. *Saxifragaceae*). (Abgeb. ein Blütenzweig in nat. Gr.)

Fam. 7. Ebenholzartige (*Ebenaceae*). Immergrüne Bäume und Sträucher der tropischen, subtropischen und wärmern gemäßigten Zone mit hartem schweren Holz, abwechselnden nebenblattlosen einfachen ganzrandigen Blättern, meist eingeschlechtigen Blüten und beeren- oder kapselartigen, meist nur wenige einweissbaltigen Samen umschließenden Früchten.

Zaf. 24, Fig. 14. Die Dattelpflaume (*Diospyros Lotus*), ein baumartig werdender, in Nordafrika und dem südlichsten Europa vorkommender Strauch, mit sauren doch eßbaren Beeren, wird für den Lotos der Topographen Homer's gehalten. (a männlicher Zweig in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b weibliche, c männliche Blumenkrone, aufgeschnitten, verg.) — D. Ebenum, Ebonaster, Melanoxylon und andere in Ostafrika und Ostindien einheimische Arten liefern das Ebenholz.

Fam. 8. Sapotaceen (*Sapotaceae*). Immergrüne Bäume und Sträucher der Tropengegenden mit weichem, Milchsaft enthaltendem Holze, abwechselnden nebenblattlosen einfachen Blättern, achselständigen regelmäßigen Zwitterblüten und mehrfächerigen wenigsamigen Beeren. Samen eiweißhaltig.

Zaf. 24, Fig. 15. Der Guttaperchabaum (*Isopandra Gutta*), auf Borneo und Celebes zu Hause, ein großer schöner Baum mit weißen Blüten, liefert die bekannte Guttapercha, welche aus dem Milchsaft gewonnen wird. (Abgeb. ein blühender Zweig in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., a eine geschlossene, d eine geöffnete Blüte, e Stempel, verg.; c junge Frucht, b Frucht im Querschnitt, verg.)

Fam. 9. Styraceen (*Styraceae*). Blatte oder mit Sternhaaren bedeckte Bäume und Sträucher des tropischen Asien und America, zum Theil auch in der wärmern gemäßigten Zone vorkommend, mit abwechselnden nebenblattlosen einfachen ganzrandigen oder gesägten Blättern und regelmäßigen einzelnstehenden oder traubig angeordneten, blattwinkelständigen Blüten, aus denen sich Steinfrüchte mit eiweißhaltigen Samen entwickeln. Alle besitzen aromatische Benzoesäure enthaltende Harze.

Zaf. 24, Fig. 16. Der Benzoebaum (*Syrax Benzoin* oder *Benzoin officinale*), ein auf den Molukken heimischer Baum, liefert das wohlriechende Benzoeharz. (Abgeb. ein blühender Zweig, stark vergrößert; a Blüte, b Frucht in nat. Gr.)

### Dritte Unterklasse.

Dialypetalae, Dicotyledonem mit getrenntblättriger Blumenkrone.

(Zafel 25–30.)

1. Ordnung der Schirmträger (*Umbellales*). Gewächse mit schirmförmig angeordneten (in Dolden, Trugbolben, Köpfchen gestellten) Blüten, welche einem unterständigen Fruchtknoten, einem eigentlichen rubimentären Kelch, 4, 5, 10 oder mehr aus eipari- oder epigynischen Scheibe eingefügten Nebenblättern und Staubgefäßen und ein oder zwei Fruchtblättern bestehen. Frucht eine Beere, Stein- oder Saftfrucht. Samen mit dem Keim umschließendem Eiweiß.

Fam. 1. Hartriegelartige (*Cornaceae*). Bäume und Sträucher, seltener Kräuter, mit gegenständig nebenblattlosen, einfachen, ganzrandigen Blättern, regelmäßig, in von Hüllblättern umgebene oder aus Köpfchen und Trugbolben gestellten Zwitter- oder eingeschlechtigen Blüten, vier Kelchzähnen, Blumenthron und Staubgefäßen und meist beerenförmigen Früchten mit zwei- bis dreifächerigem Kern. — Gewächse der gemäßigten und kalten Zone der nördlichen Hemisphäre.

Zaf. 25, Fig. 2. Der Kornelkirschenbaum (*Cornus mas*), ein in Mittel- und Südeuropa heimischer häufig als Zier- und Obstbaum angebautes, gewöhnlich strauchförmiges Holzgewächs, welches seine gelben, in verbüllte Köpfchen gestellte Blüten im Frühjahr vor dem Laubaussbruch entwickelt und welche zolllange im Herbst reisende und dann kornelartige Steinfrüchte mit säuerlich-süßem genießbarem Fleische hervorbringt. Das sehr harte Holz wird zu dem sehr ähnlichen des überall in Wäldern vorkommenden Hartriegels (*C. sanguinea*: Blätter in flachen zusammengelegten nach dem Laubaussbruch aufblühenden Trugbolben, Steinfrüchte beerenförmig schwarz) von den Uhrmachern zum hölzernen Kern der Wanduhren sehr gesucht. (a Zweig mit zwei Blütenköpfchen, b Blüte, verg.; c Frucht, vergrößert.)

Fig. 3. Der schwedische Hartriegel (*Cornus suecica*), eine niedliche kleine, in Nordeuropa und noch in Norddeutschland vorkommende krautartige Pflanze mit kriechendem Rhizom, besitzt schwarzrothe von weißen rothgeaderten Hüllblättern umgebene Blüten und kugelige schwarzrothe süße Früchte. (a junge Pflanze in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b Blüte, c Kelch mit Stempel, verg.; d Frucht in nat. Gr., e Frucht im Querschnitt, verg.)

Fam. 2. Araliaceen (*Araliaceae*). Bäume und Sträucher, selten pereinirende Kräuter, erstere oft fleischig, wol auch kletternden Kletterwurzeln und wickelnden Aclsen. Blätter abwechselnd, selten gegenständig, ohne Nebenblätter, meist gefiedert, mit lappig gelappter Fläche, oft auch vielfach zusammengekehrt; Blätter regelmäßig, zwitterlich oder einseitig in nackten oder verhüllten Köpfchen, Dolden, Trugbolben, mit ganzem oder gezähntem Kelchsaum, meist zehn und mehr Staubgefäßen und Blumenblättern mit einem Griffel. Frucht beerenartig, selten trocken, mit 2, 4, 5, 7, 8, 12 Fächern und Samen. — Gewächse der tropischen und subtropischen Zone, einige auch der gemäßigten Nordamerika, Nordasien und Europa.

Zaf. 25, Fig. 1. Der Epheu (*Hedera Helix*), der einzige Repräsentant der Araliaceen in Europa, ist ein immergrüner Kletterer Strauch, welcher ein sehr hohes Alter erreicht und bekanntlich an schattigen Mauern, Felsen und Baumstämmen emporklettert und selbst ganz überzieht. Nur alle Pflanzen blühen, und haben an den blüthentragenden Zweigen ungelappte, zeh-

nlatt ähnlich geformte Blätter. Blüten grünlich, rein schwarz. Das Holz der alten bisweilen über sechs l starken Stämme ist sehr fein, hart und schwer, bräunlicher Farbe. (a blühender Zweig in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b Blüte, c Staubgefäße und Stempel, vergr.; e Beere in nat. Gr., f Steinern, vergr.) — Aus dem Mart einer in Japan und China vorkommenden baumartigen Araliacee (*Aralia papyrifera*) rten die Japanesen und Chinesen ihr berühmtes denpapier.

jam. 3. Doldengewächse (Umbelliferae). Kräuter, selten Halbsträucher und Sträucher, erstere mit tigen, oft gestreiften oder gefurchten, zwischen den sten hohlen Stengeln und Aesten. Blätter ab: hselnd mit scheibigem, stengelumfassendem Stiel (Blatt: scheide oft bauchig aufgetrieben, weißhäutig, bis: sen sehr groß), einfach, aber selten ganz, meist et: oder handförmig gelappt, zertheilt, zer schnitten, scheinbar vielfach zusammengekehrt. Blüten meist lndlich und zwittrlich, klein, gewöhnlich in eine ummengesetzte Dölse gestellt, ausnahmsweise in igelnden Köpfchen, Ändel geordnet; Blütenstände oder ohne Hüllblätter. Fruchtknoten mit dem i Griffel tragenden Griffelpolster bedeckt, am Rande f Kelchzähne oder einen schmalen Kelchsaum tragend, menblätter und Staubgefäße fünf, miteinander vechselnd. Frucht bei der Reife vertical in zwei ften (Theilfrüchte, Maricarpien) spaltend, welche öchlich von einem nach oben in zwei Schenkel ge: ltenen Stiel (Fruchträger, carpophorum) getragen enen (Taf. 25, Fig. 4 d). Jede Theilfrucht ist an: nach außen gekerbten Fläche (Rüdenfläche) mit ni Haupt- und vier dazwischen befindlichen Nebenrip: n (juga primaria und secundaria) versehen (Fig. 4 e), die bald bloß als Linien oder erhabene Streifen, te als häutige Flügel (z. B. die Nebenrippen bei serpillum, Fig. 11), bald als Stachelreihen (Fig. 4) ausgebildet erscheinen. Innere Fläche (Nath) et jeden Theilfrucht meist eben. Hier und unter i Zwischenräumen der Rippen (in den Thälchen) mit matischen Gummibarz erfüllte Kanäle (Deltstreifen, lac), welche als matt glänzende dunkle Striche durch Fruchthand hindurchschimmern (Fig. 5 g, 8 d). de Theilfrucht enthält einen Samen mit großem reißkörper und wird von einer Hälfte des Griffel: sters getrennt. — Die Doldengewächse bilden eine größten und natürlichsten Familien und sind über ganze Erde verbreitet, jedoch in der gemäßigten ne der nördlichen Halbkugel am häufigsten. Sie fallen nach Decandolle in 3 Unterfamilien und Gruppen. Neben den in den Früchten niemals lenden, bisweilen auch in andern Theilen enthaltenen gummiartigen kommen bei einigen giftige Alkaloide, andern und zwar in den Wurzeln oder Rhizo: n reichliche Mengen von Stärke und nahrhaftem kleim vor.

Taf. 25, Fig. 4. Der gemeine Fenchel (*Foeni: cum vulgare*), eine zweijährige in Südeuropa be: liche, in Deutschland oft angebaute Pflanze mit hell: lnen in haarförmige Zipfel zerschnittenen Blättern d gelben Blüten, deren Stengel bisweilen Mann: s erreicht. Die graugelben, eigentümlich süßlich würzhaft schmeckenden und riechenden Früchte werden als Gewürz und zu Heilzwecken (Theen, Wässern) ngt. (a Stengelzipfel, b Wurzel in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., Blüte, dreimal vergr.; d aufgesprungene Frucht drei: al., e Querschnitt durch die eine Hälfte, fünfmal rgr.) — Dem Fenchel ähnlich ist der Dill (*Anethum rveolens*), von jenem durch die ringsherum schmal flügelte Frucht unterschieden.

Fig. 5. Der Wasserschierling (*Cicuta virosa*), eine in fast ganz Europa in Teichen, Wassergräben und Sümpfen wachsende Staube mit rübenförmigem fleischi: gen, inwendig gefächert hohlem Rhizom, didem bläulich bedusteten Stengel, runden hohlen Blattstielen, doppelt: fiederschnittigen Blättern, weißen Blüten und länglichen gerippten Früchten. Die grundständigen Blätter sind sehr groß, oft gegen zwei Fuß lang. Die ganze Pflanze ist sehr giftig, namentlich aber der gelbliche süße Schleim der Röhre des Wurzelstod, welcher angeblich zur Ve: reitung des berüchtigten Schierlingstranks der alten Griechen verwendet worden sein soll. (a blühender Stengeltheil, b grundständiges Blatt, c Wurzelstod, sentrecht durchschnitten, in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr.; d Blüte, e junger Fruchtknoten, viermal vergr.; f aufgesprungene Frucht in nat. Gr., g Querschnitt dreimal vergr.)

Fig. 6. Der Gartenschierling, die Weiße oder Hundspetersilie (*Aethusa Cynapium*), gemeines Unkraut, auf Gartenbeeten, Schutt, am Wegen wachsend, ist eine sehr giftige Pflanze, welche um so gefährlicher werden kann, als sie oft unter der Petersilie wächst und mit dieser dann leicht verwechselt wird. Der Gartenschierling, eine einjährige Pflanze, unterscheidet sich von der stets zweijährigen Petersilie durch die feiner zertheilten, glänzend dunkelgrünen Blätter, welche zwischen den Fingern gerieben einen knoblauchartigen Geruch entwickeln, sonst geruchlos sind, durch die weißen Blüten und die nur zur Hälfte ausgebildeten aus drei herabhängenden linealen Blättchen bestehenden Hüllchen unter jedem Doldchen. (a Blütenzweig, Blatt und Wurzel in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b Blüte, c junge Frucht, dreimal vergr.; d aufspringende Frucht, e Theilfrucht im Querschnitt, stärker vergr.)

Fig. 9. Der gefleckte Schierling (*Conium maculatum*), eine zweijährige, an feuchten Orten unter Gebüsch, auch auf humosem Boden an Heden, auf Schutt u. s. w. in fast ganz Europa vorkommende, ebenfalls sehr giftige Pflanze ist an den dunkelblut: rothen Flecken des gefurchten Stengels und der Aeste und namentlich an den wellig gekerbten Rippen der fugeilig-eisförmigen Früchte zu erkennen. Die Stengel werden bis manns hoch, die Blätter sind dreifach fieders: schnittig, bisweilen fein zertheilt, die Blüten weiß, die Dolden mit Haupt- und Nebenrüben versehen. Ist zugleich eine heilkräftige Arzneipflanze. (a, b Stengel: stöcke in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., c Wurzel, verll.; d Frucht, doppelt vergr.; e Querschnitt einer Theilfrucht, dreimal vergr.) — Sehr häufig werden der zwiebelige Kälberkropf (*Chacrophylum bulbosum*), eine un: schädliche Pflanze, deren fleischige Wurzel neuerdings durch die Cultur zu einer wohl schmeckenden Rabe (Rörbelskrübe) geworden ist, und der Taumel-Kälber: tropf (*Chaer. temulum*), eine allerdings auch giftige Pflanze, wegen der rothen Flecken ihrer Stengel für den Schierling gehalten. Beide unterscheiden sich durch die langgestreckten glatten Früchte.

Fig. 7. Der Anis (*Pimpinella Anisum*), einjährige, häufig im kleinen angebaute, im Orient heimische weißblühende Pflanze, deren aromatisch-süß schmeckenden graugrünen Früchte als Gewürz und Arzneimittel gebraucht werden. (a ganze Pflanze in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b Blüte, c Frucht, d dieselbe im Querschnitt, sechs mal vergr.) — Mit dem Anis verwandt ist der überall auf trockenen Wiesen wachsende Bibernell (*P. Saxi: fraga*), welcher sich durch die ausdauernde Wurzel, die nicht dreitheilige, sondern fiederteilige Grundblätter und die nicht süßen Früchte von der vorigen Art un: terscheidet.

Fig. 8. Der Stinkasant (*Narthex Asa foetida*) Das unter dem Namen Mastötida oder Teufelsdreck



bekannte abfichtlich stinkende Gummiharz wird durch verschiedene Doldengewächse der zwischen dem Kaspischen Meer, Aralsee und Persien befindlichen Wästen producirt, unter denen *Scorodosma foetidum* und die abgebildete Pflanze die Hauptrolle spielen. Beide sind höchst stattliche, oft über mannshohe Stauden mit gewaltigen fleischigen Rhizomen, aus deren stinkendem Milchsaft das genannte Gummiharz vorzugsweise gewonnen wird. *Scorodosma* hat eingeschlechtige, Narthex dagegen Zwitterblüten von gelblicher Farbe. (a die ganze Pflanze, sehr verkleinert; b ein Theil des Stengels in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., c Blüte, d junge Frucht, vergr.; e Querschnitt durch die Frucht, stärker vergr.)

Fig. 10. Die Mohrrübe oder Möhre (*Daucus Carota*), bekannte, allgemein angebaute Nährpflanze, welche auch überall auf Aedern, bebautem Boden, Schutz wild wächst (die wilde Pflanze hat eine schwächere holzige Wurzel), und sich durch fiederpalartige Hüllblättchen und weichfleischige Früchte auszeichnet. Man baut sie in vielen Varietäten und Sorten. (a blüthentragender Stengeltheil, b Wurzel mit Grundblättern, c ein Theil der Wurzel in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., d eine halbe Frucht, f eine querdurchschnittene Frucht: Hälfte, g eine Blüte, viermal vergr.; e der Fruchtträger, dreimal vergr.)

Fig. 11. Frucht des breitblättrigen Lastertrautes (*Laserpitium latifolium*), einer perennirenden, in Laubwäldern Mittelrusslands wachsenden, früher officinellen Pflanze, die sich durch die in breite Flügel ausgebreiteten Nebenrippen der Früchtchen auszeichnet (Fig. viermal vergr.).

Zu den Doldengewächsen gehören ferner die Petersilie (*Petroselinum sativum*), der Sellerie (*Apium graveolens*), der Koriander (*Coriandrum sativum*), der Pastinak (*Pastinaca sativa*), die Zunderwurzel (*Sium Sisaron*), der Kümmel (*Carum Carvi*), die Engelwurz (*Archangelica officinale*), das Liebstöckel (*Levisticum officinale*), der Kerbel (*Anthriscus Cerefolium*) u. a. m.

II. Ordnung der Gehörntfrüchtigen (*Corniculatae*). Früchte (Kapseln oder Beeren) von den stehbleibenden oft verhärteten Griffeln gekrönt, Fruchtknoten halb- oder ganz unterständig oder auch ganz oberständig, Samen mit fleischigem, den Keim umschließendem Eiweiß. — Holzgewächse und Kräuter mit meist nebenblattlosen abwechselnden, seltener gegenständigen, einfachen oder fiederförmig zusammengefügten Blättern und regelmäßigen Zwitterblüten.

Hierher gehören die Familien der Steinbrechgewächse (*Saxifragaceae*), Pfeifenstrauchartigen (*Philadelphaceae*) und Johannisbeerartigen (*Rubiaceae*). Die beiden erstern haben eine verschiedengebaute mehrfrüchtige Kapsel, die letztern eine mehrsamige breierfüllte Beere zur Frucht. Zu den Saxifragen gehört die auf

Taf. 25, Fig. 12 in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr. abgebildete eichenblättrige Hortensie (*Hydrangea quercifolia*), ein in Gärten eingepflanzter nordamerikanischer Strauch, der sich durch seine weißen Blumen und durch die fiederpalartigen Blätter von der bekannten aus China und Japan eingeführten gemeinen oder Gartenhortensie (*Hydrangea hortensis*) unterscheidet. Bei allen Arten von Hydrangeen kommen zweierlei Blüten in den schirmförmigen Trugdolden vor, kleine fruchtbare Zwitterblüten mit zehn Staubgefäßen und fünf Blumenblättern (Fig. 12 a vergr., b Stempel im senkrechten Durchschnitt, stark vergr.), und große geschlechtslose mit vierlappigem corollinischen Kelchrande.

Zu der Familie der Philadelphaceen gehört der S. 62 erwähnte unechte Jasmin (*Philadelphus coronarius*

und *grandiflorus*). Alle Pfeifensträucher haben gegenständige Blätter, vier Blumenblätter und viele Staubgefäße.

Fig. 15. Die gemeine Johannisbeere (*Rubrum*), bekannt, überall angepflanzt, in Europa hier und da in Wäldern (ob wirklich nicht) vorkommender Strauch mit schlaf berechnenden lodern Trauben grünlischer Blüten, aus denen bald roth, bald fleischroth, bald weiß gefärbte Beeren entstehen. (a blühender Zweig, b Fruchttraube in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., c Blüte, d Staubgefäß, e Stempel, f Beere im Durchschnitt, nat. Gr.; g Samen im Längsschnitt, vergr.) — Zu der Gattung *Ribes* gehören ferner: die schwarze Johannisbeere (*R. nigrum*), ein inumpigen Wäldern des nördlichen Mitteleuropas wild wachsender und auch oft in angebaute Strauch mit bisamartig trufeligen eigentümlich aromatisch schmeckenden schwarzen Beeren und der Stachelbeerstrauch (*Ribes Grossularia*), welcher bekanntlich einzeln stehende Blüten und Beeren trägt und mit Stacheln bewaffnet ist.

III. Ordnung der saftvollen Pflanzen (*Succulentae*). Kräuter und Holzgewächse mit meist kleinen saftvollen Blättern, oft auch Stämmen und Zweigen mit meist regelmäßigen Zwitterblüten, welche mit dem oft fleischigen Blütenboden verwachsen und blättrigen Kelch, drei bis viele Blumenblätter und Staubgefäße und einen oder mehrere Stempel aus den Kapseln, Balgfrüchte oder Beeren hervorgehen.

Fam. 1. Dickblättrige (*Crossulaceae*). Kräuter und Sträucher mit zerstreuten, bisweilen gegenständig stehenden, meist einfachen, gewöhnlich ganzrandigen Blättern und meist in Trauben oder Trugdolden stehenden zwitterlichen selten eingeschlechtigen Blüten, welche meist fünf Kelchblumenblätter und Staubgefäße, sowie 10 Staubgefäße selten mehr als (bis 20) besitzen und vielstämige meist getrennte, oft in eine mehrfächerige Kapsel vereinigte Balgfrüchte hervorbringen. Keim im Eiweiß eingeschlossen. — *Crossulaceae* sind über die gemäßigten und subpolaren Zone beider Hemisphären verbreitet und bekunden Cap der guten Hoffnung und auf den Canarischen Inseln reichlich vertreten.

Taf. 25, Fig. 13. Die gemeine Fetthenne (*Sedum Telephium*). Die artenreiche Gattung zerfällt in Arten mit kleinen schmalen (lineal-lanzettlichen, zugespitzten) und mit großen breiten Blättern. Erstere, welche meist viele sterile Stempel neben den verlängerten blüthentragenden hervorgehoben werden, „Mauerpfeffer“ genannt (die verbreitetste der gemeine Mauerpfeffer, *Sedum acre*, und die Mauern, an Felsen u. s. w. in dichten Polstern wachsende, letztere „Fetthennen“. Diese treiben oft Blüthen, aber keine oder nur wenige sterile Stengel. Sie sind fleischig, seltener gelb oder roth gefärbt, stehen in schirmförmigen zusammengefügten Trugdolden. S. Telephium, die gemeinste Art, wächst häufig auf Aedern und an felsigen Orten; ihre Blätter werden wie Portulak benutzt werden. (a, b eine ganze Pflanze in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., c Blüte, d Staubgefäß, e Stempel im Durchschnitt, f Samen, g derselbe durch den Kelch- und Blumenblätter und Stempel und Stempel zehn Staubgefäße.)

Fig. 14. Junl's Hauswurz (*Sempervivum Funkii*), eine in den österreichischen Alpen an wachsende Pflanze mit hellrothen Blüten. Die Gattung *Sempervivum* unterscheidet sich von *Sedum* andern durch 10—20 Kelch- und Blumenblätter

o oder doppelt so viele Staubgefäße; ihre zahlreichen sterilen Triebe treten immer als Blattrosetten. Die verbreitetste Art ist die früher officinell gezeigte, auf Zehnmauern, selbst auf Nothdächern, aber an Felsen wachsende, ebenfalls roth blühende eine Hauswurz (*S. tectorum*), deren zungenartige Blätter in der Volksheilkunde als kühlendes Mittel bei Wunden und entzündeten Hautstellen benutzt zu werden pflegen. (a *Semp. Funkii* in alt. Gr., b Durchschnit durch eine Blüte zweimal, c stärker vergr.)

m. 2. Cactusegewächse (*Cactaceae*). Holzgewächse tropischen und subtropischen America mit eigenthümlich oft sehr merkwürdig gestalteten (kugelförmigen, korb-, igel-, band-, säulenförmigen, einfachen oder verticillierten, gegliederten oder ungegliederten) Stämmen, gewöhnlich mit stern- oder büschelförmigen Stacheln besetzt und, wenige Arten ausgenommen, der Blätter beraubt. Stämme und Äste fleischig-saftig, erst im verholzten, mit grüner Oberhaut umkleidet. Blüten nussförmig, sitzend oder kurz gestielt, knospenförmig den Zweigen oder dem Stamme hervorbrechend, zwittrig und regelmässig, oft groß und prachtvoll, vielblättrigem corollinischen Kelch, vielblättriger Krone, vielen Staubgefäßen und einem Stempel. 2 beerenartig, vielkammig, Samen ohne Eiweiß. f. 26, Fig. 1 zeigt eine Gruppe mexicanischer, und zwar links an der Felswand einen *onocactus* (*Echinocactus*), neben der Wand *Säulencactus* (*Cereus*) dahinter eine indianische Feige (*Opuntia coccinellifera*). Von diesem, auf dessen aus breiten fleischigen Gliedern bestehenden Ästen die werthvolle Cochenille-Schildkröte (*Coccus Cacti*) lebt, zeigt Fig. 2 ein Glied mit Säulen in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr. Die Blüten sind gelb. 3 andere mexicanische Art, die gemeine indianische oder Wundfeige (*Opuntia vulgaris*) wird in Mittelmeerländern zu Hecken benutzt und kommt auch verwildert vor. Ihre süßen, äußerlich aber stacheligen Früchte werden allgemein gegessen, ihre saftigen Blattweige zerhackt auf Wunden aufgelegt. Sie wird auch bei uns häufig Ziergewächs gezogen.

g. 3. Der *Schlangencactus* (*Cereus hexagonus*), südamerikanische Art mit großen feuerrothen Blüten (a ein Stachelstern, verg.).

1 den Succulanten gehören ferner die Familien *Zicoiden* und der *Portulakartigen* (*Portulacaceae*). Pflanzen der erstgenannten Familie sind die blumigen Fajerblumen (*Mesembryanthemum*), Mehrzahl am Cap zu Hause ist, und der unendliche *Spinat* (*Tetragonia expansa*). Außer gemeinen als Suppentraut geschätzten *Portulak* (*Portulaca oleracea*), einer südeuropäischen Pflanze, hat Gattung *Portulaca*, desgleichen *Calandria*, schönliche Zierpflanzen geliefert. Auch der in Quito vorkommende, knollentragende *Ullul* (*Ullucus tuberosus*), welchem man ein Surrogat für die Kartoffel geben zu haben glaubte, gehört zu den *Portulacaceen*.

2. Ordnung der Kelchblätter (*Calycanthae*). Hier, selten strauchartige Gewächse, mit regelmäßigen zwittrigen Blüten, deren Kelchröhre mit dem ständigen Fruchtknoten verwachsen ist und an ihrer Basis (im Schlunde des verwachsenblättrigen Kelchs) Blumenblätter und Staubgefäße trägt. Frucht eine amme nicht selten schotenförmige Kapsel oder eine röhrenartige Schließfrucht. Unter den hierher gehörigen verdient hier bloß erwähnt zu werden die Familie der Nachtkerzenartigen (*Onagraceae*).

3. *Andr.-Atlas*, 2. Aufl. — Botanik.

Meist Kräuter mit gegen- oder zerstreutständigen, nebenblättrigen einfachen Blättern und theils einzeln gestellten (blattwinteständigen), theils ährig oder traubig gruppirten, gewöhnlich ansehnlichen und lebhaft gefärbten Blüten, welche 2—4 Kelchabschnitte, vier kreuzweis gestellte Blumenblätter, vier oder acht freie Staubgefäße und einen fadenförmigen Griffel mit vier Narben am Ende besitzen. Kapsel oder Beere, selten Ruß. Samen ohne Eiweiß. — Sind über die ganze Erde zerstreut, jedoch am häufigsten im gemäßigten Nordamerika. In Europa ist diese Familie besonders durch zahlreiche Arten der Gattung Weidenröschen (*Epilobium*), und durch einige Arten von Nachtkerzen (*Oenothera*) vertreten.

Fig. 26, Fig. 4. Die schneeglöckchenblättrige Fuchsie (*Fuchsia galanthiflora*), schöne, hier in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr. abgebildete Zierpflanze mit rothem Kelch und weißer Blumenkrone, ist ein durch die Kunst englischer Gärtner erzeugter Vastard. Die meisten Zierfuchsiën sind Varietäten oder Bastarde der in Chile heimischen *F. coccinea*, welche ursprünglich scharlachrothe Kelch- und Blumenblätter besitzt. Alle Fuchsiën stammen aus Südamerika und tragen saftige beerenartige mehrsamige Früchte.

Verwandt mit den *Onagraceen* und den nur aus Wasserpflanzen bestehenden *Haloragaceen* ist die merkwürdige Gattung der *Wasserlilie* (*Trapa*), welche nach einigen eine besondere Familie (*Trapaceae*) bilden muß. Fig. 5 zeigt die europäische, in Deutschlands Seen und Teichen sehr verbreitete und daselbst oft massenhaft auftretende *Wassernuß* (*Trapa natans*). Die mit ihren flach ausgebreiteten Blättern auf dem Wasser schwimmende Pflanze hat an dem langen fadenförmigen untergetauchten Stengel haarförmig fiederförmige Blätter, die man lange Zeit irrigerweise für Wurzeln gehalten hat, während die vielen leberartigen Schwimmblätter in der Mitte aufgetriebene und daselbst hohle (als Schwimmblasen dienende) Stiele haben. Aus den Fruchtknoten der kleinen unscheinbaren Blüten entsteht eine sehr harthalsige, mit vier spitzen Hörnern versehene, einem vierarmigen Anker vergleichbare Ruß mit eßbarem wohlchmedenden Kern. (a ganze Pflanze, sehr vergrößert; b Stempel und Staubgefäß, c Blüte, vergrößert; d Ruß im Verticallchnitt, e dieselbe von der Seite gesehen, in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr.)

V. Ordnung der Myrtenblütigen (*Myrtiflorae*).

Bäume und Sträucher mit gegen-, quirl- oder wechselständigen, einfachen, ganzrandigen Blättern, ohne oder mit abfallenden Nebenblättern und mit regelmäßigen zwittrigen Blüten, welche aus einem unterständigen, mit dem hohlen Blütenboden und dem Kelchröhr verwachsenen Fruchtknoten, einem mehrspaltigen Kelchsaume, einer mehrblättrigen Blumenkrone, zahlreichen oft polypetalen Staubgefäßen und einem Griffel bestehen. Frucht vom Kelchsaum, oft auch vom Griffel getrennt, zwei- bis vielfächerig, kapsel- oder beerenartige Samen ohne Eiweiß. — Folgende Familien dieser Ordnung sind besonders bemerkenswerth:

Jam. 1. Granatbäume (*Granateae*). Bäume mit in Dornen auslaufenden Ästen und nebenblättrigen Blättern. Blüten einständig, gebüschelt, groß, mit 5—7 Blumenblättern, welche sammt den zahlreichen freien Staubgefäßen auf dem Rande des freisporigen leberartigen, den Fruchtknoten umschließenden hohlen Blütenbodens eingefügt sind, mit dem der in 5—7 Lappen geschiedene hochgefarbte Kelch verwachsen ist. Frucht apfelsförmig, vom Kelch getrennt, mit leberartig Schale, inwendig durch dünne verticale und horizontale Scheidewände in Fächer abgetheilt, an deren Wandungen sehr zahlreiche Samen mit dicker glasiger Fleischhülle in-

einandergepreßt sitzen. Einzige Gattung: *Punica*, im tropischen Amerika heimisch.

Taf. 26, Fig. 6. Der gemeine Granatapfelbaum (*Punica Granatum*), ein durch brennend scharlachrothe Blumen und große röthliche Früchte mit essbaren Samen ausgezeichnete Baum oder Strauch, wird in Südeuropa als Obstbaum, bei uns als Ziergehölz in Gewächshäusern cultivirt. Die Blumen und Fruchtschalen sind officinell. (a ein blühender Zweig in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b Längsschnitt durch den Fruchtknoten in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., c Griffel, vergr.; d, e Frucht im Längs- und Querschnitt in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., f Keim im Querschnitt, vergr.)

Fam. 2. Myrtenartige (Myrtaceae). Immergrüne Holzgewächse mit meist nebenblattlosen lederartigen, gewöhnlich von Drüsen punktirt aussehenden, ganzrandigen Blättern und meist achselständigen, in Aehren, Trauben, Büschel, Doldeutrauben, seltener einzeln gestellten Blüten, welche aus drei, fünf oder sechs oft gefärbten, bald freien bald zu einem abfallenden Dedel verwachsenen Kelchblättchen, ebenso vielen Blumenblättern, zahlreichen oft polyadelphischen Staubgefäßen und einem Griffel mit kops- oder schüsselförmiger Narbe zusammengesetzt sind. Frucht nuss-, kapsel- oder beerenartig. — Die durch ätherische Oele und Gerbstoffe ausgezeichneten Myrtaceen bilden eine sehr große Familie, welche vorzugsweise die Tropenländer Amerikas und Neuhollands bewohnt, übrigens in der ganzen tropischen und subtropischen Zone beider Hemisphären zahlreiche Vertreter hat. Einzelne Arten kommen auch in Südeuropa, Nordamerika und dem antarktischen Südamerika vor.

Taf. 26, Fig. 7. Der Gewürznelkenbaum (*Caryophyllus aromaticus*), auf den Molukken heimisch und jetzt in Ost- und Westindien allgemein angebaut, liefert die Gewürznelken (b. h. die noch nicht aufgeblühten oder auch abgeblühten Blüten), aus denen das Nelkenöl bereitet wird. (a blühender Zweig in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b Spitze des Fruchtknotens mit einem Bündel Staubgefäße in nat. Gr., c Blumenblatt, vergr.; d Längsschnitt durch eine abgeblühte Blüte, in nat. Gr.; e Querschnitt durch den Fruchtknoten, f Staubgefäße, vergr.)

Fig. 8. Der Paranaßbaum (*Bertholletia excelsa*), ein Niesenbaum der Urwälder Guayanas und Nordbrasilens, liefert die als amerikanische oder Paranaßnüsse in den Handel kommenden dreikantigen hartschaligen Nüsse, welche einen mandelartig schmeckenden ölreichen Kern besitzen und nichts anderes als die Samen der bis Mannstopp großen, dickschaligen, holzigen Dedelfrucht sind. (a eine halbirte Kapsel mit den darin stehenden Samen in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b Samen, c derselbe im Querschnitt, d Samen in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr.)

Fig. 9. Die gemeine Myrte (*Myrtus communis*), ein in Südeuropa und Nordafrika an Flußufern und feuchten, sumpfigen Orten wachsender Strauch, welcher auch baumartig wird, trägt einzelnstehende weiße Blüten und braunschwarze Beeren. Die Brautmyrte ist eine kleinblättrige Varietät, welche selten wild vorkommt, desto häufiger aber als Topfgewächs cultivirt wird. (a blühender Zweig in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b Staubgefäß, d Same im Durchschnitte, vergr.; c Frucht in nat. Gr.)

Fig. 10. Der Cajeputbaum (*Melaleuca Cajeputi*), ein auf den Molukken wachsender Baum, aus dessen Blättern das officinelle Cajeputöl bereitet wird. Die Blüten sind weiß, die Früchte erbsenförmige viel-samige mit drei Klappen aufspringende Kapseln. (Abgeb. ein blühender und fruchttragender Zweig in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., a Blüten in nat. Gr., b Kelch, c Querschnitt des Fruchtknotens, vergr.)

Zu den Myrtaceen gehören ferner Antillen heimische *Eugenia Pimenta*, deren trocknete Beeren als Neumünz kommen, das auf Ceylon wachsende *Myrsine cinnamomum*, dessen Rinde den Pfeffer des neuholländischen *Eucalyptus resinifera* liefert, das australische *Acacia* *resinosa*. Die Früchte vieler Arten sind in der That als Obst geschätzt (namentlich diejenigen von *Myrtus pyrifera* und *Myrtus pomifera* in Westindien). Der Arten von *Metrosideros* ist wegen der ordentlichen Härte als Eisenholz bekannt.

VI. Ordnung der Rosenblättrigen. Bäume, Sträucher und Kräuter mit meist gegenständig und gewöhnlich von Nebenblättern einfachen, seltener zusammengesetzten blattmäßigen Zwitter-, selten eingeschlechtigen Blüten, gewöhnlich eine fünfblätterige Blumenkrone, reichere freie Staubgefäße besitzen, die in der Regel an der Basis eines bald flachen, bald oder hohlen, mit dem Kelch verwachsenen Eingefüßes sind. Stempel meist einfach-einzig; Frucht sehr verschieden, Samen meist viel.

Fam. 1. Apfelskrutige (Pomaceae). Bäume und Sträucher mit abwechselnden, unpaarig gefiederten Blättern und hängenden Nebenblättern. Blüten in endständigen Doldeutrauben oder Trugdolden, selten mit einem hohlen als unterständiger oder aufstretenden Blütenboden, welcher die fächerige Fruchtknoten umschließt, zu dem das Centrum der Blumen einnehmende Fruchtknoten (Apfelkrut, pomum) mit der verdickten Wandung der hohlen Fruchtknoten (die verdickte Wandung der hohlen Fruchtknoten) weder ein- bis mehrsamige Kapselschalen als fünf einsamige Steinkerne umschließt, sondern einen hohlen Kelch enthält. — Die Pomaceen bewohnen die gemäßigten und sub-tropischen Zone der nördlichen Hemisphäre. Zu ihnen gehören die Äpfel- und Birnbäume, die Pyrus von unbekannter Herkunft, aber aus Asien stammend, sowie die Quitten, die Mehlfrüchler oder Weißdornarten, u. a. m.

Taf. 26, Fig. 11. Der Quittenbaum (*Cydonia japonica*), ein meist als Strauch, seltener als Baum auftretendes Gewächs, welches in Kreta heimisch sein soll, an der dort wild vorkommt und häufig als Obstbaum wird. Blätter ganzrandig, unterseits netznervig, groß, weiß, Frucht groß apfel- oder birnenförmig, filzig, goldgelb, sehr süß, aber frisch ungenießbar, mit holzigen viel-samigen Kapselschalen. Samenschale sehr hart (Quittenstein). Die Quittenfrucht ist officinell. (a blühender Zweig, c Frucht im Längsschnitt, in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr.; d Frucht im Querschnitt, in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr.) — Zur Bierde wird häufig die Quitten (*Cydonia japonica*) in Gärten im ersten Frühling noch vor dem Ausblühen der purpurrothen Blüten entwidelnder Sträucher besten am Späler gezogen gedeiht.

Fig. 12. Der Ebereschens (Ebereschens- oder Pielbeerbaum (*Sorbus aucuparia*), bekannt durch ganz Mittel- und Nordeuropa, ein Waldbaum mit unpaarig gefiederten laubförmigen Blättern, in zusammengesetzten Doldeutrauben gestellten Blüten und beerenförmigen, herbsauern Früchten mit Kapselschalen. (a blühender Zweig



Frucht, verfl.; c, d dieselbe im Längs- und Querschnitt in nat. Gr., e, f Längs- und Querschnitt durch den Samen, vergt.)

Fig. 13. Der Weiß-, Mehl- oder Hagedorn (*Crataegus oxyacantha*), ein durch fast ganz Europa verbreiteter, oft zur Zierde angebauter oder zu lebensigen Hecken benutzter Strauch, welcher auch zu einem kleinen Baum zu werden vermag, mit dornigen oder ornispigen Zweigen, fiederförmigen Blättern, weißen Blüten und länglichen rothen, zwei bis drei Steinernen aufsteigenden Früchten (Mehlsäfen), deren mehliges Fleisch genießbar ist, aber sehr schmeckt. (a, b Frucht- und blüthentragender Zweig in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., c Knospe, d Blüte, e Frucht in nat. Gr.) — Fast ebenso häufig ist der eingriffliche Weißdorn (*C. monogyna*), von voriger Art fast nur durch bloßen Griffel und durch einernige Früchte verschieden. Von dieser häufiger zu einem Baume werdenden Art ist man in den Gärten Formen mit einfachen und gefüllten pfirsichrothen Blüten. Außerdem werden viele amerikanische und asiatische Arten von *Crataegus* Sträucher und Bäume, als Biergehölze cultivirt.

Fig. 14. Der Mispelstrauch (*Mespilus germanica*), in nicht allein in Deutschland, sondern in beinahe ganz Mittel- und Süd-europa in Gebüschen vereinzelt vorkommender und in manchen Gegenden auch häufig angebauter Strauch mit einzelnen Dornen, länglichen leichhaarigen ganzrandigen Blättern und einzeln stehenden weißen Blüten, bringt von dem ausgewachsenen leich gekrönte freisäulenförmige, reif gelbbraune Früchte hervor, welche, wenn sie einen Frost bekommen oder lange gelegen haben, teigig werden und dann sehr, von säuerlich-süßem Geschmack sind. Sie enthalten fünf Steinern. (a Frucht, b dieselbe im Längs-, c im Querschnitt, in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr.)

Fam. 2. Rosengewächse (*Rosaceae*). Kräuter und Sträucher mit abwechselnd gestellten, bald einfachen oder selten ganzen, meist hand- finger- oder fiederförmig zertheilten, bald unpaarig gefiederten, dreizähligen oder fingerförmigen Blättern und an den Blattstiel angewachsenen Nebenblättern. Blüten zwittrig, selten eingeschlechtig, in Trugboden, Dolbenstrahlen, Rispen oder einzeln, endständig, mit meist fünf, selten bis acht Kelch- und Blumenblättern und vielen, selten wenigen freien Staubgefäßen. Stempel meist viele, im Centrum der Grunde des Scheibens, becher- oder trugförmigen hohlen Blütenbodens, bisweilen aus einer centralen Aulenz, regel- oder kegelförmigen Verlängerung desselben (z. B. bei *Geum*) sitzend, mit einschälerigem Fruchtknoten und einem Griffel. Einsamige Nüsschen oder ein- bis zehnsamige Walzelsamen. — Die Rosaceen bilden eine große Familie, deren Arten so ziemlich über die ganze Erde verbreitet, jedoch vorzüglich in der gemäßigten Zone der nördlichen Halbkugel zu Hause sind.

Zaf. 26, Fig. 15. Die Ruspfpflanze (*Brayera orthoceras*), deren gedörrte Blüten in neuerer Zeit als ein schätzbares Mittel zum Abtreiben des Bandwurms bekannt geworden sind, ist ein in Abyssinien auch des baumartig werdendes Holzgewächs mit unpaarig fiederförmigen Blättern und in große Rispen zusammengebrängten ziemlich kleinen hellgrünen Blüten. Ein Seitenzweig einer endständigen Rispe in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b eine Blüte von oben gesehen, mit ihren Kelchblättern, dreimal vergt.; c Blüte im Längsschnitt, viermal vergt.)

Zaf. 27, Fig. 1. Die Hundsröse (*Rosa canina*). Alle Rosen besitzen einen unterständigen von den frugförmigen, kegelförmigen oder flaschenförmigen Blütenboden umschützten Scheinfruchtknoten, welcher aber nicht wie bei den Pomaceen oben verwachsen ist, sondern eine

Öffnung besitzt, aus welcher die Griffel der in dem hohlen Blütenboden eingeschlossenen zahlreichen Stempel hervorragen (h). Aus diesem Scheinfruchtknoten entsteht die Hagebutte oder Rosenfrucht, welche bei der Hundsröse stets scharlachroth ist. Diese Rosen, deren sehr wohlriechende Blüten bald hellroth oder bald weiß sind und deren schlante Wurzelschossen allgemein zum Oculliren mit andern Rosen genommen werden, ist durch ganz Europa verbreitet und durch gestämmte breitgedrübte Stacheln ausgezeichnet. (a blühender Zweig in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b Längsschnitt durch eine Blüte, etwas vergt.; c Stempel vergt.)

Zu den Rosaceen gehören ferner: die Himbeere (*Rubus idaeus*), die Brombeerarten (verschiedene Arten von *Rubus*), die Erdbeeren (verschiedene Arten von *Fragaria*), die Kellenwurz (*Geum urbanum*), die Fingerkräuter (*Potentilla*), die Spierstauben und Spiersträucher (*Spiraea*), die Goldniesel (*Kerria japonica*) u. a. m.

Fam. 3. Mandelbaumartige (*Amygdalaceae*). Unterscheiden sich von den Rosaceen dadurch, daß die Blüte nur einen Stempel enthält, welcher im Grunde der verschieden geformten Keldröhre (richtiger des röhrenförmigen Blütenbodens) befestigt ist, und durch die einernige Steinfrucht, welche sich aus dem Fruchtknoten entwickelt. Kelch fünfspaltig, Blumenblätter fünf, sammt den zahlreichen Staubgefäßen aus einem den Schlund der Keldröhre auskleidenden Ring eingefügt. — Die Mandelgewächse, lauter Sträucher und Bäume mit abwechselnden einfachen ganzen Blättern und abfallenden Nebenblättern, sind der Mehrzahl nach durch die gemäßigte und subtropische Zone der nördlichen Halbkugel verbreitet. Zu ihnen gehören alle unsere Steinobstarten.

Zaf. 27, Fig. 2. Die gemeine Traubenkirsche (*Cerasus Padus*), ein in Mittel- und Nordeuropa an Ufern und in feuchten Laubwäldern wachsender und oft zur Zierde angeplanzter Baum oder Strauch, ist durch die langen Blütentrauben von den echten Kirschen, bei denen die Blüten stets in Büscheln stehen und lang gestielt sind, sowie durch die beerenförmigen Früchte mit neßgrübigem Steinern unterschieden. Früchte reif schwarz, mit sehr dünnem bitterlich-süßem Fleische. Die Rinde ist officinell. (a blühender Zweig in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b Blumenblatt, vergt.; c Frucht, d Kern in nat. Gr.) — Eine andere Art Traubenkirsche ist der in Kleinasien heimische Kirschlorber (*C. Lauro-cerasus*), ein immergrüner Baum mit leberartigen, blausäurehaltigen Blättern und kirschengroßen Früchten. Die Blätter sind officinell. — Unter den eigentlichen Kirschen sind die Vogelkirsche (*C. avium*), die Stammpflanze aller Süßkirschenarten, und die Sauerkirsche (*C. acida*) die bemerkenswerthe. Letztere stammt aus dem Kaukasus, während die Vogelkirsche in Europa heimisch ist. — Nahe verwandt mit den Kirschen ist die Gattung der Pflaumen- und Zwetschenbäume (*Prunus*), zu welcher der gemeine Pflaumenbaum (*P. domestica*), die Aprikose (*P. armeniaca*) und der Schlehdorn oder Schwarzdorn (*P. spinosa*) gehören.

Fig. 3. Der Mandelbaum (*Amygdalus communis*), ein in allen Mittelmeerländern in zahllosen Abarten angebauter kleiner Baum oder Strauch, welcher im Orient und Nordafrika heimisch zu sein scheint, blüht sehr zeitig im Jahr und zwar vor der Entfaltung der Blätter und reift seine Früchte, von denen allein der im Steinern eingeschlossene Same (die Mandel) genießbar ist, im September. Kelch purpurn, Blumenblätter röhlichweiß oder rosa, Fruchtschale mit gelblich-grauem Filz bedeckt. (a Blüten-, b Fruchtweig in

$\frac{1}{2}$ , nat. Gr., c ein Stück Kelch mit Staubgefäßen, fast nat. Gr.; d, e Staubgefäße, viermal, f Pistill, zweimal vergr.; g Durchschnitt durch eine junge Frucht, h deren Kern, i dieselbe im Durchschnitt, k, l Keim im Längs- und Querschnitt, alle Fig. in nat. Gr.) Ein bekannter Zierstrauch ist die Zwergmandel (*A. nana*), im untern Donaugebiet und in Sibirien heimisch. — Zu der Mandelgattung wird oft auch die Pfirsiche (*Persica vulgaris*) gerechnet, die sich aber durch die dicke genießbare Fleischschale und den kleinen ungenießbaren Samen des sehr hartschaligen Kerns von den Mandeln wesentlich unterscheidet. Sie soll angeblich in Persien zu Hause sein.

VII. Ordnung der Hülsenfrüchtigen (Leguminosae). Kräuter und Holzgewächse der verschiedensten Größe, mit abwechselnden meist zusammengesetzten Blättern stehen bleibenden, selten abfallenden Nebenblättern und gewöhnlich unregelmäßigen Zwitterblüten, welche aus einem ganzblättrigen mit dem concaven Blütenboden verwachsenen Kelche, einer mehrblättrigen meist schmetterlingsförmigen Blumentrone, 10 bis vielen freien oder verwachsenen Staubgefäßen und einem Stempel bestehen, aus welchem sich am häufigsten eine Hülse, selten eine Gliederhülse oder Schließfrucht entwickelt. Samen ohne Eiweiß.

Fam. 1. Schmetterlingsblütler (Papilionaceae). Kräuter, Sträucher und Bäume mit dreizähligen, gefingerten oder gefiederten, seltener einfachen ganzen Blättern, deren Mittelrippe oder gemeinschaftlicher Blattstiel nicht selten in eine Ranke ausläuft und welche am Grunde des Stiels zwei Nebenblätter haben. Letztere erscheinen bei manchen Arten (z. B. bei der gemeinen Robinia oder unechten weißen Akazie, *Robinia Pseud-acacia*) in Dornen umgewandelt. Blüten gewöhnlich zwittrig, in Trauben, Aehren, Rispen, Dolden, selten einzeln achselständig. Kelch röhrig, mit fünftheiligem, oft zweilippigem Saum, Blumentrone fünfblättrig, schmetterlingsförmig. Staubgefäße zehn (meist neun in einer Rinne, welche den gestreckten Fruchtknoten umgibt, mit ihren Filamenten verwachsen und das zehnte frei, seltener alle 10 monadelphisch verwachsen, noch seltener völlig frei), Griffel hatig gebogen. — Die Papilionaceen, nächst den Compositen die größte Familie unter den Samenpflanzen, sind über die ganze Erde verbreitet, in größter Artenzahl jedoch im tropischen Afrika zu finden. Sie haben uns eine Menge Nahr-, Futter-, Arznei-, Handels- und Zierpflanzen geliefert und zerfallen in viele Gruppen.

Taf. 27, Fig. 4. Die gemeine Erbse (*Pisum sativum*). Die Gattung *Pisum* zeichnet sich durch die überaus großen Nebenblätter und die breite zurückschlagene Fahne der Blumentrone aus. Die Blüten stehen bei den meisten Arten zu zweien an einem blattwinkelständigen Stiele. Die in vielen Varietäten cultivirte gemeine Erbse soll aus dem Orient stammen. (a Stück eines blühenden Zweiges in  $\frac{1}{2}$ , nat. Gr., b Kelch mit Stempel, nat. Gr.) — Die Zuckerbse (*P. saccharatum*) soll nur eine Abart von *P. sativum* sein.

Fig. 5. Die Kichererbse (*Cicer arietinum*), eine einjährige, in Südeuropa, dem Orient und Aegypten allgemein angebaute Pflanze von unbekannter Herkunft, mit einzeln stehenden Blüten, ist durch die aufgeblasenen mit klebriger Vassäure aussehenden und deshalb sauer schmeckenden Haaren bedeckten wenigsamigen Hülsen und durch die einem Widderkopf ähnlich geformten Samen ausgezeichnet, welche noch nahrhafter als Erbsen sind. (a ein blühender Zweig, b Hülse in  $\frac{1}{2}$ , nat. Gr., c, d Samen in nat. Gr.)

Fig. 6. Das spanische Süßholz (*Glycyrrhiza*

glabra), in Südeuropa und im Orient dort wie auch andernwärts im großen Maß mit diesem heiligen Wurzelstock, welcher aus Süßholz liefert, aus dem der Liquiritiae bereitet wird. Die Blüthe ist in schwächigen Aehren stehenden sehr schlauzig lilä, die Hülsen länglich, schlauzig. (a Stengelspitze mit Blüten, nat. Gr., b Blüte, c Geschlechtsorgan, d Blätter, e Staubbeutel, f Stempel in nat. Gr.)

Fig. 7. Die Esparsette (*Onobrychis*) in Mittel- und Südeuropa hin und her wachsende und auf kalten häufig angebaute, sehr nahrhafte Futterpflanze, da sie vereinnend ist, mehrere Jahre reichlichen Ertrag liefert. Die Blumen in rothem Grunde purpurn gestreift, die Blüthen allen Arten von *Onobrychis*, einsamig, nicht (a eine ganze Pflanze in  $\frac{1}{2}$ , nat. Gr., b Flügel derselben, d Schiffe in nat. Gr., f Samen, zweimal vergr.)

Fig. 8. Die Indigo pflanze (Indigo). Der bekannte blaue Farbstoff, Indigo, kommt aus sehr verschiedener Pflanzen (z. B. *Indigo tinctoria* und *Polygonum tinctorium*) gewachsen die Hauptmasse desselben wird aber von den Arten der ganz tropischen Gattung *Indigofera* gewonnen, unter denen die hier abgegebene vorragenden Platz einnimmt. 1. Am Ende des kausigen Strauch mit blauen Blüten und Hülsen. (a ein blühender Zweig in  $\frac{1}{2}$ , nat. Gr., c Frucht in nat. Gr.)

Fig. 9. Die Serradella (*Ornithopus*) einjährige, im südwestlichen Europa heimisch, welche neuerdings unter ihrem vortrefflichen Namen als Futterpflanze Eingang gefunden auf Sandboden gebaut zu werden pflegt. Vogelfuß (*Ornithopus*) besitzt sichelförmig zusammengedrückte Gliederhülsen. O. rosenrothe Blüten und unterscheidet sich wie durch bedeutendere Größe in allen Theilen, dem auch in Deutschland auf magerem Boden und da wachsenden O. *perpusillus*. b fruchttragender Zweig in  $\frac{1}{2}$ , nat. Gr., mal vergr.)

Andere bekannte und allgemein angebaute Kräuter dieser Familie sind die Luzerne (*Medicago sativa*), der rothe oder gemeine Klee (*Medicago pratense*), der weiße Klee (*Medicago repens*), der schwedische Klee (*Medicago falcata*), der Honig- oder Pferdelle (*Medicago lupulina*), die Futterwicke (*Vicia sativa*), u. a.

Fig. 10. Die Erdbeide, Erdpflanze (*Arachis hypogaea*). Diese Pflanze ist in den Ländern und auch im südlichen Europa sehr schmachhaften und reichen Samen. O. Delapflanze angebaute Gewächs, welche in den tropischen America heimisch sein soll. dadurch merkwürdig, daß es seine Früchte springende zweisamige Hülsen mit festem Boden reißt. Nach der Blüte: sich der Blütenstiel abwärts und dringt mit der Blüte in den Boden ein. O. einjährig, treibt bis fünf Fuß hoch, blüht blaßgelb. (a eine Pflanze in nat. Gr., b Frucht in nat. Gr.)

Fig. 11. Der Färberginster (*Genista tinctoria*) ein durch ganz Mittel- und Südeuropa verbreiteter, dessen goldgelbe Blüthen

nthalten, welcher benutzbar ist. Doch wird e nirgends angebaut. (a Endstück eines Stengels in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b Blumenblätter, c Kelch mit den Staubgefäßen und dem imal vergr.; d Hülse in nat. Gr., e Samen, in Längs-, g im Querschnitt, viermal vergr.) iche Gattung der Ginster besteht aus zum gen Sträuchern und Halbstämmern, welche hl nach in Südeuropa und Nordafrika vord meist einfache ganze Blätter, in Aehren, Köpfchen gestellte gewöhnlich gelbe Blüten pigem Kelch und eine zweischneidig zu- üdte mehrsamige Hülse besitzen.

apilionaceen gehören ferner die Robinien, von den Laien Akazien genannt (Gatt. auter nordamerikanische Bäume, unter denen: weiße (R. Pseudacacia) auch in Deutsch- ) Fuß hoch wird; die Linse (Ervum Lens), bohnen (Lupinus albus und luteus), die e (Vicia Faba), die gemeine Witsbohne vulgaris) und die türkische Bohne (Ph. ), die Blasenschote (Colutea aborescens)

. Cäsalpiniaceen (Caesalpiniaceae). räucher, selten Stauden mit einfach bis dreifach gefiederten, selten ganz einfachen d in Trauben, Aehren oder einzeln gestellten n, welche einen röhrigen Kelch, eine fünf- eilippige oder fast regelmäßige Blumentrone is zehn oder viele freie Staubgefäße besitzen. Hülse oder Gliederhülse, letztere oft nicht sondern geschlossen bleibend, bisweilen ruchtartig. — Die Cäsalpiniaceen bewohnen änder, die meisten sind im tropischen Afrika a heimisch.

Fig. 12. Die Tamarinde (Tamarindus prächtiger in Ostindien und vielleicht auch in Afrika wild wachsender und in allen rn angeplanter Baum mit paarig gefiederten nd endständigen Trauben großer weißer n Blüten, liefert das als Abführmittel ge- Tamarindenmus (pulpa Tamarindorum). angenehm süßlich schmeckende Brei, welcher der geschlossenen bleibenden holzigen Glieder- lit. (Fruchttragender Zweig in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr.) nd 14. Sennapflanze (Cassia lanceolata ra). Die wegen ihrer abführenden Wirkung ennesblätter oder Folia Sennae kommen denen im tropischen Afrika wachsenden Arten g Cassia, zu denen die beiden genannten Die Cassien besitzen einen fünfblätterigen Kelch, fünf genagelte Blumenblätter, zehn e und einen gestielten Stempel, aus welchem e nach der Art sehr verschieden geformte Gliederhülse entwickelt. Die Cassien sind de Sträucher mit einfach gefiederten Blättern eldgelben Blumen. (Fig. 13, a ein blühen- on C. lanceolata in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b Frucht uit, nat. Gr.; Fig. 14, a eine Blütentraube na in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b ein Keim, fünffach ine Hülse in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., d dieselbe quer n, nat. Gr.)

. Der Veschedenbaum (Hymenaea ein Baum des südlichen Amerika, welcher ten Copallad liefert. Dies ist das Harz s, welches sowohl aus der Rinde hervor- auch sich unter den Wurzeln alter Bäume lumpen ansammelt. Der Stamm des Baums 80 Fuß Höhe und bis 9 Fuß Umfang, en sind lederartig und stehen zu zwei am

Blattstiel, die Blüten haben einen lederartigen Kelch und fünf weiße Blumenblätter, die braunen Früchte mit dicker holziger Schale werden bis  $\frac{1}{2}$  Fuß lang. (a ein Zweig, b eine Hülse, c dieselbe im Querschnitt, d ein Samen, e derselbe im Querschnitt; alles in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr.)

Fig. 16. Der Johanniskrautbaum (Ceratonia Siliqua), ein stattlicher immergrüner Baum mit dicht- belaubter abgerundeter Krone, welcher im ganzen mittelländischen Gebiete seiner sehr nahrhaften Früchte wegen im großen Maßstabe angebaut wird und dort vermuthlich auch zu Hause ist. Blüten polygamisch, zwittrig und eingeschlechtige Blüten untereinander, alle mit fünftheiligem Kelch und fünf Staubgefäßen, aber ohne Blumentrone, von grünlicher Farbe, Frucht eine fleischig-müßige gefächerte, nicht aufspringende Hülse von im reifen Zustande chocoladenbrauner Farbe. Diese Früchte, deren Schale Buttersäure enthält und deshalb einen widerlichen Geruch hat, aber süß schmeckt, werden im Orient, in Spanien und anderwärts vorzüglich als Viehfutter (für Schweine, Rindvieh, Maulthiere) benutzt, in Deutschland unter dem Namen „Johanniskraut“ als Lederbissen verkauft und sind auch officinell. (a ein Zweig in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b Blüte, c unreife Frucht im Längsschnitt, vergr.; d, e Hülse, ganz und im Längs- schnitt, in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr.)

Zu den Cäsalpiniaceen gehören ferner: Haematoxylon Campechianum, ein großer Baum Centralamerikas, welcher das Campeche- oder Blauholz liefert, Caesalpinia echinata, ein brasilianischer Baum, dessen ebenfalls färbendes Holz als Farnambukholz in den Handel kommt, Copaifera Jacquinii, ein Baum des äquatorialen Amerika, von welchem der Copiba- balsam abstammt, die Christusakazie (Gleditschia triacanthos) u. a. m.

Fam. 3. Mimoseaceen (Mimosaceae). Bäume und Sträucher, selten Kräuter, erstere oft mit Dornen bewaffnet, alle mit alternirenden meist doppelt- oder dreifach gefiederten, bisweilen reizbaren Blättern und mit freien, nicht selten dornigen Nebenblättern. Bei vielen neuholländischen Akazien sind statt der Blätter Phyllodien (blattförmige Blattstiele) vorhanden. Blüten meist zwittrig, klein, regelmäßig, in Aehren und Köpfchen, seltener in Rispen und Dolbentrauben, mit vier- bis fünfspaltigem Kelch, vier- bis fünfblätteriger Blumentrone und meist vielen freien Staubgefäßen. Hülse oder Gliederhülse. — Gewächse der tropischen und subtropischen Zone, der Mehrzahl nach in Süd- afrika, Neuholland und dem tropischen Amerika zu Hause.

Taf. 27, Fig. 17. 18. Die echte Akazie (Acacia vera) und die Akazie vom Nil (A. nilotica) gehören zu denjenigen Mimoseaceen, welche arabisches Gummi liefern. Diese Substanz ist im Holze aller Mimoseaceen und auch vieler Papilionaceen enthalten, in größter Menge aber in denjenigen der genannten und einiger andern Akazienarten (A. gummifera, A. Verek, A. Ehren- bergii u. a.), welche alle im tropischen Afrika und Arabien zu Hause sind und von denen manche, wie A. Verek, ganze Wälder bilden. Das Gummi schwitzt an den Stämmen und Ästen in Klumpen aus, die an der Luft erhärtet. Diese Akazien haben alle doppelt gefiederte Blätter, kugelige Blütenstände und Gliederhülsen. Die Blüten sind, wie bei fast allen Akazien, gelb. (Fig. 17, a ein Zweig mit Blüten in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b Stück einer Hülse in nat. Gr.; Fig. 18, a blühender Zweig in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b Blüte, vergr.: c Gliederhülse in nat. Gr.)

Zu der Gattung Mimosa gehören die in Brasilier heimischen sogenannten Sinnpflanz (M. sensitiva,



*M. pudica* u. a.), welche reizbare Blätter besitzen (z. B. bei Berührung die Blätter senken und die Blättchen übereinander schieben und gleichzeitig abwärts senken) und dadurch seit Jahrhunderten berühmt sind. Am häufigsten wird *M. pudica*, eine einjährige Pflanze mit blaßrothen in Köpfchen stehenden Blüten, cultivirt.

VIII. Ordnung der Terebinthineen (Terebinthaceae). Bäume und Sträucher mit alternirenden unpaarig gefiederten oder einfachen, meist nebenblattlosen Blättern, Blüten meist zwittrig und regelmäßig, mit verwachsenblättrigem Kelche, am Grunde des Kelchs eingefügten Blumenblättern und Staubgefäßen. Ein einziger, bisweilen unterständiger Fruchtknoten oder viele, dann stets oberständige Stempel. Nuß, Stein: Frucht oder Kapsel. Samen ohne Eidei.

Fam. 1. Walnußgewächse (Juglandaceae). Sommergrüne Bäume mit nebenblattlosen, gefiederten Blättern und dillinischen Blüten, von denen die männlichen in hängende walzige Köpchen gestellt und mit einem schüsselförmigen zwei- bis sechsblättrigen Perigon sowie mit drei oder vielen Staubgefäßen versehen sind, die weiblichen dagegen zu wenigen an einem kurzen aufrechten Stiele traubig oder gehäuft stehen und einen unterständigen Fruchtknoten mit kleinem vierblättrigen Perigon und meist zwei großen fleischigen Narben besitzen. Steinfrucht mit saftiger, ungenießbarer, zuletzt aufsteigender Fleischhülle und zweischaligem Steinern, in dessen großer zur Hälfte einschaliger Hölle der eigenthümlich geformte vierlappige eßbare Same liegt, dessen Kotyledonen sehr ölhaltig sind. Die Juglandaceen sind vorzugsweise in Nordamerika zu Hause, einige kommen in Westasien, Japan und Java vor. Ihre Blätter und Fruchtschalen enthalten einen wässerigen harzigen aromatischen Saft, ihr Holz ist als Nabelholz sehr geschätzt.

Zaf. 28, Fig. 1. Der gemeine Walnußbaum (*Juglans regia*) soll aus Persien stammen, wird aber seit Jahrtausenden in Südeuropa cultivirt, woher sich sein Anbau bis Mitteldeutschland verbreitet hat. (a blühender Zweig in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b Schuppe des männlichen Köpfchens in nat. Gr., c Staubgefäße, verg.; d weibliche Blüte in nat. Gr., e Nuß im Längsschnitt in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr.)

Fam. 2. Pistazienartige (Terebinthaceae). Sommer- oder immergrüne Bäume und Sträucher mit nebenblattlosen einfachen, dreizähligen oder gefiederten Blättern und eingeschlechtigen kleinen in Aehren oder Rispen gestellten Blüten, welche aus einem drei- bis fünfspaltigen meist persistenter Kelch, drei bis fünf Blumenblättern, oben oder doppelt so vielen Staubgefäßen resp. einem bis sechs Stempeln bestehen, von denen vier bis fünf steril zu sein pflegen. Einsamige Steinfrucht. — Die Terebinthaceen bewohnen vorzüglich die Tropenzone, außerhalb derselben kommen nur wenige auf beiden Hemisphären vor. Viele enthalten Milchsaft, die meisten einen wässerigen oft harzigen Saft, einige sind giftig, andere (z. B. die in allen Tropengegenden cultivirte Mangopflaume, *Mangifera indica*) liefern eßbare Früchte.

Zaf. 28, Fig. 2. Der Nierenfruchtbaum (*Anacardium occidentale*), ein immergrüner, zweihäufiger Baum Südamerikas mit einfachen Blättern. Seine nierenförmigen Früchte von etwa  $\frac{1}{2}$  Zoll Länge, welche in der Mittelschicht ihrer Fruchtschale einen dicken scharfen, blasenziehenden dunkel gefärbten Balsam (Cardobalsam) enthalten, kommen als amerikanische Gießentläufe in den Handel und waren früher officinell. Ihre Samen sind eßbar. (a blüthen- und fruchttragender Zweig in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b Blüte, c Staubgefäße in nat. Gr.)

Fig. 3. Die Pistazie (*Pistacia vera*), ein kleiner immergrüner, in Persien, Syrien und am Schwarzen Meer heimischer, in Südeuropa angebauter Baum mit gefiederten Blättern, liefert die wohlriechenden und reichen grünen Mandeln (*Pistaciae*), welche zur Verzierung von Confituren verwendet werden und früher auch officinell waren. Es sind dies die aus den Steinfrüchten herausgeschälten Samenkerne. (a fruchttragender Zweig in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b Theil des Blütenkörpers in nat. Gr., c männliche, d weibliche Blüten, verg.)

In Südeuropa sind zwei andere strauchartige Arten derselben Gattung mit ungenießbaren Früchten sehr verbreitet: der Terpentinenbaum (*Pistacia terebinthus*) und der Mastixstrauch (*Pistacia lentiscus*). Ersterer liefert den cyprischen Terpentin, letzterer das Mastixharz, welches zu Räucherpulvern, Firnissen und Läden verwendet wird. — Zu den Terebinthaceen gehören ferner: der Essigbaum (*Rhus typhina*), aus Nordamerika, der Gifsumah (*Rhus toxicodendron*), ein nordamerikanischer auch hin und wieder in Europa verwilderter Strauch mit scharf giftigem Saft, der Gerbersumah (*Rh. Coriaria*) in Südeuropa, und die häufig zur Zierde angepflanzte, in Südosteuropa heimische Perrulienstrauch (*Rh. Colinus*.)

Die andern Familien dieser Ordnung, die Burseraceen und Connaraceen sind ausschließlich Tropengewächse. Arten der erstgenannten aus der Gattung *Boswellia* liefern das wohlriechende Weihrauchharz, andere aus der Gattung der *Balsambäume* (*Balsamodendron*) die Myrrhe und den Mastbalsam, von andern Burseraceen das Elemiharz. Fast alle diese Pflanzen wachsen im tropischen Asien (in Arabien) und Afrika, die Elemispflanzen in Manila, Westindien und Centralamerika.

IX. Ordnung der Kreuzdornartigen (Rhamnaceae). Unterscheiden sich von den Terebinthaceen besonders durch die einweihaltigen Samen. Mehr Sträucher und Stauden mit einfachen, selten zusammen- oder zweifach gefiederten Blättern, mit oder ohne Nebenblätter und mit regelmäßigen, meist zwittrigen, selten eingeschlechtigen Blüten, die einen verwachsen- oder getrenntblättrigen Kelch und eine mehrblättrige Blumenschuppe, selten bloß ein Perigon besitzen, sowie einen einsamigen oberständigen Fruchtknoten, aus dem eine kapsel-, kern- oder fleischfruchtartige Frucht hervorgeht. Unter den zahlreichen hierher gehörigen Familien können hier nur drei berücksichtigt werden.

Fam. 1. Hülseartigen (Urticaceae). Immergrüne Bäume und Sträucher der warmen und gemäßigten Zone mit alternirenden oder gegenständigen, einfachen nebenblattlosen Blättern, unscheinbaren achselständige zwittrigen Blüten und beerenartigen, zwei- bis vielzähligen Steinfrüchten.

Zaf. 28, Fig. 4. Der gemeine Hülsebaum oder die Stechpalm (*Ilex Aquifolium*), die einzige in Europa (namentlich im westlichen) vorkommende Art dieser Familie, ist ein Strauch oder kleiner Baum mit dornig gekanten glänzenden grünen Blättern, weißen Blüten und rothen Beeren, der häufig (besonders in England und den Niederlanden) in vielen Varietäten als Ziergehölz cultivirt wird. Seine Blätter waren früher officinell. (a blühender Zweig in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b Blüte von oben, c Beeren aufgeschnitten, d Samen im Längsschnitt, schwach verg.)

Eine andere in Südamerika heimische Art (*Ilex guayensis*) liefert den in ganz Südamerika beliebten Paraguaphee (die Blätter).

Fam. 2. Celastrineen (Celastraceae). Bäume und Sträucher, manche mit kletternden Aesten, welche kleine achselständige zwittrigen Blüten, einfache Fruchtknoten

isfel und Kapseln, Stein- oder Flügel Früchte oder wenigsamigen Fächern hervorbringen. größtentheils in der tropischen Zone und idlichen Halbflgel heimischen Familie gehört (f. 28, Fig. 5 abgebildete gemeine Spindel: *Conyolimus europaeus*), ein häufig in Laub- und Heden wild wachsender und auch als angepflanzter Strauch (selten Baum), welcher sche kreuzförmige Blumen besitzt und wegen edigen baretförmigen purpurrothen Kapseln en Pfaffenhütchen erhalten hat. Seine icken Samen sind von einem orangegelben (illus) oder umschlossenen. (a blühender Zweig Gr., b Blüte, c Früchte in nat. Gr.)

. Kreuzdorngewächse (*Rhamnaceae*). se und Kräuter mit einfachen abwechselnden Blüten in Büscheln, Dolben, Trugdolben, oder eingeschlechtig, mit drei-, seltener zweierigem Fruchtknoten und ebenso vielen Griff- fächern. Steinfrucht mit zwei- bis drei- Steinkern, oder zwei- bis dreiknospige Gewächse der heißen und gemäßigten Zone. Fig. 6. Der gemeine Kreuzdorn (*Rhamnus cathartica*), ein in Mitteleuropa heimischer er kleiner Baum mit in Dornen auslaufenden, gegenständigen gesägten Blättern und Blüten. Die dreiknospigen zuletzt beerenartigen (zen) Steinfrüchte (Kreuzbeeren) werden ing des Saftgrün und Schüttgelb benutzt. er Zweig in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b männliche, Blüte, vergr.; d, c Frucht, ganz und aufge- Blatttrand, in nat. Gr.) — Von einer andern, 1 Waldrosen wachsenden, noch häufigern, igen Art, der Schiefbeere (*Rh. Frangula*), lenlos ist, abwechselnde ganzranbige Blätter, Blüten und anfangs grüne, dann rothe, arze Beeren trägt, wurde früher die Holz- Bereitung des Schießpulvers gebraucht.

nung der Dreiknospigen (*Tricoccae*). dreiknospige oder dreifach geflügelte, mit drei auffpringende, dreifächerige oder dreisamige amen mit Eiweiß. — Sehr verschiedenes ge- zeugen, welche in mehrere Familien zerfallen. Wolfsmilchgewächse (*Euphorbiaceae*). se und Kräuter, von denen viele einen ist scharfen Milchsaft enthalten, mit ab- seltener gegenständigen, einfachen oder hand- ummengesetzten Blättern, mit häutigen oder enblättern. Blüten klein unscheinbar, ein- , verschieden angeordnet, von Deckblättern t vier- bis sechsheiligem oder zwei- bis drei- Kelch und meist ohne Blumentrone. Staub- bis viele, dann oft einbrüderig, Fruchtknoten , sitzend oder gestielt, Frucht meist kapsel-, enartig, drei-, selten zwei- oder vielspfig, 3 zweisamigen Fächern. Samen mit einem oder Samenmantel versehen. — Die een bilden eine große über die ganze Erde Familie, die meisten wachsen im tropischen

. Fig. 7. Die gemeine Wolfsmilch (*Cyparissias*). Alle Euphorbien enthalten Heilen einen weissen Milchsaft und tragen in vielstrahligen, von Hüllblättern umgebenen mit gabeltheiligen Strahlen. Blüten mit 3em Perigon, an dessen Rande drei bis 3 Halbmondförmige Drüsen stehen und welches sowohl Staubfäden und einen langgestielten mit drei Griffeln enthält. Dreiknospige st. Die Euphorbien zerfallen in solche mit

beblättertem Stengel (trautartige) und in solche mit fleischigen cactusähnlich geformten Stämmen (Holz- gewächse). Letztere kommen in Afrika und auf den Canarischen Inseln vor. *Euph. Cyparissias* ist eine durch fast ganz Europa verbreitete, an dürren Orten wachsende, für giftig geltende, ausdauernde Pflanze mit gold- gelben, zuletzt rothen Hüllblättern. (a ganze Pflanze in nat. Gr., b Blüte, c Samen, vergr.)

Fig. 8. Die officinelle Wolfsmilch (*Euph. offi- cinarum*), ein cactusartiges Gewächs der Canarischen Inseln und des westlichen Afrika, dessen Milchsaft den unter dem Namen Euphorbium bekannten zu Hei- zwecken angewendeten Extract liefert. (Abgebildet eine ganze Pflanze, sehr verfl.)

Fig. 9. Der Buchsbaum (*Buxus sempervirens*), bekannter in Südeuropa auf Gebirgen heimischer, bis- weilen baumartig werdender, immergrüner Strauch, dessen feines hartes gelbbraunes Holz als das beste für Holzschnitte gilt und daher sehr gesucht ist. Blüten grünlichgelb, Kapseln mit drei Hörnern. Wird besont- lich auch als Zwergstrauch zur Einfassung von Garten- beeten benutzt. (a blühender Zweig in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b Blüten, c Frucht, vergr.)

Fig. 10. Der Maniol (*Jatropha Manihot*), ein in allen Tropenländern angebauter, wahrscheinlich aus dem tropischen Amerika stammender Strauch mit hand- förmig zertheilten Blättern, dessen fleischige, bis zwei Fuß lang werdende armesbide Wurzeln neben einem sehr giftigen Milchsaft reichliches Stärkemehl besitzen und deshalb als Nahrungsmittel gebraucht werden. Nach Entfernung des Milchsaftes durch Auspressen bereitet man nämlich aus dem Mehl ein sehr nahr- haftes Brot, das Cassavebrot, welches in allen Tropen- ländern gebräuchlich ist. (a blühender Zweig in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b Stempel, vergr.; c Früchte in nat. Gr.)

Taf. 29, Fig. 1. Der Wunderbaum (*Ricinus communis*), ein in Südeuropa und Nordafrika heimischer Baum, welcher bei uns zur Fierbe im Freien als ein- jährige Pflanze cultivirt wird und als solche eine kräftige, oft über mannshohe Staube mit daumesbidem Stengel und fußbreiten Blättern bildet. Blüten in Rispen gestellt, mit drei- bis fünftheiligem Kelch, ohne Blumentrone, männliche mit verwachsenen und viel verzweigten Staubgefäßen, weibliche mit traufstacheligem Fruchtknoten. Samen groß, lupinenartig, grau und schwarzbraun geschd, enthalten bis 50% eines fetten Oel, welches officinell ist. (a ein Blütenstand nebst Blattzweig in nat. Gr., b weibl. Blüte, zweimal vergr.; c Frucht in nat. Gr., d dieselbe im Querschnitt, e Samen in nat. Gr.)

Zu den Euphorbiaceen gehören ferner der Gummi- baum (*Siphonia elastica*, nicht zu verwechseln mit dem Gummibaum unserer Gewächshäuser und Zimmer, *Ficus elastica*) in Brasilien und Guyana, aus dessen Milchsaft große Massen Kautschuk gewonnen werden; der Maucinella oder Manzanillabaum (*Hippomane Manicella*), ein westindischer Baum mit furchtbar giftigem, brennend scharfem Milchsaft; die Crotonpflanze (*Croton Tiglium*), ein ostindischer Strauch, der das heftig purgirend wirkende Crotonöl liefert; die Ladmuspflanze (*Crotophora tinctoria*), ein mediterranes Kraut, welches die blaue Ladmusfarbe enthält, u. a. m.

Fam. 2. Schiefblattgewächse (*Begoniaceae*). Voll- saftige, trautartige Tropengewächse mit knotig gegliederten Stengeln, abwechselnden gestielten unsymmetrischen schiefen handnervigen Blättern, häutigen Nebenblättern und einhäufigen in achselständigen Trugdolben gestellten Blüten, von denen die männlichen ein vierblättriges, die weiblichen ein vier- bis neuntheiliges gefärbtes

Perigon, erstere viele Staubgefäße, letztere einen unterständigen Fruchtknoten besitzen, aus dem sich eine dreifächrige, dreifach geflügelte Kapsel mit vielen sehr kleinen Samen entwickelt. — Die Begonien oder Schiefblätter sind durch die prächtige Färbung und Zeichnung der Blätter ausgezeichnet und deshalb sehr beliebte Blattpflanzen unserer Gewächshäuser und Blumentische geworden. Taf. 28, Fig. 11 zeigt eine der beliebtesten Arten, die *Begonia Rex*. (a ganze Pflanze, sehr verk.; b, c Blütenstände in nat. Gr.)

XI. Ordnung der Rautenartigen (Rutaceae). Holzgewächse und Kräuter mit einfachen oder zusammengesetzten, meist nebenblattlosen Blättern und verschiednen angeordneten Zwitterblüthen, deren Blumenblätter (vier bis fünf) und Staubgefäße (acht bis zehn freie) auf einer fleischigen Scheibe stehen, welche oft in einen kurzen Stiel ausgezogen ist, an den die fünf Karpellblätter des Fruchtknotens befestigt sind. Frucht fünfknopfig, nicht aufspringend, oder in fünf Theile spaltend. Samen mit Eiweiß. — Unter den zahlreichen hierher gehörigen Familien, welche fast alle in den Tropen- und Subtropen zu Hause sind, verdient bloß diejenige der eigentlichen Rautengewächse (Rutaceae) hervorgehoben zu werden, deren bekanntester Repräsentant die gemeine Gartentrane (*Ruta graveolens*) ist. Die Rutaceen sind Kräuter und Sträucher mit alternirenden drüsig punktirten, sehr stark aromatisch riechenden Blättern und in Trauben, Doldentrauben oder Trugdolden gestellten Zwitterblüthen, welche eine Spaltfrucht hervorbringen. Gewächse der nördlichen Halbkugel, besonders in der Mediterranzone und in Südsibirien verbreitet.

Taf. 28, Fig. 12. Der Diptam (*Dictamnus Fraxinella*), eine in Mittel- und Südeuropa sowie in Asien wachsende, nicht selten zur Zierde angebaute, ehedem officinelle Staude mit unpaarig gefiederten Blättern und großen fast zweiflüppigen röthlichweißen Blumen, welche eine endständige Traube bilden, ist durch die schwarzrothen Drüsen der Stengel, Blütenstiele, Staubjäden und Kapseln ausgezeichnet, welche (in ätherisches Oel in reichlicher Menge abgeben. (a Stengelstängel in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b Stengelstängel mit Wurzel in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., c ein einzelner Stempel, d Kapsel in nat. Gr.)

Zu der Ordnung der Rutaceen gehören ferner: der Quassiabaum (*Quassia amara*) in Westindien und Guayana (Fam. der Sinarubeae), der in den deutschen Parkanlagen häufig aufgepflanzte, dreizählige Blätter tragende Lederblumenstrauch (*Ptelea trifoliata*) aus Nordamerika (Fam. Xanthoxyleae), der Korkbaum vom Amur (*Phellodendron amurense*) aus derselben Familie, die unter dem Namen Stöckergeruch bekannten Topfziersträucher (Arten von *Diosma* und *Agathosma*, südafrikanische und neuholländische Pflanzen aus der Familie der Diosmaceen); der Guajacbaum (*Guajacum officinale*) aus Westindien (Fam. der Zygophylleae) u. a. m.

XII. Ordnung der Schnabelfrüchtigen (Gruinales). Fruchtknoten aus mehreren (meist fünf) seitlich zusammengewachsenen oder um eine centrale Verlängerung des Blütenbodens wirtelförmig gestellten Karpellen zusammengekehrt, deren aneinanderliegende oder miteinander verwachsenen Griffel nach der Blütezeit oft in einen schnabelartigen Körper auswachsen (so namentlich bei den Storchschnabelgewächsen, Geraniaceae, zu denen auch die als Zierpflanzen beliebten Pelargonien, schönblühende, aromatische Sträucher aus Südafrika gehören). Frucht entweder eine Spaltfrucht, oder Kapsel oder Beere. Samen meist ohne Eiweiß.

Taf. 28, Fig. 13. Der Sauerklee (*Oxalis Aceto-*

sella), bekannte Waldpflanze mit sehr weißen Blumen, gehört zu der Familie der Oxalideen, welche vorzugsweise aus perennirenden krautigen, theils stengelstrebenden Kräutern oder knolligen Rhizomen und fingerförmig zusammengefügten Blättern besteht. Die Blüthen sind regelmäßig, in Dolden oder Rispen, mit fünf Kelch-, fünf Blumenblättern, zehn Staubblättern und einem fünfklappigen Fruchtknoten, aus dem eine Kapsel oder Beere entsteht. Der gemeine Sauerklee wurde früher zur Herstellung des in vielen enthaltenden Bitterkleezuges benutzt und ist eine (a ganze Pflanze in nat. Gr., b Kelchblätter, c Staubgefäße, ausgebreitet, d Kapsel, e Beere, f Querschnitt, vergr.)

Verschiedene cap'sche Arten von *Oxalis* sind und meist vierzähligen Blättern vertheilt in Einfassungen von Gartenbeeten.

Taf. 29, Fig. 3. Die Zwerg-*Cap* (*Tropaeolum majus*). Die Gattung *Tropaeolum* mit einigen andern Gattungen die Familie der Capaceen, lauter südamerikanische Kräuter mit liegenden oder schlingenden Stengeln, schildförmige Blätter, schöngefärbte Blumen mit corollinischem langgespornten Kelch, großen Blumenblättern, acht Staubblättern und dreifächerigen Fruchtknoten ausgezeichnet. Die Früchte sind bald trocken, dreiflüppig, zur Reifezeit in drei Theile spaltend, bald eine dreiflüppige Beere, dreifach geflügelte Schließfrucht. Die Kapuziner- oder spanische Kreuze (*Tropaeolum majus*) ist eine sehr verbreitete einjährige Pflanze mit leuchtend rothgelben oder dunkelrothen Blumen. Unsere Figur zeigt eine niedrige kleinblüthige Varietät in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr.

Zu der Ordnung der Grinales gehört die Familie der Balsaminengewächse, deren meiste Arten sich durch eine eiförmige Kapsel auszeichnen. Ihre bekanntesten Vertreter sind das in feuchten Laubwäldern häufige Springkraut oder Rühr' mich nicht (Anagallis arvensis) und die Gartenbalsamin (*Impatiens*).

XIII. Ordnung der Hornartigen (Ranunculales). Sehr verschiednen gestaltete Bäume und Sträucher, meist zwittrliche und regelmäße, fünf- oder vierzählige Blüten aus einem freien Kelch, aus dem das Kelches eingefügten fleischigen Scheibe die Blumenblätter und Staubgefäße hervorgehen und einem aus drei (selten zwei bis vier) zusammengefügten Fruchtknoten bestehend, der eine Flügel-, Stein- oder Kapselfrucht enthält, ohne Eiweiß.

Taf. 28, Fig. 14. Der gemeine Acker-*Ranunculus* (*Ranunculus acris*). Alle Arten der Gattung *Ranunculus* mit einigen andern Gattungen die Familie der Ranunculaceen bilden, haben gegenständige, handförmig gelappte Blätter, in Trauben oder Trugdolden gestellte, grüne Blüthen mit fünf geflügelten, zuletzt in zwei einsamige Hälften zerfallenden Fruchtknoten. Die Acker-*Ranunculus* bewohnt die feuchten Wälder, namentlich Nordamerika. Der gemeine Acker-*Ranunculus* ist ein in Mitteleuropa heimischer Baum, der fünf- oder vierzählige Blüthen hat, die sich in zwei Hälften spalten und nach oben gekrümmte Fruchtknoten bilden. (a Blüthe, b Blüte, c Frucht in nat. Gr.)

Fig. 15. Die Blumen-*Ranunculus* (*Ranunculus flammula*). Die Gattung bildet eine eigene Familie. Die Botanikern zu den Nelken- und Storchschnabelgewächsen (Geraniaceae) zugehörig.



ische den Acerineen in vieler Beziehung gleich aber von denselben theils durch die fiederten Blätter, theils durch die anders lauten, welche oft eingeschlechtig sind, theils samig mit einem Flügel versehene Schließlich unterschiedet. Ihre Arten kommen nach in Südeuropa und Nordamerika (Fraxinus) haben hülsenlose, Staubgefäße und einem Fruchtknoten bedekten, die Blumeneschen (Ornus) einen vierelch und eine vierblättrige Blumenkrone. in bekannter sehr groß werdender Baum) fast ganz Europa verbreitete gemeine (cinus excelsior). Die Blumenesche ist im südlichen und südöstlichen Europa baum mit weißen wohlriechenden Blüten zu Sträuchern, welcher deshalb in Mittel- zur Erde angepflanzt wird. (Abgeb. iger Zweig in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr.) ceroiden gehören ferner die Familien der, Malpighiaceen und Erythroylen. Aus anten stammt die bekannte Koka-Pflanze (Erythroxylon Coca), deren ru von den Eingeborenen als Heilmittel n.

ung der Rankengewächse (Sarmentosae). sten kletternden Gewächse mit meist alter- uschen oder zusammengesetzten Blättern, oder villinösen, regelmäßigen, aber sehr gebildeten Blüten, oberständigem Fruch- ein: bis sechsächerigen Beeren. Samen

Fig. 16. Die Weinrebe (*Vitis vinifera*) (h der wilde Wein (Ampelopsis hederacea) der Nebengewächse (Ampelideae), welche lgewächse und der Mehrzahl nach zwischen eisen zu Hause sind. Blätter einfach hand- zusammengekehrt, gefingert oder gefiedert, ne Nebenblätter. Blüten klein, grünlich, en, Sträufern, Rispen, mit kleinem vier- igen Kelch, vier bis fünf Blumenblättern, efäßen, welche auf einer mit dem Kelch Scheibe eingefügt sind, und mit zwei- erigem Fruchtknoten, aus dem eine eben- Beere mit ein- bis zweisamigen Sächern Die gemeine Weinrebe stammt aus Asien, ein aus Nordamerika. (a blüthentragender nat. Gr., b Fruchttraube in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., gr.)

Die blutrothe Passionsblume (*Passi- nea*). Die Familie der Passifloren, deren ge, theils strauchige Arten in den Tropen- onders Amerikas verbreitet sind, unter- von der vorhergehenden vorzüglich durch imlichen Bau der Blüte. Diese, meist groß besteht aus einem corollinischen Kelch oder t krug- oder walzenförmiger Röhre und hnblättrigem Saume, einem innerhalb des usbreitenden Kranze von fleischigen Safern, Staubgefäßen und einem gestielten Frucht- drei, selten fünf Griffeln. Stempel und stehen auf einem Stiele im Centrum der ie Frucht ist eine einsächerige viel-samige Beere. Die Blätter stehen abwechselnd, einzeln in den Blattwinkeln; erstere sind h, oft gelappt, bald unpaarig gefiedert. Passiflora hat schöne Zierpflanzen für Shäuser und Zimmer geliefert. Die ab-

gebildete Art zeichnet sich durch prächtige blutrothe Blumen aus.

XV. Ordnung der Orangenartigen (Hesperideae). Bäume und Sträucher mit abwechselnden, meist zusammengesetzten, nebenblattlosen Blättern und regelmäßigen gewöhnlich zwittrlichen Blüten, welche aus einem freien, ganz oder getrenntblättrigen Kelch, 4—5 sammt den Staubgefäßen auf einer hypogynischen Scheibe eingefügten Blumenblättern und einem einzigen oberständigen Stempel bestehen, aus dessen Fruchtknoten sich eine kapsel- oder beerenartige Frucht, seltener eine Steinfrucht entwickelt. Samen ohne oder mit Eiweiß. Die wichtigsten Familien sind:

Fam. 1. Cedrelaceen (Cedrelaceae). Große Bäume der Tropenländer mit schön gefärbtem wohlriechenden Holze, gefiederten Blättern und in endständige Rispen oder achselständige Trugdolden gestellten Blüten, welche aus einem vier- bis fünfblättrigen oder vier- bis fünfspaltigen Kelche, 4—5 Blumenblättern, 8—10 in eine Röhre verwachsenen Staubfäden und einem Stempel bestehen und eine holzige, vier- bis fünfklappige, einsächerige, viel-samige Kapsel zur Frucht haben.

Taf. 29, Fig. 2. Der Mahagonibaum (Swietenia Mahagoni), ein stattlicher immergrüner Baum Westindiens und Centralamerikas mit bis 100 Fuß hoch und sehr stark werdendem Stamme, dessen Holz das bekannte Mahagoniholz ist. Blätter leberartig, glänzend dunkelgrün, Blüten klein, gelbweiß, Kapseln braun. (a ein blühender Zweig in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b Blüte, viermal vergr.; c der geöffnete Cylinder der verwachsenen Staubgefäße, d Stempel, e derselbe im Querschnitt, stärker vergr.; f, g Frucht von der Seite und im Längsschnitt, fünfmal verll.)

Fam. 2. Orangeriegewächse (Aurantiaceae). Immergrüne im tropischen Asien heimische Bäume und Sträucher mit oft dornspitzigen Zweigen, wirtelförmig zusammengesetzten oder gefiederten, von Delbrüsen wimmelnden Leberblättern und einzeln stehenden oder traubig angeordneten zwittrblüten, welche einen vier- bis fünfzähligen Kelch, vier bis fünf Blumenblätter, acht bis zehn bisweilen monadelphische Staubgefäße und einen fünf- bis viel-sächerigen Fruchtknoten besitzen. Beerenartige Frucht (Orangenfrucht) mit lederartiger an Delbrüsen reicher Schale und vielen Sächern im Innern, welche mit spindelförmigen großen Saftzellen angefüllt sind, zwischen denen die großen eiweißlosen, mehrere Embryonen enthaltenden Samen liegen.

Taf. 29, Fig. 4. Der Pomeranzenbaum: (*Citrus Aurantium*). Dieser in ganz Südeuropa, im Orient und Nordafrika und außerdem in vielen Ländern der subtropischen und tropischen Zone seit den ältesten Zeiten cultivirte Baum liefert sowohl die bitteren Pomeranzen als die süßen Apfelsinen. Außer diesen beiden Varietäten gibt es noch andere. Er unterscheidet sich von dem Citronenbaum (*C. medica*) durch der breitgeflügelten (beim Citronenbaum schmalen) Blattstiel des gegliedert zusammengesetzten Blattes, durch die beiderseits weißen (beim Citronenbaum außen purpurrothlichen) Blumenblätter und durch die kugelige, nicht wie beim Citronenbaum am Scheitel kegelförmig vorgezogene Frucht. (a blühender Zweig in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b Staubgefäßcylinder in nat. Gr., c ein Bündel Staubgefäße, dreimal vergr.; d Stempel, vergr.; e Frucht im Querschnitt in  $\frac{1}{4}$  nat. Gr.)

Fig. 5. Der Adamsapfel (*Citrus medica Bigaradia*), eine Varietät des Citronenbaums, von diesem durch die eigenthümlich geformte Frucht unterschieden, welche sehr groß wird, aber nur mit Zuder einigermaßen genießbar ist. Der Adamsapfel steht bei den

Orientalen, besonders den Juden, in hohem Ansehen. (a ein Zweig mit Blatt und Blüten, b eine Frucht in  $\frac{1}{4}$  nat. Gr., c Längsschnitt, d Querschnitt durch eine gewöhnliche Citrone in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr.)

XVI. Ordnung der Guttiferen (Guttiferae). Sehr verschieden gestaltete Holzgewächse und Kräuter, der Mehrzahl nach einen gefärbten, milchigen oder harzigen Saft oder aromatische Stoffe enthaltend, mit einfachen ganzen, meist auch ganzrandigen Blättern, mit oder ohne Nebenblätter und mit regelmäßigen Zwitтерblüten, welche einen mehrblätterigen Kelch, eine mehrblätterige Blumenkrone, viele ein- oder mehrbrüderige Staubgefäße und einen oberständigen Fruchtknoten mit gewöhnlich mehreren Griffeln besitzen, aus dem sich eine Kapfel, Steinfrucht oder Beere entwickelt. Diese Ordnung enthält viele sehr verschiedene Familien, deren Arten meist den Tropengegenden angehören.

Taf. 29, Fig. 6. Der Theestrauch (*Thea chinensis*), ein immergrüner in China heimischer und dort seit undenklichen Zeiten angebauter, sehr variirender Strauch; gehört zur Familie der Ternströmiaceen, welche eine entweder mit Klappen aufspringende oder häufiger nicht aufspringende lederartig fleischige Kapfel mit vielen eiweißhaltigen Samen zur Frucht haben. Die Blüten des Theestrauchs sind weiß oder röthlichweiß, mit vielen polyadelphischen Staubgefäßen. (a Blüten und Früchte tragender Zweig in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b Stempel mit einem Staubgefäß, vergt.; c aufgeprungene Kapfel, d Kapfel von der Seite, vergt.) — Zu dieser Familie gehört auch die Gattung der Camellien (*Camellia*), welche in China und Japan zu Hause ist.

Zu den Guttiferen gehören ferner: die Tamariskenartigen (*Tamaricaceae*), aus welcher Familie die deutsche Tamariske (*Myricaria germanica*) und der Strauch abstammt, welcher wahrscheinlich das Manna der Bibel, eine durch den Stich des *Coccus maniperus* hervorgerufene Auschwüzung weißer süßer Körner, geliefert hat (*Tamarix gallica* v. *mannifera*); die Hartbeugewächse (*Hypericaceae*), deren bekannteste Art das mit Delbrüßen enthaltenden und deshalb wie durchstochen aussehenden Blättern begabte Johannisraut (*Hypericum perforatum*) ist, welches allenthalben an trockenen Orten wild wächst und ehemals officinell war; die flachblattartigen Pflanzen (*Linaceae*), zu denen die bekannte Flachspflanze oder Leinpflanze (*Linum usitatissimum*) gehört; die Clusiaceen (*Clusiaceae*), aus tropischen Gewächsen bestehend, deren eins, der auf Ceylon heimische Guttibaum (*Hebradendron cambogioides*) das als Farb- und Arzneistoff geschätzte, aus dem eingebildeten Saft bestehende Gummigutt liefert; die Flügelfrüchtigen (*Dipterocarpaceae*), ebenfalls Tropenpflanzen, von deren einer, dem auf Borneo und Sumatra wachsenden Kampherbaum (*Dryobalanops Camphora*), durch Anbohren der Stämme der Borneo-Kampher gewonnen wird, u. a.

XVII. Ordnung der Säulenfrüchtigen (*Columniferae*). Bäume, Sträucher und Kräuter mit abwechselnden einfachen handnervigen, selten handförmig zusammengesetzten Blättern, freien Nebenblättern und meist regelmäßigen Zwitтерblüten, deren zahlreiche Staubfäden bald in einen den oder die Stempel umgebenden säulen- oder ringförmigen Körper monadelphisch, bald (selten) in mehrere Bündel polyadelphisch verwachsen sind und sonst aus einem verwachsen- oder getrenntblättrigen Kelche, einer mehrblätterigen Blumenkrone und einem zusammengefügten Blattfruchtknoten oder mehreren bis vielen einfachen Blattstempeln bestehen. Kapfel- oder Spaltfrucht. Samen mit Eiweiß. Diese Ordnung zerfällt in die Familien der Liliaceen, Bättneriaceen, Sterculiaceen und Malvaceen.

Taf. 29, Fig. 7. Die Winterlinde (*Tilia*). Die Gattung der Linden (Tab. 29, Fig. 7) durch eine kapfel- oder steinfrüchtige aufspringende einsamige Frucht auszeichnend. Die Gewächse mit ganzen oder handförmig gelappten und mit traubig oder trugdoldig angeordneten, welche vier- bis fünfblätterige Höhlen (Kormentrone), viele freie oder poladelphische und einen einzigen Stempel besitzen. Die Linde wächst in ganz Mitteleuropa häufig und findet sich auch oft angepflanzt. Hier aber die Sommerlinde (*T. grandifolia*) Baum. Alle Linden sind durch das am Ende des Blattstängels befindliche, welches an den Enden des Blattstängels ausgewachsen ist. Die meisten Arten in Nordamerika, während die meisten in Europa hauptsächlich in den Tropenländern wachsen. Die Winterlinde in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., c Fruchtbüschel in nat. Gr., d Staubbeutel, f, g Samen im Längs- und Querschnitt.

Fig. 8. Der Cacaobaum (*Theobroma cacao*). Die Cacaobohnen (die Samen der großen Bäume, die drei erfüllten Früchte) liefert und jetzt in Ostindien und Afrika im großen Maßstab angebaut. Die Cacaobäume gehören zu der Familie der Bättneriaceen, lauter Holzgewächse der Tropen, die in Holland, haben ganzrandige, fiederförmige Blätter, abfallende oder persistente Früchte tragen die meist kleinen Blüten, welche fünfblätterigen Kelch, 4–5 Blumenblätter und fünf Staubgefäße und einen fünfzähligen Fruchtknoten besitzen, in Rispen, Aehren oder Trauben. Die Frucht ist kapselartig, vielkammerig und fruchtkragender Zweig des Cacaobaums in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., d Same in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr.

Fig. 9. Der Baumwollstrauch (*Gossypium*). Die Gattung der Baumwollsträucher, ein in Indien und in Westindien angebauter Strauch, der im Grunde rothen Blumen, die Familie der Malvenartigen (*Malvaceae*) artenreiche, sehr natürliche, über die ganze Welt verbreitete Familie ist besonders dadurch auszeichnet, daß die fünf Blätter der Blumenkrone und die zahlreichen monadelphischen Staubgefäße in einen den oder die Stempel umgebenden säulen- oder ringförmigen Körper verwachsen sind und viele, selten nur fünf, Stempel umgeben. Die Gattung bildet die Gattung (*Gossypium*) bilden die Gattung, die vorhandenen Kapfellarblätter einen eiförmigen Fruchtknoten, aus dem sich eine mit Klappen aufspringende Kapfel mit mehreren in lange Haare (die Baumwolle) Samen in jedem Fache enthält. Die Malvaceen (z. B. den Gattungen *Lavatera* u. a.) bilden die zahlreichen Einzelstempel, die sich zu einem Fruchtknoten entwickeln. Die Malvaceen zeichnen sich durch Sternhaare auf den Blättern, Stengeln und haben gewöhnlich einen den Stempel umgebenden säulen- oder ringförmigen Körper. Die Baumwollarten, lauter Tropensträucher, theils Kräuter. Das eine oder mehrere Blätter in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b aufgeprungene Kapfel, c dieselbe frei, d Samen in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr.

der Familie der Sterculiaceen gehören der riesige Feige und ein mehrtausendjähriges Alter erreichende Enbrotbaum oder Baobab (*Adansonia digitata*), der im tropischen Westafrika zu Hause ist, sowie durch unformliche Dide und oft tonnenförmige Stalk des Stamines ausgezeichneten Wollbäume (*mbax*), ebenfalls Tropengewächse, deren Samen einen Wollkleeff versehen sind.

VIII. Ordnung der Equisartigen (*Cistioideae*). Gewächse und Kräuter mit einfachen Blättern und mit Nebenblättern. Blüten zwittrlich, meist regelmäßig, mit getrenntblättrigem freien Kelch, hypogynisch gefügten Blumenblättern und Staubgefäßen und einem, sitzendem, meist einsächerigem Fruchtknoten. Vielzählige Kapself, seltener Beere. Samen mit Eiwisch. — Diese Ordnung zerfällt in mehrere Familien, von denen die Veichengewächse (*Violariaceae*), Sonnenhauartigen (*Droseraceae*), Sonnenröschigenartigen (*simeae*) und die Bizaceen (*Bixaceae*) die wichtigsten sind. Bekannte Neprästanten der ersten durch regelmäßige, gesperrte Blumen und aneinanderstehende Staubbeutel ausgezeichneten Familie sind das Kröpfchen (*Viola odorata*) und das Stiefmütterchen (*V. tricolor*), der zweiten Familie der niedrigen in Torfmoospoltern auf Hochmooren oft häufig vorkommende Sonnenhau (*Drosera rotundifolia* und *spilolia*) mit reizbaren, von langen purpurrothen brigen Fasern gewimperten, rosettenartig angeordneten Blättern, der dritten Familie das Sonnenröschen (*Helianthemum vulgare*), ein kleiner an denen sonnigen Grasplätzen wachsender Halbstrauch. Taf. 29, Fig. 10. Die Fliegenfalle der Venus (*ionaea muscipula*), ein in Sümpfen der südlichen reinigten Staaten Nordamerikas wachsendes Kraut, dessen auf breitgeflügeltem Stiel befindliche gewimperte Arttheile bei Berührung sich zusammenschlagen und durch zum natürlichen Fliegenfänger wird, gehört zur Familie der Troseraceen, welche über die ganze Erde verbreitet und durch anfangs gleich den Farnblättern gerollte Blätter und Blütenröhren oder Blütenröhren ausgezeichnet sind. Kelch und Blumentrone d fünfblätterig, Staubgefäße fünf, zehn oder viele, hängen und völlig frei, die Frucht ist eine vielzählige, bis zweifächerige Kapsel. (a eine ganze Pflanze der gegenwärtigen in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b ausgebreitete Blüte der Blumenblätter, c ein Blumenblatt, d Kapsel, zweifach, dreimal verg.)

Fig. 11. Der Orleansbaum (*Bixa orellana*). Die h diesem Baum benannte lauter Tropenpflanze haltende Familie der Bizaceen besteht aus Bäumen, Sträuchern mit abwechselnden, ganzrandigen oder ähneln meist drüsig punktierten Blättern und abenden Nebenblättern, deren Blüten viele freie Staubgefäße und einen einsächerigen Fruchtknoten besitzen und e vielzählige Kapsel oder Beere hervorbringen. Der Orleansbaum, ein Baum des tropischen Amerikas, liefert Orleansharz. (a blühender Zweig in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b aufgesprungene Kapsel, c dieselbe im Längsdurchschnitt, verg.)

Zwischen den Cistioideen und Säulenfrüchtigen steht die Ordnung der Nelkengewächse (*Caryophyllinae*), die in die beiden Familien der Alueen und Silene zerfällt. Zu letzterer gehören die verschiedenen Nelken (*Gattung Dianthus*), die Veimkräuter (*Silene*), Aderrade (*Agrostemma Githago*), die Beschle (*Lychnis Viscaria*), das Seifenkraut (*Saponaria officinalis*) u. a. u.

XIX. Ordnung der Kreuzblätigen (*Cruciflorae*). Lauter, selten Halbsträucher und Sträucher, mit meist wechselnden und nebenblattlosen, einfachen oder zu-

sammengesetzten Blättern und regelmäßigen Zwitterblüten, welche aus einem zwei- bis vierblättrigen Kelche, aus vier stets kreuzweis ausgebreiteten Blumenblättern, sechs tetradynamischen oder vielen gleichlangen Staubfäden und einem oberständigen Stempel bestehen. Mehrzählige Schoten, Schötchen oder Kapsel, seltener eine nicht aufspringende Schließ- oder eine mehrzählige Beerenfrucht. Samen mit oder ohne Eiwisch. — Unter den hierher gehörenden Familien sind die Cruciferen, Caparideen und Papaveraceen von besonderer Wichtigkeit.

Fam. 1. Kreuzblütler (*Cruciferae*). Pflanzen mit abwechselnden, einfachen, meist fieder- oder leierförmig zertheilten, selten ganzen Blättern und gewöhnlich doldentraubig angeordneten Blüten, welche einen vierblättrigen Kelch und sechs viermählige Staubgefäße besitzen. Schote, Schötchen oder seltener schoten- oder schötchenförmige Schließfrucht. — Die Cruciferen, eine der größten und natürlichsten Familien, sind über die ganze Erde verbreitet, jedoch vorzüglich in der gemäßigten Zone der nördlichen Halbkugel heimisch.

Taf. 29, Fig. 12. Die Gartentresse (*Lepidium sativum*), einjährige, im Orient und südlichen Europa wildwachsende, andernwärts als Salat- und Gewürzkräut angebaute und verwilderte Pflanze, hat einen eigenthümlich scharf aromatischen Geruch, weiße Blüten und nehabrige zweifählige Schötchen. (a, b eine ganze Pflanze in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., c Staubgefäße und Stempel, d aufgesprungene Schötchen, e, f Same im Längs- und Querschnitt, dreimal verg.)

Fig. 13. Der Goldlad (*Cheiranthus Cheiri*), beliebte Zierpflanze mit gelben oder goldbraunen, wohlriechenden, in Gärten oft gefüllten Blüten, wächst an Felsen und alten Mauern in Südeuropa wild. (Abgeb. das Ende einer Blütentraube in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., daneben Stempel der Staubgefäße, verg.) — Verwandte Pflanzen sind der Sommerlevoit (*Matthiola annua*) und der Winterlevoit (*Matthiola incana*), beide ebenfalls in Südeuropa heimisch.

Zu den Cruciferen gehören ferner: das Köpfelkraut (*Cochlearia officinalis*), der Meerrettich (*Cochlearia Armoracia*), die Brunnentresse (*Nasturtium officinale*), der Senf (*Sinapis alba*), der gemeine Blattkohl (*Brassica oleracea*) und überhaupt alle Kohlsorten, der Raps (*Brassica campestris*), der Rüben (*Brassica Rapa*), der Rettich und das Radieschen (*Raphanus sativus*), die berühmte Rote von Jericho (*Anastatica hierochuntica*) u. a. u.

Fam. 2. Kapengewächse (*Capparideae*). Kräuter und Holzgewächse, letztere oft mit kletternden Blättern. Blätter einfach oder zusammengesetzt, mit Nebenblättern oder Stipulardornen oder ohne solche; Blüten einzeln oder in Trauben, mit meist vierblättrigem Kelch und sechs bis vielen Staubgefäßen, welche sammt den Blumenblättern auf der fuchel- oder stielförmigen Verlängerung des Blütenbodens, unterhalb des Fruchtknotens eingefügt sind. Einsächerige zweiflappige, schotenartige Kapsel oder fleischige, auch wol trockene vielzählige Beere. — Gewächse der tropischen, subtropischen und wärmern gemäßigten Zone.

Taf. 29, Fig. 14. Der gemeine Kapernstrauch (*Capparis spinosa*), ein in Südeuropa heimischer, dorniger, raulender Strauch, dessen junge Blütenknospen getrocknet als Kapern in den Handel kommen. Die einzeln stehenden Blüten sind groß und schön, mit rötlichweißen Blumenblättern und violetten Staubfäden; die fleischigen länglichen lauggestellten Beeren werden in Essig eingelegt gegessen. (a blühender Zweig, c eine Blüte in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b Blütenknospe (Kaper) in nat. Gr., d Fruchtknoten, verg.)

Fam. 3. Mohnartige (*Papaveraceae*). Milch-



saft enthaltende Kräuter oder Halbsträucher mit abwechselnden nebenblattlosen Blättern und einzelnstehenden oder in Trauben, Trugdolden u. s. w. gestellten, regelmäßigen Zwitterblüten, welche einen zweiblättrigen beim Aufblühen abfallenden Kelch, vier Blumenblätter, viele freie Staubgefäße und einen Fruchtknoten mit sitgender oder sternförmig gelappter Narbe haben. Schotenförmige, mit zwei Klappen aufspringende oder kugelige mit Löchern aufspringende Kapsel, seltener Gliederhülse. Samen mit fleischigem ölhaltigen Eiweiß. — Die Mohngewächse bewohnen vorzugsweise die gemäßigste Zone der nördlichen Halbkugel.

Taf. 30, Fig. 2. Der gebräuchliche Mohn (*Papaver officinale*), im Orient heimische, dort wie auch in Europa häufig angebaute und bei uns oft verwilderte einjährige Pflanze, mit weissen, am Grunde blan oder violett gefleckten Blumenblättern, bringt eiförmige Kapseln (Mohnköpfe, *capita Papaveris*) hervor, welche unter der sternförmigen Narbe keine Löcher bilden wie es bei den meisten übrigen Mohnarten der Fall ist, sondern geschlossen bleiben. Aus dem Milchsaft der unreifen Kapseln wird im Orient das Opium bereitet, die Samen sind öflicnell, auch wird aus ihnen Del geschlagen. (a Stüd eines blühenden Stengels in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b Staubgefäß, c Staubbeutel, verg.; d Fruchtknoten, verll.; e Kapsel, zur Hälfte aufgeschnitten, in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr.; f Same, verg.)

Zu den Papaveraceen gehören ferner: das Schöllkraut (*Chelidonium majus*), mit rothgelbem scharfen Milchsaft, die Eschscholtzia *californica*, *Argemone mexicana* und andere schöne Zierpflanzen.

XX. Ordnung der Polygalinen (*Polygalinae*). Kräuter, selten Sträucher, mit abwechselnden nebenblattlosen einfachen Blättern und meist Zwitterblüten, welche aus einem zwei- bis fünfblättrigen oder vier- bis siebenheiligen Kelche, einer unregelmäßigen, oft zweilippigen Blumentrone, 6—8 in zwei Bündel verwachsenen oder drei bis vielen freien Staubgefäßen und einem oberständigen Stempel bestehen. Frucht sehr verschieden, Samen gewöhnlich mit Eiweiß. — Diese Ordnung zerfällt in die *Sumariaceen*, *Polygalaceen* und *Nesedaceen*. Erstere besitzen vielfach oft in sehr feine Zipfel zertheilte Blätter und zweilippige oder zweitheilige Blüten mit sechs diadelphischen Staubgefäßen. Zu ihnen gehören der gemeine Erdrauch (*Fumaria officinalis*), die Lärchenspinnarten (*Corydalis*) und das getheilte oder Jungfernhertz (*Diclytra spectabilis*). Die *Polygalaceen* haben ganze und ganzrandige Blätter und zweilippige Blüten mit acht diadelphischen Staubgefäßen. Die bekannteste Pflanze dieser Familie ist das Kreuzblümchen (*Polygala vulgaris*) der Wiesen. Die *Nesedaceen* besitzen ganze oder fiederförmig zertheilte Blätter und einständige Aehren oder Trauben, deren Blüten aus einem vier- bis siebenheiligen Kelch, vier bis sieben ungleichgroßen und drei- bis vierspaltigen Blumenblättern, 12—30 freien Staubgefäßen und einem oben offenen Fruchtknoten mit drei Narben bestehen. Die *Sumariaceen* haben schotenförmige mehrsamige Kapseln oder einsamige Nüßchen, die *Polygalaceen* zweilippige ein- oder zweifächerige wenigsamige Kapseln, die *Nesedaceen* oben offene vielsamige Früchte.

Taf. 30, Fig. 1. Der Wau (*Neseda Luteola*), einjähriges in Süd- und Mitteleuropa heimisches und hin und wieder wegen des in seinem Kraut enthaltenen Pigments als Färbepflanze gebautes Gewächs, hat gelbliche Blüten in einer stets einfachen oft über ein Fuß langen Aehre. (a Stengelspitze in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b Blüte von oben gesehen, c Kapsel von der Seite, stark verg.) Eine bekannte Zierpflanze ist die wohl-

riechende, in Südeuropa wild wachsende Reseda (*R. odorata*).

Fig. 3. Die Herzblume, das theilweise getheilte Herz (*Diclytra spectabilis*), aus Dapurien und Nordchina stammend, eine blühende, schöne Zierpflanze. (a Blüte in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b zerlegte Blüte, die die Blüte von *Fumaria officinalis*, von der sie abweicht, zeigt.)

XXI. Ordnung der Lotusartigen (*Nelumbaceae*). Krautartige, meist perennirende, sehr ungelasse, seltener stengeltreibende Wasser- und Gewächse. Blätter meist groß, bei uns grundständig, sehr lang gestielt, bei uns den abwechselnd oder gegenständig, im Herz- oder schildförmiger Scheibe, aber in Regelmäßige Zwitterblüten mit mehreren verschiedenen geformten Blütenboden, Kelch, vielen Blumenblättern und vielen wirtelförmig gestellten Fruchtblättern, einem einzigen Fruchtknoten, welcher aus mehreren, nuss- oder kapselartigen, Samen enthält. Zerfällt in die Familien der *Nelumbiaceen* und *Podophyllaceen*.

Taf. 30, Fig. 4. Die *Victoria*, eine durch riesige unterseits fiedelige Blätter, große, prächtig gefärbte Blumen und einjährige Pflanze der großen Ströme Südamerikas, gehört zu den *Nelumbaceen*. Bekannteste Repräsentanten die weißen und blauen, Seerosen oder Wasserlilien (*Nelumbium alba* u. a., *Nuphar luteum* u. a.) sind Gewässer sind. Die *Nelumbaceen* haben Rhizome, langgestielte schwimmende Blätter, gestielte untergetauchte von anderen (Blätter) und langgestielte grundständige Blätter, auf dem Wasserpiegel schwimmend oder emporragend. Die Blüten besitzen einen sammengesetzten vielschlägerigen Fruchtknoten, oft sternförmiger Narbe, aus dem die Frucht entsteht, deren Fächer mit Samen angefüllt sind. Taf. 30, Fig. 5. Die *Victoria regia* sehr verkleinert an einem Standorte. In unsern Treibhäusern wurde, 1801 von Hanks in einem Amazonasstroms entdeckte Pflanze als Samen erzeugt. In der Familie der *Nelumbaceen* durch in Höhlungen des unteren Blütenbodens eingesetzte Fruchtknoten, samige Nüsse entstehen, sowie durch die von den *Nelumbaceen* unterscheiden, die rühmte heilige Lotusblume der Indier (*Nelumbium speciosum*), deren Frucht

XXII. Ordnung der Berberiden (*Berberidaceae*). Diese Ordnung besteht aus den Berberiden, deren Arten theils Kräuter sind und sich vorzüglich in der Zone beider Hemisphären verbreiten, theils unpaarig gefiedert oder vielfach zertheilte oder fiederförmig zerschnittene oder in Trauben und Rispen, regellos bis neunblättrigen corollinischen Kelch, Blumentrone, ebenso vielen Staubgefäßen und oberständigem einfachen Fruchtknoten, dem eine einsamige, ein- oder wenigkeimige Kapsel entsteht. Samen mit Eiweiß.

Taf. 30, Fig. 5. Der gemeine Berberis (*Berberis vulgaris*), ein dorniger Strauch, der besonders gern auf Kalkboden oft zur Zierde angepflanzt wird, besitzt goldgelbe Blumen und längliche

Beeren. (a blühender Zweig in  $\frac{1}{4}$  nat. Gr., Traube in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., c Blumentlatt, d Staubdrüsenbeutel mit zwei Klappen aufspringt, e Fruchtängschnitt, f Samen im Durchschnitt, verg.)

III. Ordnung der Vielfrüchtler (Polycarpicae). er, Sträucher und Bäume mit einfachen oder zugespitzten, meist nebenblattlosen Blättern und ähigen oder unregelmäßigen, ährigen oder flechtigen Blüten, welche aus einem mehrblättrigen Kelch und einer mehrblättrigen Blumentrone bestehen und viele (mindestens drei) freie oder verwachsene Staubgefäße enthalten, welche oft auf einer Verlängerung des Blütenbodens sitzen und unterhalb deren die meist freien Staubgefäße eingefügt sind. Früchte beeren-, kapsel- oder steinfruchtartig; Samen meist ähig. — Unter den zahlreichen hierher gehörigen sind die folgenden bemerksenswerth.

m. 1. Monbsamenartige (Menispermaceae). me Sträucher mit abwechselnden, einfachen, anhängen, oft schiffelförmigen Blättern und mit unbaren, eingeschlechtigen, in Trauben oder Rispen ten Blüten, welche 3—12 Kelch- und Blumentronen (oder bisweilen nur Kelchblätter) und ebenso Staubgefäße und mehrere Fruchtknoten besitzen, denen eine Beere oder Steinfrucht entsteht. — Menispermeeen sind der Mehrzahl nach Tropenpflanzen, einige in Japan, Sibirien und Nordamerika aufe.

f. 30, Fig. 6. Der Kollersbeerentrauch (*Solus lacunosus*), ein auf den Molukken einheimischer Strauch mit röhrig gruppirten Blütentrauben, welche die giftigen Kollerskörner, welche früher meist waren und jetzt von gewissenlosen Bierbauern fischen benutzt werden, um das Bier berauschend zu machen oder die Fische im Wasser zu betäuben. Kollerskörner sind die getrockneten kugelförmigen Früchte, e die Größe von Kirschen und eine runzelige, e Oberfläche haben. (a blühender Zweig, b ein Ast in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr.).

m. 2. Hahnenfußartige (Ranunculaceae). er, selten Holzgewächse, mit abwechselnden, seltener oder querschnittigen, einfachen, meist handförmig ähigen Blättern und unregelmäßigen, seltener unregelmäßigen Blüten, welche aus einem meist fünfzähligen oder corollinisch gefärbten Kelch, einer mehrzähligen Blumentrone (seht bisweilen), vielen freien Staubgefäßen und mehreren bis sehr vielen freien ein- oder zweiblättrigen Stempel bestehen. Aus letztern entwickeln sich einjährige Nüsschen oder wenigfruchtige Beeren oder samige Balgkapseln. — Die Ranunculaceen, eine große Familie, sind über die ganze Erde verbreitet, e in der gemäßigten Zone der nördlichen Halbkugel häufigsten.

f. 30, Fig. 8. Der scharfe Hahnenfuß (*Anemone nemorosa*), gemeine Wiesenpflanze in ganz Europa, wird gegen drei Fuß hoch, hat handförmig zerchnittene Blätter und glänzend gelbellen. Wie bei allen Ranunkeln enthält jede Blüte Menge in ein Köpfchen gruppirte, an einer Verlängerung des Blütenbodens sitzende Stempel, aus e einjährige Nüsschen hervorgehen. (a blühender Stängeltheil des Stengels in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b Stängeltheil in nat. Gr.).

g. 9. Die Röhrenschelle (*Pulsatilla pratensis*), auf sandigen und felsigen jonnigen Hügeln in Europa vorkommende, im Frühling blühende, kleine Pflanze mit niederer glodenförmiger braunlicher Blüte, deren Hülle bloß aus dem gefärbten Perigon besteht. (a eine ganze Pflanze ohne Wurzel in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b Blütenboden

mit einem der in einem federigen Schwanz — den ausgewachsenen Griffel — auslaufenden Nüsschen, verg.)

Mit den Röhrenschellen sind sehr nahe verwandt die Windblumen (*Anemone*), die sich fast nur durch ungeschwängelte Nüsschen von jenen unterscheiden. Zu dieser Gattung gehört die weißblühende Waldanemone oder das Waldhühnchen (*A. nemorosa*) und das blaublühende Leberblümchen (*A. hepatica*), zwei allgemeyn verbreitete und bekannte Wald- und Frühlingsblumen.

Fig. 10. Die schwarze Nießwurz (*Helleborus niger*), eine in den Kärntner- und Krainer Alpen wachsende, heilkräftige, perennirende Pflanze mit lederartigen fußförmigen grundständigen Blättern von mehrjähriger Dauer und ebenfalls grundständigen, ein- bis zweiblättrigen Blütenstängeln und großen Blüten mit röhlichweißem corollinischen Kelch, aus deren Stempeln mehrsamige Balgkapseln entstehen. Blüht im Winter (December bis März), wird deshalb auch Winter- und Christwurz genannt und nicht selten als Zierpflanze cultivirt. (a Blütenstängel und Blatt in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b Stempel und ein Staubgefäß nebst zwei der röhrigen Blumenblätter, welche viel länger als der Kelch sind, in nat. Gr.; c Stempel im Längsschnitt, verg.; d, e Samen von der Seite, im Längs- und Querschnitt, verg.)

Fig. 11. Der Sturmhut (*Aconitum Napellus*), eine in den Gebirgen Mitteleuropas und Sibiriens an Bächen wild wachsende, in Gärten häufig zur Zierde angebaute Gift- und Heilpflanze mit knolligen Wurzeln und dunkelblauen Blumen, ist besonders, wie alle Arten der Gattung *Aconitum* durch die helmartige Form der Blume ausgezeichnet. Dieser Helm wird aus den fünf sehr verschieden gestalteten corollinischen Kelchblättern gebildet (c). Unter dem obern Kelchblatt liegen die zwei als gestielte Kapuzen ausgebildeten Blumentronenblätter (d). Aus den Stempeln (3—5) entstehen auch hier Balgkapseln. (a Stengelstängel mit einer Blüten- traube und Stengelblatt, b Wurzelstock in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., c Blume, d Staubgefäße und Kronenblätter in nat. Gr.). Mit *Aconitum* ist nahe verwandt die Gattung der Rittersporne (*Delphinium*), deren Blüte zweilappig geformt und gespornt ist. Das oberste der fünf corollinischen Kelchblätter läuft hier in einen hohlen Sporn aus, welcher zwei ebenfalls gespornte Blumentronenblätter umschließt. Verschiedene Arten (*D. Consolida*, *Ajacis*, *elatum*) sind beliebte, sehr verbreitete Zierpflanzen.

Fig. 12. Die Akelei (*Aquilegia vulgaris*), bekannte Zierpflanze mit violetten, dunkelblauen, rosenrothen oder weißen Blumen, welche auch in Deutschland, wie überhaupt in ganz Mitteleuropa und einem Theil von Asien in Laubwäldern wild wachsend vorkommt. Die Gattung *Aquilegia* ist ebenfalls durch den Bau der übrigens vollkommen regelmäßigen Blüte sehr ausgezeichnet. Der corollinische Kelch besteht aus fünf flachen Blättern, die Blumentrone aus fünf mit jenen abwechselnden nach unten in einen hohlen Sporn verlängerten Blumenblättern. Aus den Stempeln entstehen auch hier Balgkapseln. (a blüthentragender Zweig und ein Blatt in  $\frac{1}{2}$  nat. Gr., b Stempel und Staubgefäße, c Stempel im Längsschnitt, verg.)

Fig. 13. Die Pfund- oder Wichtrose (*Paeonia officinalis*), eine in Gebirgsgegenden Mitteleuropas wild wachsende und in Mitteleuropa sehr häufig zur Zierde meist mit gefüllten Blumen angebaute Staude mit knolligen Wurzeln, besitzt wie alle Paeonien einen mit großen doppelt fiederförmigen Blättern besetzten Stengel und endständige große Blüten mit fünf traubigen bleibenden Kelchblättern und 5—10 purpurnen Blu-





hältnisse der Atmosphäre in der verschiedenen Pflanzenarten, Gattungen und Familien horizontaler als verticaler Richtung (in Ge- entchieden auf. A. v. Humboldt ver- tlich die Orte gleicher mittlerer Jahres- durch Linien und nannte diese Linien n. Diese Linien verlaufen zwar parallel, Parallelkreise oder Breitengrade, aber parallel mit dem geographischen Aequator, en die verschiedenartigen Krümmungen welche theils durch große Wassermassen n), theils durch hohe Gebirge und beson- bedingt sind, worauf hier nicht weiter ein- den kann. Der thermische Aequator, d. h. die r höchsten mittleren Jahrestemperatur von chneidet den geographischen Aequator an a, in der Sundstraße und im Großen nte Punkte der niedrigsten Mitteltemperatur itäpole. Und zwar nimmt man auf der Abzug 2 Kältepole an, von denen der eine n in Sibirien (im Meridian von Irkutsk), (—19,7° C.) in Amerika im Meridian o liegt. Größer als der Einfluß des Ver- othermen hat sich derjenige des Verlaufs then und Isothermen, d. h. der Linien lerer Sommer- und Wintertemperatur auf ng der Pflanzen herausgestellt. Nur wenige über die ganze Erdoberfläche verbreit- che Pflanzen), die meisten haben einen viel Verbreitungsbezirk (Areal), bei dem man und äquatoriale, eine Ost- und Westgrenze . Der Verlauf der Isothermen und Isothermen glich die Grenzen der Verbreitungs- inden und Norden, und da sich diese unter n Linien schneiden, auch die Grenzen gegen Osten. So wird z. B. der Verbreitungs- richte (*Abies excelsa*) gegen Norden und er Isothermen von — 10°, gegen Süden von der Isotherme von + 15° begrenzt. Erhebung über die Meeresfläche die mittlere des Jahres und der Jahreszeiten ähnlich, horizontalen Richtung vom Aequator nach abnimmt (im Durchschnitt entspricht eine e von 90 bis 100 Toisen einer Wärme- n 1° C.), so wird der Verbreitung einer in verticaler Richtung, also in Gebirgen, bestimmte mittlere Temperatur des Winters t. Wirkliche Gebirgspflanzen, d. h. solche n Gebirgen, nicht aber in der Ebene (im Meeresoberfläche) gedeihen, zeigen eine untere Grenze ihres Verbreitungsbezirks, die untere Grenze durch eine bestimmte mmertemperatur, die immer geringer jein mittlere Sommertemperatur der Tiefebene, . Nicht minder einflußreich als die Ver- der Wärme ist die Verschiedenheit des itz gehalten der Luft und der Menge der ischen Niederschläge (kurzweg Regen- unt). Durch sie wird vorzugsweise die Ver- des Küsten- oder Insel- und des Con- mas bedingt. Letzteres zeichnet sich durch er und kalte Winter, im Sommer durch und sähle Nächte, überhaupt durch große der Temperatur und droßte Uebergänge Extrem zum andern, wie durch eine ver- trodene Luft und geringe Regenmenge nd das Küstenklima milde Sommer und Sommer wenig heiße Tage und warme e großen Temperaturextreme und sanfte von einem Extrem zum andern, endlich

eine stets feuchte Luft und bedeutende Regenmenge zeigr. Da nun die Mehrzahl der Pflanzen einen gleichmäßigen Gang der Temperatur und eine reichliche Menge von Luftfeuchtigkeit und Regen liebt, so erklärt es sich, weshalb in Küstengegenden und auf Inseln die Vege- tation stets reicher zusammengesetzt und üppiger ist als im Innern großer Continente. Je höher zugleich die Mitteltemperatur des Jahres ist, desto reichhaltiger pflegt auch, eine passende Bodenbeschaffenheit voraus- gesetzt, die Vegetation der Küstländer und Inseln zu sein, z. B. unter dem Aequator und in den Tropen- gegenden. Sehr modificirend wirken aber auf diese Verhältnisse die kalten und warmen Luft- (die Winde) und Meeresströmungen ein. Der warme Golf- strom, welcher aus dem Meerbusen von Mexico kommend längs der norwegischen Küste um das Nordcap ins Nördliche Eismeer vordringt, modificirt das Küsten- klima Norwegens so bedeutend, daß in Lappland noch unter 70° Breite Roggen gebaut werden kann, während diese Getreideart an der gegenüberliegenden Küst- von Grönland schon unter dem 60° nicht mehr gedeiht. Die kalten Ostwinde, welche im Winter und Frühling von Sibirien her das große osteuropäische Flachland be- streichen, machen den Winter in den Ostseeprovinzen Rußlands um vieles kälter, als in dem unter gleicher Breite gelegenen Schottland. Im allgemeinen hat sich aber herausgestellt, daß auf der nördlichen Halbkugel die Ostküsten ein beträchtlich kälteres Klima haben als die Westküsten. Ueberhaupt wird das Klima eines Landes durch die Lage (Exposition) zur Himmelsgegend und im Innern durch die Erhebung des Bodens, durch das Vorhandensein oder Fehlen großer Wasser- und Waldmassen u. s. w. vielfach modificirt, doch kann hier auf eine Erörterung der localen Verschiedenheiten des Klimas nicht eingegangen werden.

Unter Beachtung der Verschiedenheiten des Klimas und besonders der Wärme auf der Erdoberfläche hat man nun folgende pflanzengeographische Zonen (in horizontaler Richtung) und Regionen (in verticaler Richtung) festgesetzt.

1. Die Äquatorial- oder Äquinoctialzone, vom Aequator bis 15° nördl. und südl. Br., zwischen den Isothermen von + 28 und 26° C. gelegen, oder die Zone der Palmen und Bananen.

2. Die tropische Zone oder die Zone der Feigen- bäume und Baumfarn, von 15 bis 28° Br. (auf jeder Hemisphäre), zwischen den Isothermen von + 25 und 23° C. gelegen.

3. Die subtropische Zone oder die Zone der Myrten und Lorbern, von 23 bis 34°, zwischen den Isothermen von + 23 und 17°.

4. Die wärmere gemäßigte Zone oder die Zone der immergrünen Laubbölzer, von 34 bis 45°, zwischen den Isothermen von + 17 und 12°.

5. Die kältere gemäßigte Zone oder die Zone der sommergrünen Laubbölzer, von 45 bis 58°, zwischen den Isothermen von + 12 und 6°.

6. Die kalte Zone oder die Zone der Nadel- hölzer, von 58 bis 66°, zwischen den Isothermen von + 6 und 4°.

7. Die arktische (resp. antarktische) Zone oder die Zone der Alpensträucher, von 66 bis 72°, zwischen den Isothermen von + 2 und 0° C.

8. Die Polarzone oder die Zone der Alpen- träuter, vom 72° Breitengrade und der Isotherme von 0° C. an.

Diesen acht Zonen entsprechen zwischen den Wende- streifen und besonders unter dem thermischen Aequator folgende acht Pflanzenregionen:

1. Heiße Region oder Region der Palmen

und Bananen, von der Meeresfläche bis 1900 par. Fuß, mit einer mittlern Jahrestemperatur von  $+ 27$  bis  $23^{\circ}$  C.

2. Untere warme Region oder Region der Feigen und Baumfarn, von 1900 bis 3800 Fuß, mit  $+ 23$  bis  $20^{\circ}$  C. mittlerer Jahrestemperatur.

3. Obere warme Region oder Region der Myrten und Lorbern, von 3800 bis 5700 Fuß und einer Mitteltemperatur des Jahres von  $+ 20$  bis  $17^{\circ}$  C.

4. Laue Region oder Region der immergrünen Laubhölzer, von 5700 bis 7600 Fuß und  $+ 17$  bis  $14^{\circ}$  Jahrestemperatur.

5. Kühle Region oder Region der sommergrünen Laubhölzer, von 7600 bis 9500 Fuß und einer Jahrestemperatur von  $+ 14$  bis  $11^{\circ}$  C.

6. Kalte Region oder Region der Nadelhölzer, von 9500 bis 11400 Fuß und einer Jahrestemperatur von  $+ 11$  bis  $7^{\circ}$  C.

7. Untere Schneeregion oder Region der Alpensträucher, von 11400 bis 13300 Fuß, und einer Jahrestemperatur von  $+ 7$  bis  $4^{\circ}$  C.

8. Obere Schneeregion oder Region der Alpenkräuter, von 13300 bis 15200 Fuß und darüber, mit einer mittlern Jahrestemperatur von  $+ 3^{\circ}$  bis  $0^{\circ}$  C. und weniger.

Für die Alpen, welche sich auf der Grenze zwischen der kältern und wärmern gemäßigten Zone befinden, hat Beer folgende fünf Regionen aufgestellt: 1) Untere Laubwald- oder angebaute Region, von der Ebene (1000 Fuß) bis 2500 Fuß; 2) obere Wald- oder Buchenregion, von 2500 bis 4000 Fuß; 3) Region der Nadelhölzer oder subalpine, von 4000 bis 5500 Fuß; 4) Region der Alpensträucher oder untere alpine, von 5500 bis 7000 F.; 5) Region der Alpenkräuter oder obere alpine (Schneeregion), von 7000 Fuß bis an die Grenze des ewigen Schnees.

Während die Beschaffenheit des Bodens und klimatische Verhältnisse die Vertheilung einer Pflanzenart innerhalb ihres Verbreitungsbezirks und die Ausdehnung des letztern in der Hauptsache bedingen, wird die unmittelbare Verbreitung der Pflanzen selbst theils durch Wind- und Wasserströmungen, theils durch Thiere und Menschen vermittelt. Eine Unzahl von Samen und Früchten von Tausenden von Pflanzen werden alljährlich durch den Wind über weite Länderstrecken verbreitet, andere durch Flüsse aus den Gebirgen in die Ebenen hinab, oder durch Meeresströmungen und Wegengang von einer Küste an die andere geschwemmt. So erscheinen im Bett der Isar bei München Pflanzen, die in den höhern Regionen der Alpen heimisch sind, so werden alljährlich vom Golfstrom Samen amerikanischer Pflanzen an die Küsten Europas gespült, die sich hier entweder, gewöhnlich nur vorübergehend, ansiedeln oder zu Grunde gehen. Durch den Wind werden namentlich leichte, zumal mit Haarbüscheln, Federkronen und andern Flugorganen versehene Samen und Früchte, durch das Wasser schwerere Samen und Früchte fortgeführt. Meeren und andere saftige Früchte werden von vielen Vögeln als Nahrung benützt und ihre Samen mit den Excrementen dieser Thiere oft in weiter Ferne von dem Standort der Pflanze der Erde übergeben. Daraus erklärt sich z. B. die so unregelmäßige und sporadische Verbreitung der gemeinen Mistel (*Viscum album*) in Europa. Aber auch der Mensch hat wesentlich zur Verbreitung vieler Pflanzen beigetragen und thut dies noch alljährlich. Nicht allein hat das wandernde Menschengeschlecht eine große Anzahl Kulturpflanzen über weite Länderstrecken, ja (z. B. den Weizen) fast über die ganze Erdoberfläche verbreitet; mit den Kultur-

pflanzen sind von den Menschen auch in große Menge von Unkräutern, welche es zu wissen Kulturpflanzen zusammenzubringen. Derselben Unkräuter, welche in Deutschland wachsen, finden sich theil auch in Amerika und Neuholland. Kulturpflanzen, deren Anbau seit Jahrhunderten betrieben worden ist, kennen wir noch die Stammpflanze; aber ihre Heimat ist unbekannt. So folgte die Weinrebe den Weizen den Römern, der Roggen den Arabern in alle diese Völker bei der Ausbreitung ihres Handels drangen. Zu Cato's Zeiten Römern weder süße Kirschen, noch Maulbeerbäume. Alle diese Früchte Asien gekommen, obwohl von vielen Früchten des Südkirschenbaums, der unterer Vogelfirschenbaum (*Prunus avium*) dieser nicht etwa als ein verwildertes zu betrachten ist — behauptet wird, in Europa, wo die Vogelfirsche ja häufig findet, einheimisch sei. Ein Südkirschen reifen Früchten beladen, schmückte den Lucullus. Schon hundert Jahre Kultur dieses Baums in Frankreich. Deutschland verbreitet.

Hinsichtlich der Vertheilung der Pflanzen innerhalb des Verbreitungsbezirks gibt es ein Maximum und Minimum erkennen gilt von der Vertheilung der Arten innerhalb des Verbreitungsbezirks der Vertheilung der Gattungen einer Verbreitungsbezirke. So kommen z. B. der Erde mehr Gattungen und Arten naceen vor, wie im tropischen Afrika reicht diese über die ganze Erdoberfläche Familie das Maximum ihres Verbreitungsbezirks dem Vorherrschen bestimmter Pflanzen der Zusammenfassung der Vegetation der ganzen Erdoberfläche in 25 pflanzengeographische eingetheilt, welche wieder in Breitengebiete zerfallen, z. B. ein Reich der Cruciferen angenommen, welches die Europa und eine breite Zone von Mittel- und in die beiden Provinzen der Mittel- und mitteleuropäische Flora) und der Palophyten und Cynarocephalen (mittleren zerfällt. Römern dagegen nimmt nur der ganzen Erde an, denen er geographisch gibt: 1) das nordische, 2) das mittlere, 3) das südasiatische, 4) das ostindische, 5) das afrikanische, 6) das amerikanische, 7) das mittelamerikanische, 8) das antarktische.

Aufgabe der Statistik der Vegetation die Gesamtzahl der Arten, welche die Vegetationsbede der Erde zusammengefasst eine Aufgabe, von deren Lösung weit entfernt sind. Ja, es ist sogar unmöglich, die Zahl der bekannten vielleicht auf 10000 zu setzen. Leichter ausführbar und ist es, die Verhältniszahlen zu ermitteln innerhalb eines gegebenen Florengebietes eines Erdtheils, z. B. Europas) die Arten und Gattungen hinsichtlich ihrer Verbreitung und die gefundenen Verhältnisse.

rselben Familien und Gattungen der an- oder anderer Florengebiete zu vergleichen, sch allein kann ein klarer Ueberblick über die ehung der Vegetation eines Florengebiets werden. Man ermittelt zunächst die Gesamt- pflanzen oder der einer bestimmten Abtheilung reichs (z. B. den Dicotylen) angehörigen es gewählten Florengebiets, und vergleicht Summe sämtlicher Arten einer jeden rdnung u. s. w. Das gefundene Resultat der durch einen gemeinen Bruch oder durch tisches Verhältniß ausgedrückt. So bilden z. B. ulaceen auf Sicilien  $\frac{1}{100}$  der Gesamtzahl pflanzen oder verhalten sich zu diesen wie 1:50. eichung der Floren von Sicilien, Deutschland ansehnliche des ehemaligen Deutschen Bundes) und ergibt unter andern, daß sich in diesen drei Gesamtzahl ihrer Samenpflanzen verhalten:

|        | in Sicilien | in Deutschland | in Schweden |
|--------|-------------|----------------|-------------|
| neen   | wie 1:10,6  | 1:12,3         | 1:11,4      |
| ceen   | wie 1:40,0  | 1:18,6         | 1:12,5      |
| siten  | wie 1:8,7   | 1:8,2          | 1:11,1      |
| ren    | wie 1:21,0  | 1:18,2         | 1:22,2      |
| inosen | wie 1:8,8   | 1:18,4         | 1:25,0      |

lan übersieht hieraus mit einem Blick, daß die r Arten der angeführten Familien in Europa nach Norden abnimmt. Auf dieselbe Weise die Holzgewächse, perennirenden, zwei- und pflanzen verschiedener Florengebiete mitein- gleichen.

hysiognomik der Vegetation hat den eigen- Charakter (die Physiognomie) der Vegetation Zone und Region, eines jeden pflanzengeo- Reichs und Florengebiets festzustellen und n, durch welche in der Vegetation eines jeden ebiets enthaltenen Pflanzen oder Pflanzen- essen Physiognomie bedingt wird. Solche ysiognomie der Vegetation bestimmende Pflanzen- at A. von Humboldt Pflanzenformen ge- deren 16 unterschieden. Spätere Pflanzen- n vermehren diese Zahl auf 20, und wir en 35 annehmen, nämlich: 1) die Gräser- die Bananenform, 3) die Pandanenform, omeliaceenform, 5) die Agavenform, 6) die m, 7) die Jarnform, 8) die Mimosenform der zartgefiederten Laubbäume, 9) die Zug- rm oder Form der großgefiederten Laubbäume, orm der Laubbäume mit einfachen Blättern, oniferenform oder Form der nadel- und ätterigen Bäume, 12) die Casuarinenform, rotecen, Erlen- und Spacridenform, 14) die m, 15) die Cistusenform, 16) die Rosenform, orm der strauch- und baumartigen Compositen, orm der strauchartigen Labiaten, 19) die m, 20) die Ultragaleenform, 21) die Umbelli-, 22) die Distelform, 23) die Cactusform, raffiaceenform, 25) die Lilienform, 26) die mform, 27) die Orchideenform, 28) die Potos- ) die Vianenform, 30) die Loranthaceenform, orm der Halbsträucher, 32) die Form der ter, 33) die Moosform, 34) die Flechtenform, remmenform. Die Beschränktheit des Raums icht, alle diese Pflanzenformen zu schildern; daher nur einige der wichtigsten herausgegriffen charakterisirt werden. Die Palmenform, : außer den eigentlichen Palmen auch die baum- (liaceen (Yucca) und Asparageen (Dracaena) ist von alters her als die edelste Pflanzen- achtet worden. Sie nimmt vom Aequator

nach der gemäßigten Zone hin an Stärke und Größe ab; dennoch verleiht die beiseitende aller Palmen, die niedrige europäische Zwerpalme (*Chamaecrops humilis*), wenn sie große Strecken in dichtem Bestande bedeckt (z. B. in den Ebenen Andalusiens), der Vegetation ein sehr eigenthümliches Gepräge. Zu den Palmen gesellt sich in allen Tropenländern die Vananenform, von den Scitamineen und Marantaceen gebildet. Niedrige, aber saftreiche fast krautige Stämme tragen dünn und loder gewebte, zartgestreifte, seidenartig glänzende Blätter von bisweilen riesiger Größe. Auf ihrer Frucht beruht die Nahrung fast aller Tropenbewohner. Wenn der getreidebauende Mitteleuropäer einformige weitge- dehnte Grasskuren hervorbringt, die wenig den Anblick der Landschaft verschönern, so vervielfacht dagegen der sich ansiedelnde Tropenbewohner durch Bananenpflanzungen eine der herrlichsten Pflanzengestalten. Die Mimosenform, Bäume und Sträucher mit doppelt und dreifach gefiederten oder einfach aber zart (leinblättrig) gefiederten Blättern (*Acacia*, *Mimosa*, *Tamarindus*, *Schinus* u. a.), ist ebenfalls den Tropengegenden ange- hörig und gereicht denselben zu hohem Schmuck. Ihr feingefiedertes Laub hat etwas unbeschreiblich Lustiges und Elegantes. Eine Erschütterung des Bodens, sogar der Hufschlag eines dahineilenen Pferdes ist hinreichend, um solche Pflanzengassen in Bewegung zu setzen. Die tiefe Himmelsbläue, durch die zartgefiederten Blätter schimmernd, ist von überaus malerischem Effect. Die Cactusform, starre, säulen- oder schlangenförmige, kugelige, fleischig gefiederte blattlose, oft von Stacheln starrende, aber mit in den brennendsten Farben prangen- den Blüten besetzte Pflanzengestalten, belebt die öden, fast vegetationslosen Wüsten und nassen Felsengenden des westlichen Südamerika und Mexico und bringt einen höchst eigenthümlichen Zug in die Physiognomie der Landschaft. Im tropischen Afrika ist diese Form durch die cactusartigen Euphorbien, die fleischigen Ca- calien, am Cap durch die Stapelien repräsentirt. Die Form der Nadelhölzler belebt durch ihr ewiges Grün die Winterlandschaften der kalten und gemäßigten Zone, verleiht aber, in reinen Beständen allein wachsend, als ausgedehnter Nadelwald, der von ihr bedeckten Land- schaft eine einformige, ja düstere Physiognomie. Sehr angenehm wirkt dagegen diese Pflanzenform im Gemisch mit der hellgrün beblätterten Form der einfachblät- terigen sommergrünen Laubhölzler. Diese beiden Pflanz- genformen bestimmen vorzugsweise den Vegetations- charakter in der kältern gemäßigten und kalten Zone.

Erläuterung der Karte. Nr. 1 zeigt die Ver- breitung des Anbaues der wichtigsten Culturpflanzen der Erde auf deren gesammter, in Mercator's Pro- jection dargestellten Oberfläche. Die einzelnen Cultur- pflanzen sind durch verschiedene Farben und Zeichen angegeben. Man übersieht mit einem Blick, daß unter den einzelnen Getreidearten der Weizen die größte Verbreitung gefunden hat, indem derselbe rings um die Erde, auf beiden Hemisphären gebaut wird. Doch nimmt sein Anbau auf der nördlichen Halbkugel ungleich größere Flächen ein, als auf der südlichen. Im tro- pischen Asien erscheint der Weizen durch den Reis er- setzt, welcher auch im tropischen Afrika und selbst in Südamerika bedeutende Flächen einnimmt. Verglichen mit diesen beiden Getreidearten steht der Roggen, eine vorzugsweise für die kältere gemäßigte Zone geeg- nete Brotrucht, bei weitem zurück. Mit dem Weizen wird fast überall Gerste, mit dem Roggen Hafer an- gebaut; beide Getreidearten gedeihen aber auch noch jenseits der Polargrenze des Roggenbaus und bilden daher in Nordamerika und in Sibirien noch eine breite Culturzone für sich allein. In der Neuen Welt, na-





# Mineralogie.

Bearbeitet

von

A. Stelzner,  
Prof. an der Bergakademie zu Freiberg.

und

Dr. Otto Prösch,  
Hütteningenieur zu Bergisch-Gladbach.

# I n h a l t.

|                                                             | Seite | Seite |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Einleitung . . . . .                                        | 3     |       |
| A. Morphologische Eigenschaften der Mineralien . . . . .    | 4     |       |
| 1. Das tesserale System . . . . .                           | 5     |       |
| 2. Das tetragonale System . . . . .                         | 6     |       |
| 3. Das hexagonale System . . . . .                          | 6     |       |
| 4. Das rhombische System . . . . .                          | 7     |       |
| 5. Das monoklinische System . . . . .                       | 7     |       |
| 6. Das triklinische System . . . . .                        | 8     |       |
| Unvollkommenheiten der Krystallbildung . . . . .            | 8     |       |
| Krystallmessung . . . . .                                   | 9     |       |
| Mineralaggregate . . . . .                                  | 9     |       |
| Pseudomorphosen . . . . .                                   | 10    |       |
| B. Physikalische Eigenschaften der Mineralien . . . . .     | 10    |       |
| 1. Spaltbarkeit und Bruch . . . . .                         | 10    |       |
| 2. Härte und Tenacität . . . . .                            | 10    |       |
| 3. Dichtigkeit oder specifisches Gewicht . . . . .          | 11    |       |
| 4. Magnetismus . . . . .                                    | 11    |       |
| 5. Optische Eigenschaften . . . . .                         | 11    |       |
| 6. Elektrische Eigenschaften . . . . .                      | 12    |       |
| C. Chemische Eigenschaften der Mineralien . . . . .         | 13    |       |
| D. Beschreibung der wichtigsten Mineralien . . . . .        | 14    |       |
| I. Klasse. Metalloide . . . . .                             | 14    |       |
| II. Klasse. Salze . . . . .                                 | 15    |       |
| 1. Familie. Kohlenfaure Salze (Carbonate) . . . . .         | 15    |       |
| 2. " Schwefelsaure Salze (Sulphate) . . . . .               | 16    |       |
| 3. " Borfaure Salze (Borate) . . . . .                      | 17    |       |
| 4. " Salpetersaure Salze (Nitrate) . . . . .                | 17    |       |
| 5. " Phosphorsaure Salze (Phosphate) . . . . .              | 17    |       |
| 6. Familie. Fluorverbindungen (Fluoride) . . . . .          | 17    |       |
| 7. " Chlorverbindungen (Chloride) . . . . .                 | 17    |       |
| III. Klasse. Steine . . . . .                               | 17    |       |
| 1. Familie. Kiesel . . . . .                                | 17    |       |
| 2. " Feldspatartige Mineralien . . . . .                    | 17    |       |
| 3. " Zeolithe . . . . .                                     | 17    |       |
| 4. " Glimmer . . . . .                                      | 17    |       |
| 5. " Amphibole . . . . .                                    | 17    |       |
| 6. " Edelsteine . . . . .                                   | 17    |       |
| IV. Klasse. Schwere Metalle und ihre Verbindungen . . . . . | 17    |       |
| 1. Familie. Eisen . . . . .                                 | 17    |       |
| 2. " Mangan . . . . .                                       | 17    |       |
| 3. " Kobalt und Nickel . . . . .                            | 17    |       |
| 4. " Zink . . . . .                                         | 17    |       |
| 5. " Kupfer . . . . .                                       | 17    |       |
| 6. " Blei . . . . .                                         | 17    |       |
| 7. " Silber . . . . .                                       | 17    |       |
| 8. " Gold . . . . .                                         | 17    |       |
| 9. " Platin . . . . .                                       | 17    |       |
| 10. " Quecksilber . . . . .                                 | 17    |       |
| 11. " Zinn . . . . .                                        | 17    |       |
| 12. " Antimon . . . . .                                     | 17    |       |
| 13. " Arsen . . . . .                                       | 17    |       |
| 14. " Wolfram . . . . .                                     | 17    |       |
| 15. " Bismut . . . . .                                      | 17    |       |
| 16. " Antimon . . . . .                                     | 17    |       |
| 17. " Arsen . . . . .                                       | 17    |       |
| E. Edelsteinkunde . . . . .                                 | 17    |       |

(Die Bearbeitung der Tafeln hat Herr Professor H. Steffaner, die des Textes Herr Dr. Otto Prösch geleitet.)



## Einleitung.

Mineralogie (Naturgeschichte der Mineralien) seit der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts streng wissenschaftlichen Charakter.

Man hat auch schon in den ältesten Zeiten die Erze zur Gewinnung der Metalle, die Edelsteine und andere, besonders hervorragende Eigenschaften auszeichnende Mineralarten, zur Schmückung von Waffen, zu Gebäuden zu benutzen verstanden, so waren aber das Alterthum und bis an das Ende des 17. Jahrhunderts nur Vergleiche, Steinschneider, kurz in der Praxis mit diesen Dingen zu thun, ohne vereinzelte empirische Kenntnisse; die Naturphilosophen aber beschränkten sich, sozuerst hauptsächlich Mineralien in den Kreis ihrer Betrachtungen, darauf, über alle möglichen, den irdischen übernatürlichen Eigenschaften zu entsprechen, sich über deren heilkräftigen Tugenden zu den Gestirnen in unfruchtbaren Versuchen zu ergeben; alles tiefere Verständniß der physikalischen und chemischen Eigenschaften entbehrte die Bildung der Mineralien, über ihre Entstehung aus der Natur waren sie in völliger

Unkenntnis. Im 16. und 17. Jahrhundert wendet diesem wissenschaftlichen Forschung nur wenig Interesse zu. In diese Zeit der erste Versuch, die Mineralien in ihrer Beschreibung durch die Erkenntnis der Unveränderlichkeit der Kristallwinkel durch Nikolaus Steno (1667) die Entdeckung der Spaltbarkeit und der Eigenschaften des Kalkspats durch Bartholin (1670); aber alles das sind vereinzelte, zusammenhanglose Lichtblicke in der Mitte des 18. Jahrhunderts nimmt man diesem Forschungsgebiet eine bestimmtere Gestalt an, indem Wallerius (1747) die Kenntniss sucht, Cronstedt (1758) den Begriff der Spaltbarkeit mehr als bisher auf die Zusammensetzung lenkt, Bergmann (1782) (1785) die ersten genaueren Mineralanalysen führen, Romé de l'Isle aber, gestützt auf Messungen mit dem durch Berthollet erfundenen Goniometer, nicht nur die Bestimmtheit der Winkel in umfänglicher Weise bestätigt, sondern das Gesetz des Flächenparallelismus begründet. Auf diesen Grundlagen fortbauend, konnte Werner (1750—1817) eine streng wissenschaftliche Mineralogie einführen, die Geognosie von der Chemie abtrennen und der heutigen wissenschaftlichen Mineralogie ihre sichere Basis geben.

Die rasche Entwicklung, welche die exacten Wissenschaften, namentlich Physik und Chemie finden, hat ein gewaltiger Fortschritt der Mineralogie bewirkt. (1743—1822) entdeckte die Symmetriegesetze der Kristalle, die Achsenveränderung der Kristalle

durch rationale Ableitungskoeffizienten, verband mit der Ableitung der Kristalle eine Theorie über den Aufbau derselben, paßte dieser letztern scharfe Kristallbezeichnungen an und machte so die Kristallographie zu einer fest abgeschlossenen Wissenschaft. Die Construction des Reflexionsgoniometers durch Wollaston (1809) brachte der letztern großen Gewinn, und Weiß, Mohs und Naumann konnten ihr nun ihre heutige Gestalt geben.

In der Kristallphysik wurde die Entdeckung der Polarisation durch Malus (1809) von weittragender Wichtigkeit, denn schon 1813 konnte Brewster die Kristallsysteme mit ihrer Hilfe unterscheiden, und im Anschluß hieran Briot, Haidinger, des Cloizeaux unsere Kenntnisse von der Optik der Kristalle erweitern, während G. Rose und Guntel die elektrischen Eigenschaften derselben begründeten. Die Mineralchemie erreichte durch Berzelius (1779—1848) eine ungeahnte Höhe und gewann durch Mitscherlich's Entdeckung des Isomorphismus (1818) einen neuen Reiz. Zahlreiche Chemiker, Gmelin, H. Rose, Wöhler, Scheerer, Rammelsberg u. a. erweiterten die Kenntnisse von der chemischen Zusammensetzung der Mineralien, Plattner vervollkommnete in hohem Grade die Benutzung des Löthrohrs, während sich Becquerel, Ebelman, Daubrée und Gautefeuille erfolgreich mit der künstlichen Bildung der Mineralien beschäftigten, Breithaupt, Haidinger, Blum und Bischof aber die in der Natur fortwährend vor sich gehenden Umwandlungsprozesse der Mineralien und die durch dieselben gebildeten Pseudomorphosen studierten. Endlich führten neuerdings Sorby und Zirkel die mikroskopische Untersuchung der Mineralien ein und erschlossen mit ihr ein neues, zu schönen Hoffnungen berechtigendes Feld.

Die Systematik spaltete sich, je nachdem sie wesentlich auf die morphologischen und physikalischen Kennzeichen der Mineralien oder auf deren chemische Zusammensetzung Rücksicht nahm, in die sogenannte naturhistorische Methode (Mohs, Haidinger, Breithaupt) und in eine rein chemische Klassifikation (Berzelius, Blum, Kobell, Dana). Indessen, je mehr durch kristallographische, physikalische und chemische Studien die Erkenntnis von dem innigen Zusammenhange zwischen allen den verschiedenen Eigenschaften der Mineralkörper an Boden gewann, um so mehr wurde auch jene Einseitigkeit verlassen und die Klassifikation gleichzeitig auf beide Reihen von Kennzeichen gegründet; allerdings unter vorwiegender Berücksichtigung der chemischen Zusammensetzung (Deubant, Rose, Naumann, des Cloizeaux).

Indem man heute mit dem Wort Mineral jeden homogenen, starren oder tropfbar flüssigen anorganischen Körper bezeichnet, der so, wie er erscheint, ein unmittelbares, ohne Mitwirkung organischer Prozesse und ohne Zutun menschlicher Willkür entstandenes Naturproduct ist, so versteht man unter Mineralogie im weiteren Sinne des Wortes die Wissenschaft von den Mineralien nach allen ihren Eigenschaften und

Relationen, nach ihrem Sein und Werden, nach ihrer Bildung und Umbildung. Mineralogie im engeren Sinne (Naturgeschichte der Mineralien) ist dagegen die wissenschaftliche Kenntniß der Mineralien nach ihren gesammten Eigenschaften und nach ihrem gegenwärtigen Sein.

Um zu einer möglichst vollständigen Kenntniß der einzelnen Mineralien zu gelangen, muß man diese nach drei Richtungen hin untersuchen; man muß zunächst die ihnen eigenthümliche Form kennen lernen, sodann sich mit ihren physikalischen Eigenschaften bekannt machen und endlich ihre chemische Zusammensetzung zu ergründen suchen.

Mit Hülfe dieser drei Gruppen von Eigenschaften wird man dann im Stande sein, nicht nur sich ein richtiges Bild von jedem Mineralkörper zu entwerfen, abthliche, aber doch verschiedene Mineralien voneinander zu unterscheiden, sondern auch, wenigstens in vielen Fällen, ihre etwaige technische Nutzbarkeit zu beurtheilen.

## A. Morphologische Eigenschaften der Mineralien.

Die bei weitem größte Mehrzahl der Mineralien besitzt eine ursprüngliche, ringsum abgeschlossene, mehr oder weniger regelmäßige polyedrische Form, welche für die Substanz wesentlich ist und mit welcher verschiedene physische Eigenschaften (Cohärenzverhältnisse, optische und elektrische Eigenschaften, Ausdehnungsvermögen durch Wärme u. a.) in dem genauesten, mathematisch nachweisbaren Zusammenhang stehen. Derartige, von ebenen Flächen, von Kanten und Ecken (den Begrenzungselementen) begrenzte Körper, welche als die Individuen des Mineralreichs aufzufassen sind, nennt man Krystalle, die Wissenschaft aber, welche sich speciell mit der Erörterung ihrer Verhältnisse beschäftigt, die Krystallographie. Solche Mineralien, denen die Eigenschaft abgeht, im krystallinischen Zustande aufzutreten, bezeichnet man als amorphe (gestaltlose).

Diejenige Formenähnlichkeit, welche die Individuen einer und derselben Thier- oder Pflanzenart charakterisirt, geht allerdings jenen Individuen des Mineralreichs ab, denn in der Regel tritt eine und dieselbe Mineralspecies in sehr verschiedenen Krystallgestalten auf, die dem ersten Anschein nach nichts miteinander gemein haben (vgl. die Taf. 2, Fig. 2, 5, 11—20 und 22 abgebildeten Krystalle des Minerals Kalkspat). Sorgfältigere Prüfung ergibt indessen bald, daß diese sich scheinbar fremden Formen für jedes Mineral in dem innigsten stereometrischen Zusammenhang stehen und sämmtlich auf streng mathematischem Wege von einer einzigen Grundgestalt abgeleitet werden können. Außerdem entbehren die Mineralindividuen, gegenüber denen der organischen Welt, gewöhnlich eine ringsum freie und vollkommen regelmäßige Formausbildung, besonders weil die Krystallisation in dem Contacte mit fremden Körpern oder mit andern, in der unmittelbaren Nachbarschaft gleichzeitig sich entwickelnden Individuen ein Hinderniß fand; endlich sind auch die Individuen des Mineralreichs nach ihrer absoluten Größe nicht wie die Organismen an ein bestimmtes Normalmaß gebunden. Bei der theoretischen Betrachtung der Krystallgestalten sieht man von etwaigen zufälligen Störungen in ihrer Ausbildung ab, und hält sich nur an die ideal vollkommenen Formen.

Die Krystallflächen, welche sich in Kanten und Ecken schneiden, sind sehr mannichfaltiger Art; man kennt das gleichseitige Dreieck, das Quadrat, den Rhombus (Raute), ferner unregelmäßige Dreiecke, Vierede u. s. w. Das rechtwinkelige Dreieck sowie das reguläre Fünfeck

fehlen. Die Begrenzungselemente der Krystalle scheidet man in gleichwerthige und ungleichwerthige; die erstern sind in allen ihren entsprechenden Flächen also z. B. nach Seiten hin vollkommen übereinstimmend, und liegen in gleicher Entfernung vom Krystallmittelpunkte, welche man sich durch den Mittelpunkt der Flächen und welche zwei gleichwerthige Begrenzungselemente (gleichwerthige Ecken oder Ecken solcher Ecken und Kanten), nennt man Krystalltheile einer Krystallgestalt sind diese Theile symmetrisch geordnet.

Daraus folgt von selbst, daß die Krystallsysteme von größter Wichtigkeit sind, gibt sich bei der Prüfung der bekannten Krystalle, daß denselben verhältnismäßig ganz verschiedene, dergleichen Systeme zu Grunde liegende, welche sich theils durch relative Größe, theils durch gegenseitige Lage ihrer Krystalltheile unterscheiden. sechs vorhandenen Krystallsystemen sind viel Krystallsysteme, von denen jedes auf dasselbe Achsenkreuz zurückgeführt werden kann, gestalten unter sich begreift.

Die Krystallformen sind theils einfach, theils halbschlächtige; die erstern werden von einer einzigen Ebene begrenzt, als nach dem betreffenden System um das Achsenkreuz zu gruppiren, die letztern dagegen nur von der Hälfte der Flächen.

Ferner unterscheidet man einfache und zusammengesetzte; erstere zeigen nur eine Krystallform, letztere aber verschiedene, welche in einfachen Gestalten angehören.

In Bezug auf die letztern, welche in Combinationen bezeichnet, ist als Regel zu setzen:

1) Daß nur Gestalten eines und desselben Systems miteinander in Combination treten können.

2) Daß durch die Flächen der Krystalle tretenden Gestalten stets alle gleichwerthigen Begrenzungselemente der vorherrschenden Krystallform in gleicher Weise verändert werden.

Diese Veränderungen werden als Krystallumwandlungen und Zuschärfungen der Kanten und Ecken an Stelle dieser eine oder zwei Krystalltheile als Zuspitzungen der Ecken (wenn die Krystalltheile verändert) sichtbar. Je nach der Art der einfachen Gestalten, welche die Combinationen bilden, unterscheidet man diese in einfache, mehrzählige.

Die einfachen Gestalten muß man in abgeschlossene (welche den Raum allseitig begrenzen) und offene (welche den Raum nicht allseitig begrenzen). Letztere können natürlich nur in Combination auftreten.

Die große Wichtigkeit der Krystallkunde im Studium der Mineralogie liegt darin, daß die sämtlichen Krystallgestalten, die in der Natur vorkommen, in ein und dasselbe System, resp. in dieselbe Unterabtheilung des Systems gehören und auf eine und dieselbe Grundgestalt zurückbeziehen sind, und daß die Mineralspecies (unter welcher man die Krystallgestalten zusammenfaßt) eine und dieselbe von der anderer Specien verschieden ist.

Allerdings gibt es davon auch Ausnahmen, einmal Mineralien trotz gleicher Zusammensetzung doch verschiedene Krystallformen

andererseits Mineralien verschiedener Zug dieselbe Grundform besitzen. Inzwischen nur Ausnahmen, und sie lassen sich, wenn polymorphen Mineralien betrifft, verschiedene Entstehungsweise derselben erörtern, die andern, isomorphen Substanzen, nur auch verschiedene, so doch ganz analoge sein.

Verhältnisse der sechs Krystallsysteme sind:

1. **trigonal System** besitzt drei unter sich gleichwerthige Achsen, welche sich unter 120° schneiden.

2. **tetragonale System** besitzt drei sich schneidende Achsen, von denen nur zwei gleich sind.

3. **rhombische System** besitzt drei Achsen von gleicher Länge, die sich unter rechten Winkeln schneiden.

4. **monoklinische System** besitzt drei ungleicher Länge, von denen zwei sich unter einem Winkel schneiden, während die dritte senkrecht steht.

5. **triklinische System** hat drei Achsen von ungleicher Länge, welche sich alle unter verschiedenen Winkeln schneiden.

6. **hexagonale System** hat vier Achsen, drei unter sich gleiche in einer Ebene liegen unter Winkeln von 60° schneiden, während die vierte auf ihnen senkrecht steht.

#### 1. Das trigonale System.

(Tafel I, Figur 1—36.)

dreier Achsen, welche die Symmetrie dieses Systems herrschen, völlig gleichwerthig sind, so ist eine als Hauptachse anzusehen und es ist gültig, welche Achse man bei der Betrachtung der Krystallfiguren aufrecht stellt. Die Achsenkreuz (Fig. 1) können in verschiedenen Flächen gruppiert werden, man kann z. B. von denen jede alle drei Achsen (in einfachen) Entfernung vom Mittelpunkte (Fig. 2), oder solche, welche nur eine Achse, die beiden andern aber in unendlicher Entfernung schneiden, oder ihnen parallel gehen (Fig. 3), welche eine in einfacher, die beiden andern in zweifacher Entfernung schneiden (Fig. 4), u. s. w. Zweierartige Fälle sind überaus häufig, und es existiren infolge dessen einfache, vollflächige Gestalten. Diese sind:

1. **Octaeder** (Achtflächner), Fig. 5.

2. **Hexaeder** (Sechsfächner), Fig. 6.

3. **Rhombendodakaeder** (Rhombenzwölfflächner), Fig. 7.

4. **Tetrahedraeder** (Viermalsechsfächner), Fig. 8.

5. **Tetrahedraeder** (Dreimalachtfächner), Fig. 9.

6. **Tetrahedraeder** (Vierundzwanzigflächner), Fig. 10.

7. **Hexahedraeder** (Sechsmalachtflächner), Fig. 11.

8. **Hexahedraeder** (Sechsmalachtflächner), Fig. 12.

9. **Hexahedraeder** (Sechsmalachtflächner), Fig. 13.

10. **Hexahedraeder** (Sechsmalachtflächner), Fig. 14.

11. **Hexahedraeder** (Sechsmalachtflächner), Fig. 15.

es gibt nur ein Octaeder, Hexaeder oder Rhombendodakaeder, während die übrigen Gestalten in verschiedenen Abänderungen vorkommen können und auch wirklich vorkommen. Es ist z. B. ganz klar, daß man, ohne das Symmetriegesetz irgendwie zu alteriren, in Fig. 4 die Flächen hätte so legen können, daß sie zwei Achsen nicht in zweifacher, sondern in anderthalbfacher oder dreifacher Entfernung vom Mittelpunkte schnitten, es würde immer dieselbe Gestalt, nur mit andern Winkelabmessungen resultirt sein.

Diese sieben Gestalten treten in der Natur theils allein, theils in Combinationen untereinander auf. Für die Deutung der Combinationen ist es von größter Wichtigkeit, die gegenseitige Stellung der combinirenden einfachen Formen klar im Auge zu haben. So folgt aus Fig. 12, welche die gegenseitige Stellung von Hexaeder und Octaeder veranschaulicht, daß das Octaeder am vortretenden Hexaeder eine Abstumpfung von dessen acht Ecken (Fig. 13), und ebenso umgekehrt das Hexaeder am vortretenden Octaeder eine Abstumpfung von dessen sechs Ecken hervorbringen muß (Fig. 15).

Das Kubooktaeder (Fig. 14) ist diejenige Combination von Hexaeder und Octaeder, in welcher diese beiden Formen im Gleichgewicht ausgebildet sind, die Kanten der ursprünglichen Formen sind verschwunden, es existiren nur Combinationenkanten.

Die Stellung von Hexaeder und Rhombendodakaeder, welche in Fig. 16 angedeutet ist, läßt erkennen, daß das letztere die Kanten sowohl des Hexaeders (Fig. 17) als des Octaeders (Fig. 18) abstumpfen muß.

Wie sehr der Habitus einer Combination durch die vorwaltend ausgebildete Krystallform bedingt wird, ersieht man aus Fig. 19—21, welche alle drei dieselbe Combination von Hexaeder, Octaeder und Rhombendodakaeder darstellen, aber so, daß jedesmal eine andere Gestalt vorwaltet.

Einige andere, besonders häufige Combinationen sind in Fig. 22 (Hexaeder und Tetrahedraeder) und in Fig. 23 (Rhombendodakaeder und Tetrahedraeder) abgebildet.

Schon oben wurde auf das Auftreten halbflächiger Gestalten hingewiesen. Aus den eben angeführten holodrischen Formen können, mit Ausnahme des Hexaeders und Rhombendodaeders, welche der Hemidrie nicht fähig sind, halbflächige Gestalten abgeleitet werden, und zwar entstehen durch Verschwinden der abwechselnden Flächen und Ausdehnen der übrigen bis zur Raummengengung aus dem Octaeder das Tetraeder (Fig. 24, 25) und aus dem Tetrahedraeder das Pentagondodakaeder (Fig. 29); ferner durch Verschwinden abwechselnder dreiflächiger (einer Octaederfläche entsprechender) Flächensysteme aus dem Tetrahedraeder das Trigondodakaeder (Fig. 26), aus dem Tetrahedraeder das Deltoiddodakaeder (Fig. 27); durch Verschwinden abwechselnder sechsflächiger Flächensysteme aus dem Hexahedraeder das Hexahedraeder (Fig. 28) und endlich durch Verschwinden von je zwei unter spitzem Winkel zueinander geneigten Flächen aus derselben vollflächigen Gestalt das Dialisdodakaeder (Fig. 30). Es ist von selbst klar, daß aus einer vollflächigen Gestalt jedesmal zwei Halbflächner entstehen können, die unter sich vollkommen gleich, nur durch ihre um 90 Grad verwendete Stellung unterschieden sind (Fig. 24, 25). Diese verschiedene Stellung hemidrischer Gestalten kann natürlich nur in Combinationen zur Geltung kommen.

Combinationen hemidrischer Formen theils unter sich, theils mit holodrischen, sind in Fig. 31—36 ab-



gebildet; 31 Tetraeder mit Hexaeder, 32 Trigondobelaeder mit Tetraeder, 33 Octaeder mit Pentagondobelaeder, 34 Pentagondobelaeder mit Hexaeder und Octaeder, 35 Rhombendobelaeder mit Trigondobelaeder, 36 Trigondobelaeder mit Hexaeder, Rhombendobelaeder, Tetraeder, Deltoiddobelaeder, Hexakis-tetraeder und Trigondobelaeder der andern Richtung. Die letzte, siebenzählige Combination gibt zugleich einen Begriff von dem außerordentlichen Flächenreichtum, wie er durch das Zusammentreten vieler einzelner Gestalten resultiren kann und in der That nicht selten an natürlichen Krystallen beobachtet wird.

## 2. Das tetragonale System.

(Tafel 1, Figur 47–55.)

Das Achsenkreuz (Fig. 47) wird von drei rechtwinkelig sich schneidenden Achsen gebildet, von denen die eine ungleiche, welche bei der Betrachtung und Zeichnung der Krystallformen stets senkrecht zu stellen ist, als Hauptachse bezeichnet wird, während man die beiden unter sich gleichen Nebenachsen nennt.

Legt man durch die Endpunkte dieses Achsensystems Flächen, so erhält man tetragonale Pyramiden (Fig. 48 und 49), die im allgemeinen dem Octaeder ähnlich sind, sich aber von demselben dadurch unterscheiden, daß sie nicht mehr acht gleichseitige, sondern nur noch gleichschenkelige Dreiecke zu Begrenzungs-elementen haben, weil eben jetzt die Länge der Hauptachse (Fig. 47a) von der Nebenachse (Fig. 47b) differirt. Ist a kleiner als b, so entstehen flache Pyramiden (Fig. 48), ist dagegen a größer als b, so nennt man die Pyramiden spitze (Fig. 49). Es ist einleuchtend, daß es sehr verschiedene flache und spitze Pyramiden geben kann, aber es muß hervorgehoben werden, daß man für jedes einzelne tetragonale Mineral eine ganz bestimmte Pyramide als Grund- oder Stammpyramide anzunehmen hat und daß dann alle andern, an diesem Minerale zu beobachtenden Pyramiden mit jener so zusammenhängen, daß — bei gleichbleibenden Nebenachsen — die Hauptachsen der flachern Pyramiden z. B.  $1\frac{1}{2}$ , 2 oder 3 mal so kurz, die Hauptachsen der spitzern Pyramiden dagegen  $1\frac{1}{2}$ , 2 oder 3 mal so lang sind, als die Hauptachse der Stammpyramide. Das heißt mit andern Worten: die Veränderungen der Hauptachse gehen bei einem und demselben Mineral jederzeit nur nach rationalen Zahlenverhältnissen vor sich.

Setzt man die Verlängerung der Hauptachse immer weiter fort, so werden die Pyramidenflächen immer steiler geneigt, bis sie endlich, bei unendlicher Länge jener, eine verticale Stellung einnehmen und nun eine oben und unten offene, von vier der Hauptachse parallelen Flächen begrenzte Gestalt entstehen lassen: das tetragonale Prisma. Andererseits resultiren aus der fortschreitenden Verlängerung der Hauptachse immer flachere und flachere Pyramiden und endlich, wenn jene gleich Null geworden ist, zwei horizontale Flächen, die man basisches Flächenpaar oder kurzweg die Basis nennt. (Fig. 51 und 52 zeigen Combinationen von Prisma und Basis.)

Es ist bis jetzt noch keine Rücksicht darauf genommen worden, daß, wie z. B. Fig. 48 und 49 zeigen, die Endpunkte der tetragonalen Achsen entweder mit den Endpunkten der dreiseitigen Pyramidenflächen, oder mit den Mittelpunkten von den ungleichen Kanten derselben zusammenfallen können. Man unterscheidet hiernach Pyramiden der ersten Art (Protopyramiden), bei welchen eine Mittelecke nach vorn liegt (Fig. 48) und Pyramiden der zweiten Art (Deuteroypyramiden), bei denen

eine Mittellante dem Beschauer zuwächst. In ganz analoger Weise hat man Deutero- und Protoprismen (Fig. 51) zu den eben angegebenen Differenz bewirkt, welche in den Gestalten selbst, wohl aber in der Betrachtung oder Stellung, in welchen man sie betrachtet hat, und sie gelangt daher zu Combinationen zu deutlichem Ausdruck; so z. B. Protopyramide mit einem Prisma der ersten oder der andern Richtung (Fig. 54).

Als untergeordnet auftretende Formen sind ditragonale Pyramiden (Fig. 50) und ditragonale Prismen anzuführen. Letztere horizontaler Hauptschnitt ein symmetrisches (längs) Achteck ergibt.

Die Combinationen dieses Systems sind tafelförmigen, theils pyramidalen, theils säulenförmigen Habitus, je nach dem Auftreten von Basis (Fig. 52), Pyramide (Fig. 54) oder Prisma (Fig. 55). Im allgemeinen sind diese Combinationen sehr einfach und leicht zu erkennen.

Hemiedrische Formen sind allerdings sehr selten, treten aber untergeordnet und kleiner als die Hälfte der Pyramide, das sogenannte Hemiprisma (Fig. 53) auf. Man kann sich vorstellen, daß die äußere bis auf die verschiedenen Flächen ganz mit dem tetragonalen Tetraeder übereinstimmt.

## 3. Das hexagonale System.

(Tafel 2, Figur 1–19.)

Dasselbe hat vier Achsen, von welchen zwei sich gleich sind, in einer horizontalen Ebene liegen und sich hier unter Winkeln von je 60° (Nebenachsen Fig. 1b), während die vierte Achse (Fig. 1a) auf jener Ebene senkrecht steht. Die drei Achsen dieses Systems geben ihrer Ausbildung und Ableitung die größtmögliche Stimmung mit dem tetragonalen. Die Pyramide ist jetzt zwar zwölfseitig, aber übrigens wieder flach oder spitz (Fig. 4), und außerdem können sie in zwei verschiedenen Stellungen vorzukommen. Im 30° Grad differiren (Proto- und Deutero-) Basis und Prisma (Fig. 2 und 5) sind daher im hexagonalen System, und der Combinationen ist wieder, je nach dem Auftreten einer oder andern Gestalt, tafelförmig (Fig. 6) (Fig. 7 und 8) oder säulenförmig (Fig. 9).

Hexagonale Pyramiden und Prismen sind sehr selten.

Von ungleich größerer Wichtigkeit sind im hexagonalen System sind hier die hemiedrischen, sowohl was den Reichtum ihrer Formen, als auch die Häufigkeit ihres Vorkommens in der Natur betrifft.

Die wichtigste hemiedrische Gestalt ist das Rhomboeder, welches durch Verschmelzen von zwei abwechselnden Flächen der Pyramide entsteht. Entsprechend den Achsenverhältnissen der Pyramide kann es natürlich auch verschiedene Stumpfer oder spitzer Rhomboeder (Fig. 11 und 12) geben. So wird man auch Rhomboeder der ersten oder der zweiten Richtung haben, die meistens charakteristisch für das Mineral sind. Rhomboeder können auch aufsteigend oder absteigend (Fig. 13) sein. Prismen (erster und zweiter Richtung) sind dem Rhomboeder durch Verlängerung der Basis bis ins Unendliche, wie aus den Combinationen

erdm aber kann man aus den Rhomboedern eine ganz besondere Art von Krystallgestalten, nämlich die Rhomboeder, ableiten, indem man durch die des Stammrhomboeders und die Endverlängerten Hauptachse sich Flächen gelegt (Fig. 24); es entstehen dadurch von zwölf unregelmäßig begrenzten, den Hexagonalpyramiden ähnliche Gestalten, welche sich aber einmal durch die zickzackförmig aufsteigende und Mittellanten, sodann aber auch dadurch, daß die Flächen in den Scheitellanten scharf stumpfen und spitzern Winkeln zeigen, leicht begreifen lassen.

Die Zahl der Rhomboeder erster und zweiter Ordnung ist eine unbegrenzte, und ferner jedes Rhomboeder als Stammform zur Ableitung einer Reihe von Stalenoedern dienen kann, so ist die Mannichfaltigkeit, welche die hemiedrische des hexagonalen Systems in ihren Formen leicht begreiflich.

15—19 bringen einige nicht sehr combinirte zur Anschauung, so Fig. 15 ein Rhomboeder und Prisma verschiedener Richtung; Fig. 16 zwei Rhomboeder verschiedener Richtung; Fig. 17 ein Stalenoeder und zugehöriges Stammrhomboeder; Fig. 18 Combinationen der Randlanten des Rhomboeders.

Die trigonale Prismen als Hälftgestalten auf.

#### 4. Das rhombische System.

(Tafel 2, Figur 23—36.)

Die drei Achsen schneiden sich unter rechten Winkeln (Fig. 23), keine von ihnen ist aber für die Hauptachse gekennzeichnet; die Entscheidung, welche der drei als solche anzusehen und folgen zu stellen sei, bleibt der Wahl im Interesse überlassen. Ist diese Entscheidung aber bezeichnet man dann die längere horizontale Achse als Makrodiagonale, die kürzere c als Klinodiagonale.

Bei Betrachtung geht man von der rhombischen Pyramide aus (Fig. 24 und 25). Aus dieser Veränderung der Hauptachse (bei gleichbleibender Makro- und Brachydiagonale), der Makro- und Brachydiagonale, der Makro- und Brachydiagonale (bei gleichbleibender Hauptachse und Brachydiagonale) drei Gestalten, und zwar zunächst von Pyramiden, welche man als der Hauptreihe, und brachydiagonalen Nebenreihe angerechnet. Als Grenzgestalten dieser Reihen einerseits bei unendlicher Verlängerung der Achsen drei Prismen, von denen die Makrodiagonale resp. brachydiagonale als Prisma (Fig. 26) bezeichnet wird, die beiden andern horizontal liegenden Dodekaeder, und in Makrodoma (Fig. 28) und a (Fig. 27) unterschieden werden; andererseits gelangt man bei unendlicher Verkürzung der drei Flächenpaare oder Pinakoiden je nach ihrer Entstehung und Lage als makrodiagonales resp. brachydiagonales Pinakoid oder Pinakoid zu bezeichnen (Fig. 29, a, b).

ferner jede brachydiagonale oder makrodiagonale Form der gewissermaßen als Stammform betrachtet kann, welche die Elemente zur Bildung

einer neuen Reihe von Gestalten in sich enthält, als deren nähere Grenzformen brachydiagonale oder makrodiagonale Prismen, steilere und flachere Domen aufstreten, als deren fernere Grenzgestalten aber stets wieder die drei Flächenpaare resultiren, so ist hieraus die große Fülle der möglichen rhombischen Krystallformen ersichtlich, die große Complication und Mannichfaltigkeit der Combinationen dieses Systems leicht erklärlich. Der Habitus der rhombischen Krystalle kann ebenfalls pyramidal, säulenförmig oder tafelförmig sein, welche letztere Erscheinung jetzt aber sowohl durch das Vorwalten des brachydiagonalen, als der verticalen Flächenpaare bedingt sein kann.

Einige der einfachern Combinationen sind Fig. 30—36 abgebildet.

Fig. 30 Prisma und Pyramide, Fig. 31 dieselben mit makrodiagonalem Flächenpaar, Fig. 32 Pyramide mit Brachydoma, Fig. 33 Pyramide mit Makrodoma, Fig. 34 Pyramide mit Brachypinakoid, Fig. 35 Brachydoma, Makrodoma und Basis, endlich Fig. 36 Brachypinakoid, drei Brachydomen, Pyramide, Prisma, brachydiagonales Prisma, Makropinakoid und Makrodoma.

#### 5. Das monoklinische System.

(Tafel 2, Figur 41—51.)

Drei Achsen von ungleicher Länge; zwei davon schneiden sich unter schiefen Winkeln, die dritte steht senkrecht auf beiden. Eine der beiden ersten, gleichgültig welche, wird zur Hauptachse gewählt (Fig. 41 a), die andere c als Klinodiagonale, die dritte, b, welche mit den beiden andern rechte Winkel bildet, als Orthodiagonale bezeichnet. Bei der Abbildung der Krystalle denkt man dieselben stets so gestellt, daß oben der stumpfe Winkel, welchen a und c zusammen bilden, dem Beschauer zugekehrt ist.

Die einfachen Gestalten dieses Systems zeigen große Verwandtschaft mit denen des rhombischen, hier wie dort kennen wir Pyramiden, Prismen, Domen und Flächenpaare, und das was dort über die Einteilung der Formen in solche der Haupt- und Nebenreihen gesagt wurde, findet auch hier Anwendung und Geltung; indessen erlangen doch, infolge der Neigung der Klinodiagonale, einige von diesen eine besondere Ausbildung und das ganze System einen eigenthümlichen Charakter. Es müssen nämlich aus dem eben angeführten Grunde alle Gestalten, welche Klinodiagonale und Hauptachse gleichzeitig schneiden, also die Pyramiden und Orthodomen, in zwei voneinander ganz unabhängige Hälftgestalten zerfallen, die erstern sind mit je vier Flächen, als Hemipyramiden, die letztern, mit nur je zwei parallelen Flächen, als Hemidomen ausgebildet. Je nachdem diese dem spitzen oder dem stumpfen Winkel, welchen Hauptachse und Klinodiagonale miteinander bilden, gegenüberliegen, benennt man sie als positive oder negative Hemipyramiden resp. Hemidomen. Ferner geht aus der Achsenlage schon hervor, daß jene Gestalten, welche der Klinodiagonale parallel laufen, also Basis und Klinodomen, geneigt liegen müssen. Wie man aus dem Obigen ersieht, fehlen in diesem Systeme raumumschließende Gestalten vollständig, die einfachen Formen, sämtlich Theilgestalten, können nie selbständig und allein, sondern nur in Combinationen mit andern vorkommen. Derartige monokline Combinationen sind in Fig. 42—51 abgebildet. Fig. 42 stellt die Combination der beiden Hemipyramiden dar, Fig. 43 Prisma, Basis, Orthopinakoid und Klinodoma, Fig. 44 Prisma, Ortho- und Klinopinakoid und negative (vordere) Hemipyramide, Fig. 45 die drei Pinakoide,

positives Hemidoma und negative Hemipyramide, Fig. 46 Basis, klinodiagonales Flächenpaar, Klinodoma und positives Hemidoma, Fig. 47 Prisma, klinodiagonales Prisma, Orthopinakoid, negative und positive Hemipyramide, zwei positive und ein negatives Hemidoma, Fig. 48 Prisma, orthodiagonales Prisma, Orthopinakoid, Klinopinakoid, Basis und Hemipyramide, Fig. 49 Klinopinakoid, Prisma, Klinodoma, Fig. 51 Klinopinakoid, Prisma, Basis und positives Hemidoma.

### 6. Das tektilische System.

(Tafel 2, Figur 55—58.)

Drei Achsen von ungleicher Länge schneiden sich unter schiefen Winkeln (Fig. 55).

Dieses System, welches in der Natur nur selten zu beobachten ist, ist das am wenigsten regelmäßige, und besitzt den geringsten Grad von Symmetrie. Sämtliche Gestalten zerfallen hier in Flächenpaare, so die Pyramiden in vier Viertel oder Tetartopyramiden (Fig. 56), die Prismen in zwei asymmetrische Prismenhälften. Die Deutung der Combinationen, von denen in Fig. 57 und 58 einige abgebildet sind, ist vollständig der Willkür überlassen.

Eine eigenthümliche Erscheinung bei der krystallographischen Ausbildung mancher Mineralien ist als Hemimorphismus (nicht zu verwechseln mit Hemiedrie) bekannt. Es zeigen nämlich Krystalle, wenn sie frei ausgebildet, oder seitlich aufgewachsen sind, mitunter an den beiden Polen, also an den Enden der Hauptachse, Flächen nicht derselben, sondern verschiedener Gestalten. Der Hemimorphismus rhombischer Krystalle ist in Fig. 39 und 40 zur Anschauung gebracht. Der Krystall Fig. 39 z. B. ist am oberen Pol durch Basis und Makrodoma, am unteren dagegen durch die Pyramide begrenzt, in Fig. 40 sind am oberen Pol zwei Makrodomen, zwei Brachydomen und die Basis, am unteren dagegen die Pyramide entwickelt. Derartige unerklärliche Anomalien finden sich, wiewol selten, auch an Krystallen hexagonaler Mineralien.

Recht häufig kommt es vor, daß die Krystallindividuen nicht einzeln ausgebildet sind, sondern daß mehrere Individuen nach einem ganz bestimmten Gesetz verwachsen auftreten. Derartige regelmäßige Verwachsungen zweier oder mehrerer Krystalle nennt man Zwillinge (Drillinge, Viellinge).

Es ist hierbei zunächst die gegenseitige Stellung der Individuen, sodann aber die Art und Weise ihrer Verwachsung zu beachten.

In ersterer Beziehung hat man Zwillinge mit parallelen Achsensystemen (die aber nur bei hemiedrischen Formen auftreten können) von solchen mit nicht parallelen Achsensystemen zu unterscheiden, in letzterer dagegen sind die aneinandergewachsenen Zwillinge von den durcheinandergewachsenen oder Durchkreuzungszwillingen zu trennen. Für die Kenntniß des Zwillingengesetzes, d. h. des Gesetzes, nach welchem die Verwachsung von statten gegangen ist, ist die Bestimmung der Zusammenfügungsfläche oder auch der Drehungsachse, welche auf ersterer oft senkrecht steht, sowie die des Drehungswinkels nothwendig.

Die aneinandergewachsenen Zwillinge erscheinen häufig in einer Richtung bedeutend verkürzt, so daß man sie als die zwei Hälften eines Individuums betrachten kann, welche um einen gewissen Winkel umeinander

gedreht sind. Ein charakteristisches Merkmal allermeisten Zwillinge sind die Winkel, welche die beiden verachsenen Flächen bilden. Indem sich dasselbe Verhältniß mehrfach repetirt, entstehen Drillinge. Hauptviellinge. Derartige Viellinge bestehen aus papierdünnen Individuen zusammengefügter, erscheint dann als ein einfacher Kristall. Die Verwachsung ist nur durch eine feine Erhebung der Flächen nachzuweisen.

Einige Zwillinge des tetrahedralen Systems, Fig. 43—45 abgebildet (Fig. 43 ist die Zusammenfügungsfläche eine Octaederfläche, die Achse senkrecht auf ihr, Drehungsachse die Achse, Fig. 44 Tetraederzwilling; Fig. 45 ist ein ederszwilling; beides solche mit paralleler Verwachsung, wobei zu beachten, daß der von Fig. 45 gleichzeitig erfüllte Raum die tetrahedrale Gestalt ergibt). Taf. 1, Fig. 56 ist ein Zwilling des hexagonalen Systems. Hexagonale Zwillinge, Fig. 20—22 dargestellt, rhombische Fig. 38 (von denen Fig. 38 als ein ausgesprochenes Spiel von Durchkreuzungszwillingen betrachtet werden kann). Zwillinge des monoklinischen Systems, Fig. 50 und 52 neben den betreffenden Einzelkrystallen, Fig. 49 und 51, ein trikliner Zwilling, Fig. 53 abgebildet. Ein dem rhombischen System angehöriger Durchkreuzungsdwilling ist in Fig. 54 dem einfachen Krystall Fig. 53 dargestellt (irrtümlich als dem monoklinen System zugeordnet).

Viellingskrystalle, an ihrer Zwillingenlinie, entstehen besonders durch Verwachsung auf Taf. 2, Fig. 37 und 59 dargestellte Gesteine.

### Monoklinenheiten der Krystalle

Bei den bisherigen Betrachtungen ist der theoretische Charakter gemäß, nur von der in ihrer ideal vollkommensten Ausbildung. Es wurde angenommen, daß dieselben aus ebenen, von glatten und ebenen Flächen begrenzten, kurz, nach den Gesetzen ausgebildete Körper seien. Die Wirklichkeit dieses Ideal der Krystalle äußerst selten erreicht, daß die Natur in seltenen Thätigkeit den mathematischen wohl gefügt, sie aber durchaus nicht den erkennbaren Ausdruck gebracht hat, durch eben hingewiesen.

So findet man häufig, und zwar in Krystallen des tetrahedralen Systems, in der Fläche oder Achse abnorm ausgebildete Flächen und Kanten erlangen dadurch an die Stelle von Ecken treten Kanten. Der Krystall verliert, scheinbar wenigstens, die Regelmäßigkeit und erlangt einen völlig anderen Charakter. Solche monströse Krystalle, die auf Taf. 1, Fig. 37 und 38 abgebildet, unregelmäßigen vier- und sechsseitigen Gestalten haben allerdings mit dem Octaeder, wie es in Fig. 3 dargestellt ist, Aehnlichkeit; daß sie aber trotzdem nicht sind, kann man aus den übereinstimmenden Winkeln der Flächen erkennen, wie der Grundsatz, sich bei der Bestimmung der Neigung der Flächen leiten zu lassen, erhalten werden muß.



von eigenthümlicher Beschaffenheit der Flächen geben Fig. 39–41. Die Flächen des (Fig. 39) erscheinen gestreift (und zwar parallel des Krystalls), die des Hexaeders (Fig. 40) regelmäßig eingefallen. Fig. 40 zeigt ein Baumerkmal aus Hexaedern zu betrachten, welche trotz seiner octaëdrischen Gesamtheit als ein Baumerkmal aus Hexaedern zu betrachten. Seltener beobachtet. Selten erscheinen gerundeten Flächen und Kanten, wie das Hexaeder Fig. 41.

Die häufig vorkommende Unregelmäßigkeit ist, daß an Combinationen nicht alle Flächen geordnet auftretenden Gestalt zur Ausbildung sind, sodaß also z. B. bei einer Combination Hexaeders und Octaeders (Fig. 13) nicht des Hexaeders abgestumpft, einige vielmehr ausgebildet erscheinen. Man muß sich die Erscheinung, welche aller Gesetzmäßigkeit ist dem Auftreten hemidrischer Gestalten zu

häufigsten hervortretende Unvollkommenheit ist, daß an Combinationen nicht alle Flächen geordnet auftretenden Gestalt zur Ausbildung sind, sodaß also z. B. bei einer Combination Hexaeders und Octaeders (Fig. 13) nicht des Hexaeders abgestumpft, einige vielmehr ausgebildet erscheinen. Man muß sich die Erscheinung, welche aller Gesetzmäßigkeit ist dem Auftreten hemidrischer Gestalten zu

### Krystallmessung.

Schon mehrfach darauf hingewiesen worden, ist die große Wichtigkeit die Bestimmung der Verhältnisse der Krystalle ist. Instrumente, welche zur Messung der Kantenwinkel zweier Krystallflächen dienen, sind das Goniometer, und man unterscheidet sie in die Erreichung dieses Zweckes auf dem indirecten Wege ausstreben, in Contactgoniometer und in Reflexionsgoniometer.

Letztere, einem gewöhnlichen Transporteur sehr ähnlich, ist auf Taf. 1, Fig. 58 abgebildet. Seine Anordnung, bei welcher der Krystall mit der zu messenden Kante zwischen die beiden Schenkel, von denen der drehbar, eingehalten wird, ist sehr einfach, jedoch setzt sie Krystalle von einer gewissen Größe voraus, auch ist die damit zu erzielende Genauigkeit nicht groß genug, um für strengere wissenschaftliche Zwecke hinreichen zu können. Für solche Zwecke dient man sich des von Wollaston erfundenen Goniometers (Taf. 1, Fig. 57), welches aus glatten und glänzenden Krystallflächen besteht, aber auch die Neigung solcher Flächen zu messen gestattet, welche nicht unmittelbar zum Gebrauch kommen. Das Instrument besteht aus einem Kreis, dessen äußeren Umfang in Grade getheilt, dessen Theilung durch einen feinen Nonius bis auf Minuten fortzusetzen ist,

und in deren Achse der zu messende Krystall so befestigt werden kann, daß die beiden Flächen, deren Neigung man kennen lernen will, derselben parallel liegen. Man beobachtet nun das Spiegelbild eines entfernten Gegenstandes zuerst auf der einen Krystallfläche, dreht darauf den Kreis um seine Achse so lange, bis man das Bild desselben Gegenstandes in der zweiten Fläche erblickt (wobei der reflectirte Lichtstrahl stets dieselbe Lage behaupten muß) und erlangt so in dem Drehungswinkel das Supplement des gesuchten Kantenwinkels.

Anmerkung. Aus den so gemessenen Winkeln kann man die Parameter jeder Fläche (d. h. die Stücke, welche durch sie auf den Achsen, vom Mittelpunkt aus gerechnet, abgeschnitten werden) ableiten, und sich ferner mit Hilfe dieser linearen Werthe perspectivische oder körperliche Nachbildungen (Modelle) von Krystallgestalten verschaffen. Zur Anfertigung von Modellen in Pappe oder Cartonpapier bedient man sich der sogenannten Krystallnetze (Taf. 1, Fig. 46, Netz eines Octaeders), welche die sämtlichen Flächen einer Krystallgestalt in natürlicher Größe und ihrer natürlichen Reihenfolge nach nebeneinandergelegt enthalten.

### Mineralaggregate.

Die Zusammenhäufungen vieler Einzelindividuen desselben Minerals werden als Aggregate bezeichnet, und je nach ihrer Ausbildung in krystallisirte und krystallinische (resp. dichte) unterschieden.

Zu den erstern gehören außer den frei ausgebildeten oder ausgewachsenen Krystallgruppen, von denen schon oben die Rede war, auch die Krystalldrusen, welche entstehen, wenn auf einer Fläche sich so viel Individuen gleichzeitig entwickeln, daß sie diese vollständig bedecken, und nur mit ihren obern Enden zur Ausbildung gelangen. Sehr häufig bilden sich solche Drusen in ringsumgeschlossenen Hohlräumen innerhalb anderer Gesteine aus (Taf. 3, Fig. 6). Baumförmige Krystallaggregate entstehen, wenn sich an eine verticale Krystallreihe nach verschiedenen Richtungen hin andere Krystalle ansetzen, ohne sich wieder zu vereinigen (Taf. 3, Fig. 7). Schuppige Aggregate endlich resultiren, wenn sich viele Individuen von tafelförmiger Ausbildung parallel nebeneinanderlegen (Taf. 3, Fig. 8), gestrichte dagegen, wenn parallele Reihen gewöhnlich sehr kleiner Krystalle von andern ebenfalls parallelen Reihen geschnitten werden (Taf. 3, Fig. 10).

Die krystallinischen Aggregate bezeichnet man als körnige, schuppige, faserige oder schalige; letztere lassen mitunter eine gewisse Regelmäßigkeit in der Anordnung der kleinen Fasern oder dünnen Schalen erkennen, so die radialfaserigen (Taf. 3, Fig. 13b und 16b) und concentrisch-schaligen (Taf. 3, Fig. 12b) Aggregate.

Manche dieser krystallinischen Aggregate zeigen ganz besondere äußere Formen, die, wenn sie auch als zufällig zu betrachten und von der krystallographischen Natur der Mineralien ganz unabhängig sind, doch für gewisse von ihnen sehr charakteristische Kennzeichen abgeben. Dabin gehören die zahnigen Gestalten mancher geschmeidigen Mineralien (Taf. 3, Fig. 11), die kugelförmige Structur der Erbsensteine (Taf. 3, Fig. 12) und Dolithe (erstere aus concentrisch-schaligen, letztere aus radialfaserigen Kugeln zusammengesetzt), die nierenförmigen oder traubigen Gestalten mancher Mineralien (besonders der Glasköpfe, Taf. 3, Fig. 13). Auch die korallenförmigen

(Fig. 15) und stalaktitischen Bildungen (Fig. 16 a, b) gehören hierher. Unter Septarien (Fig. 14) versteht man kugelförmige Massen, welche infolge der Austrocknung in ihrem Innern eine unregelmäßig stengelige Absonderung zeigen, unter Dendriten endlich baum- und moosförmige, äußerst dünne Anflüge einer Mineralsubstanz zwischen feinen Spalten (Taf. 3, Fig. 17). Die Zahl dieser zufälligen Gestaltungen ließe sich mit Leichtigkeit noch sehr weit vermehren.

### Pseudomorphosen.

Die Mineralsubstanzen treten mitunter in Krystallformen auf, welche ihnen selbst eigentlich fremd sind, die vielmehr andern Substanzen angehören. Es ist dies stets die Folge davon, daß ein neugebildetes Mineral an die Stelle eines ältern, verschwundenen getreten ist, und man nennt die durch diesen Proceß entstandenen Bildungen Pseudomorphosen oder Asterkrystalle (Taf. 3, Fig. 18.)

Man unterscheidet, je nach der Art ihrer Entstehung, Umbildungs-, Verdrängungs- und Umwandlungspseudomorphosen. Bei den erstern bildet sich zunächst eine fremdartige Kruste über einem Krystall, welcher letztere häufig zerstört wird, sodas allein durch die Kruste die Form des frühern Minerals erhalten bleibt; bei den zweiten wird durch einen doppelten chemischen Proceß, der entweder gleichzeitig oder in getrennten Zeiten stattfindet, die ursprüngliche Mineralsubstanz hinweggeführt, eine neue an ihrer Stelle abgelagert; bei den letzten endlich erfolgt die Pseudomorphosirung durch Verlust, Aufnahme oder Austausch einzelner chemischer Bestandtheile.

Zuweilen ist der Pseudomorphosirungsproceß nicht zur Vollendung gekommen, sondern unterbrochen worden, sodas man an einem Krystall sowol die ursprüngliche als auch die neugebildete Substanz vorfindet, sei es, das sich die erstere an einer Ede, oder als Kern, oder endlich, aber seltener, als Kruste noch erhalten hat. In solchen Fällen existirt natürlich kein Zweifel über die Natur des Urminerals, wie es sonst wol manchmal der Fall sein kann.

## B. Physikalische Eigenschaften der Mineralien.

Diejenigen Eigenschaften der Mineralien, welche ihre Masse als solche, ganz abgesehen von ihrer Form oder chemischen Zusammensetzung, charakterisiren, welche ihnen entweder innewohnen müssen, wenn sie als feste Körper sich darstellen sollen, oder welche sie unter dem Einflusse gewisser Agentien, Licht, Wärme und Electricität, erkennen lassen, nennt man physikalische, und die Bestimmung derselben ist für die Erkennung und Unterscheidung der Mineralien von größter Wichtigkeit.

### 1. Spaltbarkeit und Bruch.

Die krystallisirten Mineralien zeigen die bemerkenswerthe Eigenthümlichkeit, das der Zusammenhalt ihrer kleinsten Theilchen nach gewissen Richtungen hin geringer ist, als nach allen übrigen, d. h. das der Widerstand, den sie dem Zerbrechen oder Spalten entgegenstellen, in der Richtung gewisser Flächen am geringsten ist. Diese Eigenschaft der Spaltbarkeit ist aber deshalb von dem größten Interesse, weil jene Richtungen der geringern Cohärenz stets Krystallflächen parallel laufen, welche in die Krystallreihe des betreffenden Minerals gehören, sodas also dadurch ein inniger Zusammenhang zwischen seinen äußern formalen und innern physikalischen Eigenschaften nachgewiesen wird.

Die Spaltungsrichtungen oder Spaltbarkeiten können nach Zahl und Gruppierung man Mineralien mit ein, zwei, drei, vier, sechs, acht, zehn, zwanzig, hundert, ja unendlich rechten oder schiefen Winkeln sich unterscheiden. Es ist als Regel, das, wenn ein Mineral aus einer Fläche einer gewissen Krystallform, z. B. nach einer Hexaederfläche, das es in der Vollkommenheit nach allen Seiten in die nämlichen Krystallgestalt, also auch nach andern Flächen oder den zwei andern Richtungen des Hexaeders spaltet. So genügt ein leichter Hammer Schlag auf einen Krystall der die Gestalten Taf. 1, Fig. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Bei weniger vollkommener oder unvollständiger Spaltbarkeit muß man dagegen ein Auge (Fig. 59) zu Hülfe nehmen, daselbe in die Richtung auf den Krystall aufsetzen und einen leichten Hammer Schlag gegen daselbe thun, es z. B. leicht gelingen, am Flußspath sich in Hexaedern (Taf. 1, Fig. 6) nach dem Octaeder (Taf. 1, Fig. 5) durch leichten Druck mit dem Messer die Ecken (Taf. 1, Fig. 12) oder mit Zuhilfenahme von Hammer aus dem ursprünglichen vollständigen Octaeder herauszuspalten.

Spaltungsrichtungen von ungleicher Zahl entsprechen jederzeit den Flächenrichtungen der Krystallgestalten. So spaltet z. B. das krystallisirende Mineral Hornblende sehr vollständig nach dem Prisma, aber nur nach dem Flächenpaar (Taf. 2, Fig. 43).

Schließlich muß hervorgehoben werden, das Mineralspecies immer nur eine oder wenige Spaltungsformen besitzt und die eigenthümliche Spaltbarkeit, wie jeder Mineralog weiß, bei allen ihren Individuen ganz unabhängig von deren jeweiligen Formen oder sonstigen Ausbildungen. Namentlich deshalb ist die Spaltbarkeit eine wichtige Eigenschaft und ein beachtenswerthes Mittel zur Bestimmung der Mineralien.

Wird ein Mineral nach Richtungen, in denen es keine Spaltbarkeit besitzt, zerbrochen, so entstehen Bruchflächen. Bei Mineralien mit unvollkommener Spaltbarkeit wird der Bruch nur in bestimmter Richtung tritt er aber bei solchen die die Eigenschaft abgeht, und seine Bestimmung unter Umständen ein wichtiges Mittel zur Bestimmung solcher Körper sein.

Der allgemeinen Form der Bruchflächen man von muscheligem, ebenem, unebenem, zerklüftem, nach der Beschaffenheit ihres Bruch von glattem, splitterigem, erdigem, splitterigem Bruch.

### 2. Härte und Cohärenz.

Unter der Härte, dem Ausdrucks der Cohärenz eines Minerals, versteht man den Widerstand, den es einer Trennung der Theilchen entgegenstellt. Ihre wenigstens annähernde Bestimmung ist von großer Wichtigkeit, und

er Kennzeichenlehre eingehend mit diesem  
igt, indem er sich zur Feststellung und  
er Härte des Fingernagels, des Messers  
s bediente und bei den einzelnen Mi-  
n, ob sie mit dem Fingernagel, oder  
mit dem Messer zu ritzen seien, oder  
hle Funken schlugen. Das Princip von  
relative Härte durch Ritzen der Körper  
bestimmte, gestattet jedoch eine weit  
igkeit, und deshalb bedient man sich  
h zur Feststellung dieser Eigenschaft der  
ärtescalen, welche auf jenes Princip  
ind aus einer Reihe von Mineralien  
e ungefähr gleiche Differenzen in ihrer  
Die gebräuchlichste ist die Härtescala  
welche aus folgenden zehn Mineralien

1. Talk,
2. Steinsalz (oder Gips),
3. Kalkspat,
4. Flußspat,
5. Apatit,
6. Orthoklas,
7. Quarz,
8. Topas,
9. Korund,
10. Diamant.

also findet, daß ein zu bestimmendes  
Flußspat ritzt, vom Apatit aber geritzt  
man, es habe Flußspat: bis Apatit:  
der Kürze halber, Härte 4—5, wobei  
stets zu vergegenwärtigen hat, daß diese  
absoluten Größen ausdrücken. In der  
t man sich, da man nicht stets derartige,  
tuden bestehende Härtescalen zur Hand  
bestimmung zumeist nur des Messers  
3. 59), womit man bei hinlänglicher  
gende Resultate zu erzielen vermag.  
Härteuntersuchungen erlangt man zugleich  
is über die Art des Widerstandes, den  
n dem Eindringen eines andern, härtern  
egensehen, über ihre Tenacität, und  
idet in dieser Beziehung spröde, milde,  
e und biegsame (gemein-, resp. elastisch-  
neralien.

#### Dichtigkeit oder specifisches Gewicht.

zeit oder das specifische Gewicht, durch  
Verhältniß der Masse zum Volumen eines  
gedrückt wird, ist für die Mineralien des-  
erordentlich wichtiges Merkmal, weil ver-  
neralspecies in der Regel verschiedenes,  
Species gehörigen Varietäten gleiches  
ewicht besitzen. Um dasselbe festzustellen,  
n das Gewicht eines Mineralstücks mit  
desselben Volumens Wasser; der Quotient  
zahlen drückt das specifische Gewicht des  
Minerals aus.

(Ausführung dieser Versuche bedient man  
sagen (Taf. 2, Fig. 65), und man ver-  
o, daß man ein Stück des zu untersuchen-  
s zuerst in der Luft (auf der obern Wag-  
e, und darauf in Wasser eingetaucht (auf  
rechten Schale) wägt. Da ein Körper  
: genau um so viel weniger wiegt, als  
des durch ihn verdrängten (also dem  
en) Wasservolumens beträgt, so muß man  
ng des Gleichgewichts das zuerst aufge-  
t um einen gewissen Betrag vermindern.  
ir das Gewicht des Stücks an der Luft

bestimmt P, sein Gewicht unter Wasser P<sup>1</sup>, so ist  
P — P<sup>1</sup> das Gewicht des verdrängten Wasservolumens,  
das gesuchte specifische Gewicht aber =  $\frac{P}{P - P^1}$ .

Da man derartige besondere Wagen nicht immer  
zur Verfügung hat, und außerdem aus gewissen Grün-  
den die Bestimmung des specifischen Gewichts von  
pulverisirten Körpern der in massiven Stücken vorge-  
zogen werden muß, so benutzt man jetzt vielfach ge-  
wöhnliche chemische Wagen, und nimmt die zweite  
Operation in einem kleinen, mit Wasser gefüllten und  
mit durchbohrtem Stöpsel versehenen Fläschchen vor.  
Natürlich muß man dabei auch das Gewicht des  
bloßen, vollständig mit Wasser gefüllten Fläschchens  
feststellen.

#### 4. Magnetismus.

Nur wenige Mineralien zeigen von Natur Magne-  
tismus, der in seltenen Fällen attractorisch, meist nur  
retractorisch ist.

Die diamagnetischen Eigenschaften, welche alle Kör-  
per in größerem oder geringerem Grade zeigen, sind zu  
schwierig festzustellen, als daß sie für den praktischen  
Mineralogen von großem Werthe sein könnten.

#### 5. Optische Eigenschaften.

Diejenigen äußern Kennzeichen der Mineralien,  
welche auf der Einwirkung des Lichts beruhen, sind  
schon deshalb als Merkmale vom ersten Range anzu-  
sehen, weil sie am meisten in die Augen fallen, am  
leichtesten erkannt werden können, und man darf sich  
deshalb nicht verwundern, wenn in früheren Zeiten auf  
deren Bestimmung ein fast übergroßes Gewicht gelegt  
wurde.

Am wenigsten wesentlich erscheint die Durchsichtig-  
keit (Transparenz), welche durch dunkle Färbung oder  
vielfache Aggregation leicht alterirt werden kann.  
Man unterscheidet folgende Grade: durchsichtig, halb-  
durchsichtig, durchscheinend, lantendurchscheinend, un-  
durchsichtig.

Der Glanz ist eine Erscheinung, welche durch die  
Reflexion des Lichts von mehr oder weniger glatten  
Flächen hervorgerufen wird. Er ist nach Art und  
Stärke verschieden. Nach der Art des Glanzes hat  
man zunächst die metallischglänzenden Mineralien  
von den nichtmetallischglänzenden zu sondern,  
eine Untercheidung von eingreifender Wichtigkeit, da  
die erste Art des Glanzes, welche stets mit vollkom-  
mener Undurchsichtigkeit und ganz bestimmten Farben  
gepaart erscheint, nur den schweren Metallen und  
vielen ihrer Verbindungen zukommt. Die nicht-  
metallischglänzenden Mineralien zeigen je nach der  
Stärke ihres Lichtbrechungsvermögens Diamant-  
glanz, Glasglanz, Fettglanz, Perlmutter-  
glanz oder Seidenglanz. Der Perlmutterglanz  
findet sich nur bei Individuen, welche aus unendlich  
vielen äußerst dünnen Lamellen zusammengesetzt sind,  
und zeichnet deshalb besonders die Flächen der voll-  
kommensten Spaltungsrichtungen aus; der Seidenglanz  
beruht lediglich in feinfaseriger Aggregation. Krystall-  
combinationen zeigen sehr häufig verschiedene Arten  
des Glanzes auf den Flächen der verschiedenen combi-  
nirten einfachen Gestalten.

Je nach der Stärke des Glanzes spricht man von  
starkglänzenden, glänzenden, schimmernden und matten  
Mineralien.

Alle diese Ausdrücke sind lediglich conventioneller  
Natur und deshalb einer scharfen Definition nicht  
fähig, nur durch vielfache Anschauung kann man sich



die damit bezeichneten Erscheinungen einprägen. Noch mehr gilt dies von den Farben, worunter man die Empfindungen versteht, welche die Strahlen des reflectirten oder transmittirten Lichts in unserm Auge hervorrufen.

Metallischglänzende Mineralien besitzen stets auch ihnen eigenthümliche metallische Farben, rothe, braune, gelbe, weiße, graue oder schwarze, welche noch in verschiedene Nuancen, z. B. goldgelb, messinggelb, silberweiß, bleigrau, stahlgrau u. s. f. unterschieden werden.

Die nichtmetallischen Farben, welche sich unter die acht Hauptfarben, weiß, grau, schwarz, grün, blau, gelb, roth und braun, bringen lassen, sind für die Charakterisirung der Mineralien von verschiedenem Werth, denn während es eines theils viele Mineralien (besonders Verbindungen schwerer Metalle) gibt, welche unter allen Umständen dieselbe Farbe zeigen, bei denen also die Farbe als ein wesentliches, charakteristisches Kennzeichen anzusehen ist (farbige Mineralien), ist bei der größten Mehrzahl die Färbung nur durch Beimischung von gewissen Pigmenten verursacht, also nur als ein zufälliges, unwesentliches Merkmal zu betrachten (gefärbte Mineralien).

Jede der oben erwähnten acht Hauptfarben ist durch eine Varietät als reinste, Charakterfarbe, repräsentirt. Diese sind: schneeweiß, aschgrau, sammet-schwarz, smaragdgrün, berlinerblau, citronengelb, lamarinroth, kastanienbraun; die übrigen sehr zahlreichen Farben-  
nuancen, sind durch Mischungen jener hervorgerufen.

Die Lichtstrahlen werden bekanntlich beim Uebergang aus einem Mittel in das andere, also auch beim Uebergang aus der Luft in Mineralien, aus ihrer Richtung abgelenkt, gebrochen. Diese Brechung ist aber bei sehr vielen Mineralien, d. h. bei allen, die nicht amorph oder nicht im tesseralen System auskristallisirt sind, von einer ganz besondern Erscheinung begleitet, indem nämlich die Lichtstrahlen beim Eintritt in jene Mineralien nicht nur aus ihrer ursprünglichen Richtung abgelenkt, sondern auch in zwei Strahlen zerlegt werden. Man nennt diese Erscheinung die doppelte Strahlenbrechung. Indessen existiren auch in doppeltbrechenden Mineralien eine oder zwei Richtungen (die optischen Achsen), in welchen die Lichtstrahlen nur einfach gebrochen werden, und zwar besitzen tetragonal und hexagonal kristallisirende Mineralien eine, rhombisch, monoklinisch und triklinisch kristallisirende dagegen zwei optische Achsen.

Nur sehr selten kann man die doppelte Strahlenbrechung direct beobachten, wie z. B. an den durchsichtigen Spaltungsflächen des isländischen Kalkspats, in der Regel bedarf es dazu einer Untersuchung im polarisirten Licht. Man bedient sich zu diesem Zwecke entweder eines Nörrenbergischen Polarisationsinstruments (Zaf. 2, Fig. 61) oder noch einfacher einer Turmalinlange (Zaf. 2, Fig. 62). Diese kleine elastische Ringe hält in drehbaren Fassungen zwei Plättchen von Turmalin, welche parallel der kristallographischen Hauptachse geschliffen sind; bei paralleler Achsenlage der Plättchen erscheint das Gesichtsfeld beim Durchsehen hell, bei gekreuzter Achsenlage dagegen dunkel. Wenn man nun zwischen die in gekreuzter Achsenlage befindlichen Turmalinplättchen eine Lamelle irgendeines Minerals einlegt, so wird das Gesichtsfeld hell, wenn dieses Mineral doppelte Strahlenbrechung besitzt; bleibt dagegen das Gesichtsfeld dunkel, so hat das betreffende Mineral, wenigstens in der Richtung, in welcher das Licht durchgeht, einfache Brechung.

Die Turmalinlange ist aber auch noch weiter des-

halb ein sehr nützliches Instrument, weil sich mit ihrer Hilfe nachweisen läßt, ob ein doppeltbrechendes Mineral optisch einachsig oder zweiaxig ist. Eine Lamelle eines einachsigen, also tetragonalen oder hexagonalen Minerals, senkrecht zur Hauptachse gespalten oder geschnitten, zeigt nämlich zwischen gekreuzten Turmalinplatten ein System kreisrunder, farbiger Ringe, welche von einem schwarzen Kreuz durchschnitten sind (Fig. 63a), zwischen parallelen Platten dagegen ein weißes Kreuz und schmale Ringe in den Complementärfarben.

Anders ist die Erscheinung, wenn man eine Lamelle eines optisch zweiaxigen Minerals, welche senkrecht auf die Mittellinie der optischen Achsen geschnitten ist, zwischen gekreuzten Turmalinplatten beobachtet. Hier erblickt dann bei verschiedenen Stellungen der Lamelle zwei Systeme elliptischer, farbiger Ringe, welche von farbigen Curven (Commissuren) umgeben sind und entweder ein symmetrisches schwarzes Kreuz (Fig. 64a) oder zwei schwarze Hyperbeln (Fig. 64b) zeigen.

## 6. Elektrische Eigenschaften.

Durch Reiben werden alle Mineralien elektrisch. Die erzeugte Electricität ist bald positiv, bald negativ zum Theil nach sehr zufälligen Umständen; findet man nur bei wenigen Mineralien elektrische Erscheinungen hervor. Manche, und zwar besonders durch polymorphismus ausgezeichnete Mineralien werden durch dem Einfluß von Temperaturveränderungen elektrisch, so besonders der Turmalin, der deshalb von den Gelehrten früher Achsentröder (Achsenzieher) genannt wurde (pyroelektrische Mineralien). Dabei ist als besonders bemerkenswerth noch das hervorzuheben, daß bei gewissen Mineralien die beiden Electricitäten ungleich, an entgegengesetzten Punkten hervorgerufen werden (polare Pyroelectricität).

Unter den Instrumenten und Apparaten, welche der Mineralog bedient, ist eins der wichtigsten unentbehrlichsten das Mikroskop, welches theils als einfaches Mikroskop oder Lupe (Zaf. 2, Fig. 60) zur Vergrößerung und Deutlichmachung der oft sehr kleinen Individuen, theils als zusammengesetztes Mikroskop zum Studium der innern, feinnern Structur, zur Aufklärung besonderer Eigenthümlichkeiten und Erklärungen die vielfachste Anwendung findet. Mit dem des lehtern, des eigentlichen Mikroskops, unter welchem man aber nur ganz feine Splitter, oder besser präparirte, durchsichtig geschliffene Lamellen von Mineralien untersuchen kann, hat man gefunden, daß die Homogenität und vollkommene Raumfüllung vieler Mineralien nur eine scheinbare ist, daß sie mehr sehr häufig von unzähligen, leeren oder gefüllten Hohlräumen, von Kristallen, oder kristallinischen, oder ganz eigenthümlich unregelmäßig geformten Silicium durchsichtbar sind, daß ferner die scheinbar gleichmäßige Färbung gewisser Mineralvarietäten durch eingestreute Plättchen eines fremdartigen Körpers hervorgerufen ist, u. s. f. Kurz, man hat durch das Mikroskop so vielfache und so interessante Aufschlüsse über die innere Natur der Mineralien erlangt, daß es neuerer Zeit sehr viele Forscher sich dem Studium dieser Erscheinungen widmen.

Zaf. 3 führt nun einige Beispiele solcher mikroskopischer Bilder vor: Einschlüsse von Flüssigkeiten in Quarz (Fig. 1), von Kriställchen in Labrador (Fig. 2) und Schlacke (Fig. 3), von regellos gestalteten Körnern in Obsidian (Fig. 4).

## Die Eigenschaften der Mineralien.

tändige Einsicht in die Natur und das Mineralien erlangt man durch das Ver-  
deren morphologischen und physikalischen  
noch nicht, dazu gehört notwendigerweise  
nntniß ihrer stofflichen oder chemischen  
nicht nur weil jene mit den letztern  
Zusammenhänge stehen, ja von ihnen viel-  
bedingt werden, sondern auch weil sich  
eit der Mineralien im täglichen Leben,  
wendung zu Decorations- oder baulichen  
sehen, fast in allen Fällen auf das Vor-  
ewisser chemischer Bestandtheile gründet.  
st bekannten, mehr als sechzig einfachen,  
Stoffe oder Elemente finden sich  
den Mineralien vor, jedoch ist nur etwa  
weil von ihnen allgemein und in größerer  
eitet. Es sind dies: Sauerstoff, Wasser-  
Kohlenstoff, Silicium, Phosphor und  
den Metalloiden; von den Metallen da-  
um, Natrium, Barium, Calcium, Magne-  
sium, Mangan, Eisen, Zink, Blei, Kupfer,  
mion und Arsen.

Die Elemente treten für sich als Mineralien  
ind sie zu chemischen Verbindungen  
Gewichtsverhältnissen) vereinigt. Nach  
en Mineralogen wenigstens noch gewöhn-  
lichen Anschauungsweise, denkt man sich,  
zwei Elemente zu einer Verbindung  
nung, zwei Verbindungen erster Ordnung  
ung zweiter Ordnung u. s. f. zusammen-  
erklärt sich so den oft sehr complicirten  
bau der Mineralien. Die Verbindungen  
nt, welche am häufigsten durch Vereinig-  
auerstoff mit irgendeinem andern Element  
ennt man im allgemeinen Oxide und  
e nach ihren Eigenschaften, in Basen  
engern Sinne, mitunter auch Erden ge-  
säuren; Verbindungen zweiter Ordnung,  
ementen von Basen und Säuren ent-  
ichnet man als Salze (basische, neutrale

seltenern Verbindungen von Schwefel mit  
enten nennt man entsprechend Schwefel-  
wefelsäuren und Schwefelsalze, die  
n von Chlor u. s. w. mit Elementen end-  
schon als Verbindungen erster Ordnung  
arakter haben — Haloidsalze.

Mineralien als nach festen Verhältnissen  
mische Verbindungen anzusehen sind, so  
tisch die Frage nach der chemischen Con-  
einer Species zugehörigen Körper eine  
eantwortung finden; die Ermittlung  
einem Exemplar würde für alle Fälle,  
e Species genügen. In Wirklichkeit aber  
e Sache anders, da, abgesehen von zu-  
sammischen Beimengungen, deren Häufigkeit  
rch die neuere Mikroskopie nachgewiesen  
ie theoretische Zusammensetzung durch das  
omorphe Bestandtheile, d. h. solcher  
e, welche die Fähigkeit haben, sich gegen-  
bestimmten Verhältnissen zu vertreten,  
ewisser Grenzen alterirt werden kann.  
aber, wenn man nicht in sonstigen, mor-  
und physikalischen Beziehungen ganz über-  
Körper auseinanderreißen und in un-  
peciesmacherei verfallen will, der chemi-  
nensetzung für jede Mineralspecies einen  
ekraum gewähren.

Die Feststellung der genauen, qualitativen und  
quantitativen Zusammensetzung der Mineralien ist die  
Sache des Chemikers, der Mineralog begnügt sich  
damit, die Resultate von dessen oft mühevollen und  
zeitraubenden Arbeiten zu acceptiren und daraus die  
für seine Zwecke nöthigen Schlüsse zu ziehen; wohl-  
aber muß sich der Mineralog mit den chemischen Re-  
actionen der Mineralien, d. h. den Erscheinungen  
und Veränderungen, welche sie bei Einwirkung anderer  
Stoffe und zersetzender Agentien wahrnehmen lassen,  
vertraut machen, da ihm diese in vielen Fällen, wo  
äußere Kennzeichen nicht mehr ausreichen, werthvolle  
Fingerzeige zur Bestimmung derselben darbieten können.

Um chemische Versuche mit einem Körper vornehmen  
zu können, muß man ihn stets erst in den flüssigen  
Aggregatzustand überführen, sei es mit Hülfe hoher  
Temperatur in geschmolzenen, sei es mit Hülfe von  
Auflösungsmitteln in wässrig flüssigen Zustand, und  
je nachdem man den einen oder andern Weg ein-  
schlägt, unterscheidet man Untersuchungen auf trocke-  
nem und solche auf nassem Wege, und es ist be-  
sonders die erste Methode wegen ihrer Bequemlichkeit,  
und deshalb, weil sie nur sehr geringe Mengen des  
zu prüfenden Körpers beansprucht, bei den Mineralogen  
sehr beliebt.

Zur Erzeugung hoher Temperaturen bedient man  
sich des Löthrohrs (Taf. 1, Fig. 60, nebst der von  
Plattner angegebenen Lampe), welches zunächst die  
Schmelzbarkeit eines Minerals festzustellen, dann aber  
auch durch Flammen- und Perlenfärbung oder durch  
die bei der Behandlung eines Minerals auf Kohle  
beobachteten Erscheinungen Schlüsse auf die Gegen-  
wart bestimmter Stoffe zu ziehen erlaubt. Was zu-  
vörderst die Schmelzbarkeit der Mineralien, aller-  
dings eine mehr physikalische Eigenschaft, betrifft, so  
ist hauptsächlich deren Grad zu bestimmen. Man  
unterscheidet in dieser Beziehung leicht schmelzbare,  
schwer schmelzbare, an den Ranten schmelzbare und  
unschmelzbare Mineralien, oder man bezeichnet den  
Grad der Schmelzbarkeit mit einer Zahl, indem man  
sich zur Vergleichung der der Härtescala analogen  
Schmelzbarkeitscala bedient. Diese besteht aus  
den Mineralien Antimonglanz, Natrolith, Almandin,  
Strahlstein, Orthoklas und Bronzit, von denen das  
erste an der bloßen Lichtflamme schmilzt, das letzte  
aber unschmelzbar ist. Außer dem Grade der Schmelz-  
barkeit hat man noch andere Erscheinungen zu beob-  
achten, da manche, besonders wasserhaltige Mineralien,  
unter Aufschäumen schmelzen, während andere eine klare,  
durchsichtige Kugel, wieder andere dagegen ein un-  
durchsichtiges Email liefern. Nimmt man die Schmelz-  
versuche nicht in der Pincette, sondern auf einem  
Stück Holzkohle vor, so hat man zu berücksichtigen, ob  
das Mineral einen flüchtigen Bestandtheil von sich  
gibt, der entweder einen bestimmten Geruch besitzt,  
oder als ein gefärbter Beschlag auf der Kohle, hinter  
der Probe sich festsetzt. So deutet z. B. das Auf-  
treten eines nach Knoblauch riechenden Dampfes auf  
die Gegenwart von Arsen; ein gelber Beschlag auf  
Blei, ein weißer, feuerbeständiger Beschlag auf Zink,  
ein weißer, aber flüchtiger auf Antimon u. s. w.

Gewisse Stoffe, besonders Alkalien, alkalische Erden,  
Kupfer u. s. w. ertheilen der äußern Löthrobrflamme  
eine gewisse Färbung, welche man am leichtesten er-  
hält, wenn man die Probe mit Chlornasserstoffsäure  
(Salzsäure) befeuchtet, da die Chlorverbindungen am  
leichtesten flüchtig sind. So erhält man durch Natron  
eine gelbe, durch Kali eine violette, durch Strontianerde  
eine karminrothe, durch Kalkerde eine gelblich-rothe,  
durch Kupfer eine schön blaugrün gefärbte Flamme.

Wenn man Mineralien mit Hilfe von Flussmitteln (Borax oder Phosphorsalz) im Oehre eines Platin-drabts oder auf Kohle vor dem Löthrohr zusammenschmilzt, so bekommen die so erhaltenen Perlen bei Gegenwart gewisser Substanzen bestimmte Farben. Es ist hierbei zu beachten, ob die Perle stark oder schwach mit dem Mineralpulver gesättigt ist, ob sie noch heiß, oder schon erkaltet ist, ob man sie mit der oxydirenden äußern oder der reducirenden innern Flamme behandelt hat, da alle diese Umstände auf die Färbung von Einfluß sein können und gerade durch derartig bewirkte Farbenveränderungen die Gegenwart eines Stoffs mit um so größerer Bestimmtheit erkannt werden kann. So färbt, um nur einige Beispiele anzuführen, das Mangano die Boraperle im Oxydationsfeuer amethystroth bis schwarz, je nach dem Sättigungsgrade, im Reductionsfeuer wird diese Perle dagegen farblos, das Eisen ertheilt der Perle im erstern Falle eine gelbe bis dunkelrothe Farbe, welche sich im Reductionsfeuer in Grün umwandelt u. s. w.

Behandelt man ferner gewisse Mineralien mit Soda auf Kohle oder Platinblech vor dem Löthrohr, und befeuchtet dann die Schmelze mit Kobaltlösung, so gibt sich auch hier die Gegenwart von gewissen Stoffen (Thonerde, Magnesia) durch Färbungen kund; andere, metallhaltige Mineralien, auf Kohle mit Soda zusammen geschmolzen, hinterlassen ein regulinisches Metallkorn. Mit diesen eigentlichen Löthrohruntersuchungen verbindet man in der Regel noch kleine Prüfungen durch Erhitzen von Mineralien im Glasröhrchen, in der offenen und zugeschmolzenen Glasröhre, wodurch die Gegenwart von flüchtigen Stoffen, so von Wasser, Schwefel, Arsen, Antimon, Quecksilber nachgewiesen werden kann.

Untersuchungen auf nassem Wege werden von den Mineralogen, schon weil sie umfänglichere Hilfsmittel und größern Aufwand an Zeit erfordern, weniger benutzt; in der Regel begnügt man sich damit, das Verhalten der Mineralien gegen Lösungsmittel festzustellen.

Diese Lösungsmittel, Wasser, Salzsäure, Salpetersäure oder ein Gemenge von beiden, selten Schwefelsäure, wendet man gradatim an, wobei man häufig ihre Einwirkung durch gelindes Erwärmen zu unterstützen hat. Man beobachtet hierbei, ob und in welchem Lösungsmittel ein Mineral auflösbar oder zersezbar (d. h. partiell, mit Hinterlassung eines Rückstandes löslich) sei, ob dabei ein Aufbrausen, durch pflögliches Entweichen einer Gasart bedingt, oder die Entwidlung eines riechenden Gases stattfindet. Die Zersezbarkeit ist besonders für gewisse kiesel-säure, das Aufbrausen für kohlensäure Salze, die Entwidlung riechender Gase für manche Schwefelverbindungen charakteristisch; in Wasser lösliche Mineralien endlich besitzen einen bestimmten Geschmack.

## D. Beschreibung der wichtigsten Mineralien.

### I. Klasse. Metalloide.

#### 1. Schwefel.

Die Krystalle des in der Natur vorkommenden Schwefels gehören dem rhombischen System an; bei vorwaltend pyramidalem Habitus treten untergeordnet prismatische und domatische Gestalten sowie Pinakoide auf. (Der aus Lösungen künstlich auskrystallisirte Schwefel zeigt ebenfalls rhombische Formen, während sich beim Erkalten von geschmolzenem Schwefel monoklinische Krystalle bilden; er ist also dimorph.)

Die bis zu einigen Zoll langen Krystalle sind meist

zu Gruppen vereinigt, auf andern wachsen; häufiger kommt der Schwefel ohne bestimmte Structur vor, oder es sind von erdiger und mehligter Beschaffenheit anhäufungen mikroskopisch kleiner Krystalle.

Die Spaltbarkeit nach den basischen Flächen ist unvollkommen, der Bruch muschlig, splitterig, die Härte gleich der des specifische Gewicht = 2,0. Die Krystalle sind durchsichtig fett: bis diamantglänzend hellgelber Farbe; die derben Massen durchscheinend und lichtgelb bis lichtbraun. Elektricität wird durch Reiben und beim Erwärmen in der hohlen Hand ein knirschendes Geräusch vernommen.

Der Schwefel schmilzt bereits bei 110° C. bis zu 420° (unter Luftabzug) über, unter Luftzutritt erhitzt, verbrennt in Flamme zu schwefeliger Säure, welche den stechenden Geruch auszeichnet.

Der Schwefel, welcher meist durch haltige Exhalationen oder durch vulkanischen (oder andern organischen) Säure Verbindungen (Gips u. dgl.) entsteht, findet sich in größter Menge in der tertiären Formation, so bei Gängen in Sicilien, bei Conil im südlichen Spanien, Fundorte schöner Krystalle bekannt, in Argonien, zu Radoboj in Kroatien (hiesiger zu Smosowice bei Kralau). Argentinischer Schwefel, besonders der mehligste, aus von Vulkanen, so am Vesuv, bei Capriano (in geschmolzenen, statuarischen Krystallen) u. s. w.

Der Schwefel findet vielfache Anwendung, besonders zur Darstellung der Schießpulvers und der Zündhölzer, des Seepfens, als Arzneimittel u. s. w.

#### 2. Diamant.

Der Diamant krystallisirt meistens in Octaëder, Rhombendodekaëder, Tetraëder, Hexaëder, letztere Gestalten sind genähert, mit abgerundeten Flächen und Kanten, meist in der Richtung einer Krystallachse.

Der Diamant hat sehr vollkommene Spaltbarkeit, die höchste Härte unter allen Krystallen, specifische Gewicht = 3,5. Der Diamant zerfällt auf die meisten rauen Krystallflächen erst auf Spaltungs- und Schmelzflächen; das starke Lichtbrechungsvermögen, das harte Farbenspiel. Die durchsichtigen Krystalle sind farblos, oft wasserhell, doch manche in verschiedenen grauen, grünen, blauen und violetten Tönen gefärbt.

Der Diamant ist reiner Kohlenstoff, ihn daher, aber nur unter Anwendung von Kohlen-säure verbrennen, steht er hartnäckig allen Versuchen wider, hauptsächlich aus diesem Grunde ist es nicht möglich gewesen, ihn aus Krystallen zu stellen.

Der Diamant findet sich vornehmlich in Lagerstätten, d. h. in losen oder unverbundenen Anhäufungen zertrümmerten in Gesellschaft von andern Mineralien, Gold, so in Ostindien (Bateas von Ceylon), am Ural und in Brasilien (Bombar). In letztem Lande, dem reichsten in Diamanten, hat man ihn endlich auch eingewonnen.



einem glimmerschieferartigen Gestein; auch oft in derben Massen von feinförniger Zung (als sog. Carbonat) vor.

### 3. Graphit.

en, sechsseitigen, auf der Endfläche oft triristeten Tafeln, in denen das Mineral mitnimmt, gehören wahrscheinlich dem heragonalen am häufigsten tritt er in derben, strahligen, schuppigen oder dichten Aggregaten, emengtheil gneisartiger Gesteine auf. Das nach einer Richtung sehr vollkommen spaltbaren Blättchen biegsam, sehr weich, daher auch fettig anzufühlen, und besitzt das Spec. 1,9—2,2, dabei eisenschwarze Farbe und

Der Graphit besteht, wie der Diamant, stoff, dem in der Regel etwas Eisen beizugeht, und er ist deshalb, wie jener, aber ebensoviele, zu Kohlenfäure verbrennbar. Graphit bieten demnach ein ausgezeichnetes Dimorphismus dar, und in der That kann auch bei gleicher chemischer Beschaffenheit ganz verschiedene morphologischen und physikalischen Eigenschaften denken.

Krystalle kennt man besonders von Pargas in Kalk eingewachsen, in großen Massen Graphit auf Ceylon und bei Semipalatinsk vor, als Gemengtheil von Gesteinen bei Baiern. Berühmt wegen seiner Reinheit ist t von Borrowdale in England.

lichem Wege gebildete Graphitkrystalle sind selten als Auscheidungen in kohlenstoffreichen.

ten Graphitsorten werden zu Bleistiften verschlechten zu feuerfesten Ziegeln; außerdem Verwendung als Schmiermittel und Farbstoff Schwarzem eiserner Geräthschaften.

## II. Klasse. Salze.

III. Kohlenfäure Salze (Carbonate).

### 4. Kalkspat.

(Tafel 2, Fig. 11—17, 19, 20, 22.)

ndgestalt der amgezeichnet entwickelten heragonalen Krystallreihe ist ein Rhomboeder, den Scheitellanten 105°, in den Randlanten Fig. 12). Von dieser Grundgestalt, welche in den Krystallen ausgebildet erscheint, rigen außerordentlich zahlreichen Krystallgeleiten; als die wichtigsten sind anzuführen: oeder von halber (Fig. 11), zweifacher vierfacher und sechszebnfacher Länge der das Stalenoeder von dreifacher Achsenlänge s Prisma und die Basis. Diese und noch einfache Gestalten combiniren sich in der en Art und Weise, sodaß nicht weniger als mbinationen bis jetzt bekannt sind. Der Krystalle ist ebenfalls, je nach dem Vorherrn- oder der andern Form, ein sehr wechselnd- scheinen sie rhomboedrisch, bald stalenoedertafelartig, oder lang- oder kurzsäulenförmig. sind nicht selten; man beobachtet sie theils in Achsensystemen (so besonders stalenoedrbinationen, Fig. 20), theils mit geneigten ten (säulenförmige Krystalle, Fig. 22). Die en sind meist glatt und glänzend, doch sind ie Basis und die Flächen des seltenen oeders, in der Regel trübe, rau oder

So häufig und weit verbreitet auch die krystallisirten Varietäten dieses Minerals sind, so findet sich doch die Hauptmasse desselben in andern Formen, in grob- und feinförnigen bis dichten Aggregaten, in stalattitischen, stengeligen und faserigen Bildungen, oder in erdiger Beschaffenheit, oder als Versteinigungsmaterial von Thierresten.

Die Spaltbarkeit nach den Flächen der Stammgestalt ist höchst vollkommen, die Spaltungsflächen zeigen Perlmutterglanz, die Krystallflächen dagegen Glasglanz. Härte = 3, Gewicht 2,6—2,8.

Das Mineral findet sich in allen Graden der Durchsichtigkeit und in den verschiedensten Färbungen, vom wasserhellen Doppelspat an bis zu dem schwarzen, durch Kohle gefärbten Anhydronit.

Das ausgezeichnete doppelte Lichtbrechungsvermögen, welches die Anwendbarkeit mancher Varietäten zu optischen Zwecken bedingt, ist schon oben erwähnt worden.

Der Kalkspat besteht aus kohlenfäurer Kalkerde; jedoch ist meist, außer in den reinsten Abänderungen, ein Theil der Kalkerde durch entsprechende Mengen von Magnesia oder Eisenorydul vertreten. Er ist vor dem Löthrobr unschmelzbar, verliert aber beim Erhitzen seine Kohlenfäure und verwandelt sich in kalktische, leicht Wasser aufnehmende Kalkerde. In kalter Salzfäure löst er sich schon in Stücken leicht auf, die Kohlenfäure entweicht dabei unter heftigstem Aufbrausen.

Man unterscheidet bei diesem wichtigen und weitverbreiteten Mineral, je nach der Art seiner Ausbildung, verschiedene Varietäten; so zunächst den eigentlichen krystallisirten Kalkspat, den man besonders auf Erzgängen, in Drusenräumen von Kalksteinen und andern Gesteinen antrifft (Freiberg, Andreasberg, Tharand, Derbyshire und Cumberland), ferner die körnigen bis dichten Abänderungen (Marmor, Kalkstein), die ganze Gebirgsgänge und Länderstreden bilden (berühmte Marmorbrüche zu Carrara in Italien, Pentelikon in Griechenland, Insel Paros), ferner die Kalkschiefer (Solnhofen in Baiern), die faserigen Kasse und Kalksinter, die Dolithe oder Nogensteine (ihrer kugelförmigen Structur halber so genannt), endlich die erdigen Abänderungen (Kreide) aus Nügen, Nordfrankreich, England.

In Künsten und Gewerben findet das Mineral die ausgedehnteste Verwendung. Die in großen Blöden brechenden feinförnigen Kalksteine dienen der Bildhauerei, schöngefärbte dichte Kalksteine der Ornamentik; andere körnige Kalksteine liefern das Material zur Darstellung der Kohlenfäure für die ausgedehnte Fabrikation künstlicher Mineralwässer, die Kalkschiefer finden Anwendung in der Lithographie, die Kreide benutzt man zum Schreiben, vor allem aber sind die Kalksteine wichtig als leicht zu bearbeitende Bausteine und im gebräunten Zustand als Material zur Mörtelbereitung; durch Thon verunreinigte Kalksteine, die sog. Mergel, endlich werden auch zum Düngen der Felder verwendet.

### 5. Talkspat (Magnesitspat).

Die Krystallform ist, identisch mit der des Kalkspats, rhomboedrisch, mit nur geringen Winkelabweichungen. Dagegen ist die Krystallisationsreihe bei weitem weniger entwickelt; meist findet man das Mineral nur in der Form des Stammrhomboeders oder in wenigen andern Combinationen. Die Spaltbarkeit ist ebenso vollkommen wie beim Kalkspat, Härte und spezifisches Gewicht sind etwas höher als bei diesem. Die glas- bis perlmutterglänzenden Individuen sind meist durchsichtig, farblos oder licht gefärbt.

Der Talkspat besteht aus kohlenfäurer Talkerde (Magnesia), er besitzt also eine dem Kalkspat analoge Zusammenfügung; von Säuren wird er schwerer, als

dieser, meist nur in der Wärme, unter Aufbrauen gelöst.

Man findet dieses Mineral, in ringsum ausgebildeten Individuen, eingewachsen in Talkstiefen an vielen Punkten der Alpen; eine dichte, in nierenförmigen Massen auftretende Modification kennt man von Kraut in Steiermark und von andern Orten.

### 6. Bitterspat (Dolomit).

Auch bei diesem Mineral lehrt die Krystallform des Kalkspats wieder, mit Winkelabmessungen, die zwischen denen des Kalkspats und des Talkspats liegen. Am häufigsten tritt das Stammrhomboeder selbst, oft mit tafelförmig gebogenen Flächen, auf, seltener ist das flachere Rhomboeder (linienförmig ausgebildet) oder einfache Combinationen.

Die Krystalle sind meist aufgewachsen und zu Gruppen oder Drusen vereinigt, sehr häufig und in großen Massen findet man grob- bis feinförmige Abänderungen, bei denen die einzelnen Individuen nicht wie beim Kalkstein innig verwachsen, sondern viel loser (zuckertörmig) verbunden erscheinen (Dolomit). Die physikalischen Eigenschaften, Spaltbarkeit, Härte, Gewicht u. s. w., sind nahezu dieselben wie die des Kalkspats.

Der Bitterspat besteht aus kohlensaurer Magnesia und kohlensaurer Kalkerde, in den reinsten Varietäten nach gleichen Mischungsgewichten; doch weichen die meisten Abänderungen von der Normalzusammensetzung etwas ab, sodas sich Uebergänge nach beiden Richtungen, nach Kalkpat einer-, nach Talkpat andererseits, vorfinden. Außerdem wird häufig in den sogenannten Braunspaten ein Theil der Basen durch Eisenoxydul oder Manganoxydul vertreten. Das Verhalten gegen Säuren wie beim Kalkpat.

Die krystallisirten Varietäten finden sich theils in Chlorit- oder Talkstiefen der Alpen, theils auf Erzgängen (Freiberg, Joachimsthal im Erzgebirge), theils in Drusen von Dolomit (Charand in Sachsen), die förmigen Abänderungen bilden Lager oder ganze Gebirgshänge, so besonders in den Alpen, in der Fränkischen Schweiz u. s. w.

### 7. Aragonit.

Die rhombischen Krystalle dieses Minerals zeigen besonders häufig die Combination von Prisma, Brachypinacloid und Brachydroma, oder von Prisma, Brachypinacloid und Basal, von denen die letztern, da der Prismawinkel nur wenig von  $120^\circ$  abweicht, einen hexagonalartigen Charakter besitzen. Andere, spießig ausgebildete Varietäten zeigen sehr spitze Pyramiden und Brachydromen. Sehr häufig finden sich Zwillinge, welche eine Prismenfläche gemein haben (Taf. 2, Fig. 37), und alternirende Zwillinge desselben Gesezes, bei denen die mittlern Individuen nur papierdünne Lamellen bilden, sodas sich die Verwachsung lediglich aus einer feinen Streifung der brachydiagonalen und brachypinacloiden Flächen erkennen lässt. — Die Krystalle sind oft ringsum ausgebildet, seltener aufgewachsen, häufig sind stengelige und faserige Aggregate, letztere oft radialfaserig oder concentrisch-schalig (Erbsenstein, Taf. 3, Fig. 12), oder stalaktitisch und finterartig (Sprudelstein), auch finden sich baumförmige und zackige Gestalten (Eisenblüte, Taf. 3, Fig. 15).

Die Spaltbarkeit ist deutlich brachydiagonal, der Bruch muschelig, Härte = 4, Gewicht 3,0; die glasglänzenden Individuen sind wasserhell oder weingelb, auch lichtgrün oder violett gefärbt, derbe Massen oft dunkler. Die chemische Zusammensetzung und das chemische Verhalten des Aragonits ist dem des Kalkspats gleich; die kohlensaure Kalkerde liefert also ein weiteres Bei-

spiel für den Dimorphismus einer Substanz. Man hat gefunden, das sich dieselbe auch in der Form des Kalkspats, aus dem des Aragonits abscheidet.

Schöne Krystalle finden sich in der Molina in Aragonien, in Bajalthal in Spanien, gewachsene spießige Varietäten bei Schönbach und zu Alstonmoore in England. In Kalkstufen (Sprudelstein) bilden sich auch aus den heißen Quellen von Carlsbad, aus der Gegend von Eger, aus dem Giesenerz in Steiermark.

Der Sprudelstein wird zu kleinen Gefäßen und Geräthschaften verarbeitet.

### 8. Natron.

Dieses Mineral, die natürliche Soda, ist in krystallinischen Krusten oder in wässriger Efflorescenz des Bodens in heißen Quellen. Künstliche Krystalle sind merkwürdig. Der Körper ist sehr weich und zerreiblich, hat ein geringes Gewicht von 1,5. Er besitzt die Eigenschaften des kohlensauren Natrons, ist leicht löslich, schmilzt bei gelinder Wärme in Wasser, verdunstet bei der Luft.

Das Mineral findet seines Beschränktes wegen nur wenig Verwendung; am häufigsten aber die Wichtigkeit der künstlichen Soda für ihre ausgedehnten Anwendung in der Glasfabrication, in der Bleicherei, in der Papierberei in ungeheuern Massen dargestellt.

### 2. Familie. Schwefelsaure Salze.

#### 9. Schwerpat (Barit).

Das rhombische Prisma von ca.  $10^\circ$  Basal, die einfachsten Krystalle (Taf. 2, Fig. 29 c), außerdem treten aber noch andere rhombische Formen, Pyramiden, Dodekaeder, Flächenpaare auf, sodas dadurch eine Mannigfaltigkeit der Formenentwicklung und der Krystalle entsteht; vorherrschend ist aber die pyramidenartige oder pyramidale Trupez (auch als rhombische Pyramiden, aus der Combination von Makrodroma entstanden, nicht selten stengelige Krystalle entstehen durch das Auftreten eines Flächenpaares (Stangenkrystalle), sind theils einzeln, theils zu mannigfaltigen und andern Gruppen vereinigt, derbe Massen von schaliger, faseriger, dichter Aggregation, selten erdige Massen.

Die Spaltbarkeit, vollkommen nach der Basalfläche, und das hohe Gewicht dieses Mineral leicht von andern Strahlungsarten die glasglänzenden und durchsichtigen Individuen sind verschieden, man findet verschiedene Nuancen, gefärbt.

Der Schwerpat besteht aus schwefelsaurem Barium, er ist unschmelzbar und widersteht der Auflösung, nur in der Salzsäure wird er aufgelöst.

Es ist ein weitverbreitetes, besonders häufig vorkommendes Mineral; findet sich in Varietäten von Freiberg und andern Orten, von Schemnitz in Ungarn, Offenbach in Preußen in Böhmen; der Stangenkrystall der dichte und erdige Barit von Joachimsthal in Böhmen, der faserigen radialstrahligen Knollen des Barits besitzen die merkwürdigen Eigenschaften, man findet längere Zeit im Dunkeln leuchtend.

Der Schwerpat dient als Zuckmittel.

benutzt man ihn zum Verfälschen des

### 10. Eblestin.

Graphischen und physikalischen Eigenschaften stimmen mit denen des isoperpatit sehr nahe überein, nur das Gewicht niedriger = 4. Zu Drusen vereinigte, schalige, körnige und körnige Aggregate, parallelschaliger Structur.

aus schwefelsaurer Strontianerde, ist vor leicht schmelzbar (Unterschied von Schwerer die äußere Flamme schön karminroth beim Befeuchten der Probe mit Salzsäure wird er wenig angegriffen).

bloße Krystalle mit Schwefel und Gips kleine, flächenreiche, himmelblau gefärbte und in Ungarn, parallelschalige Platten schelfalt der Gegend von Jena.

Darstellung von Strontianpräparaten, Feuerwerkerei Anwendung finden.

### 11. Anhydrit.

nd selten und noch nicht genau gemessen, Spaltungsflächen, welche drei, unter 90° de, aber verschiedenwerthige Spaltungsflächen, was auf rhombische Krystallisation ist derb in körnigen und stengelförmigen Aggregaten.

spezifisches Gewicht = 2,9; der Glanz ist glasig auf den vollkommensten Spaltungsflächen glasartig; häufig sind lichtblaue oder röthliche.

rit besteht aus schwefelsaurer Kalkerde; er ist in Säuren wenig löslich. Ein Vergleich des Steinsalzes, so im Salz auf den württembergischen Salzstöden, zu Vergleich.

### 12. Gips.

ntlichste Form der monoklinischen Krystalle als ist Taf. 2, Fig. 49 abgebildet; sie Combination von Klinopinakoid, Prisma und Pyramide; sehr häufig sind schwalbenartige Zwillinge (Fig. 50), welche nach der Orthopinakoid verwachsen sind. Die Krystalle beträchtlicher Größe, sind häufig ringsum der zu freien oder aufgewachsenen Gruppen in großen Massen tritt körniger, in Platten auf.

ichtung des Klinopinakoids läßt sich der zu dünnen, biegsamen Blättchen spaltend; besteht deshalb auf diesen Flächen Perlsonst Glasglanz. Härte = 2, Gewicht = 2,3. helle oder vollkommen durchsichtige Krystalle, die derben Aggregate meist licht gefärbt. besteht aus wasserhaltiger schwefelsaurer dem Lössrohr verliert er sein Wasser und mahl; in Wasser und Säuren ist er etwas entsteht oft aus Anhydrit, da dieser leicht mmt, umgekehrt bildet sich aber auch durch der Anhydrit aus dem Gips.

en, bis 2 Fuß langen Krystalle (oft ge-Friedrichsrode in Thüringen, vom Mont-Sargis; spätige und körnige Massen (Maz) in größern Lagern mit Steinsalz; der de Salzergips häufig zwischen den Thonen der Triasformation in Thüringen und nitunter auch als ganz neues Gebilde auf n.

Der Alabastrer wird häufig zu Schmuckgegenständen verarbeitet; der gebrannte Gips dient zum Dängen der Felder, zu Stuckarbeiten und Abgüssen. Der schwarzgeaderte manesfelder Stinkgips, der auch vielfach verarbeitet wird, ist ein von bituminösen Stoffen durchdrungener Gips; daher auch der unangenehme Geruch beim Schlagen.

### 3. Familie. Borsäure Salze (Borate).

#### 13. Boracit.

Die hemiedrisch-tetrahedralen Krystalle zeigen meist die Combination von Hexaeder, Tetraeder und Rhombendodekaeder, welche je nach dem Vorherrschenden einer dieser drei Formen verschiedenen Habitus besitzen. Man kennt nur kleine, ringsum ausgebildete Krystalle, welche in Gips oder Anhydrit eingewachsen sind.

Härte = 7, Gewicht = 3; die glas- bis diamantglänzenden Individuen sind meist graulichweiß gefärbt. Der Boracit besteht in der Hauptsache aus borsaurer Magnesia, er ist schwer schmelzbar und schwer in Säuren löslich.üneburg im Hannoverschen.

Der Stahlfurtt, welcher in größeren Mengen auf dem Steinialzlagern von Stahlfurt in der Provinz Sachsen in derben Massen vorkommt, ist wahrscheinlich dasselbe Mineral.

Der Tinkal oder Borax findet sich in breitsäulenförmigen monoklinischen Krystallen an den Ufern mehrerer Seen in Tibet; er besteht aus wasserhaltigem zweifach borsaurom Natron, ist in Wasser löslich und findet Anwendung als Fluß- und Lötlötmittel, sowie bei der Bereitung feiner Gläser.

### 4. Familie. Salpetersäure Salze (Nitrate).

#### 14. Salpeter.

Die rhombischen Krystalle besitzen die Form des Aragonits; in der Natur aber kommt er nur in feinen Nadelchen oder als flockiger und mehrlariger Ueberzug vor. Die sehr weiche und leichte Substanz besteht aus salpetersaurem Kali, ist in Wasser löslich, schmeckt lühelnd-salzig und verpufft auf glühender Kohle.

Man findet den Salpeter meist als Ausblühung des Bodens, so in Ungarn, wo diese Efflorescenzen einen Raum von 130 Quadratmeilen bedecken. Er findet vielfache Anwendung, besonders zur Darstellung der Salpetersäure und des Schießpulvers.

Der Chilisalpeter oder Natronsalpeter (salpetersaures Natron) findet sich in großen Massen von körniger Beschaffenheit in der regenlosen Wüste Atacama an der Grenze von Chile und Peru. Er liefert das billigste Material zur Salpetersäuredarstellung, wogegen er zur Fabrication des Schießpulvers nicht geeignet ist, da er Feuchtigkeit aus der Luft anzieht.

### 5. Familie. Phosphorsaure Salze (Phosphate).

#### 15. Apatit.

Hexagonales Krystallsystem; die häufigsten Formen sind die Taf. 3, Fig. 5, 6, 10 abgebildeten Combinationen (Prisma und Basis, Prisma und Pyramide resp. Prisma, Basis und Pyramide). Dazu gesellen sich häufig noch steilere und flachere Pyramiden 1. Richtung, sowie als Abstumpfungen der Combinationsecken von Prisma und Pyramide solche 2. Richtung, ferner in der Regel halbflächig ausgebildete, dihexagonale Pyramiden und Prismen, sodah die Krystalle oft sehr complicirt und flächenreich, die Orientirung an ihnen, besonders den turzfäulenförmig ausgebildeten, nicht ganz leicht ist. Die Krystalle sind häufig eingewachsen oder



einzeln aufgewachsen, doch auch zu Gruppen vereinigt; die derben, körnigen bis dichten Massen nennt man Phosphorit.

Das Mineral hat muscheligen Bruch; Härte 5, Gewicht 3,2; Glasglanz, auf Bruchflächen Fettglanz; farblos und wasserhell, meist aber gefärbt; grüne Abänderungen nennt man Spargelstein, blaugrüne Moroxit.

Der Apatit besteht aus phosphoraurer Kalkerde mit etwas Chlorcalcium oder Fluorcalcium; er schmilzt schwierig und färbt nach dem Besuchen mit Schwefelsäure die äußere Löthrohrflamme bläulichgrün (Reaction auf Phosphorsäure); er löst sich in Säuren.

Der Apatit ist ein steter Begleiter des Zinnerzes auf seinen Lagerstätten, so bei Ehrenfriedersdorf, Zinnwald und andern Orten im Erzgebirge; flächenreiche Krystalle vom St.-Gotthard, große trübe Krystalle von Snarum in Norwegen, fuselartige Individuen von Hammond in Newyork; Phosphorit kommt lagerförmig bei Dillenburg in Nassau und bei Auerberg in der Oberpfalz vor.

Der Phosphorit ist, da er dieselben Substanzen wie die Knochen enthält, ein sehr geschätztes Düngemittel.

#### 16. Kalait (Türkis).

Ein amorphes Mineral, welches sich nur in nierenförmigen oder stalaktitischen Massen als Ueberzug auf Kieferschiefer oder in Geröllen findet; es hat Feldspathhärte, ist wenig glänzend und theils schön himmelblau, theils grün gefärbt.

Er besteht aus wasserhaltiger phosphoraurer Thonerde, ist unschmelzbar, ertheilt der Flamme eine blaugrüne Färbung und löst sich in Säuren.

Der schöne himmelblaue orientalische Türkis, der als Edelstein ziemlich hoch geschätzt wird, kommt aus der Landschaft Herat in Asien; schlechter gefärbte Kalaite von Delsnit im Voigtland. Vieler sogenannter Türkis ist blau gefärbtes Eisenblein.

### 6. Familie. Fluorverbindungen (Fluoride).

#### 17. Flußspat.

Tesserales Krystallsystem, mit vorwiegend hexaëdrischem Formtypus, trotz der vollkommen octaëdrischen Spaltbarkeit. Die Mannichfaltigkeit und der Gestaltenreichtum der Krystalle ist sehr groß, da mit Ausnahme des Triakisoctaëders sämtliche holocëdrische Gestalten des Tesseralsystems allein oder in Combinationen vorkommen. Besonders häufige Combinationen Taf. 1, Fig. 13, 15, 17, 18, 19, 22. Die Flächen des Hexaëders sind meist glatt, mitunter aber durch das Auftreten sehr flacher Tetraëderhexaëder entstellt; die Octaëderflächen sind stets rauh oder treppenförmig gestaltet, die Folge davon, daß der octaëdrische Krystall aus lauter kleinen Hexaëdern aufgebaut ist. Hexaëdrische Durchkreuzungszwillinge sind nicht selten. Die Krystalle sind meist zu Gruppen und Drusen vereinigt aufgewachsen; körnige, stengelige und dichte Massen (Flußstein).

Härte 4, Gewicht 3,2. Der Flußspat ist eins der am schönsten und mannichfaltigsten gefärbten Minerale; er findet sich in allen möglichen gelben, rothen, grünen, blauen, braunen und schwarzen Farben, auch doppelt gefärbte Krystalle, in welchen dann die verschiedenen Farben eine Vertheilung nach krystallographischen Gesetzen erkennen lassen, kommen häufig vor. Der Flußspat phosphorescirt sehr stark, d. h. beim Erhitzen nimmt man einen innerlichen Lichtschein wahr.

Der Flußspat, welcher aus Fluorcalcium besteht, schmilzt leicht vor dem Löthrobr und wird von Schwefelsäure vollständig zersetzt, wobei eine das Glas ätzende Säure, die Fluorwasserstoffsäure, gasförmig entweicht.

Das Mineral kommt sehr häufig vor; bekannt sind die farblosen Krystalle von Harz, die weingelben von Freiberg, die Szász im Banat, die rosenrothen von Gotthard, die fast lubifusigen blauen von Münsterthal in Baden, die violetten von England; als regelmässiger Begleiter der saßfischen Zinnerzlagern, gefärbt. Körnige und strahlige Krystalle, mächtigen Gang bei Delsnit im Voigtland, Flußstein bei Freiberg und Stetberg.

Der Flußspat wird besonders als Fluxum in der Glasfabrikation, sowie zur Entzunderung der Glasöfen gebraucht.

#### 18. Kryptolith.

Die drei verschiedenwertigen, unvollkommen sich schneidenden Spaltungsrichtungen, die trübe bische Krystallisation; wirkliche Krystalle sind seltener, sondern nur derbe, spätige oder körnige Massen, 3, Gewicht 2,9—3. Das Mineral ist durchscheinend, farblos oder licht gelblich, aus einem Doppelsalz von Fluorwasserstoffsäure und Aluminium, ist leicht schmelzbar vor dem Löthrobr und verhält sich gegen Schwefelsäure wie Flußspat.

Der Kryptolith bildet bei Ivortoeel in Dänemark 5—6 Fuß mächtiges Lager und ist ein sehr wertvolles Mineral, welches zur Darstellung von Natronlauge, zur Darstellung des Aluminiums benutzt, welches zu Schmudgegenständen vielfach verwendet wird.

### 7. Familie. Chlorverbindungen.

#### 19. Steinsalz.

Die tesseralen Krystalle zeigen fast nur nach welchem das Mineral auch vorkommt. In der Regel bildet es spätige oder körnige Aggregate, welche letztere Trümmern zwischen den Schichten der Steinsalzlager auftreten.

Härte 2, Gewicht 2,1; glasglänzend, farblos, doch auch weißlich, beigemengtes Eisenoxyd) oder blau (Zinnstein) gefärbt; es schneidet rein salzig.

Das Steinsalz besteht aus Chlornatrium, in Wasser löslich und zerfließt daher beim Auflösen im Glaslötlöcher zerfließt es beim Erhitzen, meist in Gesellschaft von Natriumhydrat, mächtiges Lager und Stöße, als Efflorescenz der Erdoberfläche oder in dem Wasser mancher Seen und in dem es durch natürlichen oder künstlichen Weg gewonnen werden kann.

Außer zum Würzen der Speisen ist es noch eine ausgebreitete Verwendung, besonders zur Sodafabrikation, zur Darstellung der Salzsäure, als Zuthat in vielen industriellen Processen u. s. w.

Andere Chlorverbindungen, so das Kalium, der Salmiak (Chlorammonium) und das Natrium, in ihren äußern Eigenschaften sehr verschieden, krystallisiren ebenfalls tesseral, haben ein niedriges Gewicht, und sind wie jenes in Wasser löslich, jedoch kommen sie in der Natur nicht vor, der letztere meist auf Vulkanen oder den breunenden Steinkohlenlager (Steinkohlensäure) zu finden.

## III. Klasse. Steine.

## 1. Familie. Kiesel.

## 20. Quarz.

wichtige und außerordentlich weit verbreitete Kristallform hexagonal; die häufigste Gestalt ist die von Prisma und Pyramide, lang- oder säulenförmig ausgebildet (Taf. 2, Fig. 6, 7), seltener die Pyramide allein (Taf. 2, Fig. 4). Combinationen sind die Pyramidenflächen häufig abgerundet und kleiner ausgebildet (Taf. 2, Fig. 21, 22), ja es verschwinden wol die abwechselnden Flächen ganz, sodaß dadurch auf rhomboëdrische hingedeutet wird. Interessante, aber nur entstellende Combinationen entstehen durch geordnete Auftreten anderer hexagonaler oder anderer Pyramiden, welche meist nur mit der dem Viertel ihrer Flächen ausgebildeten. Die Pyramidenflächen sind fast stets sehr glatt, während die Prismenflächen meist horirekt sind, mit welcher Erscheinung häufig eine Art der Kristalle nach dem Vole zu Hand in Hand. Monokristalle, hervorgebracht durch überherrschenden einer oder mehrerer Flächen (Fig. 5), und verzerrte, nach einer Richtung teils Kristalle, sind sehr häufig. — Der Quarz tritt nicht nur in ringsum ausgebildeten und einzelnen, sowie in einzeln oder zu Gruppen und verbunden aufgewachsenen Kristallen, sondern in verschiedensten Aggregationsformen, in dichten, in Körnern, als Gerölle und Sand, in Kieselsteinen nach vielen Mineralien und endlich in Kieselsteinmaterial.

Die Spaltbarkeit ist kaum wahrnehmbar, die Kristalle sind meist bis splitterig; die Härte 7, das Gewicht 2,6. Der Glanz ist auf Bruchflächen fettartig, auf der Oberfläche häufig vollkommen durchsichtig, sonst aber sehr verschiedenartig.

Der Quarz ist reine Kieselsäure; vor dem Löthrobr vor und in Säuren, mit Ausnahme der Flußsäure löslich. Es läßt sich erwarten, daß ein so verbreitetes Mineral, wie der Quarz, nicht in Umgebungen ganz dieselbe Ausbildung erlangt, sondern von den zahlreichen Varietäten bezieht folgende hervorzuheben:

Der Quarz ist ein Kristall; die reinsten, am schönsten und in Kristallform Abänderung; in der Regel, doch auch gelb (Citrin) oder rauchgrau bis rauchtopas (oder Morion), enthält oft fremde Einschlüsse, wie Wassertropfen (Taf. 3, Fig. 1), kleine Kristalle von Rutil, Turmalin, Blättchen von Eisen, Eisenglanz u. s. w. Seine Kristalle sind oft eine erstaunliche Größe und ein Gewicht von mehreren Centnern; sie finden sich dann in großer Menge in sogenannten Kristallfeldern, wie besonders in der Schweiz und auf Madagaskar; die schönsten Kristallgruppen aus den Alpen kommen in der Nähe von Chamonix vor. Die schönsten liefert die Marmarosa in Ungarn, die schönsten wasserhellen Geschiebe. Der Quarz wird zu allerhand Schmuckgegenständen verarbeitet.

Der Quarz ist, in freie Kristallenden aus Aggregaten, selten säulenförmige Kristalle, auch in Massen und in Geschieben; ausgezeichnete sind die prächtvoll violette und pfauenblaue Quarze, die schönsten gefärbt sind die Amethyste von Schmeiz in Ungarn, Wolkenstein und Schott-

land in Sachsen, sowie Oberstein an der Nahe, sind bekannte Fundorte; in neuerer Zeit liefert Brasilien große Massen.

In tief gefärbten Abänderungen ist der Amethyst ein beliebter Schmuckstein.

c) Gemeiner Quarz; säulenförmige Kristalle oder stengelige Massen mit freien Kristallenden, selten ringsum ausgebildete Pyramiden; in vielerlei Aggregaten, Körnern und losen Geschieben. Er bildet das Hauptmaterial der Sandsteine und einen Gemengtheil vieler körniger Gesteine, tritt in dichten, manchmal schieferigen Massen als selbständiges Gestein auf und ist das verbreitetste Mineral auf Erdoberflächen. Manche Abänderungen hat man mit besondern Namen belegt, so den lichtroth gefärbten Rosenquarz, den bläulichweißen Milchquarz, den lauchgrünen Prase, den röthlichbraunen, von Glimmerschüppchen erfüllten Aventurin, den durch Eisenoxyd roth oder gelb gefärbten Eisenkiesel; ein dichter Eisenkiesel ist der durch muscheligen Bruch ausgezeichnete Jaspe. Undeutlich kristallinische Varietäten des Quarzes sind der Hornstein, der an seinem hornartig-splitterigem Bruch kenntlich ist und oft holzartige Structur besitzt und dann Holzstein genannt wird, sowie der Kieselkiefer, der in grauen bis schwarzen, oft von weißen Adern durchzogenen, dichten schieferigen Massen vorkommt.

Die reinen Quarzvarietäten sind wichtig für die Fabrication des Glases und der feuerfesten Ziegel, die Sandsteine liefern ein geschätztes Baumaterial, der Quarzsand dient zur Mörtelbereitung, zum Scheuern, Schleifen; der Kieselkiefer wird zur Unterhaltung der Chausséen und in manchen Varietäten als Probirstein benutzt u. s. w.

## 21. Opal.

Ein amorphes Mineral; kommt nur eingesprengt in dichten Massen, seltener in traubigen oder stalaktitischen Formen von muscheligen Brüche vor. Härte  $5\frac{1}{2}$ , Gewicht 2,2. Der Opal ist glasglänzend, in verschiedenen Graden durchsichtig, mitunter farblos, doch meist gefärbt; er besitzt in einigen Abänderungen schönes Farbenspiel.

Er besteht aus wasserhaltiger Kieselsäure mit wechselndem Wassergehalt; sein chemisches Verhalten unterscheidet sich von dem des Quarzes nur darin, daß er von heißer Kalilauge aufgelöst wird, was bei jenem nicht der Fall ist. Der Opal ist jedenfalls, wie die künstliche amorphe Kieselsäure, aus der Zersetzung von Silicaten hervorgegangen und es erinnert auch sein ganzer Habitus lebhaft an einen ursprünglich gallertartigen Zustand.

Als besondere Varietäten sind anzuführen:

Opalith, in wasserhellen traubigen Krusten und Tropfen auf dem Anamezit von Steinheim bei Frankfurt. Edler Opal mit ausgezeichnet schönem Farbenspiel in den Trachyten von Ceres in Ungarn.

Feueropal von feuerrother Farbe. Zinnapan in Mexico.

Gemeiner Opal und Halbopal, letzterer mit oft holzartiger Structur und dann Holzopal genannt (Schaiba in Ungarn), besitzen kein Farbenspiel. Menilit in braunen Knollen von Menilmontant bei Paris.

Der edle Opal, der nur selten in größern Stücken vorkommt, ist ein sehr geschätzter Schmuckstein, ähnlich der Feueropal.

Gewisse, auch aus Kieselsäure bestehende Mineralkörper, bilden ihrem chemischen Verhalten nach, indem sie partiell in Kalilauge auflösbar sind, gewissermaßen den Uebergang zwischen Quarz und Opal. Dahin gehören:

1) der Chalcedon, der theils in Pseudomorphosen, hauptsächlich aber in nierenförmigen, stalaktitischen oder plattigen Massen und in Geröllen vorkommt, flachmuscheligen und etwas splitterigen Bruch und sehr verschiedene Färbungen besitzt. Besondere Namen führen der gelbrothe Carneol, das dunkelgrüne Plasma, der grüne von rothen Adern durchzogene Heliotrop, der apfelgrüne Chrysopras, der schwarz und weiß gestreifte Onyx (Taf. 4, Fig. 5), der durch deutliche Zeichnungen charakterisirte Moßkastein (Taf. 4, Fig. 4). Alle diese Varietäten werden zu Ring- und Nadelsteinen und andern Schmudgegenständen vielfach bearbeitet.

2) der Feuerstein; Knollen mit flachmuscheligem Bruch und schwarzen oder grauen Farben, die besonders in der weißen Kreide sich massenhaft vorfinden. Wurde früher zu Flintenschläffern und Schlagfeuerzeugen verarbeitet.

Die Achate endlich sind Gemenge verschiedener Quarzvarietäten, besonders von Amethyst, Chalcedon und Jasps, welche meist streifenweis angeordnet sind, und durch ihre verschiedene Structur, Färbung und Durchsichtigkeit die feinsten und zierlichsten Zeichnungen hervortreten lassen (Taf. 4, Fig. 1—3). Besonders häufig kommen sie in kugelförmigen Secretionen in manchen Gesteinen vor und werden zu vielerlei Schmudgegenständen und Geräthschaften verschliffen. Hauptfundorte sind Oberstein an der Nahe und in neuerer Zeit Brasilien.

## 2. Familie. Feldspatartige Mineralien.

Die Mineralien, welche diese Familie umfaßt, besitzen sämmtlich den gleichen Härtegrad 6 und nahezu gleiches specifisches Gewicht = 2,5—3,0, und sehr analoge chemische Zusammensetzung, indem sie aus kiesel-saurer Thonerde, verbunden mit einem kiesel-sauren Alkali oder einer kiesel-sauren alkalischen Erde, bestehen. Ein großer Theil von ihnen ist als Bestandtheil der körnigen und porphyritischen Gesteine von großem geologischen Interesse und erlangt deshalb auch, insofern diese Gesteine als Baumaterial benutzt werden, technische Wichtigkeit.

Die eigentlichen Feldspate lassen sich trotz ihrer mannichfaltigen morphologischen Eigenschaften und ihrer vielfältigen chemischen Gliederung auf drei Normal-species zurückführen, welche man nach der Natur ihrer basischen Bestandtheile als Kaliseldspat, Natronseldspat und Kaliseldspat bezeichnen kann; alle übrigen können kristallographisch und chemisch als Mischungen aus zwei dieser Grundspecies angesehen werden. Sie besitzen alle zwei deutliche Spaltungsrichtungen, welche sich unter Winkeln von 90° oder nahezu 90° schneiden. Dies bedingt ihre kristallographische Zusammengehörigkeit.

### 22. Kaliseldspat.

Er kristallisirt monoklinisch; die zwei Spaltungsrichtungen, welche die Kristallisationsreihe beherrschen, entsprechen der basischen Endfläche und dem Klinopinakoid, sie schneiden sich folglich unter 90°; die erstere ist die vollkommenste. Zu diesen beiden Flächenpaaren gesellen sich dann noch das Prisma und ein hinteres Hemidoma (Taf. 2, Fig. 51), oft auch das Klinodoma (Taf. 2, Fig. 46) oder hintere Hemipyramiden. Der Habitus der Kristalle ist prismatisch oder rektangulär-säulenförmig; in den reinsten Abänderungen, wo das Klinopinakoid häufig nur klein ausgebildet ist, auch didaktelartig. Die Kristalle sind oft in vollkommen paralleler Stellung aneinander gereiht, und bilden dann

zahnförmige Gruppen; viel seltener Zwillinge auf, denen verschiedene Lagerungen, am häufigsten ist das sog. Schiefer (Drehungsachse die Hauptachse, Taf. 2, Fig. 46). Kristalle sind meist ringsum ausgebildet und wachsen, seltener zu Gruppen vereinigend, außerdem individualisirte (spätige) und dichte Aggregate.

Die Kristalle sind äußerlich oft sehr glänzend, auf frischen Bruchflächen liegen, am häufigsten ist das sog. Schiefer (Drehungsachse die Hauptachse, Taf. 2, Fig. 46). Kristalle sind meist ringsum ausgebildet und wachsen, seltener zu Gruppen vereinigend, außerdem individualisirte (spätige) und dichte Aggregate.

Die Kristalle sind äußerlich oft sehr glänzend, auf frischen Bruchflächen liegen, am häufigsten ist das sog. Schiefer (Drehungsachse die Hauptachse, Taf. 2, Fig. 46). Kristalle sind meist ringsum ausgebildet und wachsen, seltener zu Gruppen vereinigend, außerdem individualisirte (spätige) und dichte Aggregate.

Die Kristalle sind äußerlich oft sehr glänzend, auf frischen Bruchflächen liegen, am häufigsten ist das sog. Schiefer (Drehungsachse die Hauptachse, Taf. 2, Fig. 46). Kristalle sind meist ringsum ausgebildet und wachsen, seltener zu Gruppen vereinigend, außerdem individualisirte (spätige) und dichte Aggregate.

Die Kristalle sind äußerlich oft sehr glänzend, auf frischen Bruchflächen liegen, am häufigsten ist das sog. Schiefer (Drehungsachse die Hauptachse, Taf. 2, Fig. 46). Kristalle sind meist ringsum ausgebildet und wachsen, seltener zu Gruppen vereinigend, außerdem individualisirte (spätige) und dichte Aggregate.

### 23. Natronseldspat (Albit, Felspar).

Die beiden Spaltungsrichtungen schneiden sich unter rechten, sondern unter schiefen Winkeln. Der Kristall ist folglich triklinisch, jedoch mit einem nollinem Habitus, wie denn die Kristalle denen des Albits und Pegmatolits sehr ähnlich sind. Besonders häufig sind Zwillinge (Taf. 2, Fig. 59) abgebildeten Form, die sich so verhalten, als wären sie aus einem Kristall gebildet. Diese Zwillingbildung wiederholt sich bei späten Massen stets in der selben großen Zahl papierdünner Lamellen, so daß man die Zwillinge übersehen kann, eine sehr feine Streifung der Kristalle, die Spaltungsfläche nachweisen kann, eine Endfläche, das wesentlichste Hilfsmittel zur Unterscheidung der Kristalle. Die Kristalle sind meist in Gruppen vereinigend, außerdem individualisirte (spätige) und dichte Aggregate.

Die reinen Natronseldspate finden sich in Drusenräumen auskristallisirt, die vollständig ausgebildet und zu losen Gruppen vereinigend, außerdem individualisirte (spätige) und dichte Aggregate.



Schöne Krystalle von Hirschberg in Schlesien, im St.-Gothard und aus dem Zillertal in Tirol. Wie sich der Albit zum Axular verhält, so der Oligoklas zum Orthoklas. Es ist ein Natronfeldspat, welchem wechselnde Mengen von Natron durch Kali, sp. Kalk vertreten sind. Er findet sich selten in kristallinen Krystallen (Bodenmais in Baiern), aber sehr häufig in spätigen Partien und leitenförmigen oder scharfzahnigen Individuen, immer an der Zwillingstreifung nützlich, als Gemengetheil krystallinischer Gesteine, so vieler Granite und Gneise, des Diorits u. s. w.

An den Oligoklas schließt sich der Labradorit an, vorwaltend ein Kalkfeldspat, in welchem ein Theil der Kalkerde durch Natron vertreten ist. Krystalle sind sehr selten und undeutlich; die beiden fast gleich vollkommenen Spaltungsrichtungen, von denen die erste meist Zwillingstreifung zeigt, schneiden sich unter schiefen Winkeln. Ausgezeichnet sind die spätigen Gerölle von der Küste Labrador durch die prachtvolle Farbenvorstellung auf den brachydiagonalen Spaltungsflächen, welche durch eingestreute mikroskopische Krystalle hervorgerufen wird (Zaf. 3, Fig. 2).

Der Labradorit schmilzt noch etwas leichter als Oligoklas und wird von Säuren angegriffen, wie denn überhaupt die Schmelzbarkeit der Feldspate mit deren Kalkgehalt zunimmt. Er bildet einen Bestandteil mancher Gesteine, so des Hypersthens, des Gabbros, des Diorits u. s. w., von denen die ersten besonders frequent im Gebiet der sächsischen Granulitformation bei Penig und Rößwein auftreten.

#### 24. Kalkfeldspat.

Der reine Kalkfeldspat oder Anorthit kommt in kleinen oft recht verwickelten, albitähnlichen Krystallen von prismatischem Habitus vor. Die beiden Spaltungsrichtungen schneiden sich unter schiefen Winkeln. Er ist ziemlich schwer schmelzbar und wird von Säuren vollkommen zersetzt. Ein seltenes Mineral; Krystalle in den Auswürflingen des Beudant, körnige Partien im Kugeldiorit von Corsica.

#### 25. Leucit.

Das Mineral krystallisiert tesseral und kommt nur in ringsum ausgebildeten, seltener zu kugeligen Gruppen vereinigt desolden Zositetradern vor. Es besitzt Glasglanz, der muschelige Bruch Fettglanz, geringe Durchsichtigkeit und lichtgraue Farbe.

Chemisch kommt es dem Kalisfeldspat sehr nahe, nur ist es etwas säureärmer und kalireicher, manche, besonders zersetzte Varietäten, enthalten auch einige Procent Natron. Der Leucit ist unschmelzbar, in Säuren unter Abscheidung von pulveriger Kieselsäure zersetzbar.

Große Krystalle von der Rocca Musina bei Rom; sehr verbreitet in den Laven des Vesuvius und des Laacher Sees; zersetzte Krystalle von Oberrörsenthal in Sachsen und vom Kaiserstuhl in Baden.

#### 26. Nephelin (Elaolith).

Hexagonale Säulen mit pyramidalen und basischer Endung (Zaf. 2, Fig. 10), meist kleine durchsichtige, glasglänzende, farblose oder licht gefärbte, einzeln aufgewachsene Krystalle (Nephelin), oder derbe, individualisierte oder körnige, fettglänzende braune, rothe oder grüne Massen (Elaolith). Die Spaltbarkeit ist unvollkommen, der Bruch muschelig bis eben. Es ist vorherrschend ein Thonerde-Natronsilikat, in welchem einige Procent Kali. Der eigentliche Nephelin ist schwer, der Elaolith dagegen ziemlich leicht schmelzbar, beide werden von Säuren unter Abscheidung von gallertartiger Kieselsäure zersetzt.

Der Nephelin findet sich in aufgewachsenen Krystallen am Vesuvius, in eingewachsenen als Gemengetheil des Nephelindolerits vom Kapenbuel im Odenwald und vom Lössauer Berg in Sachsen; der Elaolith als Bestandtheil spenitartiger Gesteine von Frederiksborg in Norwegen und Niasl am Ural.

#### 27. Stapolith (Wernerit).

Krystallisiert tetragonal, besonders in der Taf. 1, Fig. 54 abgebildeten Combination von Pyramide und Deutero-prisma, doch sind die Krystalle meist mehr säulenförmig ausgebildet. Oft treten auch noch andere Formen, das Protoprisma, eine Deutero-pyramide u. s. w. hinzu. Eingewachsene oder aufgewachsene Krystalle, derbe, körnige Massen. Nach den Flächen des Deutero-prisma ist das Mineral deutlich spaltbar, der Glanz ist glas- oder fettartig, doch nie sehr lebhaft, ebenso sind die verschiedenen grauen, grünen und rothen Farben meist trüb und schmutzig. Der Stapolith ist vielfachen Umbildungen unterworfen, die chemische Zusammensetzung daher sehr schwankend, doch stimmt sie in der Hauptsache mit der der Kalkfeldspate überein. Vor dem Löthrohr leicht schmelzbar, in Säuren zersetzbar.

Kommt besonders auf norwegischen, schwedischen und finländischen Kalk- und Magnetitenerzlagern vor.

An die feldspatartigen Mineralien sind wegen der Ähnlichkeit ihrer chemischen Zusammensetzung noch einige andere Körper anzureihen, deren völlig amorphe, glasartige Beschaffenheit erkennen läßt, daß sie sehr rasch aus dem geschmolzenen in den starren Zustand übergegangen sind. Diese natürlichen Gläser haben sich nach Art der Gesteine in Stöcken und Gängen, (Perlfenstein und Beseite) oder in Form von Strömen sowie als Auswürflinge (Obsidian und Bimsstein, der letztere eine poröse, schwammige oder schaumige Abart des ersten).

Anhangsweise sind endlich noch die technisch wichtigen Thone zu erwähnen, ebenfalls amorphe, aber erdige Mineralmassen, welche meist aus der Zersetzung von Feldspaten hervorgegangen sind und deshalb stets einen größeren oder geringeren Wassergehalt besitzen.

Die reinste Abänderung ist der Kaolin (Porzellanerde), ein feinerdiges, leicht zerreibliches, weißes Mineral, welches häufig in Pseudomorphosen nach Orthoklas, Leucit und andern Mineralien vorkommt. Er fühlt sich mager an, ist aber angefeuchtet ausgezeichnet plastisch und besteht aus wasserhaltiger kieselhafter Thonerde. Vor dem Löthrohr ist er unschmelzbar.

Zu größeren Massen findet er sich zu Aue bei Schneeberg, in der Gegend von Meißen in Sachsen, bei Limoges in Frankreich u. s. w., an welchen Orten er überall behufs seiner Verwendung in der Porzellanmanufaktur gegraben wird.

An diesen schließen sich die eigentlichen Thone, welche sämtlich als durch kohlensauren Kalk, Eisenoxyd, Quarzsand oder Gesteintrümmer mehr oder weniger verunreinigter Kaolin zu betrachten sind. Sie sind häufig fettig anzufühlen und sehr plastisch und deshalb zur Fabrication aller möglichen Steingut- und Töpferwaaren verwendbar; die reinsten und deshalb schwerstschmelzbaren werden zur Darstellung feuerfester Ziegeln und Gefäße benutzt.

#### 3. Familie. Zeolith.

Unter dem Namen Zeolith begreift man eine Gruppe meist sehr schön krystallisirter Mineralien, welche in ihren physikalischen und chemischen Eigenschaften, besonders aber in der Art ihres Vorkommens und ihrer Entstehung große Uebereinstimmung zeigen.

Sie sind sämmtlich sehr leicht (Gewicht unter 2,4), schmelzen sehr leicht unter Aufschäumen zu einer klaren Perle und bestehen zum größten Theil aus wasserhaltigen Doppelsilicaten der Thonerde und der Kalkerde oder eines Alkalis, so daß man sie recht wohl als gewässerte Feldspate betrachten kann. In Säuren sind sie unter Abcheidung einer Kieselsäuregallert zersehbare. Man findet sie nur aufgewachsen in Drusenräumen oder Mandelräumen gewisser Gesteine, besonders der Basalte, Rhonolithe, Melaphyre, älterer oder jüngerer Laven, selten auf Gängen in ältern Gebirgsformationen. Beides, chemische Zusammensetzung und Vorkommen, lassen es als unzweifelhaft erscheinen, daß die Zeolithe als secundäre Gebilde, hervorgegangen aus der Zersetzung der Muttergesteine, anzusehen sind, und daß besonders die feldspatigen Gemengtheile der letztern es waren, welche das Hauptmaterial zu ihrer Bildung hergegeben haben. Nur einige der häufigsten können als Beispiele hier aufgeführt werden.

#### 28. Natrolith. Mesotyp.

In rhombischen säulenförmigen, Krystallen (Taf. 2, Fig. 30), meist nur in nadel- und haarförmigen, zu Büscheln verbundenen Individuen, oder feinfaserigen, nierenförmigen Aggregaten; glasglänzend, meist weiß, selten ockergelb oder roth gefärbt.

Schöne Krystalle aus der Auvergne und von Island; sehr häufig in der Gegend von Auzig in Böhmen und vom Hahngau am Bodensee.

#### 29. Chabasit.

Rhomboedrische Krystalle, die Krystallflächen oft federartig gestreift; häufig Durchkreuzungszwillinge; die Krystalle meist zu Gruppen vereinigt.

Das böhmische Mittelgebirge, die Farberinseln, das Zassathal in Tirol sind bekannte Fundorte.

#### 30. Analcim.

Tesseral; am häufigsten in Kristalltetraedern oder in der Combination von Würfel und Kristalltetraeder; die Krystalle sind oft sehr groß, auch körnige Massen. Wasserhell, manchmal fleischroth gefärbt.

Das Zassathal liefert die größten, fleischrothen Krystalle, schöne wasserhelle von den Liparischen Inseln.

#### 31. Desmin.

Rhombische, rectangulär säulenförmige Krystalle mit pyramidalen Endung; sie sind oft breitssäulenförmig und sächerförmig gruppirt, häufig auch in der Mitte eingeschnürt, nach den Enden zu auseinanderlaufend (garbensförmig). Auf den brachydiagonalen Spaltungsflächen Perlmutterglanz, sonst Glasglanz.

Das Zassathal, die Farberinseln, besonders aber Island liefern schöne Exemplare.

#### 32. Heulandit.

Krystallisiert monoklinisch in der Combination von Fig. 45 auf Taf. 2. Die klinodiagonalen Spaltungsflächen besitzen starken Perlmutterglanz.

Farblose Krystalle von den Farbern, ziegelroth gefärbte aus dem Zassathal.

#### 33. Harmotom.

Er krystallisiert ganz ähnlich wie Desmin, hat aber meist gestreifte Pyramidenflächen und besitzt keine Spaltbarkeit, folglich auch keinen Perlmutterglanz. Er kommt am häufigsten in Durchkreuzungszwillingen vor (Zwillingsachse die Hauptachse) und wird daher auch Kreuzstein genannt. Er enthält Baryterde und besitzt deshalb ein ausnahmsweise höheres Gewicht von 2,5.

Besonders schön auf den Erzgängen am Berg am Harz, und in den Melaphyren von Island.

Zu den Zeolithen ist auch noch, trotz der abweichenden Constitution, zu rechnen:

#### 34. Apophyllit.

Er krystallisiert meist in spitzen tetragonalen Formen, oft combinirt mit dem Deuterozeolithen. Basit, seltener, aber besonders groß in prismatischen Krystallen (Boonah in Indien). In Krystallen findet sich das Mineral auch in Aggregaten. Die vollkommene basische Spaltbarkeit besitzt Perlmutterglanz, sonst Glasglanz; er leuchtet rosenroth gefärbt.

Der Apophyllit enthält kein Thonerdeoxyd, sondern bloß kiesel-saure Kalkerde, kiesel-saures Kali und verhält sich aber sonst wie ein Zeolith. Er kommt oben genannten Orte auch von den Farbern, und den Erzgängen von Andreasberg (mit rothe Abänderung).

#### 4. Familie. Glimmer.

Das Hauptkennzeichen der dieser Familie angehörigen Mineralien ist die vollkommene basische Spaltbarkeit, infolge dessen der Perlmutterglanz auf den Spaltungsflächen und die blätterige Structur der Krystalle (Taf. 3, Fig. 8). Glatte Spaltungsflächen gehören daher bei den meisten Individuen zu den größten Seltenheiten, weshalb für diese Mineralien, da solche unausführbar sind, die Untersuchung in dünnen Plättchen unerlässlich und auch am frühesten zu veranlaßt worden. Auf diesem Wege sind die Glimmer in der That wenigstens im Stande gewesen, die Krystalle der verschiedenen Körper angehören, die die Glimmer sind Doppelverbindungen von saurem oder basischem kiesel-saurem Kali (resp. Natrium) und Magnesia, mit basisch kiesel-saurer Thonerde. Er ist ein Theil der Thonerde durch Eisenoxyd gefärbt. Nicht selten sind kleine Wassergehalte. Die große Zahl glimmerartigen Mineralien, die folgenden, als besonders häufig vorzukommen wähnt werden.

#### 35. Kaliglimmer (zweiachsig).

Der Umstand, daß das Mineral optisch einachsig ist, also zwei Richtungen besitzt, in denen es einfach bricht, weist auf das rhombische Krystallsystem hin; die sechsseitigen Tafeln sind als Combination von Basis, Prisma und Brachypinakoid zu betrachten. Die basischen Endflächen sind oft gestreift, lamellenförmig oder parallel-schuppig aufgewachsen, häufigsten gerad- und trummischalige, stiellos vorwiegend schuppige Aggregate oder einzeln in Blättchen. In dünnen Lamellen elastisch, in größeren tafelförmigen Perlmutterglanz und oft silberweiß häufig auch gelbliche und grüne Färbungen. Dichte = 2, Gewicht = 2,8.

Die chemische Zusammensetzung ist sehr verschieden, in der Hauptsache sind diese Glimmer als basische erde-Kalifilicate zu betrachten, welche Kalkerde durch das Austreten kleiner Mengen von Natrium, Eisenoxyd, Fluor und Wasser ersetzt werden kann. Sie sind meist schwierig zu zerlegen, werden von Säuren nicht angegriffen.

Der Kaliglimmer bildet einen Hauptbestandtheil Glimmerschiefer, vieler Granite, Gneise und Metakonglomerate; in sehr großen Tafeln kommt er in den Gneisen vor, wo man ihn an Stelle des Quarzes benutzen kann.

thionglimmer ist eine durch einen Fluoridgehalt, oft auch durch pyrischbläulichrothe Farbe durch leichte Schmelzbarkeit charakterisirte des Kaliglimmers.

und Zinnwald in Sachsen, Rozena in Mähren.

### 36. Magnesiaglimmer.

Die Einachsigkeit verweist auf hexagonale Krystalle, die seltenen Krystalle lassen rhomboëdrische erkennen. Die Art des Auftretens ist dieselbe Kaliglimmer, von welchem sich der Magnesiaglimmer physikalische Beziehung durch die sehr dunkle, arge Färbung unterscheidet. Er ist in der That ein Thonerde-Magnesiasilicat, doch fehlen Eisenorydul neben der Magnesia, Eisenorydul Thonerde nie; häufig treten auch Titansäure in der Mischung bei, also wieder eine sehr chemische Constitution. Von Schwefelsäure wird er zerlegt. Sehr häufig als Gemengtheil in den ältesten Gneissen und Graniten in jüngsten Basalten und Laven; leidliche finden sich besonders in diesen letztern.

### 37. Chlorit.

Hexagonalen Krystalle sind tafelförmig, oft zu Gruppen verbunden; meist kommt aber auch, ähnlich wie die Glimmer, in blätterigen, schuppigen Aggregaten, in Fläsen oder eingesprengten Blättchen vor.

Chlorit ist in dünnen Lamellen gemein, nicht leuchtend, besitzt Durchscheinbarkeit und lichte bis grüne Farbe, grünen Strich, äußerst geteilt und das Gewicht 2,8. Er ist ein sehr wasserhaltiges Silicat von Thonerde, Magnesiaglimmer, vor dem Löthrobr schwer schmelzbar wird von Schwefelsäure zerlegt.

Er kommt als selbstständiges schieferiges oder körniges Gestein (meist Magnetit enthaltend) häufig in den Alpen vor.

### 5. Familie. Amphibole.

#### 38. Epidot.

Monoklinischen Krystalle sind horizontal säulensförmig, sodas Basid, Orthopinakoid und ein großer ausgebeugt sind; die seitliche Wände bilden prismatische, hemipyramidale und tafelförmige Flächen, meist in großer Anzahl. Aufsteigend und zu Gruppen vereinigte Krystalle, auch strahlige und körnige Aggregate.

Er ist gleich vollkommene Spaltungsrichtungen nach drei unter schiefen Winkeln; sie entsprechen den orthodiagonalen Flächenpaar, der muscheligen und splitterigen. Härte  $5\frac{1}{2}$ , Gewicht 3,5. Vorherrschend sind intensive grüne Farben, seltener braune. Die chemische Zusammensetzung des Epidots ist wie die aller amphibolartigen Minerale und unterscheidet sich von den meisten Silikaten, äußerst schwankend; im Allgemeinen ist er ein Thonerde-Kalkerde-Silicat, in dem Thonerde theilweise durch Eisenorydul, einige der Kalkerde durch Eisenorydul vertreten werden. Es ist wenigstens die Constitution des Epidots, der am weitesten verbreiteten (Krystalle von Arendal in Norwegen, Bourgoin in der Dauphiné, krystallinische Massen von Nöckerberg im Erzgebirge), während beim rothbraunen Manganepidot von St. Marcel in Piemont genau an die Stelle des Eisenoryduls tritt.

#### 39. Amphibol (Hornblende).

Monoklinischen Krystallform liegt ein stumpfes Rhomboëdrum zu Grunde, welches am häufigsten mit dem

Klinopinakoid, der Basis und der positiven Hemipyramide, oder mit Orthopinakoid, Basis und Klinobasid (Taf. 2, Fig. 43) combinirt auftritt. Zwillinge der ersten Combination mit dem Orthopinakoid als Zwillingsebene sind sehr häufig, einspringende Winkel fehlen, aber der eine Pol zeigt dann vier pyramidale, der andere zwei basische Flächen. Die Krystalle sind stets säulensförmig, oft ringsum ausgebildet und eingewachsen, seltener aufgewachsen, häufig stengelige und strahlige, verworrene Aggregate oder kleine eingesprengte Individuen.

Sehr charakteristisch ist die vollkommene prismatische Spaltbarkeit; Härte  $5\frac{1}{2}$ , Gewicht = 3. Vorherrschend sind grüne und schwarze Farben, mit geringer Durchscheinbarkeit gepaart, seltener sind mehr durchsichtige, lichter gefärbte Individuen. In chemischer Beziehung sind zwei Varietätengruppen zu unterscheiden, erstlich die thonerdefreien Amphibole, von denen der weiß oder lichtgrün gefärbte Grammatit als Magnesia-Kalkerde-Silicat zu betrachten ist, während der lauchgrüne Strahlstein in noch Eisenorydul enthält. Diese beiden Varietäten kommen in langsäulensförmigen Krystallen ohne Endflächen vor, welche meist zu stengeligen Aggregaten verbunden sind, ersterer in Dolomit, letzterer in Talk- und Chloritgneisen eingewachsen. Zweitens die thonerdehaltigen Amphibole, welche außer Magnesia, Kalkerde und Eisenorydul auch noch Eisenorydul, Kali und Natron enthalten. Von diesen kommt die dunkelgrüne gemeine Hornblende in aufgewachsenen Krystallen, besonders aber eingesprengt als Gemengtheil vieler Gesteine, so der Syenite, Diorite und mancher Trachyte vor, während die schwarze basaltische Hornblende in rundum ausgebildeten Krystallen in basaltische Gesteine eingestreut vorkommt.

### 40. Augit (Pyroxen).

Die monoklinen Krystalle sind vorherrschend von einer Säule, deren Kantenwinkel nahezu  $90^\circ$  betragen und von den beiden verticalen Flächenpaaren gebildet; als polare Begrenzungselemente treten besonders häufig die Flächen der positiven Hemipyramide (Taf. 2, Fig. 44), des positiven Hemidomas sowie noch anderer hemipyramidaler Gestalten auf. Die Krystalle sind meist achsensymmetrisch oder rectangulär säulensförmig ausgebildet, ringsum entwicelt eingewachsen, seltener aufgewachsen; stengelige und körnige Aggregate sind nicht selten; recht frequent sind Zwillingbildungen nach demselben Gesetz, wie beim Amphibol, die dann stark einspringende Winkel zeigen.

Die unvollkommene prismatische Spaltbarkeit läßt den Augit leicht vom Amphibol unterscheiden, was von Berth ist, da beide Mineralien, die sonst sehr ähnliche physikalische Kennzeichen besitzen, so sehr häufig als Gesteinsgemengtheile vorkommen. Härte und Gewicht, auch die Farbe ist dieselbe wie beim Amphibol; durchsichtige wasserhelle oder lichtgrün gefärbte Varietäten sind selten.

Die Augite bestehen aus kieselhafter Kalkerde, verbunden mit kieselhafter Magnesia oder Eisenorydul, oder beiden zusammen, und auch hier hat man thonerdefreie von thonerdehaltigen Arten zu trennen. Vor dem Löthrobr sind die Augite, wie die Amphibole, schmelzbar, von Säuren werden sie nur unvollständig zerlegt. Als Varietäten sind namhaft zu machen: der blaßgrüne Diopsid, in meist breitstengeligen Individuen (fast eisenfrei) von Schwarzenstein in Tirol; der lauchgrüne Pyroxen, in prismatischen, scharfkantigen Krystallen vom Fassathal und Traversella in Piemont; der schwarze körnige Augit oder Kalkolith, in edelkörnigen Massen von Arendal, und der gemeine Augit, der theils



eingeprengt in manchen Gesteinen als wesentlicher Gemengtheil vorkommt, theils, wie die basaltische Hornblende, in ringsum ausgebildeten Krystallen in Basalte und Laven eingestreut ist.

Die eisenreichen Abänderungen des Augits werden ebenso wie die entsprechenden Varietäten des Epidots und Amphibols, wenn sie in größerer Menge vorkommen, als Zuschlag beim Eisenschmelzen gebraucht. Asbest und Amiant bilden seinfaserige oder haarförmige, oft verfilzte Massen, welche ihrer chemischen Constitution nach theils zur Hornblende, theils zum Augit zu rechnen sind. Sie können, mit Flachs gemischt, versponnen werden, und dienen zur Anfertigung der sog. unverbrennlichen Zeuge.

Der Hypersthen ist ein augitähnliches, aber wahrscheinlich rhombisches Mineral, welches sich besonders durch den metallisirend-perlmutterartigen Glanz auf der einen vollkommenen Spaltungsfläche auszeichnet. Es bildet mit Labradorit den Hypersthenfels, ein nicht seltenes Gestein. Der schöngefärbte Smaragdit, der mit rothem Granat den Elsgit, eine der prächtigsten Felsarten zusammensetzt, ist wahrscheinlich als ein Gemeng von Augit und Hornblende anzusehen.

#### 41. Talc.

Sehr selten kommen sechsseitige Täfelchen vor, meist tritt das Mineral nur in derben, krümmlichen oder schuppigen und schieferigen bis fast dichten Massen auf. Es ist nach einer Richtung sehr vollkommen spaltbar, in dünnen Blättchen biegsam, fettig anzufühlen, äußerst weich und besitzt das specifische Gewicht 2,7. Der Talc ist perlmutter- bis fettglänzend und lichtgrün gefärbt. Er ist ein wasserhaltiges Magnesiasilicat, welches meist einige Procente Eisenorydul enthält. Vor dem Löthrohr blättert er sich auf, ist aber äußerst schwierig schmelzbar; von Säuren wird er nicht angegriffen.

Die Talcstiefer sind besonders in den Tiroler und Schweizer Alpen sehr verbreitet.

Der Steatit oder Spedstein ist eine dichte, in nierenförmigen oder knolligen Massen, sowie in Pseudomorphosen nach Quarz, Dolomit, Orthoklas und andern Mineralien auftretende Modification des Talc, mit dem er in physikalischer und chemischer Beziehung vollkommen übereinstimmt.

Er findet sich u. a. zu Göpfersgrün im Fichtelgebirge. Der Talc, besonders aber der Spedstein, werden zu Maschinenschmieren und Schminken, der letztere aber auch zu allerlei gedrehten und geschnittenen Geräthschaften verarbeitet.

#### 42. Serpentin.

Ein amorphes Mineral, welches nur in derben Massen oder auch in Pseudomorphosen, besonders nach Olivin, vorkommt. Der Serpentin besitzt glattmuscheligen Bruch, die Härte  $3\frac{1}{2}$ , das Gewicht 2,6, ist matt und fast undurchsichtig und zeigt schneefarbene (edler Serpentin) meist aber düstere grüne, braune und rothe Farben, oft auch verschieden geaderte und gefleckte Farbenzeichnungen.

In chemischer Beziehung steht er dem Talc sehr nahe, doch unterscheidet er sich von ihm durch einen viel höhern Wassergehalt; die schwierige Schmelzbarkeit hat er mit jenem gemein, dagegen wird sein Pulver von Säuren vollständig zerseht.

Der Serpentin findet sich in mächtigen Stöcken zu Waldheim und Zöblitz in Sachsen, wo er zu allerlei Geräthschaften und Ornamenten verarbeitet wird.

#### 6. Familie. Edelsteine.

Die Mineralien, welche in dieser Familie vereinigt

sind, zeichnen sich insgesammt durch kräftigen Glanz, Durchsichtigkeit und Härte aus, Eigenschaften, welche, in Verbindung mit der Seltenheit ihres Vorkommens, ihre Verwendbarkeit zu Schmucksteinen klären. Es ist jedoch zu beachten, dass nicht in allen ihren Varietäten jene Eigenschaften gleich hohem Grade besitzen, das sind eine oder wenige Abarten als Edelsteine schätzbar und angewendet werden.

#### 43. Chrysolith (Olivin).

Der Chrysolith krystallisirt in rhombischen von prismatischem Habitus, welche Vorherrschendes des makrodiagonalen Tafelförmig erscheinen. Am häufigsten in eingewachsenen Körnern oder körnigen in losen Geröllen. Er hat muscheligen Bruch, das Gewicht 3,4, zeigt Glasglanz, mehr dunkelgrüne, in verwittertem Zustand gelbe und braune Farben und ist sehr hart. Er besteht aus einem Silicat von Magnesia-orydul, ist nur in den eisenreichen Granaten und wird von Schwefelsäure mit Zersetzung gelöst.

Der schön grüne und durchsichtige Chrysolith findet sich in losen Krystallen und Geröllen in Aegypten, während der minder schöne in eingeprengten Körnern in allen Gesteinen

#### 44. Idocras (Besorstein).

Den tetragonalen Krystallen liegt das Prisma und Pyramide zu Grunde. Gestalten sich aber in der Regel nach dem Prisma, die Basis, verschiedene Formen. Die zweite Richtung sowie mannichfache Combinationen, wie denn die Zahl der Combinationen bei irgendeinem andern tetragonalen Krystalle sehr selten pyramidal ausfallen, sind am häufigsten aufgewachsen, und fast immer in aggregirten Massen nicht selten.

Der Idocras hat Quarzhärte, zeigt zum Theil fettartigen Glasglanz und mehr grüne und braune, seltener gelbe Farben.

Er besteht aus kieselhafter Kalkerde und Thonerde, meist mit etwas Magnesia, Eisenorydul und etwas Wasser, er schmilzt in Flusskalken und wird von Säuren leicht gelöst.

Schöne Varietäten vom Besorstein, der Idocras, findet man in Piemont, Achmatowsk im Ural, und in Norwegen.

#### 45. Granat.

Die tesseralen Krystalle zeigen als Formen das Rhombendodekaeder (Taf. 1, Fig. 10), das Ikositetraeder (Taf. 1, Fig. 11), theils in Combination (Taf. 1, Fig. 12) Nicht selten ist ferner das Hexaëder (Taf. 1, Fig. 11) oder als Zuschärfung der Rhomben Combination von Rhombendodekaeder und Octaeder (Taf. 1, Fig. 21). Der Granat sehr oft eingewachsen, aber auch in losen Massen aufgewachsen; derbe körnige Massen, die in zerfallenden oder losen Körnern sehr zerfallen.

Der Granat hat muscheligen Bruch, Glasglanz und verschiedene Fellfarben. Das Gewicht schwankt mit der chemischen Zusammensetzung zwischen 3,2 und 4,3. Die Farben sind verschieden, nur blaue Farben kommen

ische Constitution variirt außerordentlich, von den seltenern Varietäten abgesehen, Kaltthonsilikate, Eisenthonsilikate und Kaltz zu trennen. Die Granate sind leicht schmelzbar, vorübergegangener Schmelzung von Säuren zerseßbar.

ungen nach unterscheidet man den seltenen anat von Tellemarlen, den grünlichweißen grünen Grossular vom Wiluifluss in smaragdgrünen, chromhaltigen Uwarowit am Ural, den blutrothen Akmandinbrant, der sehr häufig als Gemengtheil in oder in eingewachsenen Krystallen voroniggelben bis hyacinthrothen Hessonit oder von Ceylon und Piemont, den schmutzig oder braun gefärbten gemeinen oder nat, der besonders häufig körnige bis dichte (bei Gegenden von Schwarzenberg in Sachsen), schwarzen Melanit vom Vesuv, vom im Breisgau.

nat steht der schöne blutroth gefärbte Pyrop in Beziehung sehr nahe, er findet sich in der Gegend von Merouitz in Böhmen, in Serpentin zu Zöblitz in Sachsen.

#### 46. Turmalin.

gonal-rhombodrischen Krystalle haben prismatischen, jedoch ist das Prisma erster Ordnung nur mit der Hälfte seiner Flächen als Prisma, das Deutero-Prisma dagegen voll-ebildet. Als Endflächen treten besonders die sechs sehr flache Stammrhomboider auf, die dann noch andere steilere Rhomboider ebene Stalenoeder gesellen. Der Turmalin ist hemimorph ausgebildet, er zeigt also entwickelten Krystallen an den zwei Polen verschiedener Formen; die Flächen des Trismas sind in der Regel sehr stark vertical; Flächen der übrigen Gestalten dagegen

horizontal. Krystalle sind sehr oft eingewachsen, seltener aufgewachsen; parallel- oder radialstrahlige Aggregate sind sehr häufig.

Die Härte ist etwas höher als die des Quarzes, der ungefähr 3, der Glanz stark glasartig, sehr mannichfaltig; nicht gar selten zeigen doppelte Farben, so kennt man farblose oder schwarze Krappe, oder grüne Krystalle Kern u. s. w. Der Turmalin ist ausgezeichnet elektrisch. Wenige Mineralien haben eine so wechselnde chemische Constitution, Turmalin; von aciden Bestandtheilen enthält vorherrschenden Kieselsäure noch Bor- säure, und Fluor, von basischen Kali, Natron, Kalkerde, Magnesia, Eisenoxydul und Mangan- oxyde, Eisenoxyd und Manganoxyd. Da theile nicht gleichzeitig in allen Turmalinen vorkommen kann man hiernach eine Reihe von Varietäten. Die Schmelzbarkeit ist je nach der Beschaffenheit verschieden.

Die rothe Turmaline von Murfinsht am Ural, der Insel Uden, wasserhelle und grüne von Achsen, letztere auch von Elba, braune von Kärnten; der schwarze Turmalin oder häufig, besonders in Graniten.

#### 47. Azinit.

nisches Mineral, dessen sehr unsymmetrische, unregelmäßige Krystalle meist die Combination der 58 zeigen. Die Flächen sind oft parallel

den Achsen gestreift, die Krystalle einzeln oder zu Gruppen verbunden aufgewachsen.

Das Mineral hat Quarzhärte, Gewicht 3,3, Glasglanz und meist nellenbraune oder infolge von Chlorit- imprägnationen grünliche Färbung.

Auch der Azinit ist sehr complicirt zusammengesetzt und enthält Kieselsäure und Bor- säure, verbunden mit Kalkerde, Thonerde, Eisen- und Manganoxyd. Er ist leicht schmelzbar und wird nach der Schmelzung von Salzsäure vollständig zersezt.

Schöne Krystalle mit Bergkrystall von Bourg-d'Oisans in der Dauphiné und vom St. Gotthard, schalige Aggregate von Thun in Sachsen.

#### 48. Lasurstein.

Die dodekaedrischen Krystalle sind sehr selten, meist nur derbe, feinkörnige Aggregate. Das wenig glänzende, aber prachtvoll lasurblaue Mineral hat ungefähr Feldspathhärte und das Gewicht 2,4.

Es besteht aus einem Silicat von Thonerde und Natron, verbunden mit schwefelsaurem Natron und etwas Schwefeleisen, also eine ganz abnorme Zusammensetzung.

In Kalkstein eingewachsen findet sich der Lasurstein am Bailassee, in Tibet und China. Er liefert das natürliche Ultramarin, und war deshalb in früherer Zeit, ehe man die Fabrication des künstlichen Ultramarin kannte, außerordentlich hoch geschätzt.

#### 49. Topas.

Die Grundform der rhombischen Krystalle, und zugleich die vorwaltende Gestalt ist ein stumpfes Prisma, welches mit einem brachydiagonalen Prisma, einer oder mehreren Pyramiden der Haupt- und solchen der brachydiagonalen Nebenreihe, sowie mit brachydomatischen und den basischen Endflächen combinirt erscheint. Die Krystalle, in der Regel einzeln aufgewachsen, sind mitunter hemimorph ausgebildet; die prismatischen Flächen oft stark gestreift, seltener sind parallelstengelige Aggregate.

Die Spaltbarkeit ist sehr vollkommen basisch, die Härte 8, das Gewicht 3,6. Die glasglänzenden Krystalle sind durchsichtig, selten wasserhell, meist licht gefärbt. Der Topas besteht aus kiesel- saurer Thonerde, verbunden mit Fluorsilicium und Fluoraluminium; er ist unschmelzbar, und gibt, mit Schwefelsäure anhaltend behandelt, die Reaction auf Fluor.

Wasserhelle oder lichtgrüne Krystalle von Murfinsht am Ural und Aduntschil in Sibirien, weingelbe vom Schneedenstein im Voigtland, vielblaue von Villarica in Brasilien, stengelige Aggregate (Pituit) von Altenberg im Erzgebirge.

#### 50. Beryll (Smaragd).

Der Beryll krystallisirt hexagonal und zeigt am häufigsten die Combination der beiden Prismen mit der Basis oder mit Pyramide und Basis, nur selten sind die Krystalle infolge des Auftretens vieler Pyramiden complicirt gebaut. Die Krystalle, welche fast stets vertical gestreifte Prismenflächen besitzen, sind immer säulenförmig, eingewachsen, oder in Gruppen aufgewachsen oder zu stengeligen Aggregaten verbunden.

Die basische Spaltbarkeit ist recht deutlich, Härte fast 8, das Gewicht 2,7. Die glasglänzenden Krystalle sind durchsichtig bis durchscheinend, selten farblos, meist grün, blau oder gelb gefärbt.

Der Beryll enthält eine seltene Erde, die Beryllerde verbunden mit Kieselsäure und Thonerde, er ist schwer schmelzbar, von Säuren nicht zerseßbar.

Die edelste Varietät ist der prachtvoll gefärbte Smaragd, der meist in Glimmerkieser eingewachsen in Salzburgischen, bei Katharinenburg im Ural und zu

Muzo in Columbien vorkommt; dann der lichtgrün, lichtblau oder gelb gefärbte, durchsichtige edle Beryll von Katharinenburg und Miask am Ural, sowie vom Altai (hier in meterlangen Krystallen); endlich der trübe gemeine Beryll von Bodenmais in Baiern und von Grafton in Connecticut, an letzterm Orte in 20—30 Centner schweren Krystallen.

### 51. Chrysoberyll.

Die rhombischen Krystalle dieses seltenen Minerals sind in der Regel ziemlich complicirt; eine nicht seltene Form ist Taf. 2, Fig. 53, ein aus dieser Form gebildeter Durchkreuzungsdrilling, in Fig. 54 abgebildet. Die säulenförmigen oder dittaflartigen Krystalle (oft mit verticaler Streifung auf dem makrodiagonalen Flächenpaar) sind einzeln eingewachsen, oft findet sich das Mineral auch in losen Geschieben.

Der Chrysoberyll ist härter als Topas, glasglänzend und olivengrün bis smaragdgrün, oft auch mehrfach gefärbt; er besteht aus kieselhafter Beryllerde und ist weder schmelzbar noch in Säuren zersehbare.

Krystalle von Katharinenburg am Ural und Haddam in Connecticut; Geschiebe von Ceylon.

### 52. Zirkon (Hyacinth).

Die tetragonalen Krystalle, theils säulenförmig, theils pyramidal ausgebildet, zeigen besonders die auf Taf. 1, Fig. 53—55 abgebildeten Combinationen von Protopyramide und Protoprisma, Protopyramide und Deutero-Prisma, odervon diesen beiden Gestalten und einer ditetragonalen Pyramide. Auch complicirtere Combinationen, an denen besonders noch andere steilere Pyramiden auftreten, sind nicht selten. Die Krystalle sind ringsum entwickelt einzeln eingewachsen oder lose, in letzterm Falle oft zu Körnern abgerundet.

Der Zirkon besitzt kleinmuscheligen Bruch, Quarz- bis Topashärte, das Gewicht 4,6, diamantartigen Glasglanz, er ist durchsichtig bis durchscheinend und vorherrschend roth, gelb oder braun gefärbt. Er besteht aus kieselhafter Zirkonerde (einer seltenen Substanz), ist unschmelzbar (er entfärbt sich beim Glühen) und wird von Säuren nicht angegriffen.

Die schön roth gefärbten, durchsichtigen Hyacinthe kommen zu Crpailly in der Auvergne und auf Ceylon im aufgeschwemmten Lande vor, gelbe und braune Zirkone bilden einen Gemengtheil speunitartiger Gesteine von Brevig in Norwegen und von Miask am Ural.

### 53. Staurolith.

Die rhombischen Krystalle sind stets säulenförmig ausgebildet und zeigen die Combination von Prisma, Brachypinacoid und Basis. Sehr häufig sind Durchkreuzungszwillinge (Taf. 2, Fig. 38). Die Flächen sind oft, in Folge einer beginnenden Zersehung, rau und eingebrüht, die Krystalle übrigens stets eingewachsen.

Der Staurolith hat mehr als Quarzhärte, das Gewicht 3,6; im frischen Zustand lebhaften Glasglanz und zeigt dunkle rothbraune bis schwarzbraune Farben, deshalb geringe Durchsichtigkeit. Er besteht aus einem Silicat der Thonerde und des Eisenoxyds, ist unschmelzbar und wird von Säuren nur theilweise zerseht.

Die frischesten Krystalle von Tirol am St. Gottthard; die von Guimber in der Bretagne sind meist oberflächlich zerseht.

### 54. Andalusit.

Das rhombische Prisma, mit der Basis und einem Brachypinacoid die einzige bekannte Gestalt, steht dem

tetragonalen außerordentlich nahe; es ist stets säulenförmig ausgebildet, eingewachsen glattschlig, sehr oft oberflächlich zerseht, ja auch wol ganz in Glimmer umgewandelt.

Der Andalusit hat, im frischen Zustand Quarzhärte, das Gewicht 3, schwachen perlgrauen, lichtrothe, auch wol bläuliche Er ist ein reines, unschmelzbares und zersehtbares Thonerdesilicat.

In Glimmerschiefer eingewachsen findet sich Eisen in Tirol und Limbach in Sachsen zu Bodenmais in Baiern.

Gleiche Zusammensetzung besitzt der Anorthit, der aber in trichlinischen säulenförmig krystallisiert. Er ist ausgezeichnet durch die blaue Farbe und die sehr wechselnde Härte, nach den Flächen zwischen der des Quarzes schwankt. Die besten Krystalle, welche parallel verwachsen, kommen in Norwegen vor.

### 55. Korund.

Der Korund krystallisiert hexagonal, er hat Stamm- und Spaltungsgehalt ein Rhomboeder in seinen Winkelabmessungen nur wenig abweicht, doch tritt er meist in Krystallen vor, durch das Deutero-Prisma oder eine sehr kleine Pyramide, in Verbindung mit der Basis, oft eingewachsene oder lose Krystalle und Krystallite oder körnige Massen.

Die Spaltbarkeit ist meist nach der Rhomboeder gleich vollkommen, die hexagonale Spaltungsfläche ist oft in Folge der Zwillingbildung gestreift. Härte = 9, dem Diamant der härteste Körper, besteht aus Thonerde, welche folgende Varietäten hat:

a) Rubin und Saphir, ersterer roth gefärbt; beide stark glänzende, durchsichtige und Körner bildend. Auf Ceylon und im aufgeschwemmten Land, zu Niedermerz am Rhein in Basalt eingewachsen.

b) Gemeiner Korund, in grünen, meist bläulich gefärbten Krystallen oder faserigen Massen auf Ceylon, in China, in Piemont.

c) Smirgel, in feinkörnigen, oft in durchwachsenen Massen von der Größe eines Ochsenkopfs bei Schwarzenberg im Erzgebirge. Der gemeine Korund wird zu Zahnrädern von Uhren und seinen Instrumenten als Schleif- und Poliermittel benutzt.

### 56. Spinell.

Die gewöhnliche Gestalt des Spinells ist das Octaeder, seltener die Combination von Octaeder und Rhombendodekaeder (Taf. 1, Fig. 1). Man findet octaedrische Zwillinge (Taf. 1, Fig. 2). Die glattschligigen Krystalle sind einzeln oder zu Körnern abgerundet, kommen im aufgeschwemmten Land vor.

Die octaedrische Spaltbarkeit ist nicht so vollkommen, die Härte 8, das Gewicht 3,5—3,8. Die lebhaft glasartig, die häufig sehr dunkel gefärbten Krystalle zeigen vorherrschend rothe, schwarze, blaue Farben.

Der Spinell ist ein Magnesia-Mineral, in den schwarzen Abänderungen enthält er Eisen. Er wird durch Eisenoxyd zerseht, schmelzbar und in Säuren unauflöslich.



the oder edle Spinell (auch Rubis balais kommt in losen Krystallen oder Körnern auf in Begu in Hinterindien vor; von dem ist dem er häufig verwechselt wird, unterscheidet sich seine nicht so tief sarmirothe, mehr bräunliche. Der blaue Spinell oder Saphirin findet wenigem Kalt von Aler in Schweden, sowie im vom Laacher See, der schwarze Spinell auch Pleonast oder Ceylanit genannt, kommt im Sphenit vom Monzenberg in Südtirol, vulkanischen Tuffen des Vesuvius und im auf dem Lande an der Bierwiese im Riesengebirge wie auf Ceylon vor.

#### 1. Familie. Eisen.

##### 57. Gebiegen Eisen.

raffenhaft auch das Eisen in Verbindungen vorkommt, so ist doch sein Vorkommen in metallischem in dem Erdbinnen noch nicht mit Sicherheit ist; dagegen finden sich Massen, oft aus reinem bestehend und von bedeutendem Gewicht, auf der Oberfläche, die aber nicht irdischen sondern losen Ursprungs sind, d. h. die auf ihrer planetarischen Bahn durch den Weltraum in den Bereich der Anziehungskraft der Erde gekommen und auf ihr niedergefallen sind. Diese Meteorisenmassen zeigen ganz die physikalischen Eigenschaften des künstlich dargestellten Eisens; sie bestehen aus tesseralen Krystallformen, die sich aber meist aus einem eigenthümlich maschigen Gefüge zu ergeben, welches beim Hegen mit Salpetersäure verschwindet kommt, und die sog. Widmannstätten-Figuren (Taf. 3, Fig. 19) liefert; sie besitzen häufigen Bruch, seine Geschmeidigkeit, seine Härte ein Gewicht 7,8 (leichteres sinkt aber infolge der einmengen chemischer oder mechanischer Natur, s. 6,6). Das Meteorisen hat Lichtstahlgrau, es ist magnetisch, unschmelzbar vor dem Vöth in Säuren leicht löslich. Es bildet meist unregelmäßig geformte Klumpen, die mit einer dünnen, glatten Rinde, ein Zeichen der hohen Temperatur, die sie beim schnellen Fall durch die Atmosphäre hatten, oder nach längerem Liegen an feuchter mit einer dicken braunen Verwitterungskruste bedeckt sind.

Chemischer Beziehung zeichnet sich das Meteorisen durch den nie fehlenden Gehalt an Nickel, der 10 Proc. steigen kann, aus. Außerdem enthalten viele derartige Massen auch nichtmetallische Verunreinigungen, unter ihnen den Olivin besonders häufig, mechanische Beimengungen, und sie nähern sich den feinkörnigen Körpern desselben Ursprungs, Meteoriten, welche vorherrschend aus Augit Anorthit bestehen und theils eisenhaltig, theils frei sind.

Die Meteorisenmassen von besonders großen Dimensionen verdienen angeführt zu werden: das Meteorisen von Elbogen in Böhmen (191 Pfd.), das von Aachen in Brandenburg (200 Pfd.), das von Alai (300 Pfd.), das von Krasnojarsk in Sibirien (10 Pfd.), das von Villa Nueva in Mexico (mehrere von 2—3000 Pfd.), endlich das von Olumbana (300 Ctr.).

Meteorsteine theils mit, theils ohne Eisen, sind u. a. an folgenden Orten und Tagen gefallen: Blansko in Böhmen (25. Nov. 1833), Montrejeau in Frankreich

(9. Dec. 1858), Alais in Frankreich (15. Mai 1806), Stannern in Mähren (22. Mai 1808), Juvenas in Frankreich (13. Juni 1821), Teketzin in Ungarn (15. April 1857).

##### 58. Magneteisen.

Das Magneteisen krystallisiert tesseral, in den Formen des Octaeders, des Rhombendodekaeders und der Combination dieser beiden Gestalten, oder in octaëdrischen Zwillingen. Die Flächen des Dodekaeders sind häufig diagonal gestreift, die Krystalle übrigens oft ringförmig ausgebildet und eingewachsen oder auch gruppirte aufgewachsen, am häufigsten sind aber derbe, grob- bis feinkörnige oder dichte Massen.

Das Magneteisen besitzt Feldspathhärte, ist fünfmal schwerer als Wasser, es hat auf Krystallflächen Metallglanz, auf den feinsten muschelförmigen Bruchflächen pechartig metallischen Glanz, eisenschwarze Farbe und gleichen Strich, und ist besonders durch seine stark magnetischen Eigenschaften (es bildet manchmal natürliche, mit polarischem Magnetismus versehene Magnete) ausgezeichnet.

Es ist Eisenorydorydul mit ca. 72 Proc. Eisengehalt, ist nur schwierig schmelzbar und löst sich langsam in Säuren. Dieses Erz kommt in Schweden (Dannemora) und am Ural (Wagodat) in großen, massigen Lagern und Stöden vor, ferner bildet es, gemengt mit andern Mineralien, Lager und Gänge in der Gegend von Schwarzenberg und Bergschnee in Sachsen, bei Traverella in Piemont und Dognagla im Banat; an eingewachsenen Krystallen sind besonders die Chlorit-schiefer und Talk-schiefer der Alpen reich.

Das Magneteisen ist einmal seines hohen Eisengehalts und sodann der großen Reinheit des aus ihm dargestellten Eisens wegen ein sehr geschätztes Eisen-erz; es wird besonders zur Darstellung feinerer Eisensorten, des Stahls und des Stabeisens benutzt.

Das schwedische Eisen verdankt ihm hauptsächlich seinen Auf.

Das Chromeisen-erz, welches für die Herstellung der Chromverbindungen von Wichtigkeit ist, besteht dieselben krystallographischen und physikalischen Eigenschaften wie das Magneteisen, nur ist es etwas leichter, hat unvollkommenen Metallglanz und braunen Strich. Es enthält an Stelle des Eisenoryds Chromoryd und findet sich in Schlesien sowie am Ural.

##### 59. Glanzeisenerz und Rotheisenerz.

Das Glanzeisenerz krystallisiert in rhomboëdrischen Formen, welche mit denen des Korunds die größte Uebereinstimmung zeigen; auch die Krystallreihe dieses Minerals ist durch das Vorkommen von Deltapiraminen ausgezeichnet, die aber seltener allein, häufiger in Combination mit Rhomboëdern ausgebildet sind. Nadelartige Krystalle entstehen nicht selten, wenn die Basis und ein flaches Rhomboëder der ersten Richtung, welche Flächen in der Regel horizontal gestreift sind, mit dem Stammrhomboëder combinirt sind, auch kennt man dünnstafelartige Krystalle, an denen Rhomboëderflächen nur ganz untergeordnet auftreten. Die Krystalle sind aufgewachsen, mitunter zu rosettenartigen Gruppen (Eisenerzen) verbunden, die dünnstafelartigen zu schuppigen, feinschuppigen Massen aggregirt, auch sind strahlige oder schalige Partien nicht selten.

Das Glanzeisenerz besitzt muschelförmigen Bruch, Feldspathhärte, das specifische Gewicht 5,2, Metallglanz, in den dünnsten Lamellen rothe Durchscheinheit, eisenschwarze Farbe und kirchrothen Strich. Es besteht aus reinem Eisenoryd, ist vor dem Vöthrohr unschmelzbar, in Säuren löslich.

Die schönsten Glanzeisenerzkryrstalle kennt man vom St.-Gottthard, vom Ritschthal in Tirol, von der Insel Elba, von Altenberg in Sachsen, das schuppige Glanzeisenerz, der Eisenglimmer, kommt theils auf Eisenerz-lagerstätten, theils als Gemengtheil von Gesteinen (in denen er den Glimmer vertritt) vor, so im Granit des Zickelgebirgs und im Glimmerschiefer (Stabir) von Brasilien, das strahlige Glanzeisenerz endlich im Siegenischen.

Das Rotheisenerz ist ebenfalls reines Eisenoryd; es ist aber nicht krystallin, sondern nur krystallinisch, und unterscheidet sich vom Glanzeisenerz durch seine geringere Härte (3—5), das geringere Gewicht von 4,5—4,9, den unvollkommenen, meist sehr matten Metallglanz, die dunkelrothe, selten stahlgraue Farbe und den blutrothen Strich. Es findet sich in kugelförmigen oder nierenförmigen oder traubigen Gestalten mit glatter Oberfläche und radialstengeligem oder faserigem Gefüge als rother Glaslopf oder Blutstein (Taf. 3, Fig. 13), oder in derben Massen von flachmuscheligen bis ebenem Bruch und dichter Beschaffenheit; schuppige und schaumige Partien, der sog. Eisenrahm, oder erdige und zerreibliche oder finden sich mitunter auf den Klüften und Absonderungsflächen des derben Rotheisensteins.

Das Rotheisenerz bildet, fast stets mit Quarz und Hornstein verbunden, Gänge und Lager in den ältern Gebirgsformationen, so am Harz, im obern Erzgebirge, in Westfalen, in Nassau u. s. w., und es ist an allen diesen Orten Gegenstand bergmännischer Gewinnung, da es als ein reines Eisenerz von hohem Gehalt (bis zu 70 Proc.) sehr geschätzt ist. Langfaserige Partien von großer Härte (Blutstein) werden zum Poliren von Gold- und Silberwaaren benutzt.

Der Rotheisenstein ist häufig durch Kieselsäure, Thon oder Kalk verunreinigt, aber auch diese unreinen Arten werden, wenn es der Metallgehalt nur irgend gestattet, auf Eisen verschmolzen.

Mit dem Glanzeisenerz krystallographisch und physikalisch auf das innigste verwandt ist das Titaneisenerz, welches neben Eisenoryd Titanoryd in so wechselnden Mengen enthält, daß eine scharfe chemische und physikalische Trennung beider Körper nicht durchführbar ist. Am besten kann man sie noch durch den Strich unterscheiden, der beim eigentlichen Titaneisenerz (mit ca. 50 Proc. Titanoryd) schwarz ist.

#### 60. Brauneisenerz.

Die Art des Vorkommens dieses Erzes ist vollständig der des Rotheisenerzes analog; auch das Brauneisenerz kennt man nur im krystallinischen, glaslopfartigen oder derben, dichten Zustand. Härte = 4, Gewicht 3,4—4,2, je nach der Reinheit; die faserigen oder flachmuscheligen Bruchflächen sind schwach glas- oder seidenglänzend bis matt, das Mineral ist schwarzbraun bis ockergelb gefärbt, der Strich ist gelblichbraun.

Das Brauneisenerz ist ein Eisenorydhydrat mit ungefähr 60 Proc. Eisen. Es ist schwer schmelzbar, in Säuren löslich.

Man unterscheidet auch hier die Varietäten des faserigen Brauneisenerzes (brauner Glaslopf), des dichten Brauneisensteins und des Brauneisenoders, welche meist zusammen vorkommen und Gänge und Stöcke in verschiedenen Formationen bilden, so am Harz, am Thüringer Wald, im Siegenischen, in der Oberpfalz, in Steiermark, Kärnten u. s. w.

Das Brauneisenerz ist sehr häufig aus der Zersetzung anderer Eisenerze hervorgegangen, so besonders des Spateisensteins und des Eisenkiesels, und man findet es deshalb oft nur am Ausgehenden der Lagerstätten, während in der Tiefe jene Erze vorherrschen.

Daß man auch kieselige, thonige Erze finden wird, ist leicht begreiflich.

Das Brauneisenerz wird bekanntlich verschmolzen.

Eine unreine Abart des Brauneisenerzes ist der Raseneisenerz, den Boden von Seen oder in jungem als Absatz eisenhaltiger Quellen bildet. Er enthält Phosphorsäure in variabler Menge, organische Zersetzungsproducte, und Quarz, und ist besonders durch die unregelmäßigen Löcher und Höhlungen, die er charakterisirt.

Er findet sich in großen Mengen in der norddeutschen und russischen überall gewonnen und auf Gusseisen

#### 61. Eisenspat (Spateisenstein oder siderit).

Der Eisenspat krystallisirt rhomboedrisch, mit welchem er isomorph ist. Der rhomboeder ist die vorherrschende Form, die erste stumpfere Rhomboeder und die Spaltbarkeit ist, wie bei allen, dem Kalk Mineralien, vollkommen rhomboedrisch. Mitunter mit sattelförmig gebogenen oder durcheinandergewachsen, seltener in härtesten bildet aber der Eisenspat die härteste, körnige oder dichte Massen, die faserige Partien von radialfaserigem Gefüge.

Das Mineral besitzt Glasglanz, der in Fettglanz übergeht, erbsengelbe, isabelfarbene Farbe und geringe Durchsichtigkeit.

Der Eisenspat besteht aus kohligen Eisen mit circa 40 Proc. Eisen, doch ist das Eisenoryd durch Magnesia oder Kalk vertreten, wodurch natürlich der Eisenspat wird. Von Säuren wird das Mineral gelöst. Der Eisenspat besitzt eine starke Abgabe von Kohlensäure und Wasser in Eisenorydhydrat umzuwandeln, daher so häufig in der Natur.

Der krystallinische und krystallinische Eisenspat bildet in ältern Formationen Gänge und Stöcke, so im Riesengebirge, im Harz, im Siegenischen, bei Müsen und in Steiermark. Er ist trefflich zur Stahlbereitung. Die faserigen Gefüge versehenen Partien des Eisenspats sind in größeren Massen, seltener in doleritischer Gesteine, so in der Gegend von Main.

Ein sehr wichtiges Erz ist der Thoneisenstein, ein mit kieseligen auch mit kohligen Bestandtheilen versehenes Mineral. Er bildet entweder zusammenhängende lagerförmig angeordnete Nieren und Massen, vorwiegend in der Formation des Thons und der Steinkohle. Es ist besonders häufig in der Steinkohle vorzukommen mit Kohle, so in den rheinischen und saarbrücker Becken. Thoneisensteine so werthvoll und trotz des geringen Eisengehaltes von circa 32 Proc.

#### 62. Magnetit.

Das Mineral kommt in hexagonaler nach der Basis vollkommen spaltbar, aber in derben, blätterigen oder

härte, das Gewicht 4,5, Metallglanz, der Oberfläche meist tonbadbraune Farbe Strich und ist retractorisch magnetisch. Schwefelkies mit ungefähr 60 Proc. Eisen, in einem Löthrobrflamme leicht zu einer gelben und wird von Säuren unter Entweichen von Schwefelwasserstoffgas gelöst.

Es kommt besonders auf Erzlagerstätten, in Baiern, Kupferberg in Schlesien, Modum in Norwegen, sowie in Meteor-eisenmassen vor.

Kies von Modum wird seines Nickelgehaltes wegen zu Nickelrefabrikation, Nickel dieses Minerals dagegen zur Darstellung von Vitriol verwendet.

#### Eisenkies (Schwefelkies).

Sehr häufige und weitverbreitete Mineral kristallisiert in der rhomboedrischen Form.

Formen sind Hexaeder, Octaeder, Dodekaeder und Dodekaeder (Taf. 1, 2), sowie die Combinationen dieser Formen ein paar in Fig. 33 und 34 abgebildet. Die Kristalle des Pentagons mit parallelen Achsen systemen vor (Taf. 1, 3). Die Oberflächen sind sehr oft durch untereinander stehende Pentagonalflächen gegliedert. Alle übrigen Kristallformen sind glatt. Der Kies hat muscheligen Bruch, Feldspathhärte, starken Metallglanz, speisgelbe bis gelbbraune Farbe der Oberfläche dagegen manchmal (Taf. 1, 4) und grünlichschwarzen Strich.

Es ist ein Schwefelkies mit 47 Proc. Eisen; kleine Mengen von Silber oder noch etwas von Gold, die aber doch häufig fehlen. Vor dem Löthrobr schmilzt er in Königswasser, von Salpetersäure, von Salpetersäure unter Schwefelabgabe gelöst.

Kieskristalle sind häufig einzeln oder zu Gruppen verbunden, eingewachsen, noch in Mineralien aufgewachsen, wobei sie nicht selten, traubigen oder baumsförmigen Partien (Taf. 3, Fig. 7); hauptsächlich Mineral in dichten Massen von strahliger, feiner Structur auf.

Die Fundorte des Schwefelkies sind die Erzberge, er denn nicht selten allein ganze Gänge findet man ihn in mergeligen und thonschieferigen, sowie in Braun- und Steinkohlen, zu deren Entzündung er in Folge seiner Leichtigkeit sehr selten Anlaß gibt.

Er wurde früher zur Darstellung von Eisen, aber besonders zur Fabrikation von Eisen, indem man schweflige Säure aus ihm entwickelt, welche dann durch Erhitzen in Schwefelsäure übergeführt wird.

#### 64. Strahlkies.

Strahlkies ist eine rhomboedrische Kristallform, also eine Verbindung derselben Verbindung, wie der sehr flachprismatischen Kristalle sind in paarartigen Drillingen verwachsen, daher Strahlkies genannt hat; in der Natur Strahlkies aber in knolligen oder traubigen von strahligem Gefüge vor. Er unterscheidet sich besonders durch die mehr gelbe Farbe und den rein grünlichschwarzen Strich durch seine viel größere Neigung zum Schmelzen in Vitriolflamme.

Seine Verwendung wie beim Eisenkies.

#### 65. Arsenkies.

Die rhomboedrischen kurzäulenförmigen Kristalle zeigen als Endflächen ein sehr flaches Brachydoma, welches in der Regel horizontal gestreift erscheint. Durchkreuzungszwillinge, welche eine makrodomatische Fläche als Zwillingsebene besitzen, sind sehr häufig. Die Kristalle sind einzeln ein- oder zu Drusen verbunden aufgewachsen; stengelige und strahlige Partien oder derbe Massen von körniger bis dichter Structur.

Die Spaltbarkeit ist deutlich prismatisch, die Härte 6, das Gewicht 6,2, der Glanz nur an frischen Stücken lebhaft metallisch, die Farbe zinnweiß, durch Anlaufen leicht grau werdend, der Strich schwarz; beim Zerbrechen ist ein knoblauchartiger Geruch wahrzunehmen.

Der Arsenkies ist eine Verbindung von Schwefelkies mit Arsenkies (43 Proc. Arsen), doch enthält er nicht selten mehrere Procent Kobalt (Kobaltarsenkies, zeichnet sich durch rötlich-silberweiße Farbe aus). Auf Kohle erhitzt, erzeugt er unter Entzündung von starkem Knoblauchgeruch einen weißen, flüchtigen Beschlag und schmilzt, Salpetersäure löst ihn unter Abscheidung von Schwefel und arseniger Säure.

Der Arsenkies ist ein auf Erzlagerstätten sehr weit verbreitetes Mineral, auch kommt er eingeprengt in Gebirgsarten vor. Er dient zur Darstellung der verschiedenen Arsenfabrikate (als Gistmehl, Fliegenstein, Arsenöl).

Als Verfeinerungsproduct schwefelkieshaltiger Kiese findet man nicht selten, in trauben- oder nierenförmigen Partien oder in Einschlüssen, den Eisenvitriol, das wasserhaltige schwefelsäure Eisenorydul. Seine graugrüne Farbe, geringe Härte, die leichte Löslichkeit in Wasser und der tinnenartig herbe Geschmack machen ihn leicht kenntlich; infolge seiner Löslichkeit geht er oft in die Grubenwasser über, die man, falls sie giftig genug sind, auf Vitriol verarbeiten kann; läßt man solche Vitriolwasser mit Bädern sich vermischen, so richten sie durch das Ertröden aller Organismen in diesen großen Schaden an.

Ähnliche Verfeinerungsproducte sind auch die Eisensinter, welche in der Hauptsache aus wasserhaltigem, arsenkiesem oder phosphorsäurem Eisenorydul bestehen. Harzartiger Glanz, braune Farbe und amorphe, glasige Structur kennzeichnen sie.

#### 2. Familie. Mangan.

Das Mangan kommt nie in gediegenem, sondern nur in vererztem Zustande vor. Es zeichnet sich durch die große Zahl von Verbindungen aus, welche es mit Sauerstoff bildet, von denen besonders eine, das Manganoxyd, in der Natur vorkommt und dadurch von Wichtigkeit ist, daß sie sehr leicht einen Theil ihres Sauerstoffs abgibt und deshalb zur Darstellung von Sauerstoffgas und auf indirectem Wege, indem man sie mit Chlornatrium und Schwefelsäure erhitzt, zur Entzündung von Chlorgas benutzt werden kann.

Außerdem aber werden die Manganerze, die äußerst häufig mit Eisenerzen zusammen auftreten, mit diesen verschmolzen; das dabei erhaltene Spiegeleisen eignet sich besonders zur Darstellung von Stahl. Endlich aber übt das Mangan, den Glasflüssen zugesetzt, eine entfärbende Wirkung aus.

Das wichtigste Manganerz ist der

#### 66. Pyrolusit.

Der Pyrolusit ist kein ursprüngliches Mineral, sondern ein Umwandlungsproduct aus zwei andern Manganerzen, dem Manganit und Polianit. Echte Kristalle gibt es daher nicht, vielmehr nur Pseudomorphosen



nach diesen Mineralien; am häufigsten finden sich strahlige oder radialfaserige Partien, oder dichte und erdige Massen. Er ist sehr weich, daher abfärbend, halbmetallisch bis seidenartig glänzend, stahlgrau bis licht eisenschwarz, hat tiefschwarzen Strich und das Gewicht 4,7—5.

Er ist Mangansuperoryd mit 37 Proc. Sauerstoff, von welchem er beim Glühen den dritten Theil verliert. Er ist, wie alle Manganerze, unschmelzbar und löst sich in Salzsäure unter lebhafter Chlorentwickelung.

Am Thüringerwald und am Harz bildet er mit andern Manganerzen Gänge im Melaphyr und rothen Porphy, im Nassauischen Nesten in Dolomit, außerdem kommt er auf den meisten Eisenerzlagerstätten vor, so im Erzgebirge, in Thüringen, Nassau u. s. w.

#### 67. Polianit.

Der Polianit krystallisirt in rhombischen, säulenförmigen Krystallen, die meist vertical gestreift und an ihren Enden zerfasert erscheinen.

Er hat mit dem Pyrolusit, mit dem er chemisch identisch ist, und in den er sich, wie oben bemerkt, leicht umsetzt, die größte Aehnlichkeit; er unterscheidet sich von ihm hauptsächlich durch seine hohe Härte, welche im völlig frischen Zustande die des Quarzes erreicht.

#### 68. Manganit.

Die rhombischen Krystalle sind säulenförmig ausgebildet und zeigen in der Regel sehr complicirte Combinationen mehrerer Säulen und vieler Pyramiden, auch sind knieförmige Zwillingkrystalle nicht selten. Die Krystalle sind oft vertical gestreift, zu Bündeln vereinigt; faserige und stengelige Aggregate wie beim Pyrolusit.

Der Manganit ist nach dem Brachypinaloid vollkommen spaltbar, hat Flußspathhärte, Gewicht 4,3, stahlgrau bis eisenschwarze Farbe und braunen Strich. Er ist Manganoxydhydrat, besitzt aber große Neigung, seinen Wassergehalt gegen Sauerstoff auszutauschen, sich also in Pyrolusit umzuwandeln, bei welchem Vorgang das Gewicht höher, die Härte geringer und der Strich dunkler wird.

Er findet sich besonders auf den Manganerzgängen des Harzes und Thüringerwaldes.

Ein paar seltenere Mineralien, die mit den vorigen zusammen vorkommen, sind der Braunit (Manganoxyd) und der Hausmannit (Manganoxyd-Drydul). Beide krystallisiren in tetragonalen Pyramiden (die des erstern sind sehr octaëderähnlich, die des andern spitzer) und unterscheiden sich voneinander hauptsächlich durch den Strich, der beim Braunit schwarz, beim Hausmannit kastanienbraun ist.

Der Psilomelan oder Hartmanganerz (wasserhaltiges Mangansuperoryd mit Baryterde, Kali und Manganoxydul in sehr wechselnden Verhältnissen) ist ein amorphes, in glasförmigen Massen von schmutzgelbem Bruch auftretendes Mineral; es hat Feldspathhärte, sehr schwachen metallischen Glanz, bläulichschwarze Farbe und schwarzen, stärker glänzenden Strich.

Der Psilomelan kommt auf Manganerzlagerstätten häufig vor, findet aber nur selten Verwendung zu technischen Zwecken.

#### 69. Manganspat.

Krystallform und Spaltbarkeit rhomboëdrisch, wie die des Kalispatz, Eisenspatz u. s. w.

Die zu Drusen verbundenen Krystalle sind aufgewachsen und zeichnen sich besonders durch ihre rosenrothe bis himbeerrothe Farbe aus. Der Manganspat besteht aus kohlenfreiem Manganoxydul und verhält sich chemisch wie Eisenspat.

Ein auf Blei- und Silbererzen Mineral, so besonders bei Freiberg.

#### 3. Familie. Kobalt- und Nickelminerale.

Beide Metalle kommen nie als Metalle in vereinigtem Zustande, und zwar auch nicht mit Schwefel verbunden, vor. Ihre Aehnlichkeit hin, daß sie den alten Bergleuten keinen Nutzen zu ziehen wußten, ist die einzige Erscheinung gewesen, die dem 16. Jahrhundert aus den Erzgebirgen geschätzte blaue Farbe, Smalte genannt, erst in neuester Zeit angefangen hat, in größern Mengen darzustellen. In der Schweiz werden aus ihm Schmelzen

#### 70. Speiskobalt und Nickel.

Diese beiden Mineralien sind in der Natur so ähnlich, daß sie nicht zu trennen sind. Sie krystallisiren beide in der Form des Kubooktaëders (Taf. 1, Fig. 17) in der Combination des Hexaëders mit dem Kubus (Taf. 1, Fig. 17). Die Krystalle sind oft conger, die Krystalle zu Gruppen vereinigt oder eingesprengt, und dann findet man eine Abtheilung in die Länge gegen einander gestrichelte oder derbe Aggregate oder dichter Structur.

Die Mineralien haben Krystalle bis zu einem Gewicht 6,4—7,3, Metallglanz, stahlgraue Farbe (daher weißer Strich) und schwarzen Strich.

Der reine Speiskobalt würde aus der reinen Chloanthit aus Einfach-Kobalt doch finden sich stets beide Metalle; daher läßt sich, da es nur auf ein Element ankommt, nicht einmal auf einfachen sondern nur auf genaue quantitative Trennung dieser Körper bei der Kohle unter Arsengeruch leicht untersuchen, saure unter Abscheidung von Arsen.

Auf Gängen im obern Erzgebirge, namentlich von Schneeberg, zu Niederschlag.

Das einzige praktische Hilfsmittel zur Trennung dieser Körper bei der Analyse ist die bedeckte Schmelze mit Ueberbleibseln wasserhaltigen arsensauren Erden bei herrschendem Kobaltgehalt rothe, im Nickelgehalt blaue Farbe besitzend.

Der erstere dieser Beschläge, der kommt auch in Drusenräumen in sehr perlmutterglänzenden, spieförmigen und körnigen Krystallen vor.

#### 71. Rothnickellies.

Die kleinen hexagonalen Krystalle, die meist kommt das Mineral nur derbe vor. Es hat Härte 5½, Gewicht 7,3, Bruch lebhaften Metallglanz und bläulichschwarzen Strich.

Der Rothnickellies besteht aus Nickel und ist oft ein Theil des Arsens durch Kobalt auch etwas Kobalt vorhanden. Er kommt ähnlich wie der Chloanthit.

Dieses sehr wichtige Mineral findet man in Schneeberg, Freiberg und Joachimsthal im Mansfeldischen sowie zu Niederschlag.

#### 72. Glanzkobalt.

Der Glanzkobalt krystallisirt in der Form des Kubooktaëders.

n wie der Eisenkies, also pentagonalbode-  
e Krystalle sind meist scharfkantig ringsum  
auch finden sich derbe und eingesprenge  
e hexaedrische Spaltbarkeit ist vollkommen  
Härte  $5\frac{1}{2}$ , das Gewicht 6, der Glanz ist  
d, die Farbe röthlich-silberweiß, der Strich  
kobalt besteht aus Zweifach-Schwefelkobalt  
isenkobalt mit 36 Proc. Kobalt (häufig et-  
Die Reactionen sind identisch mit denen des  
doch scheidet er bei der Auflösung auch  
in Schweden und Stutterud in Norwegen  
pfundorte.

## 73. Kobaltkies.

len, fast stets octaedrischen Krystalle sind  
cengt, seltener aufgewachsen; häufig derbe  
hat dieselbe Härte und Farbe wie der  
ist aber leichter als dieser (Gewicht = 5).  
is Schwefel und Kobalt, mit 58 Proc. Ko-  
auch hier ein oft beträchtlicher Antheil des  
Hidel (bis 42 Proc.) vertreten. Er gibt  
rohr schweflige Säure und schmilzt im Re-  
in Salpetersäure ist er unter Schwefel-  
löslich.

Rheinland und Riddarhytta in Schweden.

## 4. Familie. Zink.

## 74. Zinkblende.

allform ist tesseral, und zwar hemiedrisch  
nd rhombendodekaedrischem Habitus, sodas  
chen Gestalten, Tetraeder und Trigondode-  
untergeordnet auftreten, doch sind auch  
oder scheinbar octaedrische, durch die Com-  
beiden Tetraeder entstandene Krystalle  
ht selten. Die beiden Tetraeder, die oft  
auftreten, sind stets leicht dadurch vonein-  
erscheiden, daß die Flächen des einen glatt,  
ern aber rauh und drüsig erscheinen.

fig sind Zwillingkrystalle nach dem Gesef-  
ie senkrecht auf einer Tetraederfläche; wenn  
e Krystalle in dieser Weise ausgebildet sind,  
in die Verwachsung, da einspringende Win-  
iran, daß sechs Flächen des Rhombendode-  
Etrapezen geworden sind. Die Zinkblende  
in aufgewachsenen Krystallen auch in der-  
ischen Massen von grob- oder feinkörnigem,  
asferigem Gefüge vor.

kommen ist die dodekaedrische Spaltbarkeit;  
de steht darin einzig da. Das Mineral  
härte, Gewicht = 4, starken Diamantglanz,  
rsichtigkeit und sehr verschiedene gelbgrüne,  
re und schwarze Farben, in den dunklern  
elben bis braunen Strich.

Zinkblende besteht aus Schwefelzink mit  
it, doch sind stets größere oder kleinere An-  
theils durch Eisen vertreten. Sie schmilzt nur  
und ist in Salpetersäure unter Schwefel-  
löslich.

tallisirte gelbe und grüne Blende von Schem-  
nit in Ungarn, Picos in Spanien, rothe  
l, braune vom Harz und aus den Pyre-  
näische Blende von Freiberg, Zellerfeld am

je Blende bildet oft allein mächtige Gänge  
o am Wettersee in Schweden, in Spanien,  
er Zeit dient die Blende zur Zinkdar-

## 75. Zinkspat.

Auch dieses Mineral gehört zu der Zahl der mit dem  
Kalkspat isomorphen Körper, doch sind die Krystalle stets  
klein und überhaupt selten, meist kommt der Zinkspat  
in nierenförmigen und traubigen Massen von faseriger  
Structur oder in feinkörnigen bis dichten Aggregaten  
vor. Der Zinkspat hat Apatithärte, Gewicht 4,3, ist  
glas- bis perlmutterglänzend, licht grau, gelb, grün  
oder braun gefärbt und durchscheinend. Er besteht aus  
kohlenfaurem Zinkoxyd mit 50 Proc. Zink, doch enthalten  
die meisten Varietäten etwas Eisen- oder Manganory-  
dul, auch wol geringe Mengen von Bleioryd und Kadm-  
miumoryd, oder sie sind durch Kieselsäure und Thon-  
erde verunreinigt. Vor dem Löthrohr verliert er die  
Kohlensäure und gibt auf Kohle einen weißen Zinkbe-  
schlag, in Säuren ist er unter Aufbrausen löslich.

Er kommt in größeren Massen am Altenberg bei  
Nachen, zu Tarnowitz in Schlesien, bei Dognaczka im  
Banat vor und liefert an diesen Orten das geschäftigste  
Material zur Zinkdestillation.

## 76. Kieselzinkerz.

Die Krystallform ist rhombisch mit ausgezeichnetem  
hemimorphen Formtypus. Die durch das Vorherr-  
schen des Brachy- oder Makropinaloids breittafelför-  
migen Krystalle sind an ihrem untern Pole durch eine  
Brachyppramide, am obern Pole dagegen durch andere,  
sehr verschiedenartige Gestalten begrenzt, so durch Ma-  
krodoma und Basis (Taf. 2, Fig. 39) oder durch zwei  
Makro-, zwei Brachydomen und die Basis (Taf. 2,  
Fig. 40).

Die Flächen des Prismas, nach welchen das Mineral  
vollkommen spaltbar ist, treten an den Krystallen meist  
nur untergeordnet und mit verticalen Streifungen ver-  
sehen auf.

Die Krystalle sind meist leiförmig und fächerförmig  
gruppirt, zu traubigen, nierenförmigen und stalaktitischen  
Gestalten vereinigt; sehr häufig sind strahlige oder fein-  
faserige Aggregate und dichte bis erdige Varietäten.

Das Kieselzinkerz hat Apatithärte, Gewicht 3,5, zum  
Theil perlmutterartigen Glasglanz, es ist mitunter durch-  
sichtig und wasserhell, doch meist verschiedenartig grau,  
gelb, grün, roth und blau gefärbt. Es besteht aus  
wasserhaltigem kieselfaurem Zinkoxyd mit 53 Proc. Zink,  
ist unschmelzbar und in Säuren unter Abscheidung von  
Kieselgallert zersehbär.

Das Kieselzinkerz kommt in Kärnten, Oberschlesien,  
Polen, in Westfalen, bei Nachen, in Spanien und auf  
der Insel Sardinien massenhaft in Lagern und Nestern  
vor.

Der Galmei der Berg- und Hüttenleute ist ein durch  
Bergarten verschiedener Art verunreinigtes Gemenge von  
Kieselzinkerz und Zinkspat (der edle Galmei enthält vor-  
wiegend den letztern), und dieses gemengte Erz ist es,  
welches das Hauptmaterial zur Zinkfabrikation liefert.

Das Rothzinkerz (manganhaltiges Zinkoxyd) kommt  
nur in Nordamerika, im Staate Neu-Jersey, in so großen  
Massen vor, daß es zur Zinkdestillation benutzt werden  
kann.

## 5. Familie. Kupfer.

## 77. Gediegen Kupfer.

Das Kupfer krystallisirt tesseral und zeigt das Hexaeder  
theils allein, theils mit dem Octaeder (Taf. 1, Fig. 13  
und 14), theils mit Octaeder und Rhombendodekaeder  
(Taf. 1, Fig. 19), theils mit dem Tetraederhexaeder  
(Taf. 1, Fig. 22) combinirt. Die Krystalle haben meist  
krumme Flächen und sind monströs ausgebildet, auch  
zu baumförmigen oder moosartigen Gruppen verwachsen.

Sehr häufig sind zähnige und drathförmige Gestalten, dünnere oder didere Platten, oder ganz unregelmäßig geformte Klumpen.

Das Kupfer ist ein geschmeidiges und dehnbares Metall, hat haligen Bruch, ungefähr Kalkspathhärte, Gewicht 8,5—8,9, Metallglanz auf frischen Bruchflächen, rothe, auf der Oberfläche bräunliche Farbe und rothen, glänzenden Strich. Es ist schmelzbar und löst sich in Salpetersäure.

In den größten Massen und gleichzeitig in schönen Krystallen kommt das Kupfer am Lake superior in Nordamerika vor (man hat dort Platten von 1600 Ctr. Gewicht gefunden), ebenso bei Adelaide in Australien; ferner am Ural, zu Rheinbreitenbach, bei Zwickau in Sachsen, in Cornwall u. s. w.

Die vielfache Verwendung des Kupfers zu Münzen, Geräthschaften, Schiffsbeschlägen, Legirungen u. s. w. ist bekannt.

#### 78. Rothkupfererz.

Trigonale Krystallform, vorherrschend Octäeder, Octäeder mit Rhombendodekaeder (Taf. 1, Fig. 18) oder Triakisoctäeder, seltener Hexäeder, die in der Richtung einer Achse nadelförmig verlängert sind. Die Krystalle sind einzeln oder gruppirt aufgewachsen, häufig körnige oder faserige Aggregate. Die Spaltbarkeit ist octäedrisch und vollkommen, die Härte 4, das Gewicht 6; der Glanz lebhaft diamantartig bis metallisirend, die Farbe lichter oder dunkler roth, manchmal in dunkel stahlgrau übergehend, der Strich bräunlich-roth. Das Mineral besteht aus Kupferoxydul mit circa 90 Proc. Kupfer; es ist leicht reducirbar, ertheilt der Flamme eine schöne grüne Färbung und löst sich in Säuren.

Das Rothkupfererz kommt sehr häufig auf Kupfererzlagertstätten und zwar in der Regel mit gediegenem Kupfer zusammen vor, welches dann den Kern der Krystalle zu bilden pflegt; so zu Dillenburg in Nassau, Rheinbreitenbach, Goslar am Harz, Chessy bei Lyon (die Krystalle mit einer Haut von Malachit überzogen oder ganz in diesen umgewandelt), Cornwall, im Bannat, am Ural, in Peru, Chile u. s. f. Es wird auf Kupfer verschmolzen.

#### 79. Malachit.

Die klinorhombischen, nadelförmigen Krystalle sind äußerst selten; meist finden sich kugelförmige, nierenförmige und traubige Formen mit glatter Oberfläche und faseriger, selten dichter Structur, oder auch erdige Partien, Ueberzüge und Anflüge.

Der Malachit ist nach einer Richtung vollkommen spaltbar und in dünnen Blättchen etwas biegsam, er hat Flußspathhärte, Gewicht 3,8—4, auf Krystallflächen Glasglanz, auf Spaltungsflächen Perlmutter-, in faserigen Aggregaten Seidenglanz. Er ist schön smaragdgrün bis grasgrün gefärbt, oft wechseln lichtere und dunklere Farben in streifigen oder wolkigen Zeichnungen; der Strich ist lichter grün. Er besteht aus basischem wasserhaltigen kohlensauren Kupferoxyd mit 58 Proc. Kupfer; er ist leicht schmelzbar und reducirbar und löst sich unter Aufbrausen in Säuren.

Er kommt mit andern Kupfererzen auf Gängen und Lagern vor; Chessy bei Lyon (Pseudomorphosen nach Rothkupfererz und Kupferlasur), viele Orte am Ural und am Altai sind die berühmtesten Fundorte.

Man benutzt den Malachit nicht nur als Kupfererz, sondern auch, wegen seiner prachtvollen Farbenzeichnungen, zur Anfertigung von allerlei Schmuckgegenständen, Ornamenten und Geräthschaften. Die russischen Fabrikate der Art genossen einen großen Ruf.

#### 80. Kupferlasur.

Die monoklinischen Krystalle werden durch das Prisma, die Basis und die Pyramide gebildet, zu denen sich jedoch eine Zahl anderer untergeordneter Formen gesellen.

Die oft fast kubisch erscheinenden Krystalle der Regel zu ringförmig ausgebildeten, oder kugelförmigen und knolligen Gestalten ausgezeichnet sind die hohlen Augen der Krystalle außen und innen mit den prachtvollsten Farben gelbeidet sind. Seltener sind körnige oder erdige Anflüge. Die Individuen sind nur zum Theil in Malachit umgewandelt.

Härte 4, Gewicht 3,8, Glasglanz, lichter und lichtblauer Strich. Die Kupferlasur besteht aus denselben Stoffen wie der Malachit, in denselben Verhältnissen; sie enthält 56 Proc. Kupfer.

Sie kommt nicht gar zu häufig vor, erzeugt vor; am schönsten zu Chessy, am Ural zu Mosdawa im Bannat und in Cornwall, ferner von Saalfeld in Thüringen.

#### 81. Atacamit.

Die rhombischen Krystalle sind, sehr selten, des Aragonits, von Prisma, Brachypinakoid und Doma begrenzt und säulenförmig ausgebildet, wenig und stengelige Aggregate, nierenförmig oder loser Sand. Das Mineral hat Kalkspathhärte, Gewicht 3,7, Glasglanz, dunkelgrüne oder grünen Strich. Es besteht aus basischem Chlorkupfer (mit 59 Proc. Kupfer), ist leicht reducirbar und reducirbar, ertheilt der Flamme eine grüne Färbung und löst sich in Säuren.

An der Westküste Südamerikas, im nördlichen Chile kommt dieses Erz in Massen vor, daß es zur Verhüttung nach Chile verschifft werden kann. Als Seltenheit zu finden in Sachsen.

#### 82. Kupferglanz.

Der Kupferglanz krystallisiert in rhombischen, außerordentlich hexagonalartigen Tafeln, von Prisma und Brachypinakoid begrenzt, ferner noch Pyramide und Brachydoma gesellen. Die Basis stets nach einer Richtung gestreift, die hexagonalen Krystallen nicht vorkommen, sondern in derben, knolligen oder plattenförmigen Krystallen, seltener körniger Beschaffenheit.

Das Mineral hat nahezu Kalkspathhärte, ist etwas geschmeidig, wenig glänzend, zerbricht oft mit bläulichem Schimmer, und hat schwarzen Strich. Es ist Halbschwefelkupfer mit 79 Proc. Kupfer, hält es mitunter etwas Eisen oder Silber beigemengt. Es krystallisiert in isomorphen Silberkupferglanz, ein Mineral, aber.

Der Kupferglanz kommt auf Lagern und Gängen mit andern Kupfererzen zusammen vor; so zu Freiberg in Sachsen, in Mansfeld, zu Rammelsberg besonders schön zu Redruth in Cornwall und in Connecticut. Er ist ein sehr werthvolles Mineral.

#### 83. Kupferkies.

Tetragonal, mit spheonodrischer Hemikrystallform ist die Combination der beiden Krystallformen, welche in ihren Winkeln dem Octäeder entsprechen, die Flächen der zwei Gestalten sind stets in derben, knolligen oder plattenförmigen Krystallen, außerdem noch andere, verwickelte und Zwillinge. Der größte Theil des Kupferkieses findet sich in derben oder eingesprengten Krystallen.



4, 2, lebhafter Metallglanz, messinggelbe angelauten, und schwarzer Strich. Der ist aus Schwefelkupfer und Schwefelzinn kupfer; er gibt auf Kohle schweflige Säure nicht; er löst sich in Königswasser unter Dampfung.

Es ist das häufigste und somit auch wichtigste; von Fundorten mögen nur genannt werden, Mansfeld, Goslar und Lauterberg in Harz, Cornwall und Salun in Schweden.

#### 84. Buntkupferkies.

Die hexaëdrischen Krystalle sind äußerst seltener, findet sich fast nur eingeprengt oder in Massen; es ist milchig, hat Kalkspathhärte, messinggelbe bis lichtkupferrothe Farbe, die aber in den Bruchflächen zum Vorschein kommt, der Kupferkies äußerlich schnell blau und roth an Strichpulver ist schwarz. Der Buntkupferkies enthält Stoffe wie der Kupferkies, jedoch in variablen Verhältnissen, so daß der Kupfer 56 und 71 Proc. schwankt. Chemisch ist er Kupferkies. Er ist nicht zu häufig, meist in Gesellschaft mit dem Kupferkies, auf Erzlagerstätten und wird mit jenem erschmolzen.

#### 85. Fahlerz.

Das Fahlerz krystallisiert tetraëdrisch, und zwar ausgeprägt, so daß es von keinem Mineral an Mannichfaltigkeit tetraëdrischer Combinationen erreicht wird. Die in Taf. 1, Fig. 25, und 36 abgebildeten und schon früher beschriebenen einfachen und zusammengesetzten Formen gleichen dem Fahlerz an, und die Zahl der Combinationen könnte mit Leichtigkeit noch um ein Vielfaches vermehrt werden.

Das Fahlerz wächst zu Gruppen und Drusen, in Krystallen kommt das Fahlerz auch zerstreut vor. Es hat unebenem Bruch von sehr körniger Beschaffenheit, Kalkspathhärte, des specifischen Gewicht (4,4—5,6), es hat Metallglanz, stahlgraue bis eisen schwarze Farbe und schwarzen Strich, der bei manchen Arten in dunkel-erschmelzt.

Die chemische Zusammensetzung ist außerordentlich verschieden (daher auch die Differenzen im specifischen Gewicht, so daß man zunächst zwei Varietätengruppen unterscheiden muß, je nachdem die Fahlerze Schwefelkupfer oder Schwefelzinn (heller) enthalten. Diese Substanzen sind mit Halberz und andern Schwefelmetallen verbunden, besonders Eisen, Zinn, Quecksilber und Silber. Der Gehalt an Silber steigt in den Fahlerzen bis zu 10 Proc., in dem Silberfahlerz bis zu 32 Proc. Dies ist ein Silbererz, doch möge es wegen seiner Übereinstimmung mit den echten Fahlerzen nicht erwähnt werden. Die Fahlerze sind zerbrechlich und werden von Salpetersäure unter Dampfung von Schwefel und Antimonoxyd, resp. arsenig zerlegt.

Das Fahlerz kommt mit andern Kupfererzen (die nicht selten mit einer Haut von Kupferkies auf Gängen vor, so am Harz, in der Goslar, zu Saalfeld in Thüringen, Dillenberg, Schwab in Tirol, Herrngrund in Böhmen) zusammen, bei Freiberg und Wollach

Erzeugungproduct der schwefelkupferhaltigen Kiese.

2. Aufl. — Mineralogie.

ist der Kupfervitriol (wasserhaltiges schwefelsaures Kupferoxyd), der in ähnlicher Weise wie der Eisenvitriol und durch ihn verunreinigt vorkommt. Künstliche Krystalle sind trüben; sie zeigen die Taf. 2, Fig. 57 abgebildete Form.

#### 6. Familie. Blei.

Das Blei kommt nie gediegen, sondern nur in vererztem Zustande, in mannichfachen geschwefelten oder oxydischen Verbindungen vor.

#### 86. Bleiglanz.

Die Krystalle sind meist vorwaltend hexaëdrisch, seltener octaëdrisch, Formtypus. Die in Taf. 1, Fig. 5, 6, 13, 14, 15, 17—20 abgebildeten Gestalten gehören sämmtlich dem Bleiglanz an. Die Flächen sind oft rau oder gekörnt, die Krystalle nicht selten monoklin ausgebildet. Die Individuen sind meist in Gruppen angewachsen, seltener eingewachsen; es kommen traubige, nierenförmige, angelogene Partien, hauptsächlich aber grob- und feinkörnige bis dichte Aggregate vor. Die Spaltbarkeit ist sehr vollkommen hexaëdrisch; bei leichtem Hammerchlage schon zerpringen die Krystalle in lauter kleine Hexaëder; Härte  $2\frac{1}{2}$ , Gewicht 7,5, die Farbe ist bleigrau mit einem Stich ins Röthliche, der Strich schwarz, der Glanz sehr lebhaft metallisch.

Der Bleiglanz ist Schwefelblei mit 86 Proc. Blei, häufig enthält er eine kleine Menge Silber, die, wenn sie auch in der Regel nicht mehr als 0,1—0,2 Proc. beträgt, doch leicht und mit Gewinn abzuscheiden ist. Auf Kohle gibt er schweflige Säure und hinterläßt zuletzt ein geschmolzenes Metallkorn; in Säuren löslich unter Abscheidung von Schwefel.

Es ist ein auf Lagern und Gängen äußerst verbreitetes Mineral, das wichtigste Bleierz. Der freiberger, harzer, sächsischer und englische Bleibergbau beruht hauptsächlich auf seinem Vorkommen, den Hauptwerth erlangt er aber, wie gesagt, durch das in ihm enthaltene Silber.

Interessant ist das Knotenerz von Kommern in der Eifel, ein mit Bleiglanz imprägnirter Sandstein.

#### 87. Bournonit.

Die rhombischen Krystalle besitzen diatlasartigen Habitus und sind von Basis, Matro- und Brachypinacoid, Prisma, Matro- und Brachydoma begrenzt. Zwillinge und Biellinge (Zwillingssebene eine Prismaseite) sind sehr häufig; sonst derbe, körnige Massen, eingeprengt und angelogene Partien. Der Bruch ist muschelig, Härte  $2\frac{1}{2}$ , Gewicht 5,8; das Mineral hat starken Metallglanz, eisen schwarze Farbe und schwarzen Strich.

Der Bournonit besteht aus Schwefelantimon verbunden mit Schwefelblei und Halbschwefelkupfer; er enthält 42 Proc. Blei und 13 Proc. Kupfer. Beim Schmelzen auf Kohle gibt er einen gelben Bleibeschlag und mit Soda ein Kupferkorn; von Salpetersäure wird er zerlegt.

Auf den Erzgängen von Kapnit in Ungarn, Przibram in Böhmen, Freiberg, Neudorf und andern Orten am Harz. Der Bournonit kann auf Kupfer und Blei benutzt werden.

#### 88. Weißbleierz (Cerussit).

Das Weißbleierz krystallisiert rhombisch und ist dem Aragonit isomorph. Die Krystalle erscheinen theils als sechsseitige Pyramiden (Combination der Pyramide mit einem Brachydoma von nahezu gleichem Kantenwinkel), theils horizontal säulensförmig (Taf. 2, Fig. 36), in verwinkelten, von mehreren Brachydomen, dem Brachypinacoid, der Pyramide, mehreren Prismen und einem Matrodoma gebildeten Combinationen. Sehr häufig

Durchkreuzungszwillinge nach dem Aragonitgesetz. Der Cerussit kommt meist in einzeln oder gruppirt aufgewachsenen Krystallen, seltener in feinkörnigen bis erdigen Aggregaten (Bleierde) vor.

Das Mineral hat muscheligen Bruch, Kalkspathhärte, Gewicht 6,5, ist spröde, diamantglänzend, wasserhell, meist weiß, grau bis braun, sogar schwarz gefärbt (letzteres wohl infolge einer beginnenden Bildung von Schwefelblei). Der Cerussit besteht aus kohlensaurem Bleiorz mit 83 Proc. Bleiorz; er reducirt sich auf Kohle leicht zu metallischem Blei und löst sich in Salpetersäure unter Aufbrausen.

Häufig auf Erzgängen, so bei Mies und Przibram in Böhmen, bei Zellerfeld und Klausthal am Harz, Braubach in Nassau, Leadhills in Schottland.

Der Cerussit wird auf Blei verarbeitet.

### 89. Bitriolblei (Anglesit).

Die rhombischen Krystalle besitzen die Form des isomorphen Schwerpatz. Sie sind meist klein und flächenreich und sehr oft in Drusen von Bleiglanz aufgewachsen, der das Material zu ihrer Bildung geliefert hat.

Die prismatische und basische Spaltbarkeit ist nicht so vollkommen, wie die des Schwerpatz, der Bruch ist muschelig, die Härte 3, das Gewicht 6,3. Die stark diamantglänzenden Individuen sind oft vollständig durchsichtig und wasserhell, doch auch grau und braun gefärbt. Das Bitriolblei ist, analog dem Schwerpatz, schwefelsaures Bleiorz mit 73,5 Proc. Bleiorz, es ist schmelzbar, in Säuren schwer löslich.

Die schönsten Krystalle finden sich auf den Bleierzgängen von Iglesias und Monte Boni auf Sardinien, Johann von Zellerfeld am Harz, Leadhills in Schottland, Insel Anglesea, Pbönizville in Pennsylvanien.

### 90. Pyromorphit (Buntbleierz).

Der Pyromorphit ist dem Apatit isomorph, krystallisiert also hexagonal, hauptsächlich in säulenförmigen Krystallen von der Form Taf. 2, Fig. 10. Die Individuen erscheinen oft bauchig und sahförmig, sie sind zu Drusen vereinigt oder stengelig durcheinandergewachsen, auch gibt es nierenförmige, traubige und derbe Aggregate. Sie sind nicht selten mehr oder weniger vollständig in Bleiglanz pseudomorphosirt, während umgekehrt auch Pseudomorphosen von Pyromorphit nach Bleiglanz bekannt sind.

Das Mineral hat kleinsmuscheligen Bruch, Flußspathhärte, Gewicht 6,9—7,0, Fettglanz und grüne oder braune, seltener gelbe Farbe.

Der Pyromorphit besteht aus phosphorsaurem Bleiorz und Chlorblei, wobei oft etwas Phosphorsäure durch Arsenäure, ein Theil des Bleiorz durch Kalkerde vertreten wird. Er ist leicht schmelzbar und in Salpetersäure löslich.

Die schönsten, oft bouquetförmig gruppirten Krystalle von Braubach am Rhein; sonst von Freiberg und Schopau in Sachsen, von Zellerfeld, Przibram, überhaupt von Bleierzgängen, besonders in obern Teufen.

Der Mimetesit ist ein dem Pyromorphit isomorphes Bleierz von honiggelber Farbe, welches an Stelle der Phosphorsäure Arsenäure enthält. Johanngeorgensstadt im Erzgebirge.

## 7. Familie. Silber.

### 91. Gebiegen Silber.

Das Silber krystallisiert tesseral in der Form des Hexaeders oder des Hexaeders mit Octaeder; die Krystalle sind nie groß, oft monströs und zu allerlei treppenförmigen, baumartigen oder gestriekten Gestalten (Taf. 3,

Fig. 10) gruppirt. Sehr häufig auch in der Form von Nadeln (Taf. 3, Fig. 11), meist in faserförmig, blech- oder plattenförmig, meist eingeprengt auf. Das Silber ist ein weiches Metall, haligen Bruch, es ist unzerbrechlich, besitzt Gyps- bis Kalkspathhärte, Metallglanz und silberweiße Farbe. Es ist nicht selten angelautet. Es enthält kleine Stangen, am häufigsten kleine Nadeln, es ist leicht schmelzbar und in Salpetersäure löslich.

Die schönsten Krystalle kommen an der Kongberg in Norwegen vor; auch in den Gängen von Freiberg, Schneeberg, in Mexico, Chile, Sibirien und den nordwestlichen Staaten am Lake Superior mit Kupfer innig verbunden.

Das guldliche Silber von Kongsberg ist sehr schön, enthält kleine Nadeln.

### 92. Amalgam.

Die tesseralen Krystalle sind meist in der Form von Nadeln, sie bilden und zeigen sehr vielfältige Combinationen, oft in der Form von Octaeder; auch derb und angelautet. Es besitzt Kalkspathhärte, Gewicht 13,7—14,1, silberweiße Farbe. Es besteht aus Silber und Quecksilber in wechselnden Proportionen, jedoch der Silbergehalt schwankt zwischen 26 und 63 Proc. schwach. Beim Erhitzen entweichen die Quecksilberdämpfe und hinterläßt ein Silber, welches in Salpetersäure leicht auflöslich ist.

Das Amalgam kommt auf Leadhills bei Moschellandsberg in Rheinbairern vor (s. Taf. 3) und bei Almaden in Spanien vor.

### 93. Silberglanz (Glasglanz).

Den tesseralen Combinationen sieht es ähnlich, es bildet Octaeder, Rhombendodekaeder oder in der Form von Nadeln; sie sind meist monströs, treppenförmig ausgebildet, zu Gruppen und Drusen verbunden und aufgewachsen; ferner kommt derbe, strichförmig, zählig, drabt- oder haarförmig, derben Massen vor. Er besitzt basischen Bruch, Geschmeidigkeit, Gyps- bis Kalkspathhärte, Metallglanz, schwärzlich bleigraue Farbe.

Der Silberglanz ist Schwefelsilber mit 80 Proc. Silber, er ist auf Kohle schmelzbar und hinterläßt ein Silber, welches in Salpetersäure unter Schwefelabgabe löslich ist.

Er ist das wichtigste Silbererz und tritt in den Erzgängen von Freiberg, Schneeberg, Klausthal im Erzgebirge, von Schemnitz in der Kongberg vor.

### 94. Melanglanz (Sprödglanz).

Die rhombischen Krystalle bilden, sehr selten in der Form von Nadeln, meist in der Form von Tafeln, die derb oder gruppirt aufgewachsen; auch treppenförmig und angelautet vor. Der Melanglanz hat unebenen Bruch, Härte 2½, schwarze Farbe und Strich. Er besteht aus Silber und Schwefelantimon mit 68 Proc. Silber, er ist leicht schmelzbar und in Salpetersäure löslich.

Er kommt an denselben Orten vor wie der Silberglanz.

### 95. Eugenglanz.

Die hexagonalen Krystalle erscheinen in der Form von dünn-tafelartig ausgebildeten Combinationen und Pyramiden, wobei die erstere in der Form von Nadeln gestreift ist. Das im allgemeinen

it auch verb und eingesprengt vor. Es ist Glasbärte, Gewicht 6,1 und eisen schwarze Der Eugenglanz besteht aus Schwefelsilber veselantimon oder Schwefelarsen; das meist rocent Kupfer in die Mischung eintreten, so der Silbergehalt zwischen 64 und 72 Proc. Er ist chemisch wie Melanglanz, in dessen Gesellschaft meist vorkommt.

. Rothgültigerz (Silberblende).

Rothgültigerz krystallisiert rhomboedrisch; die en zeigen häufig die Combination von Rhomboeder Deutoprisma (Taf. 2, Fig. 18), zu welchen das trigonal ausgebildete Protoprisma alenöder (Taf. 2, Fig. 14) treten. Die Kry- sten säulenförmigen oder stäbenförmigen Ha- rer manchmal in das Nadel förmige übergeht, einzeln oder büschelförmig gruppiert, aufge- ; häufig derbe Massen, eingesprengte oder an- e Partien. Die rhomboedrische Spaltbarkeit ist vollkommen, die Härte 2, das Gewicht 8, der Glanz lebhaft diamantartig, zum Theil allische übergehend. Der chemischen Zusammen- nach hat man zwei Varietäten zu unterscheiden, alle oder antimonische Rothgültigerz (Schwefel- nd Schwefelantimon mit 60 Proc. Silber) von eher bis fast bleigrauer Farbe, kirschrothem und geringer Durchsichtigkeit, und das lichte enische Rothgültigerz (Schwefelsilber und Schwefel- mit 65 Proc. Silber) mit cochenilleroth Farbe, rothem Strich und größerer Durchsichtigkeit. sind leicht schmelzbar und in Salpetersäure zer- ; reichen Silbererze finden sich an den beim glanz ausgeführten Orten.

#### 97. Chlor Silber.

sehr kleinen tesseralen und zwar heraderischen le sind sehr selten; meist trypen förmig gruppiert, r derbe oder eingesprengte Partien. Das Chlor- hat muscheligen Bruch; es ist geschmeidig, sehr hat das Gewicht 5,6, geringen Glanz und grau- i Farbe. Es enthält 65 Proc. Silber, ist leicht bar, in Säuren nicht, dagegen in Ammoniak leicht Chlor Silber findet sich in obern Teufen auf den ger, johannegeorgensstädter und besonders den michen Erzgängen.

#### 8. Familie. Gold.

##### 98. Gediogene Gold.

t tesseralen Krystalle zeigen am häufigsten das ter, herader, Rhombendodekaeder, ein würfel- des Mositetraeder und andere Formen, sie sind klein und infolge von Verzerrungen und Flächen- rungen unendlich ausgebildet; am häufigsten t das Gold gestrich, haar-, zahn-, baumförmig, artig, in Flecken und Platten, in mikroskopischen agnationen auf secundären Lagerstätten, in Flit- kornern und Klumpen vor. Der größte bis jetzt nt gewordene Goldklumpen (in Australien ge- n) hatte ein Gewicht von 184 Pfund, also einen r von ca. 83000 Thalern. Das Gold hat haligen i, Gips- bis Kalkspathhärte, Gewicht 19,3—19,4, r geschmeidig und dehnbar und von goldgelber nehmung gelber Farbe. Es ist fast nie ganz rein, enthält es einige Procent Silber, was auch das ge Gewicht und die lichte Farbe vieler Varietäten t. Es ist schmelzbar und löst sich in Salpetersäure.

Das Gold findet sich zunächst auf Gängen, Lagern oder in Form von Imprägnationszonen am Ural, in Ungarn, Siebenbürgen, bei Salzburg, in Californien, Mexico, Peru und Brasilien, hauptsächlich aber als Waschgold auf secundärer Lagerstätte in Sandablagerungen von Flußthälern, so am Ural, in Californien, in Australien, auf Borneo, an der afrikanischen Küste u. s. w. Auch der Sand des Rheins und anderer deutscher Flüsse ist, wenn auch nur in sehr geringem Grade, goldhaltig.

Da das Gold fast nur metallisch vorkommt, so wird natürlich auch der größte Theil desselben aus dem gediegenen Metall gewonnen.

Das Gold kommt weder mit Sauerstoff, noch mit Schwefel verbunden in der Natur vor, dagegen bildet es, an Tellur, einen seltenen, die Rolle des Schwefels spielenden Stoff, gebunden, zwei Mineralien, das Schriftery oder Weistellur, eine Verbindung von Tellurgold mit Tellur Silber, und den Nagagait oder Plattertellur (Tellurgold mit Tellurblei), welche beide zu Nagag und Offenbanya in Siebenbürgen gefunden werden.

#### 9. Familie. Platin.

##### 99. Gediogene Platin.

Das Platin krystallisiert in Heradern, doch findet man es meist nur in losen, viel seltener eingewachsenen Körnern und Klumpen. Es hat haligen Bruch, Härte 4—5, Gewicht 17—18 (im gehämmerten Zustande über 21), es ist geschmeidig und von lichtgrauer Farbe. Es enthält fast stets mehrere Procent Eisen (im Eisenplatin bis zu 19 Proc.), ist äußerst strengflüssig und in Salpetersäure auflöslich.

Das Platin findet sich auf secundärer Lagerstätte im Sande der uralischen Flußthäler (dort auch im Serpentin eingewachsen), in Nengranada, Brasilien und Californien.

Das Platinmetall, welches nur aus dem gediegenen Platin gewonnen wird, ist einer seiner Strengflüssigkeit und Unveränderlichkeit wegen unersetzbares Material für viele chemische Geräthschaften.

#### 10. Familie. Quecksilber.

##### 100. Gediogene Quecksilber.

Das Quecksilber ist in gewöhnlicher Temperatur flüchtig; es erstarrt erst bei  $-40^{\circ}$  C. und krystallisiert dann tesseral. Es hat das Gewicht 13,5, zimweisse Farbe und starken Metallglanz. Vor dem Rothroßr verdampt es vollständig.

Es findet sich in Drusenräumen von Gängen oder in Gesteinshöhlungen zu Joria in Krain, Moschellandsberg in der Pfalz, Almaden in Spanien, Realmaden in Californien.

#### 101. Zinnober.

Die rhomboedrischen Krystalle bilden meist eine tafelförmig ausgebildete Combination von Basis, Prisma und mehreren Rhomboedern derselben Richtung. Sie sind zu Gruppen vereinigt und im allgemeinen selten; viel häufiger kommt das Mineral verb, eingesprengt und angelogen vor. Es ist deutlich prismatisch spaltbar, hat Gipsbärte, Gewicht 8,1, Diamantglanz, cochenillerothe Farbe und scharlachrothen Strich. Es besteht aus Schwefelquecksilber mit 86 Proc. Quecksilber, ist leicht sublimirbar und in Salpetersäure auflöslich.

Es kommt an denselben Orten, aber in viel größerer Menge vor, als das gediegene Quecksilber, und liefert das Hauptmaterial zur Darstellung dieses Metalls. Auch wird der Zinnober direct als Farbe angewendet.



## 11. Familie. Zinn.

## 102. Zinnerz.

Das Zinnerz krystallisiert tetragonal; eine sehr häufige Combination ist die von Pyramide und Prisma (Taf. 1, Fig. 53), oft mit Deuteroypyramide und Deuteroprisma. Nicht selten treten auch ditetragonale Pyramiden auf. Sehr frequent sind Zwillinge nach dem Gesetz: Drehungsachse senkrecht auf einer Fläche der Deuteroypyramide (Taf. 1, Fig. 56). Die kolumnenförmigen oder pyramidalen Krystalle sind einzeln oder gruppirt aufgewachsen; ferner finden sich derbe körnige oder feinfaserige Aggregate (Holzzinn) oder eingesprengte Körner (oft mikroskopisch klein), stumpfedicke Stücken und lose Geschiebe. Interessant sind die Pseudomorphosen nach Orthoklas.

Die Spaltbarkeit nach beiden Prismen ist unvollkommen, Härte  $6\frac{1}{2}$ , das Gewicht 6,9; der Glanz ist diamant- oder fettartig, die Farbe grau, braun bis schwarz, der Strich weiß. Das Zinnerz ist reines Zinnoryd (oder Zinnsäure) mit 78 Proc. Zinn; es ist unschmelzbar und in Säuren unveränderlich.

In Krystallen und Imprägnationen von Altenberg, Zinnwald, Graupen, Geyer im Erzgebirge, Cornwall, Pittaranda in Finland, Bretagne; in Geschieben im Seifengebirge des Erzgebirgs und der Insel Banca, Billiton u. im südlichen Archipel.

Da das Zinn nur in dieser Form in größerer Menge vorkommt, so ist das Zinnerz für die Gewinnung des Metalls von größter Wichtigkeit.

## 12. Familie. Molybdän.

## 103. Molybdänglanz.

Das Mineral kommt in sechsseitigen, tafelförmigen Krystallen mit sehr vollkommener basischer Spaltbarkeit oder in schaligen und blätterigen Aggregaten derb oder eingesprengt vor. Es ist äußerst weich, in dünnen Blättchen biegsam, fettig anzufühlen, besitzt das Gewicht 4,7, bleigraue Farbe und starken Metallglanz; der Strich ist auf Papier grau, auf Porzellan grün. Der Molybdänglanz ist Schwefelmolybdän mit 59 Proc. Molybdän, er ist unschmelzbar, in Salpetersäure löslich. Er kommt in Begleitung des Zinnerzes an den oben aufgeführten Orten vor und kann zur Bereitung einer blauen Farbe verwendet werden.

## 13. Familie. Titan.

## 104. Rutil.

Der Rutil ist mit dem Zinnerz isomorph, also tetragonal. Die Krystalle sind meist nicht so schön wie bei jenem Mineral und vorwiegend in Form von knieförmig gebogenen Zwillingen und Biellingen ausgebildet. Die Spaltbarkeit nach Proto- und Deuteroprisma dagegen ist hier vollkommen.

Die Prismenflächen sind in der Regel stark gestreift, die Krystalle aufgewachsen oder laugsäulenförmig bis haarförmig in Quarz und Bergkrystall eingewachsen; individualisierte Massen, lose Geschiebe und Körner. Der Rutil hat Feldspathhärte, Gewicht 4,1, hyacinthrothe, gelb- oder rothbraune bis schwarze Farbe und metallisirenden Diamantglanz. Er besteht, analog dem Zinnerz, aus Titansäure, ist unschmelzbar und in Säuren unveränderlich.

Vom St.-Gothard, Saualpe in Kärnten, Pittschthal in Tirol, Freiberg in Sachsen, Graves Mount in Georgia u. s. w.

Der Rutil liefert eine, in der Porzellanmalerei angewendete gelbbraune Farbe.

Die Titansäure kommt noch in manchen andern seltenen Mineralien vor, z. B. in Zinnstein. Diese Mineralien sind der Natur nach Pyramiden von schwarzer Farbe, z. B. in Zinnstein (tafelartige rhombische Krystalle von Durchscheinheit).

## 105. Titanit (Eck).

Die monoklinischen Krystalle des Titanit sind diejenigen des lichtgrünen Eckers. Die Combination von Prisma, Basis und Pyramide; sie erscheinen kolumnenförmig und vorherrschen des flachern Orthorhombischen. Die Combinationen des gelben und braunen Titanit sind von der Basis, dem steileren Prisma, groß ausgehenden, zwischen jenen vordern Hemipyramide begrenzt, gleich vertical zu stehende Flächen, die doch scheinbar säulenförmig ausgebildet sind. Die Krystalle (häufig Durchkreuzungen) oder eingewachsen, die des Titanit auch finden sich schälige Aggregate. Die Mohshärte, Gewicht 3,5 und Glanz ist oft durchsichtig.

Der Titanit besteht aus titanzinniger Kalkerde, er ist an den Ranten durch von Schwefelsäure zerlegt. Schöne St.-Gothard und andern Orten. Die kleinen Titanite sind besonders in Pionolith sehr verbreitet. Schöne mitunter als Schmuckstein geschliffen.

## 14. Familie. Wolfram.

## 106. Wolframit.

Die rhombischen Krystalle zeigen ein Malakolithoides, und mehrerer Malakolith und Pyramiden und kolumnen Habitus, da die letztern nur mit der Hälfte ihrer Flächen häufig Zwillingstrystalle, welche natürlichen Flächenpaar verwachsen sind. Die säulenförmigen Krystalle sind eingewachsen, schälige und stengelige Aggregate. In nach dem Brachypinakoid, welches nicht vorkommt, vollkommen spaltbar. Gewicht 7,5, metallartigen Diamantglanz und braunen Strich.

Der Wolframit besteht aus wolframsäurehaltigem Manganorydul und Manganorydul, er ist unschmelzbar und in Salzsäure, unter Erwärmen, in gelben Pulver (Wolframsäure) zerlegt. Er ist regelmäßiger Begleiter des Zinnerzes in Lagerstätten von Altenberg, Zinnwald, St.-Gothard und andern Orten des Erzgebirgs.

Man verwendet den Wolframit zur Bereitung von Wolframsäure.

## 107. Scheelit.

Der Scheelit krystallisiert tetragonal, häufig in Pyramiden oder in Combination mit einer steilen Hemipyramide mit einer steilen Basis. Die Krystalle sind einzeln oder gruppirt aufgewachsen; selten derb vor. Es ist nach einer Richtung deutlich spaltbar, es hat Flußspathhärte, Gewicht 6, fettglanz und ist nach dem Erhitzen gefärbt. Der Scheelit besteht aus Kalkerde, ist schwer schmelzbar und in Salpetersäure zerlegt. Auch dieses Mineral

den erzgebirgischen Zinnerzlagerstätten. Man  
zur Darstellung der Wolframsäure benutzt,  
gelbe Farbe Verwendung findet.

## 15. Familie. Wismut.

## 108. Gediegen Wismut.

Wismut krystallisiert hexagonal-rhomboedrisch,  
Kristalle selten, meist verzerrt und zu baum-  
oder gestrichelten Aggregaten vereinigt. Au-  
kommt das Mineral derb vor.

Wismut ist rhomboedrisch und basisch spaltbar,  
und weich, hat das Gewicht 9,7, röthlich  
e Farbe und lebhaften Metallglanz; nicht  
es bunt angelauten. Es ist sehr leicht schmelz-  
bar. Kohle gibt es einen citrongelben Beschlag.  
Setzt sich, mit Kobalt- und Nidelerzen vergesell-  
auf den Erzgängen des obern Erzgebirgs  
für die Darstellung leichtflüssiger Legirungen,  
Arzneimittel und der Schminke sehr gesuchtes  
Fast alles Wismut wird aus dem gediegenen  
erwonnen.

Einziges Wismuterz, welches in einiger Menge  
t, ist

## 109. Wismutglanz.

krystallisiert in rhombischen, langäulen- bis nadel-  
förmigen Kristallen, deren Flächen stark gestreift er-  
scheint, kommt er noch in faserigen oder körnigen  
Formen vor. Er ist nach einer Richtung vollkommen  
spaltbar, hat Gips Härte, Gewicht 6,6, lichtgraue me-  
tallische Farbe und ist gelb angelauten. Er besteht aus  
Wismut, mit 81 Proc. Wismut, ist auf Kohle  
schmelzbar, wobei er einen gelben Beschlag  
hinterläßt und löst sich unter Schwefelab-  
bau in Salzsäure.

Er mischt mit dem gediegenen Wismut im obern  
Gebirge vor.

## 16. Familie. Antimon.

## 110. Gediegen Antimon.

Antimonform und Spaltbarkeit sind der des Wismuts  
ähnlich, findet sich das Mineral eingesprengt oder  
in Massen von blätteriger oder feinkörniger  
Form vor. Es besitzt Kalkspathhärte, Gewicht 6,7, starken  
metallischen Glanz und zinnweiße Farbe.

Antimon ist sehr leicht schmelzbar und flüchtig,  
wird es zwar oxydirt, aber nicht gelöst.  
Nur in der Dauphiné, in neuerer Zeit South-  
Carolina sind Hauptfundorte.

## 111. Antimonglanz.

Die häufigste Form des rhombischen Minerals  
ist die Combination von Prisma, Makropinakoid und  
Basis (Taf. 2, Fig. 31); die Kristalle sind stark  
gestreift, langäulen- oder nadelförmig ausge-  
wachsen und meist zu büschelartigen Gruppen vereinigt.  
Die Spaltungsflächen sind horizontal gestreift,  
die Spaltungsflächen sind horizontal gestreift.  
Mineral hat Gips Härte, Gewicht 4,7, bleigraue  
Farbe und schwarzen Strich. Es besteht aus Schwefel-  
antimon mit 72 Antimon, ist schon an der Lichtflamme  
schmelzbar und wird von Salzsäure gelöst.

Im Erzgebirge von Freiberg, Goldkronach im  
Thüringischen, Neudorf am Harz u. s. f.

Antimon, welches meist aus diesem Mineral  
erhalten wird, dient zur Fabrication des Antimon-  
schmelzes und Apparatmetall und zu medicinischen  
Zwecken.

## 17. Familie. Arsen.

## 112. Gediegen Arsen.

Das Arsen ist krystallographisch dem Antimon und  
Wismut sehr verwandt, doch gehören Kristalle zu den  
größten Seltenheiten, in der Regel findet sich das Mi-  
neral nur in feinkörnigen oder dichten, schaligen Ag-  
gregaten von nierenförmiger Oberfläche (Scherbentol-  
bali). Das Arsen ist spröde, besitzt Kalkspathhärte, Ge-  
wicht 5,7 und licht bleigraue Farbe, die aber nur auf  
ganz frischem Bruch sichtbar ist, weil das Mineral sehr  
rasch schwärzlich anläuft. Es ist vor dem Löthrobr  
flüchtig und entwidelt dabei den charakteristischen,  
knoblauchartigen Geruch. — Besonders auf den Erz-  
gängen des Erzgebirgs.

## 113. Realgar.

Das Realgar krystallisiert in monoklinischen, meist  
sehr flächenreichen Combinationen, von denen eine  
auf Taf. 2 Fig. 48 abgebildet ist. Die Kristalle sind  
säulenförmig ausgebildet, einzeln oder gruppirte auf-  
gewachsen, auch kommt das Mineral eingesprengt oder  
in derben Massen vor. Das Realgar ist nach zwei  
Richtungen deutlich spaltbar, sehr weich und mild, hat  
das Gewicht 3,5, diamantartigen Fettglanz, morgen-  
rothe Farbe und pomeranzgelben Strich. Es besteht  
aus Schwefelarsen mit 70 Proc. Arsen, ist leicht schmelz-  
bar und flüchtig und wird von Salpetersäure zerlegt.

Schöne krystallisierte Varietäten von Kapnik in Un-  
garn, Felsöbanya in Siebenbürgen und vom Winnen-  
thal in Wallis.

Das rothe Schwefelarsen wird künstlich in großen  
Mengen dargestellt und findet zu mancherlei technischen  
Zwecken Verwendung.

## 114. Auripigment.

Die rhombischen, kurzäulenförmigen Kristalle sind  
selten, meist tritt das Mineral in blätterigen, oder  
breitstengeligem, oder schuppigen Aggregaten von trau-  
biger Oberfläche auf. Es ist nach einer Richtung sehr  
vollkommen spaltbar, die Spaltungsflächen sind gestreift  
und stark perlmutterglänzend, in dünnen Blättchen ist  
das Auripigment biegsam. Es ist sehr weich, hat das  
Gewicht 3,5, citrongelbe Farbe und Strich. Es besteht  
wie das Realgar aus Schwefelarsen, enthält aber nur  
61 Proc. Arsen; es gibt dieselben Reactionen, wie jenes  
Mineral, mit dem es auch am häufigsten vorkommt.

Das Auripigment wird als Malerfarbe benutzt, aber  
zu diesem Zwecke meist künstlich dargestellt.

## E. Edelsteinkunde.

(Tafel 4.)

Wenn auch schon weiter oben die Edelsteine ihren  
mineralogischen Eigenschaften nach behandelt worden  
sind, so läßt es doch das vielseitige Interesse, welches  
gerade ihnen vor allen andern unorganischen Körpern  
gewidmet wird, der hohe Werth, den man ihnen bei-  
legt, die vielfache Benützung, die sie finden, gerecht-  
fertigt erscheinen, dieselben hier nochmals von einem  
andern Gesichtspunkte aus zu betrachten.

Da ist zunächst zu bemerken, daß im gewöhnlichen  
Leben der Begriff Edelstein viel weiter gefaßt wird,  
als es von Seiten des Mineralogen geschieht, daß  
man den eigentlichen Edelsteinen oder Juwelen, welche  
die oben angeführten charakteristischen Eigenschaften,  
hohe Härte, Durchsichtigkeit, Farblosigkeit oder schöne  
Färbungen und Seltenheit des Vorkommens, in be-  
sonders hohem Grade beizien, noch eine große Menge  
anderer Mineralien anreicht, welche jene Merkmale in

geringerem Maße besitzen und wegen der größern Massenhaftigkeit ihres Vorkommens erst durch die kunstvolle Art der Verarbeitung oder wol auch durch die Mode einen höhern Werth erlangen. Man nennt diese Halbedelsteine, doch ist ein vollkommen scharfer Unterschied zwischen ihnen und den eigentlichen Edelsteinen kaum zu ziehen, und noch viel weniger läßt sich eine bestimmte Scala des Werthes aufstellen, da dieser wesentlich von der Schönheit des einzelnen Exemplars bedingt wird.

Die schätzbaren Eigenschaften der Edelsteine treten am rohen Stück nur in äußerst seltenen Fällen so stark hervor, daß sie sofort verwendet werden könnten, meist bedarf es erst einer besondern Verarbeitung, des Schleifens oder Schneidens, um die Edelsteine zu würdigen Gegenständen des Schmucks umzubilden.

Zum Alterthum und bis weit in das Mittelalter hinein, war diese Kunst weniger gepflegt und besonders fehlte der Diamant, seiner außerordentlichen Härte wegen, allen Bearbeitungsversuchen unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen; man begnügte sich damals mit dem Poliren der äußern Flächen und faßte die Steine so, daß sie an Schürre gereicht getragen wurden. Erst gegen den Ausgang des 13. und im 14. Jahrhundert bildeten sich einzelne Steinschneidersünfte und in der Mitte des 15. Säculums entdeckte Ludwig von Berguen aus Brügge die Kunst, die Diamanten mit ihrem eigenen Pulver zu schleifen. Diese Entdeckung war epochemachend, denn nur mit Hilfe dieses Mittels war und ist es möglich, auch dem härtesten Stein eine beliebige Form, die schönste Politur zu geben, und seit jener Zeit entwickelte sich die Kunst der Diamant- und Steinschleiferei, die besonders in Amsterdam und Paris betrieben wird, zu ihrer jetzigen Höhe und Vollkommenheit.

Der Diamantstaub oder Diamantbort, dessen man zum Schleifen bedarf, wird durch Zerstoßen von schlechten Steinen oder Abfällen in einem kleinen Stahlmörser dargestellt, oder benutzt man den beim Schleifen selbst fallenden Staub, der zu diesem Zwecke stets sorgfältig gesammelt wird, natürlich immer wieder.

Die ganze Arbeit des Diamantschleifens zerfällt in drei Abtheilungen: das Spalten, Schneiden und eigentliche Schleifen oder Poliren.

Das Spalten wird deshalb vorgenommen, um theils die spätere Form des Steins schon im voraus allgemein zu bestimmen, theils schadhafte Stellen ohne große Mühe wegzubringen. Man profitirt von der vollkommenen octaëdrischen Spaltbarkeit des Diamants (Fig. 29), doch erfordert die Bestimmung der Richtung, in welcher die Spaltung vorgenommen werden soll, besonders dann, wenn deutliche Krystallflächen fehlen, große Uebung und Geschicklichkeit. Zum Zwecke des Spaltens wird die abzuspaltende Stelle durch Einschneiden mit einem Diamantsplitter vorgezeichnet, der Stein dann in einen Rittloß so weit eingekittet, daß nur jener Theil hervorragt, und dieser darauf durch einen kurzen kräftigen Schlag auf einen feinen, in den Einschnitt gesetzten Meißel abgeschlagen.

Durch das Schneiden werden, wenn auch nicht alle, so doch die wichtigsten Flächen hervorgebracht, und dadurch den Steinen ihre specielle Form ertheilt. Es werden in der Regel zwei Steine gleichzeitig durch Aneinanderreiben über der Schneidebüchse (Fig. 30) bearbeitet. Letztere ist ein oben offenes Kästchen von starkem Holz, welches mit einem Einsatz von Messingblech versehen ist. Dieser ist nicht ganz so tief, als die Schneidebüchse und in seinem Boden sein durchlöcher, sodaß der entstehende Diamantstaub, ohne verunreinigt zu werden, in dem Zwischenraum zwischen dem Einsatz und dem Kästchen aufgesammelt werden

kann. Die beiden Steine werden in zwei Rittlöse, mit Hilfe von Kitt oder Schnellloß eingekittet, was nur besonderer Vorsicht gebieten muß, damit man auch wirklich die Flächen erhält, die man hervorgebracht zu sehen wünscht. Die Rittlöse werden dann gegen zwei verticale Stahlstifte gestemmt, welche an den Langseiten des Kastens angebracht sind, und dann so lange kräftig in rotirender Bewegung gegeneinander gerieben, bis die hervorzubringenden Flächen eben und von gehöriger Größe erscheinen. Die Diamanten werden dann aus den Rittlösen herausgenommen, in andere Lage wieder eingekittet und damit so lange fortgeführt, bis alle Flächen vorhanden sind. Diese erscheinen aber noch matt und ohne Glanz, und um diesen hervorzurufen, nimmt man endlich noch die Arbeit des Polirens vor. Diese erfolgt auf horizontalen Drehscheiben (Fig. 31) von weichen Stahl, welche mit Hilfe der Maschinenkraft, seltener durch Menschenhände in sehr rasche Rotation versetzt werden können. Den Drehscheiben ertheilt man vorher durch Streichen mit Bismuthstein eine etwas raube, gelebte Oberfläche, dann der Diamantstaub, der mit seinem Oel daraufgeschrieben wird, besser haftet und von diesem immerhin leichter Material nichts verloren geht. Die Steine werden in passender Stellung in der sog. Doppe, einer leichtmigen Messingbüchse mit Schlagloß, festgekittet (Fig. 2) und diese beim Schleifen fest gegen die Scheibe angedrückt. Auf diese Weise werden nicht nur die größten, durch das Schneiden schon erhaltenen Flächen polirt, sondern auch die kleinern, noch fehlenden Facetten angeglänzt.

Die Schliffformen der Diamanten und mit ihnen der übrigen Edelsteine sind verschieden und richten theils nach der ursprünglichen Gestalt des Steins, die für die Wahl der Schliffform schon deshalb nur bis zu einem gewissen Grade maßgebend sein wird, weil man so wenig wie möglich Material durch den Schnitt einzubüßen wünscht, ferner nach der Schönheit der Farbe und Durchsichtigkeit des Steins, und endlich nach dem Geldeaufwand, den man an das Schleifen wenden will.

An den meisten geschliffenen Steinen unterscheidet man den Obertheil oder Pavillon, den Untertheil oder Gulaße und die Rundiste oder den Gürtel, der beiderseits und gleichzeitig derjenige Theil des Steins, an welchem er in der Fassung befestigt wird. Manche Formen geben der Untertheil ab.

Von größter Wichtigkeit ist die Dicke der Steine und das Höhenverhältniß zwischen Obertheil und Untertheil, weil darauf die größere oder geringere Durchsichtigkeit und Lichtbrechung, der Farbenglanz des fertigen Stücks beruht. Jenes Höhenverhältniß ist für wasserhelle und schön gefärbte, durchsichtige Steine am fest bestimmten und zwar derart, daß das Obertheil ein Drittel, das Untertheil zwei Drittel der Steindicke einnimmt.

Die wesentlichsten Schnittformen sind die folgenden:

1) Der Brillantschnitt, der werthvollste und schönste von allen, weil er am mächtigsten bezweckt ist, den größten Materialverlust herbeizuführen, und weil er die glänzendsten Eigenschaften der Edelsteine am meisten hervortreten läßt (Fig. 16–19). Die reinste und vollkommenste Brillantform hat der dreifache Brillant (Fig. 16 a, b, c; a. Ansicht von oben, b. Ansicht von unten, c. Seitenansicht), dessen Obertheil von einer horizontalen Fläche und drei- und vierseitigen Facetten, dessen Untertheil von einer kleinen horizontalen Fläche und zwei Reihen vier- und fünfseitiger Facetten begrenzt ist. Andere Formen des Brillantschnitts, die man besonders bei unregelmäßig



gestaltung des rohen Steins wählt, sind der ovale (Fig. 17 a, b), der birnenförmige (Fig. 18 a, b) und der sternförmige Schnitt (Fig. 19).

2) Der Rosettenschnitt. Den Rosetten fehlt der Untertheil, sie sind nach unten von einer geraden Fläche begrenzt, während der Obertheil kegelförmige Gestalt hat, und von mehreren Reihen regelmäßiger dreieckiger Flächen gebildet wird (Fig. 20 a, b).

3) Der Tafelschnitt (Fig. 21 a, b) wird bei Steinen in geringer Tiefe oder bei abgeplatteten Stücken, im Allgemeinen bei minder werthvollen Exemplaren angewendet.

4) Der Treppenschnitt (Fig. 22 u. 23). Der Obertheil erhält eine große horizontale Fläche, ein hohes oder niedriges, und zwei Reihen vierseitiger Facetten, der Untertheil, ebenfalls von vierseitigen Flächen begrenzt, endigt in eine Spitze.

5) Der Schnitt mit doppelten Facetten (Fig. 24 a, b) ist gewissermaßen eine Combination des brillanten und Treppenschnitts. Das Obertheil wird mit der Tafel und zwei Reihen dreieckiger, abwechselnd gesetzter Facetten, das Untertheil mit vielen Reihen vierseitiger Facetten ausgestattet.

6) Der müßige Schnitt endlich kommt nur selten in der wirklichen Schmudsteins vor; der Stein wird oben erwölbt und unten horizontal geschliffen (Fig. 25 a, b), die Wölbung wol auch mit mehreren Reihen von Facetten versehen (Fig. 26).

Das Schleifen der übrigen Edelsteine erfolgt in ähnlicher Weise wie das des Diamants, nur mit dem Unterschied, daß man zuerst mit einem möglichst harten Schleifmittel (Diamantbort oder Smirgel) den Stein vollständig fertig schneidet, und mit einem Polirmittel, welches seine Härte möglichst wenig übertrifft, glatt polirt, durch welche Theilung der Arbeit man außerordentlich an Zeit erspart.

Die Grobsteinschleiferei oder die Bearbeitung von Steinen zum Zwecke der Anfertigung größerer Geräthschaften, erfordert natürlich andere Hilfsmittel; in die Stelle der kleinen metallenen Schleifschleiben treten große Mühlsteine, welche aus einem sehr festen unmoogen Sandstein angefertigt, an einer horizontalen Welle angebracht und durch darauf fließendes Wasser stets feucht gehalten werden. Die Arbeiter legen auf einem ausgehöhlten langen Holzscheitel fast horizontal vor der Schleifmaschine, die Füße gegen Holzseile gestützt, und drücken die Steine entweder mit der bloßen Hand oder mit Holzstücken sehr kräftig gegen den schnell rotirenden Schleifstein und sind so im Stande, den Fortgang des Schiffs stets mit den Augen zu verfolgen und durch passendes Drehen des zu bearbeitenden Steins diesem die gewünschte Gestalt zu geben (Fig. 6). Auf diese Weise wird die Khatkschleiferei in der Gegend von Oberstein betrieben, wo allein gegen 200 Schleifmühlen im Gange sind. Das Vertiefeschleifen erfolgt mit Hilfe kleinerer Schleifsteine, deren Gestalt der zu bewirkenden Ausbuchtung entspricht, das Poliren auf Blei- oder Zinnscheiben mit Wasser angerührtem Polus.

Die geschliffenen Edelsteine werden sehr häufig noch weiter bearbeitet, indem man auf ihnen Schriftzüge, Figuren u. dgl. vertieft oder erhaben (in Relief) ausarbeitet. Derartige Steine werden Gemmen genannt, und zwar bezeichnet man jene, welche vertiefte Figuren enthalten, als Intaglien, solche mit erhabenen Bildwerken als Cameen, die Arbeit selbst aber als Graviren oder Steinschneiden im engeren Sinne.

Die Kunst des Gravirens ist außerordentlich alt, wie das schon daraus hervorgeht, daß der Gebrauch der Siegelringe bis in das früheste Alterthum hinauf-

reicht; besonders aber besaßen die beiden größten Culturvölker der alten Welt, Griechen und Römer, eine außerordentliche Geschicklichkeit und den feinsten Geschmack in der Bearbeitung der Gemme; diese, von denen sich viele bis jetzt erhalten haben und bei den Ausgrabungen noch immer zu Tage gefördert werden, tragen oft die zierlichsten, gruppenreichsten Bildwerke (Fig. 36 Camee mit dem Raub der Europa, Fig. 37 Intaglio mit einem weiblichen Brustbild).

Während zum Graviren von Schriftzügen, zur Herstellung von Ringsteinen, alle Sorten von Edelsteinen oder Halbedelsteinen mit Ausnahme des Diamants benutzt werden, wendet man zur Herstellung der eigentlichen Gemmen mit Vorliebe nur eine gewisse Klasse der Steine an, solche, welche aus feinen, parallelen Lagen von sehr verschiedener Färbung bestehen; am beliebtesten sind die Onyre, welche abwechselnd schwarze und weiße Lagen zeigen (Fig. 5). Die Bearbeitung dieser Onyre erfolgt nun in der Weise, daß man das Bildwerk in der einen Schicht derart ausarbeitet, so daß die zweite anders gefärbte als Grund erscheint, von dem sich dann das erstere um so schöner abhebt.

Noch geschätzter sind diejenigen Exemplare, welche Lagen von mehr als zwei Farben besitzen, bei denen man also einzelne Theile des Bildwerks, z. B. die Gewandung, mit besonderer Färbung ausarbeiten kann. Es mag nebenbei bemerkt werden, daß es auch künstliche Mittel gibt, um die verschiedene Färbung einzelner Lagen hervorzurufen oder die Farbdifferenz zu erhöhen; dahin gehört besonders das Sieden in Oel.

Die Arbeit des Gravirens wird auf einer Drehbank vorgenommen (Fig. 34), in deren Spindel man sog. Gravirzeiger (Fig. 35 a, b) einsetzt, die je nach der Form des arbeitenden Theils und nach ihrer Größe äußerst mannichfaltig sind; indem man dann den zu gravirenden Stein fest gegen den Zeiger drückt, oder in bestimmter Richtung langsam an ihm vorüberführt, kann man nach und nach das gewünschte Relief oder die verlangte vertiefte Zeichnung aus ihm herausarbeiten. Weiter auf die Details dieser ebenso interessanten als unabweisbaren Arbeiten einzugehen, verbietet uns der knappe zugemessene Raum.

Die für die Gewichtsbestimmung der Edelsteine allgemein angenommene Gewichtseinheit ist das Karat, welches aber nicht an allen Orten das gleiche, absolute Gewicht besitzt. Im Durchschnitt kann man ein Karat = 205 Milligramm annehmen, sodaß also ein Loth ( $\frac{1}{20}$  Pfund Zollgew.) 81 Karat ungefähr enthält. Die Fig. 27 u. 28 zeigen Diamanten von 1 bis 50 Karat, erstere in Form von Brillanten, letztere in Form von Rosetten geschnitten. Bei Fig. 27 stellt der starke schwarze Strich unter jedem Bild die Höhe, die kleine Fläche dagegen die Cullasse des Brillanten dar.

Die Werthbestimmung der Edelsteine, zunächst der Diamanten, für die noch am leichtesten eine feste Regel aufgestellt werden kann, erfolgt in der Weise, daß das Gewicht, in Karaten, gesucht, dieses quadriert (mit sich selbst multiplicirt) und darauf mit dem Werth pro Karat multiplicirt wird; der Werth der Diamanten nimmt also nicht in arithmetischer, sondern in geometrischer Progression zu.

Ein Brillant erster Sorte z. B. wird pro Karat mit ungefähr 80 Thlrn. bezahlt, ein Stein von 3 Karat würde nach obiger Regel also  $3 \times 3 \times 80 = 720$  Thlr. kosten. Steine von weniger als einem Karat, oder von weniger schönen Schliffformen werden natürlich nach einem niedrigeren Einheitsfuss bezahlt, sodaß Brillanten, von denen 16 auf ein Karat gehen, nur mit 50 Thlrn. pro Karat, Rosetten von einem Karat

und mehr mit ca. 55 Thlr., solche, von denen 16 auf das Karat gehen, mit 44 Thlr. für das Karat, rohe Steine von Karatgröße endlich mit 30 Thlrn. bezahlt werden. Diese Einheitsätze schwanken selbstverständlich, wie alle Preise, nach Angebot und Nachfrage.

Diese angegebene Regel hat aber nur Geltung für Diamanten geringerer Größe, bis zu 15 Karat etwa; für die Schätzung schwererer Exemplare lassen sich feste Grundsätze schon deshalb nicht aufstellen, weil diese überhaupt sehr selten und dann so kostbar sind, daß sich Käufer dafür kaum finden und sie deshalb meist in festen Händen, in den Kronschätzen der größten Fürstengeschlechter verwahrt und unveräußerlich bleiben.

Die Zahl wirklich großer Diamanten ist so gering, ihre Geschichte, und jeder von ihnen hat eine wirkliche Geschichte, so interessant, daß es wol der Mühe lohnt, mit wenigen Worten ihrer zu gedenken.

Von dem portugiesischen Diamanten, der ein Gewicht von 1680 Karat und einen Werth von 389 Millionen Thlrn. besitzen soll, aber wahrscheinlich nur in der Fabel existirt, oder ein wasserheller Topas ist, abgesehen, befinden sich die größten Diamanten im Besitze indischer Fürsten, so der Großmogul (279 Karat schwer, aber nicht schön geschnitten, Fig. 7), und der noch größere des Nadscha von Mattau auf Borneo, der gar 367 Karat wiegen soll.

Der größte in Europa befindliche Diamant ist der Orlow oder Amsterdamer Diamant, welcher, ähnlich geschnitten wie der Großmogul, die Spitze des russischen Scepters bildet und ein Gewicht von 194 $\frac{1}{2}$  Karat besitzt. Er fand sich am Thronessel des Schah Nadir von Persien, bei dessen Ermordung er von einem Franzosen, der in persischen Diensten stand, gestohlen und später für eine nicht bedeutende Summe verkauft wurde. Er ging, immer höher bezahlt, durch mehrere Hände, bis er endlich von einem armenischen Kaufmanne 1775 an Katharina II. von Rußland für einen Adelsbrief, eine Rente von 4000 und eine feste Summe von 450000 Rubel verkauft wurde.

Am nächsten steht ihm der Pitt oder Regent, 136 $\frac{3}{4}$  Karat schwer, Fig. 9, der sich jetzt im französischen Kronschatz befindet und durch die Reinheit seines Wassers sowie durch die Schönheit und Regelmäßigkeit seines Brillantschliffs unter allen hervortritt. Er wird auf 12 Millionen Francs geschätzt und wurde nach vielem Besitzwechsel durch den Herzog von Orleans für Ludwig XV. von einem Herrn Pitt für nahezu 3 $\frac{1}{2}$  Mill. Francs erworben. Die Republik verpfändete ihn in Berlin, während ihn später Napoleon I. am Degentknopfe trug.

Der österreichische Schatz birgt den Florentiner von 133 $\frac{1}{4}$  Karat (Fig. 10). Karl der Kühne besaß ihn, verlor ihn aber nach der Schlacht bei Granson, wo ihn ein Schweizer fand, der ihn als werthloses Stüd Glas für wenige Franken verkaufte. Er wechselte bei immer steigendem Preise oft seinen Besitzer, bis ihn endlich Papst Julius II. für 20000 Dukaten acquirirte. Jetzt schätzt man ihn, trotz seiner citrongelben Farbe, auf 2 $\frac{1}{2}$  Mill. Francs.

Der größte brasilianische Diamant, der Südstern, (Fig. 11) wog roh 254, nach dem Schliffe aber nur 125 Karat. Es ist der einzige berühmte Diamant, der sich in Privathänden befindet.

Die größte Berühmtheit besitzt der König Berg des Lichts (Fig. 12), nicht sowohl wegen seiner Größe (er wiegt 106 Karat), als wegen der wechselvollen Geschichte, die er durchlief. Er fand sich früher in Indien und gab den Fürsten, die stets nach seinem Besitze trachteten, zu den mannichfaltigsten politischen Streitigkeiten, Kriegen und Ermordungen. Er befand sich im Kronschätze von Lahore, bis die Compagnie, eine Empörung benutzend, die sammtlichen Kronjuwelen auch den Kohnern entzog. Er hatte damals 186 Karat Gewicht, in unregelmäßiger Form (er war von einem venetianischen Steinschleifer entstellt worden), die Königin von England entschloß sich, ihn schleifen zu lassen. Durch diesen neuen Herr Boorsanger aus Amsterdam in der Weise ausführt (Fig. 33), verminderte sein Gewicht auf 106 Karat, dafür wurde er aber ganz vollkommenen, prachtvollen Brillanten.

Man vermutet, wegen der Gestalt des Orlovs, der Orlow und ein anderer, ähnlich aufgebundener Diamant, ursprünglich so gebildet hätten; möglich, daß dies der von Tavernier gefundene und abgebildete große des Großmoguls (793 Karat schwer) gewesen.

Im russischen Kronschatz befinden sich drei Diamanten, der Schah (Fig. 13), der Sancy (Fig. 14), 53 $\frac{1}{2}$  Karat, und der Regent (Fig. 15), 40 Karat, von denen der Schah die merkwürdige Form, die noch mehrere natürlichen Flächen zeigt, der Sancy aber durch seine Schicksale, die ihn sogar durch den Napoleon geführt haben sollen, Interesse erregt.

Eine allgemein gültige Werthbestimmung Edelsteine läßt sich schwer oder gar nicht. Dem Diamant am nächsten steht wol der rothe Korund, von dem ein Karatstein mit 2 bezahlt wird, nur der Smaragd wird auch fehlerlosen und tiefgrün gefärbten Exemplaren sehr selten sind, noch höher bezahlt. Der Saphir oder blaue Korund, der Chrysoberyll, Spinell oder Hyacinth. Diese rechnet man zu den ersten Ranges, und es folgen die Edelsteine zweiten Ranges Zirkon, edler Turmalin, Granat und edler Opal (letzterer farbenspielende Exemplare von letzteren ebenso theuer bezahlt als Rubin).

Die Schmucksteine dritten Ranges, der Jaspis, Chrysolith, Cyanit u. s. w., sind besonders schönen Stücken hoch bezahlt. Die Zahl der Halbedelsteine endlich, zu denen die verschiedenen Varietäten des Quarzes, und Opals, der Vesuvian, sowie die Feldspate zu rechnen sind, erhalten ihren Werth nur durch die Bearbeitung. Von den Edelsteinen ist der Amethyst noch am meisten gefordert, fehlerlosen, schön violettblauen Exemplaren, welche ihn gerade beliebt, sogar recht theuer. Die übrigen werden aber nur seltener zu Schmuckgegenständen, sondern vorwiegend zu Zierathen und größern Luxusartikeln verwendet.

# Mechanische Technik.

Bearbeitet

von

Dr. Ernst Hartig,  
Professor am Polytechnikum in Dresden.

und

Dr. Theodor Weiß,  
Professor an der technischen Hochschule in Brunn.



# Inhalt.

|                                                                            | Seite |                                                                                                  | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Einleitung . . . . .                                                       | 3     | Transportmaschinen für luftförmige Körper (Tafel 20 und 21) . . . . .                            | 20    |
| Technologie. Bearbeitet von Professor Dr. E. Partig.                       |       | 1. Gebläse . . . . .                                                                             | 20    |
| Mühlen (Tafel 1) . . . . .                                                 | 4     | 2. Rotirende Kolbengebläse und Ventilatoren . . . . .                                            | 20    |
| Sägemaschinen (Tafel 2) . . . . .                                          | 6     | 3. Saugstrahlventilatoren und Erhausfloren . . . . .                                             | 21    |
| Sägen und Durchschnitte (Tafel 3) . . . . .                                | 7     | Motoren oder Kraftmaschinen . . . . .                                                            | 21    |
| Hobel und Hobelmaschinen (Tafel 4) . . . . .                               | 9     | Physiologische Motoren . . . . .                                                                 | 22    |
| Bohrer und Bohrmaschinen (Tafel 5) . . . . .                               | 10    | Göpelwerke, Tret-, Lauf- und Spreßräder (Tafel 21) . . . . .                                     | 22    |
| Schleifsteine, Feilen und Fräsmaschinen (Tafel 6) . . . . .                | 12    | Wasserräder (Tafel 22) . . . . .                                                                 | 22    |
| Drehbänke und Drehbänke (Tafel 7) . . . . .                                | 14    | Turbinen (Tafel 23 und 24) . . . . .                                                             | 23    |
| Vorbereitungsmaschinen der Spinnerei (Tafel 8) . . . . .                   | 15    | Wasserdruckmotoren (Tafel 24) . . . . .                                                          | 23    |
| Vor- und Feinspinnmaschinen (Tafel 9) . . . . .                            | 18    | Pronysches Dynamometer . . . . .                                                                 | 23    |
| Spinn- und Klopplmaschinen (Tafel 10) . . . . .                            | 20    | Windräder (Tafel 25) . . . . .                                                                   | 23    |
| Webstühle (Tafel 11) . . . . .                                             | 21    | Dampfessel (Tafel 26) . . . . .                                                                  | 23    |
| Wirbmaschinen, Appreturmaschinen (Tafel 12) . . . . .                      | 23    | Rauchverhüllende Apparate . . . . .                                                              | 23    |
| Nähmaschinen, Stichtmaschinen (Tafel 13) . . . . .                         | 25    | Armatur und Garnitur . . . . .                                                                   | 23    |
| Druckmaschinen (Tafel 14) . . . . .                                        | 27    | Dampfmaschinen.                                                                                  |       |
| Maschinen des Schriftgießers, Stein- und Kupferdrucks (Tafel 15) . . . . . | 30    | 1. Balancier-Dampfmaschinen (Tafel 27) . . . . .                                                 | 27    |
| Maschinen der Cigarren- und Tabackindustrie (Tafel 16) . . . . .           | 31    | 2. Maschinen von verticaler Aufstellung ohne Balancier (Tafel 28) . . . . .                      | 27    |
| Uhren (Tafel 17) . . . . .                                                 | 32    | 3. Maschinen von horizontaler Aufstellung (Tafel 29) . . . . .                                   | 27    |
|                                                                            |       | Die Steuerungen . . . . .                                                                        | 27    |
| Maschinentechnik. Bearbeitet von Professor Dr. Th. Weiß.                   |       | 4. Die Maschine von Corliss und von Allen . . . . .                                              | 27    |
| Transportmaschinen für feste Körper (Tafel 18) . . . . .                   | 39    | 5. Oscillirende und rotirende Maschinen (Tafel 30) . . . . .                                     | 27    |
| 1. Hebezeuge . . . . .                                                     | 39    | 6. Transportable Dampfmaschinen, Locomotiven und Halb locomotiven (Tafel 31) . . . . .           | 27    |
| 2. Flaschenzüge . . . . .                                                  | 39    | Calorische Maschinen, Gasmotoren und andere thermodynamische Kraftmaschinen (Tafel 31) . . . . . | 27    |
| 3. Winden . . . . .                                                        | 40    | 1. Gaskraftmaschinen . . . . .                                                                   | 27    |
| 4. Krähne . . . . .                                                        | 42    | 2. FeiBluftmaschinen . . . . .                                                                   | 27    |
| Transportmaschinen für flüssige Körper (Tafel 19 bis 21) . . . . .         | 43    | 3. Feuerluftmaschinen . . . . .                                                                  | 27    |
| 1. Kolbenpumpen . . . . .                                                  | 43    | 4. Aetherdampfmaschinen . . . . .                                                                | 27    |
| 2. Centrifugalpumpen, Notationspumpen und Kapselräder . . . . .            | 46    | Regulatoren . . . . .                                                                            | 27    |
| 3. Strahlpumpen, Injectoren und Ejectoren . . . . .                        | 48    | Locomotiven (Tafel 32 und 33) . . . . .                                                          | 27    |
| 4. Feuerpfeifen, Bewässerungs- und Versprengungsvorrichtungen . . . . .    | 48    | 1. Eisenbahnlocomotiven . . . . .                                                                | 27    |
|                                                                            |       | 2. Straßenlocomotiven . . . . .                                                                  | 27    |
|                                                                            |       | Die Luftschiffahrt (Tafel 34) . . . . .                                                          | 27    |
|                                                                            |       | 1. Ballons, Aërostaten . . . . .                                                                 | 27    |
|                                                                            |       | 2. Flug- oder Fliegmaschinen . . . . .                                                           | 27    |

## Einleitung.

Der Land- und Forstwirthschaft sowie dem Aufgabc zufällt, der Natur die zu nützlichen und verwendbaren Stoffe abzugewinnen und dieselben eine nach fruchtbarerem Hervorgehene Richtung zu ertheilen, so hat sich vorwiegend mit der Umgestaltung dieser oder Nohprodukte in Gebrauchsgegenstände mit dem Transporte beider, sowie mit der Verfüguug zu diesen Zwecken geeigneten Naturstoffen zu befassen.

einen wird die Technik in die chemische und mechanische Technik abgeteilt. Erstere ist damit, den der Natur abgewonnenen Stoffe mittels chemischer Kräfte zur Gewinnung oder Neubildung zu erheben, die mechanische Technik eine solche Umgestaltung und auch Ortsveränderung unter Anwendung von Dienstbarmachung der sogenannten mechanischen Kräfte zu bewirken strebt.

gungsgebiet der mechanischen Technik  
nicht genommen, auch die Bautechnik und  
verworfen ein. Nicht ungerne hätte man  
beiden Zweige der Technik, welche vor-  
statischen Wirkungen der Naturkräfte  
gen, als „statische Technik“ zu bezeichnen,  
ein Teil der mechanischen Technik, wel-  
genstand der hier abzuhandelnden Be-  
sitzt und welcher sich vorwiegend mit der  
der bewegenden oder dynamischen Kräfte  
dem Namen der „dynamischen Technik“

ist, zumeist aus Gründen der historischen  
süßlich geworden, der Bautechnik und  
artweisen einen Platz zwischen der Archi-  
r mechanischen Technik, beziehentlich eine  
derte Stellung anzuweisen, und daher blei-  
ische Technik, unter Ausschluß nach-  
rt und des Seewesens, sowie der militä-  
it, auf das engere Gebiet beschränkt, wel-  
eniger der mittelbaren oder unmittelbaren  
olcher Naturkräfte und Hilfsmittel bezeich-  
darf, durch welche an den Naturkörpern  
unter physikalische Formänderungen zum  
blicher Gestaltung, sowie Ortsveränderun-  
äußerungen hervorgebracht werden können.  
smittel sind theils Werkzeuge, theils Ma-  
te werden von den Händen des Menschen  
erfordern also ein gewisses Maß von  
und physischer Kraft zugleich; den Ma-  
e Gezeugenheit (Unfreiheit) der Geme-  
zugehörigen Theile charakteristisch, daher  
ig zwar auch mittels der von Menschen  
physischen Kraft erfolgen, jedoch statt die-  
beliebige Naturkraft (elementare Betriebs-  
art werden kann. Die rapide materielle  
der Kulturvölker im 19. Jahrhundert ist  
nit dem von steigendem Erfolg gekrönten

Bestreben verknüpft, die Werkzeuge durch Maschinen, die Muskelkraft der menschlichen Gliedmaßen durch die Kraft des herabsinkenden Wassers, des Windes, des gespannten Wasserdampfes, der aus explosibeln Körpern erzeugten Gase u. s. w. zu ersetzen. Die hierdurch erreichbare Vermehrung und Vervollkommenung aller beabsichtigten mechanischen Prozesse ist so beträchtlich, daß in den letztverflossenen Jahrzehnten die geistige Kraft aller erfinderiichen Köpfe auf die Maschinenentwicklung sich geworfen hat, daher die mechanische Technik mit den ohnehin viel zusammengesetztern Maschinen weit mehr zu schaffen findet, als mit den Werkzeugen, die oft nur noch als bereits verlassene Anfangsstufe technischer Entwicklung anzusehen sind.

Wie sämtliche Wissensgebiete wegen der in der Neuzeit mehr und mehr answellenden Fälle und Masse des Stoffs in Specialzweige verästelt und zergliedert werden, so ist auch das bezeichnete engere Gebiet der mechanischen Technik in die auf unsern technischen Bildungsstätten didaktisch geforderten Theile der Technologie und der Maschinentechnik (Maschinenlehre und Maschinenbau) getrennt. Und wenn auch ein noch in der Neubildung begriffener Wissenszweig, nämlich die Kinematik, die Gebilde der gesamten mechanischen Technik, von einem gewissen Gesichtspunkte aus zusammengefaßt, beleuchtet und zwar von dem Gesichtspunkte der Bewegungsart und der zur Hervorbringung dieser Bewegungsart geeigneten Constructionsform, so verbleibt doch der Bereich der mechanischen Technik jener erwähnten geforderten, vorwiegend den zu erreichenden Fabrications- oder überhaupt technischen Endzweck ins Auge fassenden Behandlungsweise, und zwar beschäftigt sich die Technologie mit den diesen Zweck erreichenden lassenden Werkzeugen und Arbeitsmaschinen, die Maschinentechnik hingegen mit den Motoren oder Kraftmaschinen, mit den Transportmaschinen und Zwischenmaschinen, ohne indeßsen sämtliche hierzu gehörigen mechanischen Vorrichtungen zu umfassen, vielmehr eine nicht unbeträchtliche Anzahl derselben andern Wissenszweigen, als der Bautechnik, dem Ingenieurwesen, der Landwirtschaft, dem Seewesen u. s. w. überlassend.

In der nachfolgenden Darstellung sind die unmittelbar form- und ortsändernden Hilfsmittel, also die dem Gebiete der Technologie zugezählten Wertzeuge und Arbeitsmaschinen (Zaf. 1—17) den mittelbar benutzten, vom dem Wissensgebiete der Maschinentechnik umfaßten Kräftezeugungs- und Transportmaschinen (Zaf. 18—34) vorangestellt.

Da es sich bei der Verwendung aller dieser Maschinen und Vorrichtungen immer um die vorteilhafteste Erreichung eines Zwecks handelt, so erscheint es gerechtfertigt, den reichen hier abzuhandelnden Stoff mit wesentlicher Rücksicht auf den Zweck der zu beschreibenden Hilfsmittel anzuordnen. Freilich darf hierbei, um unnütze Wiederholungen zu vermeiden, immer nur an den allernächst liegenden, durch die Wirkungsweise der Werkzeuge und Maschinen ausgesprochenen Zweck gedacht werden, nicht an jede fernerliegende Verwend-

barkeit derselben in allen einzelnen historisch ange-  
baren Gewerzbetrieben; denn nur so ist es möglich,  
eine leidlich befriedigende Uebersicht über alle uns  
gegenwärtig zur Verfügung stehenden mechanischen und  
maschinellen Hilfsmittel zu erlangen.

## Technologie.

Bearbeitet von Professor Dr. Ernst Hartig.

## Mühlen.

(Tafel 1.)

Die formlose Zerkleinerung fester Materialien, der einfachste und älteste aller Arbeitsprozesse, kann durch Böden, Quetschen und Reiben geschehen. Die ursprünglichsten und einfachsten von Menschenhand bewegten Zerkleinerungswerzeuge, Mörser und Stößel, gestatten die gleichzeitige Ausführung dieser drei Operationen, während bei den entwickelteren, durch Naturkräfte zu bewegenden Zerkleinerungsmaschinen in der Regel nur je eine, höchstens zwei derselben in Anwendung kommen. Diejenigen dieser Maschinen, bei welchen ein Zerreiben (Mahlen) der Materialien, entweder allein oder mit einem Quetschen verbunden, stattfindet, heißen Mühlen und haben, weil sie die Zerkleinerung bis zu beliebiger Feinheit gestatten, die größte Verbreitung und die vielfältigste Entwicklung gefunden. Zumeilen ist der Name auch auf zerschlängelnde wirkende Zerkleinerungsmaschinen übertragen worden.

Bei den eigentlichen Mühlen kommen immer die Oberflächen zweier harter Körper zur Wirkung, welche das zu zerfeinernde Material zwischen sich fassen und vermöge angemessenen Drucks zerquetschen, vermöge ihrer rauen (gefärbten, gerippten u. f. w.) Beschaffenheit, in Verbindung mit ihrer gleitenden Bewegung aufeinander, zerreiben. Nach Form und Bewegungsart dieser Oberflächen unterscheidet man hauptsächlich die folgenden Anordnungen.

Die Kugelmühle (Fig. 1, a Vorderansicht, b Verticalschnitt) enthält eine Anzahl metallener Kugeln, welche in einem langsam rotirenden Gehäuse, das zur Aufnahme des zu zerkleinernden Materials dient, eine rollende Bewegung annehmen, indem sie fortwährend der Schwere folgend die tiefste Lage zu besetzen suchen. Diese Kugeln wirken auf das unter und zwischen ihnen befindliche Material vermöge ihres Gewichtes zerquetschend und gleichzeitig untereinander wie in Gemeinschaft mit der Innenseite des Gehäuses zerreibend; es kann nur ein abgemessenes, verhältnißmäßig kleines Materialquantum in Arbeit genommen, dieses jedoch durch Verlängerung der Procedure zu beliebiger Feinheit gebracht werden. Die Leistungsfähigkeit solcher Kugelmühlen, die nur für Materialien von großer Weichheit (Farbstoffe, Porzellanerde u. s. w.) taugen, ist nur gering.

Von weit energischerer Wirkung und erheblicherer Leistungsfähigkeit hat sich der Kollergang (Fig. 2) erwiesen, bei welchem zwei um die Horizontalachse *a* drehbare, schwere Zylinder (Läufer) im Kreise auf der Bodenfläche eines tellerförmigen Troges *C* herumrollen; die Horizontalachse *a* ist nämlich durch den Längsschnitt einer verticalen Welle *b* gesteckt, welche durch Regelräder *c*, *d* von einer Antriebswelle *e* aus eine langsame Rotationsbewegung erhält; damit das auf *C* ausgebreitete Material die Bewegungsmechanismen nicht berühren kann, sind dieselben in ein gußeisernes Gehäuse *f* eingeschlossen. Die beiden Läufer *A* und *B* stehen in verschieden großem Abstand von der Verticalwelle *b*, sodas sie nicht dieselbe Straße ziehen, vielmehr

auf verschiedenen ringförmigen Stufen  
ihre Wirkung ausüben; um zu einem  
Materialtheilchen in allen möglichen  
Lage ausgebreitet sind, hat man zwei  
entgegengesetzten Seiten schräg  
mit der Welle verbunden, welche  
den Gang das in C ausgebreitete  
nach außen und innen verdrängen.  
daß die beiden Läufer vermöge  
allein eine quetschende Wirkung  
— weil die Rotation eines Kreises  
berührenden Ebene niemals eine sein  
kann — eine zerkleinernde (mahlen-  
gang, oftmals durch Pferde in  
welche an einer die Verlängerung  
den Deißel angepaßt werden, beim  
verschiedensten Zerkleinerungsproceß  
Gebrauch; zumal er leicht neben der  
eine innige Mischung der zu zerkleinert  
bewirkt. So dient er in der Zerklein-  
feinerung der Kaffee, in der Zerklein-  
und Schokoladenindustrie zur Zerklein-  
bei erforderlichen Materialien, bei  
Mischen von Kalk und Sand u. s. w.  
der Kollergang von einer besonderen  
maschine betrieben, wie aus Fig. 3 zu

Eine eigenthümliche Modification ist die in Fig. 4 dargestellte Cycloid mit einem kegelförmigen, aus Granit oder Stein A laufen, durch die stehende Arme C und D getrieben, die beiden in im Kreise herum; jedoch nicht mit, sondern mit der ebenen Basis, also nur. Diese Regel (Läufer) sind aus robustem Arme C, D drehbar aufgeschoben und vollends auf A und dem hin Material. Da aus dem Verührungswinkel den Läufern zu überwindende Widerstand verschieden großen Krümmungsablenkung fläche ungleich groß ist, so erleiden bei ihrem Umgang gleichzeitig eine Rotation um Achse, woraus der Vortheil einer Abnutzung derselben resultirt. Der Vortheil ist von einer hölzernen oder metallenen, welche das auf A gebrachte Material hält. Die Zuführung desselben erfolgt durch den Kumpf aus in der Mitte, mit der Tragung hier zumeist der Luft über die durch die Drehung der Läufer eine Bewegung gesetzt wird und den feinsten Theil des Materials über den Rand der umgibt man daher die Maschine mit einigen Holzlasten, so kann man es selbst das feingemahlene Pulver oder zeitweilig entfernen. Die hier beschriebene eignet sich in unübertroffener Art zu feinsten staubförmigen Pulver zu Zwecken (z. B. arabisches Gummi) in den sogenannten Drogen- und in der geübten Anwendung. Den Namen der Maschine von der cycloidschen Gestalt der verschiedenen Punkte der Läufer

Bei den Regelmühlen (Fig. 5) ist der massivere kegelförmige Stein in einem Stück aus einem Gestein gehauen, welches durch die Schwerkraft oder mittels der Bewegung der Pleineisenwalzen in den engen Zwischenraum der beiden Pleineisenwalzen geführt wird. In Fig. 5 ist eine Regelmühle mit Pleineisenwalzen dargestellt. Die Pleineisenwalzen sind hier A den Kumpf zur Aufnahme des Pleineisensteins.



einen Mittelschuh, welcher dasselbe mit Mähigkeit dem zwischen Läufer C und uthaltenden Zwischenraum zuführt; dieser verengt sich von oben nach unten und ist einer aus der Figur ersichtlichen ungleichmäßig verkleinert werden. In dem Materialtheilchen durch Abreiben kleiner sie tiefer hinab, um endlich in einen geordneten ringförmigen Sammelbehälter welcher bei E zu einer Gasse ausgezogen das Mahlgut austrägt. Der Läufer C einer Welle a, welche mittels eines es c, d von einer horizontalen Antriebs-: Drehung empfängt, die selbst entweder r Figur angegeben — von der Hand e f umgetrieben oder auch mittels eines von einer Transmissionswelle aus bewegt ten Falle ist die Anordnung eines b zur Erzielung eines gleichförmigen langes rascham. Die Drehungsachse des auch horizontal angeordnet werden, wie hier muß jedoch die Drehungsgeschwindigkeit gewählt werden, daß die erregte Centrifugalgenug ist, die Materialtheilchen von n nach dem stärkeren Läuferende zu be- derselben Figur ist auch der Antrieb n und Riemenscheibe vorausgesetzt. Die sind schon im griechischen und römischen Gebrauch gewesen (jedoch in der um- ordnung mit feststehendem Mähstegel u. Hohlstegel); sie dienen jetzt vielfach als Men, zur Zerkleinerung der Kohlen, des anderer Materialien. Die beiden Mäh-: statt aus Stein häufig aus Schmiede- der Gußeisen (Hartguß) hergestellt und Regel mit scharfslantigen Rippen aus- die zerreibende Wirkung durch eine schneidende Wirkung ergänzt wird.

Reinmühle (Fig. 7 und 8) ist durch ährliche Mähkörper charakterisirt, welche len Endflächen das Material bearbeiten. eine solche im Verticalschnitt dargestellt. fällt aus einem trichterförmigen Vor- durch einen Schlauch B auf eine schnell le C (Centrifugalschütter), aber deren nach allen Seiten hinausgeschleubert dann zwischen die beiden Mähsteine D äth; von diesen liegt der unter E fest, obere — durch eine eiserne „Gaue“ mit verbunden — in rascher Drehung sich be- dreht wird mittels zweier Kegeträder h, rizontalen Antriebswelle d aus übertragen, ei e f mit Fest- und Losscheibe versehen einen Treibriemen bewegt werden kann. e Bodenstein E ruht in dem Mähgerüst mittels der Stellschrauben h genau ho- lt werden. Der obere Stein D (der ist seiner Welle a auch einer Verstellung ichtung fähig, sodaß man dem Zwi- beiden Steine die dem Korn des Mäh- ende Größe geben kann. Alle in diesen gelangenden Theilchen werden nun mehr gezwungen, an der Rotation des Läufers en und unterliegen so der Einwirkung , gelangen daher allmählich, die Re- n Bodenstein überwindend, nach dem der Mähsteine, wo der Zwischenraum erforderliche kleinste Maß vermindert. Hinausschiebung des Mahlgutes wird ei andere Mittel befördert: durch leichte,

in die Mähflächen eingearbeitete Furchen (deren Ge- stalt und Verzerrung in Fig. 9 dargestellt ist), welche sich scherenartig durchkreuzen, und durch Erzeugung eines künstlichen Windstroms, der durch einen Ven- tilator erzeugt wird und sich von dem Auge des Läu- fers durch den Zwischenraum der Mähflächen nach dem die Steine umschließenden Gehäuse bewegt. Letz- teres nimmt endlich das hinreichend zermahlene Ma- terial auf, worauf dasselbe durch einen abwärts ge- führten Kanal regelmäßig entweicht. Zerkleinerungs- maschinen dieser Art sind in hohem Grade leistungs- fähig, insbesondere wenn die schon erwähnten Furchen (Hauflschläge) immer in scharfslantigem Zustande gehalten werden; dieselben werden daher von Zeit zu Zeit mit besondern von Hand geführten Pöden (Fig. 10—12) aufgebauen, was man das Schärfen der Steine nennt. Die Flachsteinmühlen sind vorzugsweise zur Vermahlung der Körnerfrüchte im Gebrauch, doch dienen sie auch zur zerkleinerung mancher anderer Materialien. In Fig. 8 ist die Anordnung zweier Flachsteinmühlen in einem gemeinsamen gußeisernen Gerüst dargestellt — eine von englischen Fabrikanten landwirthschaftlicher Maschinen mit Vorliebe ausgeführte Form.

Bei den Walzmühlen (Fig. 13—16) haben die Mähflächen eine freischildrische Gestalt, und zwar arbeiten entweder zwei Mähstocylinder (Fig. 13—15) oder ein Mähstoc- und Hohlcyliuder (Fig. 16) auf- einander. Im ersten Falle haben entweder beide Cy- linder eine (in entgegengesetztem Sinne erfolgende) gleichschnelle Rotation: dann üben sie auf das zu- geführte Material nur eine zerquetschende Wirkung aus, oder ihre Umfangsgeschwindigkeit ist verschieden groß: dann tritt zu dieser zerquetschenden Wirkung noch eine zerreibende, zermahlende. Fig. 13 zeigt die gewöhnliche Anordnung der Walzmühlen (Walzen- quetschen, Quetschwalzen) zur Zerkleinerung der Erze und mineralischen Brennstoffe; in Fig. 14 ist die Ein- richtung der in den Bierbrauereien üblichen Mäh- quetschen im Verticalschnitt dargestellt. Je feinerförmiger das Mahlgut ausfallen soll, um so näher müssen die beiden Walzen aneinander gestellt werden; in der Mehlfabrikation, wo die Walzmühlen neben den Flach- steinmühlen hier und da Verwendung finden, müssen sich die Walzenumfänge berühren. Dasselbe ist der Fall bei denjenigen Walzmühlen, welche zur höchsten Verfeinerung teigartiger Materialien (Chocoladenmasse, Buchdruckerdruckschwärze u. s. w.) dienen sollen und von deren Anordnung Fig. 15 eine Vorstellung gibt. Das in einem Rumpf a enthaltene Material gelangt hier zwischen die ersten zwei Reibwalzen b und c, von welchen c am schnellsten umläuft; da gleich große Flächenstücke dieser Walzen gleiche Mengen abhätrendes Material mitnehmen, so folgt, daß der größere Theil desselben von c weiter transportirt wird; zwischen c und einer folgenden noch schneller umlaufenden Walze d erfolgt eine zweite Zerreibung; hier geht wieder der größere Theil des Materials an Walze d und es folgt nun eine dritte und vierte Bearbeitung zwischen den Walzenpaaren d und e, e und f, bis endlich das Ma- terial am Umfang der letzten Walze mittels eines Messers g abgestreift wird.

Bei der in Fig. 16 dargestellten Walzmühle ar- beitet ein Mähstocylinder A in Gemeinschaft mit einem bruchstückweise ausgeführten Hohlcyliuder B, in deren Zwischenraum das Material aus einem Rumpf C durch das Speisewalzenpaar D, E zugeführt wird; die Stell- schrauben a und b gestatten eine beliebige Regulirung des zwischen A und B vorhandenen Zwischenraums, wie solche die Korngröße des zugeführten und aus- zutragenden Mahlgutes erfordert. Dasselbe wird durch

den nach links rotirenden Cylinder A nach einem trichterförmigen Raum F befördert und fällt hier aus der Maschine. Die vorliegende Anordnung hat insofern ein allgemeineres Interesse, als sie bei den zur Bereitung der Papiermasse dienende Holländern in einer nur unwesentlich modificirten Gestalt vorliegt.

Eine letzte, neuerdings in Gebrauch gekommene Zerkleinerungsmaschine, die Schleudermühle, Centrifugalmühle, auch Desintegrator genannt, stellt Fig. 17 in perspectivischer Ansicht dar; hier wird jedoch das Material weder zerquetscht, noch zerrieben, sondern zer Schlaglagen; dasselbe fällt nämlich aus einem seitwärts angeordneten Rumpf in das Innere einer aus eisernen Stabstäben gebildeten schnell rotirenden Trommel; die durch die Schlagwirkung derselben gebildeten Fragmente entweichen durch die Zwischenräume der Stäbe und werden mit einer der Umdrehungszahl derselben entsprechenden Geschwindigkeit den Stäben einer zweiten ähnlich gebildeten jedoch entgegengesetzt umlaufenden Trommel entgegengeschleudert, so daß hier ein Zusammenstoß mit einer Geschwindigkeit stattfinden muß, deren Größe gleich der Summe der Geschwindigkeiten beider Trommeln ist; durchschnittlich 40—120 Meter per Secunde. In gleicher Art können drei, vier oder mehr nach abwechselnd entgegengesetzten Richtungen umlaufende Schlagtrommeln angewendet werden, welche einander concentrisch umschließen. Das zerkleinerte Material wird endlich von der äußersten Trommel in einen durch ein umschließendes Gehäuse begrenzten Raum geschleudert, aus dem es von Zeit zu Zeit entfernt werden muß. Diese höchst originelle Zerkleinerungsmaschine hat sich bisher für die verschiedenartigsten Materialien bewährt, für künstlichen Dünger, Steinkohlen, Coals, Gips, Gänister, Erze, selbst für Körnerfrüchte aller Art und deren Umwandlung in Gries, Dunst und Mehl. Dieselbe ist eine Erfindung des Engländers Carr.

## Sägemaschinen.

(Tafel 2.)

Wenn ein Arbeitsstück von Holz, Stein oder Metall durch einen ebenen oder gekrümmten Schnitt mit dem möglichst geringen Verlust in mehrere Theile zerlegt werden soll, so ist die Säge das vortheilhafteste Werkzeug. Dieselbe hat entweder ein gerades Blatt, welches geradlinig hin- und herbewegt wird, oder ein bandförmiges endloses Blatt mit fortlaufender Bewegung, oder ein kreisförmiges Blatt mit rotirender Bewegung.

Sägemaschinen mit geradem Blatt sind auf unserer Tafel in den Fig. 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12 und 13 dargestellt. Bei der kleinen für Holzarbeiter-Werkstätten bestimmten Säge, Fig. 2, ist das Blatt an seinen Enden in zwei Klemmen befestigt, von welchen die obere durch einen federnden Bügel von Holz oder Stahl (die Wippe) immer nach oben gezogen, (also in angemessener Spannung gehalten) wird, während die untere von einer stetig rotirenden Antriebswelle aus mittels Kurbelscheibe und Zugstange auf- und abbewegt wird; die Zahnsippen des Sägeblattes sind nach unten gerichtet, so daß dasselbe beim Niedergang schneidet, daher das Arbeitsstück auf dem in der Figur ersichtlichen Tisch nur in der erforderlichen Richtung entgegengeschoben zu werden braucht. Da bei dieser Maschine der Tisch ringsum frei ist, so können Arbeitsstücke von jeder Länge in beliebiger Weise verwendet werden, daher hier die Ausführung krummliniger Schnitte keinerlei Schwierigkeiten macht. Die Befestigung der Wippe erfolgt an der Dedo des Arbeitsraums.

Bei den in Fig. 5 und 6 dargestellten Maschinen ist auf die Anwendung der Wippe verzichtet, daher alle erforderlichen Theile in einem einzigen Gestell vereinigt sind. In beiden Klemmen, welche das Sägeblatt zwischen Schiebern angekoppelt, welche an einem Gestell vertical geführt sind, sind die Leitrollen gebende Seilstränge an einander verbunden, der von einer der Seile des Gestells gelagerten Antriebswelle an, welche eine schnelle Auf- und Niederbewegung erhält, sich daher durch abwechselnde Auf- und Abwärtsbewegung dem Sägeblatt mittheilt. Der Winkel unter spitzem Winkel gegen das Sägeblatt, was die Herstellung legelförmiger Schnitte ermöglicht.

Die in Fig. 6 dargestellte Maschine ist von vorigen große Aehnlichkeit, nur ist durch zwei gleicharmige Hebel eine der einen Seite durch eine Zugstange mit der andern durch zwei Zugstangen verbunden sind.

Bei den stärksten Geradblattsägen ist die Umwandlung der Baumstämme in Bretter im Gebrauch, wird das Sägeblatt in einen Rahmen (das Gatter) eingebracht, welches in horizontalen oder auch horizontalen Bewegung empfangt. In der Maschine dieser Art dargestellt, ist das Gatter als Seitengatter ausgeführt, d. h. die Außenseite des Gatters placirt, die Richtung der Baubölzer beliebige Anzahl rubt hier auf einem mit Rollen versehenen gleitbaren Wagen, welcher durch einen Mechanismus (das Schaltzeug) in Vor- und Rückwärtsbewegung erhält. Wie die Maschine nämlich von einem auf der Kreisbahnen ein Winkelhebel in Bewegung gesetzt, der mittels einer Sperrrad wirkt, dessen Drehung durch ein Radübersehung und durch Gatter dem Blockwagen mitgetheilt wird.

In Fig. 13 ist eine sogenannte Zugsäge dargestellt, bei welcher das Gatter von Sägeblättern enthält, daher große Anzahl von Schnitten in demselben Blatt kann. Bei dieser Anordnung wird die Arbeitsarbeit geteilt, weil die Zugstange nach jedem einzelnen Schnitt den Arbeitsverlust durch Reibung nicht proportional wachsen. Solche Zugsägen werden oftmals auf einem Schienen montirt und durch einen ebenfalls auf Schienen (Locomobile) in Betrieb gebracht, die durch Fig. 8 veranschaulicht sind, solchen transportablen Maschinen, die im Wald gefällten Bäume am Orte der Fällung in Bretter zerlegen, daher dann der Transport der vollen Theile (Kinden, Schwanten) erforderlich ist; ein für manche Fälle nicht fallender Gewinn.

Zur Herstellung ganz dünner Bretter aus werthvollen Hölzern gewährt die Anwendung eines horizontalen Sägeblattes Vorthail besonderer Genauigkeit, daher die möglichst geringe Breite der zu erzeugenden Bretter. Eine Anwendung solcher Art ist in Fig. 14 dargestellt, die Ebene des Sägeblattes ist so geneigt, daß der Block an einem in der

(aufsteigenden) Schieber befestigt (angemessen). Die Antriebswelle kommt hier zunächst von den übrigen Theilen der Maschine.

Bearbeitung der Steine kommen Maschinennutzungen. Hier ist jedoch das Blatt aus Eisen statt aus Stahl gefertigt und abgerieben ausgerüstet, die schneidende Wirkung durch einen stetig zugeführten Strom und hartem Sand (Schmirgel) erzielt; nach, sobald sie unter das Blatt gerathen, an der Kante desselben fest, werden ein genommen und schaben so die entgegen lateraltheilchen ab, während der Wasserzugi Abführung des Steinschmants besorgt. Steinsäge ist in Fig. 4 dargestellt. Man das Blatt an seinen Enden in zwei Klammern ist, welche unter sich durch ein über zwei elegtes Riemenstück verbunden sind und mit einer rotirenden Antriebswelle aus eine Bewegung erhalten. Die Lager der beiden sitzen an Verticalschiebern, welche durch Augen und Getriebe von einem Handrad wärts bewegt werden können, daher der hem so die Säge entgegengeführt wird, er Arbeit fest liegen kann. Daß Sägen auch zum Querdurchsägen von Holzrivend werden können, wenn man ein gesägte Blatt einspannt, hat der Zeichner durch rungsweise des Arbeitsstücks andenten wollen. ndsagen sind auf unserer Tafel durch d 11 vertreten. Bei diesen bildet das ein sehr dünnes, daher biegsames, in sich des (endloses) Band, welches gleich einem über zwei glattrandige Scheiben gelegten Drehung seine Bewegung erfolgt; die hse der untern Scheibe ist zugleich die An auf welcher eine feste und eine lose Niesowie auch eine zur schnellen Stillsetzung ne dienende Bremscheibe sitzt. Die Lager Scheibenachse sind mittels einer Schraubenververticalen Sinne zu verschieben, womit die orderliche Spannung des Sägeblattes sich reguliren läßt. Zwischen den beiden übergeordneten Scheiben — auf derjenigen das Blatt sich niederwärts bewegt — ist (Fig. 1) an dem Gestell befestigt, auf welArbeitsstück der Säge entgegengeführt wird, rd — wie bei den großen Gatterjagen — stück mit einem Schlitten (Bodwage) verelcher horizontal geführt und entweder durch iter oder durch ein Schaltwerk vorwärts gerd (Fig. 11). Nahe über dem Arbeitsdas Sägeblatt in einer Gabel geführt wert es sich nicht verläuft. Die Bandsäge der Geradblattsäge den Vortheil größerer, geringern Arbeitsverbrauchs (weil keine n- und Verbewegungen sind) und (wegen der i Arbeitsgeschwindigkeit) größerer Leistung. s hat man dieselbe auch zum Schneiden von Schneideisen, Blei-Antimon-Legierungen) mit verwendet.

u Kreissägen (Fig. 3, 7 und 9) sitzen auf dem Umfang einer kreisrunden Stahlcyl, welche auf einer in schnelle Rotation zu n Welle befestigt ist und der man auf einem en Tisch das Arbeitsstück entgegenführt; leghiebt entweder von der Hand, unter Beines verstellbaren Anschlags (Fig. 9) oder n von der Sägenwelle aus in Gang gesetz-

ten Zuschiebsapparat (Fig. 3), bestehend aus einem mit dem Arbeitsstück zu verbindenden Seil, welches sich auf einer in langsame Drehung versetzten Trommel aufwickelt. Die Kreissäge gestattet eine noch größere Arbeitsgeschwindigkeit als die Bandsäge; sie schneidet wie diese ununterbrochen, ist daher überaus leistungsfähig; doch vermag sie nur ebene Schnittflächen herzustellen, und ist die Schnitthöhe durch die Größe des Sägeblattes begrenzt; der Durchmesser desselben übersteigt nur ausnahmsweise den Betrag von 1 Meter. Die Schnittfuge ist in der Regel sehr breit, da man die Zähne, damit sich das Blatt nicht klemme, stark schränken, d. h. abwechselnd nach der einen und andern Seite ausbiegen muß.

In Fig. 7 ist eine mit vier Kreissägen ausgerüstete Zapfenschneidmaschine dargestellt, welche als hübsches Beispiel für die mannichfache Verwendbarkeit der Kreissäge gelten kann; das Arbeitsstück, ein Holzprisma, wird auf einem Horizontalständer befestigt und erhält durch ein erstes Paar auf verticaler Welle sitzende Kreissägen zwei horizontale Schnitte, hierauf durch zwei folgende übereinander angeordnete Kreissägen mit vertical gestelltem Blatt zwei senkrechte Schnitte, die auf der oberen und untern Seite je ein prismatisches Endstück aus dem Langholz herausfallen lassen, sodaß hier ein regelrechter horizontaler Zapfen zu Stande kommt.

Stellt man das Blatt einer Kreissäge schief zur Drehungsachse, so kann man dieselbe vortheilhaft zur Herstellung von Nuten in Brettern und Balken benutzen.

## Scheren und Durchschnitte.

(Tafel 3.)

Die Wirkungsweise der Scheren ergibt sich durch Betrachtung der Fig. 12 unserer Tafel, in welcher a ein Stück Blech (das Arbeitsstück) bedeutet und mit  $s_1, s_2$  zwei meißelförmige Werkzeuge (die Scherenblätter) bezeichnet sind, welche mit erforderlicher Kraft gegeneinander bewegt werden, sodaß die vorangehenden Schneiden in das Arbeitsstück eindringen und dasselbe in zwei Theile trennen. Gibt man dem einen Scherenblatt die Gestalt eines Ringes r (Fig. 13) und dem andern die eines hineinpassenden Stempels  $s$ , so wird aus der Schere ein Durchschnitt; die herzustellende Schnittfuge erhält eine kreisförmige Gestalt und läuft in sich selbst zurück. Während die Scheren zum Verschneiden der äußeren Kanten der Blechtafeln eine ausgedehnte Anwendung finden, dienen die Durchschnitte besonders zur schnellen Herstellung der zur Aufnahme von Nietbolzen bestimmten Löcher. Beiderlei Werkzeuge finden sich ungemein häufig an einer und derselben Maschine vereinigt.

Als ein Vorläufer der Schere im Entwicklungsgange dieser Werkzeuggruppe ist die gewöhnliche Schneipzange zu betrachten, bei welcher die beiden meißelförmigen Werkzeuge noch nicht eine solche Form haben, daß sie übereinander hintereinander streifen können, vielmehr nur mit ihren Schneiden nahe zur Berührung zusammenrücken, infolge dessen eine weniger ebene Schnittfläche zu Stande bringen. Fig. 11 zeigt eine solche Schneipzange, gegen die gewöhnliche Form dahin verbessert, daß eine durch den einen Nuten gesteckte Stellschraube die Annäherung des andern Nudens nur so weit gestattet, daß die beiden Schneiden sich nahezu, aber nicht vollständig berühren, womit jede Beschädigung der Schneiden verhütet ist.

Die Scheren haben zumeist geradschneidige Blätter, welche entweder mittels einer geradlinigen Verschiebung oder mittels einer Drehung um eine feste Achse zur



Wirkung kommen; im ersten Fall nennt man die Schere Parallelschere (Fig. 3 6—9), im zweiten Falle Hebelschere und es können hier die beiden verschiedenen Anordnungen vorkommen, daß die Drehungsachse den Schneiden parallel läuft (Fig. 4) oder zu denselben senkrecht steht (Fig. 2, 5). Will man lange Schnitte ohne Unterbrechung führen, so muß man den Blättern die Gestalt kreisrunder, mit den Rändern übereinanderstreifender Scheiben geben; man erhält so die Kreisschere, wie solche in Fig. 1 dargestellt ist. Die beiden Blätter sitzen hier auf zwei parallelen (oder auch unter einem spitzen Winkel geneigten) Wellen, welche nach entgegengesetzten Richtungen gedreht werden, daher denn ein (nicht allzu dickes) Blechstück auf der einen Seite der Blätter gefaßt und in zwei Theilen auf der andern Seite wieder ausgeliefert wird. Damit jenes Erfassen mit erforderlicher Sicherheit erfolge, muß der Durchmesser der Scherenblätter etwa 80 mal so groß sein wie die Blechdicke, womit wegen der Schwierigkeit der Herstellung großer Stahlblechschneiden die Verwendbarkeit dieser mechanisch vollkommensten Maschinenschere auf die Verarbeitung dünner Bleche beschränkt ist.

In Fig. 2 ist eine doppelte Hebelschere dargestellt, bei welcher die beiden beweglichen Blätter an einem großen trapezförmigen Gußstück angeschraubt sind, welches um einen zwischen den Scheren in der Mitte des Gestells angeordneten Bolzen drehbar ist und am oberen Ende mittels eines in einem Verticalschlitz arbeitenden Kreisrcenters eine schwingende Bewegung empfängt. Dieses Kreisrcenter sitzt auf einer horizontalen Welle, welche von der Schwungradwelle einer besondern kleinen Dampfmaschine aus mittels eines Stirnradpaars ihre Rotationsbewegung empfängt.

Eine mit Hebelschere combinirte Durchstoßmaschine ist in Fig. 5 dargestellt. Hier bezeichnet A das feste Scherenblatt, B das bewegliche, C den Lochstempel, D den Lochring; a die Drehungsachse des kräftigen Hebels b, mit welchem sowohl das bewegliche Scherenblatt als auch der Lochstempel in Verbindung stehen; derselbe trägt am äußern Ende eine Rolle c, auf welche eine herzförmige Scheibe d einwirkt, den Hebel b zu einer schwingenden Bewegung veranlassend. Die Nabe der Scheibe d empfängt eine langsame Rotationsbewegung von einer Antriebswelle aus mittels der Zahnräder e, f; auf dieser Antriebswelle sind außer dem Schwungrad g die beiden Riemenscheiben h<sub>1</sub>, h<sub>2</sub> (Fest- und Losscheibe) aufgesetzt, auf welche der Treibriemen ansläuft. Man macht dieser Art Hebelscheren den Vorwurf, daß bei geradschneidigen Blättern der Schneidwinkel, d. h. der Winkel, unter welchem die Schneiden das Arbeitsstück erfassen, veränderlich ist und im Anfang des Schneidens leicht so groß wird, daß dem Arbeitsstück durch den Angriff der Blätter eine Verschiebung ertheilt wird. Die Bewegung des Lochstempels C, der in einer Prismenführung k des Gestells vertical verschiebbar ist, erfolgt niederwärts durch die kurze Verlängerung des Hebels b über a hinaus, aufwärts durch zwei zu beiden Seiten des Hebelkopfes drehbar angeschlossene Zuglängen i.

In Fig. 4 findet sich die Darstellung einer andern Verschmelzung von Hebelschere und Durchschnitt. Das bewegliche Scherenblatt und der Lochstempel sind hier, ähnlich wie bei der in Fig. 2 dargestellten Anordnung, an einem trapezförmig gestalteten, um einen horizontalen Bolzen drehbaren Gußstück befestigt, welches am oberen Ende durch ein Kreisrcenter eine schwingende Bewegung empfängt; dieses Rcenter ist auf einer hohlen, die Antriebswelle umschließenden Welle aufgesetzt und empfängt eine langsame Rotation

mittels eines aus zwei Rändern rüßförmigen Naderwerks. Der betrübende Anordnung ist eine da es gibt.

Als ein derselben ebenbürtiger Parallelschere kann die in Fig. 6 dargestellte große Flachsenschere von Whittem bezeichnet A das an einem Getriebe, B das vertical bewegliche Scherenblatt, C das an einem in der Prismenführung des Gestells festgeschraubt ist; D die auf- und Abschiebung mittels der von einem excentrischen Zapfen aus dem Ende einer horizontalen, bei E getragenen Welle befindet. Das hinter D trägt ein großes Stirnrad d, im Centrum auf der Schwungradwelle einer Dampfmaschine aufgesetzten kleineren Stirnrad e, auf dem die Kurbel f, die Schubstange, i die Kolbenstange, l das Schiebercenter, m der Pleistange, n den Schieberkasten, o das Pleistonsventil, mittels eines in bequemem Handrads p zu öffnen und zu schließen ist für den Gebrauch der Eisenbahnen in welchen die ausgewählten Kohlenstücke in kürzere Stücke geschnitten werden alsdann Pakete zu formiren. Wegen der veränderlichen Widerstandes beim Schneiden ist der Betrieb durch einen Dampfmotor entschieden vorthellhaft, da ein regelmäßiger Gang anderer Arbeitsmaschinen werden kann.

Die in Fig. 7 und 8 dargestellte Schere charakterisirt sich durch eine große Länge der Scherenblätter, die es erlaubt Blechtafeln nach erfolgtem Auswalzen am Rande zu beschnitten. Auch der Betrieb wird durch einen separaten Motor. Eine besondere Einrichtung dient dazu, das Scherenblatt schnell in Stillstand zu bringen, die Betriebsmaschine aufzuhalten und die schweren rotirenden Massen abzumachen.

Die Fig. 6 und 9 zeigen zwei verschiedene Verschmelzungen von Parallelschere und Durchschnitt, die eine fahrbar (stationär) oder eine stationär; bei jener liegen die Scheren übereinander, bei dieser nebeneinander, der Antrieb von einer Transmissionswelle, der Treibriemen vorausgesetzt. In Fig. 9 ist das Scherenblatt mit A, das bewegliche mit B, der Lochring mit C, der Stempel mit D, der von einer im Gestell gelagerten Welle aus eine auf- und Niederschiebung empfängt eine langsame Rotation von zwei Stirnradpaare a b und c d von der im Gestell gelagerten Antriebswelle, welche bei e mit der Pleistange, bei f mit einem Pleistonsventil ist. Das Gestell ist als Hohlkasten die in Fig. 6 dargestellte Maschine ist.

Noch ist des Lesers Aufmerksamkeit auf die in Fig. 10 dargestellten hydraulischen Durchschnitten zu richten. Hier wird die Niederschiebung dadurch zu Wege gebracht, daß ein an einer borgene kleine Druckpumpe, deren Pleistange und Niederbewegung des oberen Pleistonsventils durch Wasser oder Del aus einem Cylinder befördert, dessen Pleistonsventil ein Stück bildet; die Pleistons-

cht mit Hilfe des untern Handhebels nach Herzog einer Communication zwischen Cylindern und vor. Man hat es also hier mit einer Verbindung von hydraulischer Presse und Durchschnittn.

## Hobel und Hobelmaschinen.

(Tafel 4.)

Der Hobel ist charakteristisch, daß derselbe die Bearbeitung der Oberfläche fester Körper zu Stande bringt, indem er in geraden Bügen über diese Oberfläche hin- und hergeführt wird. Bei den von Hand benutzten Hobeln wird ein zu tiefes Eindringen der eise durch die Oberfläche des Arbeitsstücks selbst verhindert, auf welcher der das zugespitzte Messer enthaltende Hobelkasten hinkläuft; bei den Hobelmaschinen besondere Prismenführungen in Anwendung, welche oder des Arbeitsstücks oder des Werkzeugs gerade Bewegung sichern. Die Anwendung der Handhobel beschränkt sich auf die Bearbeitung weicherer Materialien (Holz, weiche Metalle), wogegen zur Bearbeitung harter Materialien (Eisen) die durch elementar-Betriebskraft bewegten Hobelmaschinen im allgemeinen Gebrauch sind.

Die Gestalt und Einrichtung der wichtigsten Handhobel ergibt sich aus den Fig. 12—23; dieselben haben oder einfache oder doppelte Eisen; von ersterer Art die in Fig. 12, 13 und 15 dargestellten, von der letzteren dasjenige in Fig. 14; hier liegt auf der Vorderseite des eigentlichen Hobeleisens, welches mit seiner Kante die Abkantung eines Spans bewirkt, eine verarbeitete Dedplatte, deren untere Kante bis nahe an die Schneide des Eisens herangestellt ist; diese Dedplatte bewirkt eine vielfache Krümmung des vor dem ausfallenden Hobelspanns und verhindert so, bei ungleichmäßigem Zäherlauf ein sogenanntes Einengen zu erfolgen. Aus diesem Grunde eignen sich die Doppelheisen ausgearbeiteten Hobel (Doppelhobel, Doppelraubant, Fig. 20) besonders zur letzten Bearbeitung (Glättung) der Oberflächen. Fig. 12 stellt ein Eisen eines Schrupphobels dar, welcher zur ersten Bearbeitung rauher Flächen dient; hier ist die Schneide ungleichmäßig (convex) gestaltet, damit die abzuführende Kante mehr als breit ausfallen; Fig. 13 zeigt ein Eisen eines Schlächthobels, durch eine gerade Schneide charakterisiert; in Fig. 15 ist das Eisen eines Krümmhobels dargestellt, bei welchem die Schneide Profilsform irgenwelcher Simsleiten entspricht. Befestigung solcher Eisen geschieht mittels eines eisernen Keils, der mit dem Hammer vor dem Hobel fest eingetrieben wird, neuerdings auch, um den Gebrauch des Hammers zu beseitigen, mit Hilfe der Schraube und eines doppelarmigen Hebels. Bei den in Fig. 19—21 dargestellten gewöhnlichen Horizontalhobel zur Bearbeitung ringsum freier Flächen reicht die Schneide des Hobeleisens nicht über die ganze Breite des Hobelkastens, daher es nicht möglich ist, einem einmündigen Winkel die Bearbeitung bis in den inneren Winkel hin fortzusetzen; wenn solches möglich sein soll, so muß man dem Hobelkasten die in Fig. 16 dargestellte Form geben (Sims-hobel) und nun dem Hobeleisen im untern Theil eine Breite geben, welche diejenige des Hobelkastens um einen geringen Betrag übertrifft. Ist die zu bearbeitende Fläche ringsum von einer in rechtem Winkel aufsteigenden Fläche begrenzt, handelt es sich also darum, im Grund eines Zapfenlochs glatt zu hobeln, so verwendet man den Grundhobel (Fig. 17), bei welchem der Hobelkasten ringsum freistehend und die Führung des Hobeleisens eigenthümlich gestaltet Hobelkastens auf einer

Oberfläche erfolgt, welche der zu bearbeitenden parallel liegt. Soll die Seitenfläche einer Nut von rechthecigem Querschnitt bearbeitet werden, so gibt man dem Hobeleisen wie auch dem Querschnitt des Hobelkastens eine T-förmige Gestalt und erhält so den in Fig. 22 dargestellten Wangenhobel. Die in Fig. 23 und 18 dargestellten Hobel dienen zur Herstellung von Nuten in ebenen oder hohlcylindrischen Oberflächen; hier sitzen im Hobelkasten zwei Verschneider, welche dem Hobeleisen vorgeben und die von diesem abzulösenden Fasern vorerst sauber durchschneiden.

Zur Festhaltung des Arbeitsstücks beim Gebrauch der Hobel dient die in Fig. 11 dargestellte Hobelbank; hier sind an einem festen, aus hartem Holz hergestellten Brett zwei hölzerne Parallelschraubstöcke angebracht, von denen je nach Beschaffenheit des Zalles der eine oder andere in Benutzung zu nehmen ist.

Die Hobelstäbe zur Bearbeitung der Metalle (Fig. 24—26) sind von härteren Dimensionen als die zur Holzbearbeitung und haben einen größeren Schneidewinkel, dem bedeutendern Widerstande des Materials entsprechend. Am häufigsten finden die Stäbe mit bogensförmiger Schneide Anwendung (Schruppstäbe), welche entweder aus einem einzigen Stück Stahl geschmiedet sind (Fig. 24) oder aus einem kurzen Stahlstück und einem schmiedeeisernen Halter bestehen (Fig. 25 und 26); im letztern Falle findet eine mehr ökonomische Verwendung des Stahls statt.

Diese Stäbe finden ausschließlich in eigentlichen Hobelmaschinen Verwendung, welche vorzugsweise für die Bearbeitung der Metalle eine vielgestaltige Entwicklung gefunden haben (denn was man in der Bearbeitung des Holzes gemeinhin Hobelmaschine nennt, ist zwar eine zum Ersatz des Handhobels bestimmte Maschine, die aber, weil sie mit rotirendem Werkzeug arbeitet, zu den Fräsmaschinen gehört). Man kann die Metallhobelmaschinen nach der Richtung, in welcher die einzelnen Schnitte erfolgen, in Vertical- und Horizontalhobelmaschinen einteilen; bei den letztern empfiehlt sich eine weitere Untereinteilung in Horizontalhobelmaschinen mit bewegtem und solche mit feststehendem Stahl.

Die Einrichtung der Verticalhobelmaschinen für Metalle (auch Stoßmaschinen genannt) ergibt sich aus den Fig. 1—3. Man erkennt hier, daß der Hobelstahl am untern Ende eines vertical geführten Stößels eingepaßt ist, welcher von einer horizontalen, mit Stufenrädern versehenen Antriebswelle aus durch Kurbel und Zugstange (Fig. 2) oder durch Zwischenräder und Kurbelgetriebe (Fig. 1 und 3) die erforderliche Auf- und Niederschiebung erhält. Das Arbeitsstück (bei Fig. 1 ein Stirnrad, dessen Nabe mit einer Keilnut versehen werden soll) wird auf einem horizontalen, mit eingebobelten Nuten versehenen Tisch festgespannt, welcher sowohl einer drehenden Bewegung um eine verticale Achse als auch zweier Verschiebungen nach zwei horizontalen, unter rechtem Winkel sich durchschneidenden Richtungen fähig ist. Diese drei Bewegungen können sowohl durch die Hand des bedienenden Arbeiters (durch Drehung dreier Handkurbeln) erfolgen, als auch von der Antriebswelle durch geeignete Mechanismen abgeleitet werden. Man kann so dem Arbeitsstück nach jedem Schnitt eine solche Verschiebung (Zugschiebung) ertheilen, daß die entstehenden Schnittflächen sich zu einer ebenen oder freis-cylindrischen oder überhaupt zu einer Oberfläche ergänzen, welche dem Gesichte der allgemeinen Cylindrischen angehört. Es ist z. B. möglich, auf einer solchen Stoßmaschine die Zahnäder eines Stirnrades nach einer vorgezeichneten Linie fertig zu hobeln. Das

der Tisch eine solche Einrichtung, daß sein oberer Theil schief gestellt werden kann (Fig. 10), so wird es auch möglich, kegelförmige Gestalten auf Maschinen dieser Art zu vollenden.

Horizontalhobelmaschinen mit bewegtem Stahl (auch Feilmaschinen, Shapingmaschinen genannt) sind auf unserer Tafel durch die Figuren 4, 5 und 7 dargestellt. Der Stöbel, welcher am vordern Ende in einem besondern Kopf den Stahl trägt, ist in einer horizontalen Prismenführung beweglich und erhält seine alternirende Bewegung von der Antriebswelle aus durch Mechanismen gleicher Art wie bei den Stofmaschinen. Das Arbeitsstück wird auf einem consolenförmigen Tisch aufgespannt, welcher durch ein Schaltwerk eine schrittweise (den einzelnen Schritten vorausgehende) Aufchiebung in horizontaler Richtung empfängt (Fig. 7); zuweilen steht auch dieser Tisch fest und es wird dem die Prismenführung des Stöbels enthaltenden Theil durch Schaltwerk und Schraube die Querverchiebung ertheilt (Fig. 5); in beiden Fällen wird eine ebene Fläche an dem Arbeitsstück zu Stande kommen. Wird jedoch, wie in Fig. 4 und 5 angedeutet, das letztere auf einem horizontalen Dorn (zwischen zwei Kegeln) aufgespannt, welchem eine schrittweise Drehung ertheilt wird, so muß eine cylindrische Oberfläche entstehen, und es empfiehlt sich die so sich darbietende Herstellungsweise cylindrischer Oberflächen in denjenigen Fällen, wo dieselben nicht auf der ganzen Umfläche des Arbeitsstücks ausgebildet sind, daher sich zur Bearbeitung auf der Drehbank nicht eignen.

Horizontalhobelmaschinen mit feststehendem Stahl sind in den Fig. 6 und 9 zur Darstellung gebracht. Der Stahl sitzt in einem Support, welcher seine Schiefstellung und seine Verschiebung in verticalem Sinne gestattet und welcher selbst auf einem horizontalen, über die ganze Breite der Maschine reichenden Prisma verschiebbar ist. Hiernach kann dem Stahl nach jedem Schnitt mittels eines besondern Schaltwerks eine kleine Querverchiebung (zumeist auch eine Verschiebung in verticalem Sinne) ertheilt werden. Das Arbeitsstück wird mit Hilfe geeigneter Schrauben, Stege u. s. w. auf einem gußeisernen Tisch befestigt (aufgespannt), der mittels einer partiell ausgeführten Prismenführung auf einem langen und starken gußeisernen Bett horizontal verschiebbar ist. Auf seiner untern Seite trägt dieser Tisch eine Zahnstange, welche im Eingriff mit einem auf horizontaler Welle sitzenden Getriebe stehend von der Antriebswelle aus eine Vor- und Rückwärtschiebung erhält. Es ist ersichtlich, wie hierdurch nach passender Anstellung des Hobelstahls die Oberfläche des aufgespannten Arbeitsstücks eben gehobelt werden kann. Damit auch Gegenstände von einiger Höhe Platz finden können, ist das Bett supporttragende Horizontalprisma an der Vorderseite zweier mit dem Bett verschraubter oder an denselben angegoßener gußeiserner Ständer, welche am obern Ende durch einen Querballen verbunden sind, vertical verschiebbar eingerichtet; seine Hebung und Senkung vollzieht sich mit Hilfe zweier verticaler Schrauben von gleicher Ganghöhe, welche von einer oberhalb der Ständer gelagerten Horizontalwelle aus gleichzeitig und gleichschnell gedreht werden können. Zwei an der Seite des Tisches in beliebigem (der Länge des Arbeitsstücks entsprechendem) Abstand zu befestigende Anlagen (in Fig. 5 zu sehen) bewirken durch ihren Anstoß an einen kurzen Hobel die rechtzeitige Umsteuerung der Tischbewegung und gleichzeitig die Querversehung des Stahls.

Zu den Hobelmaschinen dieser Art ist auch die in Fig. 8 dargestellte Holzhobelmachine (Abschneidmaschine)

mit dreifachstehenden Stählen zu rechnen, bei welcher die untere Seite eines in horizontaler Richtung verschobenen Bretes, indem es nach oben gegen stehende Walzen läuft, über die Schneiden des Hobelmessers läuft, von denen jedes einen breiten, der Figur deutlich angegebenen Span abnimmt. Messer reichen hier über die ganze Breite des Arbeitsstücks, was wegen der größeren Weichheit des Materials zulässig ist; die Aufchiebung des Bretes mit Hilfe glatter oder geritzter gußeiserner Rollen, welche paarweise vor und hinter den Messern anordnet sind und in dem erforderlichen Sinne diese Bewegung um ihre Achsen erhalten. Maschinen dieser Art können ebenso die Glättung von Brettern, Kisten zum Zwecke haben, wie auch die Herstellung dünner Holzblätter für die Fabrication der Schiffe u. dgl. Behandelt man das Holz vorher mit Wasserdampf, der ihm eine auffallende Weichheit leiht, so kann man den Messern eine sehr große Breite geben, und es vermag alsdann eine solche Maschine die auf Taf. 2 dargestellte Journierarbeit großen Vortheil zu ersehen bei der Herstellung eigentlichen Furnüre, da sie keinen Verlust an Späne veranlaßt. Die in Fig. 8 dargestellte Maschine enthält übrigens noch zur Bearbeitung der Seitenfläche des Bretes rotirende Werkzeuge (z. B. Schneidböpfe), auf welche wir bei Besprechung der 6 zurückkommen.

## Bohrer und Bohrmaschinen.

(Tafel 5.)

Zur Herstellung eines kreisrunden Lochs in festem Metall genügt es, ein am Ende zugespitztes, mit scharfen oder schneidenden Kanten versehenes Werkzeug aus Stahl mit der Spitze auf das Arbeitsstück aufzusetzen in Rotation um seine Achse zu versetzen, unter Uebung eines Drucks in der Richtung dieser Achse. Ein Werkzeug solcher Art heißt ein Bohrer. Die Art der Schneiden ist für verschiedene Materialien verschieden; auch hier muß der Zuschärfungsgrad des Schneiden um so größer sein (um so näher an dem Grad kommen), je härter das zu bohrende Material ist. Bei den Bohrern für Holz (Fig. 13 — 17) ist daher die Schneiden unter einem Winkel von 30 Grad zugespitzt, bei den Metallbohrern unter einem solchen von 50 — 60 Grad. Unter den Bohrern hat der Nagelbohrer (Fig. 16 und 17) die einfachste Gestalt; hier läuft von der Spitze zur Oberfläche eines schlanen Kegels eine Furche nach links- und rechtsläufigen Schrauben gestaltet nach oben, deren Spitze zumeist so wenig zugespitzt ist, daß eine eigene Ablösung von Material beim Gebrauch nicht erfolgt, vielmehr nur ein partielles Auseinanderdrängen des Holzes, hinreichend, um einen Nagel oder größerer Leichtigkeit einschlagen zu können. Die Gestalt dieser einfachsten Bohrer wird mittels eines am obern Ende befindlichen Griffes von Hand bewirkt. Der in Fig. 13 dargestellte Schneidenbohrer unterscheidet sich von dem Nagelbohrer außer durch die größeren Dimensionen wesentlich durch den kleineren Zuschärfungswinkel der beim Bohren vorangehenden schraubenförmigen Schneide, welche die Ablösung breiter Späne zuläßt. Der Griff hat hier eine solche Größe, daß er von beiden Händen, also auch die Ausübung des großen Drucks möglich ist. Fig. 14 zeigt einen Handbohrer, bei welchem an dem breiten langgestreckten Ende außer der beim Bohren vorangehenden Spitze einerseits ein scharfer, mit peripherisch geführter Schneide versehener Vorbohrer, andererseits eine radialer Schneide ausgerüstete Schaufel sitzt; die



Lage der Drehungsachse, der Vorsteiner zu entfernenden Holzfasern am Umfang des ab, die Schaufel bewirkt die fortlaufende dieser Fasern mittels eines schraubengangsaufenden Schnittes. Als eine zu speciellem neue Variation des Centrumbohrers ist der Bohrer, Fig. 15, zu betrachten, bei welchem die Schneide und Schaufel am Ende eines abgekehrten Kegels sitzen; mittels dieses Bohrers ist in den Boden eines mit Flüssigkeit gefüllten Loch zum Einsieden eines Hahnes zu machen, da die Flüssigkeit ausfließt; sobald nämlicher durchbricht, verfließt der nachfolgende die hergestellte Bohrung, worauf dann raschen Bewegung dieses Werkzeugs gegen umzutauschen ist. Zu bequemerer Handhabung des Centrumbohrers bedient man sich allgemein 11 und 12 dargestellten Brustleier, in deren Mitte der Bohrer eingesetzt wird, während auf der einen Seite ein Griff mit der linken Hand der Brust der erforderliche Druck ausgeübt, die rechte Hand den in der Mitte befindlichen Griff ergreift und im Kreise herumführt. Von Fig. 18 — 22 dargestellten Metallbohrern Fig. 18 den gewöhnlichen (älteren) Spitzbohrer, dessen unterem Ende zwei symmetrisch zueinander gerichtete Schneiden in einer Spitze zusammenlaufen; kommen bei der Umdrehung des Bohrers (in einem Sinne) beide zur Wirkung. Dieser Art bei veränderlicher Härte des Materials leicht verlaufen, so hat man dieselben da, wo es erforderlich ist, daß man dem den Schneiden nachfolgenden Theil des Bohrers auf eine größere Länge gleich dem Durchmesser der Bohrung gab, die recht sichere Führung des Bohrers im Werkstücke vermittelt (s. Fig. 19); bei dem in Fig. 20 dargestellten Bohrer, zum Bohren auf der Drehmaschine, ist eine einzige Schneide am Ende des Bohrers, es fehlt daher die centrale Spitze; ein neuer Bohrer ist aus einem Stahlschleifer arbeitend zweier diametral gegenüberliegenden hergestellt und durch Anschleifen zweier zu je zusammenlaufender Facetten. Als die vollkommene Form der Metallbohrer ist der in Fig. 22 dargestellte Schraubenbohrer zu bezeichnen, bei dem das Abfließen der Späne in zwei schraubengängigen Kanälen mit erwünschter Regelmäßigkeit erfolgt. Unter den zur Handhabung der Metallbohrer gehörigen Vorrichtungen ist die in Fig. 9 dargestellte Bohrturbel eine der gebräuchlichsten; unterscheidet sich von der Brustleier wesentlich durch die Zustellung oder Aufschiebung des Bohrerarms, seine Verschiebung in der Richtung der Drehungsachse durch Vermittelung einer kräftigen Schraube, deren Muttergewinde sich in dem Arm eines mit dem Arbeitsstück zu verstellenden Gestells befindet; hierdurch wird es möglich, die Bohrer zu schneiden — entsprechend der größeren oder geringeren Härte des Materials — mit einer größeren Kraft auf das Werkstück wirken zu lassen. Während die rechte Hand die Bohrturbel im Kreise herumführt, die linke Hand mittels eines durch den Gestell gehenden Knebels eine schrittweise Vor- und Rückbewegung des Bohrers bewirkt. In Fig. 10 ist eine zweckmäßige Construction der Bohrturbel mit der Ratsche dargestellt; ist die Bohrturbel nicht eine fortlaufende, sondern eine pendelartige Schwingung, von ohne weiteres Zutun des Arbeiters die Drehung des Bohrers mittels Sperrklinke, Sperrschraube abgeleitet wird.

Bei den Bohrmaschinen ist nun immer Veranstaltung getroffen, daß von den beiden dem Werkzeug zu ertheilenden Bewegungen — Rotation und geradlinige Translation — jedenfalls die erstere von einer durch Elementarkraft betriebenen Transmissionswelle abgeleitet werden kann, während die zweite noch durch den Arbeiter mit Fuß oder Hand veranlaßt wird. So zeigt Fig. 5 eine Verticalbohrmaschine für Metalle, bei welcher das Arbeitsstück auf einem in fester Höhe einzustellenden Tische festliegt und der in eine verticale Spindel eingesteckte Bohrer durch Niederführung eines Zuhelms die geradlinige Verschiebung empfängt, während die drehende Bewegung derselben Spindel von einer umlaufenden Antriebswelle mittels eines Riementriebes und eines Kegelscheibenpaars mitgetheilt wird. Damit es hierbei möglich werde, für Bohrer von verschiedenem Durchmesser nahezu dieselbe Umfangsgeschwindigkeit zu erreichen, deren Größe für jedes Material durch die Erfahrung festzustellen ist, enthält der erwähnte Riementrieb, wie die Figur erkennen läßt, vier Scheibenpaare von verschiedenem Uebersehungsverhältniß nebeneinander. Damit ferner die Bohrspindel überhaupt beide ihr mitzutheilende Bewegungen annehmen könne, versteht es sich, daß sie mit Nut und Feder durch die Nabe des getriebenen Kegelscheibens hindurchgeht, während dieses selbst mit dem Gestell in solcher Art verbunden ist, daß es zwar drehbar, aber nicht verschiebbar ist.

Von einer Verticalbohrmaschine mit selbstthätiger Aufschiebung gibt Fig. 4 eine perspectivische Ansicht. Auch hier erfolgt die Drehung der Bohrspindel von einer horizontalen, mit Stufenscheiben versehenen Antriebswelle aus, mit welcher eine an der Decke des Arbeitsraums gelagerte Vorgelegswelle correspondirt. Durch ein besonderes, aus zwei Stirnräderpaaren bestehendes Nadelvorgelege ist es hier möglich, die Zahl der dem Bohrer zu ertheilenden Geschwindigkeiten auf das Doppelte der Zahl der Riemenläufe (also hier auf sechs) zu bringen. Die automatische Aufschiebung des Bohrers wird von derselben Antriebswelle durch folgende Mechanismen abgeleitet: ein Riementrieb (dreiläufig, an der rechten Seite der Figur sichtbar), horizontale Zwischewelle, Schraubenrabeingriff, verticale Hülfschraube, Stirnräderpaar, Schraubenmutter mit Spindel; letztere ist mit dem Gestell auf Aufschiebung, mit der Bohrspindel auf Drehung verbunden, daher sich die der Schraubenmutter mitgetheilte Drehung in eine Verticalaufschiebung der Bohrspindel umsetzt.

Da es häufig vorkommt, daß an großen, schwer beweglichen Arbeitsstücken (Maschinengestelle, Dampfcylinder u. s. w.) mehrere Löcher nach derselben Richtung zu bohren sind, so hat man der Verticalbohrmaschine zuweilen eine solche Einrichtung gegeben, daß die Bohrspindel unbeschadet der ihr von der Antriebswelle aus zu ertheilenden Bewegungen innerhalb eines gewissen Raumes nach jedem beliebigen Punkt versetzt werden kann. Ist solches durch Radialaufschiebung der Bohrspindel enthaltenden Schiebers auf einem horizontalen Arm und Drehung dieses Arms erreicht, so nennt man diese Art Bohrmaschinen Radialbohrmaschinen, deren eine auf unserer Tafel durch Fig. 8 dargestellt ist. Hier erfolgt die Drehung des erwähnten Arms um eine gußeiserne Säule, in deren Achse eine zur Uebertragung der Bewegung wesentlich erforderliche verticale Welle gelagert ist; dieselbe empfängt am untern Ende durch ein Kegelscheibenpaar die Rotationsbewegung von der horizontalen Antriebswelle aus und überträgt sie am obern Ende mittels eines zweiten Kegelscheibenpaars auf eine hori-

zontale (in unserer Figur deutlich sichtbare) Welle, welche an der Bewegung des Arms theilnimmt, wie auch an der geradlinigen Verschiebung des Bohrspindel: schlitzen; diese Welle ist einerseits mit dem getriebenen Kegelrad auf Drehung verbunden (mittels Nut und Feder), und treibt andererseits die Bohrspindel, wonach leicht zu übersehen ist, daß für alle möglichen Positionen des Bohrers der Bewegungszusammenhang zwischen Antriebswelle und Bohrspindel unverändert bestehen bleibt. Die Zushiebungsbewegung des Bohrers wird von der Rotation desselben in gleicher Art abgeleitet, wie bei den in Fig. 4 dargestellten Maschinen. Nur ist hier wie dort die Möglichkeit herbeigeführt, die Zushiebung auch von Hand (durch Drehung des rechts von der Bohrspindel sichtbaren Handrades) auszuführen. Das Arbeitsstück wird auf der horizontalen oder vertikalen, mit T-Nuten versehenen Gefestigungsfläche befestigt, oder auch, wenn es sehr groß ist, unmittelbar auf den Anstößen gestützt.

Um die Leistung einer Bohrmaschine auf das höchste Maß zu bringen, hat man sie wol mit mehreren Spindeln und Bohrern ausgerüstet, welche gleichzeitig zur Wirkung gebracht werden können. Eine Bohrmaschine (vierspindelige Horizontalbohrmaschine) ist in Fig. 6 unserer Tafel dargestellt; dieselbe dient zur Durchbohrung kleiner Arbeitsstücke und zeigt zugleich die bemerkenswerthe Umkehrung, daß die Drehungsbewegung nicht den Bohrern, sondern den Arbeitsstücken mitgetheilt wird und die Bohrer nur die geradlinige Verschiebung erhalten; es kann daher diese Maschine auch als vierspindelige Drehbank angesehen werden. In jedem Fall repräsentirt sie ein für die Maschinenindustrie wichtiges Princip, das Princip nämlich der Vervielfachung des Werkzeugs, wonach der Totalaufwand für Gestell, Bewegungsapparat u. s. w. sich für jedes einzelne Werkzeug erheblich abmindern läßt.

Ein anderes Princip ist durch die in Fig. 2 dargestellte einspindelige Bohrmaschine dargestellt: die Verschmelzung der Arbeitsmaschinen mit einem separaten Motor (hier eine Vertikalbohrmaschine mit einer oszillirenden Dampfmaschine). Eine solche Verschmelzung gewährt mancherlei Vortheile: die Arbeitsmaschine wird von andern Arbeitsmaschinen völlig unabhängig, kann in der Gleichförmigkeit ihres Ganges nicht durch diese beeinträchtigt werden, auch ihrerseits auf andere nicht störend einwirken; der Verbrauch an motorischer Substanz findet nur so lange statt, als die Benutzung der Arbeitsmaschine erfolgt; auch erlangt dieselbe eine für gewisse Fälle (Herstellung großer Arbeitsstücke, Brücken, Schiffkörper u. s. w.) werthvolle Transportfähigkeit, wenn man nämlich die Einrichtung sich gestattet, daß die motorische Substanz (Dampf, Wasser, comprimirt Luft) durch biegsame oder gelenkige Vorrichtungen von der Quelle derselben nach der Arbeitsmaschine hingeleitet wird.

Eine schöne und werthvolle Verallgemeinerung hat das Bohren endlich bei den sogenannten Langlobohrmaschinen oder Nutenbohrmaschinen erfahren, die in den Figuren 1, 3 und 7 ihre Darstellung gefunden haben. Hier kommt zu den zwei oben erwähnten Bewegungen noch eine dritte, nämlich eine geradlinige Translation des Arbeitsstücks rechtwinklig zur Bohrerachse (Fig. 3) oder — bei ruhendem Arbeitsstück — eine ebensolche Bewegung des Bohrers mit Bohrspindel und Zubehör. Denkt man sich den Bohrer zunächst bis zu einer gewissen Tiefe in das Arbeitsstück eingedrungen und sodann diese Bewegung innerhalb gewisser Grenzen hin und her erfolgen, unter jedesmaliger Tieferstellung des Bohrers in den Umkehr-

momenten, so wird statt eines kreisförmigen Zuges eine Nut mit halbcylindrisch abgerundeten Enden zu Stande kommen, deren Glätte und Sauberkeit den strengsten Anforderungen genügt. Solche Nuten (sogenannte Nuten) lassen sich übrigens leicht nachträglich leicht richtig ausfeilen oder anstoßen lassen) mußten früher mühsam mit dem Meißel oder Stummelisen ausgearbeitet werden. Diese Langlobohrmaschinen bilden überaus den Uebergang von den Bohrmaschinen zu den Fräsmaschinen, daher es kommt, daß die für Langlobohrmaschinen gebräuchlichen Bohrer auf der die Fräsmaschinen betreffenden Taf. 6 (in den Fig. 11 und 12, Zweizahnbohrer und Kronenbohrer) dargestellt sind.

## Schleifsteine, Feilen und Fräsmaschinen.

(Tafel 6.)

Als ältestes und einfachstes Werkzeug zur Bearbeitung harter Materialien durch Hinwegnahme eines Späne ist der von Hand geführte Schleifstein zu betrachten, aus einem Stück eines harten, grobkörnigen feinförmigen Sandsteins, Tonstein oder anderer Gesteins bestehend. Es ist anzunehmen, daß der Mensch auf dieses Werkzeug durch die Wahrnehmung gekommen ist, daß die bei den Reibnüssen (Taf. 1) angetroffenen Steine sich infolge ihrer Raubigkeiten in natürlichem Grade selbst abnützen. Jedes raube Arbeitsstück, wenn es auf einem Arbeitsstück unter einem Druck beharrlich hin- und hergetrieben wird, wird durch Hinwegnahme vieler kleiner Theilchen eine Veränderung an diesem Arbeitsstück hervor. Gegenstände sind die Handschleifsteine besonders zum Schärfen von Messern, Meißeln und anderer Stahlwerkzeuge im Gebrauch, und es ist hier gewöhnlich die Beziehung zwischen Werkstück und Werkzeug insofern umgekehrt, als das letztere auf letztem herumreißt, besonders wenn es durch Schleifen zu bearbeitende Stück nicht sehr groß ist. Doch gibt es genug Fälle, in denen dem Handschleifstein die Bewegung ertheilt wird (Schleifen des Senfes), und besonders hat man künstliche Schleifsteine (bereitet aus einer Mischung von Fein- oder Schmirgelpulver oder vulkanisirtem Kausthou und hartem Sand u. dgl.) in solcher Art vergerichtet, daß einem handlichen Griff verbunden, daß die Führung auf der Oberfläche eines Arbeitsstücks mit Leichtigkeit erfolgen kann (Taf. 6, Fig. 22). Um solchen Werkzeugen die höchste Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung zu ertheilen, hat man später dasselbe aus gehärtetem Stahl gefertigt und die erforderliche raube Oberfläche durch Aufbauen derselben mit einem spitzen oder schneidigen Werkzeug hergestellt (Kaspeln, Fig. 24, Feilen, Fig. 21.) Um kleinere Arbeitsstücke, die nicht durch ihr eigenes Gewicht festliegen, beim Gebrauch solcher Werkzeuge gehörig festzuhalten, hat man mehrere Einspannvorrichtungen erfunden, als deren wichtigster Repräsentant der Schraubstock in Fig. 19 unserer Tafel dargestellt ist. Derselbe besteht aus zwei durch Scharnier drehbar verbundenen Bänken, welche mittels einer Schraube gegeneinander verschoben werden können und zwischen denen das Arbeitsstück so festgeklemmt wird, daß die zu bearbeitende Oberfläche freiliegend und für den Gebrauch der Feile oder Kaspel zugänglich ist. Von den beiden Bänken ist der eine fest mit einer Werkbank verbunden.

Wie nun bei weiterer Entwidlung aller Werkzeuge insbesondere zur Benutzung elementarer Betriebskräfte die drehbare Bewegung zu Hülfe genommen wird, so haben sich auch hier in dem rotirenden Schleifstein (Fig. 4) und in der Fräse (Fig. 11 bis 15), die man als rotirende Feile betrachten kann, 1662

istungsfähige Maschinenwerkzeuge herausgebildet, deren allgemeine Benutzung zur Bearbeitung der Metalle und Hölzer noch fortwährend im Zunehmen begriffen ist.

Der in Fig. 4 dargestellte einfache Schleifstein ist jeder Holz- und Metallbearbeitungsverkstatt anzueffnen; ein kreiszylindrisch behauener feinstörniger Sandstein ist mittels gußeiserner Scheiben, die ihn zwischen sich fassen, mit einer horizontal gelagerten Welle verbunden und erhält von einer Antriebswelle aus mittels eines Treibriemens rotierende Bewegung; in Lager der Welle sitzen auf dem Rande eines gußeisernen Troges, welcher das zur Kühlung des Arbeitsstücks etwa zugeführte Wasser und die durch den Schleifproceß losgerissenen Theilchen des Steins und des Werkstücks (den Schleifschmutz) aufzunehmen bestimmt ist. Vor dem Stein, wo die Oberfläche desselben im Niedergang begriffen ist, trägt der Trog mittels zweier nach dem Steindurchmesser verstellbarer Stützen eine gußeiserne Schiene (die Auflage) zur Unterstützung des zu schleifenden Stücks. Für den gewöhnlichen Antrieb sind auf der einen Seite des Steins zwei Riemenscheiben, eine Fest- und Losscheibe, auf die Welle gefeilt; auf der andern Seite sitzt eine kleinere Scheibe von größerem Durchmesser, welche beim Abbrechen des Steins zur Herstellung der kreiszylindrischen Form desselben benutzt wird, wobei eine geringere Umfangsgeschwindigkeit genügt.

Der in Fig. 8 dargestellte mehrfache Schleifstein soll wieder das Princip der Vervielfachung des Werkzeugs illustriren: dasselbe Gestell, derselbe Antriebsmechanismus dient gleichzeitig für sechs Schleifsteine; sind dieselben in verschiedenem Grade feinstörnig, so kann die Vollenbung eines Arbeitsstücks, indem der Arbeiter zuerst die grobkörnigen, zuletzt die feinstörnigen Steine benutzt, mit möglichst geringem Zeitverlust erfolgen.

Die Fräsen sind aus gehärtetem Stahl hergestellte Rotationskörper, auf ihrem Umfang mit Schneiden versehen, welche durch Drehung des Werkzeugs um die geometrische Achse zur Wirkung gelangen. Die in den Fig. 11 bis 15 dargestellten Fräsen für Metall schneiden sich am nächsten an die Metallbohrer an; die mit 11 und 12 bezeichneten wurden schon als Langlochbohrer erwähnt; unter Fig. 13 und 14 sind zwei sogenante Senker dargestellt, welche dazu dienen, cylindrische Löcher kegelförmig oder halbkugelig zu erweitern; Fig. 15 stellt die am häufigsten angewendete Scheibenfräse dar, die entweder mit ihrer cylindrischen Umfläche oder mit ihrer ebenen Endfläche benutzt werden kann. Eine sehr ausgedehnte Verwendung finden die Fräsen zur Herstellung verzahnter Räder, wenn an deren richtige Form die höchsten Anforderungen gestellt werden. In Fig. 6 ist eine hierzu brauchbare Maschine (Naderfräsemaschine) zur Darstellung gebracht. Die Fräse, deren Form genau der Gestalt der herzustellenden Zahnflanken entspricht, sitzt auf einer horizontalen Achse, die von der Antriebswelle aus eine langsame Drehbewegung erhält; gleichzeitig kann man ihr eine geradlinige Verschiebung in verticalem Sinne ertheilen; das Arbeitsstück, ein gegossenes glattrandiges Rad, ist auf eine Planscheibe aufgespannt, welche sowohl einer horizontalen Verschiebung als auch einer horizontalen Drehung fähig ist; die erstere wird dazu benutzt, das Rad gegen die Fräse richtig anzustellen, die letztere, dasselbe nach Vollendung einer Zahnflanke um den erforderlichen, der Radtheilung entsprechenden Winkel zu drehen. Indem, wie aus der Figur zu ersehen, der Aufspannapparat auch schief gestellt werden kann, ist

es möglich, diese Maschine auch zur Herstellung von Kegeltädern zu benutzen.

In neuerer Zeit hat sich die Benutzung der Fräsmaschinen für Metallbearbeitung ungemein gesteigert; dieselben sind überall, wo es sich um fabricative Herstellung von Maschinentheilen und ganzen Maschinen handelt, mit entschiedenem Vortheil zu brauchen und lassen am besten die genaue Uebereinstimmung aller Exemplare eines gewissen Arbeitsstücks erreichen. Letzterer Umstand ist von großer praktischer Wichtigkeit bei der Herstellung z. B. der Handfeuerwaffen, der Schloßer und der Nähmaschinen.

Die zur Bearbeitung des Holzes dienenden Fräsen unterscheiden sich von den Metallfräsen wesentlich in zwei Punkten: die Schneiden sind schärfer zugespitzt und die Umfangsgeschwindigkeit ist eine erheblich größere, beides mit Rücksicht auf die Weichheit und die faserige Structur des Holzes; in den Fig. 7, 16—18 sind die hauptsächlichsten Formen der Holzfräsen (Fräsköpfe, Messerwalzen) dargestellt. Fig. 7 zeigt eine zur Herstellung ebener Flächen dienende Holzfräse, bei welcher die Schneiden eine schraubengangförmige Gestalt haben, womit eine möglichst gleichförmige Wirkung erzielt wird; die Figur läßt zugleich erkennen, wie das Anschleifen der Schneiden nach eingetretener Abnutzung zu bewirken ist: aus einer zur Fräsenachse parallelen, mit doppelten Schraubengängen versehenen Welle wird eine schmale Schleifscheibe, die in schneller Rotation begriffen ist, langsam hin- und hergeführt, unter angemessener Anstellung an die Fräse. Messerköpfe dieser Art werden in Maschinen von der durch die Fig. 2 und 9 dargestellten Anordnung zur Wirkung gebracht, indem das Arbeitsstück (ein Bret, eine Kiste u. s. w.) mittels einiger Paare geritzelter und stark belasteter Walzen darunter hingeföhrt wird. Da solche Maschinen mit großem Vortheil die sonst zur Bearbeitung gebräuchlichen Hobel erzeugen, so pflegt man sie gewöhnlich mit dem Namen Hobelmaschinen zu belegen.

Die in den Fig. 16 und 18 dargestellten Fräsen wirken mehr schabend als schneidend; die Messer stehen senkrecht zur Oberfläche des Werkstücks; dieselben dienen vorzugsweise zur Herstellung geschweifeter Keilten, in welchem Falle die Fräsmaschine die in Fig. 3 ersichtliche Anordnung erhält: eine verticale, mit großer Geschwindigkeit umlaufende Welle ragt mit dem obern Ende über einen gußeisernen gehobelten Tisch hervor und trägt hier den Fräskopf; der Arbeiter führt das Arbeitsstück in der erforderlichen Richtung diesem Fräskopf langsam entgegen, womit eine der jeweiligen Gestalt der Fräsen entsprechende Profilierung desselben zu Stande kommt.

Auch zur Herstellung von Nuten, Federn und Zapfen können rotierende Messerwalzen mit Vortheil verwendet werden, indem man den Schneiden genau die Breite des wegzuarbeitenden Holzkörpers zur Länge gibt und übrigens sie so gestaltet, daß sie zu einiger Tiefe eindringen vermögen (Fig. 17). Handelt es sich um Herstellung eines Zapfens am Ende eines Balkenstücks, so erhält die Fräsmaschine (Zapfen-schneidemaschine) die in Fig. 1 dargestellte Form; das Werkstück ist auf einen Tisch festgespannt, die Fräsenachse findet sich an einem Schlitten gelagert, welcher mittels eines Handhebels langsam vertical abwärts geführt werden kann, womit der Fräskopf zur Wirkung gebracht wird; derselbe enthält in diesem Fall zwei Messer, damit die beiden seitwärts vom Zapfen befindlichen Holzkörper weggearbeitet werden.

Sollen dagegen Breiter auf ihren Seitenflächen mit Nut und Federn versehen werden, so nimmt die Ma-





stehend beschriebenes Arrangement nur zur Herstellung kreisförmiger Oberflächen brauchbar ist, bei seiner weitem Auseinandersehung.

Die in Fig. 4 abgebildete Supportdrehbank zeigt die eben beschriebenen zwei bemerkenswerthe Abänderungen: der Spindelstock enthält außer der Laufwelle noch eine parallel zu derselben gelagerte Hülfs- oder Stützwelle, welche durch zwei Räderpaare so mit ihr verbunden werden kann, daß die auf die Stufenscheiben wirkende Bewegung erheblich verlangsamt der Laufwelle selbst mitgetheilt werden kann; da außerdem die Stufenscheiben direct mit der Laufwelle verbunden werden können, so ist es möglich, bei derselben Geschwindigkeit der Vorgelegswelle mittels einer vierzähligen Stufenscheibe acht verschiedene Geschwindigkeiten dem Arbeitsstück mitzutheilen, und so für in den Grenzen verschiedene Durchmesser desselben doch immer dieselbe vortheilhafteste Umfangsgeschwindigkeit zu erhalten. Die zweite Eigenthümlichkeit der Drehbank (Fig. 4) ist die gleichzeitige Einwirkung zweier Drehkräfte auf beiden Seiten des Arbeitsstücks, welche nicht in die Leistung der Welle auf das Doppelte erhöhen, sondern auch die Durchbiegung des Arbeitsstücks unter Einwirkung des Stahls verhindern soll; zur Aufnahme dieser beiden Stähle ist der Support in zwei Theile getheilt, die je einen Supportarm bilden, von denen jeder für sich als Kreuzsupport ausgeführt ist, d. h. in horizontalen Richtungen des Stahls nach zwei zu jeder senkrechten Richtungen zuläßt. Die Detailzeichnung solcher Kreuzsupporte ist aus den Fig. 8 und 9 mit Deutlichkeit zu erkennen.

Die Maschinenbauwerke erhalten nicht selten, um die Verwendbarkeit möglichst zu erhöhen, ein gewisses Bett (Fig. 3 und 10); unmittelbar neben dem Bettstock, unterhalb des zum Einspannen der Arbeitsstücke mit geeigneten Vorrichtungen zu versehenen Werkstückes, ist das Drehbankblatt auf eine gewisse Höhe hin ausgehoben, sodann nun auch Arbeitsstücke größerer Halbmesser, als der Spindelhöhe entspricht, wenn ihre Länge nicht zu groß ist — abgedreht werden können. Die Beliebtheit dieser Drehbankform beruht nicht auf dem Umstand, daß die am häufigsten vorkommenden Arbeitsstücke entweder lang und dünn oder kurz und dick sind; sie bildet den Uebergang zu den ausschließlich für scheibenförmige Arbeitsstücke von größerem Durchmesser bestimmten Planscheibenbänken, wie solche in Fig. 2 und 5 dargestellt werden. Zur Aufnahme des Arbeitsstücks ist hier eine große, aus dem Spindelstock aufgeworfene, mit Durchbrechungen und Nöthigen durchbohrte ebene gußeiserne Scheibe (Planscheibe); der Stock befindet sich mit dem Stahlsupport entweder einem besonderen, jedoch durch eine Fundamentplatte mit dem Spindelstock verbundenen Bett (Fig. 2), oder er kommt ganz in Wegfall (Fig. 5), sodann als nur für den Support ein besonderes Gestell erforderlich ist. Zum Abbrechen großer Riemenscheiben, Scheiben, Zahnräder, Turbinenräder u. dgl. sind die Planscheibenbänke unentbehrlich.

Als eine Verdoppelung der gewöhnlichen Planscheibenbank kann die in Fig. 7 dargestellte Räderdrehbank angesehen werden, auf welcher die durch Abzug deformirten Spurkränze der Eisenbahnwagen abgedreht werden; bei diesem Abbrechen bleiben die Räder und Spurkränze zusammen, bilden ein Ganzes, welches wegen seiner Ausdehnung und wegen der Elasticität der Achse nicht von einer Seite her anzuheben werden darf; es werden daher beide Räder Planscheiben, die eine selbständige Drehung erhalten, in Verbindung gesetzt, womit jede unerwünschte

Erzitterung der Räder beim Angriff der Drehstäbe vermieden wird; die Supports müssen eine Höhe haben, daß die Schneiden der Stäbe nahe in der Höhe der Drehungskasse angreifen.

Die Formen der bei Maschinenbauwerken angewendeten Drehstäbe sind aus Fig. 12 zu sehen; hier sind a und c gewöhnliche Schruppstäbe für Metalle, b ist ein Drehstahl für Holz, d und e sind Stäbe, bei denen ein in einen schmiedeeisernen Schaft eingesetztes Stück Dreikantstahl oder Rundstahl die zur Wirkung kommende Schneide trägt; diese Ausführungsform gestattet eine möglichst ökonomische Verwendung des Stahls und macht das sonst unvermeidliche Ausschmieden des Werkzeuges entbehrlich.

Zuweilen werden die Maschinenbauwerke mit Einrichtungen versehen, welche den Stahl nach einer krummen Linie führen, z. B. mit einer faconirten Leitschiene, gegen welche der oberste Querschieber stets durch ein Gewicht angezogen wird (Curvensupport, Fig. 15).

Nach ist einer eigenthümlichen Modification der Drehbank zu gedenken, welche die Herstellung unregelmäßig gestalteter Gegenstände gestattet, unter Benutzung eines gegebenen Vorbildes (Patrone) einen mechanischen Copirproceß vollzieht. Das Princip dieser sogenannten Copirdrehbänke ergibt sich aus der Skizze Fig. 13. Patrone und Arbeitsstück sind mittels eines zweispindeligen Spindelstockes und eines doppelten Keilstockes zwischen Spitzen eingespannt und erhalten gleich schnelle Rotation in gleicher Richtung; gegen den Umfang der Patrone wird eine glattrandige Scheibe stetig angezogen, welche sich mit einer in Drehung befindlichen Fräse auf einem gemeinsamen Querschieber befindet; die Fräse erhält daher eine gewisse von der Patrone abhängige Verschiebung und wird so, passend angestellt, die Form derselben an dem Arbeitsstück reproduciren; diese Fräse erfährt hier den gewöhnlichen Drehstahl, daher diese Maschine ebenso wohl zu den Fräsmaschinen wie zu den Drehbänken zu rechnen wäre.

## Vorbereitungsmaschinen der Spinnerei.

(Tafel 8.)

Es ist für die Maschinenbauwerke in hohem Grade charakteristisch, daß sie nicht wie die Handspinnerei mit einem Schritte von der bündel- oder haufenweisen Anordnung der Fasern zu einem feinen Faden übergeht, vielmehr zunächst auf die Bildung eines starken bandförmigen Halbfabrikats hinarbeitet, in welchem die Fasern frei von allen fremdartigen Körpern möglichst regelmäßig, gerade ausgezogen und parallelaufend nebeneinanderliegen und welches sodann erst ganz allmählich, schrittweise zu der geforderten Feinheit ausgezogen, endlich durch Zusammenziehen mit der erforderlichen Festigkeit ausgerollt wird. Man kann daher wohl zu Erlangung eines allgemeineren Ueberblicks die gesamte Maschinenbauwerke in zwei Abschnitte theilen: 1) Herstellung eines Bandes, und 2) Verwandlung dieses Bandes in Feingespinnst; die hauptsächlichsten Formen der für den ersten Abschnitt angewendeten Maschinen sind auf Taf. 8 zusammengefaßt, während die Figuren der Taf. 9 sich auf den zweiten Abschnitt beziehen.

Beginnen wir bei Betrachtung der Taf. 8 mit dem wichtigsten Faserstoff, der Baumwolle, so haben wir daran zu erinnern, daß hier die erste mit maschinellen Hilfsmitteln auszuführende Operation das Egreniren, d. h. die Trennung der Fasern von den durch sie eingehüllten Samenlern ist. Die Fig. 12 und 13 stellen zwei hierzu benutzte Maschinen im Verticalschnitt dar. Bei der Sägen-Egrenirmaschine, Fig.





Fig. 14. Die Baumwolle wird auf einem Latten- und ausgebreitet und durch zwei Paar Nisselwalzen im Schlagflügel zugeführt im Innern des Gebäudes dieser Schlagflügel besteht aus drei, oder auch nur ei Stahlschienen, welche durch mehrere Arm- uze mit einer in schneller Rotation begriffenen Welle Verbindung stehen; es werden also die erwähnten hienen auf den aus den Speisewalzen hervortreten- i Wollbart in schneller Folge und mit großer Ge- windigkeit schlagen wirken und so die etwa noch rbandenen büschelweisen Anhäufungen der Baum- lle des Weitern auflösen; unterhalb dieses Schlag- gels ist ein Koft angeordnet, durch dessen Fugen de Verunreinigungen entweichen. Die aufgeloderte umwolle paßirt nun den sogenannten Flugraum h d verdichtet sich auf dem Umfang der Siebtrommel deren Inneres stetig evacuirt wird, zu einem Blies; selbe wird von dem Walzenpaar d abgelöst, zwie- en den Walzen e, f, g, h verdichtet und endlich auf er großen Holzspule zu einem Widel i zusammen- widelt. Damit die Ablösung des Blieses von der ebtrommel c sich leichter vollziehe, wird an der eßenden Stelle der Windstrom durch einen Schirm bgegriffen, welcher durch einen Hebel m, ausba- irt durch ein Gewicht n, mit der Achse der Sieb- nnel fest verbunden ist; diese Achse steht fest und dreht sich die Siebtrommel mit Hohlzapfen auf ihr. i Fig. 15 ist eine modificirte Anordnung der Schlag- d Widelmaschine dargestellt; es bezeichnet hier a den Schlagflügel, c d den Koft, b den Flugraum, e und f ei die Siebtrommel erscheinende endlose Siebtücher, die Comprimirungswalzen, hinter denen der Widel- parat folgt; bei h und i münden die nach einem indrad führenden Saugansätze l und m, durch welche e Abführung des Staubes aus der Baumwolle er- gt; k ist ein Behälter zur Aufnahme durchfallender rwerer) Verunreinigungen, zugleich zum Abfluß e Luft nach unten dienend. Damit man für kurze umwollen die wirksame Kante des Schlagflügels glichst der Stelle nähern kann, an welcher die Fest- lung des Wollbarts stattfindet, hat man die Zu- rungs walzen oftmals, wie Fig. 16 zeigt, durch eine ude a und eine darüber gelagerte Stadelwalze b ert, welche Theile sich ziemlich nahe an die (von den Ar- n g geführte) Schlagfläche anstellen lassen; man eichnet diese Einrichtung mit dem Namen Muden- führung.

Die äußere Erscheinung der Schlag- und Widel- schinen ist auf unserer Tafel durch die perspectiv- en Bilder Fig. 9 und 10 wiedergegeben.

Das auf diesen Maschinen erzeugte Blies gelangt lich auf die Krempel, Fig. 7, deren Aufgabe in : nochmaligen gänzlichen Auflösung aller Faserbü- el mittels der allerfeinsten Werkzeuge (Krazen) und der Zusammenfügung der Fasern zu einem noch ichmächtigern Blies oder Band besteht. Die eigen- mliche büschelfasernde und fasernvereinigende ertungsweise der Krazen, des wichtigsten Wert- es zur Vorbereitung der kurzfasrigen Ge spin- ste, mag zunächst mit Hülfe der schematischen 3. 17 und 18 erläutert werden. Dieselben stellen ei Paar Krazen, mit Drabthälchen von wink- ligen Gestalt dicht besetzte Leberblätter, in zwei schiedenen Arten des Zusammenwirkens dar; bei 3. 17 sind die Drabthälchen in der Richtung ihrer icken entgegengesetzt; denkt man sich daher die un- e auf irgendeine Weise mit Baumwollbüscheln be- zt und in Ruhe befindlich und die obere (b) nach bis darüber hinwegbewegt, also entgegengesetzt der Rich- 3 des eingezeichneten Pfeils, so werden die Häl-

chen der letztern von allen den Stellen der erstern, wo Baumwolle im Ueberfluß aufliegt, einen Theil dersel- ben wegnehmen und an solche Stellen, welche frei ge- blieben sind, absetzen, sobald demnach eine Auflösung der Faserbüschel und eine gleichmäßige Anordnung der Fasern auf beiden Krazen das Resultat dieser einfachen Operation sein wird. Fig. 18 zeigt dagegen zwei Krazen, deren Hälchen nach derselben Richtung abge- bogen sind; ist die obere (a) mit Fasermaterial er- fällt und bewegt sie sich in der Richtung des einge- zeichneten Pfeils über die untere hin, so wird das gesammte Material in die untere Krage übergehen. Auf diese beiden Benutzungsarten gründet sich die eigentliche Wirkung der Krempelmaschinen, in welchen um eine mit Krazen besetzte und schnell rotirende große Walze (Trommel, Tambour) eine Anzahl kleinere Wal- zen (Arbeiter und Weuder) oder mit Krazenbesatz versehene festliegende Deden oder Walzen und Deden zugleich so angeordnet sind, daß die mittels eines Speiseapparats zugeführte Baumwolle in Einzelfasern aufgelöst und zu einem zarten, an den Drabthälchen des Tambours sitzenden Blies umgestaltet wird, wel- ches, auf den Umfang einer folgenden Walze (des Fil- lets) übertragen, gleichzeitig durch Zusammenziehung der Fasern verdichtet, endlich mittels einer feinzähni- gen, in schneller Schwingung begriffenen Stahlsch- schiene (Hader) abgelöst, mittels eines Trichters zu einem Band zusammengezogen und in einen Wicetopf abgeführt wird. Die in Fig. 7 dargestellte Krempel, aus der Fabrik von Schimmel und Comp. in Chem- niz, enthält sowohl Weuder und Arbeiter als auch Dedel, und für letztere einen selbstthätig wirkenden Ap- parat zum Ausputzen derselben; sie repräsentirt also diese Maschinengattung in ihrer heutigen vollkommene- sten Gestalt.

Wenn wir uns zu den Vorbereitungsmaschinen für die Schafswolle, so haben wir uns mittels Fig. 4 zunächst mit einer der am häufigsten angewendeten Waschmaschinen bekannt zu machen, auf welcher der an den Wollhaaren lebende Fettzschweiß entfernt wird. Man behandelt die Wolle in einem großen höl- zernen oder metallenen Trug, in der Figur abgebro- chen dargestellt, mit warmem Seifenwasser, welches den Fettzschweiß löst, und entfernt sodann den größten Theil der anhängenden Flüssigkeit mittels eines Walzenpaares, durch welches die mit Rechen ausgeschöpfte Wolle hin- durchgehen muß. Die untere Walze ist von Gußeisen, glatt abgedreht, die obere mit Wollband überzogen, also in gewissem Grade weich und elastisch, und durch Gewichtshebel stark belastet. Es muß also ein Aus- pressen der Wolle erfolgen; dieselbe wird endlich mit- tels eines Lattentuchs in einen Korb befördert und erfährt ihre vollständige Trodnung in einem Troden- raum oder mittels einer Trodenmaschine.

Für die Vorbereitung der kurzhaarigen Schafswolle (Streichwolle) ist der in Fig. 2 dargestellte Reißwolf von einiger Wichtigkeit, welcher die erstmalige Auf- lodern der Wolle zu besorgen hat. Innerhalb eines halbcylindrischen Gebäudes dreht sich eine mit Stahl- spitzen ringsum besetzte Trommel, welcher die Wolle mittels eines aus Lattentuch und Nisselwalzen bestehen- den Speiseapparats entgegengeführt wird; durch eine im Gebäude angebrachte, dem Speiseapparat gegenüber- liegende Oeffnung wird alsdann die aufgeloderte Wolle wieder herausgeschleudert. Benutzt man diese Maschine zur Bearbeitung der für den Krempelproceß mit Del benetzten Wolle, so gibt man ihr den besondern Na- men Delwolf.

In Fig. 6 ist ein sogenannter Kettenwolf dar- gestellt, welcher die nicht ganz leichte Aufgabe zu lösen

hat, die in mancher Schafwolle reichlich vorhandenen harten Samenkerne (Kletten) vollständig und ohne Wollverlust zu entfernen; der wesentlich wirksame Theil dieser Maschine ist eine mit feinzahnigen, tangential gestellten Stahlschienen besetzte Walze (Klettenwalze), auf deren Umfang die klettenhaltige Wolle aufgestrichen (aufgebürstet) wird, dergestalt, daß die Kletten auf der Innenseite freiliegen und mittels einer schnell umlaufenden Messerwalze abgeschlagen werden können: eine der hinreichenden Maschinen der Wollspinnerei.

Von den zur Gewinnung des Flachses dienenden Flachs- und Fasermaschinen wurden als besonders charakteristisch zwei Flachs- und Faserbrecher (Fig. 3 und 8) auf die vorliegende Tafel aufgenommen. Dieselben sollen den holzigen Theil der Flachsstengel, nachdem der die Flachsfasern mit demselben verbindende gummiartige Stoff durch den Röstproceß zerstört worden ist, in kurzen Zwischenräumen zerbrechen, sodas die vollständige Abstreifung dieser holzigen Theile auf der Schwingmaschine sich mit Leichtigkeit vollzieht. Bei der in Fig. 8 dargestellten Brechmaschine befinden sich zwei Reihen oder Gruppen gußeiserner Hebel in schwingender Bewegung gegeneinander; die Kanten derselben streifen ein wenig übereinander, sodas dazwischengehaltene Flachsstengel brechen müssen. Fig. 3 zeigt die zu besonderer Verbreitung gelangte Gault'sche Flachs- und Faserbrecher, deren wirksame Theile zwei Paar geriffelte Walzen sind, zwischen welchen die auf einem Tisch ausgebreiteten Flachsstengel hindurchgehen. Die von allen Holztheilen befreiten Flachsfasern unterliegen später einem sogenannten Hebelproceß, durch welchen die langen Fasern (Langflachs) von den kurzen (Werch) vollständig getrennt werden. Aus erstem wird in sehr einfacher Art durch Aufwickeln einzelner Hölse aus dem endlosen Tuch einer Anlage ein endloses Band erzeugt, während für das Werch die schon oben besprochene Krempel in Anwendung zu bringen ist. Ueberhaupt bildet die Krempel, wie man sagen kann, ein Universalwerkzeug zur Uebersührung alles kurzfasrigen Gespinnstmaterials (Baumwolle, Schafwolle, Werch, Floretseide) in die Form gleichmäßig beschaffener Bliese oder Bänder, deren Umwandlung in fertiges Gespinnst sobald mit Leichtigkeit erfolgen kann.

### Vor- und Feinspinnmaschinen.

(Tafel 9.)

Nachdem mittels der Krempel- oder anderer Vorbereitungs- und Spinnmaschinen die spinnbaren Fasern der Baumwolle, Schafwolle u. s. w. in einer solchen Art zusammengefügt sind, daß sie ein fortlaufendes Blies oder Band von einiger Consistenz bilden, handelt es sich zur Umwandlung desselben in fertiges Garn oder Feinspinn um Herstellung höchster Gleichförmigkeit dieses Bandes hinsichtlich seiner Dike durch wiederholtes Zusammenlegen mehrerer Bänder (Dubliren), sodann um möglichste Geradlegung aller Fasern nach der Richtung der Länge des Bandes durch Anziehen oder Strecken der dublirten Bänder, hierauf um schrittweise Verdünnung desselben durch fortgesetztes Strecken unter gleichzeitiger Ertheilung einer der erforderliche Consistenz des Fadens erzeugenden schwachen Drehung (Vorspinnen), endlich um Verdünnung des Vorgarns zu der vom Feinspinn geforderten Feinheit und Herbeiführung der notwendigen Festigkeit desselben durch stärkeres Zusammenziehen (Feinspinnen).

Unsere Tafel enthält die Repräsentanten der wichtigsten zu diesen Operationen benutzten Arbeitsmaschinen.

Das bloße Zusammenlegen mehrerer Bänder, die von einer Reihe nebeneinanderstehender Krempeln herkommen, bewirkt die in Fig. 4 dargestellte Kanal-

maschine. Dieselbe enthält zwei abwechselnd umlaufende Holzspulen, auf welche die aus den Krempeln kommenden Bänder zusammenzuführenden schmalen, krempelmäßigen Schichten aufgewickelt werden. Die Spulen werden durch dadurh vermittelte, das Abwickeln von einer Spule mit angemessenem Druck auf die andere Spule mit angemeßener Drehung bewirkt. Die regelmäßige Ueberschiebung der Bänder erfolgt auf einem endlosen, in einem spanntem Zustand horizontal verlaufenden, aus 10 oder 12 Krempeln entlang laufendem, oben offenen langen Kasten, des letzteren unteren Theil, da es nicht wahrscheinlich ist, daß die Bänder zusammenlegen eine zufällig bidere Lage des Bandes gerade mit dicken Stellen allerwärts zusammenstößt, vielmehr die fehlerhaften Stellen einzelner Bänder im fertigen Band nicht hervortreten, so wird erklärlich, wie ein solcher Proceß die Gleichförmigkeit des Fadens seiner Stärke erhöht. Die verkehrte Anwendung der Dublirmaschine findet ihre Anwendung in der Baumwollspinnerei zwischen dem ersten Krempelproceß, sowie nach dem letzten.

Eine andere hierher gehörige Maschine (Fig. 2) dargestellte Streck- und Dublirmaschine, eine Streck- und Dublirmaschine und Verziehen (Strecken) der Baumwollspinnerei, die Maschine von ziemlich universaler Anwendung der Verpinnung aller möglichen Fasern, deren Theile derselben sind paarweise Walzen, welche das zusammengelegte Band zwischen zwei Walzen durchziehen und durch die Walzen auf eine fünf- bis sechsfache Länge ausziehen, daher die Fasern in der Bandbreite strecken. Die Aufsammlung des so gestreckten Bandes geschieht in Töpfen aus Eisenblech, in unserer Figur dargestellt ist. In der Figur nennt man diese Maschinen Durchziehmächinen, werden zumest wiederholt nacheinander um eine völlig gestreckte Lage der Fasern gleichförmige Bandbeschaffenheit zu erzielen, von einer ersten, zweiten, dritten u. s. w. spricht.

Solange mit dem Strecken ein Band geht, behält das Band hinsichtlich der Operationen des Einlegens und des Wiederaushebens ohne Schaden, so erlangt das Band allmählich eine gewisse Festigkeit, die Gefahr häufigen Abreißens mit sich bringt, man nicht Mittel ergreift, seine Festigkeit ein solches Mittel ist die vorübergehende Zusammenziehung des Bandes durch Strecken, durch welche die Fasern einander näher zu innigerer Verwicklung, zu festeren Zusammenhängen gebracht werden; diese durch die Strecken bewirkte gegenseitige Annäherung der Fasern nicht so weit geführt werden, daß das Band zu dünn oder gar vermindert würden. Mit der Streckung eine solche Tragfähigkeit der Consistenz des Fadens bewirkt, die im engeren Sinne Vorspinnmaschinen sind. Zwei Arten, solche für vorübergehende und solche für bleibenden Drabt.

Eine Vorspinnmaschine der ersten Art (Fig. 5) dargestellte Rota-Trotteur-

dem gewöhnlichen Streckwert ein sogenannter Wärgelapparat vorhanden, welcher die hindurchpassierenden Fäden oder Fäden nach erfolgter Streckung abwechselnd nach links und rechts zusammendreht; derselbe ahmt die Wirkung nach, welche man mit den flachen Seiten der zusammengelagerten Hände ausübt, wenn man ein gewisses gelegtes Band zusammenwürfelt; er besteht nämlich für jedes einzelne Band aus einem einlopfen, in gespanntem Zustand über zwei Walzen gelegten Oberstreifen, auf welchen in der Mitte des obren freilegenden Stücks eine mit Leder überzogene Walze gedrückt ist; diese beiden Organe fassen das Band zwischen sich und erhalten außer einer fortlaufenden Rotationsbewegung, durch welche das Band vom Streckwert nach dem Beschöpf transportirt wird, eine schiefelnde Hin- und Herschiebung in horizontaler, zur Längsrichtung normaler Richtung, wodurch die erwähnte Umdrehung des Bandes in wechselnder Richtung folgt.

Als Vertreter der Vorspinnmaschinen für bleibenden Fäden können die in Fig. 1 und 3 dargestellten Flyer der Spulenbänke dienen; hier wird das gestreckte Band von den Vorderzylindern nach der centralen Befestigung eines gabelförmigen Flügels, der in schneller Rotation begriffen ist, geführt und passiert durch einen hohlen Arm desselben nach einer innerhalb des Flügels befindlichen, auf dessen Achse oder Spindel aufgestellten dünnen Spule, die eine selbständige Drehung in jedem Maße empfangt, das gerade die vom Streckwert angelieferte Fadenlänge in Form regelmäßig übereinandergelegter Windungen auf die Spule aufgewickelt wird. Es ergibt sich hieraus, daß dem Faden zwischen Streckwert und Flügel eine bleibende Drehung und damit die gerade notwendige Festigkeit ertheilt wird, während gleichzeitig die in möglichster Schonung des Bandes dienende regelmäßige Zusammenwicklung desselben in einer Spule zu Stande kommt. Jeder Flyer enthält eine größere Anzahl (40—100) in zwei Reihen geordnete Spindeln mit Flügeln und Spulen, um daher eine gleiche Zahl Vorgarnfäden gleichzeitig arbeiten. Diese Maschine findet in den verschiedenen Fäberrereien eine ähnliche allgemeine Verwendung wie die Stredde.

In einer gänzlich abweichenden originellen Art erzeugt bei der Verspinnung der kurzen Schafwolle (Streichwolle) die Bildung des Vorgarns aus dem Faden der letzten Krempel durch einen auf diese Krempel (Vorspinnkrempel) selbst angebrachten Apparat. Während bei Verspinnung von Baumwolle, Flachswolle langer Schafwolle das Bestreben zu erkennen ist, ein Feingespinnst von recht glatter, schlücker Beschaffenheit mit gerade ausgefreckten Einzelfasern zu erzielen, so wird man umgekehrt bei der Streichwolle einen Faden von rauher Beschaffenheit, mit querliegenden Fasern, deren Enden aus der Oberfläche hervortragen, zu spinnen, um mit aus solchem Gespinnst erzeugten Gewebe (wie Tuche) die Eigenschaft der Wassfäbigkeit besitzen, welche die nebeneinanderliegenden Fäden sich unter Einwirkung von Feuchtigkeit, Wärme und steter Bewegung leicht verschieben. Hierdurch werden die Streck- und Duplicationsprocesse entbehrlich, und man kann in der Operation von dem Krempelstiel zu dem Vorspinnst gelangen, wenn man dieses Wies nach der Reihe in Bänder zerlegt, die man durch Wärgelapparate in runde Fäden (Vorgespinnt) umwandelt. Die Herstellung dieses Wieses geschieht an dem Umfang des unter dem Tambour unmittelbar folgenden Feigzurs, dessen Krabenbeslag aus schmalen, durch eine Zwischenräume voneinander getrennten ringförmigen Streifen besteht, daher das Wies von diesem

Feigneur sich in Gestalt vieler nach der Länge fortlaufender Streifen ablösen wird. Will man besondere Sicherheit haben, daß diese Streifen sich nicht untereinander berühren, so läßt man die Ablösung derselben durch zwei Fäden, von denen der eine für den ersten, dritten, fünften Streifen, der andere für den zweiten, vierten, sechsten Beschlagstreifen mit Nähen versehen ist, bewirken und bringt sodann auch zwei Wärgelapparate und zwei Widelapparate in Verwendung. Eine solche Vorspinnkrempel mit einem Feigneur und zwei Fäden zeigt Fig. 12, wogegen in Fig. 13 eine solche Krempel mit nur einem Faden zur Darstellung gebracht ist.

Der letzte Schritt in der Erzeugung der Gespinste ist das Feinspinnen; das Vorgarn wird in solchem Verhältnisse ausgezogen (gestreckt), daß die am Feinspinnst geforderte Feinheit zu Stande kommt; sodann erhält der Faden eine bleibende und hinreichend scharfe Zusammenwicklung, womit eine starke Annäherung der Fasern aneinander verbunden ist und eine Ueberführung derselben in die schraubenangsförmige Lage; endlich muß die nun sehr beträchtlich gewordene Fadenlänge in einer regelmäßigen, die später erfolgende Wiederabwicklung leicht gestattenden Anordnung aufgewickelt werden. Je nachdem diese drei Operationen gleichzeitig oder abwechselnd erfolgen, unterscheidet man zwei Arten Feinspinnmaschinen, die Water- und die Mulemaschinen. Die ersten haben in ihrer Anordnung große Ähnlichkeit mit dem Flyer (Fig. 1 und 3); wie dieser enthalten sie ein Streckwert, für jeden Faden einen die Drahtgebung bewirkenden Flügel und eine zur Aufnahme des Gespinstes dienende hölzerne Spule (Fig. 9 und 10); aber während diese Spule beim Flyer wegen der zarten Beschaffenheit des Vorgarns eine selbständige Drehungsbewegung von der Antriebswelle her empfängt, wird sie hier nur durch den in der Aufwicklung begriffenen Faden nachgezogen, wobei die aus ihrem Gewicht entspringende Reibung auf ihrer Unterstüßungsfläche die angemessene Spannung dieses aufzulauenden Fadens hervorbringt. Aus dieser Anordnung folgt schon, daß eine gewisse durch stärkeres Zusammenwickeln erzeugte Festigkeit im Gespinnst vorhanden sein muß, wenn nicht ein häufiges Abreißen des Fadens eintreten soll. Will man daher eine weiche Beschaffenheit des Feingespinnstes, wie sie für manche Verwendung, z. B. zur Erzeugung von gewirkten Waaren, erforderlich ist, darf man daher nur schwächeren Draht ertheilen, so ist die Water-Feinspinnmaschine nicht verwendbar und es muß die Mule-Feinspinnmaschine in Anwendung kommen, wie in den Fig. 6, 7, 11, 14—16 in verschiedenen Anordnungen dargestellt ist. Bei dieser erfolgt das Strecken und Zusammenwickeln der Fäden zwar gleichzeitig, aber die Aufwicklung geschieht intermittierend; jedesmal nach Vollendung einer gewissen Fadenlänge von etwa 1,5 Meter, wobei der eigentliche Spinnproceß unterbrochen ist. Die Aufwicklung erfolgt nicht auf hölzerner, mit Scheiben versehene Spulen, wie in den Fig. 9 und 10 dargestellt, sondern auf eine eiserne oder stählerne schlangenförmige Spindel von der aus Fig. 8 ersichtliche Form.

Ein bemerkenswerther Unterschied besteht zwischen denjenigen Mulemaschinen, welche aus Baumwolle, langer Schafwolle u. s. w. glatte Garne erzeugen sollen, und den für raube Garne (Streichgarne), aus kurzer Schafwolle bestimmten; bei den ersten, wo im Vorgespinnst von hoher Gleichförmigkeit bereits vorliegt, bewirkt man den Streckproceß mittels eines Streckwerts der gewöhnlichen Art, bei den letztern aber zwischen einem Zuführungsrollenpaar und der die Drahtgebung



bewirkenden sowie zur Aufwindelung benutzten Spindel, indem letztere sich von den Zuführungswalzen auch noch dann entfernt, wenn diese schon stillstehen. Die Spindeln, an deren Umfang man sich den Faden befestigt zu denken hat, stehen um einen kleinen Winkel gegen die Verticale geneigt und empfangen während des ganzen Spinnprocesses eine schnelle Rotationsbewegung; sie ertheilen daher dem Faden bleibenden Draht. Es folgen nun Drahtgebung und Stredung gleichzeitig, wie bei der Streichgarnmule, so werfen sich die in den Faden gelangenden Drehungen zuerst nur auf die etwa vorhandenen dünnen Stellen, welche der Zusammenziehung den geringsten Widerstand entgegensetzen; hierdurch erhalten diese eine solche Festigkeit, daß sie dem Ausziehen nun größeren Widerstand entgegensetzen als die übrigen didern und nur noch wenig gedrehten Stellen, daher sich die Stredung vorzugsweise auf die letztern wirft; es wird auf solche Art durch den Feinspinnproceß zugleich die wegen ungleicher Dide des Vorgarns nothwendige Egalisirung der Fadendide erzielt. Hierdurch erklärt sich auch die etwas abweichende Einrichtung der an den Streichgarnmulen vorkommenden Mechanismen (Fig. 6 und 7).

Bei den Mulefeinspinnmaschinen ist die Zahl der auf einer Maschine gleichzeitig hergestellten Fäden sehr groß (200 bis 1000); die in entsprechender Zahl vorhandenen Spindeln stehen in einer Reihe auf einem langen, durch Schienengleise geführten Wagen, welcher abwechselnd von dem das Stredwerk enthaltenden Gestell sich entfernt (Spinperiode), um sich sodann demselben wieder zu nähern (Aufwindungsperiode). Bei den sogenannten Handmulen geschieht die Wagenbewegung während der letzten Periode (die Wageneinfahrt), wie auch die Spindeldrehung und die Vertheilung der Windungen auf der Spindel durch einen Arbeiter, wogegen bei den jetzt zumeist gebräuchlichen Selfactors alle Bewegungen ohne Ausnahme von der Rotation der Antriebswelle abgeleitet werden. Die Fig. 11, 14 und 15 sollen die äußere Erscheinung verschiedener Selfactors zur Anschauung bringen.

## Zwirn- und Klöppelmaschinen.

(Tafel 10.)

Die vorliegende Tafel faßt diejenigen Maschinen gattungen in ihren Hauptrepräsentanten zusammen, welche die Vereinigung von zwei oder mehr einfachen Fäden zu stärkern fadenförmigen Producten (Zwirne, Schnuren, Seile, Tane u. s. w.) zu bewirken bestimmt sind. Eine solche Vereinigung kann entweder durch Zusammenziehen oder Zusammenflechten (Klöppeln) geschehen.

Die einfachste, auch zum eigentlichen Spinnen brauchbare Vorrichtung ist das Seilerrad, von welchem Fig. 1 eine zweckmäßige Anordnung darstellt. Dasselbe enthält eine Anzahl horizontale Spindeln, welche am äußeren freiliegenden Ende hakenförmig umgebogen sind und vermittels einer geeigneten maschinellen Einrichtung eine schnelle rotirende Bewegung erhalten; bei der auf unserer Tafel dargestellten Anordnung wird diese Bewegung mittels einer Schnurscheibe hervorgebracht, über welche eine Treibschnur gelegt ist; der Arbeiter, welcher bei dem Spinnen und Zusammenziehen rückwärts schreitet, zieht die eine Seite dieser Treibschnur an und versetzt so die Scheibe in Drehung, wogegen bei den ältern Seilerrädern hierzu ein besonderer Arbeiter erforderlich war. Soll dieser Apparat zum Spinnen gebraucht werden, so zieht der Arbeiter aus einem Büschel des rohen Fasermaterials, z. B. Flachwerch, einige Fasern heraus, dreht dieselben mit den Fingern zu einem Fadenstück zusammen und be-

festigt dasselbe an einem der Fäden; nun langsam rückwärts bewegt, mit einer Seit von 400—500 Millimeter per Rev., den immer neue Fasern aus dem so benannten Materialquantum herausgezogen, der Drehung des Fadens angemessen dreht. Sollen nun zwei oder mehrere Schnuren zu einem stärkern Faden (Ligen) vereinigt werden, so befestigt an denselben an einem andern, in entgegen gesetzter Richtung rotirenden Faden und dreht so, wobei die entgegengesetzten Enden gebogen an einem Faden, welcher an einem Spindel feststeht, angehängen werden. Zudem man sich nun bei der Vereinigung der Einzeladern, welche wählt zu demjenigen bei deren Faden man erfahrungsgemäß einen bestimmten Zusammenstoß dieser Fäden.

Für den ausgebehrtten fabrikanten an die Stelle des Seilerrades die eigentlichen Maschinen, von denen unsere Tafel 2 und 7 ein paar Anordnungen zeigt. Am dargestellten Spindelschnurenmaschinen gleichzeitig drei Ligen aus je drei einzeln zusammengebrocht und diese drei Ligen zusammengebrocht zu einer einzigen Schnur, hier zusammenwirkenden beweglichen des sich um eine horizontale Spindel, auf eines Treibriemens und der am linken Maschine sichtbaren Riemenscheiben drehen übertragen wird; diese Spindel trägt ein Grad gegeneinander verstellte Rahmen, in welchem je drei Garnspulen angeordnet, drehbar eingelagert sind; innerhalb jedes werden die drei von den Spulen kommenden Fäden durch ein in der Drehungsachse befindliches einem Faden vereinigt und gleichzeitig in Form zusammengebrocht; es erhalten die Vorrathshälter für das Fadenmaterial in kleinen Rahmen außer ihrer Drehung auf der Spindel noch eine besondere Drehung zu dieser Spindel parallele Achse, und eines zur Hauptwelle concentrischen, fest befestigten Stirnrades, auf welchem sich auf die erwähnten Rahmen treibend und abwälzend abwälzen. Die drei so gebildeten schließlich am rechtseitigen Ende der Fäden einer gemeinsamen centralen Austrittsöffnung und die hier entstehende didere Schnur dreier rotirender Walzen, von denen gegen die dritte untere angepreßt werden gezogen und fällt frei herab.

Bei der in Fig. 7 dargestellten Seilerrad übrigen auf gleichen Principien beruhend, erfolgt eine regelmäßige des erzeugten Seils auf eine große Einwirkung der geradlinigen Auf- und Abwärtsbewegung. Alle größeren Seilmaschinen derartigen Widellapparaten ausgerüstet.

Zu vielen Fällen genügt ein einfacher Legungsproceß zur Herstellung eines Seils (z. B. Rähzwirn, Stridgarn, Kettenzwirn u. s. w.); alsdann ist das Princip des Werkzeuges mit Vortheil angewendet. Man sieht hier in dem obersten Theil der Latten zusammengefügtes Gestell, aus dem einfachen Fäden gefüllten Spulen von drei, vier oder fünf Spulen kommen, den nach einem gemeinsamen Dreh gewir-

Dann zwei auseinandergepreßte Walzen, welche von einer Antriebswelle aus eine gleichmäßige Drehbewegung empfangen, daher die zusammengelegten (unbirtten) Fäden mit unveränderlicher Geschwindigkeit vorwärts ziehen; dieselben erhalten hierauf durch einen rotirenden Flügel, dessen Einrichtung bei Beschreibung der Waterfeinspinnmaschine dargelegt wurde, die erforderliche Drehung und werden endlich auf Spulen, die in der Figur fortgelassen sind, in regelmäßigen Bindungen aufgewickelt.

Mit solchen Spinnmaschinen sind die auf unserer Tafel angenommenen Spulmaschinen nahe verwandt (Fig. 8 und 9); die Vereinigung mehrerer Fäden fällt hier in der Regel weg und es verbleibt nur der Aufwindungsproceß, indem solche Maschinen beschaffen sind, die zu Webwaren verarbeitet werden sollen, aus der im Handel gebräuchlichen Form der Strähne die Form von Spulen überführen sollen. Diese Spulen sind von zweierlei Art: Scheibenspulen oder aufspulen, bei denen das Abwindeln in der Richtung senkrecht zur Achse möglich und hierbei die Drehung der Spulen erforderlich ist, und Schleifspulen (Cops), welche während der Abwindelung feststehen und bei einem das Abziehen des Fadens in der Richtung der Achse zu bewirken ist; die ersten finden zur Herrichtung der Kette, die letztern zur Einführung des Schusses Verwendung; bei jenen bilden die einzelnen schraubenförmigen Bindungen kreisförmige Schichten auf einem hölzernen Rohre, an dessen Enden dünne Scheiben sitzen, bei diesen setzen sich die einzelnen Bindungen zu kegelförmigen Schichten zusammen, welche sich auf dem kegelförmigen Ende der Spule übereinanderlagern. Hieraus ergibt sich der notwendige Unterschied in der Einrichtung der Ketten- und Spulmaschinen (Fig. 8) und Schleifspulmaschinen (Fig. 9); bei ersten geben die Fäden von dem leicht drehbaren Haspel über eine Scheibe, welche in langsamer Auf- und Abbewegung begriffen ist, nach den schnell rotirenden, auf verticalen Spindeln stehenden Spulen; bei letztern treten sie durch einen verticalen Schlitz eines feststehenden Hohlkegels, in welchem die in Drehung begriffene Spule mit ihrem kegelförmigen Ende berührend eingesteckt ist und in dem Maße, wie die Aufwindung vorwärtreitet, höher aufsteigt; hier muß also die Spule mit ihrer Spindel so verbunden sein, daß sie zwar an der Drehbewegung theilzunehmen gezwungen ist, jedoch eine Verschiebung in der Richtung der Höhe erleiden kann.

Bei den Klöppel- oder Flechtmaschinen (Fig. 5 und 6) erfolgt eine eigentliche Verschlingung der einzelnen Fäden, ähnlich wie bei der Herstellung der Geflechte von Hand; die Fäden theilen sich in zwei Gruppen, von welchen die Fäden der einen Gruppe wie rechtsgängige, diejenigen der andern wie linksgängige Schraubenlinien verlaufen; jeder Faden der einen Gruppe geht abwechselnd über und unter einem Faden der zweiten Gruppe hin, jedoch hier auf einer einseitigen Oberfläche eine ähnliche Verschlingung der Fäden entsteht, wie bei den leinwandbindigen Geweben zwischen den Fäden der Kette und des Schusses. Das zu einem Stamme kommende Fabrilat bildet ein biegsames Rohr, welches durch eine passende Anzahl lose zusammengelegter Fäden mit einem Kern ausgefüllt werden kann; auch ist es möglich, feste Körper, Versteifungsstücke u. s. w. zu überflechten. Die zusammengeflochtenen Fäden sind auf Spulen aufgewickelt, welche treibbar auf besondere rohrförmige Klöppel (Fig. 6) aufgeschoben sind, die man durch rotirende sternförmige Treiber in zwei wellenförmig gestalteten, sich abwechselnd durchdringenden und in sich zurücklaufenden Bahnen

fortschieben läßt; damit alle Fäden mit derselben constanten Spannung in das Geflecht eintreten, läßt man sie, wie Fig. 6 zeigt, durch das Dehr eines in der Höhlung des Klöppels untergebrachten Spannungsgewichts passieren; die gleichmäßige Dichtigkeit des Geflechts wird außerdem durch ein ganz gleichmäßiges Abziehen der geflochtenen Schnur mittels zweier rotirender Walzen gesichert, um welche dieselbe herumgeführt wird, worauf die regelmäßige Aufwindung auf eine Spule erfolgen kann. Wie man an demselben Gestell eine größere Zahl von Klöppelwerken vereinigen kann, welche eine gemeinschaftliche Antriebswelle haben, zeigt die Fig. 5 unserer Tafel.

Für feinere Erzeugnisse der hier besprochenen Art (Nähzwirn, Bindfaden, Stridgarn u. s. w.) wird zuweilen die Aufwindung derselben zu regelmäßig gebildeten Knäulen gefordert; daher erschien es angezeigt, auch eine Knäuelwindmaschine (Fig. 4) auf die vorliegende Tafel aufzunehmen. Hier wird die aufzuwindende Schnur durch die hohle Achse eines rotirenden gabelförmigen Flügels und durch ein an einem Arm desselben befindliches Dehr nach einer Spindel geführt, welche gleichzeitig zwei verschiedene Bewegungen ausführt: eine langsame Drehung um ihre horizontale geometrische Achse und eine noch langsamere Oscillation um eine verticale Achse; die letztere Bewegung macht, daß die erzeugten schraubengangförmigen Bindungen allmählich ihren Neigungswinkel gegen die Achse des Knäuels ändern, womit überhaupt die nöthige Haltbarkeit des Ganzen zu Stande kommt. Die in Fig. 4 dargestellte Knäuelwindmaschine ist für Handbetrieb und für gleichzeitige Herstellung dreier Knäule bestimmt.

## Webstühle.

(Tafel 11.)

Die auf vorliegender Tafel dargestellten maschinellen Hilfsmittel dienen zur Herstellung der Gewebe im engeren Sinne, d. h. solcher flächenartig ausgebreiteter Fabrilate, welche durch regelmäßige Verschlingung zweier unter rechtem Winkel verlaufener Systeme fadenförmiger Körper (Gespinnste von Baumwolle, Schafwolle, Flach, Seide u. s. w.) gebildet sind; das eine Fadensystem (Kette) erstreckt sich nach der Länge des Gewebestücks, das andere (Schuß) nach der Breite desselben; das erstere besteht aus vielen einzelnen sehr langen Fäden, welche vor der eigentlichen Weboperation durch eine besondere Arbeit (das Scheren) parallel nebeneinander gelegt und auf eine hölzerne Walze (Kettenbaum) straff aufgewickelt (aufgebäumt) werden; das andere Fadensystem wird durch einen einzigen Faden erzeugt, welcher über die Breite des Gewebestücks in geraden Lagen hin- und herläuft, an den Rändern desselben umförmig und denselben eine gewisse Haltbarkeit verleihend. Die Verbindung der beiden Fadengruppen geschieht nun so, daß der Schußfaden in regelmäßigem Wechsel unter einigen und über den übrigen Kettenfäden verläuft und daß in jeder folgenden Lage des Schußfadens eine andere Vertheilung der Kettenfäden in oberhalb und unterhalb liegende erfolgt. Die größte Zahl von Verschlingungen (Bindungen) zwischen Schuß- und Kettenfäden findet bei der Leinwand statt; hier nimmt der erste Schußfaden seinen Lauf über den ersten, dritten, fünften, unter den zweiten, vierten, sechsten Kettenfaden, der zweite über den zweiten, vierten, sechsten und unter den ersten, dritten, fünften Kettenfäden; der dritte Schußfaden hat wieder dieselbe Lage wie der erste, der vierte dieselbe wie der zweite u. s. w. Derjenige Theil des Webstuhls, welcher die regelmäßige Theilung der gesammten Kettenfäden in die für jeden einzelnen

Schussfaden erforderlichen zwei Gruppen bewirkt, heisst das Geschirr. Die Anordnung desselben für das Leinwandgewebe ergibt sich aus Fig. 13, worin a b die horizontal ausgespannte Kette bezeichnet, c das sogenannte Blatt, ein leichter hölzerner Rahmen von einer der Gewebebreite entsprechenden Länge und mit einer großen Zahl parallel verlaufender verticaler Stäbchen (Riete) versehen (Fig. 7), zwischen welchen die Kettenfäden einzeln oder zu zweien oder dreien hindurchgeführt sind; hierdurch werden die Kettenfäden in gleichmäßiger Vertheilung über die Stuhlbreite erhalten, sowie die Zusammenschiebung der eingetragenen Schussfäden sich mittels einer Horizontalschiebung des Blattes leicht bewirken lässt;  $d_1$ ,  $d_2$  sind die sogenannten Schäfte, deren jeder (wie Fig. 12 zeigt) aus zwei horizontalen Latten besteht, welche mittels verticaler Schnuren (Ligen) eine Reihe kleiner Drahtösen (Zeugringelchen) eingebunden enthalten, durch welche je ein Kettenfaden hindurchgezogen ist; die beiden Rollen sind oberhalb durch zwei über Rollen e geführte Schnuren verbunden, unterhalb stehen sie durch je zwei andere Schnuren mit den um die Achse g drehbaren Hebeln (Tritten)  $F_1$ ,  $F_2$  in Verbindung, welche der Weber mittels seiner Füße abwechselnd niedertritt; denkt man sich nun, dass alle ungeradzahligen Kettenfäden (der erste, dritte, fünfte u. s. w.) durch die Zeugringelchen des Schaftes  $d_1$  gezogen sind, alle geradzahligen durch diejenigen des Schaftes  $d_2$ , so erhält, dass durch Niedertreten des Trittes (Schemels)  $F_2$ , Schaft  $d_2$  aus seiner Mittellage herab,  $d_1$  hinaufgezogen wird, daher eine solche Theilung (Zachbildung) der Kette eintritt, dass alle ungeradzahligen Kettenfäden über alle geradzahligen unter die ursprüngliche Mittellage geführt werden; in den so zwischen dem schon fertigen Gewebestück a und den Schäften  $d_1$ ,  $d_2$  gebildeten winkelförmigen Raum (das Fach) wird mittels eines sogenannten Schüpfen, welcher den Schussfaden auf ein Spulchen gewickelt im Vorrath enthält, der Schuss eingetragen, und zwar so, dass er vor das Blatt c zu liegen kommt; durch eine kräftige Bewegung desselben gegen das schon vorhandene Gewebe (das Anschlagen) wird der Schussfaden an den vorher eingetragenen nahe herangeschoben, worauf durch Niedertreten des Schemels  $F_1$ , die entgegengesetzte Lage der Schäfte herbeigeführt wird, also die ungeradzahligen Kettenfäden ins Unterfach, die geradzahligen ins Oberfach gebracht werden; ein zweiter Schussfaden wird eingetragen und mit der Lade angeschlagen, womit ein Cyklus aller regelmäßig sich wiederholenden Bewegungen beendet ist.

Die Gestalt der zum Eintragen des Schusses dienenden Schüpfen ergibt sich aus den Fig. 9 und 10; ein schiffähnlich gestaltetes, an den zugespitzten Enden mit Metall beschlagenes Stüd Holz enthält in einem tiefen Anschnitt die auf eine Spindel aufgesteckte, mit dem Schussfaden bewickelte Spule, von welcher der Faden entweder in der Richtung normal zur Achse oder parallel zu derselben abgezogen wird; im ersten Fall (Fig. 9) dreht sich die Spule g (Lauffspule) um die Spindel, im zweiten (Fig. 10) steht die Spule s fest auf derselben, daher dort die Windungen cylindrische, hier konische Schichten bilden müssen; der Faden tritt durch ein in der Schüpfenwandung enthaltenes Loch nach außen und wird beim Durchgang des Schüpfen durch das Fach über die Breite der Kette ausgelegt; zur breite Gewebe, bei denen weber das Durchsteden noch das Durchwerfen thünlich ist, versteht man den Schüpfen mit zwei Lauffrädern und stößt ihn mittels einer eigenen, von Hand zu bewegenden Vorrichtung (Peitsche und Schüpfentreiber) auf dem Ladenklos hin.

Mit dem letztern Namen bezeichnet man das Querstück (H in Fig. 11) des rahmenlosen Webstuhls (Lade), in welchem das Blatt gehalten wird, welchen dasselbe die erwähnte horizontale Bewegung aufhängt; wie Fig. 11 erkennen lässt, ist es zwischen dem Ladenklos H und den beiden durch zwei Arme oder Schwingen E mit der Ueberlage B in Verbindung stehenden zweier Schneiden oder Spitzen auf der drehbar aufgehängt ist und durch die in der Mitte des Arbeiters in pendelartige Schwingungen ausführt. Damit nicht durch die Anspannung des Gewebes (welcher beim Anschlagen gezwungen wird, eine gewisse förmige Gestalt anzunehmen) eine regelmäßige Verminderung der Gewebebreite bedient sich der Weber eines kleinen dargelegten Werkzeugs (Breithebel, Zempel), bestehend aus zwei durch die Kettenfäden verbundenen Stäben, die an den äußeren Enden kegelförmig versehen sind; indem man diese Stäbe nahe dem Rande des Gewebes in die Kette einsteckt, während die beiden Stäbe einen Raum zwischen sich bilden, und hierauf das Gewebe durch den Kniehebel auf das Gewebe niederdrückt, in demselben nach der Richtung der Zugkraft eine gewisse Spannung, welche dem Zug der Widerstand leistet; selbstverständlich muss die Lade in dem Maße wie die Gewebebreite zeitweilig neu eingesetzt werden. Ebenso kann das Spiel der Lade fortwährend an der Spitze in Fig. 13 fortrücken; man lässt die Lade halb auf eine Walze (Zeugbaum) sich aufwickeln, zeitweilig durch den Arbeiter oder in letzterem selbstthätig durch einen von der Lade abhängenden Mechanismus gedreht wird.

Während bei der Herstellung der Leinwand Gewebe nur zwei verschiedene Lagen vorkommen, also auch zwei Schäfte genügt, bei allen anderen Arten von Geweben kommen bei Lade verschiedener Lagen der Kettenfäden sich dem entsprechend auch die Zahl der zuzuwendenden Schäfte; alsdann ist das Geschirr nicht mehr zu bezeichnen, sondern in Fig. 14 skizzierte Contourform; hier steht jeder Schaft a durch einen zweiarmligen Hebel b b in Verbindung, einen Stift c drehbar ist; eine aufsteigende herabgehende Schnur legt diesen Hebel um die Achse (um Stift e drehbaren) Hebel d a an, welchen bei f die nach dem Tritt der Schnur angeknüpft ist; derselbe Schussfaden wird durch die Schnuren und Zwischenhebel h i mit dem Tritt k in directer Verbindung, weshalb es offensichtlich, dass der Schaft a aus seiner Lage sowohl durch Treten des Schemels e als durch Treten des Schemels k geändert werden kann; man hat nun in dem Geschirr so viel verschiedene Lagen von Geweben, als verschiedene Lagen von Schemeln vorkommen, und so viel Schemeln, als verschiedene Lagen von Schüssen gibt, und jeden Tritt mit allen denjenigen Schäften in Verbindung gehoben werden sollen, welche in demselben Tritt vorkommen sollen, direct mittels der Lade. Zur Herstellung einer großen Zahl verschiedener Bindungen und Gewebesorten vermag die Fabrikation der Körper, Mäße und



unterer Stoffe ist der Contermarsch allgemein im Gebrauch. Die Grenze seiner Anwendung liegt da, wo die Zahl der Schäfte zu groß wird, um sie im Stuhl herbringen zu können, und die Zahl der Schenkel zu groß, als daß jeder derselben den Füßen des Arbeiters bequem zugänglich wäre. Dieser Fall tritt ein bei jederseits um großemesterten Stoffe (Taschensachen), bei welcher dieselbe Lage des Schußfadens in des Kettenfadens erst innerhalb eines größeren Intervalls wiederkehrt. An die Stelle des Contermarsches tritt also da der Jacquardmaschine, von welcher Fig. 15 eine Vorstellung gewähren soll. An der Stelle der Schäfte treten hier einfache Schürren (Lorden) a, deren jede alle diejenigen Lagen vereinigt, deren Kettenfaden immer gleichzeitig gehoben werden müssen; diese Schürren sind durch Löcher eines horizontalen, am Stuhlgestell befestigten Bretes (Platinenboden) b geführt und an verticalen, oben mit einer springenden Nase versehenen Stäben (Platinen) c befestigt; dieselben können mittels horizontaler Schienen (Meßer) d, welche in einem vertikal beweglichen Schieber (Meßerlasten) e sitzen, um den zur Eintragung des Schußfadens erforderlichen Betrag gehoben werden, wenn sie sich in der verticalen Stellung befinden; sie können aber aus dieser Stellung seitwärts verschoben um das auf dem Platinenboden stehende Ende gebracht werden durch Horizontalziehung der zu jeder Lagen gehörigen Nadel f, welche mittels einer Lese Vorrichtung u, welche solche Nadel wird durch eine kleine in dem Federhaus g untergebrachte Schraubenfeder als links gehalten, kann aber durch das im Querschnitt dargestellte vierseitige Prisma nach rechts verschoben werden, wenn letzteres eine Horizontalbewegung in dem erforderlichen Sinne ausführt; die Seiten dieses Prismas sind mit eingebornten Löchern i versehen, welche mit den linksseitigen Enden der Nadel f correspondiren; diese Löcher müssen für diejenigen Nadeln, welche nach rechts verschoben werden sollen, verdeckt werden, was durch übergelegte, durch Fadenstücke beweglich verbundene, eine enlose Kette bildende Pappenstücke h geschieht, die nur an denjenigen Stellen, welche den nicht zu verschobenden Nadeln entsprechen, durchlöcher sind; denkt man sich nun das erwähnte Prisma hin- und hergehend und zugleich durch einen besonderen Mechanismus per Spiel um einen Winkel von 90 Grad um seine Achse gedreht, so wird die Möglichkeit erkennen, für jedes solche mit dem Tempore Kettenbewegung correspondirende Spiel eine andere durch das zu bildende Gewebemuster vorgegebene Gruppe von Platinen in derjenigen Position zu belassen, bei welcher sie durch den aufsteigenden Meßerlasten gehoben werden, die übrigen aber jedesmal weit schiefer zu stellen, daß ihre Nasen außerhalb des Bereichs der correspondirenden Meßer kommen, also auf dem Platinenboden stehen bleiben; um ein gewisses Maas herzustellen, wird man nur nöthig haben, eine solche Musterkette aufzulegen, deren Pappen an den entsprechenden Stellen mit Löchern versehen sind; für das Muster ist daher eine andere Musterkette erforderlich.

Die bisher beschriebenen Hilfsmittel sind für Handwebstühle, bei denen alle Bewegungen durch Hände und Füße eines Arbeiters hervorgebracht werden, und mechanische Stühle, deren Betrieb durch eine Naturkraft folgt, gleichmäßig in Anwendung; jedoch treten bei dem letzten noch gewisse Bewegungsmechanismen hinzu, welche die erforderlichen Bewegungen von der Umkehrung einer umlaufenden, durch Treibriemen bewegten Rolle (Antriebswelle) ableiten. Um hiervon wie von der gegenseitigen Anordnung aller wirklichen Theile

einen Totaleneindruck zu gewähren, sind in den Fig. 1 bis 5 die perspectivischen Abbildungen mehrerer mechanischer Webstühle aufgenommen worden.

Fig. 1 zeigt einen mechanischen Webstuhl von Rudolf Voigt in Chemnitz, bestimmt zur Herstellung leinwandbildiger Gewebe; die Schäfte sind weggenommen gedacht, jedoch die Nollen, an denen dieselben aufgehängt sind, im oberen Theile des Gestells sichtbar; der Zeugbaum, auf welchem die Aufwindelung der Waare erfolgt, ist dem Beobachter zugekehrt.

Der in Fig. 2 dargestellte Webstuhl aus derselben Werkstatt enthält die besondere Einrichtung, daß verschiedenartiger (z. B. verschiedenfarbiger oder verschieden starker) Schuß in regelmäßiger Abwechslung eingetragen werden kann; die Wade enthält zu dem Ende auf der einen Seite mehrere Schützenläden, welche durch einen besondern Mechanismus vor jedem Kettenspiel so weit horizontal verschoben werden, daß jedesmal der gewünschte Schützen sich in der Verlängerung der Kettenbahn befindet; hierdurch wird die Herstellungs anergestrichter Stoffe auf dem mechanischen Webstuhl möglich.

In Fig. 3 ist ein großer, zur Herstellung gemusterter Teppiche geeigneter Kraftstuhl dargestellt, bei welchem zur Fachbildung zwar Schäfte angewendet sind, deren Hebung jedoch mittels zweier der Jacquardmaschine ähnlichen Vorrichtungen (Schastmaschinen) erfolgt; die Pappenketten sind hier durch zwei aus Holzschienen gebildete Ketten ersetzt, welche an gewissen, durch das Muster vorgeschriebenen Stellen mit kurzen Stiften besetzt sind.

Eine einzige Schastmaschine enthält der für kleingemusterte Stoffe bestimmte mechanische Stuhl der Fig. 4, während der in Fig. 5 dargestellte Stuhl zur Aufnahme einer eigentlichen Jacquardmaschine eingerichtet ist, daher keine Schäfte aufzunehmen hat.

Verwendet man als Kette ein Gepinkst, welches durch die mannichfachen, bei der Fachbildung auftretenden Reibungen leichte Schäden leidet (z. B. Baumwollengarn), so muß man die Kette vor ihrer Verarbeitungen schützen, d. h. mit einer Stärkeabfodung überziehen, welche nach gehöriger Vertheilung und Ausstreckung eine schützende Decke bildet; bei dem Handstuhl geschieht diese Operation auf dem Stuhle selbst mittels einfacher, vom Weber gehandhabter Bürsten; für mechanische Stühle ist jedoch eine eigene in Fig. 6 dargestellte Schleichtmaschine im Gebrauch, welche für eine größere Zahl von Stühlen die Ketten im Voraus schleicht; die auf besondern (in der Figur weggelassenen) Spulen aufgewickelten Kettenfäden passieren hier einen mit Stärkekleister erfüllten Trög, werden dann durch zwei schwingende Bürsten von oben und unten bearbeitet, hierauf durch einen Strom heißer Luft getrocknet, durch einen dem Watt des Webstuhls (Fig. 7) ähnlichen Kamm in gleichmäßiger Nebeneinanderordnung erhalten, endlich auf den im oberen Theile des Gestells gelagerten Kettenbaum aufgewickelt; letzterer wird alsdann unmittelbar in den Stuhl eingelegt. Bei schafwollener Kette tritt an Stelle dieser Schleichtmaschine eine Leimmaschine, während seidene und leinene Ketten wegen der größeren Glätte ihrer Fäden diese Bearbeitung nicht erfordern.

## Wirkmaschinen\*), Appreturmaschinen.

(Tafel 12.)

Das Wirken, 1589 vom Engländer James Lee erfunden, ist aus dem Striden hervorgegangen; es ver-

\*) Bearbeitet von G. Willkomm, Director der Fachschule für Strumpfwirker in Kempten bei Memmingen.

wendet wie letzteres zur Herstellung eines flächenartig ausgebreiteten biegsamen Fabrikats nur einen Faden, welcher in bestimmte Lagen (Maschen) gebogen und durch Einhängen derselben ineinander mit sich selbst verbunden wird. Diese Maschinen (Fig. 10) gleichen zwei symmetrisch zueinander stehenden Buchstaben S (N); sie enthalten also den Faden nicht gerade gestreckt, sondern vielfach gebogen und stellen, wegen der Biegeelastizität des Fadens, ihre Form nach etwaigem Verziehen leicht selbst wieder her. Deshalb ist die Waare, das Gewirke, elastisch und eignet sich besser als andere Gewebe zu solchen Kleidungsstücken, welche sich genau den Formen der Körperteile anschmiegen sollen.

Zur Herstellung der Maschinen sind Nadeln mit langen Haken (Fig. 10) und dünne Blechstücke mit mehrfachen Einschnitten (sogenannte Platinen) erforderlich, und zwar beide Stücke in derselben Anzahl als die Zahl der Maschinen in der Breitrichtung des Waarenstücks beträgt. Während nun beim Stricken jede neue Masche einzeln dadurch entsteht, daß man den Faden als Schleife durch eine alte Masche hindurchzieht, so wird beim Wirken eine ganze Reihe Maschinen mit einem male hergestellt, nachdem man mit ihnen folgende Vorbereitungsarbeiten vorgenommen hat (Fig. 10). Die alte Waare wird durch die Platineneinschnitte (Kehlen) auf den Nadeln zurückgezogen, der Faden über die Nadeln und unter die Platinennasen lang hingelegt und durch Herabziehen der einzelnen Platinen zu Schleifen zwischen die Nadeln eingedrückt, diese Schleifen werden vorn unter die Nadelhaken geschoben, die alten Maschinen aber hinter denselben gelassen; die Hakenspitzen werden durch eine Schiene, die Presse, abwärts in die Riemen (Zischassen) der Nadelkäse gedrückt, sodas man endlich die alten Maschinen auf die Haken und von den Nadeln abschieben kann; sie bleiben dann in den neuen Schleifen hängen und diese bilden nun die neuen Maschinen.

Diese Maschinenbildung mit nur einem Faden nennt man die Kulirwirkererei (vom französischen couler, d. i. das Einschleiben der Platinen zwischen die Nadeln). Eine andere Art des Wirkens, 1769 erfunden, verwendet nicht einen Faden, sondern eine ganze Menge paralleler Fäden, eine sogenannte Kette, und verbindet dieselben auch durch Bildung von Maschinen; sie heißt die Kettenwirkererei.

Die Maschinen zur Kulirwirkererei sind: der Handkultirstuhl, auch Strumpfstuhl genannt, und flache sowie runde mechanische Stühle. Ein sogenannter französischer Rundstuhl, d. i. ein solcher, welcher die Nadeln auf einem Kreisringe horizontal und radial liegend enthält, ist in Fig. 1 abgebildet. Seine Kulirplatinen befinden sich in einzelnen Kapseln oder Rädern, den sogenannten Mailleusen: oder Maschinenbildnern. Die Zeichnung deutet die beste Ausführung dieser Mailleusen, die sogenannten großen Mailleusen (mailleuses obliques, von Fouquet und Franz in Mottenburg a. N., Württemberg, oder Stüden und Terrot, Stuttgart), an, welche vollkommen genau kuliren und auch spärde Garne verarbeiten, weil sie die Schleifen bis zum Abschlagen der alten Maschinen halten.

Seit etwa zwanzig Jahren ist eine andere Art der Maschinenbildung für Kulirwaare bekannt geworden, welche Zungennadeln (selfacting needles, Fig. 9) verwendet, deren kurze Haken durch das Auflegen eines beweglichen Arms, einer Zunge, geschlossen werden, sodas also das „Pressen“ wegfällt. Hierbei wird in der Regel auch nicht kulirt, sondern es werden die Maschinen, nach Art des Häkelns, einzeln hergestellt, indem die Nadeln einzeln durch ihre alten Maschinen hindurchfahren, mit

den Haken den Faden erfassen und ihn durch die neuen Maschinen durch die alten hindurchziehen, so daß die Waare in der Weise arbeitet die jetzt zumehrend bei der Strickmaschine, 1866 in Nordamerika erfunden, in Fig. 3 gezeichnet ist. Die Zungennadeln sind zwei Reihen schräg einander gegenüber und durch ihren unteren zu Haken umgebogenen Teil aus drei Platten (Fig. 4) gebildet. Die Maschinen erfassen und gehoben und gesenkt werden. Die Maschinen einzeln nebeneinander bilden die Winkelhebeln (Fig. 4) kann man die Platten vorstellen, sodas die Nadeln tief herabsinken und loder oder sehr rasch diese Maschine eine „Strickmaschine“ genannt, mit ihr namentlich Strümpfe angefertigt werden. Diese Weise herstellen kann, wie durch Fig. 1 und 2, rund, regulär und ohne Naht, hat aber auch auf andere, flach wie der Handkulturstuhl Maschinen mit übertragen, wenn dieselben zu bearbeiten waren und die Form der Maschine regulär, also ohne zu schneiden, erhalten. In Fig. 2 abgebildete Strickmaschine ist die Waare in der Weise, die in der Abbildung unter Fadenführung und Fadenpannung, für die Lambische Maschine aus Fig. 8 (Fig. 8), welcher den etwa überflüssigen Faden zieht und später wieder nachliefert. Die Waare von Christoffer (Fig. 6) kann auch in der Waare liefern; die Maschinenbildung mit kurzen Haken und einen rotierenden Rad, an jeder bei ihm vorbeigefahrenen Nadel hoch zieht und über die Nadel abschiebt. Diese Maschine von Hinkley, (Fig. 5) entsteht die Waarenstücke arbeiten (wie der Handkulturstuhl) eigentlich nicht eine Wirk-, sondern eine Kettenstrickmaschine, welche mit einem Faden als Schleife durch eine alte Maschine führt, diese Schleife durch einen Haken und endlich als neue Masche auf einen Haken hängt. Der Ramm, welcher der Nadelstrumpfstoß entspricht, erhält die neuen Maschinen nebeneinander, während er sich an der Nähnadel vorbeibewegt.

Die Maschinen zur Kettenwirkererei sind: flache mechanische Kettenstühle; Handkulturstuhl, man bislang nur für Herstellung von Ketten gebaut und kennt sie unter dem Namen Kettenmaschinen.

Die meisten Gewebe, sowohl die gewöhnlichen (geradfadige Gewebe), als auch die feinen (geradfadige Gewebe), erfahren nach ihrer Herstellung zu ihrer Verschönerung dienliche Operationen unter dem Namen Appretur, Appretur zusammenzufassen pflegt; dahin gehören das Waschen und Trodnen der baumwollenen Gewebe, das Walken, Kauben, Scheren, Pressen der tuchartigen Stoffe, das Färbeln der Kattune, im weitesten Sinne auch das Färben und Drucken. Der Appreturraum gestattet von den hierzu benutzten Hilfsmitteln nur die Aufnahme eines Centrifugaltrudenmaschine (Fig. 12) und einer Guttrick-Walke (Fig. 12) und einer Guttrick-Walke. Die erste genannte Maschine findet sich unmittelbar nach dem mit sehr einfach auszuführenden Waschen der Gewebe des allergrößten Theils des andern besteht aus einem an verticaler Spindel kreisförmigen Kessel von Kupferblech.

vielen kleinen Löchern versehen sind, aus denen, nach entgegengesetzten Richtungen, Antriebswellen, welche mittels Reibrädern in einem sehr schnellen Spindel in sehr schnelle Rotation versetzt sind, aus einem den Kessel umschließenden Gehäuse das die Antriebswellen lagernde Schraubt ist; fällt man die naassen Gewebe ein und versetzt ihn in Drehung, so übt der Dampf die bekannte Wirkung aus, die die Wandung des Kessels anzulegen und das Wasser bis auf einen kleinen, durch die zu entfernenden Bruchtheil durch die Hand durchzutreiben; dasselbe sammelt sich in dem umschließenden Gehäuse und fließt durch eine Oefnung stetig ab.

g. 12 dargestellte Walle (Doppelturbelwalle in Chemnitz) dient zu einer eigentümlichen Bearbeitung suchartiger (schafwollener) Stoffe, welche der Fadenlauf derselben (die Zeit) zum Verschwinden gebracht und die oft der Länge und Breite) erheblich vermindert die Eigenschaft, warm zu halten, in der verfahren werden soll; diese Bearbeitung, welche unter Gegenwart von Seifenwasser durchgeföhrt besteht, beruht auf der Anwendung von Schafwollhaare, in erweichtem und erst dann sich schraubengangförmig zusammenziehend, sodann unter Einwirkung einander verschlingend, so dass die hier abgebildete Maschine einem glattwandigen, innerlich mit Holz ausgekleideten, dessen Boden sich nach beiden Seiten in kreisförmiger Form erhebt, einen zentralen und beschwingenden Klotz (Walle) welcher seine Bewegung von der horizontalen Achse aus mittels kurzer Schubstangen, an einem wasserfesten, gehörig angefeuchteten, unelastischen Gewebebestände werden zu dem des Wallehammers in den Trog eingebracht, indem sie vor dem Hammer an der Innenwandung des Troges aufgelegt, von oben her wieder vor den Hammer fallen, also eine langsame Circulation in der angegebenen Bearbeitung. Andere als diese Gewebe besitzen die Wallefähigkeit nicht; daher Maschinen der beschriebenen Art zum Bearbeiten von baumwollenen Stoffen benutzt werden können.

Die Stoffe besitzen in einzigem Grade die Eigenschaft, d. h. es nehmen die Elementarstoffe auch die daraus erzeugten Fabrikate, welche von Wärme jede ihnen aufgeprägte Form behalten dieselbe alsdann mit einer geringen Abweichung. Von dieser Eigenschaft, die ein Platten und Bügeln der Wäsche in der Form bringen, macht die in Fig. 13 dargestellte eine vortheilhafteste Anwendung; dieselbe aus Filz, Gewebe, Strohgeflecht u. s. w. bilden die durch die jeweilige Mode vorgegebene geben; sie enthält daher eine gußeisnerne, von unten her durch Holzbohlenfeuer erhitzte Form, auf welche der Stoff aufgelegt wird, auf welcher ein sogenannter Gummiwalzen Stellen gleichmäßig aufgedrückt wird; der Stoff ist eine haubenförmige dickwandige Manufaktur, am Rande in einem abgerundeten Deckel so befestigt, dass auf die Herstellung eines sehr hohen Drucks (atmosphärischen) mittels eingepumpten Wassers in einem dieser Deckel aufgeschlagen, die Stellung der zu formende Form eingelegt

werden kann; er wird vor Herstellung des hohen Drucks niedergelassen und mittels eines kräftigen Nadelverschlusses geschlossen; das Einpumpen des Wassers geschieht wie in einer hydraulischen Presse mittels einer von Hand bewegten kleinen Druckpumpe; seit Einführung dieser Maschine ist das früher übliche Aufhängeln der Güte auf die Form fast gänzlich außer Gebrauch gekommen.

## Nähmaschinen, Stickmaschinen.

(Tafel 12.)

Die Ausbildung brauchbarer maschineller Hilfsmittel zur Herstellung von Verbindungs- und Ziernähten ist einer der rühmendsten Erfolge erfindender Thätigkeit des letzten Viertelsjahrhunderts; die eigentliche Fabrikation guter Nähmaschinen begann in den Vereinigten Staaten im Jahre 1830, in Deutschland 1854.

Die älteste Art von Nähmaschinen, welche überhaupt in ausgedehntem praktischen Gebrauch gekommen sind, lieferten die gewöhnliche, durch Handarbeit herstellbare Heftnaht, bei welcher, wie Fig. 1 zeigt, ein einziger Faden abwechselnd von der oberen nach der unteren Seite der zu vereinigenen Gewebestücke und zurückläuft; die Erzeugung derselben fordert, dass die Nadel selbst den gesamten Weg des Fadens zurücklegt, also entweder bei jedem Stich ganz durch den Stoff hindurchgeht, oder, wie Fig. 2 zeigt, gleichzeitig mehrere Windungen des wellenartig gefalteten Stoffs durchsticht; in Fig. 3 und 4 sind zwei zur Herstellung der Heftnaht bestimmte Maschinen dargestellt, wie sie vielfach in Appreturanstalten und Rattunbrudereien benutzt werden, um die einzelnen Gewebestücke mit ihren Enden aneinanderzuwähen; zwei ineinandergreifende Zahnräder legen den ihnen zugeführten Stoff in viele regelmäßige Falten und schieben dieselben auf eine den Nähfaden in einem Drehr enthaltende lange Nadel, welche am Gestell befestigt ist und deren möglichste Annäherung an die Zahnräder durch eine auf deren Umföläche eingebrachte Nut zugelassen wird; löst man alsdann die Nadel vom Gestell und zieht man sie vollständig durch die Falten hindurch, so wird der Faden nachgezogen und verbindet die wieder geradegestreckten Stofflagen. In einer andern Art ist dieselbe Naht auch auf Maschinen hergestellt worden, bei denen eine doppelspitze, in der Mitte mit dem Drehr versehene Nadel (Fig. 1) mittels zweier auf beiden Seiten der Stofflagen befindlicher Zangen abwechselnd gefasst, durchgestrichen, wieder gefasst, durchgezogen und an einer andern Stelle in entgegengesetzter Richtung durch den Stoff geführt wird. Jedoch ist dieser Operationsmodus nur bei den weiter unten zu besprechenden Stickmaschinen in Gebrauch geblieben, während die Maschinennäherei andere Arten von Nähten benutzte, bei welchen die Nadel nur von einer Seite in den Stoff tritt, den Faden mittels eines dicht über der Spitze befindlichen Drehrs durch den Stoff bringt, worauf der Faden durch eine Schlinge desselben Fadens (Einfadenkettenstich, Tambourstich) oder durch einen zweiten Faden (Doppelschleppstich, Doppelschleppstich) gehalten wird und sodann die Nadel nach derselben Seite wieder zurückgeht, um an einer andern Stelle des inzwischen weiter geschobenen Stoffs wieder einzuführen.

Von dem sogenannten Einfadenkettenstich geben die Fig. 5 und 6 eine genauere Vorstellung; man erkennt aus Fig. 5, dass hier der Nähfaden für jeden Stich eine Schleife bildet, welche den doppelt zusammengelegten Faden des nächstfolgenden Sticks umfößt; die Naht hat die Eigenschaft, dass, wenn man den Faden an einem Ende (rechts, mit Beziehung auf Fig. 5) anzieht, ihre Auflösung ohne Hemmnis erfolgt, eine





1, nachdem ihr Verkaufspreis durch höchst rasche Fabrikationsmethoden beträchtlich herabgezogen

der durch die Fig. 15 und 16 dargestellten Maschine von Wheeler und Wilson, welche ausschließlich für Weißzeugnäherei im Gebrauch ist, erfolgt. Erstellung derselben Naht ohne Schiffschen, unter fernahme eines rotirenden Fadens und eines in Hohlung desselben untergebrachten flachschreibenden, gestalteten Spulchens („stehende Spule“); die um und Wirkung der letztgenannten Theile wird in Fig. 17 und 18 ersichtlich; in Fig. 17 hat adel diejenige Stellung, bei welcher die Spitze reißers die entstehende Schleife des Oberfadens; diese Schleife wird durch die weitere Drehung reißers vergrößert und vermöge dessen eigenlicher, ohne Modell schwer zu verdenklicher so geführt, daß die den Untersadenvorrath entde Spule hindurchschlüpft (oder richtiger: die se über diese Spule hinweggezogen wird); dieser ist bei der in Fig. 18 dargestellten Position vollendet; die Oberfadenschleife verläßt den r bei weiterer Drehung (Fig. 17, links) und bei Gelegenheit der Erzeugung des nächstfolgenden Stiches durch Ausziehen des Fadens zum Verden gebracht, wobei die beiden Fäden ihre gegew. Umficklung vollenden. Der Vortheil dieser ngeweise der Doppelpfennstichnaht liegt in dem all der oskillirenden Bewegung des Schiffchens, t das lästige Geräusch der Schiffchenmaschinen igt und eine größere Stichzahl pro Zeiteinheit icht ist. In Fig. 19 ist der zu dieser Maschine ge Stoffräder und die Nadel in größerem Maß dargestellt; die Fig. 20 und 21 zeigen die Nuung zweier wichtiger Hilfsapparate (des Säumers des Schnuraufnähers) an der Nähplatte; dieselben len, daß der zu bildende Saum, beziehentlich die ähende Schnur sich ohne besondere Bemühung ähenden genau unter die einstechende Nadelspitze m.

größte Fadenlänge erfordert der in den Fig. 23 dargestellte Zweifadenlettenstich; hier bildet Versaden in jedem Stich eine Schleife, welche durch den Stoff hindurchgezogen und auf der seite desselben durch den zweiten Faden gebunden elcher sowol diese Schleife als Ganzes umschließt, uch (in rückläufiger Bewegung) dieselbe durchl. Dieser Stich liefert eine sehr haltbare Naht, wenn man den Untersaden besonders stark nimmt, dhne Ziernaht; zu seiner Herstellung dienen zwei n, eine gerade für den Oberfaden und eine kreisförmig gekrümmte (Zirkelnadel) für den Unter. Die nordamerikanische Firma Grover und Baker ersten und meisten Nähmaschinen für Zweifadenstich auf den Markt gebracht; in Fig. 24 ist eine dargestellt.

der äußeren Disposition der Theile werden bei Nähmaschinen oftmals erhebliche Aenderungen ndig, wenn die zu nähenden Gegenstände eine sförmige oder sadförmige Gestalt haben, wie rarmel, Schube u. dgl.; statt der Nähplatte dient nn ein freitragender metallener Hohlzylinder (Fig. 1) der eine vierseitige abgestumpfte Pyramide (Fig. 1) zur Unterstüzung des Arbeitsfadens.

in naber Verwandtschaft mit der Nähmaschine, ist auf unserer Tafel noch die Heilmann'sche Maschine durch eine Abbildung (Fig. 27) ver, bei welcher die durch Fig. 1 charakterisirte ungart der Nadel zu Grunde liegt und eine große mäßigkeit durch gleichzeitige Bewegung sehr

viele Nadeln (200 bis 500), welche in zwei horizontalen Reihen angeordnet sind, erzielt wird. Der mit Stidereien zu bedeckende Stoff ist in einem verticalen Rahmen glatt ausgespannt und mit diesem in seiner Ebene nach jeder Richtung beweglich; durch einen Storchschnabel empfängt dieser Rahmen vor jedem Durchgang der Nadeln von einem durch den Arbeiter auf einer Musterzeichnung weiter gesetzten Zahrtlist aus eine dem Intervall zweier Nachbarteile entsprechende Bewegung; vor und hinter diesem Rahmen ist auf horizontalen Gleisen je ein breiter Wagen fahrbar angeordnet, welcher für jede Stidnadel eine kleine Zange trägt; alle Zangen eines solchen Wagens können mittels eines einfachen, vom Arbeiter zu bewegenden Mechanismus gleichzeitig geöffnet und geschlossen werden, um die Stidnadeln sämtlich freizulassen oder sämtlich zu fassen. Hiernach ist das Spiel dieser Maschine leicht zu verstehen: die Nadeln, welche in ihrem auf der Mitte stehenden Dohr ein Fadensstück enthalten, werden durch Herausziehen des einen Wagens in den Stoff eingehoben, auf der entgegengesetzten Seite von den Zangen des zweiten Wagens erfaßt und so weit durchgezogen, daß die nachfolgenden Fäden straff werden; hierauf folgt die durch das Muster bedingte Versetzung des Stoffrahmens, die Nadeln werden an einer andern Stelle durchgesteckt, von den Zangen des ersten Wagens erfaßt, abermals durchgezogen bis zu voller Anspannung der Stidfäden, worauf der Rahmen mittels des Storchschnabels um ein Stichintervall weiter gesetzt wird u. s. f.

Diese Maschine begründet ihre Leistungsfähigkeit, wie man sieht, auf das schon mehrfach erwähnte Prinzip der Vervielfachung des Werkzeuges, ohne daß jedoch der Betrieb durch Naturkräfte — wie solches bei der Nähmaschine der Fall ist — möglich wäre.

## Buchdruckmaschinen.

(Tafel 14.)

Von den beiden Hauptarbeiten des Buchdruckers, dem Setzen und Drucken, wird zur Zeit nur die eine, das Drucken, unter Benützung maschineller Hilfsmittel ausgeführt, wogegen das Setzen, d. h. die geordnete Zusammenfügung der mit erhabenen Schriftzeichen versehenen metallenen Typen zu Zeilen und Columnen, ein zu hohes Maß von Intelligenz erfordert, als daß hierfür die Handarbeit zu entbehren wäre. Unsere Tafel enthält daher zwar Druckmaschinen, aber keine Setzmaschinen, wiewol an der Ausbildung der letztern vielfach gearbeitet wird; dagegen sind zur Vervollständigung der Darstellung die wenigen Werkzeuge des Setzers aufgezogen.

Die kleinen Theile, aus welchen die Formen zum Buchdruck zusammengelegt werden (Typen, Lettern), sind aus einer Legirung von Blei und Antimon gegossen und enthalten die mit Farbe auf das Papier zu übertragenen Buchstaben, Zeichen u. s. w. in verkehrter und erhabener Darstellung. Außer den eigentlichen Schriften gehören dahin Zeichen verschiedener Art, Klammern, Linien, Einfassungen, ferner die nicht zum Abdruck gelangenden, sondern nur zur Ausfüllung der im Druck leer bleibenden Räume bestimmten Ausschließungen (Quadrate oder Gevierte, Halbgevierte und Spatien), endlich der Durchschuß, dünne Streifen (Durchschußlinien) oder didere Stäbchen (Concordanzquadrate), welche zwischen die Zeilen eingesetzt werden, wenn man sie in größerem Abstand voneinander bringen will. Jede Letter besitzt nabe am Fuße, und zwar auf der Fläche, welche dem untern Ende des Buchstaben entspricht, eine halbrunde Ausbuchtung (Signatur), welche als ein fühlbares Merkmal dient, um die rich-

tige Stellung ohne Hinein zu finden. Die Herstellung der Lettern geschieht in einem sogenannten Gießinstrument, d. h. einer mehrtheiligen metallenen Gießform; die gegossenen Lettern erfordern vor ihrer Verwendung gewisse Zurichtungsoperationen (Schleifen, Hobeln, Bestoßen) zur Entfernung des Gratheß, Herstellung der genauen Länge u. s. w.; unsere Tafel zeigt in Fig. 17 zwei Ausführungsformen des sogenannten Linienhobels, mit dessen Hülse die Endflächen der gegossenen (oder auch gezogenen) Linien genau rechtwinklig (zuweilen auch unter spitzem Winkel) abgehobelt werden; Fig. 18 gibt die Anordnung eines Linienschneide-Instruments, bei welchem die gleiche Absicht durch ein scherenartig wirkendes, an einem Hebel sitzendes Messer erreicht wird.

Die verschiedenen Schriften werden in die Fächer des Setzkastens, Fig. 12, vertheilt, und zwar so, daß die am häufigsten vorkommenden Buchstaben der Hand am nächsten sind. Aus den verschiedenen Fächern dieses Kastens entnimmt nun der Setzer die zur Wiedergabe eines Manuscriptes erforderlichen Lettern mit der rechten Hand und fügt dieselben in dem in seiner linken Hand befindlichen Setzinstrument, dem Winkelbaken, Fig. 14 und 15, zu Zeilen aneinander; das abzufertigende Manuscript ist an einem auf dem Kasten eingestochenen Halter, dem Tenafel, Fig. 13, befestigt. Sobald eine Zeile voll gesetzt ist, wird sie ausgeschloßen, d. h. man erzeugt durch Einschiebung dünner Spatien eine angemessene Spannung, welche das Herausfallen einzelner Buchstaben bei den folgenden Manipulationen verhindert; alsdann wird ein passend gestaltetes Stüd Messingblech, die Seklinie, übergelegt, damit die neue Zeile eine glatte Unterstüßungsfläche findet. Mit 10 oder 12 Zeilen ist der Winkelbaken gefüllt und es wird nunmehr der Satz auf ein mit Nandleisten versehenes Bret, das Schiff, Fig. 16, aufgestellt. Hat sich hier so viel Satz angesammelt, daß er eine Druckseite (Columne) gibt, so wird das Ganze mit Bindfaden fest umschlungen (ausgebunden), worauf die Columne frei aufgenommen und auf eine Tafel übertragen werden kann. Zu einem vollen Bogen gehören, je nach dem gewählten Format, 8, 16, 24 u. s. w. Columnen. Diese werden auf der erwähnten Tafel in der erforderlichen Anordnung aufgestellt, mit einem eisernen Formrahmen umgeben, die Lücken zwischen den Columnen mit genau rechtwinklig gearbeiteten hölzernen oder auch metallenen Stegen ausgefüllt, endlich Columnen, Stege und Formrahmen mittels Schrauben, Keilen, Zahnstangen und Getrieben (mechanische Schließstege, Fig. 20) zu einem festen Ganzen zusammengefloßen; vorher feuchtet man den Satz mit Wasser an, damit die von den Bindfäden zu befreienden Columnen durch Abdäsion zusammengehalten. Vor Beginn des eigentlichen Drucks wird zunächst ein Probeabdruck genommen, auf welchem alle etwa vorhandenen Fehler aufgesucht und bezeichnet werden (Correctur). Hierbei kann der in Fig. 19 dargestellte Apparat mit Vortheil benutzt werden; derselbe besteht aus einem Tisch mit gehobelter Metallplatte zur Aufnahme des Satzes und aus zwei zur Geradzuführung einer Druckwalze angelegten horizontalen Leisten. Man trägt die Druckfarbe mittels einer elastischen, aus Leim und Sirup über einer Achse gegossenen Walze auf, legt den schwach durchfeuchteten Druckbogen über, bedeckt denselben mit einigen andern Papierbogen oder mit einem Stüd Filz und rollt nun die mit Filz bedeckte (in unserer Figur dargestellte) Druckwalze unter Ausübung eines angemessenen Drucks über den Satz hin. Auf dem so erhaltenen Abdruck werden vom Corrector alle Fehler verbessert, worauf

der Setzer nach Anleitung des in Fig. 20 dargestellten Bogens die Verbesserungen in der unter Benützung einiger einfacher (in Fig. 21 aufgenommenen) Hülfswerkzeuge (die in den meisten Fällen wird auf dem zweiten und selbst dritter Probabogen) gemacht, um die mit einer nöthigkeit dem Setzer sich anbietende zu beseitigen. Hiernach ist die Druckfertig. Bevor wir jedoch nach der Einrichtung der Druckmaschinen betonen, einiger zur Herstellung der selben und der Druckschwärze dienenden Details. Die aus Leimlösung und Sirup bestehende Farbwalze wird in einem durch doppelwandigen kupfernen Kessel, mit Schöpfstellen in die aus Wasser bestehende Gießhülse, Fig. 6, eingebracht; in dieser die metallene Achse umschließende Hülse ist zweitheilig und kann zur Reinigung und Erhärtung der Walze gegen die Druckfarbe besteht von alterer Mischung von eingekochtem Leim zu deren Herstellung und bezieht sich besonderer Reibmaschinen betriebs nach Art der Regelmühlen, Fig. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) konstruirt.

Die zum Drucken dienenden Vorrichtungen sind die Handpressen, die Pressen oder Druckmaschinen. Die Handpressen enthalten unsere Tafel 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Alle hiernach erforderlichen Vorrichtungen sind in der Hand ausgeführt. Die Abdrücke der Pressen von tadelloser Beschaffenheit, doch ist die Quantität der Lettern beträchtlich (bei Voraussetzung von 200 Abdrücke pro Stunde).

Auch die kleine Numerir-Maschine, Fig. 7, kann zu den Handpressen gezählt werden, obwohl sie nicht eine aus sehr vielen gefalteten Blättern bestehende Form enthält; sie dient zur Herstellung von tadellosen Abdrücken von Büchern und zum Drucken auf Werthpapieren, Lotterielosen etc. Sie wird auf eine bedruckte Platte aufgelegt und der aus dem Bogen bedruckte Satz befindet sich an einem



ern einen kleinen selbstthätigen Schwärzapparat, die Ziffern befinden sich am Umfang kleinerer Scheiben, welche in gleicher Art wie die ersten eines Zählwerks durch die Hebelbewegung eine solche schrittweise Drehung empfangen, daß rückgefestigt Niederdrücken des Hebels die Zahlenreihe gedruckt wird.

Druckpressen nennt man solche Druckmaschinen, auf den Betrieb durch Naturkräfte eingerichtet. Dieselben wurden durch einen Deutschen, Friedrich A. aus Gießen, erfunden, jedoch infolge der kläglichen Patentschutzverhältnisse Deutschlands nicht hier, sondern in England (1804—12) zur eigentlichen Brung gebracht. In den Fig. 1 und 2 sind die verbreitetsten Anordnungen der königlichen Museen dargestellt. Bei beiden ruht die Druckform auf einem ebenen Karren, dessen Hin- und Herbewegung mittels eines Hyppocylindräderwerkes (Bewegung) von einer durch Dampf betriebenen Plewelle aus erfolgt; das Aufpressen des Bogens in die eingeschwärtzte Form geschieht mittels eines mit verzogenen gußeisernen Cylinders, welcher durch Zahnstangen und zwei Getriebe in solcher Art bewegt wird, daß seine Umfangsgeschwindigkeit mit der Geschwindigkeit des Karrens in jedem Augenblick der Bewegung genau übereinstimmt. Die einfache Schnellpresse, Fig. 1, enthält einen, die doppelte, Fig. 2, zwei Druckcylinder; die Bewegung derselben ist infolge einer absteigenden, als ihre Drehung nur während des Druckens erfolgt, worauf sie während der Karrenruhe stillstehen. Innerhalb dieses Zeitintervalls ist sowohl das Einschwärzen der Druckform als das Gießen eines Bogens; für ersteres ist ein ganzes elastisches Farbmägen vorhanden; die oberste sich innerhalb eines mit Farbevorrath gefüllten Kessels; eine schwächere Ledwalze tritt in periodischer Hebung an dieselbe heran und überträgt die abzunehmende Farbe auf eine unter ihr befindliche Walze und Schiebung zugleich begabte Walze; über folgende härtere Walze gelangt die Farbe auf unelastische (metallene) Walze und von dieser auf die Austragwalzen, welche die Schriftseite der Bogen berühren. Das Einlegen des schwach gefuchelten Papiers geschieht durch einen seitwärts von hinten aufgestellten Anhaber oder ein Mädchen; von dem obersten Theil der Maschine befindlichen Vorrath wird je ein Bogen entnommen und auf schiefe Ebene so nahe an den Druckcylinder gehalten, daß derselbe ihn mit eigenen beweglichen Greifern (Greifern), welche in diesem Moment geöffnet, erfassen kann; in dem Augenblick, wo die Bewegung des Cylinders beginnt, flappen die Greifer und ziehen den Bogen mit sich fort, der folglich den Cylinder und Schriftsatz gelangt und sogleich gedruckt wird; hiernach wird der Bogen von einem entlofer, über Rollen gehender Bänder (Lauffer) in Empfang genommen und durch ein leichtes nartiges Werkzeug (Ableger), welches in schwacher Bewegung zwischen den Laufbändern durchschlägt, einem Tisch abgelegt. Die Zahl der auf einer kleinen Schnellpresse dieser Art zu erhaltenden Abzüge beträgt 1000 bis 1500 pro Stunde; eine Doppel-Schnellpresse, Fig. 2, liefert demgemäß 2000 bis 3000 Abzüge in derselben Zeit.

Für den Zeitungsdruck ist auch diese beträchtliche ungeschwindigkeit noch nicht groß genug und man hat die Anwendung des Prinzips der Vervielfachung wirksamen Theile erstlich größere Produktionsfähigkeit zu erzielen gesucht. Am besten ist solches gelungen, indem man die Druckform (durch Gießen her-

gestellte Copie des Satzes) auf dem Umfang eines gußeisernen Cylinders (Typencylinder) anordnete, gegen welchen eine größere Zahl von Druckcylindern zur Wirkung kommt; der Typus dieser Art Schnellpressen wird durch Fig. 3 repräsentirt, eine amerikanische Kiesen- oder Mammuth-Schnellpresse darstellend; hier sind um den Typencylinder sechs Druckcylinder nebst sechs Anlegelassen und sechs Ablegern gruppiert, wozu eine gleiche Anzahl von Farbmägenapparaten gehört; für jede Umdrehung des Typencylinders wird die Form desselben sechs mal abgedruckt, woraus die Möglichkeit erhellet, die Zahl der Abdrücke auch ohne das Tempo des Druckens zu beschleunigen, auf das Sechsfache der einfachen Schnellpresse (6—9000 pro Stunde) zu steigern; da es aber zulässig ist, die Geschwindigkeit einer in derselben Richtung rotirenden Form noch erheblich größer zu wählen, als diejenige einer geradlinig hin- und hergehenden Form (wegen des Wegfalls der Trägheitswirkungen), so ist die Zahl der Abdrücke auf einer solchen Presse leicht auf 12—16000 pro Stunde zu bringen. Die Uebersetzung der geraden Form des Satzes in die kreisförmige Krümmung geschieht in folgender Art: Ueber den fertigen Satz wird eine Matrize gebildet durch Uebereinanderlegen mehrerer mit Kleister bestrichener Papierblätter und Aufklopfen derselben mittels einer Bürste; diese Matrize, welche die Schriftzeichen vertieft enthält, läßt sich mit Leichtigkeit biegen, daher in eine Gießform einlegen, deren Höhlung die dem Umfang des Typencylinders entsprechende Krümmung hat; durch Füllung der Gießform mit geschmolzenem Schriftzeug erhält man so die erforderliche cylindrisch gekrümmte Copie des Satzes, welche nur noch durch Bearbeitung mittels Bandsäge, Hobelmaschine und Drehbank auf den Typencylinder genau aufgepaßt werden muß.

Von den anderweiten in Buchdruckereien gebrauchten Maschinen enthält unsere Tafel noch eine Satinirmaschine, Fig. 9, eine hydraulische Glättpresse, Fig. 10, und eine Papiersehneidemaschine, Fig. 11.

Das Satiniren des Papiers wird bei bessern Arbeiten vor dem Drucken vorgenommen; es verleiht demselben eine solche Glätte und Ebenheit der Oberfläche, daß es den Druck in seiner ganzen Reinheit und Schärfe aufzunehmen im Stande ist. Das Papier wird angefeuchtet und zwischen Zinktafeln gelegt, so daß jeder Bogen auf beiden Seiten von einer Zinktafel berührt wird; etwa 25 solche Tafeln werden alsdann durch die Satinirmaschine, Fig. 9, geführt, welche im wesentlichen aus zwei gußeisernen, abgedrehten Walzen besteht, von denen die untere mittels eines doppelten Nadvorgeleges von einer Kurbelwelle aus in Umdrehung versetzt und die obere mittels einer Schraubenstellung in solche Entfernung gebracht wird, daß die Zinktafeln beim Durchwalzen mit dem erforderlichen Druck gegen einander gepreßt werden.

Das Glätten des Papiers erfolgt nach beendeter Druck unter Anwendung von Pressen oder Glättpappen, welche in regelmäßiger Abwechselung mit je einem Bogen zu kleinen (25—50 Bogen enthaltenden) Stößen zusammengelegt werden; aus diesen und zwischengelegten Brettern wird ein größerer Stöß gebildet, den man in der hydraulischen Glättpresse, Fig. 10, einem mittels der zugehörigen Druckpumpe erzeugten hohen Druck aussetzt und längere oder kürzere Zeit darin beläßt. Zu demselben Zweck waren früher auch (und sind theilweise noch) Schraubenpressen im Gebrauch.

Die in Fig. 11 dargestellte Papiersehneidemaschine findet ihre Anwendung hauptsächlich bei Ausführung der sogenannten Accidenzarbeiten, womit man die Druckarbeiten von kleinerem Umfang (Circulars,

Geschäftspapiere aller Art, Visitenkarten u. s. w.) bezeichnet; dieselben werden stoffweise auf dieser Maschine beschnitten und liegen hierbei auf einem festen Tische, gegen welchen sich in geradliniger, unter einem Winkel von 30 — 45 Grad gegen den Tisch geneigter Translationsbewegung ein scharfschneidiges Messer herabsenkt; die angegebene Bewegungsrichtung bewirkt, daß die Wirkungsweise des Messers derjenigen einer Säge nahe kommt, welche erfahrungsmäßig für das leichtere Durchschneiden günstig ist. Die Maschine wird mittels einer Kurbel, deren Welle durch zwei Stirnräderpaare und eine doppelte Schubkurbel mit dem Messer in Verbindung steht, in Bewegung gesetzt.

## Maschinen des Schriftgießers, Stein- und Kupferdruckers.

(Tafel 15.)

Im Anschluß an die bei Beschreibung der vorigen Tafel nur kurz besprochene Herstellungsweise der Lettern sind mittels vorliegender Tafel zunächst einige maschinelle Hilfsmittel des Schriftgießers näher zu erläutern. In Fig. 10 ist eine zweckmäßige Anordnung des Gießofens dargestellt, in welchem die Schmelzung des Schriftmetalls erfolgt; dasselbe wird entweder mittels kleiner Löffel in das Gießinstrument eingegossen oder — wie die Figur zeigt — mittels kleiner metallener Handpumpen in dasselbe hineingespritzt. Vereinigt man Gießofen, Gießpumpe und Gießinstrument mit geeigneten Bewegungsmechanismen in solcher Art zu einem Ganzen, daß die Schließung des Gießinstrumentes, das Einspritzen des Schriftzeugs, das Auswerfen der fertigen Type u. s. w. von der fortlaufenden Drehung einer Antriebswelle abgeleitet werden kann, so hat man die in Fig. 11 dargestellte Letterngießmaschine, eine der bemerkenswerthesten Leistungen der Maschinen-technik; dieselbe erzeugt stündlich etwa 1200 Typen, wogegen ein Schriftgießer höchstens 500 in derselben Zeit fertig bringt. Fig. 14 zeigt die äußere Einrichtung eines größeren Gießinstrumentes (einer Gießform) zur Herstellung von Stereotypplatten. Man versteht hierunter aus Schriftzeug hergestellte Abgüsse ganzer Columnen des aus einzelnen Typen zusammengefügtten Satzes, zum Zwecke der Schonung dieser Typen bei Herstellung großer Auflagen und der unveränderten Erhaltung des Satzes bei Herstellung solcher Werke, deren nachfolgende Auflagen keine Veränderungen erfordern (Bibeln, Logarithmentafeln u. s. w.). Es wird aus Gips oder aus mit Kleister bestrichenen Papierlagen eine Gegenform des Satzes hergestellt, welche nach erfolgter Austrocknung so in die kastenförmige Hohlform des in Fig. 14 dargestellten Apparates eingelegt wird, daß sie den dem einzugießenden Metall dargebotenen Hohlraum auf der einen Seite begrenzt. Statt des Gießens wendet man (so zur Vervielfachung von Holzschnitten) auch das galvanoplastische Verfahren an, indem man mittels der in Fig. 9 dargestellten Schraubenpresse eine Gegenform aus durch Erwärmen erweichter Guttapercha herstellt, diese an der Oberfläche durch Ueberziehen mit Graphit leitend macht und mittels des galvanischen Stroms eine Schicht Kupfer darauf ablagert. Das in Fig. 13 dargestellte Werkzeu dient zur Vollenbung der gegossenen Typen durch Abhobeln der Ranten und besteht aus einer Spannvorrichtung zur Aufnahme einer ganzen Reihe von Typen und aus einem darüber hin-zuführenden Hobel. Zur Zurückführung der Stereotypplatten (Geradschneiden der Ränder) wird häufig eine kleine durch den Fuß zu betreibende Kreissäge, Fig. 12, in Benutzung genommen. Die Herstellung der so-

genannten Linien geschieht stattdessen auf einer Ziehbank, Fig. 4, indem geschnittene Blechstreifen auf einen solchen Schlitten befestigt und mittels der Handkurbel unter einem Winkel bis die erforderliche Gestalt und Dicke erreicht ist.

Zu der dem Buchdruck nahe verwandten Stein- und Kupferdruckerei bedient man sich maschineller Hilfsmittel: die eine (Stein- und Kupferdruckmaschine, Reliefmachine, Pantographmaschine, Fig. 2, 3 und 7) dient zur Herstellung der Druckplatten, welche freilich zu einer Handarbeit ist, die andere (Kupferdruckpresse, autographische Presse u. s. w.) zum Abdruck dieser Platten.

Die Linienmaschine, Fig. 3, besteht aus festliegenden Rahmen, auf welchem zwei Kurbeln und ein Schlitten verfahren werden kann; letzterer trägt eine Prismenführung einen kürzeren Längsarm, der mit Gravirlist oder Zirkel versehen ist; ein Hebel angeordnet ist; mit Hilfe dieses Hebel und Schraubenwinden, deren äußeres Ende ein Kopf trägt, läßt sich dieser Querschnitt in größere Intervalle verschieben, woraus sich ergibt, daß auf einer innerhalb des Rahmens festgehaltenen Kupferplatte, einem glatten Stein u. s. w. ein System paralleler Linien zugraviren, wie solches zur Herstellung von Druckplatten erforderlich ist. Die Maschine ist eine Einrichtung, durch welche die Linien wellenförmig gestaltet werden, was die Randform einer faconnirten Schrift. Die Schlittenverschiebung eine gleichförmige Fahrt und einem auf ihr ruhenden stehenden Bewegung in verticaler Ebene. Mittels geeigneter Zwischenmechanismen wird der Heißer in horizontaler Ebene umgelenkt, von derart erzeugten Wellenlinien auf Papier ein beliebiges Schutzmittel.

Bei der in Fig. 2 dargestellten Maschine ist die besprochene Anordnung durch einen Pantographen (Pantographen) und einen Apparat vervollständigt; der Apparat ist ein nistigen Verkleinerung gegebener, zu übertragender Zeichnungen, die Bildung von Reliefdarstellungen von solcher Art, daß die Schnittflächen mit der Oberfläche des Reliefs auf der Ebene der Druckplatte um ihre Höhe werden; es entsteht so eine topographische Darstellung des Reliefs. In einer Drehscheibe oder eines Druckers der Druckplatte) mit dem Wellen höchst mannigfache Linienverläufe Wirkung (Guillochen) hervorzubringen, abnehmlich aus freier Hand sie zu Vanknoten besonders geeignet macht.

Die in Fig. 7 dargestellte Stein- bildet ein nicht wohl zu entbedrucker lithographischer Anstalten werden gebrauchte Steine an mit Sand und Wasser so weit die Spur der vorhandenen Zeichnung der Stein zur Aufnahme einer Abbildung u. s. w. tauglich wird. Die mittel wird mittels einer querschnittlichen Bewegung in trunniniger Lage getrieben von einer Antriebswelle der Stein herumgetrieben, wobei die

n durch die Veranastaltung gesichert ist, daß die eisenplatte um ihren Verbindungszapfen mit der sie enen Lenktafel frei drehbar ist.

ie in der Stein- und Kupferdruckerei angewende- Handpressen unterscheiden sich von den typogra- phen Handpressen wesentlich durch den Umstand, daß Aufpressen des Papiers niemals auf der gan- Ausdehnung desselben gleichzeitig, sondern immer innerhalb eines schmalen Streifens erfolgt, daher Verschiebung der Druckplatte unter dem Druck- ibenden Organe nothwendig ist. Bei der Kupfer- dresse (Fig. 1) dienen hierzu zwei gußeiserne, n freis cylindrisch abgedrehte Walzen, zwischen denen gehöriger Zusammenstellung die Kupferplatte, auf der die Zeichnung entsprechenden Vertiefungen mit e erfüllt sind, mit dem darübergelegten ange- setzten Papier langsam hindurchgeführt wird; das- Mittel ist bei der für Zintplatten bestimmten ographischen Presse (Fig. 8) in Anwendung. der Steindruckhandpresse (Fig. 6) wird der Druck s eines sogenannten Heißers hervorgebracht, eines die ganze Breite der Maschine reichenden stumpf- igen Holzstücks, welches mittels Drehung einer jason- n Scheibe gegen den Stein kraftvoll niedergedrückt; r letzterer liegt auf einem mittels Zahnstange und rebe verschiebbaren Karren; seine obere Fläche ent- die Zeichnung nicht eigentlich gravirt, sondern durch vorherrschend chemisches Verfahren in solcher Weise vorgebracht, daß nur die Linien desselben die mit-

Walze oder Tampon aufzutragende Druckfarbe nehmen, alle andern Stellen aber sich abstoßend en dieselbe verhalten; der gehörig vorbereitete Stein fängt das angefeuchtete Papierblatt, auf welches ein aus Mahmen und Leberstich bestehender Dedel ergelappt wird, worauf das Ganze unter dem der durchgezogen wird.

n neuerer Zeit sind für den Steindruck die Hand- en durch Schnellpressen ersetzt worden, deren An- nung große Mithlichkeit mit denjenigen Runddruck- alpressen haben, welche eine gerade Druckform nsetzen. Fig. 5 gibt das Bild einer solchen Presse; Stein liegt auf einem mittels Schubkarbel von einer aufenden Welle hin- und herzuführenden Rahmen und r durch Farbwalzen eingesaugt; das Papier wird s eines darübergelagerten, mit Greifern ausge- ten Cylinders zugeführt und entweder durch einen ergebenden Reiber oder durch diesen Cylinders selbst n den Stein gedrückt; der Handarbeit verbleibt r nur noch das Anlegen und Abnehmen der ter.

n manchen Fällen sind die lithographischen Bilder träglich noch mit einer Prägung zu versehen, durch e einzelne Theile des Papiers sich aus der Ebene ben zur Erhöhung des Effectes emporheben; u benutzt man besondere Pressen (Schrauben- oder ebelpressen), welche das Papier zwischen einer est gravirten Messingplatte und einer entsprechend ilsten, die Gegenform darbietenden Platte von hem Material (Blei, Zeder, Pappe) einem starken d auszufassen gestalten; eine kleinere Prägpreffe r Art mit Schraube und Schwungflügeln ist in 15 zur Anschauung gebracht.

## Maschinen der Taback- und Cigarrenindustrie.

(Tafel 16.)

lon den zur Verwandlung der Tabackblätter in ctaback und in Cigarren benutzten mechanischen ssmitteln enthält die vorliegende Tafel zwei Taback- eidemaschinen (Fig. 13 und 16), sowie die sämtli-

chen in der Cigarrenfabrikation benutzten Werkzeuge und Maschinen.

Die in Fig. 16 dargestellte kleinere Tabackschneide- maschine ist für Handbetrieb berechnet; der in schmale Streifen zu zerschneidende Taback (in Form eines Blätterbündels oder eines zusammengekehrten Stranges, einer Rolle) liegt auf einem Tisch und wird mittels der federnden Platte F gegen denselben angebrückt; zwei aufgeschraubte Winkelplatten wie G bewirken die seitliche Führung; das Messer sitzt an einem Schieber, der in einer Prismenführung des Gestelles I beweglich ist, durch zwei Schraubenfedern aufwärts, durch Drehung eines in einen Handhebel auslaufenden Excenters H niedermwärts bewegt wird; bei der Niederbewegung erfolgt nicht allein das Zerschneiden des Tabacks, sondern auch vorher die erforderliche Zuschübung desselben; hierzu dient die an der untern Kante gezahnte, mit Langlöchern auf zwei Stiften des Gestells aufge- hängte Platte A, gegen deren am obern Rande an- geschraubte Schiene B die am Messer sitzende Nagge C verschiebend und drehend zugleich wirkt, dergestalt, daß diese Platte A in den Taback einsticht und den- selben unter das Messer schiebt, indem sie in die im Verticalschnitt punktiert ausgegebene Position übergeht; beim Rückgang des Messers wird dieser Zubringer durch Federn wieder in die alte Lage geschoben, wobei die Stellung der Schraube D zur Regulirung der End- position und damit der Zuschübsgröße des Tabacks dient. Fig. 13 zeigt eine große für Dampfetrieb eingerichtete Tabackschneidemaschine; die Bewegung des Messers an der Mündung eines den Taback enthal- tenden Kastens wird mittels Kurbelgetriebe, Balancier und Schubstange von einer horizontal gelagerten An- triebswelle abgeleitet; die rudweise Zuschübung der in größerer Zahl übereinandergelegten Tabackblätter erfolgt mittels einer über dem Boden des erwähnten Kastens gelagerten Nissenwalze, welche von derselben Antriebs- welle aus durch Kurbelgetriebe, Schaltwerk und Stirn- räderpaar vor jedem Niedergang des Schneidemeßers eine kleine Drehung empfängt; da man sich den Taback in so hoher Schicht eingepackt denken muß, daß er zwischen Walze und Kastenboden mit einiger Spannung eingeklemmt ist, so setzt sich diese Walzenrotation in eine Verschiebung des Tabacks um; die Größe derselben kann dadurch verändert (regulirt) werden, daß man den zum Betrieb des Schaltwerks bestimmten Kurbel- zapfen in der diametralen Luft der auf der Antriebs- welle sitzenden Kurbelscheibe an eine andere Stelle bringt.

Von größerer Mannichfaltigkeit sind die in den übr- gen Figuren dargestellten Werkzeuge und Maschinen der Cigarrenfabrikation. Jede Cigarre durch- läuft die folgenden vier Operationen: Bildung der Einlage, Umwicklung des Umblattes, Formgebung durch Pressen, endlich Auflegen des Deckblattes (Wideln) und Vollendung. Zur Bildung der Einlage bedient man sich gegenwärtig fast auskbalben einer maschinellen Einrich- tung, welche mit den schon beschriebenen Tabackschneide- maschinen einige Aehnlichkeit hat, nämlich einer soge- nannten Einlagebeilmaschine; eine der verbreit- testen (von Reimiger in Stuttgart) zeigt Fig. 14. Der vorbereitete lufttrockene Taback wird in Partien, welche das Material für 80 bis 150 Stüd Cigarren enthalten, abgemogen und in eisernen Mahnen von 600 Millimeter Länge, deren Breite mit der Länge der zu erzeugenden Cigarre übereinstimmt, in gleichförmig wider Schicht ausgebreitet; mittels dieser Mahnen wird der Taback bei a in den Zuführungskanal der Maschine einge- schüttet und nunmehr mittels zweier endlosen Leder- oder Guttaperchariemen dem Schneideapparat zugeführt,



welcher die den einzelnen Cigarren entsprechenden Quantitäten abschneidet; die abzutrennende Partie wird schon vor Ausführung des Schnitts von einem eigenthümlichen Zangenapparat gefaßt und durch denselben nach beendetem Schnitt in ein kleines fargförmiges Wackelstück abgelegt; die gefüllten Käftchen werden durch schrittweise Schiebung des sie tragenden Tisches vom Schneideapparat entfernt, später von einem Arbeiter abgenommen und den Widelmaschinen übergeben. Der Weg, um welchen der Tabak nach jedem Schnitt vorgeschoben wird, kann nach Belieben verändert, so nach bei jedem Schnitt eine größere oder kleinere Menge abgetrennt werden, wie es die Größe der Cigarre erfordert. Die Maschine macht in der Minute 45 Schnitte, kann also stündlich 2700 Stück Einlagen liefern.

Um die so abgemessenen Tabakportionen vorläufig zusammenzuhalten und zu cigarrenähnlich gestalteten „Wideln“ zusammenzuschließen, wird ein streifenförmig zugeschnittenes Tabakblatt (Umblatt) herumgewidelt, wozu man eine der in Fig. 12 und 15 dargestellten Widelmaschinen verwendet. Die Wirkungsweise derselben beruht auf der Anwendung eines an beiden Enden befestigten Tuchs (Wideltuch), auf welches das Umblatt aufgelegt wird; vor letztem wird in eine schleifenförmige Ausbeulung dieses Tuchs die Einlage eingeschüttet und sodann mittels bogenförmiger (Fig. 12) oder geradliniger (Fig. 15) Verschiebung zweier kleiner Rollen so über dem Tuch bingerollt, daß sie sich gänzlich in das Umblatt einhüllt und sonach eine kreiszylindrische Gestalt annimmt.

Neuerdings hat man die beschriebenen zwei Maschinen mit Vortheil zu einer einzigen verschmolzen (Widelerzeugungsmaschine), welche sonach in einem Zuführungsanal den für die Einlagen bestimmten Tabak empfängt und die mit Umblatt versehenen Wideln abliefern, sämtliche erforderlichen Bewegungen selbstthätig vollführend (Dillmann, Friedrich, Donath und Jasper u. f. w.).

Damit nun die Wideln eine schönere, nach den Enden hin verjüngte Gestalt annehmen, werden sie in zweitheilige hölzerne Formen (Fig. 3—5) eingelegt, deren man eine größere Anzahl übereinanderschichtet, um sie in einer Schraubenpresse (Fig. 6 und 7) fest zusammenzudrücken und in diesem Zustand einer etwas erhöhten Temperatur auszusetzen; die Formen werden nach einigen Tagen unter Gebrauch besonderer Zangen (Fig. 5) wieder geöffnet, worauf die faconirten Wideln herausgenommen und nun mit dem Dedblatt versehen und gänzlich vollendet werden.

Man schneidet mittels eines Schneidrädchens (Fig. 1) oder eines Messers (Fig. 8) aus besonders fehlerfreien (unverletzten) Tabakblättern Streifen von 50 bis 60 Millimeter Breite und widelt diese auf dem Rollbret (Fig. 9) in Schraubengangform um die Cigarre, indem man das Mundstück mit etwas braungefärbtem Meißer festigt und sorgfältig ausbildet, das entgegengesetzte Ende aber unter Benutzung eines am Rollbret angebrachten Maßstabes (Fig. 9) und des Messers (Fig. 8), oder unter Anwendung einer eigenen kleinen Abschnidemaschine, deren Einrichtung aus Fig. 10 ohne weitere Erklärung zu verstehen ist, abschneidet. In Fig. 2 ist eine mit Auflegung des Dedblattes beschäftigte Arbeiterin abgebildet.

Die fertigen Cigarren werden endlich in dem Bündelstod (Fig. 11), zu 25 oder 50 Stück abgezählt und mit Bast oder Seidenband in der allbekannten Art umwidelt, endlich in Käftchen zu 100, 500 oder 1000 Stück verpackt.

## Uhren Räderuhr.

(Tafel 17.)

Auf vorliegender Tafel soll die Uhr zu genauer Messung der Zeit zu Räderuhren veranschaulicht werden. Unter den maschinellen Hilfsmitteln der Technik durch den Umstand gerechtfertigt, Räderuhr als eine mit eigenem Motor (Jedermotor) ausgerüstete Maschine zu einer gleichförmigen Bewegung (also einer Bewegung, der Zeiger auf einem Zifferblatt anzuzeigen kann. Jede Räderuhr setzt sich aus wesentlichen Theilen zusammen: 1) einem Gehäuse, in welchem die Entwindung eines Federquantums übertragen ist; 2) einem Räderwerk, welches sich jenes Arbeitsquantum in der Zeit so erhält, daß es durch das Triebwerk in der Zeit erhalten wird; 3) eine Vorrichtung, die die Umdrehung, dergestalt, daß die proportionale verläuft, und endlich 4) eine Vorrichtung, welche gestattet, in jedem Augenblicke den Stand des Räderwerks und damit die Zeit zu beobachten.

1) Das Triebwerk. Je nach der Kraft oder der Kraft elastischer Feder, die erforderlichen Arbeitsquantum herbeizuführen man als die zwei Hauptarten von Uhren und Federuhren. Bei jenen wird die Kraft der Erde auf ein an einem Ketten aufgehängtes Gewicht und durch eine herabzieht, eine Welle um, auf der ein Räderwerk ist; bei letztem wird ein elastische Feder durch die Umdrehung der Welle in Drehung. Uhren können nur in feststehender ruhiger Lage stehen; Uhren der letztern Art vertragen sich auch die Regulierung mittels einer Feder ausgeführt wird, beliebige in beiden Arten von Uhren können nicht in Thätigkeit verbleiben, als die Kraft nicht erschöpft ist. Bei jenen Uhren ein zeitweiliges Aufwinden des Gewichtes, bei letztern ein Aufwinden der Feder.

Fig. 1 zeigt die einfache Anordnung einer Gewichtsunhr; A ist die Umdrehung des Seils P befestigt ist; B ist ein vierkantiges eiserne Welle, auf dem das tragende Ende der Schlüssel zum Räderwerk; die Verbindung der Seilmitte mit dem Rad B des Räderwerks geschieht durch den Sperrkegel k; letzteres ist mit dem Rad verbunden, welches die Trommel allein ohne das Räderwerk zu bewegen.

In Fig. 3 ist das Triebwerk einer zwei verschiedenen Stellungen der Feder aus einem dünnen, zu einer Spirale gebogenen Stahlstreifen, welcher am Ende an der Achse hängt, am anderen Ende mit dem Federhaus verbunden ist. Die kreiszylindrische, lose auf die Achse etwas höher als der Breite der Feder so weit, daß die Feder im vollständigem Zustande nicht hineingeht, jedes Mal zusammengezwungen zu werden gebracht zu werden; der obere Theil im ausgedehnten, der untere im

e. Hält man die Achse fest und dreht das Federhaus in der Richtung des obern Pfeils um, so windet die Feder um die Achse und nimmt schließlich die Gestalt der untern Figur an; in dieser Lage übt sie Druck aus in der Richtung des untern Pfeils; man die Achse und läßt das Federhaus frei, so sich die Feder wieder aus und treibt das Federhaus um. Man hat zwei Mittel, die so erzeugte Spannung auf das Räderwerk der Uhr zu übertragen; der widelt man auf den cylindrischen Mantel des Federhauses eine Kette auf, deren anderes Ende mit einer Spiralfeder verbunden ist, oder man gibt der Peripherie des Federhauses Zähne und läßt dieselben direct auf ein zweites Zahnrad eingreifen. Fig. 4 stellt die Anordnung perspectivisch, Fig. 5 im Aufriss dar; letztere bezeichnet  $s$  das Federhaus mit der darum gewickelten feingliederigen Kette,  $a$  die Achse desselben,  $A$  und  $B$  in zwei parallele Platten  $A$  und  $B$  eingelegt sind. Diese Platten stützen noch eine andere Platte  $b$  auf, auf welcher die sogenannte Schnecke feststeht. Diese besteht aus einem abgestumpften, mit einem Haken versehenen Kegel, an dessen größtem Durchmesser das Ende der Kette befestigt ist; bei  $b$  die Achse der Schnecke in Form eines kurzen vierseitigen Stiftes, auf welchen der Schlüssel  $d$  auf der Platte  $B$  hervor; dreht man den Schlüssel um, so dreht sich die Kette von dem Federhaus ab und auf die Hänge der Schnecke; die Feder wird also aufgezogen und angespannt. Denkt man sich die Feder aufgezogen, so ist von der Kette nichts oder nur wenig von der obersten Windung auf dem Federhaus, wogegen die spiralförmigen Gänge der Schnecke mit der Kette umgeben sind; die Feder wirkt also in diesem aufgezogenen Zustande zuerst auf die oberste Windung, welche, wie man sieht, den kleinsten Durchmesser hat; läuft die Feder ab, so wirkt sie durch die Kette allmählich auf immer größere Halbmesser der Schnecke; diese besondere Einrichtung ist darin bedacht, daß die Feder im Anfang ihrer Wirkung, in ganz aufgezogenem Zustande, die stärkste Zugentfaltung zeigt; man wünscht aber eine möglichst gleichmäßige Kraft während der ganzen Aufwindung der Feder, deshalb läßt man die Feder in dem Zustande ihrer stärksten Anspannung auf den kleinsten Durchmesser oder den kleinsten Regelhalbmesser wirken, in dem Maße, wie die Kraft der Feder abnimmt, so vergrößert der getriebene Regelhalbmesser, womit die Ueberwindung des Kraftmomentes begünstigt erscheint. Fig. 4 ist das Federhaus mit  $A$ , die Kette mit  $C$  und die Schnecke mit  $C$  und das mit dieser verbundene, die Uebertragung der erzeugten Rotation bestimmende Zahnrad mit  $D$  bezeichnet.

Fig. 6 zeigt die obere Fläche eines Federhauses, bei dem man mit Vermeidung der Kette die Kraft der Feder direct durch ein Zahnrad überträgt; zugleich ist das sogenannte Gesperrrad dargestellt; dasselbe ist aus einem auf der Achse des Federhauses sitzenden Sperrrad  $r$ , in dessen Zähne ein Sperrkegel einsteckt; letzterer ist durch seine Achse mit dem Dedel des Federhauses verbunden und wird durch die Bogenform mit der Spitze gegen die Zähne des Rades  $r$  angepreßt; man kann daher das letztere und somit auch die Achse des Federhauses nur in der Richtung des Pfeils herumdrehen; der Sperrkegel gleitet dabei von den Zähnen des Sperrrades auf den andern, und wenn man mit der Drehung aufhört, so legt er sich gegen den Einschnitt und verhindert die Rückdrehung des Rades. Beim Aufziehen der Uhr dreht die Achse natürlich infolge des Drucks der Feder allmählich, und dieser Bewegung folgt das Federhaus, welches somit durch seine Zähne die Kraft auf die abtragenen Räder überträgt.

welches somit durch seine Zähne die Kraft auf die abtragenen Räder überträgt.

Außer dem Gesperrrad, welches das Zurückdrehen der Feder bewirkt, hat jede Uhr noch eine andere Vorrichtung, durch welche man verhindert, daß die Feder übermäßig aufgezogen wird; man nennt dieselbe die Selbsthemmung (Fig. 7). Auf dem Dedel des Federhauses ist nämlich noch ein kleineres Rad  $u$  angebracht, welches etwa zur Hälfte seines Umfangs verzahnt ist. Die Achse, an der man aufzieht, trägt außerdem ein Rad mit einem einzigen Zahn  $s$ , der sich mit dem Rad  $u$  dreht; dieser Stift dreht bei jedem Umgang das Rad  $u$  um einen Zahn; kommt so nach einigen Umdrehungen der verzahnte Theil des Rades  $u$  dem Zahn  $s$  gegenüber, so stemmt sich letzterer gegen diesen unverzahnten Rand und eine weitere Umdrehung ist unmöglich. Beim Ablaufen der Uhr macht der Stift  $s$  und insolge dessen auch das Rad  $u$  den entgegengesetzten Weg und muß nach einer gewissen Zahl von Umdrehungen dann auch von selbst wieder stehen bleiben.

2) Das Räderwerk. Als Beispiel der Anordnung des Räderwerks und der Verbindung desselben mit dem Triebwerk und der unter 3) zu betrachtenden Hemmung enthält unsere Tafel in Fig. 1 den verticalen Durchschnitt einer Gewichtuhr in ihrer einfachsten Einrichtung. Die Verbindung der Seiltrommel  $A$  mit dem Bodenrad  $B$  wurde bereits oben beschrieben; letzteres hat 100 Zähne und greift in das Getriebe  $C$  des Rades  $D$ , welches 80 Zähne hat und das Minutenrad heißt; das dritte durch sein Getriebe  $E$  mit dem Minutenrad in Verbindung stehende Rad  $F$  (das Mittelrad) hat 60 Zähne; in dieses endlich greift das Getriebe  $G$  des mit 30 Zähnen versehenen Rades  $H$  ein, welches Hemmrad oder Steigrad genannt wird; die Zahnzahlen der Getriebe  $C$ ,  $E$  und  $G$  sind 8, 8 und 10. Das Minutenrad  $D$  muß sich in der Stunde einmal umdrehen, daher das Steigrad  $H$

$$\frac{80}{8} \times \frac{60}{10} =$$

60 mal; daß solches nun wirklich geschieht, dafür hat die Regulirungsvorrichtung zu sorgen, von der man in der Figur bei  $K$  einen Theil erblickt; dieser Theil hat nämlich die Aufgabe, die sich drehenden Zähne des Steigrads nur einzeln vorwärts schreiten zu lassen; er ist zu diesem Zwecke mit dem Regulator (im vorliegenden Falle einem Pendel) verbunden; bei jedem vollen Spiel des Pendels schlägt ein Zahn von  $H$  unter den Spitzen von  $K$  hindurch; es sind demnach 30 Spiele (60 einfache Schwingungen) nöthig, damit das Rad  $H$  sich einmal umdrehe; soll diese Umdrehung nun genau in einer Minute erfolgen, so muß das Pendel Secunden schlagen.

3) Regulirungsvorrichtungen oder Hemmungen. Dieselben haben den Zweck, die durch die Triebkraft verursachte Bewegung des Räderwerks in Uebereinstimmung mit der bestmöglichen Eintheilung des Tages in Stunden, Minuten und Secunden zu setzen. Wie die Triebkraft stets am ersten Rade wirkt, so greift die Regulirungsvorrichtung in das letzte oder Steigrad ein. Zu dieser Regulirung gehört ebenfalls eine Kraft, welche aber ihrer Intensität nach der Triebkraft nachsehen kann, da sie direct nur die Bewegung des letzten, sich mit der geringsten Kraft drehenden Rades  $H$  zu hemmen braucht. Auch hierzu dient wieder entweder die Schwere oder die Elasticität einer Feder. Die Schwere findet Anwendung durch das Pendel, die Federkraft durch die Unruhe. Da die Schwingungsdauer eines Pendels (bei geringer Schwingungsweite) allein von der Pendellänge abhängt, und da für die vorliegende Verwendung eine

unveränderliche Schwingungsdauer vor allen Dingen nothwendig ist, so müssen bei einer Uhr, deren Gang sich nicht ändern soll, Vorkehrungen getroffen sein, welche eine Verlängerung oder Verkürzung des Pendels unmöglich machen; solche Vorkehrungen treten bei jedem Pendel ein, wenn die Temperatur der umgebenden Luft sich ändert; in der Wärme dehnt sich das Pendel aus (die Uhr geht langsamer), in der Kälte verkürzt es sich (die Uhr geht schneller); damit diese Veränderungen bei wechselnder Temperatur nicht eintreten, muß das Pendel als Compensationspendel (Fig. 2) ausgeführt sein. Die Construction desselben beruht auf der verschieden starken Ausdehnung verschiedener Metalle bei gleicher Temperaturänderung; es besteht nämlich aus fünf Eisenstäben und vier Messingstäben; jene sind in der Figur dunkler dargestellt als diese. Zwei von den Eisenstäben sind oben und unten an einem Querstück befestigt; an dem untern Querstück sitzen die zwei äußersten Messingstäbe, welche oben ein zweites Querstück tragen; daran befinden sich abermals zwei Eisenstäbe, welche unten verbunden sind und gleichzeitig ein paar Messingstäbe tragen; diese endlich sind oben wiederum mit einem dritten noch schmälern Querstück verbunden, welches schließlich eine Eisenstange trägt, an der die Linse des Pendels hängt; wenn dieses Pendel nun eine Temperaturerhöhung erfährt, so dehnen sich alle Messingstäbe aus. Durch die Ausdehnung der beiden äußersten Eisenstäbe wird der erste Querstab gesenkt und zieht die beiden äußersten Messingstäbe ebenfalls mit herab; durch die Ausdehnung dieser aber wird der zweite Querstab oben wieder gehoben, und da das Messing sich stärker ausdehnt als das Eisen, so wird er mehr gehoben als er vorher gesenkt war. Die Ausdehnung der zweitinneren Eisenstäbe bewirkt eine Senkung des zweituntersten Querstabes und damit auch der daran befestigten Messingstäbe; diese aber veranlassen durch ihre Ausdehnung eine Hebung des drittobersten Querstabes, und diese Hebung ist wiederum größer als die vorangegangene Senkung; endlich findet noch eine schließlich Senkung des mittelsten Eisenstabes und damit der Linse statt. Man sieht hiernach, daß die Ausdehnung der Eisenstäbe eine Senkung, die der Messingstäbe eine Hebung der Linse bewirkt. Wenn nun die Hebung gerade so groß ist, daß dadurch die Senkung aufgehoben wird, so muß offenbar trotz der Temperaturänderung die Linse an ihrer Stelle bleiben; durch genaue Versuche hat man die Länge der Stäbe derart zu bestimmen vermocht, daß dieses Ziel in der That erreicht wird. Bringt man ein solches Compensationspendel so an einer Uhr an, daß der gabelförmige Hals K (Fig. 1) unveränderlich mit ihm verbunden ist und gleichzeitig mit ihm schwingt, so ist nunmehr das Durchschlüpfen der Zähne des Steigrades H an genau abgemessene unveränderliche Zeiträume gebunden und danach wird sich dann auch der Gang der Uhr richten.

Benutzt man, wie dies bei tragbaren Uhren der Fall sein muß, statt des Pendels eine Stahlfeder (Unruhe), so gibt man derselben eine Form wie Fig. 11. In einer leicht drehbaren Welle o ist das eine innere Ende einer spiralförmig gewundenen sehr dünnen Stahlfeder befestigt, deren äußeres freies Ende bei f festgehalten ist. Auf der Welle o sitzt, mittels dreier Arme befestigt, das kleine Schwingrad s, welches an den Drehungen dieser Welle theilnimmt; denkt man sich dieselbe nun durch irgendeine Kraft so angestoßen, daß die Spiralfeder (Unruhe) entweder etwas auf- oder zugewunden, mit einem Wort aus ihrer Gleichgewichtslage gebracht wird, so übt nach dem Aufhören jener Einwirkung die Elasticität der Feder einen Druck auf

die Achse aus, welcher sie nebst der Unruhe entgegengegesetzten Richtung hin, in die Position angelassen, hört die Schwingung ab. Das Schwingrad aber setzt infolge der einmal eingeleitete Bewegung über die Unruhe aus in derselben Richtung noch in die Unruhe, welche dadurch wieder in die Gleichgewichtslage gebracht ist, gesteuert. Die Unruhe wächst allmählich mit der Zeit um welchen sie auf- oder zugewunden wird daher bald eine Lage erreicht hat, bei welcher die im Schwingrad wirkende Kraft durch den Elasticitätsdruck ausgeglichen ist; dann wirkt wieder die Unruhe, das Schwingrad kehrt in die Unruhe und geht sodann über dieselbe in die entgegengegesetzten Seite, bis abermals die Unruhe die Gleichgewichtslage erreicht. Diese schwingende Bewegung, welche die Unruhe mit der Pendelbewegung hat, dauert, wenn nicht der Widerstand der Reibung, welche die Achse o in ihrer Lagerung erleidet, die ganze Vorrichtung allmählich zum Stillstand bringen würde. Die Kraft, welche die Unruhe auf- oder Zugewunden hält, ist ungewänderter Breite und Zeit die Länge ab; verkürzt man die Feder, so stärkern, verlängert man sie, so schwächen sie sich aus; im ersten Falle wird sie schneller, im zweiten langsamer. In der übrigen in Frage kommenden Einrichtung. Man hat also bei der Unruhe ein Mittel, die Schwingungsdauer zu vergrößern oder zu verkleinern, beides durch Verlängerung oder Verkürzung der Feder. 11 ist eine hierzu geeignete, allen Umständen gestellte. Ein theilweise verzahntes Spiel im Eingriff mit dem auf der Unruhe befindlichen Ringstück a, welches mit der Unruhe verbunden ist; letzterer reicht bis unter die Unruhe der Spiralfeder f e und ist mit zwei getheilten Stiften versehen, welche zwischen der Spiralfeder zwischen sich haben. Die Unruhe r, so verschiebt man dadurch die Unruhe auch den Anschlag c; da die Unruhe der Feder, welche bei dem Spiel der Unruhe kommt, nur von c bis o reicht, so kann man sagen: die wirkliche Länge der Feder ist die Länge der Feder von c bis o (also das Spiel dieses Apparates). Wenn man denselben Zeiger in der Unruhe r, die beiden Buchstaben A (Anschlag) finden sich auf einer über r ausgehenden Gravirung. Bei neuern Uhren hat man den apparat gewöhnlich die in Fig. 10 die Unruhe r ist das Schwingrad, welches mit ihrem Ende c bei der Unruhe innere Ende der Spirale ist, welches mit dem Schwingrad verbunden; dieses innere Ende drehbar gelagert; das Spiel findet sich in der Winkelplatte k; die Unruhe f sich zwischen zwei Schrauben g und h, welche zwei Fortsätze, welche an der Unruhe und einen kürzern breitem g trägt, sich über einer Kreisheilung a k befinden. Nach unten gerichtet zwei Fortsätze, welche wieder die äußerste Winkelplatte k klemmt ist; dreht man daher die Unruhe, so wird die Spirale verkürzt, die Unruhe



dagegen  $\beta$  nach  $R$ , so wird die Spirale die Uhr geht nach.

Verbindung Feder und Schwungrad gibt erer Tafel noch eine perspectivische Dar-

ne einmal regulirte Uhr unverändert den-  
1 behalte, müssen noch weitere Vorkehrungen  
erden, welche die von Temperaturschwän-  
elasten Dimensionsveränderungen der Feder  
hwingrades unschädlich machen. Das leg-  
an hierzu nicht aus einem Stück, sondern  
trennten halbkreisförmigen Wägeln  $a$  und  
)) her; jeder dieser Wägel ist nur einseitig  
an den Enden eines mit der Unruhswelle  
Armes  $c c'$  befestigt; diese Wägel sind  
einem Stahl- und einem Messingstreifen  
mengeselbte, daß jener die innere, dieser  
eripierie bildet; da nun der Ausdehnungs-  
s Stahls kleiner ist als derjenige des  
verlängert sich bei eintretender Temperatur-  
Messingstreifen mehr als der Stahlstreifen,  
Ummung des ganzen Streifens nach ein-  
läßt. Es sind nun verschiedene Schraubchen  
köpfen in diese Streifen eingeschraubt (11),  
Hauptmasse des Rades mehr in den äußern  
legt wird. Dadurch wird eine geringe  
ung der Streifen von stärkerm Einfluß und  
e kräftige Compensation zu Stande. Umge-  
wenn durch Temperaturenniedrigung das  
sich zusammenzieht, die Metallstreifen sich  
lumen, wodurch die Schraubköpfe in  
Mitte entfernt werden, also das Träg-  
des Rades, welches sich durch jene Zu-  
g verringerte, wieder erhöht wird. Je-  
t nun diesen Schraubchen verschiedene  
uf dem Umsaße des Rades gibt, kann  
Gleichung genau reguliren. Derartige  
Unruhen wendet man in neuerer Zeit  
hnlischen gut gearbeiteten Taschenuhren an.  
e Unruhe bilden nur einen Theil der  
chtung, welche am Ende des Räderwerks  
n muß, um das regelmäßige Ablaufen  
erwickeln. Zwischen ihnen und dem Steig-  
ch eine vermittelnde Einrichtung ange-  
elche direct in letzteres eingreift und die  
selben regelt. Einrichtungen dieser Art  
eciellen Hemmungen genannt. Sie  
überein, daß sie durch das Pendel oder  
uhe in schwingende Bewegung versetzt  
egen die Umdrehung des Steigrades  
ankämpfen, indem sie nur Zahn für  
e durchschlüpfen lassen. Es findet also  
ein fortwährender Angriff der Hemmung  
rad und umgekehrt des Steigrades auf  
statt; letzteres ist nothwendig, damit  
ung und Luftwiderstand verloren gebende  
n dem Regulator (Pendel, Unruhe)  
erfetzt wird. Die Fig. 12—16 stellen  
ten vorkommenden Hemmungen dar.  
st die sogenannte Spindelhemmung.  
es Steigrades  $AB$  stehen normal zur  
und haben die Form gewöhnlicher  
uf der Welle  $w$  sitzt das Getriebe  $t$ ,  
n Räderwerk im Eingriff steht; dasselbe  
einen steten Antrieb, und zwar in der  
Pfeils. Normal zur Welle  $w$  liegt eine  
 $b$ , welche mit der Spirale  $s$  in Verbin-  
durch dieselbe getrieben wird. Diese  
unter 90 Grad gegeneinander gestellte  
; die in der Figur angegebene Stellung

ist die Ruhelage. Der Zahn  $\alpha$  schiebt infolge des An-  
triebs von  $AB$  auf den Flügel  $l$ , sucht ihn zu heben  
und dadurch die Welle  $w$  umzudrehen. Wenn es  
ihm gelingt, den Flügel  $l$  hoch genug zu heben, so  
schlüpft er unter demselben hinweg; während dessen  
aber hat sich der andere Flügel  $l'$  gesenkt, stellt sich  
dem Zahne  $\beta$  entgegen und hindert diesen in seiner  
fortschreitenden Bewegung; dadurch wird natürlich das  
ganze Steigrad gehemmt. Nachdem der Zahn  $\alpha$  aber  
unterhalb des Flügels  $l'$  hinweggegangen ist, ist letz-  
terer wieder frei und kann der von der Unruhe aus-  
gehenden rückwirkenden Bewegung folgen, wodurch sich  
die ganze Welle in der entgegengesetzten Richtung  
dreht; dadurch wird auch der Flügel  $l'$  wieder ge-  
hoben und läßt den Zahn  $\beta$  hindurch; mittlerweile  
kommt aber der Zahn  $\delta$  dem Flügel  $l$  entgegen und  
wird von diesem gehemmt; er kann nicht eher vorbei,  
bevor nicht die Unruhe eine rückläufige Bewegung  
macht; dies geschieht, sobald die Ruhelage, die sie nach  
jeder Schwingung erreicht, vorüber ist. Der Zahn  $\delta$   
wird infolge der abermal's aufsteigenden Bewegung  
von  $l'$  frei und schlüpft hindurch; es wird aber jetzt  
der Zahn  $\epsilon$  gehemmt; so geht also während jeder  
ganzen Schwingung der Unruhe ein Zahn auf jeder  
Seite durch; das Steigrad dreht sich also um den der  
Theilung desselben entsprechenden Betrag. Die Zähne  
ertheilen den Flügeln bei jeder Schwingung der Un-  
ruhe einen Stoß, beschleunigen also diese Schwingung,  
sodas nach jedem Stoß der betreffende Flügel sich ein  
wenig höher heben muß als vorher; wenn er also  
im Anfang der Bewegung sich gerade nur so weit hob,  
daß der betreffende Zahn eben durch konnte, wird er  
bei einer folgenden Schwingung der Unruhe sich noch  
weiter heben, nachdem der Zahn schon durchgeschlüpft  
ist. Dies aber hat seine Grenze, denn es wird gleich-  
zeitig der andere Flügel dadurch dem ihm entgegen-  
kommenden Zahn mit größerer Kraft entgegengeschoben  
als vorher; bald tritt ein Augenblick ein, in welchem  
Wirkung und Gegenwirkung sich ausgleichen, d. h. die  
Beschleunigung der Unruhe durch das Triebwerk und  
umgekehrt die Zurückwerfung des Triebwerks durch die  
Unruhe erreicht ein gewisses Maximum, welches von  
der relativen Stärke der beiden Federn (Triebfeder und  
Unruhe) abhängt.

In Fig. 12 ist die vollkommene Graham'sche An-  
terhemmung dargestellt. Die Steigradzähne, in der  
Ebene des Rades liegend, sind spitz, auf der voran-  
gehenden Seite gerade, aber etwas gegen die Richtung  
des Steigradhalbmessers geneigt und auf der Rückseite  
ein wenig ausgebogen; der Anker  $x$  dreht sich um  $D$ , welche  
Achse gleichzeitig auch die Drehungsachse des Pendels  
ist; das Stück  $m \times n$  hat die Form eines Kreisbogens;  
1 und 2 sind die Paletten; die Endflächen derselben  
sind Hebungsfächen; die andern beiden Flächen  $m c$   
und  $o d$ , sowie  $b n$  und  $a r$  sind Theile zweier con-  
centrischen Cylindermantelflächen, deren gemeinschaftliche  
Achse in  $D$  liegt. Es sind demnach alle Punkte der  
Flächen  $m c$  und  $b n$  gleichweit von dem Punkte  $D$   
entfernt; dasselbe gilt auch von den Flächen  $o d$  und  
 $a r$ ; das Steigrad dreht sich in der Richtung des Pfeils.  
Das Spiel dieser Hemmung ist folgendes: Wird in  
der durch die Figur dargestellten Lage das Pendel  
ein wenig nach links bewegt, so gleitet die Spitze des  
Zahnes  $\alpha$  auf der Hebungsfäche  $c d$  nach rechts und  
ertheilt dem Anker und somit auch dem Pendel eine  
Beschleunigung. Ist die Schwingungsbreite groß genug,  
so erreicht die Spitze des Zahnes  $\alpha$  die Spitze  $d$  der  
Palette 1 und passiert dieselbe; gleichzeitig hat sich die  
Palette 2 zwischen die Zähne  $\gamma$  und  $\delta$  eingeklinkt und  
in dem Augenblicke, in welchem  $\alpha$  gerade über  $d$  hin-

weggeht, legt sich die Spitze von  $\gamma$  an die Fläche  $a$ , und zwar ganz dicht bei  $a$ , wodurch das Steigrad gehemmt wird; das Pendel kehrt nun zurück, die Spitze von  $\gamma$  tritt auf die Hebungsfäche  $a$  b der Palette 2 und beschleunigt den Anker; sie gleitet bis  $b$  und paßirt die Palette. In diesem Augenblicke aber legt sich der Zahn  $e$  mit seiner vordern Kante an die Fläche  $m$   $c$  ganz nahe bei  $c$ , an, wodurch das Steigrad abermals gehemmt wird; es erfolgt ein neuer Ausschlag; der Zahn  $e$  streicht auf der Hebungsfäche  $c$   $d$  hin, paßirt  $d$  und der Zahn  $\eta$  legt sich an die Fläche  $a$ . Wenn der Ausschlagwinkel des Pendels immer gerade nur so groß bleibt wie der Drehungswinkel des Steigrades während der Hebung, so würde die Spitze eines jeden Zahns, welcher sich an die Flächen  $m$ ,  $c$ ,  $a$  anlegt, immer nur ganz dicht bei  $c$  resp.  $a$  anslagen; da aber das Steigrad dem Pendel bei jeder Congnation eine Beschleunigung ertheilt, so nehmen die Schwingungswinkel allmählich zu, d. h. das Pendel und somit der Anker schwingen noch, nachdem  $z$ . B. der Zahn  $a$  den Punkt  $d$  der Hebungsfäche paßirt hat, also frei geworden ist. In diesem Augenblicke hat sich aber der Zahn  $\gamma$  bereits an die Fläche  $a$  angelegt, und da nun das Pendel noch weiter nach links schwingt, so gleitet die Palette 2 noch tiefer in den Zwischenraum zwischen  $\gamma$  und  $d$  hinein. Es ist aber bereits erwähnt, daß alle Punkte der Fläche  $a$  gleichweit von der Drehachse  $l$  entfernt sind; daher kann der Anker, während er in den Zwischenraum  $\gamma$   $d$  hineinrückt, keine Wirkung auf das Steigrad ausüben; es ist gerade so, als ob der Zahn  $\gamma$  einfach nur mit der Palette 2 in Berührung bliebe. Die Wechselwirkung zwischen Steigrad und Pendel besteht also bei dieser Hemmung nur darin, daß letzteres im Anfang einer jeden Schwingung die nötige Beschleunigung erhält, ohne durch eine Gegenwirkung des Steigrades in seinem Ausschlagen gehindert zu sein.

Fig. 14 ist die perspectivische Darstellung der gleichfalls von Graham erfundenen Cylindrehemmung. Das Steigrad  $A$  hat eine bogenförmig ausgeschnittene Peripherie und trägt senkrecht zu seiner Ebene an den Spitzen der Bogen kleine Stäbchen, welche an ihren Endpunkten mit eigenthümlich geformten keilförmigen Zähnen, die sämmtlich in einer der Kabebene parallelen Ebene liegen, versehen sind;  $B$  ist der sogenannte Cylindrer, welcher um die mit der Steigradachse parallele Achse  $cd$  leicht drehbar ist. Der obere und untere Theil des Cylinders ist massiv, der mittlere aber hohl und an der einen Seite ziemlich halb aufgeschnitten ( $ab$ ); die Schnittfläche bei  $a$  ist gerade und etwas gegen die Richtung des Halbmessers geneigt; die Schnittfläche bei  $b$  dagegen ist gerundet;  $a$  und  $b$  sind die Hebungsfächen oder Lippen. Infolge seiner Aufstellung gestattet der Cylindrer den Eintritt der Steigradzähne in sein Inneres. Auf der Achse des Cylinders ist senkrecht zu derselben die Unruhe aufgesetzt, so daß also der Cylindrer infolge der Unruhenschwingungen oscillirt. Wie daher die schrägen Flächen der Zähne  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  u. s. w. abwechselnd an  $a$  und  $b$  drehend auf den Cylindrer wirken (den Arbeitsverlust durch Reibung und Luftwiderstand erfendend) und die Cylindrerwandungen die Steigradzähne zeitweilig aufhalten, ist nach Analogie der vorher beschriebenen Hemmung und bei Betrachtung der Figur leicht zu erschließen.

Von noch größerer Vollkommenheit sind die sogenannten freien Ankerhemmungen, Fig. 15 und 16. Bei diesen vollfährt der Regulator, nachdem er durch das Steigrad seine Beschleunigung erhalten hat, den übrigen Theil seiner Schwingung ganz frei, ohne mit dem Steigrade weiter in Berührung zu bleiben, daher

auch ohne von den immerhin voraussetzenden Lenkungen in der Intensität der treibenden Kraft beeinflusst zu werden.

Bei der freien Ankerhemmung von Jägers (Fig. 15) hat der Anker  $A$  einige Abtheilungen, die dem bei der Graham'schen ruhenden Hemmung bedürftigen. Er dreht sich um die Achse  $z$ , seine beiden Paletten bilden wie dort zwei Stäbe eines Cylindersmantels, dessen Achse mit dem Drehungspunkte  $l$  des Ankers zusammenfällt;  $a$ ,  $b$  und  $d$  sind die Hebungsfächen; an der Palette 1 ist ein bei  $kl$  gegabeltes Stäbchen angebracht; Palette 2 trägt ein anderes  $g$  zur Nequilibrium von  $t$  bestimmtes Stäbchen, welches den Schwerpunkt des Ankers  $z$  fallen läßt. Ein auf der Achse der Unruhe sitzendes Rad trägt einen ringförmigen Zahn  $s$  von solcher Form und Stellung, daß er  $t$  in den Einschnitt  $ikl$  hineinlegt, wenn  $A$  in Unruhe ihre Mittellage eingenommen haben. In Steigrad  $C$  hat starke, gegen die Richtung der halbmessers geneigte Zähne, deren vordere Fläche gerade die hintere dagegen etwas ausgebogen ist. Die Zähne sind nicht spitz, sondern breit mit geraden Endkanten. In der Rubelage legt sich ein Zahn,  $z$ . B.  $z$  mit seiner Spitze, gerade an das Ende der Hebungsfäche  $a$ , indem er an derselben hingeleitet, hebt er die Palette 2, während 1 sich in den Zahneinschnitt  $\gamma$  und  $t$  dadurch wirkt aber die Gabel  $t$  auf den Zahn  $s$ , dem die Seite  $i$  des Einschnittes den Zahn  $s$  drängt; dies geschieht so lange, bis der Zahn  $s$  das Ende der Hebungsfäche  $d$  erreicht hat; die Gabel ist hierdurch angespannt und sucht zurückzukehren, kann dies, sobald die Palette 2 frei geworden ist, kurz vorher, eben als der Zahn  $a$  die Spitze paßirt, hat sich der Zahn  $\gamma$  mit seiner Spitze an Fläche  $a$  dicht bei  $a$  angelegt, wodurch das Spiel einen Augenblick gehemmt ist. Wenn jetzt die Unruhe wieder zurückgeschwingt, so greift der Zahn  $s$  in den Einschnitt  $ikl$  und drückt auf die Fläche  $i$ , dann kommt der Zahn  $\gamma$  auf die Hebungsfäche  $a$ ,  $t$  Steigrad drückt die Palette 1 in der Richtung  $a$  aufwärts, beschleunigt den Anker und ertheilt dem Anker einen Impuls, damit sie dem Zahn  $s$  nach und mit ihrer Fläche  $i$  ihn in der Schwingungsrichtung der Unruhe vorwärts treibe. Dies geschieht so lange, bis der Zahn  $\gamma$  den Punkt  $b$  erreicht; nun ist der Zahn  $s$  aus dem Einschnitt  $ikl$  herausgetreten, die Unruhe ist also frei geworden, hat sich aber in demselben Augenblicke der Zahn auch schon an die Außenfläche der Palette 2 angelagert, wodurch das Steigrad wieder einen Augenblick gehemmt wird. Es findet nicht eher eine Auslösung dieses Zahns statt, bis nicht die Unruhe wieder umgeschwungen und der Zahn  $s$  auf die Fläche  $i$  des Einschnittes  $ikl$  drückt, wodurch erst der Zahn  $s$  auf die Hebungsfäche  $d$  gelangt. In dieser Zeit geht das Spiel weiter. Infolge der Beschleunigung wird aber die Unruhe einen allmählich größeren Ausschlagwinkel erhalten, so daß derselbe gar bald den Hebungswinkel des Ankers übertrifft. Ein Blick auf die Fig. 15 zeigt, daß die Unruhe in ihrer Schwingung völlig frei ist. Denn sobald der Anker vermittelst seiner Gabel auf den Zahn  $s$  so weit treibend gewirkt hat, daß letzterer aus dem Einschnitt  $ikl$  heraus so steht die Unruhe mit der Gabel und folglich auch mit dem Anker in keiner weiteren Verbindung vollendet ihre Schwingung, soweit es ihre Elastizität gestattet. Dann kehrt sie frei wieder um und tritt auf, wenn der Zahn  $s$  wieder an dem Einschnitt  $ikl$  angekommen ist, welchen er in derselben Stellung verläßt, in der er ihn verlassen, wieder mit der Gabel, und

auch mit dem Anker, überhaupt mit dem Trieb der Uhr in Berührung. Aber diese zweite Bewegung dauert auch wiederum nicht länger als bis Zahn *s* aus dem Einschnitt *ikl* nach der andern e ausgetreten ist, d. h. nicht länger als die Hälfte des Ankers durch das Steigrad gebauert hat. Anker macht demnach verhältnismäßig viel kleiner Schwingungen als die Urruhe *y*. Damit die Zeit der Schwingungen immer dieselbe bleibe, sind beiden Seiten des Stüdes *u* zwei Anschlagstifte *v* angebracht. Man wendet diese Hemmung in jeder Zeit mit Vorliebe bei guten Taschenuhren an, be dann kurz mit den Namen Ankeruhren bezeichnet werden.

Die freien Hemmungen gehören ferner noch die Feder oder Chronometerhemmung von Carnshaw (S. 16). Die Steigradzähne stehen hier in größeren Räumen, sind sehr spitz, an ihrer vordern Seite gerade, stark gegen die Richtung des Halbfahrs geneigt und an ihrer hintern Fläche kreisförmig ausgeschnitten. Die Hemmung wird hier einer Feder *nn* ausgeübt, welche mit dem einen Ende so befestigt ist, daß sie in der Ebene des Steigrades tangential zu dem Umfang desselben getrieben ist und das Bestreben hat, sich dem letztern zu nähern. In diesem Bestreben wird sie durch die Feder *v* gehindert, welche mit ihrer Spindel durch etwas größeres Loch in der Feder *nn* hindurchgeht. Befestigt ist diese Schraube in einem Steg *T*. Eine unmittelbare unter dem Schraubenkopfe *v*, hat die Feder *nn* einen Zahn, auf welchem die Spitze des Steigradabzahn aufliegt, solange die Feder in der Ruhelage verharrt. Wird aber auf das obere Ende der Feder ein Druck nach links ausgeübt, durch welchen sie sich frei gegen den Steg *T* hinbiegt, so hebt der Zahn *c* den betreffenden Steigradabzahn frei, sobald jener Druck nachläßt, kehrt die Feder wieder in ihre Ruhelage zurück. Die hiernach zur Hemmung des Ausflusses des Steigrades erforderliche Ausübung des periodisch wirkenden Drucks erfolgt durch eine auf der Uhrwelle angebrachte Scheibe *RS*. Eine zarte Scheibe *ikl* sitzt concentrisch auf derselben; sie trägt einen Zahn *k*, welcher mit seiner Spitze gerade ins Ende von *mm* einfallen kann; *mm* ist ebenfalls drehend, aber äußerst dünn und daher wenig Widerstand bietend. Sie ist an dem untern Ende von *mm* befestigt und legt sich mit ihrem obern freien Ende an das obere Ende von *nn* an. Ein Druck auf dieses obere Ende von *m* in der Richtung von rechts nach links wird somit die Feder *nn* gegen den Steg *T* anrücken, während ein in der entgegengesetzten Seite ausgeübter Druck nur die Feder *nn* faßt, dagegen auf *nn* keine Wirkung übt. Das Rad *RS* hat nun auch einen Ausschnitt *ap*, welcher auf der einen Seite keilförmig (*p*), auf der andern Seite eben ist (*a*). Man sieht aus der Figur, daß der Zahn *z*, wenn sich das Steigrad *S* frei in der Richtung des Pfeils dreht, einen Stoß auf die Fläche *a* ausüben, sonach das Rad *RS* selbst in der Richtung *p* herumzudrehen muß. Hiernach ist das Spiel dieser Hemmung leicht zu übersehen. Die Verkleinerung der Urruhe findet nicht wie bei den vorher beschriebenen Hemmungen bei der Hin- und Herschwingung, sondern allein bei der Hinhinbewegung durch Wirkung der Steigradzähne auf die Stoßfläche *a* statt. Die Berührung der Theile geschieht, da sie nur momentan ist, fast ohne Reibung. Fig. 17 zeigt die Einrichtung eines Chronometers zur Zeit im Gebrauch der Schiffahrt. Das Werk enthält zwei Federhäuser; sie werden nacheinander aufgezogen, während das Werk immer fortgeht; die Bodenräder

treiben ein und dasselbe zwischen ihnen liegende Getriebe, welches auf der Welle des großen Minutenrades sitzt; von diesem überträgt sich die Bewegung auf das Sekundenrad und endlich auf das Hemmungs- oder Steigrad. Die Hemmung ist die zuletzt beschriebene freie; als Urruhefeder dient eine Schraubenfeder; das Schwingrad hat die in Fig. 9 dargestellte Compensations-einrichtung.

Als ein bewundernswürdiges Erzeugniß der Uhrmacherkunst ist auf vorliegender Tafel noch die in Straßburger Münster befindliche große Uhr in einer äußern Ansicht aufgenommen worden, 1838—40 zum Ersatz eines ähnlichen ältern Werks von Schwilgué erbaut. Derselbe besteht aus drei thurmartig sich erhebenden Aufbauten, von denen der mittlere etwa 14 Meter hoch ist. Der rechts befindliche Aufbau ist rund und enthält eine Wendeltreppe, auf welcher man in die verschiedenen Stockwerke des mittlern Aufbaues gelangen kann. Vor dem Grundbau steht in der Mitte eine große Kugelscheibe, welche in 110 Sternbildern die mit bloßem Auge sichtbaren Sterne enthält. Diese Kugel dreht sich gleichmäßig mit dem gestirnten Himmel. Hinter dieser Kugel ist am Grundbau eine große Kalender-scheibe, welche für jedes Jahr die beweglichen Feste anzeigt und sich so dreht, daß der danebenstehende Apollo mit einem Stäbchen stets auf den gegenwärtigen Tag hindeutet. Eine kleinere Scheibe mit Ringen in der Mitte der neun Fuß im Durchmesser großen Kalender-scheibe markirt die Auf- und Untergänge der Sonne, Mondlauf und Mondphasen und die Eintritte der Sonnen- und Mondfinsternisse. Auf den beiden Seiten neben der Kalendar-tafel sind mechanische Vorrichtungen zur Angabe der Jahreszahl, des Sonnenzyklus, der goldenen Zahl, der Römerzinszahl, des Sonntagsbuchstaben, der Epakten und des Osterfestes stets für das gegenwärtige Jahr. Noch im Unterbau über der Kalendar-tafel auf einem Vorprung erblickt man im Laufe der Woche sieben Wagen allmählich vorüberfahren: Sonntag Apollo mit den Sonnenrosen, Montag Diana mit einem Hirsche, Dienstag Mars mit Schlachtenrosen, Mittwoch Mercur mit Luchsen, Donnerstag Jupiter mit Donnerpfeil und Wollen, Freitag Venus mit Lauben, Sonnabend Saturn mit einer Chimäre. Der Unterbau trägt zunächst die Korymbogalerie, benannt von zwei an den Seiten befindlichen Löwen, von denen der eine das Wappenstein der Stadt Straßburg, der andere den Helm in den Klauen hält. In der Mitte dieser Galerie ist das Ziffernblatt einer Uhr, welche mittlere Zeit angibt. Daneben sind zwei Venien; der eine derselben schlägt auf ein Glöckchen beim Eintritt der Stundenviertel, der andere dreht stündlich eine Sanduhr. Die untere Abtheilung des mittlern Aufbaues enthält ein Planetarium, auf welchem die Bewegungen der Planeten Mercur, Venus, Erde, Mars, Jupiter und Saturn im Fixsternhimmel um die Sonne dargestellt sind. Die darüber befindliche Abtheilung veranschaulicht auf gestirntem Himmel die allmähliche Zu- und Abnahme des Mondes durch allmähliche Drehung einer zur Hälfte weißen, zur Hälfte schwarzen Kugel.

In der darauffolgenden höhern Abtheilung erblickt man die Gestalt des Todes, welcher in der einen Hand eine Sense, in der andern einen Knochen hält. Zu beiden Seiten desselben hind kleine Gloden angebracht. Zur Zeit „ein Viertel“ tritt durch eine Seiten Thür die Gestalt eines Kindes hervor, wendet sich zu dem einen der Glöckchen, schlägt mit einem Stäbchen einmal darauf und geht durch die andere Seiten Thür wieder ab. Zur Zeit „zwei Viertel“ kommt in gleicher Weise ein Jäger (Jüngling) und schlägt mit einem Pfeile zwei-



mal auf das Glöckchen. „Drei Viertel“ wird von einem Krieger (Mann) durch dreimaliges Aufschlagen mit einem Schwerte angezeigt. Endlich kündigt ein Greis „Vier Viertel“ an, indem er mit seiner Krücke viermal an das Glöckchen schlägt. Hierauf erhebt der Tod den Arm und gibt die Stundenzahl an, langsam schlägt er mit dem Knochen auf das größere der beiden Glöckchen.

In der obersten Abtheilung steht die Gestalt des Heilandes mit dem Siegesbanner in der linken Hand und die Rechte zum Zeichen des Segnens beweglich. Mittags 12 Uhr ziehen die zwölf Apostel nacheinander vor ihm vorüber, wenden sich zu ihm und erhalten das Zeichen des Segens. Nachdem alle Apostel vorüber sind, erfolgt noch einmal das Zeichen des Segens für die stets zahlreich anwesenden Besucher des Münsters. Während die Apostel vorüberziehen, läßt der auf der Spitze des seitlichen Aufbaues befindliche Hahn sich hören. Er schwingt die Flügel, bewegt Kopf und Schweif, bläht den Hals auf und kräht dreimal. In die obersten Verzierungen eingereiht sind die Gestalten von: Jesaias, den Evangelisten, von Seraphim mit Musikinstrumenten u. s. w.

Der kleinere Aufbau enthält die Gewichte der Nebenwerke, welche durch Auslösung in zeitweiligen Gang kommen. Diese Auslösungen werden durch das Centralwerk bewirkt. Letzteres setzt den ganzen Mechanismus in Bewegung, und wird nach je 8 Tagen ausgezogen.

Die Wendeltreppe führt nicht allein zu dem mittlern Aufbau, sondern auch zu dem großen, 16 Fuß im Durchmesser enthaltenden, über dem südlichen Portale des Münsters angebrachten Zifferblatte, auf welchem zwei Zeiger den Tag, die Woche und die Stunde des Tags angeben.

## Maschinentechnik.

Bearbeitet von Dr. Theodor Weiß.

Mit der Taf. 18 treten wir in das Gebiet desjenigen Theils der mechanischen Technik, welcher zufolge des in der allgemeinen Einleitung ange deuteten Fortkommens im Gegensatz zu der Technologie wohl die „Maschinentechnik“ genannt wird.

In der Maschinentechnik wird eigentlich alles abgehandelt, was nicht Werkzeug und nicht Arbeitsmaschine ist und doch zum Maschinenwesen oder zu der mechanischen Technik im engeren, hier gebrauchten Sinne des Wortes gehört. Selbst Arbeitsmaschinen, namentlich insofern deren Constructionsform mit der einer sonst in diesen Bereich gerechneten Maschine verwandt ist, werden in den Kreis der Betrachtungen gezogen. Das Fortkommen gebietet hier mächtiger als die Systematologie.

Jedoch pflegt man sich bei der Begrenzung des Gebiets an nachfolgend angeführte Klassifikation zu halten:

### A. Kraftmaschinen oder Motoren.

#### a. Physiologische Motoren (Mensch und Thiere) und zu denselben gehörige Maschinen:

- 1) Hebel- oder Schraubenwerke,
- 2) Tret- und Laufräder,
- 3) Ödpelwerke.

#### b. Hydraulische Motoren:

- 1) Wasserräder,
- 2) Turbinen,
- 3) Wasserdruckmotoren.

#### c. Aerodynamische Motoren:

Windräder.

#### d. Thermodynamische Motoren:

- 1) Dampfmaschinen,
- 2) Heißluft- oder calorische Maschinen,
- 3) Gaskraftmaschinen.

### B. Zwischenmaschinen oder Mechanismen und Transmissionsmaschinen:

#### a. Die Art und die Geschwindigkeit der zu übertragenden Mechanismen:

- 1) Räderwerke,
- 2) Kurbelmechanismen,
- 3) Geradsführungen,
- 4) Diverfa dieser Art.

#### b. Regulierende Mechanismen

- 1) Bremsen,
- 2) Schwungräder,
- 3) Centrifugalregulatoren,
- 4) Hydraulische und pneumatische Transmissionsmaschinen.

#### c. Wellentransmissionen.

#### d. Seil-, Ketten- und Riementransmissionen.

#### e. Hydraulische und pneumatische Transmissionsmaschinen.

### C. Transportmaschinen:

#### a. Transportmaschinen für feste Körper von Gefäßen umschlossene Substanzen:

- 1) Hebezeuge,
- 2) Aufzüge, Flaschenzüge,
- 3) Schiebebühnen und Transportwagen,
- 4) Winden und Krabbe,
- 5) Fördermaschinen,
- 6) Pneumatische Transportmaschinen.

#### b. Transportmaschinen für flüssige und körnige Substanzen:

- 1) Behälter, Schneiden- und Schneepumpen,
- 2) Kolbenpumpen,
- 3) Schöpf-, Wurräder und Centrifugalpumpen,
- 4) Strahlpumpen.

#### c. Transportmaschinen für gasförmige Substanzen:

- 1) Blasebälge und Gebläse,
- 2) Ventilatoren,
- 3) Strahlpumpen.

#### d. Motorische Fahrzeuge:

- 1) Locomotiven,
- 2) Dampfschiffe,
- 3) Luftschiffe.

Gemäß dieser Klassifikation wurde die Vertheilung des hier vorzuführenden handelnden Gegenstand keineswegs erörtert. Vielmehr ist die Vertheilung in Gruppen der aufgezählten Maschinen nach dem Zweck, zu dem sie dienen, erfolgt. Im Wegfall, theils weil ihre Beschreibung in den Abtheilungen des „Bilder-Atlas“ Platz zum Beispiel die Schiebebühnen und Transportwagen im Eisenbahnbau, die Dampfschiffe im Seebau, weil ihre Darstellung sich nur schwer erreichenden Zwecken hätte anpassen lassen, theils weil ihre Berücksichtigung Anlaß zur Überwindung der vorgeschriebenen Grenzen des Buches haben würde. Andere, namentlich die Transportmaschinen und Transmissionsmaschinen, wurden nur spärlich berücksichtigt, und einige zu maschinentechnischen Zwecken benutzte Instrumente, auf den Tafeln sporadisch beobachtet, weil ihre Reihenfolge gewöhnlich, sondern einfachen Transportmaschinen begrenzten den Motoren und endlich von den

von motorischen Fahrzeugen, gesprochen. Die Luftschiffe zu den Transportmaschinen hier abgehandelt wurden, beruht weniger vorzugsweise in gereiften Zuständen der Erfindung und in ein noch der fernern Zukunft Gebiet, sondern lediglich auf dem Mangel und geeigneten Plätzen für diesen eben- „der-Atlas“ vorzuführenden Gegenstand. wurden auf den ersten Tafeln nicht nur in Transportmaschinen, sondern behufs ihres Zusammenhaltens des Stoffs auch leicht erscheinende Combinationen mit den b mit den Fahrzeugen zur Darstellung

## Transportmaschinen für feste Körper.

(Tafel 18.)

Transportmaschinen haben den Zweck, mit Lasten um mit Körpermassen von sowohl fester als un- fester Beschaffenheit Ortsveränderungen zu bewirken lassen.

### 1. Hebezeuge.

Veränderungen von sehr geringer Hubhöhe, oder gesprochen, innerhalb sehr enger Wirkungs- kreise mittels der Hebezeuge vorgenommen. zu diesen Transportmaschinen nebst den Hebeln und Hebeln die Wagen- die Baumwinde, wie man sie bei den ten zum Heben ihrer reparaturbedürftigen bei den Waldarbeitern zum Ausheben der Stämme antrifft. Sie ersetzen gewisser- maßen einfachen Hebel. Ihr Mechanismus be- steht aus Zahnstange, welche durch Zahnrad und bewegt wird, oder aus einer Schraub- stange mittels Mutter ebenfalls durch Zahnäder der auch durch eine Natter, d. h. durch einen seilförmigen Sperrkabel und Hebel bestehen- des ihre Bewegung erhält (Taf. 18, Fig. 1). auch die in Fig. 11 getroffene Construction der stehenden Schraube gehobene Last liegenden Schraube horizontal fortbewegt gehören ferner zu diesen Maschinen die verwendeten hydraulischen Winden (Fig. 5). halten im Innern ihres eisernen Körpers eine kleine Pumpe und einen Flüssig- keitsbehälter. Die Flüssigkeit (Wasser, Del) wird über ein Rohr mittels eines äußerlich greifbaren Hebels läßt hierdurch ein Heben des den Kolben im Innern des Körpers und der Angriffsläure bewirken, durch ein mittels eines Hahnes veranlaßtes Einströmen der Flüssigkeit in den unterhalb des Kol- bens Raum ein Sinken von Klaue und

den haben dieselbe Wirkungsweise, wie die Pressen (Taf. 21, Fig. 11), die sich nur dadurch unterscheiden, daß das Pump- en des Presskolben enthaltenden Haupt- zylinder ist, und daß ein Pressgerüst vorhanden die zu hebende Körpermasse am oberen Ende und hierdurch ein Zusammenpressen, ein- oder auch ein Ausquetschen, Entwässern, f. w. derselben bewirken läßt.

Es sind diese hydraulischen Pressen, welche am meisten des Pressgerüsts zu der Klasse der Pressen gezählt und eigentlich in das Gebiet der Pressen verlegt werden müssen, und welche als solche Arbeitsmaschinen genannt sind,

auch zum Heben von großen Lasten, also als Trans- portmaschinen verwendet. Zum Beispiel wurden die über 38000 Ctr. schweren Bestandtheile der Stephenson'schen Röhrenbrücke und neuerdings ganze Stadtviertel in Neuport mittels solcher Pressen gehoben, indem das dazu gehörige Pumpwerk durch Dampfmaschinenkraft bewegt wurde.

### 2. Flaschenzüge.

Die einfache, an einem festen Punkte befestigte Rolle, über welche ein Seil oder eine Kette geschlungen ist, wird noch nicht eine Hebemaschine genannt und dient auch nicht sowohl zum Heben als zur Richtungsänderung des hebenden Seils. Sobald sie aber eine sogenannte lose Rolle wird, indem sie sich mit der zu hebenden Last bewegt, so kann sie auf die Bezeichnung einer Maschine, wenn auch einer Maschine sehr einfacher Construction, Anspruch machen. Durch Anwendung derselben ist man im Stande, mit der einfachen Kraft die doppelte Last, freilich aber auch nur während der doppelten Zeitdauer zu heben.

Die Combination einer losen mit einer festen Rolle, bestehend aus mehreren solcher Rollen, wird ein Flaschen- zug genannt. Bei der ältern Constructionsform der Flaschenzüge sind die Blöcke, Flaschen oder Kloben aus Holz hergestellt. Neuerdings verwendet man als Material zu diesem Zweck, und namentlich bei maschi- nentechnischen Constructionsformen, das Eisen, wie die Figurengruppe 2, Taf. 18, zeigt. Der am weitesten nach rechts dargestellte Kloben dieser Gruppe ist so derartig construirt, daß das Seil mit größerer Leichtig- keit, als bei den gewöhnlichen Arten, aufgelegt werden kann.

Durch Vermehrung der Rollen jedes Klobens oder jeder Flasche könnte mit einer gegebenen Kraft jede beliebige Last gehoben werden, wenn nicht die Reibungs- widerstände und die Seil- oder Kettensteifigkeit eine Grenze setzten, welche so sehr bald erreicht wird, daß der Vortheil der Einfachheit und Billigkeit dieser Maschine durch den Nachtheil eines äußerst geringen Wirkungsgrades derselben compensirt wird.

Neuerdings wendet man mit vielem praktischen Vor- theil den Differential-Flaschenzug an, wie er in Fig. 13 dargestellt ist. Er gehörte zu den hervor- ragenden Gegenständen der londoner Ausstellung von 1862. Seine Wirkungsweise stimmt mit derjenigen der schon lange angewendeten Differentialwinde (Fig. 14) überein. (Die Beschreibung der letztern folgt unter den Winden.) Der Differential-Flaschenzug ent- steht aus der Differentialwinde, wenn die beiden Trommeln der letztern zu zwei mit Einkerbungen verse- henen Rollen zusammenschumpfen und wenn aus dem an den Trommeln mit seinen beiden Enden befestigten Seile eine sogenannte endlose Kette gemacht wird. Das Rollenpaar von verschiedenen Durchmesser bildet die obere und zwar feste Flasche, die untere, auch bei der Winde vorhandene Rolle, die lose Flasche. Damit die Kette nicht gleite, müssen die obern Rollen eine Art Verzahnung erhalten. Der Vortheil dieses Flaschen- zugs gegenüber seinen Gattungsgeoffenen besteht darin, daß er in seine beiden Flaschen eine sehr große Ueber- setzung legen läßt und daß er demnach, ohne viel Raum und viel Herstellungskosten zu beanspruchen, eine verhältnißmäßig große Last bewältigt. Er hat dagegen den Nachtheil, dem Heben einen stärkern Reibungswiderstand entgegenzusetzen, also das Heben der Last entweder mühevoller oder zeitraubender zu machen. Dieser Nachtheil wird aber insofern wieder in einen Vortheil umgewandelt, als durch den stärkern

Reibungswiderstand das Herabsinken der gehobenen Last beim Loslassen der Krafthette ohne weiteres Zutun verhindert wird.

Um 1000 Kilogr. mit einer Zugkraft von 10 Kilogr. zu heben, hat man beim gewöhnlichen Flaschenzuge 100 Rollen nöthig, beim Differentialflaschenzuge nur deren drei. Dieses übertrieben zu Gunsten der Differentialflaschenzüge sprechende Beispiel ist jedoch nur theoretisch, d. h. ohne Rücksicht auf die Widerstände richtig. Wegen tatsächlicher Reibung der letztern schrumpft der Vorzug sehr zusammen.

### 3. Winden.

Die einfachste Constructionsform dieser Gruppe von Transportmaschinen besteht aus einer Walze oder Trommel, welche durch Anbringung von Zapfen und Kurbeln oder Tummelbäumen drehbar gemacht ist, welche in einem Gestelle oder Bode ruht und welche ein die Last tragendes Seil oder eine das Transportobject ergreifende Kette aufwickeln läßt.

Eine solche einfache Winde wird, wenn die Trommel liegt, Haspel, wenn dieselbe steht, Erdwinde genannt.

Wird auf der Trommelwelle dieser einfachen Winde ein Stirnrad angebracht (Taf. 18, Fig. 6) und eine Kurbelwelle hinzugefügt oder vorgelegt, welche ein kleineres in jenes Stirnrad eingreifendes Zahnrad trägt, so entsteht die Construction, welche man Vorgelegewinde oder einfache Seilwinde nennt. Eine Bremscheibe mit Bremshebel und Bremsband, welcher Mechanismus beim Herablassen der Last zur Mäßigung oder Unterbrechung der Bewegung verwendet wird, ein Sperrrad zur Hinderung des unbeabsichtigten Rückganges und eine Vorrichtung zum Ausrücken der Kurbel- oder Vorgelegewelle vervollständigen diese Winde. Auf Schiffen angewendet erhält sie meistens auch noch einen äußerlich in der Verlängerung der Trommel angebrachten Konus, welcher als Frictionskonus beim Niederlassen der Last dient.

Sollen mit dieser Windenart größere Lasten, als es mit der soeben beschriebenen Construction möglich ist, gehoben werden, so bringt man noch mehrere Vorgelege, aber, weil für die größere Last ein Seil zu dick werden müßte, statt des letztern eine Kette an. Diese Constructionsform, deren einzelne Bestandtheile die verschiedenartigsten Anordnungen erhalten, wird Kettenwinde genannt.

Durch Anordnung recht vieler Vorgelege kann man es dahin bringen, mit der einfachen menschlichen Kraft eine sehr bedeutende Last zu heben. Das letztere kann aber auch ohne Vermehrung der Vorgelege durch Verstärkung der angreifenden Kraft erreicht werden. Dieses geschieht durch Anbringung zweier kleiner, die Kurbeln erfassender, meistens oszillirender, jedoch auch, wie hier (Fig. 1), fester Dampfmaschinen. Diese Constructionsform heißt Dampfwinde oder Dampfhaspel. Sie wird häufig zum Aufziehen von in Gefäße gefüllten Substanzen oder Körpermassen benutzt. In diesem Falle bringt man auf der Trommel meistens zwei nach verschiedenen Richtungen sich aufwickelnde Seile, oder auf der Lastwelle zwei Trommeln mit derartig aufgewickelten Seilen an, daß das leere Gefäß niedersinkt, wenn das gefüllte gehoben wird. Hierdurch entsteht nicht nur Zeit-, sondern auch Kraftgewinn, indem das herabgehende leere Gefäß durch sein Gewicht die Triebkraft unterstützt. Namentlich zweckmäßig wird daher diese Dampfwinde bei Anwendung auf kontinuierliche Förderung von Lasten, wie es unter andern beim Bergwerksbetriebe oft vorkommt.

In diesem Falle ersetzt man die Dampfmaschinen durch größere liegende Dampfmaschinen, die Ketten durch Trommeln durch sogenannte Seilzüge. In der That ist die Verhinderung einer zu starken Beanspruchung der Seile einen relativ geringen Aufwand an Seil zu erhalten, und nennt solche Constructionsformen Seilgöpel oder Fördermaschinen.

Die gewöhnliche Seilwinde, wie man sie in einem Hause aufgestellt, liefert, wenn man ein Triebrad mit einem bis in das untere herabhängenden Seile ohne Ende und den sogenannten Aufzug, wie z. B. in Mühlen u. s. w. Verwendung findet, eine große Länge des äußerlich am Ende der Lastseils muß die dasselbe auch eine verhältnismäßig große Breite des Seils muß mehreremal übereinander fallen, wo das aufzuwickelnde Seil auftritt, kann durch eine Construction gebeugt werden, welche man Frictionswinde (Taf. 18, Fig. 16).

Die Wirkungsweise derselben besteht in der Reibungswiderstand, welcher durch die Trommel oder Walze mehreremal geschlungen wird. Dieser Reibungswiderstand im Verhältniß zum losen Ende des umschlungenen Seils erzielte eine so große Kraft hält die am andern Ende hängende Last oder den hier ausgeübten Gleichgewicht. Diese Kraft kann sehr groß sein, je größer die Anzahl der Umdrehungen ist, die Sie wird zu dieser Anzahl in ein Seil gebracht, daß sie durch die Hand eines Mannes durch das Gewicht des herabhängenden Seiles entwidelt werden kann. In den gewöhnlichen Fällen drei bis acht Umdrehungen so braucht die Trommel und demnach die in der That nur sehr selten zu sein, so aufzuwickelnde, oder vielmehr überzogene an der einen Seite aufzuwickelnde Seil, unendlich lang ist. Diese Construction dieser Winde dadurch erreicht, daß zwei hintereinander liegende Trommeln sein müssen. Bei Anwendung auf die Trommel würde sich nämlich das Seil in der Achsenrichtung der Trommel und die Trommel dürfte aus dieser Richtung minder breit gemacht werden, als man in gewöhnlichen Winden. Wegen der Anbringung zweier Trommeln müssen auch die Seile mit Zahnradern und Zubeckungen versehen und dadurch wird diese Construction ermöglicht.

Die Frictionswinden von gewöhnlicher Größe werden in Fabriken und Speichern in der Flaschenzügen angewendet. Sie werden in der Regel an einem Pfeiler befestigt, während der Flaschenzug an einer Kurbel gebracht ist. Die Hubhöhe ist also sehr groß, aber das aufzuwickelnde Seil ist beträchtliche Länge, weil es durch das Gewicht des Flaschenzugs geleitet werden muß.

Die Frictionswinden von bedeutender Größe und stärkeren Naderüberzeugungen sind in Fig. 16 dargestellte Form, wie sie bei der Londoner Weltausstellung gesehen wurde. Die beiden Trommeln sind vorn angebracht



erung des Auslegens des Seils völlig frei. In die beiden auf den Trommelwellen angebrachten Räder eingreifende Zahnrad sitzt auf einer Welle, die von einer Vorgelegswelle bewegt wird, die die Drehung von einem Nientrieb erhält.

Die fast genau solche Constructionsform bildet auch der Bewegungsmechanismus der seit einigen Jahren Aufnahme genommenen Kettendampfschiffe, die aus der Kettenschlepper. Die auf dem Bette des Flusses oder Kanals liegende Kette wird um die beiden in der Mitte des Schiffs angebrachten Frictionsrollen geschlungen. Durch Umdrehung der Winde, die in diesem Falle eine kräftige Dampfmaschine angetrieben wird, bewegt sich das Schiff an der fest auf dem Bette des Flusses liegenden, beziehentlich durch ihr Gewicht und durch den Reibungswiderstand gehaltenen Kette entlang.

Im historischen Hinsicht steht dieser Einrichtung diejenige voran, bei welcher die Frictionswinde fest am Land stand und das Schiff mittels Kette an sich zog. Diese Einrichtung findet man noch heute häufig an Stromschnellen oder oberhalb von Brücken, wo durch ihre Stauverhältnisse eine beständige Stauung veranlassen. Derartige Constructionsformen sind den Schiffswinden genannt und erhalten vertikale Trommelwellen, sowie statt der Kurbeln Tummeln, an welchen die ausgekiffte Mannschaft arbeitet.

Eine eigenthümliche, wiewol schon lange bekannte, noch länger bei den Chinesen in Gebrauch gebliebene Winde ist die durch Fig. 14 dargestellte Differentialwinde oder der Gegenhaspel. Sie ist als eine Combination von zwei Haspeln aufgestellt, welche sich entgegenwirken und auf diese Weise durch die Differenz ihrer Wirkungen nutzbar werden. Die beiden Haspel von verschiedenen Durchmesser sind hier auf ein und denselben Kurbel nicht nebeneinander angebracht. Sie können aber auch auf zwei vor- oder übereinanderliegenden Wellen montirt und durch Zahnräder miteinander verbunden werden und im letztern Falle gleiche Durchmesser erhalten, sofern die Zahnräder verschieden groß hergestellt werden. In allen Fällen ist eine das auf der Trommel sich aufwickelnde Seil führende lose Hülse A erforderlich, an deren Kloben die Last hängt wird. Die Wirkungsweise ergibt sich aus nachfolgender rechnungsmäßigen Betrachtung. Jedes der beiden herabhängenden Seilenden hat von der am Land herabhängenden Last L die Hälfte, also  $\frac{1}{2} L$ , zu tragen. An der großen Trommel vom Halbmesser R wirkt demnach das Lastmoment  $\frac{1}{2} L R$ , an der kleinen vom Halbmesser r das Lastmoment  $\frac{1}{2} L r$ . Das an der Kurbel von der Länge l wirkende Kraftmoment dagegen K l, wenn unter K die vereinte Kraft der Seile verstanden wird. Es ergibt sich daher aus statischen Gleichheit:

$$K \cdot l + \frac{1}{2} L r = \frac{1}{2} L R$$

Kraftbedarf zu:

$$K = \frac{R - r}{2 \cdot l} \cdot L$$

der Lastwerth zu:

$$L = \frac{2 \cdot l}{R - r} \cdot K$$

Man erkennt hieraus, daß man mit einer gewissen, relativ kleinen Kraft, zum Beispiel der menschlichen Muskelkraft, eine ganz enorm große Last heben kann, wenn man nur die Differenz  $(R - r)$  der Trommel-

halbmesser klein genug macht. Wird diese Differenz zu Null, werden also beide Trommeldurchmesser gleich groß hergestellt, so kann (mathematisch genommen) sogar eine unendlich große Last gehoben werden, für welche freilich die Hubhöhe gleich Null ausfällt, d. h. trotz Drehung der Winde ein Stehenbleiben auf derselben Höhe stattfindet. Jedoch von diesem äußersten Werthe an gerechnet und mit Rücksicht auf die ungleichmäßige Dide des Seils oder der Kette, durch welche die Anwendung unbedeutend differirender Trommelhalbmesser illusorisch und praktisch unausführbar wird, kann jede beliebig große Last gehoben werden. Der Vortheil dieser Winde hinsichtlich ihrer einfachen und billigen Construction gegenüber der gewöhnlichen, unter solchen Umständen eine beträchtliche Anzahl von Vorgelegten, Wellen, Nubern und Lagern erfordernden und hierdurch kostspielig werdenden Kettenwinde wird jedoch durch den Nachtheil paralysirt, daß dieselbe bei bedeutenden Hubhöhen außerordentlich lange Seile oder Ketten und lange Trommeln erfordert und aus diesem Grunde wieder theuer wird. Ihr Vorzug beschränkt sich daher auf den engen Anwendungskreis geringer Hubhöhen.

Die unter den Rubriken Nr. 1, 2 und 3 beschriebenen Hebevorrichtungen, Flaschenzüge und Winden werden auf das mannichfaltigste combinirt und erhalten hierdurch oft das Ansehen ganz anderer Apparate oder Maschinen. Wenn auch für gewisse Sonderzwecke praktisch und gut, werden sie doch häufig sehr ungerechtfertigter Weise als Verbesserungen im allgemeinen angepriesen und vom Publikum dafür gehalten. Mangelnde Schärfe des Urtheils über die Wirkungsweise und den Wirkungsgrad trägt die Schuld hieran.

Die Vorstellung, daß durch eine Hebel-, Schrauben- oder Räderverbindung Kraft hervorgebracht werden könne, ist eine laienhafte. Eine solche Verbindung bewirkt vielmehr nur eine Umwandlung, und das constant bleibende in dem Umgewandelten ist dasjenige, welches mechanische Wirkung oder mechanische Arbeit genannt wird, und welches aus einem Product von Kraft und Hubhöhe, oder Kraft und Weg, oder Kraft und Zeit besteht. Gewinnt man durch die bezeichnete Umwandlung, wie sie mit dem Mechanismus einer Winde und überhaupt einer Maschine vorgenommen wird, eine Kraftvermehrung, so verliert man Zeit, und umgekehrt. Ist die bewegte Last 100 mal so groß, als die ausgeübte Kraft, so ist auch die Zeitdauer des Transportes 100 mal so groß, als sie bei Gleichheit von Last und Kraft sein könnte. Und eine Winde, welche mit einer gegebenen Kraft 10 mal so viel Last hebt, als eine andere mit derselben Kraft, transportirt die Last 10 mal so langsam.

Dieses einfache Verhältniß zwischen Kraftgewinn und Zeitverlust wird aber in Wirklichkeit hinsichtlich eines Gewinns noch ungünstiger durch die Widerstände, als Reibungswiderstände, Seil- oder Kettensteifigkeit u. s. w., welche bei jeder mechanischen Vorrichtung unvermeidlich sind und auch von den Erfordernissen eines vermeintlichen Perpetuum mobile, obwohl außer Acht gelassen, so doch nie zu annulliren waren. Wären diese Widerstände nicht vorhanden, so wäre es in theoretischer Beziehung, d. h. abgesehen von den Herstellungskosten, von bequemer Anbringung oder Aufstellung, von leichter Sanctierung u. s. w. völlig gleichgültig, was für eine von den existirenden oder noch zu erfindenden Constructionsformen in einem gegebenen Falle angewendet würde. Da dieselben jedoch thatsächlich vorhanden sind, so bilden sich unter jenen Constructionsformen Vorzuglichkeitsunterschiede, je

nachdem die Lebern unter sonst gleichen Umständen mehr oder weniger in ihrer Leistung von denselben beeinträchtigt werden.

Der Grad dieser Beeinträchtigung, oder der Grad der thatsächlich geleisteten Wirkung bildet daher ein Kriterium für die Güte einer Constructionsart, und da die Widerstände, welche mit  $W$  bezeichnet werden mögen, als eine zu überwindende oder zu hebende zusätzliche Last aufgefaßt und in Rechnung gezogen werden können, so läßt sich dieser „Wirkungsgrad“ oder „Gütegrad“ wenn er mit  $\eta$  bezeichnet wird, durch das Symbol

$$\eta = \frac{L}{L + W}$$

berechnen, sofern  $L$  diejenige Last bedeutet, welche bei Nichtexistenz der Widerstände gehoben oder bewältigt werden könnte.

Je größer dieser Wirkungsgrad ausfällt, d. h. je mehr er sich, obigem Symbol zufolge, der Einheit nähert, desto vorzüglicher ist die Maschine. Von dieser Seite beleuchtet, klassificiren sich z. B. die bisher besprochenen Transportmaschinen derart, daß die Differentialflaschenzüge die schlechtesten, die gewöhnlichen Flaschenzüge auch noch schlecht, die Differentialwinden gut und die gewöhnlichen Winden, sofern deren Zahnräder nicht allzu klein hergestellt werden, am besten sind. In Bezug auf Herstellungskosten bildet sich allerdings die umgekehrte Reihenfolge. Es muß außerdem berücksichtigt werden, daß bei Anwendung von Menschenkräften und überhaupt von animalischen Motoren die Kraftentwidelung  $K$  eine verschiednen große ist, je nachdem an einem Seile gezogen, oder an einem Tunnelbaume geschoben, oder an einer Kurbel gedreht, oder auf einen Hebel gedrückt werden muß. Und endlich ist bei Winden der Vortheil nicht zu unterschätzen, daß einige Vorlegele ausgerüstet werden können, und daß hierdurch je nach Bedürfnis und Vorkommniß zwischen Lasthebung und Zeitaufwand ein günstigeres Verhältniß erzielt zu werden vermag.

#### 4. Krähne.

Die Benutzung eines Flaschenzugs hat das Vorhandensein eines festen Aufhängerpunktes zur Voraussetzung. Der Deckenbalken eines Locals, ein Baugerüst, ein Schiffsmaß u. s. w. liefert einen solchen festen Aufhängerpunkt, ebenso wie ein Baugerüst, ein Thurm, eine Mauer, eine Brunneneinfassung die Unterstützung für eine Winde bietet. Die Gesamtheit eines Flaschenzugs oder einer Winde und eines unterstützenden Baues mit Zubehör wird wol ein Aufzug genannt. Ist eine solche Unterstützung, ein solcher fester Aufhängerpunkt nicht vorhanden, so wird ein Gerüst von irgendwelcher Constructionsform, oder ein gerüstartiger Bau besonders hergestellt, und die Combination der Winde oder des Flaschenzugs mit einem solchen Gerüste ein Krahn genannt. Wenn im Volksmunde auch manche andere galgenartige Gerüste Krähne heißen und wenn auch die zum Fällen der Lender auf den Wasserstationen unserer Eisenbahnen vorhandenen Wasserständer Krähne genannt werden, so ändert dies nichts an der Richtigkeit jener Definition, soweit überhaupt Definitionen und Vergleiche nicht hinken, und die Bezeichnung Krahn für einen gewöhnlichen Wasser- oder Bierahn ist ein Provinzialismus. Hiernach werden sich die verschiednen Constructionsformen der Krähne im wesentlichen durch die Form ihres gerüstartigen Baues unterscheiden lassen. Einerseits von diesem Gesichtspunkte aus, andererseits nach der Art

der angewendeten Winde oder Aufzugsvorrichtung, nach der Verbindungsweise derselben mit dem Krähngerüst, und endlich in Betreff der Richtung der Gesamtheit des Krahns als Transportmaschine lassen sich Klassifikationen vornehmen.

Ein in der Mauer eines Gebäudes festiger Balken, von einer schrägen Strebe unterstützt, an dessen äußern Ende einen Flaschenzug oder eine Winde tragend und durch dieselbe mit einer Winde in Verbindung gebracht, eine solche Vorrichtung bildet im Uebergang von einem Aufzuge zu einem Krähne. Die Last wird hier gerade in die Höhe gezogen, die Wirkungssphäre dieser Transportmaschine ist also eine verticale Linie.

Wird die erwähnte Leitrolle oder der bewegliche Flaschenzug an einen Wagen („eine Kage“) gehängt, welcher auf jenem Balken hin- und hergehoben werden kann, so ist die Wirkungssphäre eines solchen Krahns eine ebene Fläche. Dieselbe Wirkungssphäre kann erhalten werden, wenn die Rolle oder der Flaschenzug unverrückbar befestigt, der Ausleger mit Schnabel des Krahns schräg gestellt und am inneren Fußpunkt drehbar gemacht wird. In den diesen Construction entsprechenden Formen heißt der Krahn Zweibein, beziehentlich Dreibein oder Schenkelskran.

Wird das Krähngerüst um eine verticale Achse drehbar gemacht und ist die am äußern Ende derselben angebrachte Rolle nicht verschiebbar, so ist die Wirkungssphäre der Krähne der Mantel eines Kreiscylinders, beziehentlich ein Theil davon. Hierzu liefert Fig. 18, Fig. 7 ein Beispiel. Mit einer fest auf dem Grunde verschraubten gußeisernen Platte ist in der Figur eine Säule, die Krahn säule, verbunden. Um dieselbe läßt sich der Krahn ausleger mit Gerüst und daran angebrachten Rollen mittels einer Zapfeneinrichtung drehen. Die Last wird durch eine kleine Dampfmaschine bewegt, welche durch das U-förmig gebogene und einerseits in der Achse der Krahn säule liegende Rohr von einem in dem stehenden Dampfessel gespeist wird. Mehrere solcher etwa längs eines Kai's oder eines Güterbahnhofs aufgestellte Krähne können von einer Centralstelle aus mit Dampf versorgt werden. Sie werden Dampfkrahne genannt.

Eine der vorigen gleiche Wirkungssphäre hat in Fig. 4 dargestellte Säulenkrahn mit horizontaler gelenktem Ausleger. Die Wirkungssphäre, d. h. die mit dem Lastbalken erreichbare geometrische Ort, wird als kreisförmiger Hohlcylander durch Anbringung der Last oder des Flaschenzugs an einem Wagen, am „Kage“, welche auf dem horizontalen Ausleger hin- und herzufahren ist. Dieselbe Wirkungssphäre kann ferner aber auch unter Beibehaltung der Rolle erreicht werden, wenn der Ausleger oder Schnabel schräg angeordnet und am Fußpunkte in der vertikalen Ebene drehbar gemacht wird. Zu der letzteren Constructionenarten bietet Fig. 15 ein Beispiel. Diese Constructionsform (hier in sehr vergrößertem Maßstabe dargestellt) heißt freistehender Krahn, weil der eigentliche Krahn, d. h. Krahn säule und Ausleger mit Zubehör, nicht von den Fundamenten eines Gebäudes, sondern von einem für sich bestehenden und zu ihm gehörenden Gerüste unterstützt wird, welches hier aus schrägliegenden hölzernen Stützen besteht. Dieser Krahn muß zwei Windevorrichtungen erhalten, die eine zur Förderung der Last, die andere jedoch auch für den Krahn mit beweglicher Kage.

Die Wirkungssphäre des Krahns ist der Hohlcylander

pipeds, d. h. sein Lastbalken kann an 3 langgestreckten Saaks, einer Wertbracht werden, wenn derselbe die durch alte Constructionsform hat, in welcher genannt wird. Er besteht in diesem rechts und links auf Laufrädern ruhend (hier aus Blech hergestellt), auf welche hin- und hergefahren oder (wie hier) einseitig feststehenden Winde und einer 2. eine „Kasse“ hin- und hergezogen. Die Laufräder sind auf Schienen befestigt, entweder an, beziehentlich auf den Gebäuden, oder (wie hier) auf einem Gerüste befestigt werden. Ueblicherweise meistens nur von Menschenhand durch Dampftrakt bewegt, und selbst steht mit auf dem Krähngerüste. Auch erden, daß neuerdings die Bewegungsträger als der auf denselben hin- und Winde mittels einer Seiltransmission völlig getrennt von dem Krähne auf: aus bewirkt wird.

Die herzustellen, auf welchen die Schienen verlaufen, kann man, wie Fig. 12 zeigt, auf festen Trägern auch verticale Stützen in Fische mit Nähern versehen, und die Erde anbringen, beziehentlich den Eisenbahn bewegen, wodurch seine leicht bedeutend erweitert wird. Er besteht aus fahrbarer Lauftrahn oder in genannt. In der hier dargestellten Form ist er aus blechernen Trägern und Stützen hergestellt, hat zur Fortbewegung auf jeder Seite eine Winde, Lasten auf jeder Seite ebenfalls eine 2. und zwei Kassen, und zum Hin- und Herfahren auf jeder der oberen Seile, welche mittels einer nach abwärts über ein Trieb- oder Kurbelrad gehen, unten aus gedrückt werden kann. In der Form, welche eine der vorigen Constructionen hat, ergibt sich durch Combination der festen Krähne mit einem solchen Constructionsform, fahrbarer kurz Fahrtrahn genannt, ist in Fig. 9 dargestellt. Das Fahrzeug, welches den Transport eines Lastgutes in einem Punkte eines Hafens veranlaßt, sei es durch Seiltrahn oder Schwinne (aus Holz hergestellt) hat daher Wirkungsphäre, welche durch Anbringung eines motorischen Seefahrzeugs noch in ähnlicher Weise erweitert wird. Wirkungsphäre des Fahrtrahns durch dieselben an ein motorisches Landfahr-

## Transportmaschinen für flüssige Körper.

(Tafel 19 bis 21.)

Die körnigen und pulverförmigen Substanzen bilden den Uebergang von den festen zu den tropfbar flüssigen Körpern. Das Sandhorn verhält sich zum Sandstein wie der Wassertropfen zur Wassermasse. Gewisse Transportmaschinen für Staub-, pulverförmige und körnige Substanzen haben daher mit denjenigen für Flüssigkeiten sehr viel constructive Ähnlichkeit. Das Schneckens- und das Becherwerk dient zum Transporte des Mehls, des Getreides, des Sandes und Kieles (bei den Baggermaschinen) und des „Tropfens“ der Mauermaße, des Ziegelsteins, ebensoviel als zum Transporte des Wassers und sonstiger Flüssigkeiten. Das Schneckenswerk wird beim Transporte von Flüssigkeiten zur sogenannten Wassertschraube oder archimedischen Schraube und statt des Becherwerks wird auch wol das Paternosterwerk angewendet. Hieran schließt sich das Kettenkolbenwerk oder die Kettenpumpe, welche aus einer über zwei vertical entfernt voneinander angebrachten Räder geführten Kette, aus mehreren hiermit verbundenen Kolben und einer Röhre besteht, an deren Wandung die mit der Kette bewegten Kolben sich anschließen.

Jedoch meistens und namentlich zum Zwecke des Transportes in weitere Entfernungen werden die Transportmaschinen für Flüssigkeiten aus Röhrenleitungen und aus einem Mechanismus zusammengesetzt, welcher die Flüssigkeit durch Ausaugen aus der Röhrenleitung oder durch Einpressen in dieselbe in Bewegung bringt. Auch in dieser Form haben die Transportmaschinen für feste Körper Verwandtes mit denen für flüssige. Denn auch in Röhrenleitungen werden feste Körper (Badete, Blechlappen, Wagen) mittels des Luftdrucks transportirt.

Diese Mechanismen werden Pumpen genannt und bestehen entweder aus einem in dem Pumpenkessel oder Pumpenzylinder hin- und herbewegten Kolben und aus Ventilen, oder aus in einem Gehäuse rasch umgedrehten Schaufeln, beziehentlich aus sogenannten Kapselrädern, oder endlich aus einem Röhrensystem von solcher Anordnung, daß vermöge einer eigenthümlichen hydraulischen Wirkungsweise die zu bewegende Flüssigkeit durch einen bewegten Flüssigkeitsstrahl in die den Transport vermittelnde Röhrenleitung gepreßt oder eingefogen wird, weshalb dieser Mechanismus Strahlpumpe oder Injector, beziehentlich Ejector heißt.

### 1. Kolbenpumpen.

Die Wirkungsweise dieser Pumpen ist aus folgender Beschreibung bei Betrachtung der Fig. 12 auf Taf. 19 zu erkennen:

Wenn der Kolben K mittels der daran befestigten Kolbenstange im Pumpenzylinder nach aufwärts bewegt ist, nachdem er dicht über dem Boden des letztern gestanden hatte, so hat sich, völlig dicht, der Schluß zwischen Kolben und Zylinderwandung vorausgesetzt, in dem Raume O unter dem Kolben ein luftverdünneter, beziehentlich absolut leerer Raum gebildet. In diesen Raum wird vermöge des atmosphärischen Drucks, welcher auf allen terrestrischen Gegenständen und so auch auf dem Wasserspiegel des bei A stehenden Gefäßes lastet, das Wasser in das Saugrohr bei A und von hier aus in den Raum O gedrückt. In dem Maße, als der Kolben fortbewegt wird, wird das Wasser beständig von außen nachgedrückt und demnach



der Pumpencylinder mehr und mehr damit angefüllt. Ist der Kolben oben bei B angelangt, so ist der Pumpencylinder gänzlich gefüllt. Alsdann wird die Bewegung umgekehrt; es öffnet sich vermöge des durch das Niederdrücken des Kolbens verursachten Wasserdrucks das im Kolben angebrachte Kolbenventil W und läßt den Inhalt des Cylinders nach und nach über den Kolben treten. Zur Erzielung dieser Wirkung ist jedoch ein zweites, im Boden des Cylinders angebrachtes Ventil, das Saugventil, erforderlich, welches beim Niedergehen des Kolbens sich schließt und das Zurückfallen des Wassers aus dem Cylinder in das Saugrohr verhindert. Nachdem der Kolben bis auf den Boden des Cylinders niedergebückt ist und zum zweiten male gehoben wird, wird der Raum unter demselben abermals gefüllt und der Raum über demselben allmählich durch Abfluß bei B entleert, da das Kolbenventil W, welches beim ersten Hube durch den auf ihm lastenden Luftdruck geschlossen blieb, beim abermaligen Wechsel der Bewegungsrichtung sowohl durch den Luftdruck als durch den obern Wasserdruck geschlossen wird. Setzt man in dieser Weise das Spiel der Bewegung fort, so wird nach und nach eine größere Wassermasse gehoben oder, allgemeiner gesprochen, transportirt. Das Gelingen dieser Wirkungsweise hat jedoch das Annehmen gewisser Höhenverhältnisse zur nothwendigen Voraussetzung. Der Druck der Atmosphäre ist nicht größer, als daß er in einem völlig dicht schließenden und absolut leeren Gefäße das Wasser höher als 10 Meter höhe, ebenso wie er das Quecksilber (in einem Barometer) nicht höher als 76 Centimeter hebt. Daher darf die ganze Höhe  $h_0 + O + S$  keinesfalls höher als 10 Meter sein. Uebrigens aber muß bei Beginn der Benutzung der Pumpe zunächst die im Saugrohr befindliche Luft ausgepumpt werden, was mit Hülfe des Pumpenkolbens und des Saugventils selbst geschieht, oder es muß nach vorgängiger Verstopfung des untern Theils des Saugrohrs die Pumpe sammt Saugrohr von oben her mit Wasser gefüllt werden, wodurch ebenfalls die Luft ausgetrieben wird.

Diese Pumpe wird, weil sie das Wasser (scheinbar) ansaugt, Saugpumpe genannt. Sie wird zur Hubpumpe, wenn der Pumpencylinder nach oben wesentlich verlängert, oder wenn derselbe mittels Ventils oben geschlossen und alsdann bei B mit einem nach aufwärts geleiteten Rohre versehen wird.

Anstatt daß das Ventil W im Kolben angebracht wird, kann es für den leistungsfähigsten Zweck auch neben dem Saugventile in dem in diesem Falle vom Boden des Cylinders ausgehenden Hubrohre angeordnet werden. Es entsteht auf diese Weise die einfach wirkende Hubpumpe, und durch wiederholte Anbringung zweier Ventile am obern Theile des Cylinders die doppelt wirkende Hubpumpe.

An Stelle eines dicht an die Wandungen des Cylinders oder Stiefels anschließenden Kolbens kann auch ein Kolben, welcher, ohne die Cylindervandungen zu berühren, nur in den Wassergehalt des Cylinders eintaucht und das Wasser verdrängt, angewendet werden. Ein solcher Kolben wird Taucherkolben oder Plungerkolben oder auch Mönchskolben genannt und muß, wie Fig. 6, Taf. 19 zeigt, durch eine ihn fest umschließende Stopfbüchse in den Cylinder geführt sein. Die Wirkungsweise einer derartigen Pumpe stimmt mit derjenigen einer vorhin beschriebenen einfachen Hubpumpe fast völlig überein. Diese Pumpe eignet sich jedoch weniger zum Saugen als zum Heben und noch mehr zum Einpressen oder Drücken des Wassers und wird daher nebst der Bezeichnung Mönchskol-

pumpe oder Plungerkolbenpumpe oder Druckpumpe genannt.

Eine Combination des Taucherkolbens mit einem in Fig. 9, Taf. 21 im Durchschnitte dargestellten wirkenden Pumpe, welche die in Fig. 12, Taf. 19 beschriebenen Ventile besitzt und welche in dieser Combination in der Berliner Wasserwerke als Filterpumpe zur Transport des zu klärenden Wassers verwendet wird. Wegen der geringen Dimensionen dieser Pumpe hat der in der Fig. 9, Taf. 21 dargestellte Saugkolben eine von den gewöhnlichen Ventilkolben abweichende Form, gegen den Kolben, d. h. er besteht, der in der Fig. 9, Taf. 21 dargestellt ist, aus einer Figur unmittelbar unter ihm befindlichen aus Etagen und zwar aus dem in der Fig. 9, Taf. 21 dargestellten aus jeder eine horizontale ringförmige Lage für die aus Anzahl der Klappen enthält. Beim Aufgange wird die ganze pro Hin- und Hergangsmenge gesaugt und gleichzeitig gedrückt, welche in dem von dem (hier bezeichneten) und dem Cylinder gebildeten Raume befindlich ist, gehoben; beim Niedergange durch den Ventilkolben dringende Lufttheil gehoben, welcher in jenem Raume keinen Platz findet. Durch rasches Umdrehen des Plungerkolbens kann der ganze Raum so groß hergestellt werden, als gerade die Hälfte von der ganzen Höhe, also bei Auf- und Niedergang gefördert wird. Uebrigens ist auch an der Hand sichtbare Druckventil nicht vorhanden, sondern aus deren mehreren nach dem Grade der Annahme, daß das Heben der angegebenen Pfeile in der Fig. 9, Taf. 21, im geöffneten Zustande sei. Die Ventile der Pumpen, welche in verschiedenen Formen von kleineren Dimensionen bestehen, bestehen aus einfachen Leder- oder Kautschukklappen, oder aus soliden konstruirten Metallklappen, oder aus einem plötzlichen, feigen- oder fugeförmigen bilden, welcher von dem Wasser gedrückt oder auf den seiner Form genau nach nicht schließend gedrückt wird, oder in verschiedenen Formen von größeren Dimensionen, oder in zwei Ventiltypen (Taf. 20, Fig. 9, Taf. 21, Etagenventile mit schrägliegenden Klappen angewendet wird die Anzahl der Etagen mit mehr und mehr gesteigert, jedoch das Ventil genannte Constructionen, Taf. 20 im Durchschnitte abgebildet ist. Dieses Ventil ist an einer in der Londoner Wasserwerke angebracht, dessen Durchmesser von 1½, Meter gesammten Ventils in viele Theile, oder die Zusammenfügung derselben, oder die mit dem sogenannten Schlag verbundenen erschütternden Stöße zeitig den Uebelstand, daß ein Theil der Verunreinigung des Wassers klemmen das gesammte Ventil veranlaßt, dahin abzumindern, das Einzelorgane unbrauchbar wird, übrige Theil unbeeinträchtigt fort.

Nach Fig. 7, Taf. 19 heißt die Pumpe, welche in der Fig. 7, Taf. 19 dargestellt ist, eine Pumpe, sondern für Getriebe-

die genauere Beschreibung erst bei Besichtigung der Maschinen erfolgen wird und hier in der Zwischenzeit von der Mittellinie der Figur ist dargestellt die Ventillasten mit den ausstarventilen bestehenden Saug- und Druckventilen werden soll.

Die Pumpen werden in der Regel bei einem mittleren Geschwindigkeit bis 0,3 Mt. in der Secunde bewegt, und die Leitungsröhren erhalten eine solche, daß unter jenen Umständen das einer Geschwindigkeit von 0,8 bis 1,2 liegt. Bei größeren Geschwindigkeiten den stattfindenden Wechsel der Bewegung des Kolbens einerseits Stöße in den andererseits Erschütterungen in den Rohrentstehen, welche die Stabilität gefährdend auch bei den üblichen mäßigen Umdrehungen auftretende Erschütterungen zu vermeiden man die Windkessel an, d. h. Kessel- oder cylinderförmige Gefäße, welche geschlossen sind und bis zu drei Viertel ihres Inhalts fassen, welche vermöge ihrer elastischen Wasser ein weiches, federndes Element. Solche Windkessel sind bei den auf 20 dargestellten Pumpenarten an ihrer Unterseite und an einem kuppelartigen oberem Ende. Dieselben werden für gewöhnlich in der Druckleitung, also an der Druckleitung, auch vor dem Saugventile, also an der Saugleitung, angebracht; letzteres im Falle eines Stößen der Pumpe. Man unterzieht das Windkessel der Saugwindkessel.

Man werden häufig in engem Anschluß an die anderen Motoren, an Gabelwerke, Wasser- und Dampfmaschinen konstruirt.

Fig. 8 zeigt in dieser Beziehung eine der Pumpe mit einem einfachen durch bewegten Hebelwerke. Sie stellt den gebauten Pumpenlasten mit vier Pumpen, dem hinten angebrachten Windkessel und demselben dar, welches aus einer Schüttel- und beweglichen Pumpenhebeln und zwei zum Mannschaft angeordneten Hebelverläufen Krafthebeln, zusammengesetzt ist.

Fig. 13 zeigt die Combination einer durch Thierkraft bewegten Gabel- und Welle des Beschauers zunächst ist das in der hinabgesenkte Saugrohr dargestellt, in dem Wagen ruhend, der Ventillasten mit beweglichen lastenförmigen Windkessel und beweglichen beiden nebeneinanderliegenden Hebeln. Weiter hinten auf der Rechten befindet sich der Gabel mit seinem Räder die Pumpenkolben bewegenden Ventile mit seinen vier hölzernen Armen, an welchen mittels Schwengel oder Drückventilen werden; obenauf ein Sitz für den

Die in Fig. 8 dargestellte, von ihrem Erfinder sogenannte Universal-Dampfpumpe läßt hier vorn den Dampfcylinder mit dem Dampfzuleitungsrohr und hinten den mit dem Dampfcylinder zusammengefügten Pumpenkörper, den Windkessel und das Druckrohr, sowie andererseits im Hintergrunde das Saugrohr sehen; Pfeile deuten die Richtung des zufließenden und abfließenden Wassers an.

Durch Fig. 4 ist die Baumann'sche Dampfpumpe dargestellt, bei welcher der Pumpenkörper an dem darauffolgenden hohen cylindrischen Windkessel und den beiden viereckigen Dedeln der Ventillasten kenntlich sein wird, während der Dampfcylinder rechts- und links zu sehen ist.

Auch Fig. 11 auf Taf. 19 zeigt eine solche direct wirkende Pumpe, von dem Patentinhaber Specialpumpe getauft, oder vielmehr deren zwei, welche rechts und links von der Feuerbüchse des zu ihnen gehörigen verticalen Dampfessels auf der dem ganzen Bau gemeinschaftlichen massigen gußeisernen Fundamentplatte befestigt sind. Auch hier ist der Pumpencylinder von dem Dampfcylinder durch den auf ihm angebrachten urnenförmigen Windkessel und an seiner äußerlich kastenartigen Gestalt zu unterscheiden, welche er durch Anbringung des Ventillasten erhalten hat. Die zur Befestigung des Saugrohrs dienende Klammer ist unter dem Ventillasten und die zur Befestigung des Druckrohrs bestimmte über demselben angebracht.

Alle die in Fig. 4, 8, 9 und 11 dargestellten Dampfpumpen sind Erfindungen neuerer Datums und derzeit sehr in Mode. Früher, aber zum Theil auch noch jetzt, wendete man bei derartigen Combinationen behufs Anbringung des für den Dampfcylinder erforderlichen Steuerungsmechanismus ein rotirendes Nebenglied an, bestehend aus einer Schwungradwelle mit Schwungrad und einem Kurbelmechanismus. Eine solche Constructionsform ist z. B. die in Fig. 10, Taf. 20 dargestellte Dampfpumpe von Wilson, bei welcher der Dampfcylinder mit dem massigen Schwungrad oben und der Pumpencylinder mit dem Ventillasten und den für die Befestigung von Saug- und Druckrohr bestimmten Rohrstutzen unten angebracht ist.

In Fig. 4, Taf. 20 tritt dieses rotirende Nebenglied als ein rotirendes Zwischenglied auf, indem die alternirende Bewegung des Dampfkolbens zunächst auf die zwischen Dampfcylinder und Pumpenkörper angebrachte Schwungradwelle und von hier aus mittelst zweier Lenkstangen auf den Pumpenkörper übertragen wird. Die Lenkstangen ergreifen zunächst einen Kreuzkopf, welcher von den hinten am Pumpencylinder befestigten abgehenden Geradsführungen oder Seilen in gerader Bahn erhalten wird, und an welchem die Kolbenstange der Pumpe befestigt ist. Der obenauf stehende hohe Windkessel mit einem Theil des Druckrohrs und ebenso das nach unten abgekrümmte Saugrohr treten in der Abbildung deutlich hervor, gleichfalls die an beiden Enden des Pumpencylinders angebrachten, mit horizontal liegenden Dedeln verschlossenen Ventillasten.

Auch in Fig. 1, Taf. 19 ist ein rotirender Zwischenmechanismus angebracht, jedoch noch vermehrt um Räderwerke und Kurbelmechanismen. Die hier dargestellte Dampfpumpenmaschine des schottischen Wasserwerks besteht aus einem pyramidenförmigen gußeisernen Gehäuse, welches oben die Schwungradwelle mit zwei Schwungrädern und einem kleinen Zahnrad und unten auf seiner Fundamentplatte vorn und hinten je einen Dampfcylinder und an den vier Ecken je einen Pumpencylinder trägt. Das genannte kleine Zahn-

Fig. 4, 8 und 9 zeigen sehr enggebaute Combinationen der Pumpe mit der Dampf-

Fig. 9 dargestellte Species wird vorzugsweise der Dampfessel benutzt und ist so, wie sie an einer der Umfassungsmauern des Hauses befestigt werden kann. Oben der Dampfcylinder, unten der Pumpencylinder der Windkessel. Die verlängerte Dampfkolbenstange bildet den Tauchermpe.

rad greift in zwei größere Zahnräder ein, welche auf zwei an den Enden mit je zwei Kurbeln versehenen Zwischenwellen sitzen und somit die von den Dampfcylindern ausgehende Bewegung mittels Lenkungen auf die Pumpenkolben übertragen. Letztere sind hohle Kugeln, oder Taucherkolben. Durch die völlig symmetrische Anordnung sollen hervorragende Stabilität und ruhiger Gang erzielt werden. Die Anwendung mehrerer Pumpenstiefel sichert diesen ruhigen Gang schon an und für sich, namentlich wenn, wie hier, sämtliche Kurbeln gegeneinander verstellt sind, so daß jede derselben zu einer andern Zeit, als die andern, den todten Punkt passiert. Vor Erfindung des Windfessels war diese Anordnung die einzig mögliche bei größeren Wasserwerken, und die berühmten Wasserkünste zu Versailles konnten erst in Betrieb genommen werden, nachdem die ursprünglich großen und ohne Windfessel aufgestellten Pumpen durch eine sehr beträchtliche Anzahl verhältnismäßig kleiner Exemplare mit verstellten Kurbeln ersetzt waren. Schon bei Anordnung von drei derartigen Pumpenstiefeln hält man den Windfessel für überflüssig. In vorliegendem Falle ist daher auch kein solcher angewendet, und zwar um so weniger, als das Vorhandensein des Käderwerts den Gang der Pumpenkolben im Verhältniß zu demjenigen des Dampfkolbens sehr verlangsamt und dadurch stoßlos macht.

Bei den durch Fig. 2 und 14 auf Taf. 19 dargestellten größten Dampfmaschinen tritt der rotirende Mechanismus abermals als Nebenglied auf, indem die Stange des Pumpenkolbens einfach die Verlängerung der Stange des Dampfkolbens bildet, und die mit dem Schwungrade armirte Schwungradwelle nicht die Bewegung jener beiden Kolben vermittelt, sondern nur zur Sicherung der Vollhubigkeit dieser Kolben und des Ganges der Steuerung des Dampfkolbens angebracht ist.

In Fig. 2 befindet sich die Pumpe vertical unterhalb des Dampfcylinders (linkerhand der Zeichnung), in Fig. 14 horizontal vor demselben. Die erstere dieser Anordnung macht eine Balancier-Dampfmaschine nöthig, die letztere reicht mit einer liegenden Dampfmaschine aus. Fig. 2 zeigt diesen Balancier an ihrem höchsten Punkte. Derselbe ist von zwei pyramidalen Gerüsten getragen und von einer zur Erleichterung des Controlirens und Schmieren der oben befindlichen Maschinenteile angebrachten, bestiehbaren Gallerie umgeben. In der Mitte unter den horizontalen Trägern zeigt sich der Condensator, rechterhand der cylindrische Windfessel und zwischen letztem und dem Gerüste die Lenkstange mit der Kurbel, der Schwungradwelle und dem Schwungrade.

Während Fig. 2 nur am untern Theile und oben ein partiell im Durchschnitt dargestellt ist, legt Fig. 14 einen völligen Durchschnitt vor Augen.

In der Mitte befindet sich der Dampfcylinder mit dem in mittlerer Lage dargestellten Kolben und mit seinen hohlen Dedeln; links davon unter der eisernen Fundamentplatte zeigt sich der Condensator mit der Kaltwasser- und der Luftpumpe, welche beide als Kolben die auf Taf. 21, Fig. 9 beschriebene Combination von Taucher- und Ventilkolben haben. Noch weiter zur Linken ist das Schwungrad mit Welle, Kurbel und Lenkstange erkennbar und zur äußersten Rechten befindet sich die eigentliche Pumpe. Dieselbe hat unter ihrem Cylindrer zwei Saug- und über demselben zwei Druckventile; sie ist doppelwirkend. Die Ventile, welche rechterhand nicht gezeichnet sind, haben die Doppelfisch-Construction. Es ist in der unten sichtbaren Saugleitung ein Saugwindfessel und

oben auf dem Pumpenstiefel ein Druckwindfessel, wozu dem aber noch, gemeinschaftlich für zwei Pumpen, ein größerer, hinter der Pumpe stehender Ventilschieber angebracht, welcher in Wirklichkeit eine bedeutend höhere hat, als hier wegen Raumangels gegeben wurde.

Durch vorstehende Darlegung könnte die Pumpe erweitert werden, als ob mit Weglassung der oben erwähnten rotirenden Zwischen- oder Kadermaschinen nur die Pumpen kleineren Kalibers angewendet seien. Diese Ansicht wäre jedoch irrig; denn gerade bei den allergrößten Dampfmaschinen kommt diese rotirende Mechanismen in Begall. Die meisten der für die sogenannte Wasserhaltung des baues errichteten Dampfmaschinen, welche in historische Vortritt vor allen Dampfmaschinen gehen und welche zu den gigantischsten Maschinen überhaupt zählen, haben keine rotirenden Bestandtheile, auch viele auf den Stammenlagen unter natürlichen städtischen Wasserwerke aufgestellten Dampfmaschinen verrichten ihre regelmäßige Function auf rotirende Massen. Man ist sogar noch immer im Zweifel, ob nicht die Weglassung der rotirenden Theile zweckmäßiger sei, und die Frage, ob nicht der Theil des Vorhandenseins dieser Massen und derartigen Mechanismen hinsichtlich der Sicherheit ruhigen und genau abgegrenzten Ganges eine Nachtheile in wirtschaftlicher Beziehung überwiegen, mehrere Dampf- oder Kolbenverbrauchs erlangen, den müsse, gehört zu den unentschiedenen Fragen.

In den kleinsten Sorten von Pumpen zählen die hydraulischen Pressen angeordnet (Taf. Fig. 10). Dieselben sind so klein, daß, wie bei den auf dem linkerhand dargestellten Pumpen mit Führungsbügel und Druckhebel angeordneten Pumpen zeigen, die Taucherkolben derselben einen größeren Durchmesser als deren Kolbenstangen haben, welche nach aufwärts in gleicher Dicks der Führungsbügel verlängert sind. Die Figur rechts zeigt linkerhand das Pressgerüst mit dem rotirenden Presscylinder und dem aus letztem hervorragenden mit Druckplatte versehenen Presshebel. Auch ist das das Presswasser leitende Verbindungsrohr zwischen Presscylinder und Pumpenstiefel, über dem Boden liegend, sichtbar und oberhalb über diesem Rohre stehendes Quecksilbermanometer, welches den entwickelten Wasserdruck anzeigt.

## 2. Centrifugalpumpen, Rotationspumpen und Schöpfpumpen

Wie die Construction der Kolbenpumpe auch Bauart des einfachsten Schöpfmeisels begreift werden kann, der in seinem Boden ein Ventil angebracht hält, bis zu einer Röhre verlängert und in der Gestalt auf und nieder bewegt wird, so läßt sich auch das Schöpfrad, welches die Constructionen der Wasserräder hat, jedoch in umgekehrter Weise dieses wirksam wird, aus dem Schöpfmeisel entstehen betrachten, der in mehreren Exemplaren von dem Umfange eines in Umdrehung versetzten und mit einem untern Theile in das zu hebende Wasser tauchenden Rades angebracht ist. Die Schöpfblätter tauchen zu Wurfrädern, wenn die das Wasser schöpfenden gellenartigen Bestandtheile schaufelartig nach außen werden und wenn das an einem untern Theile des Umfanges mit einem Gerinne versehene oder von einem Gehäuse eingeschlossene Rad in rascher Umdrehung versetzt wird.

Läßt man ein solches mit Schaufeln ausgerüstet



nicht nur mit einem Theile seines Umfangs, nämlich in das Wasser eintauchen, umgibt es in einem bis auf eine centrale Oeffnung kesselförmigen Gehäuse und bringt an dem Umfange des Gehäuses ein nach aufwärts geleitetes Rohr so kann man durch sehr rasches Umdrehen Wasser in dem genannten Rohre in die Höhe, indem vermöge der beständigen Rotation nachfolgend in das Gehäuse eingebrachte Wasser fortgeschleudert und somit in das Rohr getrieben wird, während neues Wasser durch das Rohr nachfließt. Aus einer derartigen Construction entsteht diejenige Construction, welche als Schaufelpumpe oder Kreiselpumpe genannt wird. Der äußerst raschen Umdrehung, welche man Pumpen dem Schaufelrade ertheilt, können Pumpen derselben für die gleichen Zwecke, die Förderung der gleichen Wassermenge, weniger als bei den relativ langsam umgedrehten und Schöpfkrädern sein, weshalb denn Anschaffungskosten derselben beträchtlich geringer sind, dagegen deren Wirkungsgrad und demnach der Betriebsaufwand ungünstig verhält.

Man kann dieselben meistens geträumt hergestellt in ihrem noch nicht geträumten Zustande, trapezförmig oder noch anders gestaltet. Das Schaufelrad wird liegend oder so bestmöglich um eine verticale oder eine Achse drehbar angeordnet.

Fig. 2 stellt eine Pumpe von Ferris mit liegender, also mit verticaler Achse dar. Das Gehäuse desselben umschließenden Gehäuse wird Wasser gefüllt, welches durch die oben sichtbaren Leitschaukeln einfließt und oben aufwärts gebogene Steigrohre fortgeleitet

wird durch die rasche Umdrehung der Schaufeln das Wasser gegen die Peripherie des Rades in das hier angebrachte Rohr geschleudert auch in der Umgebung der Achse ein Rohr gebildet wird, so kann eine Pumpe auch saugend wirken und verstatet die Ansaugung eines im Centrum eintretenden und eine Aufstellung über Wasser.

Die Einrichtung und Aufstellung ist folgende. Ein Beispiel hierzu zeigt Fig. 13 auf welche die Gwynne'sche Pumpe mit stehendem Schaufelrad und mit horizontaler Achse vorn und hinten behufs hermetischen Abriegelung des Gehäuses durch eine Stopfbüchse bringt mittelst einer vorn sichtbaren kleinen Riemen- Umdrehung versehen wird. Das Wasser wird durch das vom Boden bis zur Mitte reichende Rohr angefaugt und durch das an der Peripherie befindliche und an einer Stelle erkennbare Rohr, beziehentlich vermittelst desselben angeschraubten Rohrenleitung

Die Schaufeln erhalten auch eine schraubenförmige Gestalt, oder das Rad geht in eine völlige Schraube über, oder wird endlich aus Röhren zusammengeleitet, welche schraubenförmig gewunden sind.

In allen diesen Constructionen besteht jedoch ein Zwischenraum zwischen dem Rade und dem Gehäuse, sobald im Ruhezustande, sofern nicht Ventile angewendet werden, ein Abfluß des Wassers durch diesen Zwischenraum stattfindet, und bei bedeutender Druckhöhe auch während des Ganges so viel Wasser zurückfließt, als von den Schaufeln in die Höhe getrieben wird, mithin gar keine Wasserförderung erfolgt. Diese Centrifugaspumpen und Schraubenpumpen sind daher nur innerhalb gewisser Grenzen hinsichtlich der Druck- oder Hubhöhe anwendbar und haben mit zunehmender Druckhöhe einen beständig kleiner werdenden Wirkungsgrad, sobald ihre Anwendung nur für geringe Förderhöhen zweckmäßig ist.

Dem beregten Uebelstande zu begegnen, hat man Constructionen hergestelt, bei welchen die Schaufeln, oder allgemeiner gesprochen die Umfänge der eigenthümlich geformten Räder oder rotirenden Kolben die innern Gehäusewände in engem Anschlusse berühren, und nennt diese Constructionen Rotationspumpen.

Eine Vorstellung von der innern Einrichtung derselben verschaffen die in Fig. 3, in Fig. 7 und Fig. 11 auf Taf. 30 dargestellten Rotations-Dampfmaschinen.

Auch werden, wie Fig. 6 und 7 auf Taf. 20 vor Augen legen, anstatt eines einzigen Rades oder eines einzigen rotirenden Körpers deren zwei in einem Gehäuse angebracht, sobald, allgemein gesprochen, die Kapselrader-Construction entsteht. Die Wirkungsweise derselben ist zu erkennen, wenn man sich die Räder in der Richtung der in Fig. 7 eingezeichneten Pfeile mittels zweier äußerlich auf deren Achsen angebrachten Zahnräder umgedreht denkt und beachtet, daß der unten sichtbare Rohrstutzen zum Anschluß an das Saugrohr und der obere zum Anschluß an das Druckrohr bestimmt ist. Durch die bezeichnete Drehung der Räder wird der unmittelbar über der Saugöffnung befindliche innere Raum erweitert, hierdurch anfänglich eine Luftverdünnung und ein Einbringen von Wasser verursacht; dieses Wasser wird von den nachfolgenden Rädern der Räder ergriffen und in der Richtung der Pfeile gehoben; durch die im weiteren Verlaufe der Umdrehung folgende Zahnflanke wird abermals eine Vergrößerung jenes Raumes bewirkt, abermals eine neue Quantität Wasser angefaugt und auf diese Weise das Spiel fortgesetzt, sobald schließlich ein Wasserstrahl continuirlich unten zum Zuflusse und oben zum Abflusse gebracht wird.

Ähnlich ist die Wirkungsweise der in Fig. 6 auf Taf. 20 dargestellten Pumpe von Behrens, welche das Saug- und Druckrohr zur Linken und zur Rechten aufnimmt und ebenfalls durch zwei äußerlich angebrachte Zahnräder bewegt wird.

Auch gibt es derartige Pumpen, bei denen die innern Rotationskörper genau die Form von Zahnrädern haben und wie diese ineinandergreifend einander bewegen, sobald der Eindruck erweckt wird, als ob in Fig. 6 oder 7 die innern rotirenden Körper einfach in Wegfall gebracht und an deren Stelle die äußerlich vorhandenen Zahnräder verlegt wären. Eine dieser Construction ähnliche Bauart hat sogar den historischen Vortritt vor allen andern Kapselrad-Pumpen, nämlich die aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges stammende sogenannte „Wappenheimant“.

Fig. 3 zeigt eine ähnliche, wiewol mit abweichend konstruirten Schaufelradcompensator, welche mit einer liegenden auf einer Scheibensförmigen Kurbel und einer drehbaren Kurbelwelle wirkenden Dampfconstructive Verbindung gebracht und hier vorn hinten sichtbar ist. Und Fig. 9 auf Taf. 30 zeigt eine sogenannte Schneckenpumpe, welche von einer kleinen verticalen Dampfmaschine oben angebrachtem Dampfzylinder direct

## 3. Strahlpumpen, Injectoren und Ejectoren.

Wenn ein Wasserstrahl in ein Rohr zum Ausfluß gebracht wird, welches weiter ist als der Querschnitt des Strahls, jedoch nicht so viel weiter, als daß nicht in einiger Entfernung von der Ausflußöffnung ein Anschluß des ausgefloßenen Wassers an die Wandungen des Rohrs stattfindet, so bildet sich zwischen dem Strahl und den Rohrwandungen ein luftverdünnter Raum, sofern das Rohr an dieser Stelle allseitig geschlossen und dicht ist. Wird jedoch an dieser Stelle in dem Rohre eine Oeffnung angebracht, so findet ein Ansaugen von Luft statt, d. h. der äußere Atmosphärendruck preßt beständig Luft ein, welche von dem Wasser mit fortgerissen wird. Und bringt man an derselben Stelle ein Rohr an, welches in eine tiefer befindliche Wassermasse eintaucht, so wird von dieser Masse eine Quantität Wasser angesaugt, oder, genauer gesprochen, ebenfalls von dem äußeren Atmosphärendrucke eingepreßt und von dem Wasserstrahl mitgenommen.

Auf dieser hinsichtlich ihrer ursächlichen Entstehung mit den Lehren der Mechanik und den empirischen Gesetzen der Hydraulik nachweisbaren Erscheinung beruht die Construction und Wirkungsweise der sogenannten Strahlpumpen.

Es ist nicht erforderlich, daß der motorische Strahl ein Wasserstrahl sei, ebenso wenig wie es nöthig ist, daß die angesaugte Masse einer bestimmten tropfbaren oder gasförmigen Flüssigkeitsart angehöre. Vielmehr kann jede beliebige tropfbare Flüssigkeit, Dampfart oder Gasart sowohl den Rang des motorischen Strahls als die Stelle der bewegten Masse einnehmen, sodaß eine große Anzahl von aus entsprechenden diesfälligen Combinationen hervorgehenden Constructionen möglich ist und in neuerer Zeit zur Ausführung gebracht wurde.

Daß auf den Hüttenwerken als Gebläse- oder Wettermaschine verwendete Wassertrommelgebläse, in welchem der motorische Strahl Wasser und das angesaugte, beziehentlich comprimirte Fluidum Luft ist, möchte wol die älteste derartige Vorrichtung sein.

Hervorragendes Aufsehen unter den Technikern hat jedoch, namentlich wegen seiner eigenthümlichen Verwendbarkeit zum Speisen der Dampfkessel derjenige nach diesem Princip construirte Apparat erweckt, welcher in der neuern Zeit (1857) erfunden wurde und nach seinem Erfinder der Giffard'sche Injector genannt wird. Dieser Apparat ist auf Taf. 29 in Fig. 10 dargestellt und zwar in einem horizontalen Längsdurchschnitte.

Der motorische Strahl ist hier Dampf, welcher mittels eines Rohrs durch den am weitesten nach rechts angebrachten seitlichen Rohrstutzen zugeleitet wird. Die angesaugte Flüssigkeit, welche mittels eines nach abwärts geleiteten Rohrs durch den andererseits in der Mitte angebrachten Stutzen einströmt, ist Wasser. Dieses Wasser condensirt, verdichtet, den Dampf und wird von dem aus dieser Condensation hervorgegangenen Wasser in die in der Längsnachse des Apparats angeordnete tonische Verjüngung mitgerissen, aus welcher das Gemisch in eine ebenfalls in der Längsnachse angeordnete und in nur geringem Abstände von der erstern sich fortsetzende Röhre übertritt und durch dieselbe nach Ausdrückung eines hinterhand angebrachten Tellerventils in den Dampfkessel gelangt, welchem selbst der motorische Dampf entnommen wird.

Die Abbildung läßt rechterhand zwei mittels Griff und Handrad verstellbare Schrauben erkennen. Mittels der erstern kann ein hohler, an seinem linken Ende sich konisch zuspitzender cylindrischer Bestandtheil

in der Achsenrichtung verschoben werden und andern mit Handrad versehenen ist ein Hohlcylinder angebracht, ebenfalls mit einem Spindel verstellbar. Mit Hülfe dieser Einrichtung wird die Dide des Wasserstrahls und der Zufluß des Dampfes welcher in den Hohlcylinder durch die dazwischen liegenden Wandungen angebracht werden kann am weitesten nach links befindliche Stelle dient zum Abführen des bei ungenügender seitlich entweichenden Wassers.

Das Gelingen der Wirkungsweise der Pumpe hängt von der Temperatur des angesaugten Wassers ab. Bei 40° beträgt. Der beim Uebertritt von den höchsten Verjüngung in der vor den Stutzen befindlichen Röhre betrachtete Dampf erscheint mildig getrübt, je nach dem Aussehen eines seitstehenden Wasserstabes.

Diese und ähnliche eigenthümlichen Erscheinungen und namentlich der auffällige, in der Nähe des Dampfes und dem innern Verbrauche beruhende Umstand, daß die eingesaugten Wassers in denselben Kessel gelangt, der motorische Dampf entnommen wird, die vielen Giffard'schen Injector die höchste Neuerung ist eine Anzahl von Abänderungen und Vereinfachungen enthalten. Hier dargestellte Exemplar ist etwas vom Original construiert; für einen der besten gilt der Krauch'sche Injector, welcher einige der oben beschriebenen Regularitäten an sich trägt, und in gleicher vorzüglich erfundene Apparat das Entsaugen einer beträchtlichen Anzahl anderer Sonderbede geeigneter, aber auch die Principe beruhender Strahlpumpen gebotene enge Raum gestattet jedoch das freie Eingehen auf diese neuern Formen. Nur der Ejector erwähnt sein mag, welches eines aus dem Abgangsdampfe der Kessel bestehenden motorischen Strahls das Wasser zum Behufe der Condensation dieses Dampfes und der daraus hervorgehenden Bildung des Raums anzusaugen hat.

## 4. Feuersprizen, Bewässerungs- und Bescsprizungsmaschinen.

Die bereits theilweise als eine Ejector-Pumpe mit einer motorischen Wasserpumpe Fig. 8 auf Taf. 20 schließt noch eine Variation in sich, nämlich die der Bewässerungsmaschine, der Pumpe, mit einer anderen Maschine, mit einem Fahrzeuge. Die Anwendung von Transportmaschinen mit einem zum unmittelbaren Angreifen geeigneten Mechanismus wird meistens bei dem Wasser und der Pumpe an der Feuerstelle und zum weitem Transporten mittels einer schlauchartigen Röhre zur Brandstelle verwendet; sie ist die Feuerspritze.

Fig. 3 auf Taf. 20 stellt die Feuerspritze dar, also eine Combination aus schlauchartiger Röhrenleitung, Pumpe und einer Dampfmaschine. Unten unter dem Aufseher ist die seitwärts erkennbare Windkessel

maschine mit ihrem verticalen Kessel und ihrem Schornsteine. In der Mitte des Wagens Anzahl von Schläuchen und zwischen und dem Aufseherbode ein Rasten zur Aufnahme von Werkzeugen und Utensilien angeordnet. In diesen Städten wird der Kessel einer Solerspritze auf die telegraphische Anzeige vom eines Feuers sofort mit vorräthig gehalten: Wasser gefüllt und angeheizt, sodas sich end der Fahrt nach der Feuerstelle der mospf entwickeln kann.

Senerspritzen ist nicht nur der Transport an die brennende Stelle, sondern auch itung desselben über dieselbe Bedingniß, was elung eines Strahls bewirkt wird, welcher den Zweck erreichen läßt, dem Orte der e gefickterer Entfernung beikommen zu das Wasser auch durch Stoß und somit ershörend auf die in Brand gerathenen zur Einwirkung zu bringen. Zur Entwicgleichmäßigen Strahls ist namentlich bei penarten das Vorhandensein eines Windwenniges Erforderniß.

ines eine leichtere und aus größerer Entföhrbare Verbreitung des transportirten Wastenden Strahls wirksam zu werden, diese ht man auch mit manchen Bewässerungsngungsvorrichtungen zu lösen, wenn deren ise über die einfache Wirkungsweise einer oder eines mit Brause versehenen fahrbaaffes hinausgehen soll. Eine in einen gestellte Pumpe mit Schlauch und strahlMundstücke ist der Anfang zu einer veresserung. Neuerdings stellt man jedoch, wie Fig. 5 zeigt, eine Combination her zwischaren und mit strahlbildendem Mundstücke Schlauche und der Pumpmaschine des städervorwerks, indem man besagten, auf einer versehenen Trommel mittels des Fahrens wdelbaren Schlauch mit einem der sogeranten der Wasserleitung durch Verschrauung bringt.

## maschinen für luftförmige Körper.

(Tafel 20 und 21.)

davon, daß der Transport von Luft aus:(für unterirdische oder unterseeische Zwecke) en Behältern mit Anwendung von Fahrkt wird, entsteht das Verlangen nach einem der uns überall umgebenden und überall atmosphärischen Luft in den Fällen, wenn ner Raum völlig oder theilweise von Luft reichlicher und dichter, als es ohne Anstlicher Mittel möglich ist, mit Luft gefoll, und wenn die Fortschaffung unrein und die Herbeischaffung reiner Luft oder rig von Gasen und Dämpfen mittels der wird.

f, dessen man sich in allen diesen Fällen en bedient, beruht auf der Anbringung fangs- und Endpunkte des Transportenden Röhren- oder Kanalleitung und rbringung einer Luftverdünnung an den ndpunkten, oder einer Luftverdichtung an n Anfangspunkten, beziehentlich sowol dünnung als einer Luftverdichtung an stelle innerhalb der bezeichneten Röhren-ung.

transportirende Luft wird nach dem Orte fangsverminderung verknüpften Luftver-

dünnung vermöge des atmosphärischen Drucks bewegt, und von dem Orte der mit Pressungsvermehrung verknüpften Luftverdichtung nach den Endpunkten des Transportwegs vermöge dieser Pressungsvermehrung getrieben.

Außer verschiedenen zur Hervorbringung solcher Luftverdünnungen und Luftverdichtungen angewendeten Mitteln, als der in Verbindung mit einer besonders zu diesem Zwecke geeigneten Anordnung und Lage der Leitungslande gebrachten Wirkung der Wärme (Ventilationsfächte, Schornsteine oder Effen) und als etlicher hydraulischer Vorrichtungen (Rettentrommelgebläse, Cagniardellen), benutzt man zu diesem Zwecke Maschinen, welche mit den für den Transport der tropfbaren Flüssigkeiten bestimmten sehr viel constructive Aehnlichkeit haben.

Da übrigens die bezeichnete Luftverdichtung und Luftverdünnung nicht nur zum Zwecke des Transportes, sondern auch zur Verrichtung etlicher technischer Operationen mittels dieser Maschinen bewirkt wird, so sind dieselben nicht nur zu den Transport-, sondern auch zu den Arbeitsmaschinen zu zählen.

### 1. Gebläse.

Diesjenigen dieser Maschinen, welche in nächster constructiver Verwandtschaft zu den Kolbenpumpen stehen, sind die Cylindergebläse.

Auf Taf. 20 stellt Fig. 1 ein solches mit zwei stehenden Cylindern in Verbindung mit dem dasselbe bewegenden Wassertade dar. Fig. 2 auf Taf. 20 zeigt dagegen ein solches mit einem liegenden Cylinder in Verbindung mit der dasselbe bewegenden Dampfmaschine.

Der eine im Durchschnitt dargestellte Cylinder der Fig. 1 läßt erkennen, daß, wie bei den doppeltwirkenden Pumpen so auch bei diesem doppeltwirkenden Gebläse, ein Scheibenkolben in dem feststehenden Cylinder hin- und herbewegt, und daß hierdurch bald auf der einen, bald auf der andern Seite des Kolbens mit Hülfe angebrachter Saug- und Druckventile (Wasserventile) eine Luftverdünnung und eine Luftverdichtung bewirkt wird. Infolge der erstern findet ein Einfließen der äußern Luft vermöge des atmosphärischen Drucks durch die Saugventile in den Cylinder statt, infolge der letztern wird die eingeflossene Luft durch die Druckventile in die Röhrenleitung gepreßt. Diese mitten zwischen beiden Cylindern angeordnete Röhrenleitung ist hier halb im Durchschnitt dargestellt und steht mit denselben sowohl oben als unten in Verbindung.

Ebenso wie eine unmittelbar in das zu transportirende Wasser gestellte Pumpe eines Saugrohrs nicht benöthigen würde, so weist auch dieses an den Ort, wo die Luft aufgefangen werden soll, errichtete Gebläse eine Saugleitung nicht auf. Die Saugventile sind vielmehr (wie der nicht durchschnitten dargestellte Cylinder zeigt) unmittelbar im Dedel und im Boden angebracht, eine Anordnung, welche bei den Gebläsen meistens angetroffen wird. Auch die Druckventile befinden sich hier (durchschnittener Cylinder) in den Dedeln und den Böden. Diese Anordnung, ebenso wie diejenige der Saugventile, erfordert die Anwendung von mit Gegengewichten versehenen und in der Abbildung erkennbaren Doppelscheiben, welche auf den Zufluß der Ventile hinwirken.

Uebrigens ist in der Fig. 1 das oberflächläge Wassertad und der Kurbelmechanismus zu erkennen, welcher die rotirende Bewegung desrades umzuwandeln und zu transmittiren hat. Die Doppelersting der Cylinder hat den Zweck, ein gleichförmiges Einströmen der Luft in die Gebläseleitung (Windleitung) bewirken



zu lassen, zu welchem Zwecke jedoch außerdem noch die Kurbeln gegeneinander versetzt sein müssen.

In Fig. 2 auf Taf. 20 ist der Gebläsecyylinder linkerhand, der Dampfcylinder in der Mitte und die Kurbel mit Welle und Schwungrad rechterhand zu erkennen.

Der Dampfkolben hat hier eine aus beiden Endseiten des Cylinders hervorragende Stange, welche rechterhand den Kurbelmecanismus ergreift und linkerhand mit der Stange des Gebläsekolbens verbunden ist. Letztere ist beidseits der durch die Schwere des Gebläsekolbens beeinträchtigten Geradsführung bis auf die andere Seite des Cylinders verlängert und hier von einem auf Gleisen hin- und herbewegten Kreuzkopf unterstützt. Der genannte Bau ruht auf einem horizontalen gußeisernen Fundamente, welches mittels etlicher unterwärts (abgebroschen) sichtbaren Schraubenbolzen mit einem steinernen Fundamente verauert wird. Uebrigens gilt diese Gebläsemaschine, auf dem Eisenwerke von Gilling und Comp. in Middlesborough aufgestellt, unter allen mit horizontalen Cylindern gebauten für die größte der Welt. Der Gebläsecyylinder ist 2,75 Meter, der Dampfcylinder 1,3 Meter im Durchmesser, beide haben 2,75 Meter Hub, arbeiten mit 2 Meter Geschwindigkeit in der Secunde und bewegen eine Luftmenge von 700 Kubikmeter in der Minute.

Ein Vergleich dieser mit der in Fig. 14 auf Taf. 19 dargestellten Dampfpumpmaschine wird die fast völlige Identität in der constructiven Aehnlichkeit dieser beiden Gattungen von Transportmaschinen vor Augen legen. Auch hier tritt der Kurbelmecanismus mit Schwungrad als ein rotirender Nebenmecanismus auf, welcher lediglich zur Sicherung der Vollhubigkeit der Kolben angebracht ist, und welcher, wie bei den Pumpen, auch in Wegfall kommen kann. Und wenn hier ein Windkessel nicht sichtbar ist, so wird doch ein solcher, wie bei den Kolbenpumpen, auch hier angewendet, erhält jedoch die Benennung eines Windregulators, weil sein Zweck weniger in der Vermeidung von Stößen als in einem Reguliren der ausströmenden Luftmengen besteht. Aus gleichen Gründen, wie bei den Kolbenpumpen der Windkessel, wird dieser Windregulator ganz oder zum Theil entbehrlich zu machen versucht durch die Anbringung mehrerer mittels gegeneinander versetzter Kurbeln bewegter Kolben, wofür Fig. 1 auf Taf. 20 ein Beispiel liefert.

Auch die Ventile, häufiger jedoch als bei den Pumpen durch Schieber ersetzt und in Klappenform aus Leder oder Kautschuk constructirt, erhalten fast alle die Formen, welche bei den Pumpen angewendet werden, und somit auch, bei Gebläsen von bedeutenden Dimensionen, die aus vielen Einzelheiten zusammengesetzte Construction, wovon Fig. 7 auf Taf. 19 ein Beispiel liefert.

Diese Dargreave'schen Ventile sind im vorliegenden Falle an einem Gebläse mit zwei Cylindern angebracht gedacht, welche zur Rechten und zur Linken der Figur an die dargestellte Construction sich anschließen. In der Mitte der Abbildung ist das Druckrohr (die Windleitung) halb durchschnitten und ein Drittel abgebroschen dargestellt. Rechterhand von der Mittellinie zeigt sich die Vorderansicht der Dedel dieses Rohrs und derjenigen der Ventilkästen, und linkerhand ist oben das Druckventil, unten das Saugventil im Querschnitt dargestellt. Lange cylindrische Walzen von kreisrunden Querschnitt, aus hohlen Metallröhren bestehend, welche von vulkanisirtem Gummi oder sonst einem elastischen Stoffe umhüllt sind, bilden die Elementarventile. Dieselben ruhen auf langgestreckt rechteckigen Ventil-

stiften und sind von Bügeln überdeckt, welche den Hohlraum begrenzen.

Die Kolben, welche im wesentlichen denen der Pumpen sehr ähnlich constructirt sind, werden mit einer mittleren Geschwindigkeit von 1 bis 2 Meter secundlich an den Gebläseeylindern bewegt, und die Ventile erhalten eine Weite, daß die Luft mit einer Geschwindigkeit von 10 bis 20 Meter per Secunde herausfließt.

## 2. Rollende Kolbengebläse und Ventilatoren.

Aehnlich den auf Taf. 30, Fig. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 11 dargestellten rotirenden Dampfmaschinen ähnlich den auf Taf. 20 in Fig. 6 und 7 dargestellten Rotationspumpen, werden auch Gebläse mit rotirenden Kolben oder von Kapselventilatoren gebildet. Eine neuerdings viel genannte, jedoch nach der Bezeichnung Ventilator belegte Construction dieser Art von Noths, ähnlich wie Fig. 7 auf Taf. 30, aus zwei Rotationskörpern bestehend, wovon jeder die Form einer Hälfte des in Fig. 7 dargestellten oberer oder unterer befindlichen Kades, alle die Form einer 8 hat, soll in vielen Fällen einen sehr günstigen Wirkungsgrad geliefert haben.

Auch gehört das für Grubenwede mit großer Erfolge angewendete Wetterrad von John...

Häufiger jedoch sind die Centrifugalventilatoren im Gebrauch. Ganz ebenso wie viele Centrifugalpumpen constructirt, bestehen sie aus mehreren ungeschlossenen und mit etlichen geraden oder krummen oder eigenthümlich geformten Flügel versehenen Rädern, welche in rasche Umdrehung versetzt werden und welche hierdurch ein Verdichten und Absaugen der Luft bewirken, welche im Gehäuse enthaltenen Luft in der peripherisch ausströmende Rohreitung und demnach ein Ansaugen frischer Luft durch die central im Gehäuse angebrachten Oeffnungen bewirken.

Die Flügelräder der kleinsten Sorten dieser Ventilatoren haben keinen größeren Durchmesser als 0,15 bis 0,2 Meter und werden mit 8000 bis 10000 Umdrehungen per Minute bewegt.

Eine Mittelsorte von Sturtevant ist in Fig. 12 auf Taf. 21 dargestellt und zeigt mehr die äußere Form als die innere Einrichtung.

In Fig. 3 auf Taf. 21 zeigt sich dagegen der Sturtevant'sche Ventilator sowohl in seiner äußeren Form als mit seiner innern Einrichtung.

Das Flügelrad ist hier nicht wie in Fig. 12 radial, sondern horizontal, also die Welle radial stehend angeordnet. Die Luft dringt nach der Richtung der eingezeichneten Pfeile sowohl durch oben als unten central angebrachte Oeffnungen und wird nach dem das in der Mitte unterbrochene Flügelrad in der peripherisch angeordnete Druck- oder Blaserohr geleitet. Uebrigens aber wird dieser Ventilator auch einer in directe Verbindung mit ihm gebunden, nämlich auf der Flügelwelle befestigten Dampfmaschine bewegt, welche am Fuße der rechterhand befindlichen Durchschnittsabbildung als ein schmales, mit zwei Schaufeln versehenes Rad sich darstellt und für welches das linkerhand sichtbare Rohr für den einströmenden und das rechterhand erkennbare Rohr für den abströmenden Dampf angebracht ist.

Eine Constructionform von sehr großer Größe ist in Fig. 10 auf Taf. 21 zu Dreiviertel im Querschnitt abgebildete Ventilator von Guibal, welcher neuerdings häufiger zu der Ventilation von Bergwerken (Gruben) und auch von laugen Tunneln angewendet wird. Seine Größe ist so bedeutend (11 Meter Durchmesser), daß die vor ihm angebrachte...

hine, welche direct auf eine an seiner Rad-  
lige Kurbel wirkt, verschwindend klein gegen  
nt. Das Gehäuse und ebenso die am Um-  
elben sich fortsetzende Kanalleitung ist hier  
wert hergestellt, das Flügelrad dagegen aus  
nnert, indem an dem Umfange von drei  
eisernen Rosetten parallel zu den Durch-  
s Gehäuses Balken befestigt und, vom Um-  
bis auf eine gewisse Strecke central ein-  
r mit Brettern belegt sind.

wie bei den Centrifugalpumpen statt der  
r Schraubenräder angewendet werden, gibt  
entilatoren mit Schraubenrädern.

ner nur aus schraubenförmigen Schaufeln  
Construction erhält man eine Vorstellung  
achtung des auf Taf. 24 in Fig. 6 dar-  
urbinenrades, welches ebenso wie das zuletzt  
Vollrad in der kreisrunden Dessignung einer  
er auch in der Achsenrichtung eines Kanals  
werden kann. Und ferner zeigt Fig. 8 auf  
solches aus vier schraubenförmigen Schaufeln  
Rad. Jedoch stellt diese Abbildung einen,  
nderer, nachfolgend geschilderter Beziehung  
ichen Ventilator dar.

wie die Centrifugalpumpen eine beträchtliche  
fortbewegten Wassers durch die zwischen  
sektade und den innern Wandflächen des  
bestehenden Zwischenräume rücklaufen lassen,  
nich bei den Ventilatoren durch eben diese  
ame sehr viel Luft, so daß es aus diesem  
t möglichst, die Compression und Spannungs-  
y über ein gewisses Maß hinaus zu steigern  
falls bis zu einem mittels eines Gehäuses  
1 Grade. Zur Beseitigung dieser Unvoll-  
hat man mehrere Ventilatoren hinterein-  
estellt und zwar derartig, daß der folgende  
saugt, welche sein Vorgänger bereits verdich-

che Construction mit Schraubenrädern zeigt  
e Fig. 8 auf Taf. 21. Die Anzahl der hin-  
angebrachten Ventilatoren beträgt hier vier.  
Einrichtung eines jeden ist aus dem halb-  
en dargestellten ersten dieser Ventilatoren

Die im Durchschnitt als gerade verticale  
arstellende scheibenförmige Platte theilt den  
m des Gehäuses in zwei Hälften, läßt aber  
ze so viel Zwischenraum, daß die central e  
und von dem Schraubenrade peripherisch  
erte Luft durch denselben in die andere  
entweichen kann, von wo sie alsdann durch  
angelegte Oeffnung in den Flügelraum des  
ntilators gelangt. Sämmtliche Schrauben-  
auf ein und denselben Welle angebracht,  
eiz der rechterhand erkennbaren, kleinen  
be in Umdrehung zu versehen ist.  
verdrichtung wird mit Hilfe dieses Ventila-  
esprochen, „multiplicirt“ und derselbe daher  
ationsventilator genannt.

#### Luftstrahlventilatoren und Exhaustoren.

1 Principe der Strahlpumpen wird eine  
getrossen, bei welcher der mit einer Düse  
sahals eines Ventilators oder eines Ge-  
er Längsrichtung eines relativ weiten Ka-  
indet. Mittels des ausströmenden Luft-  
s Luft durch eine an der Stelle der Be-  
imöffnung in den Kanalwandungen an-  
sinnung gesaugt und mit dem alsdann sich  
ribewegenden Strahle gemischt. Eine der-  
Transport der Luft geeignete Einrichtung

war z. B. bei der Ventilationsanlage des pariser Welt-  
ausstellungsgebäudes von 1867 angewendet und ist  
ebenfalls bei der Ventilationsanlage des interimisti-  
schen deutschen Parlamentshauses im Gebrauch.

An Stelle des Luftstrahls wird bei den Wasser-  
trommelgebläsen ein Wasserstrahl, und bei den Blase-  
röhren oder Exhaustoren der Locomotiven und Loco-  
mobilen ein Dampfstrahl angewendet. Die Art der  
Anbringung eines solchen Exhaustors an der Locomo-  
tive zeigt Fig. 13 auf Taf. 32, in welcher d die Esse,  
c die Rauchkammer und h der Exhaustor ist. Der-  
selbe besteht aus einem düsenartig verjüngten, mittels  
eines Mechanismus vom Führerstande aus theils oder  
gänzlich verschließbaren Rohre, welches den aus den  
Cylindern abströmenden, also verbrauchten Dampf  
aufnimmt und denselben in der Ausrichtung der Esse  
d ausstößt. Hierdurch wird in der Rauchkammer c  
eine Luft- oder Gasverdünnung, beziehentlich eine Druck-  
verminderung bewirkt und infolge davon der stärkere  
atmosphärische Druck in die Lage gebracht, frische Luft  
durch den Rost zu pressen.

Eine ganz gleiche Wirkung, nur in schwächerem Grade,  
wird im Falle des Nichtvorhandenseins von verbrauch-  
tem Dampf, also im Ruhezustande der Locomotive,  
auch durch ein in der Figur erkennbares Röhrchen her-  
vorgebracht, welches in die Esse frischen Kessel Dampf  
einführen läßt.

### Motoren oder Kraftmaschinen.

Unter Motoren versteht man diejenigen physicali-  
schen Elemente oder diejenigen Elementareigenschaften  
der Natur, welche als Ursachen der Bewegung auf-  
treten oder die Ursachen der mechanischen Arbeit sind.

Diesen Körper, an welchen diese Elementar-  
eigenschaften haften oder welchen dieselben mitgetheilt  
werden können, welche also gewissermaßen als Träger  
derselben dienen, heißen motorische Substanzen.

Mechanische Vorrichtungen, durch welche die Moto-  
ren und motorischen Substanzen nutzbar gemacht wer-  
den oder durch welche den motorischen Substanzen die  
denselben innewohnende mechanische Arbeit entzogen  
und in brauchbare Arbeitsarten umgewandelt wird,  
heißen motorische Maschinen.

Insofern aber die motorischen Maschinen andern Ma-  
schinen oder Maschinenanlagen als Bewegter dienen,  
werden auch sie kurzweg Motoren genannt.

Zu den Motoren im eigentlichen, zuerst bezeichneten  
Sinne des Wortes werden in der Regel gerechnet:

- Die Muskelkraft von Mensch und Thier,
- die Federkraft,
- die Schwerkraft,
- die Windkraft,
- die Dampfkraft,
- die Expansivkraft und
- der Elektromagnetismus.

Allein nach Maßgabe der neuern physikalischen An-  
schauungen müssen alle diese aufgezählten Motoren als  
die Wirkungen einer einzigen Ursache, also eines ein-  
zigen Urmotors angesehen werden, welcher die wechse-  
lartige Anziehungskraft oder die Attractionskraft ist.

Obwol die Chemie eine Vervielfältigungsarbeit ver-  
richtet hat, indem sie aus den vier antiken Elementen  
des Stofflichen an die hiezig moderne entwidelt, so  
sind doch die übrigen Zweige der Naturwissenschaften  
entschieden unthätig verfahren, und indem der Darwi-  
nismus die unendliche Menge von Arten, von denen  
jede zeitlich als das abgegrenzte Zeugungswerk eines  
separaten Schöpfungsactes galt, in einige wenige Ur-

arten oder gar nur in deren eine einzige zusammenschmilzt, so gelangte die Physik auf ihrem Forschungswege zu dem Ergebniss, daß die vielen Elementarkräfte, „welche sonst die Welt regierten“, nicht eigentlich Elementarkräfte sind, sondern als Wirkungen einer ihnen allen gemeinsamen Urelementarkraft angesehen werden müssen. Magnetismus, Electricität, Wärme, Licht, für nichts anderes gelten jetzt diese Kräfte oder vermeintlichen imponderablen Stoffe, als für die Wirkungen derjenigen Urkraft, welche jeden terrestrischen Gegenstand zusammenhält, welche alle diese Gegenstände an den Erdball fesselt, welche unsere Planeten um die Sonne kreisen macht und welche die Sonnen mit ihren Systemen in den Räumen des Kosmos umhertreibt — der wechselseitigen Anziehungskraft.

Und so ist es auch diese Urkraft, welche als Urmotor für die oben aufgezählten sogenannten Motoren substituiert werden muß.

Daß die Schwere und die Federkraft nichts als Wirkungen der Anziehung sind, letztere der der Anziehung der einzelnen Molecule des federnden Körpers und erstere der der Anziehung der Summe von Moleculen, aus denen unser Erdball zusammengeleht ist, bedarf weiter keiner Erörterung. Die Dampfkraft aber, ebenso wie die Expansivkraft der Gase ist zunächst eine Wirkung der Wärme und diese wieder eine Wirkung der Anziehungskraft der Atome oder des atomistischen Aethers. Durch die moleculare Anziehungskraft werden gewisse Bewegungen der Atome oder des Aethers der Atome hervorgerufen, welche diejenigen Erscheinungen bewirken, welche wir Wärmeerscheinungen nennen. Ebenso hat sich der Elektromagnetismus als ein gewisser Bewegungszustand der Atome oder des atomistischen Aethers erwiesen, ist also ebenfalls die Folge jener Anziehungskraft, und endlich läßt sich auch die Muskelkraft, abgesehen von der spiritualistischen Hypothese einer eigenen Vitalkraft, vollständig auf das Urelement der Anziehungskraft zurückführen. Es bildet sich hier eine ziemlich verwickelte Combination von Wirkungen, welche sich aber sammt und sonders aus der genannten Grundursache herleiten lassen. Auch ist die Wasserkraft die Folge von mehreren Ursachen. Eine gewisse Menge Wassers, auf einer Höhe befindlich, vermag zwar allein durch das Walten der Erbanziehung eine dem Höhenbetrage entsprechende Arbeit hervorzubringen. Eine fortgesetzte Arbeitsleistung entsteht aber nur dann, wenn der Kreislauf dadurch geschlossen wird, daß das gesunkene oder herabgefallene Wasser in die ursprünglich eingenommene Höhenlage wieder zurückkehrt. Die Naturkraft, welche in diesem Sinne thätig ist, ist die Wärme, und zwar die Sonnen- und Erdwärme, welche durch den Wechsel ihrer Intensität im Vereine mit der Erbanziehung Verdunstung und Verdichtung bewirkt. Der Gießbach, welcher von den Gebirgen herabstürzt, der Fluß, welcher auf der sanft geneigten Ebene seines Bettes niedergleitet, sie kehren in ihre Quellen zurück durch das Walten von Thau- und Regenbildung, sie werden wieder gehoben durch die verdunstende Wirkung der Sonnenwärme. Die Wärme ist aber vorhin angeführtermaßen die Wirkung wiederum der Anziehungskraft.

Auf Grund dieser Betrachtungen können mit der Benennung der motorischen Substanzen nicht alle Körper belegt werden, welche gemäß der eingängig aufgestellten Definition als die Träger der motorischen Kräfte bezeichnet wurden, denn die Attractionskraft bahnt an allen Dingen; sondern nur diejenigen Stoffe sind motorische Substanzen, welche sich für die Entwicklung von mechanischer Arbeit qualificiren.

Als im weitern Umfange verwendbar für die mecha-

nische Technik treten von diesen motorischen Substanzen auf:

- 1) die Muskeln von Mensch und Thier,
- 2) das Wasser,
- 3) der Wind,
- 4) der Dampf,
- 5) die erbigte Luft und
- 6) das erbigte Leuchtgas.

Insofern aber, außer dem Wasser, keines dieser genannten Stoffe nur vermittelst der Wärme wirksam werden, und zwar nicht allein der durch die natürlichen Wirkungen der Sonnen- und Erdwärme erzeugte Wind, sondern auch die durch den physikalischen Verbrennungsproceß entwickelte Muskelkraft, könnte man einfach lediglich zwei Gruppen der motorischen Substanzen nennen, nämlich:

- die hydraulische Substanz und
- die thermodynamische Substanz.

Aus dem gleichen Grunde würden die motorischen Maschinen oder kurzweg die Motoren nur in: hydraulische Motoren und thermodynamische Motoren eingetheilt sein.

Allein dem Gebrauche gemäß werden wol die Dampfmaschinen, die Heißluft- oder calorischen Motoren als die Gaskraftmaschinen zu der Klasse der thermodynamischen Motoren gezählt, nicht aber die Windmühlen, die physiologischen oder animalischen Motoren.

#### Physiologische Motoren.

Das Thier im Menschen und das Thier als solche vertreten die in diesem Kapitel abzuhandelnden animalischen Maschinen. Eine den übrigen Kapiteln analoge Behandlung würde daher, streng genommen, eine beschreibende Anatomie und Physiologie des Mensch und Thier verlangen. In der That tritt die Analogie des arbeitenden Thiers zu der Dampfmaschine oder überhaupt zu einem thermodynamischen Motor noch drasilicher hervor, als nach der eben kurzgenannten Andeutung gemeint werden könnte, wenn es das Gesicht des zergliedernden Vergleichs noch näher eingegangen wird.

Dem Thiere muß, wie der Dampfmaschine, Kohlen- und eine kohlenwasserstoffhaltige Substanz zugeführt werden. Letztere erhält das Thier in der ersten Gestalt des Grases, der Blätter und des Halmes, in der Dampfmaschine oder der calorischen Motor dagegen in der abgestorbenen Gestalt des Holzes oder der Kohle gewordenen des Torfs, der Braunkohle und Steinkohle. Jedoch sowohl im Thiere wie in der calorischen Maschine werden diese kohlenwasserstoffhaltigen Substanzen verbrannt; sie werden chemisch umgewandelt in Kohlen- und Wasserstoffdampf, welche aus beiden Nebenächtschleiten, ebenso wie die Excremente, ausgeschieden, abgeführt werden, während in beiden jense chemische Umwandlung oder Verbrennung entwickelt und diese Wärme sowohl bei dem Thiere als bei der calorischen Maschine zum Theil durch die Abkühlung oder an den abgeführten Stoffen verloren unverändert an die Außenwelt tritt, zum andern Theil aber in Kraft, oder besser gesagt, in mechanische Arbeit umgesetzt wird.

Aus der Kohlen- und Wasserstoffdampfmenge, welche ein Mensch nach physiologischen Beobachtungen aufnimmt, und aus der Arbeitsleistung, welche nach technischer Beobachtung in der gleichen Zeit zu entwickeln vermag, hat man den Werth der calorischen oder Wirkungsgrad berechnet, welchen der Mensch als thermodynamische Maschine aufweist, und ist es gewiß interessant und überraschenden Ergebnisses, daß er die Dampfmaschine in dieser Beziehung



das vierfache übertrifft. Diese Berechnung jedoch nur auf den Ausnützungsgrad der dieser beiden verglichenen Motoren entwickelten, ist also nur wissenschaftlich richtig. Praktisch kommt wesentlich dabei die Thatsache zu, daß das Kohlenwasserstoffgebilde der Karbide Gemisches höher im Preise steht, als des Holzes und der Steintobler, oder daß erlingen will, den Menschen wie die Dampf- mit Brennmaterialien zu nähren, ja daß der reinen die Fleischkost beansprucht und ferner, die Dampfmaschine nur zur Schmierung sonst zur Nahrung, der Fettstoffe bedarf.

Theorie der Thiere vom Standpunkte der tierischen Maschinen mit Rücksicht auf ihren Skelettbau analog der Theorie der Dampfmaschinen entwickelt, ist versucht worden, sogar schon im Jahre 1660 von dem Italiener Bozzini: der ungetrübten Jugendfrische der mechanischen entspringende Kühnheit dieses Verhältnisses sich jedoch zu dem erzielten Erfolge in der Weise wie die Versuche der griechischen Philisten die Naturlehre a priori mit der Speculation konstruieren, zu deren Resultaten, welche die Epoche der nur mühsam und allmählichen Erkenntnis vordringenden systematischen empirischen aufsuchten.

Die Erforschung des Thiers als Maschine ist bisher geworden und die theoretische Behandlungszutage als zweifellos unfruchtbar ganz ausgeschlossen.

Es zunächst beobachtet, daß der physiologische sehr verschiedene große mechanische Wirkung hat, je nachdem er an einer Kurbel zu drehen, Hebel zu drücken, an einem Seile zu ziehen, an einem Tummelbaume zu schieben, in einem zu gehen, in einem Sprossenrade zu steigen, einen Treter zu treten hat. Man hat sich bemüht gesehen, ihn an jeder dieser Maschinen besonders zu untersuchen.

Es ferner gefunden, daß seine Arbeitsleistung abhängig von der Geschwindigkeit ist, mit der drehen, schieben, heben oder treten muß, die Anzahl und Dauer der ihm gegönnten Pausen eine hervorragende Rolle spielt. Gemein ist das Beobachtungsergebnis zum gekommen, daß der physiologische Motor nicht mit derjenigen Geschwindigkeit arbeitet, die so groß als die, wenn auch kraftlos, die Ueberwindung von Widerstand, von ihm größte Geschwindigkeit ist, und dieses harmonisiert völlig mit demjenigen, welches zu in Betreff aller übrigen motorischen gefunden hat.

Die theilhafteste tägliche Arbeitsdauer hat sich bei dem Thiere die Zeit von acht Stunden heraus, ihm nicht mehr zugemuthet wird, verdann am meisten Arbeit, wenn er an der 8 Kilogramm Druck und 0,8 Meter secundliche Geschwindigkeit zu drehen hat, und wenn diese Zahl des Hebels 5 und 1,1, betreffs des Tummelbaums 13 und 0,6 und in Bezug auf das Treten 0,7 Meter genommen werden.

Das Göpel arbeitet das Pferd mit 44 Kilo Zug und 0,7 Meter secundlicher Geschwindigkeit, der Mensch mit 65 und 0,6, der Mausestel mit 30 und 0,5, der Ferkel mit 14 und 0,8 Meter am günstigsten. Die ausübbarste Druck ist viermal so groß, als angegebenen Zahlen entsprechende.

Es ist nicht der betonten Hervorhebung, daß

alle diese Angaben nur Mittelwerthe aus einer großen Anzahl sehr bedeutend voneinander abweichender Beobachtungszahlen sind und weder auf das erste Individuum noch auf jeden der sehr wechselvollen, geschweige denn besonders stimulirten Körperzustände desselben ohne weiteres passen.

Das Product aus dem ausgeübten Druck und der dabei dem Angriffspunkte ertheilten Geschwindigkeit pro Secunde heißt die mechanische Arbeit pro Secunde, oder kurzweg auch die secundliche Wirkung. Ist der Druck in Kilogrammen und die Geschwindigkeit in Metern ausgedrückt, so gilt für die secundliche Wirkung die Bezeichnung in Kilogrammmeter oder Meterkilogrammen; 75 solcher Kilogrammmeter werden auf eine dynamische Pferdestärke oder, besser gesagt, Pferdestärke gerechnet.

Nach den obigen Angaben leistet daher ein Pferd am Göpel eine secundliche Wirkung von 44 · 0,9

$$= 39,6 \text{ Kilogrammmeter, oder } \frac{39,6}{75} = 0,52 \text{ dy-}$$

namische Pferdestärken, sodaß etwa zwei Pferde zur Ausübung von einer dynamischen Pferdestärke erforderlich sind.

Ein Mensch verrichtet nach dem Obigen am Tummel-

$$\text{baume } 12 \cdot 0,6 = 7,2 \text{ Kilogrammmeter, oder } \frac{7,2}{75}$$

$$= \text{circa } \frac{1}{10} \text{ Pferdestärke, an der Kurbel } 8 \cdot 0,9 = 7,2 \text{ Kilogrammmeter, also ebenfalls } \frac{7,2}{75} = \text{circa}$$

$$\frac{1}{10} \text{ Pferdestärke Arbeit.}$$

Es würden daher zur Entwicklung von einer dynamischen Pferdestärke sowohl am Tummelbaume als an der Kurbel 10 Arbeiter erforderlich sein.

## Göpelwerke, Trete-, Lauf- und Sprossenräder.

(Tafel 21.)

Die beiden durch Fig. 1 und 14 dargestellten Göpel für zwei Pferde vermögen nach dem sechsten Gesagten eine Dampfmaschine von nur einer Pferdestärke zu ersetzen, während mittels der in Fig. 13 abgebildeten und für vier Pferde bestimmten Construction doppelt so viel Wirkung hervorgebracht werden kann.

Alle diese Göpel bestehen aus einem, zwei oder vier Zugbäumen oder Schwengeln aus Holz, an welche die Pferde gespannt werden, und aus einem mit denselben in Verbindung gebrachten Zahnradwerke, welches lediglich die Bestimmung hat, der von dem Göpel zu betreibenden Transmissionswelle eine raschere Umdrehung zu ertheilen, als sie bei unmittelbarer Verbindung mit der direct von den Schwengeln bewegten Welle wegen des langsamen Ganges der Thiere annehmen würde.

Die Transmissionswelle erscheint auf Taf. 21 in Fig. 1 in einem unter der Pferdebahn angebrachten Kanale angeordnet, in Fig. 14 dagegen über dem Boden; dieselbe ist im letztern Falle, damit nicht die Thiere darauf treten oder darüber stolpern, an der Stelle der Pferdebahn mit einem Schuttbliche überdeckt und mit dem Göpel durch ein sogenanntes Universalgelenk verbunden, welches ein Verlegen derselben nach andern Richtungen gestattet.

Fig. 1 stellt einen feststehenden, von Mauerwerk umschlossenen Göpel dar, Fig. 14 einen transportablen, auf einem aus einem Balkentreu gebildeten Fundamente zu befestigenden und Fig. 13 einen fahrbaren

(s. unter Kolbenpumpen). Die Construction der Fig. 14 von Barrett und Andrews erscheint dem Beschauer in Wirklichkeit äußerlich als ein völlig geschlossenes, dosenartiges Gehäuse, welches dem innerlich angebrachten Räderwerke Schutz gegen das Eindringen von Staub darbietet; in der Abbildung ist ein Theil sowol des Dedels als der Seitenwand durchbrochen dargestellt, damit ein Einblick in die innere Construction gewährt werde.

Die Tretrschleife, auf Taf. 21 in Fig. 4 dargestellt, ist gewissermaßen ein Göpel mit relativer Bewegung des motorischen Thiers zu der Bahn. Während bei den Göpeln das Pferd auf fester Bahn im Kreise herumgeht, dreht sich hier die Bahn unter dem feststehenden, d. h. an ein und derselben Stelle tretenden Thiere im Kreise herum und ist an der in Verbindung mit Zahnradwerk zu bringenden Welle behufs deren Gedrehtwerdens entsprechend befestigt. Damit aber auch das Gewicht des Thiers zum Theil mitwirke, ist die Bahn und selbstverständlich gleichfalls die Welle geneigt angeordnet.

In ähnlicher Weise wie hier, jedoch noch völliger wird auf Taf. 21 in den Fig. 5, 6 und 7 das Gewicht des physiologischen Motors als Betriebskraft zur Verwendung gebracht, indem der Arbeiter sowol bei dem Tretr- oder Treppennabe (Fig. 5), als bei dem Laufrade (Fig. 7) eine kreisförmige Treppe hinaufzusteigen bemüht ist und, an derselben Stelle bleibend, das mit dieser Treppe vereinigte Rad und dessen Welle in Umdrehung versetzt — indem er ebenso bei dem Sprossennabe (Fig. 6) eine kreisförmig gebogene Leiter zu erklimmen trachtet, jedoch durch Verbleiben an demselben Orte dieselbe sammt der mit ihr vereinigten Welle umdreht.

Indwiefern bei diesen Rädern das Gewicht des physiologischen Motors wirksam wird, erkennt man um so bestimmter durch die Vorstellung, daß neben denselben eine gewöhnliche feste Treppe angebracht sei, welche der Arbeiter völlig ersteige, um alsdann oben auf eine der Stufen oder Sprossen des Rades zu treten und durch ruhiges Stehenbleiben auf der Stufe mittels Niederstülzens das Rad zu drehen. In der That sind auch derartige Räder ausgeführt und unter Anwendung einer größern Anzahl bald die Treppe ersteigenden, bald am Rade sich niederlassenden Arbeiter mit günstigem Erfolge in Betrieb gesetzt worden, so daß hier eine Combination der Muskelkraft und der Erdbziehung oder Erdschwere in gleicher Weise, wie bei den Wasserrädern, weiter oben erwähntermaßen, eine Combination der Sonnenwärme und der Erdschwere zu motorischer Wirkung ausgenutzt erscheint.

### Wasserräder.

(Tafel 22.)

Das Wasser, von der Sonnen- und Erdwärme vermöge der Verbundung auf die Höhenpunkte unserer Planeten gehoben und vermöge der Erdattraction wieder in die Thäler herniedergezogen, wird auf der letztbezeichneten Bahn dieses Kreislaufs zu motorischer Arbeit vermittels der Wasserräder auf Grund des ihm von jener Erdattraction ertheilten Gewichts, oder auf Grund der von dieser Naturkraft ihm eingepprägten sogenannten „lebendigen Kraft“, oder endlich auf Grund der von letzterer Kraft herrührenden Stoßwirkung ausgenutzt.

Durch die erstere dieser Arten der Ausnützung kann doppelt so viel Wirkung oder mechanische Arbeit erhalten werden als durch die letztere, sofern dem in der Technik üblichen Gebrauche gemäß angenommen

wird, daß die volle ausnützbarere Wirkung in der That aus dem Gewichte der herabfallenden Wassermasse und der Fallhöhe, dem „drückenden“ gleichkomme. Man ist daher bemüht, die Räderart zu construiren, daß das Wasser die vollständige hindurch vermöge seines Gewichtes werde oder daß seine volle lebendige Kraft zur Ausnützung gelange. Steht jedoch der Bau einer vollkommenen Construction erreichbare Gewinnung nicht in Verhältniß zu dem durch die Vollkommenung bedingten Mehraufwande, so man die einfachere Bauart vor.

Wie Taf. 22 vor Augen legt, bestehen die Wasserräder aus Radkränzen, welche durch ihren Theilchen durch Rosetten mit in Lagern drehbar in Umdrehung zu versetzenden Achsen verbunden sind.

Die Radkränze sind entweder mit zellenartig aneinandergesetzten Bestandtheilen versehen, welche man in einigen Arten von Maschinen, aus Mauerwerk, Zimmerung oder dergleichen Gerinnen und Kröpfen theilweise anwendet.

Die Bauart im besondern ist von dem Material abhängig, welches Holz, Eisen oder ein Gemisch von allen dreien sein kann. Die Construction dagegen wird meistens die Höhenlage des Einlaufspunktes für das Wasser bedingt.

In dieser Hinsicht zeigt Fig. 1 ein Rad, in welchem das Wasser oben einläuft oder oben einströmt und welches daher ein oberflächliges Rad wird, oder welches vom Wasser oben angetrieben wird und demnach oberflächliges Rad ist.

Fig. 2 stellt ein rüdenschlächliges Rad dar, welches die Bezeichnung, weil das Rad ein dreiviertel Hebe zwischen Kopf- und Fuß im Räder desselben aufschlägt.

Das in Fig. 4 abgebildete, etwa in der Mitte der Höhe beaufschlagte Rad wird mittelst oder mittelschlagig genannt, und Fig. 5 unterflächliges Rad.

An allen diesen Rädern kommen jedoch verschiedene und bauliche, auf die Benennung überde Besonderheiten vor.

Fig. 1 ist ganz aus Eisen gebaut und der schmiedeeisernen Achse A, welche in einem im Mauerwerk verankerten Lager B trägt, an welcher die eisernen Räder befestigt sind. Es besteht ferner aus den in der Zeichnung gehörigen Diagonalfangen, wie C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, aus einer größern Anzahl von bleibernen Schaufeln, welche zwischen den Rädern und dem Radboden derartig angebracht sind, daß sie lauter zellenartige Räume für die Aufnahme des Wassers bilden, und endlich daß auf der rechten Seite einen Zahntranz, durch den das kleine Getriebe M eingreifen und die Bewegung auf die Welle M N fortsetzen.

Auch das in Fig. 2 abgebildete rüdenschlächlige Rad ist völlig aus Eisen gebaut, hat aber keine Achse, sondern statt deren einen Kranz von Suspensionstangen, welche mit den bleibernen Rosetten und den gußeisernen Rosetten verbunden sind. In Fig. 3 separat im Durchschnitt dargestellt, zeigt die rechte Hand an dem rüdenschlächliges Rad rechts herum greift in die Rädertransmission. Ueber dem links

den Einlaufgerinne ist eine kleine mechanische Vorrichtung, im wesentlichen ein Centrifugalregulator mit Schieber, sichtbar, mittels dessen die Stellung des Schieber und somit der Zufluss des Wassers und die Geschwindigkeit des Rades selbstthätig regulirt wird. Die nebengezeichnete menschliche Figur soll eine Vorrichtung von der Größe dieses Rades geben, welches in Betrieb einer Baumwollspinnerei zu Greenock in Schottland aufgestellt, in der That den enormen Durchmesser von über 21 Meter für ein Gefälle von 19/2 Fuß hat und nur wenig kleiner ist als die größten Wasserräder der Welt.

In dem in Fig. 4 abgebildeten, ganz aus Gußeisen gefertigten, jedoch mit hölzernen, quer über die Umfangs hervorstachenden Gußeisen gelegten Schaufel versehenen Rade ist das Kropfgerinne oder Kropf der Kropf A B C erwähnenswerth, mit welchem man einen Theil des Radumfangs umgibt, das das Wasser in den Schaufelräumen möglichst lange verweilen lässt. Ein solcher Kropf wird fast nie bei unterschlägigen, wohl aber schon bei kleinen rückschlägigen und stets unterschlägigen Rädern angeordnet und entweder aus Holz gegumirt oder aus Eisen construiert oder auch gemauert. Der mittels einer Zahnstange D bewegliche Schieber S, welcher unten mit einem um einen Fixpunkt drehbaren Stange befestigt wird Spannschrauben genannt, und daher heißt das Rad ein unterschlägiges Kropfrad mit Spannschraubenlauf.

Anstatt das Wasser zwischen dem abgerundeten Kropfgerinne und einer Spannschraube einlaufen zu lassen, wendet man auch Schieber an, welche das Wasser aus dem Boden des Einlaufs abschließen und sich wegziehen oder wegfällen lassen; dieselben werden Ueberfallschrauben genannt. Mit einem solchen Schieber ist das in Fig. 5 abgebildete Rad versehen, welches eine der Fig. 4 sehr ähnliche Bauart hat, jedoch hölzerne, in gußeisernen Kassetten stehende und einen hölzernen Radboden hat und außerdem, wie Fig. 2, mit einem mittels Centrifugalkraft gehaltenen Zahntranz versehen ist.

Die unterschlägigen Räder haben im allgemeinen äußere Aussehen des in Fig. 4 dargestellten unterschlägigen, nur erscheint der Kropf sehr zusammengekrümmt oder ist ganz in Wegfall gekommen, in welchem Falle das Gerinne ein Schnurgerinne genannt wird, und das Rad eine hierauf bezügliche Zeichnung erhält.

Das in Fig. 6 abgebildete unterschlägige Rad ist ganz besonderer Art, nämlich das nach seinem Erfinder benannte Poncellet-Rad. Es hat, überhaupt aus Eisen hergestellt, gekrümmte Blechschaufeln, in solcher Construction, dass mit Hilfe des Spannschraubens das Wasser fast seine ganze lebendige Kraft auf dieselben abgeben muss. Die in dem unteren Theile des Radmittels dargestellten Theile gezeichneten Constructionslinien sollen die diesbezügliche Wirkungsweise anschaulich machen.

Eine ebenfalls erst aus der jüngsten Erfindungszeit stammende, jedoch für größere Gefälle bestimmte Konstruktion ist das in Fig. 8 dargestellte Rad von Pinner, welches aus nur einem einzigen Kranz und aus diesem einer oberbeiderseits befestigten langgestreckten Blechschaufeln besteht, jedoch von oben bis unten von einem Mantel D E F G H K umschlossen wird. Der Mantel, welcher übrigens das Wasser auch während der Füllung der Schaufeln so lange, bis diese ihre tiefste Lage G erreicht haben, weshalb ein sehr hoher Ausnützungsgrad oder Wirkungsgrad erzielt wird.

Auch das in Fig. 7 abgebildete Rad von Sagebien sucht die Wasserkraft völliger dadurch auszunutzen, dass es die ganze dem Wasser inneohnende lebendige Kraft aufnimmt, beziehentlich das Wasser ohne Gefälleverlust, d. h. ohne Senkung des Wasserspiegels einfließen lässt.

Die bekanntere Construction von Sagebien hat mehr äußere Ähnlichkeit mit dem Poncellet-Rade (Fig. 6), lässt das Wasser aber nicht unter einem Spannschrauben, sondern über einem Ueberfallschrauben einlaufen. Da diese Construction in vielen Fällen die Anwendung sehr großer Raddurchmesser, also sehr hoher und demnach theurer Räder, nöthig macht, so hat derselbe Erfinder das hier abgebildete, unter sonst gleichen Umständen mit geringerem Durchmesser ausführbare Rad erdacht. Freilich wird dasselbe wiederum kostspielig durch seine complicirte Bauart.

Wie der zu unterst dargestellte Grundriss zeigt, fließt das Wasser, auflaufend wie gewöhnlich am äußeren Umfang, an den beiden Seiten des Rades zu. Zur Erreichung dieses Zwecks mussten die Schaufeln eine eigenthümliche und nicht billig herzustellende Construction erhalten, durch welche jedoch der bereits angeordnete Vortheil erreicht wird. Eine Vorstellung von dieser Schaufelung erhält man durch Betrachtung auch der Aufsichtzeichnung, in welcher der vordere Theil des Einlaufgerinnes im Querschnitt dargestellt ist. Uebrigens lässt sich eine einseitige oder beiderseitige Neufällung durch Oeffnung nur des einen oder aller beider in der Gabelung des Einlaufkanals angebrachten Schieber nach Belieben erreichen.

Als Ersatz für die Schiffsmühlenträder, welche, auf zwei geankerten Rähnen gelagert, mit ihren Schaufeln zum Eintauchen in den Stromtrich eines Flusses gebracht werden, hat Professor Colladon in Genf eine in Fig. 9 abgebildete Construction erfunden, welche man das schwimmende Rad oder kurz das Schwimmrad nennen kann. Der eigentliche Radkörper ist weiter nichts als ein äußerlich mit Schaufeln versehener Kessel aus Blech, welcher vermöge seines Hohlseins schwimmt und vermöge seiner Schaufelung dem fließenden Wasser in Umdrehung versetzt wird. Allein noch besonders beachtenswerth ist die Art der Lagerung dieses Radkörpers und die Verbindung desselben mit der Transmissionswelle. An einem aus Balken gegummerten und im Grunde des Flusses befestigten Gerüste ist nämlich die Lagerung für die nach dem Ufer geleitete Transmissionswelle angebracht, und in der Höhenrichtung dieser Welle sind auch fixe Drehpunkte für zwei gußeiserne Träger angeordnet, zwischen und an welchem der kesselartige Radkörper ebenso wie eine derselben mit der Transmissionswelle verbindende Zahnradübertragung angeordnet ist. Es lässt sich nach dieser Beschreibung ersehen, dass der schwimmende Radkörper den Schwankungen des Wasserstandes folgen wird, ohne dass die Unveränderlichkeit der Lage der Transmissionswelle hierdurch eine Beeinträchtigung erleidet. Uebrigens aber ist noch zu erwähnen, dass der Erfinder unter dem Rade ein ebenfalls schwimmendes Gerinne angebracht hat, und dass sowohl hierdurch, als durch das Eintauchen des Radkörpers eine Verminderung des Flussquerschnittes, demnach eine Vergrößerung der Geschwindigkeit des Wassers und somit ein gesteigerter Ausnützungsgrad der Wasserkraft erreicht wird.

In Fig. 14 ist die Verbindung mittels Schrauben eines eisernen Armes mit dem eisernen Kranz eines Rades dargestellt, in Fig. 10 die Verbindung eines hölzernen Armes mit dem hölzernen Kranz, sowie ferner die Verbindung der aus blechernen Stöpsel oder Sch-





en Schaufeln haben im Leitrade eine den des Laufrades entgegengesetzte Krümmung, so Wasser beim Uebertritt vom Leitrade in das, sofern letzteres festgehalten würde, in Richtung von der durch die Schaufeln des erhaltenen Richtung abgelenkt werden würde. Ister das Laufrad, dem Zwecke entsprechend, ist, so ist eine gewisse Drehgeschwindigkeit und thatsächlich herbeizuführend, bei welcher bezeichnete Weise vom Leitrade ausfließende e angenommene Richtung und Geschwindigkeit in den ersten Querschnitten des Laufrades und somit ohne Stoß überströmt. Diese mit mungen der Schaufeln in bestimmtem Zunge stehende Geschwindigkeit wird dem Rade mung des von demselben zu überwindenden Widerstandes ertheilt, wobei bemerkt r, daß jene Geschwindigkeit etwa halb so groß als usfällt, welche das völlig unbelastete und e Rad unter sonst gleichen Umständen annimmt. en, soeben beschriebenen Rädern verschiedene in Fig. 4 und 6 auf Taf. 23 abgebildet. Abbildung, einen Durchschnitt durch den r Untergraben darstellend, zeigt unten das es tellerförmigen Armsystems mit der Welle : Turbinen- oder Laufrad, aus welchem das den Untergraben D strömt. In das Innere es ragt ein gußeiserner Cylinder, der en, welcher in einen zweiten Cylinder dichtung eingepaßt ist und mittels der in erkennbaren Stangen zwischen Lauf- und f- und abgehoben werden kann, und welcher usfluß theilweise oder gänzlich unterbrechen ; zweite, äußere Cylinder ist in den aus d Bretern hergestellten Boden C mit dichte usse eingebaut, sodaß das von zwei ge- Kanalwandungen G und einer hölzernen öllig eingeschlossene und bei A eintretende r durch das Rad in den Untergraben E kann. Die in der Mitte sichtbare gußeiserne oben befestigt, trägt unten in der Höhe des den Leitapparat und umschließt die oben aus ihr herausragende Welle, welche oben aburade versehen ist und unten das Lauf- ebrigen ruht das unterste Zapfenlager ebel, welcher eine verticale Verschiebung des vornehmen läßt. auart wird Niederdruckturbine, im u der in Fig. 4 dargestellten Hochdruck- genannt, welche eine völlig geschlossene tlich auch mit hermetisch abgedichtetem Dedel gußeiserne Turbinenlammer A hat, die über graben auf dem Gebälb D ruht und ver- öhre B ihren Zufluß erhält. Diese öhre t dem höher gelegenen Untergraben oder roir, beziehentlich einem Teiche in Ver- Das zuströmende Wasser, welches für den lichtvorhandenseins des erwahnten Dedels ausfließen würde, steht daher in A unter r; deshalb die Bezeichnung Hochdruckturbine. erlich, daß die mit dem Rade G aus- e, und ebenso daß die mittels der Kurbel- o dem oben auf A sichtbaren Räderwerke Stangen des Ringschleifs in dem be- dedel Stopfbüchsen erhalten.

erikanische oder Francis-Turbinen.

aß das Leitrad innerlich und das Laufrad ebracht wird, kann auch die umgekehrte getroffen werden.

Construktionen dieser Art nennt man wol Francis-Turbinen, nach einem Amerikaner, welcher sich mit der experimentellen Untersuchung und der Vervollkommnung derselben viel beschäftigt hat. Auch werden sie amerikanische und von außen beaufschlagte Turbinen genannt, in welchem Falle die bis jetzt geschilderten Räder von Segner, Mannbury-d'Etot, Cabiat und Joumeyron die gegensätzliche Bezeichnung der von innen beaufschlagten Räder erhalten.

Francis- oder amerikanische Turbinen sind auf Taf. 23 in Fig. 1, 3, 7, 12, 13 und 14 in verschiedenen Formen, jedoch keineswegs bezüglich der Aeußerlichkeit und des Nebensächlichen in der Francis'schen Originalform dargestellt.

In Fig. 7, welche eine Abbildung mit vielfach, be- hufs Verstatung eines Einblis in das Innere, weg- gedachten Bestandtheilen vor Augen legt, ist A das in Wirklichkeit völlig geschlossene Zuflußrohr von recht- edigem Querschnitt, B das Laufrad mit den Schaufeln D, D, D, der Welle C und den Armen c, c, c; endlich sind a, a, a die Schaufeln des feststehenden Leitrades. Das Wasser fließt in der Richtung der eingezeichneten Pfeile in dem spiralförmig sich verjüngenden Einlaufe um das Leitrad herum, woher die Bezeichnung Spiral-Turbine.

Ebenso ist in Fig. 3 A das Laufrad mit den Schaufeln B und der Welle J, C der Einlaufkanal und D ein Theil des Leitrades.

In Fig. 1 fehlt der Leitapparat, wie bei der Cabiat'schen Turbine. Die Pfeile deuten die Einlaufrichtung des Wassers an. Das Laufrad D mit den Armen C, den Schaufeln E und der Welle A, sowie die duseu- artige, eiserne Radlammer G H J, und endlich die Transmissionswelle B mit der Riemenscheibe I sind leicht zu erkennen.

Die Francis-Turbine stammt übrigens von einer Construktion her, welche nach ihrem Erfinder die Hobd- Turbine, oder nach dem Bereiche ihrer ursprünglichen Anwendung United-States-Rad genannt wird.

Diese letztere war einfach aus Holz hergestellt und hatte nicht gekrümmte, sondern ebene Leit- und Radschaufeln. Eine aus Eisen hergestellte Verbesserung zeigen die Figuren 12, 13 und 14 auf Taf. 23.

In Fig. 12 ist der mit ebenen Schaufeln versehene Leitapparat abgebildet, in Fig. 13 das mit gekrümmten Schaufeln versehene Laufrad mit dem Dedel des Radlastens und in Fig. 14 die Einfügung des Leitrades in den Radlasten ober das Gehäuse.

Fig. 8 auf Taf. 23 zeigt gewissermaßen eine Combination einer von außen und von innen beaufschlagten Turbine, indem das bei C' in das Gehäuse C C' fließende Wasser äußerlich in das Leitrad eintritt, jedoch innerlich in das unten sichtbare Laufrad gelangt, durch welche Anordnung es möglich ist, den mittels der Stangen K zu hebenden und zu senkenden (hier zum Theil abgebrochen dargestellten) Ring- oder Perspectivschüß J äußerlich am Leitrade anzubringen.

#### e. Genschel'sche Turbinen.

Während alle die bisher beschriebenen Formen aus dem Segner'schen Reaktionsrade sich herleiten lassen, bildet das Euler'sche Rad den Urtypus für ein Constructions-system, welches die in Fig. 10 auf Taf. 24 im Verticalschnitt dargestellte Schaufelung hat. Das Wasser fließt hier nicht, wie durch Fig. 12 veranschaulicht, horizontal, sondern vertical durch Leit- und Laufrad.

Euler, übrigens auch der erste, welcher Leit- und Laufräder ober Leit- und Laufröhren, wenigstens in ungenügender Anordnung eingeführt, hat zuerst dem Wasser den soeben bezeichneten verticalen Weg, nach Zurücklegung dessen

es übrigens ebenfalls nahezu horizontal austritt, durch entsprechende Bauart des Rades vorgeschrieben.

Sein Rad war indessen unvollkommen construirt, indem es, wie die Segner'sche Turbine, nur aus einzelnen krummen Röhren, anstatt aus einer Anzahl eng aneinander geschlossener Kanäle bestand, wodurch es die in Fig. 6 auf Taf. 24 veranschaulichte Gestalt annimmt, nämlich aus zwei Kränzen mit dazwischen angebrachten krummen Schaufeln besteht.

Diese verbesserte und heutzutage lediglich angewendete Constructionsform hat zufolge der historischen Forschungen Rühlmann's zuerst Henschel in Cassel (1837) und nicht nach französischen Angaben Fontaine (1840) eingeführt.

Dem Lesern kann vielmehr nur die Anbringung der in Fig. 10 dargestellten, jeden einzelnen Leitschaufelraum abschließen lassenden Schützen als Erfindung zugebilligt werden, wovon später noch die Rede sein wird.

Nach dem Henschel'schen oder fälschlich sogenannten Fontaine'schen, beziehentlich noch fälschlicher sogenannten, weil noch später erfundenen Callon'schen Constructionsysteme sind die in Fig. 4, 5, 6 und 7 auf Taf. 24 abgebildeten Turbinen gebaut. Hiervon ist Fig. 5 die üblichste Bauart, im besondern derartig von Veder ausgeführt. Auf dem Fundamente A steht mit den Fläken B der Turbinenmantel. In demselben, sowie im Boden des im Durchschnitt dargestellten Radlastens aus Holz ist das gußeiserne Leitrad F mit wasserdichtem Abflusse eingebaut. Dasselbe besteht in diesem besondern Falle aus drei ineinanderliegenden, jedoch aus einem einzigen Stücke gegossenen Rädern, von denen jedes eine dem in Fig. 6 dargestellten Laufrade ähnliche Gestalt hat. Dicht unter diesen Rädern befinden sich drei ebenfalls in einem einzigen Stücke gegossene Laufräder, deren Schaufeln jedoch nach Maßgabe der Fig. 10 entgegengesetzt denen der Leiträder gekrümmt sind. Selbstverständlich ist das Laufrad mit der in der Mitte sichtbaren und wasserdicht bei h durch den obern Keller des Leitrades gehenden Welle mittels eines Armsystems verbunden; jedoch besteht diese Welle aus einer Röhre, welche oben auf dem vom Fundamente bis dicht unter die Zahnräder verlängerten Stützpfosten hängt und die Zahnräder K und L treibt. Der innere Ring des dreifachen oder dreiringsigen Leitrades ist mit Verschlussklappen und der mittlere Ring mit einem vollen ringförmigen Schützen N versehen, welcher durch den Mechanismus O, P, S, Q bewegt werden kann. Der äußere Ring bleibt stets geöffnet, die beiden innern werden jedoch nur nach Maßgabe des größern Effectbedürfnisses oder des geringern Wassermangels aufgemacht. Die Richtung des zu- und abfließenden Wassers ist durch Pfeile angegeben.

Fig. 4 stellt eine sehr ähnliche Constructionsform mit eisernem Radgehäuse dar. Man sieht vorn den Droffelschützen A im Einlaufe des Radlastens und erhält durch die Wegnahme der Seitenwand B einen Blick auf das in Innern befindliche Leitrad. Das Radgehäuse ist, wie in Fig. 4 auf Taf. 23, mit einem Dedel verschlossen, welcher eine Stopfbüchse zum Abdichten der hindurchgehenden Welle enthält. Der Grund hiervon liegt in der Voransetzung, daß das Wasser von einem höher gelegenen Reservoir zugeleitet werde. Diese Construction ist daher eine Hochdruckturbine.

Zu Fig. 7 auf Taf. 24 ist ein Leitrad nicht vorhanden, sondern das in Fig. 6 separat dargestellte Laufrad befindet sich unmittelbar unter dem Einlaufgehäuse, welches schneckenhausartig hergestellt ist und dieser Construction daher die übrigens bedeutungslose Bezeichnung Schneckenhaus-Turbine ertheilt hat.

Die Henschel'sche Construction der Erfindung von Turbinen Anlaß gegeben, nach gestreckte schraubenförmige Schaufeln, wie auf Taf. 24, haben, oder welche, wie auf Taf. 23, aus einer vollen Schraube bestehen.

Allein ein hervorragender Schmeidler hat Henschel's Erfindung ist noch derjenige, welcher die französischen Schriftsteller Veranlassung gegeben, der Erfindung desselben einen überaus hohen Stellenwert zu verleihen und danach ein ganzes Turbinen-Bezeichnungssystem, oder Journal der Turbinen zu belegen — nämlich der Henschel oder der Schläger.

In Fig. 5 auf Taf. 23 ist hiervon ein Beispiel gegeben.

Man sieht hier zwei Hochdruckturbinen nebeneinander stehen und aus Stopfbüchsen herausragenden Wellen, welche auf eine oben in der Mitte befindliche Wellenwelle mittels Zahnräder (Stützräder) als zwei schwache Löcher stellen sich der Einlaufsrobre dar; unmittelbar unter derselben befinden sich die Leit- und Laufräder, und über dem das Rad umschließende Mantel bis zu graben fort, sodas er die Gestalt eines Henschel'schen, und zu derselben Zeit, wo die Turbine bereits eine herzoglich brandenburgische Schleiferei in Holzminde trieb, nach „von doppelter Wirkung“, und in der That gesagt werden, daß sie sowohl drücken als wirken, indem das unter dem Rade in die fließende Wasser ebenso wol, wie das in der stehende den beabsichtigten Effect bewirkt, nämlich, daß es wegen der Wirkung des Atmosphärendrucks als völlig gleichgültig an welcher Stelle der 10 Mt. über dem dem atmosphärischen Drucke in einem abgeschlossenen Rohre gebobenen Wasserstande einrad angebracht wird. Allein die Erfindung ist im höchsten Grade von so, sodas der Name Henschel, namentlich die von Prof. Rühlmann nachgemachte Bezeichnung desselben seitens der französischen Fontaine und Jonval mit Betonung zu werden verdient.

Aus den Rädern Journeynon's und hinsichtlich deren Anbringung und Verhältniß zu der Zuleitung des Wassers, in Schützenform u. s. w. in der allerersten Geschichte der Erfindungen so viel angewachsen, daß die in Betreff solcher nach den Gesetzen der Combinationen befindenden Gestaltungen fast erschöpfend Turbinen, Räder mit horizontalen oder Wellen, von oben, von der Seite, auf Taf. 23, von unten beaufschlagt, zu Verbesserungen der Details versehen, zu Zeit entstanden.

#### 1. Girard'sche Turbinen

In dieser Beziehung sei der auf Taf. 23 dargestellten Heberturbine und der auf Taf. 23 abgebildeten hydropneumatischen von Girard Erwähnung gemacht. Einrichtung der erstern stimmt mit der bis auf die Hydropneumatikation des Das hebertförmig gebogene Rad



acht, damit, trotz sehr geringer Gefällshöhe, ein ständiges, von Wirbelbewegungen freies Einsinken abwärts in das Rad von statten gehen möge.

Sydropneumatikern besteht in einem von dem selbst mittels angehängter Pumpe bewirkten Einströmen von Luft in einen Raum (Fig. 9), welcher durch sich abschließende Ummantelung des Turbinengebildes ist, und hat den Zweck, ein Niedersteigen des Wasserspiegels unter das Rad zu bewirken, andernfalls im Unterwasser waten und hierdurch das stattfindende Reibungswiderstandes in seiner Wirkung gehemmt werden würde. Auch soll, und wesentlich, eine auf Verminderung des hindernissen Erscheinung bezogen werden, welche in 10 und 11 auf Taf. 24 veranschaulicht ist. Sieht hier, daß für den Fall des partiellen Gefälles ein bereits früher erwähneter Einzelteil ein unruhiges, Wirbelbewegungen und demselben Verluste mit sich bringendes Hindurchfließen bewirkt durch die Nachschaukelräume plagt, welche in Fig. 11 erkennbar, im Laufe an den Oeffnungen kann aus dem erwähnten pneumatischen Mantel comprimirt Luft in die Schaufelrinnen und jene Wirbelbewegungen niederdrückt. Und ferner werden durch die Pneumatisation gen Effectsverluste im Keime erstirbt, welche durch die dieselbe stattfindende Eindringen des Unterwassers in die völlig abgeköhlten und demnach leeren Räume entstehen würden.

#### Partialturbinen und Tangentialräder.

Die sehr kleine, in St.-Blasen aufgestellte nach Joumeyron'schem System beschriebene, daß dieselbe nicht mehr als 31 Cmt. äußeren 10 Cmt. innern Durchmesser hatte und trotzdem Effect von 47 Pferdestärken lieferte. Freilich ist auf dieselbe einwirkende Gefällshöhe nicht gerade 108 Mt., während die Aufschlagwasserhöhe 10 Mt. in der Secunde betrug, und das enorme Geschwindigkeitsvermögen von 2300 Umdrehungen in der Minute annahm.

so sehr großen, aus einer bedeutenden Gefällshöhe resultirenden Geschwindigkeiten werden die Zapfen beträchtlichen Abnutzungseinwirkung ausgesetzt, entschließt sich daher in solchen Fällen, die Turbinen nicht voll zu beaufschlagen, nicht als Vollturbinen zu construiren, sondern, indem man dem einen bei weitem größern Durchmesser gibt und die Umdrehungsgeschwindigkeit abmindert, nur partielle Beaufschlagung stattfinden zu lassen und ab daher als eine sogenannte Partialturbine construiren.

in diesem Falle die Turbine dem Joumeyron'schen und noch mehr, wenn sie dem Francis'schen (wie Fig. 7 auf Tafel 23) angehöret, wird solche Partialturbine, wegen des alsdann stattfindenden innern oder äußeren tangentialen Herausströmens des Wasserstrahls an den Radumfang, auch tangential genannt.

Fig. 11 auf Taf. 23 und in Fig. 3 auf Taf. 24 die Tangentialräder oder Partialturbinen abgezeichnet. Die äußere dieser Turbinen hat ein nach Joumeyron'schem System construirtes, mit dem Schaufelwerk versehenes Laufrad F, welches die Welle N und an demselben O, D, C und E bewegt. Dasselbe wird nur an der Stelle h beaufschlagt von dem Wasser, welches in dem vertikalen, durch das obere A geführte Rohr F herbeigeleitet wird. Der Ventils K h läßt das Zuflußquantum regeln.

3 auf Taf. 24 (im Durchschnitt dargestellt) bezeugen aus zwei nach Girard'schem Systeme

construirten Rädern, welche an ihren tiefsten Punkten beaufschlagt werden. Diese Abbildung zeigt demnach ein Beispiel von einer Doppelturbine und ebenfalls ein solches von der vertikalen Aufstellung des Rades, also von der horizontalen Anordnung der Welle.

#### h. Details.

Besonders wichtig für die Turbine ist die Construction der Zapfen. Die letztgenannten Arten mit horizontalen Wellen können ohne Schwierigkeit mit Zapfen versehen werden, welche die Construction der üblichen Transmissionszapfen erhalten und keinen ungünstigeren Einwirkungen, als diese, ausgesetzt werden. Bei den andern Turbinenarten muß jedoch der Zapfen unter Wasser laufen und ist alsdann dem Eindringen von mitgeführtem Sande und hierdurch einer kräftig wirkenden Abnutzungsurache preisgegeben, namentlich da er auch schwer zugänglich ist. Um ihn in dieser Beziehung zu schützen, um ihn mittels des Schmieröls waschen zu können und um auch im Stande zu sein, ein genaues Einstellen in die Achsenrichtung der Welle zu bewirken, hat man demselben außerordentlich viele verschiedene Constructionen und innere Einrichtungen gegeben, von denen die Fig. 13 bis 20 auf Taf. 24 einige Beispiele darbieten.

Auch hat man den Zapfen aus dem Wasser zu entfernen und durch besondere Einrichtungen ihn über Wasser anzuordnen, also ihn dem Wirkungsstreife jener Abnutzungsurachen zu entziehen verstanden. In dieser Beziehung legen schon die Abbildungen 2, 6 und 9 auf Taf. 23, sowie 2, 5, 6 und 7 auf Taf. 24 Beispiele vor Augen. Allein in Fig. 15 und 16 auf Taf. 23 ist noch besonders in zwei unter rechtem Winkel genommenen Durchschnitten eine solche über Wasser angebrachte Zapfeneinrichtung dargestellt, bei welcher eine hohle Turbinenwelle und eine in derselben angebrachte feststehende, vom Unterwasser bis über Oberwasser reichende Zapfenspinde angewendet ist. Ferner zeigt auch Fig. 16 auf Taf. 24 eine solche über Wasser angebrachte, mit hohler Welle, darauf befestigtem Zahnrade (hier bruchstückweise dargestellt) und langer Zapfenspinde versehene Construction. Und Fig. 17 und 18 stellen im Grund- und Aufsicht einen über Wasser angebrachten Zapfen mit drei, den Reibungswiderstand abmindernden Antifrictionrädern dar.

#### Wasserdruckmotoren.

(Tafel 24.)

Die Construction der Druckpumpe kann zur Herstellung einer Betriebsmaschine verwendet, diese Transportmaschine kann in eine motorische Maschine umgewandelt werden, und zwar einfach durch Umkehrung der Wirkungsweise. Anstatt daß der Kolben mittels einer motorischen Kraft hin- und herbewegt wird und hierdurch das Druckventil gehoben und das Wasser in eine nach aufwärts geführte Rohrleitung gedrückt wird, kann umgekehrt das Druckventil mittels einer äußeren Kraft gehoben und somit der Kolben durch den Druck des Wassers hin- und herbewegt werden, sofern nach jedem Hube des Kolbens und jedem Gefältssein des Cylinders mittels Oeffnens des Saugventils die Füllung des Cylinders abgelassen wird. Das Wasser tritt in diesem Falle nicht als transportirt Object, nicht als bewegte Masse, sondern als motorische Substanz, als bewogener Körper auf; es wird nicht mit Aufwand von motorischer Kraft gehoben, sondern sinkt wieder unter Hervorbringung von mechanischer Arbeit.

Die nach diesem geschilderten Principe construirten Maschinen werden Wasserfäulenmaschinen ge-

nannt. Ihre Construction unterscheidet sich von derjenigen der Kolbenpumpen im wesentlichen durch Mechanismen, mittels welcher das angezeichnete Oeffnen und Schließen der Ventile selbstthätig vermöge des Ganges der Maschine bewirkt wird, d. h. durch die sogenannte äußere Steuerung, sowie durch Vorrichtungen, welche zweckentsprechender, als es mittels der Ventile möglich ist, das bezeichnete Ein- und Auslassen, den angezeichneten Zu- und Abfluß des Wassers regeln lassen, d. h. durch die sogenannte innere Steuerung.

Im Jahre 1749 von Höll in Ungarn und ziemlich gleichzeitig, nämlich 1753, von Winterschmidt in Deutschland (Harz) erfunden, und erst später (1765), wenn auch wahrscheinlich selbständig, von Westgarth in England nachgefunden, jedoch völlig zweckentsprechend und vollendet erst 1809 vom Salinenrath v. Reichenbach in Baiern construiert, sind die Wasserfäulenmaschinen fast ausschließlich für Zwecke des Bergwesens in Gebrauch gekommen und geblieben.

Die enge Begrenzung dieser Wirkungssphäre rührt einerseits von der an die Zweckmäßigkeit der Wasserfäulenmaschinen geknüpften Bedingung des Vorhandenseins sehr bedeutender Gefälle und andererseits davon her, daß meistens eine rotirende Bewegung gefordert wird, während die Wasserfäulenmaschine eine alternirende und zwar eine so langsam alternirende Bewegung abgibt, daß zur Uebertragung derselben in eine rotirende eine sehr bedeutende Uebersetzung, also ein kostspieliger und Reibungsverluste verursachender Zwischenmechanismus angeordnet werden mußte.

Die neuerdings mehr und mehr sich verbreitenden vervollkommenen städtischen Wasserwerke oder Wasserversorgungsanstalten, mittels deren das Nutzwasser bis in die obersten Stockwerke der höchstgelegenen Gebäude getrieben wird, enthalten an vielen Stellen ihrer Rohrleitungen einen Wasserdruck, welcher einem Gefälle von 30—60 Mt. und darüber gleichkommt. Hierdurch ist der Verbreitung der Wasserfäulenmaschinen ein neues Gebiet eröffnet, namentlich, wenn es gelingt, der alternirenden Kolbenbewegung eine größere Geschwindigkeit zu ertheilen und einen Mechanismus herzustellen, welcher die oben gedachte Uebersetzung in eine nicht zu langsame rotirende Bewegung mit möglichst einfachen Constructionen erreichen läßt. Diese Aufgabe zu lösen, ist dem Engländer Ramsbottom bereits geglückt. Fig. 8 und 9 auf Taf. 24 zeigt die von demselben erfundene kleine Wasserfäulenmaschine mit rotirender Bewegung, welche jedoch in dieser Form Wasserdruckmotor genannt wird.

Aus den bezeichneten Figuren ist zu erkennen, daß diese Maschine aus zwei verticalen, um eine Mittelschneidung schwingenden oder oscillirenden Cylindern besteht, welche auf eine doppelt gekrümmte, d. h. mit zwei Kurven versehene Welle wirken, dieselbe in Umbrehung versetzend.

Der in Fig. 9 dargestellte Durchschnitt zeigt im besonderen, daß diese beiden Cylindern mittels zweier Schrauben, welche in den beiden einander gegenüberstehenden Gestellböden angebracht sind, gegen ein ebenfalls mit dem Gestelle verbundenes Mittelstück gepreßt werden. Diesem Mittelstück wird (Fig. 8) das Betriebswasser zugeführt und in den an den Cylindern angebrachten Kanälen bald über, bald unter den Kolben geleitet, beziehentlich wieder abgeleitet. Der Wechsel in dieser Zu- und Ableitung, sowie Ueber- und Unterleitung, also das Steuern der Maschine, wird einfach vermittlest geeignet in dem bezeichneten Mittelstück angebrachter schiffsförmiger Oeffnungen durch die Oscillation der Cylindern selbst bewirkt.

Eine vom Ingenieur Schmidt erdachte dieser Constructionform, mit welcher der Ausnützungsgewinn auf 80 Proc. erreicht wurde, ist mit der Zeit worden, welchen im Jahre 1870 in der That für den besten, die Wasserkraft einer kleinen Leitung zu Zwecken der Kleinindustrie benutzenden hydraulischen Motor ausfindig, und 14 verschiedene, meistens turbinenartige Maschinen in Concurrenz traten.

### Prong'sches Dynamometer

Um den Effect (die Anzahl der Umdrehungen, welchen die motorischen Theile mit ihnen verbundenen Transmissionsmechanismen bebieht man sich des in Fig. 21 mit dem gebildeten Brems-Dynamometer aus einem schiefen Zaunes. Dieses Instrument erlaubt eines Motors abzuwägen, wie die Lasten eines Körpers. Dasselbe besteht aus einem Hebel E und F, welche die auf der Welle befestigte Bremscheibe umgeben. Einem Hebel oder Balken C verbunden mit seinem äußersten Ende die Wagbalken. Die Bremsbäder können mittels der Hebel gegen den Umfang der Bremscheibe so fest, daß sie sammt dem Hebel ein gewisses Reibungsgegenstandes von der Welle verfesten Welle im Kreise herumgedreht werden, sofern nicht die Wagbalken lastet würde. Durch vermehrte Belastung der Bremscheibe und durch gleichzeitiges Festhalten der Hebel in der Lage verbleibt, kann umgekehrt die Welle in Stillstände an ihrer Umbrehung werden. Die Benutzung dieses Instrumentes ist durch, daß so lange mehr und mehr die Wagbalken gelegt und die Schrauben stärker und stärker angezogen werden, bei horizontal bleibender Stellung die gewünschte oder einem gewissen Grade der Anzahl von Umbrehungen macht. Die Belastung der Welle und der beobachteten Umbrehungen läßt sich alsdann der Effect an die Welle abgelesene Effect berechnen nach der einfachen Formel

$$E = \frac{L}{716} \cdot n \cdot G$$

sofern L die in der Figur angegebene Länge des Hebels in Meter, G das aufgelegte Gewicht und n die Anzahl der Umbrehungen in der Minute bedeutet, und sofern die angegebene Tarirung stattgefunden hat.

Um das Mitgenommenwerden der Welle zu vermeiden, werden dieselben zu den festen Balken 1, 1 angebracht, um den Reibungsgegenstand verursachen. Namentlich das Anbrengen der Bremsbäder, wird mittels eines Trichters auf den Umfang der Bremscheibe

### Windräder.

(Tafel 25.)

Die am meisten durch ihre Anwendung der Windmühlen bekannten Windräder sind die von dem 11. Jahrhundert mit einer Welle vereinigten Flächen, welche durch die Kraft des Windes aufzunehmen und in Umbrehung versetzen.

ei den gewöhnlichen, unsern Blick meistens sich richtenden Windmühlen heißen jene Flächen des Rades die Flügel, welche am häufigsten in Anzahl von 4 oder 6, jedoch ausnahmsweise von 3, 6 und sogar 12 mit dem oben, seitlich der Mühle hervorragenden Kopfe der horizontal etwas geneigt angebrachten Flügelwelle verbunden sind. Diese Windflügel bestehen je aus einer winklig zur Welle angebrachten Ruthe, aus an der letztern befestigten Scheiden oder Sprossen und aus der Bedeckung, welche aus dem Windst und aus Windthüren oder Segeltuch besteht.

aß mit der Flügelwelle ein Zahnrad oder eine Kurbel vereinigt ist, mittels welcher Organe motorische Wirkung des Windrades auf irgend eine Arbeitsmaschine transmittirt wird, ist selbständlich, und daß die Windmühlen entweder Boden-, oder Thurmwindmühlen, oder holländische Mühlen gehört nicht hierbei, da den Gegenstand der hier handelnden Besprechungen nicht die Windmühle, sondern das Windrad bildet, welches auch zum Betriebe von Pumpwerken, Stampfen und andern Transmissions- oder Arbeitsmaschinen Verwendung findet.

Übrigens ist in Fig. 15 von dem oben, das Windrad enthaltenden Theile einer Thurmwindmühle eine kleine Zeichnung gegeben. Darin bedeutet A den aus Holz Bauwerk hergestellten und die von der Welle L getriebenen Arbeitsmaschinen aufnehmenden Thurm, E die drehbare Haube, CDE die Flügelwelle, EF die zwei Theile zusammengefügter Ruthe und FG ein jeder Flügel zu dessen Unterstützung am Nabe befestigtes Spannseil.

nach eine entsprechende Neigung der erwähnten Flächen gegen die geometrische Ebene der Ruthe, ist die bedeckte Fläche eine Neigung gegen die Richtung parallel zur Flügelwelle blasenden Windes, insofern dieser Neigung vollständig sich die Umdrehung des Rades. Ohne dieselbe würde das Rad vom Winde nicht axial gerichteten Druck erhalten, wegen Vorwärtens derselben aber wird die Stoßkraft des Windes in eine parallel und eine normal zur Flügelgerichtete Componente zerlegt, und während nur erstere dieser Componenten einen axialen Druck entwirft, bewirkt die letztere eine Umdrehung.

Bei den ältern Windrädern wurde jene Neigung der Sprossen gleich groß angeordnet, bei den neueren Constructionen nimmt man sie jedoch für die der Welle entfernter liegenden Sprossen geringer, da infolge dessen die Flügelbedeckung eine windabweisende Fläche bildet. Wie überhaupt der Neigungsunterschied der Sprossen die Grundlage einer zweckmäßigen Construction ausmacht, so ist die zu jener windabweisenden führende, differente Neigung der Sprossen eine Verbesserung, und die beste Construction entsteht, durch Krümmung der Ruthe die windabweisende nochmals gekrümmt und zwar hohl hergestellt.

aus konstruirten derartigen Rädern kann man eine Leistung von etwa

$$= \frac{F \cdot v^3}{2800} \text{ Pferdestärken}$$

erlangen, sofern F die gesammte bedeckte Flügelfläche die secundäre Geschwindigkeit des Windes ist, denn beide Größen in Metermaß ausgedrückt. Hatte z. B. ein Rad 5 Flügel von je 10 Mt. und 2 Mt. mittlerer Breite, so würde dasselbe bei einer Windgeschwindigkeit von 6 Mt. einen Effect von einer Leistung von

$$= \frac{5 \cdot 10 \cdot 2 \cdot 6^3}{2800} = 7, \text{ Pferdestärken}$$

ausüben.

Diese Berechnung ist jedoch nur richtig, wenn die Umdrehungsgeschwindigkeit des Rades in einem gewissen günstigsten Verhältnisse zur Windgeschwindigkeit steht.

Die „kaum merkbare“ Geschwindigkeit der Luftbewegung von 1 Mt. steigert sich bis zu 20 Mt., in welchem Falle der Wind ein Orkan genannt wird, und sogar bis zu 40 Mt., in welchem Falle vom Winde Bäume entwurzelt und Gebäude niedergeworfen werden. Die den Windrädern günstigste Luftbewegung von 6—7 Mt. ist daher eine meistens nur erhoffte Erscheinung.

Da auch die zur Flügelachse parallel sein sollende Richtung des Windes veränderlich ist, so hat man Constructionen und Einrichtungen erfunden, mittels welcher trotz aller dieser Zufälligkeiten der Naturerscheinungen die Wirkung des Windrades möglichst gleich günstig und gleich groß bleibt.

Bei den gewöhnlichen Constructionen, wie sie an den ältern und meistens auch noch an den neuern Windmühlen angewendet werden, accommodirt man sich der Veränderlichkeit der Richtung des Windes durch Drehung des das Rad tragenden Gerüsts oder eines Theils desselben, und der Veränderlichkeit der Stärke des Windes durch Entfernern eines Theils der aus Brettern oder Segeltuch bestehenden Flügelbedeckung, und man verfährt somit völlig im Sinne der oben angeführten Formel, nach welcher bei gleichbleibender Leistung das Product  $F \cdot v^3$  constant erhalten, also F um so kleiner gemacht werden muß, je größer v wird.

Bei den neuern Constructionen wendet man dagegen zur Erreichung des letztern Zweckes häufiger eine Drehung der Flügel um deren Ruthe an, jedoch die vorhin als einflussreich erwähnte Neigung der Flügelfläche verändert wird.

Da es aber wirtschaftlich wichtig ist, sowohl die letztere als die erste Veränderung nicht von kostspieliger Menschenhand vornehmen lassen zu müssen, sondern die Windkraft selbst zu diesen Zwecken auszunutzen, so haben die Verbesserungsbestrebungen nach diesem Sinne hin Richtung genommen, also zielen darauf ab, die bezeichneten Constructionen selbstthätig zu machen.

Ein Blick auf Taf. 25 zeigt, daß die selbstthätige Einstellung der Flügelwelle in die jeweilige Windrichtung vermittels entweder einer großen, aus Holz, Segeltuch oder Blech hergestellten Windfahne oder eines kleinern Windrades (Fig. 12, 15) bewirkt wird, welches rechtwinklig zum großen, eigentlichen Windrade angebracht ist und auf einen Mechanismus einwirkt, der den oberen Theil des Radgerüsts in Umdrehung versetzt.

Die selbstthätige Veränderung der Flügelfläche und Flügelneigung wird dagegen durch Vorrichtungen bewirkt, von denen einige im folgenden mit Bezugnahme auf unsere Darstellungen beschrieben sind, welche allerdings in der Mehrzahl die Abbildung von Modellen und nicht von ausgeführten Rädern geben.

Fig. 1 und Fig. 2 zeigen ein auf einem Gerüst A mittels oben angebrachter Scheibe drehbares und durch die senkrecht zur Flügelebene angebrachte Windfahne in Umdrehung versetztes Windrad, dessen 4 Flügel um deren Ruthe drehbar sind. Diese letztere Drehung wird, wie Fig. 2 in vergrößertem Maßstabe zeigt, vermittels kleiner Zahnradsegmente bewirkt, welche auf den untern Enden der Ruthe angebracht sind und mit einer an allen vier Seiten verjagten quadratischen Stange in Eingriff stehen, welche in der Wellen-





richtung verschiebbar ist. Diese Zahnstange liegt in und die Flügel um deren Außenrand herum der hohl hergestellten Flügelwelle und steht mit einem Mechanismus in Verbindung, welcher von einem am Fuße des Gerüsts angebrachten Centrifugalregulator bewegt wird.

Je schneller bei stärker werdendem Winde oder bei schwächer werdendem Arbeitswiderstande das Rad sich umdreht, je schneller daher die mit der Radwelle durch Zahnräder verbundene verticale Welle I in Umdrehung versetzt wird, desto weiter werden die Kugeln des ebenfalls mit dieser Welle verbundenen Regulators auseinandergetrieben und je flacher gegen die Windrichtung werden alsdann vermittels des Zahnstangenmechanismus, welcher zum Theil auch in der hohlen Welle I angebracht ist, die Flügel gestellt. Da aber eine solche Flacherstellung die Umdrehung verlangsamt, so wird auf diese Weise eine ziemlich constant bleibende Umdrehungsgeschwindigkeit für alle Wechselfälle in der Windgeschwindigkeit entstehen und, wenn die Neigung der Flügel für eine unbedeutende Windgeschwindigkeit im Interesse eines möglichst vorteilhaften Wirkungsgrades regulirt ist, so wird auch der entwickelte Effect in allen Wechselfällen eine erwünschte Stärke annehmen. Behufs völliger Flachstellung der Flügel und hierdurch erzielter Abstellung des Windrades dient der den Regulator heben lassende Hebel K, während die Uebertragung der Wirkung auf eine Mühle, Pumpe oder Arbeitsmaschine vermittels hier nicht weiter angegebener Riemenscheiben oder Zahnräder bewirkt wird.

Eine Drehung der Flügel A um deren Sprossen B durch den Wind selbst wird auch bei der in Fig. 12 abgebildeten Constructionform vermittels eines in der hohlen Welle O angebrachten Stabes E bewirkt. Derselbe ist jedoch nicht verzahnt, sondern trägt zur Erreichung desselben Zwecks an seiner Vorderseite ein Kreuz F, an dessen Spitzen Seile G befestigt sind, welche die Eden der Flügel A ergreifen. Während die Windkraft vermöge dieses Mechanismus den Stab E in der Richtung des eingezeichneten Pfeiles zu verschieben strebt, wirkt ein auf das andere Ende von E vermittels eines Gewichtes J verschiebbarer, gekrümmter Stab H diesem Bestreben entgegen. Durch die aus dieser Wirkung und Gegenwirkung hervorgehende Gleichgewichtslage wird eine der jeweiligen Windstärke entsprechende Neigung der Flügelflächen erreicht, während das kleine Windrad L mit Zubehör die Einstellung in die Windrichtung, und das sonstige Räderpaar D und K die Fortpflanzung des Effects vermittelt.

Das ganz aus Blech hergestellte und für die Wasserstationen (Pumpwerke) vieler hannoverscher Eisenbahnhäuse mit günstigstem Erfolg in Anwendung gebrachte Windrad Kirchweger's, welches in Fig. 17 im Durchschnitte abgebildet ist, hat eine der soeben beschriebenen Construction sehr ähnliche Einrichtung. Die Flügel sind in der Figur, welche die hohle Radwelle mit dem darin verschiebbaren, vorn mit einem Kreuz versehenen und hinten gegen einen belasteten Hebel wirkenden Stab erkennen läßt, in ihrer Flachstellung gezeichnet, und linkerhand, dicht davor, befindet sich eine Vorderansicht von der zur Befestigung der fünf Flügelruthen mit der Radwelle verbundenen gußeisernen Rosette und dem davor befindlichen vorgenannten fünfarmigen Kreuze.

Auch das in Fig. 13 und 14 abgebildete Witting'sche Windrad, welches auf dem Gestelle A und dem auf Rollen drehbaren Ringe D in den Lagern a ruht, erhält seine Regulirung durch einen in der hohlen Welle c verschiebbaren Stab d, welcher mit seinem untern Ende, wie Fig. 14 deutlich darstellt, gegen eine von den Schnuren oder Ketten f, den Leitrollen F und dem Gewichte G gehaltene Lagerung l gestützt ist,

seinem vordern Ende angebrachten Mechanismus dreht. Außerdem können durch Walzen h, h, darauf liegenden Schnuren m, r, sowie Seillaken q, q, drehbar gemacht werden.

Ein in der hohlen Flügelwelle angebracht ist ferner auch bei dem Rade von Fig. 16 die mittlern Theile zweier ansehnlicher, als regulirender Anwendung gebracht. Bei diesem Flügelbede nicht ein Holz- oder Blechsegel, sondern eine jalouseartige Blech angebracht, so daß der Verstand nicht durch Verdröhung der Flächen um die Windruthen, sondern der Einzelbestandtheile der Jalouse wird. Die stärker werdende Wirkung der Zahnstangen l, dahin, den gezeichneten Lage zu ertheilen, wird einer um eine Trommel gehängten Kette F hängende Gewicht G mittels einer Trommel verbundenen Zahnrades und Stange U durch Verschiebung des Stabes gegenentgegen wirkt und somit eine Gleichgewichtslage veranlaßt.

An Stelle des in der hohlen Raderbaren Stabes haben Brown, Dr. und Lempe an ihren in Fig. 3, 4, 11 abgebildeten Windrädern nachfolgenden Mechanismen verwendet.

Mit einer auf der Radwelle stehenden in Fig. 3 mittels Charniere M in Verbindung, welche andererseits ruthen vereinigt sind, und zwar durch mittels Hälften H, in welchen die rutschen können. Vermöge dieses ein kräftiger werdender Windstoß zu verschieben, aber hat dabei eine wirkende Kraft zu überwinden, welche und durch das daranhängende Gewicht eine Spiralfeder entwickelt wird, verschiebbaren Nabe und einer mit befestigten Hülse angebracht ist. Durch diese bewirkte momentane Verschiebung werden ferner vermöge der der gewichtigen Lager L (in Fig. 3 Maßstab dargestellt) die Segel k nach und hierdurch wird vermittels der Nuth eine Drehung der Flügelruthenänderung des Neigungswinkels veranlaßt die Einstellung des Rades gegen den mit dem drehbaren Gestelle verbundenen wird, ist sofort zu erkennen, und der Mechanismus zeigt Fig. 4 in der

Während die Centrifugalkraft zur der Regulirung des Neigungswinkels mittels des konischen Pendels directer vermittels der mit schraubenförmigen Gewichte L herangezogen zu gleichem Zwecke bei den in Fig. 8, 9 konstruirten und in Fig. 8, 9 Windrädern Verwendung vermittels selbst ist auf einer Stange C C in einer gewissen Position durch eine befestigte Spiralfeder C C gehalten. Stangen r befestigt, welche um deren Ruthen drehbaren Flügelung stehen. Die Ruthen sind in innern Ringe gelagert. Eine

Gewichte so weit, als es die Spiralfedern zuzulassen, und veranlaßt durch jene Stangen eine Drehung und Flachstellung der Flügel. Ist der durch die Windfahne bewegte Betriebsmechanismus aus einem oben auf dem festen angebrachten hohlen Zapfen und um den reitbar, welcher mit dem horizontalen Theile des Gerüsts durch eine schräge Stange und eine in Verbindung steht. Durch diesen hohlen Zapfen ist die mittels tonischer Zahnräder mit der in Eingriff stehende verticale Betriebswelle durch die Transmittirung des Effects, welche Arbeitsmaschine an ihrem Fuße die über V trägt.

Centrifugalgewichte sind außer mit den Flügeln verbunden, welche auf ein oder Hemmrad einwirken und hierdurch das um Stillstehen bringen, sobald sie sehr weit vortreten.

gehört übrigens zu Fig. 8, welche eine im Vergleich mit Fig. 10 identische Construction darstellt, von dieser letztern durch die Bauart des Gerüsts, aus Segeltuch hergestellter Windfahnen Drehgerüsts sich unterscheidet.

11 ist ebenfalls eine auf der Flügelwelle angebrachte Hülse, welche einerseits durch den äußeren Enden der Flügel und andererseits durch horizontalen und verticalen Zugstangen, den verticalen Träger umfassenden Hülse und mit einem mittels Ketten betriebenen Hebel verbunden ist. Da an den Windruthen einseitig befestigt und jederseits hergestellt sind, so erwächst verschiedene Mechanismus aus dieser Verbindung des Hebels mit der Hebelbelastung und aus dem Windresultate, welche der Flügelhülse eine zu geschwindigkeit passende Neigung ertheilt.

Es mag bemerkt werden, daß die auf der angebrachte verschiebbare Hülse gleich einem oben am Drehgerüst befestigten Mechanismus einwirkt, welcher eine selbstthätige oder Hemmung bewerkstelligt, während der ersten Gerüst angebrachte gabelartige Hebelung von der Hand bewirkt läßt. Die Betriebswelle steht in einer hohlen gusseisernen Hülse mittels eines dieselbe umschließenden vier mit dem festen hölzernen Gerüst Stangen gehalten und je nach der Windrichtung wird. Die auf diese Drehung einwirkende ist in der Abbildung fortgelassen. Gleichende Betrachtung lehrt, daß die im Vergleich mit Fig. 10 identische Construction der beschriebenen Windräder in ihrer Constructivfähigkeit mit gewissen Transportmaschinen und Luft haben. Einige Centrifugalpumpen Constructionen von Ventilatoren sind ähnlich. Zum Beispiel hat der auf Taf. 21 abgebildete Ventilator eben solche Flügel. Aber auch gewisse andere motorische haben Ähnlichkeit mit den Windrädern. Auf Taf. 24 in Fig. 6 abgebildete Turbinenmechanismus besteht, wie ein Windrad, aus einer Anzahl von Windfahnen, oder schraubenförmigen Flächen, welche in Gestalt eines einer Welle gruppiert sind. Diese Flächen bestehen aus Theilen sowohl der Turbine, als des; sie sind die Receptoren bei jenen für die Substanz des Wassers, bei diesen für die Substanz des Windes.

Es ist natürlich, daß man auf Grund solcher Betrachtungen auf die Idee der Ver-

wendung auch anderer Constructionen von Turbinen und Ventilatoren zu aerodynamischen Zwecken gelangte.

Die Constructionen der von außen beaufschlagten sogenannten Francis-Turbine, welche auf Taf. 23 in Fig. 7 dargestellt ist, gehört hierzu. Wird der Mantel dieser Turbine weggedacht, so daß nur das Lauf- und Leitrad derselben übrigbleibt, so entsteht die ungefähre Form eines in Anwendung gekommenen und hin und wieder auch jetzt noch ausgeführten Windrades. Die Radwelle wird alsdann, wie bei der genannten Turbine, vertical angeordnet und läßt in dieser Anordnung den Vortheil erreichen, daß das Rad nicht gegen die Windrichtung gestellt zu werden braucht und somit einer Windfahne mit zugehörigen Mechanismen entbehren kann. Von welcher Richtung der Wind auch zufließen mag, immer wird eine Hälfte des Rades von demselben getroffen werden, jedenfalls werden die auf der einen Hälfte dieser Hälfte befindlichen Leiterschalen demselben dem Lauffrade zuführen, während die auf der andern Hälfte dieser Hälfte angebrachten Leiterschalen ihn ablenken und ihn an einer Nebenwelle Beeinflussung der Drehung verhindern werden.

Solche mit verticalen Wellen construirte Räder werden horizontale Windräder genannt, weil deren Räder in einer horizontalen Ebene sich umdrehen.

Auf Taf. 25, Fig. 6, 7 sind zwei andere Constructionen solcher Horizontalräder abgebildet.

Die auf der verticalen Welle B in Figur 6 mittels der Nabe D befestigten Ruthen oder Radarme E, welche von den ebenfalls an der genannten Welle befestigten Zugstangen G gehalten und durch die Stangen H versteift werden, tragen an ihren äußersten Enden die vier Rahmen F, welche die Lagerung für geträgerte und die Flügel G aufnehmende Wellen I bilden. Würden diese Rahmen einfach mit Segeltuch überspannt sein, so würde der zufließende Wind gegen diejenigen Flügelflächen, welche auf dem Wege ihrer Umdrehung demselben entgegenbewegt werden müssen, offenbar ebenso heftig stoßen, als gegen diejenigen dieser Flächen, welche derselbe bewegen soll, und die Folge davon würde der Stillstand des Rades sein. Es muß daher ein Mechanismus angeordnet werden, welcher bewirkt, daß der in der Richtung des Windes zu bewegende Flügel dem Windstoße seine volle Fläche darbietet, und daß der in der entgegengesetzten Richtung zu bewegende Flügel diesem Windstoße eine möglichst geringe Fläche preisgibt. Ein solcher Mechanismus ist durch die Schnüre J gebildet, welche an den Flügeln G befestigt, durch die Gewichte W belastet und über Rollen geleitet sind, welche an den äußeren Enden der an den Ruthen angeordneten schrägen Arme und unter der Nabe D angebracht sind. Mittels der Winde M können die Gewichte W gehoben, somit die Schnüre entlastet und die Flügel frei gemacht und zum Stillstand gebracht werden, eine Wirkung, welche auch durch eine sehr heftige, die Flügel sehr flach stellende und somit die Gewichte W hebende Windströmung erreicht wird.

Im Vergleich mit den früher beschriebenen verticalen Windrädern hat diese Construction der Figur 6 offenbar die Vereinfachung, daß außer dem Windfahnenmechanismus auch die horizontale, mittels tonischer Räder mit der verticalen Betriebswelle verbundene Flügelwelle in Wegfall kommt, indem das Windrad unmittelbar an der verticalen Betriebswelle befestigt ist, welche an ihrem Fuße behufs der Transmittirung des Effects nur mit einem Zahnrad C oder einer Riemen Scheibe ausgerüstet zu sein braucht.

Die auf Taf. 25, Fig. 7 abgebildete Constructionenform ist sogar noch einfacher, da bei ihr auch der die Flügel-





linie die Gefährlichkeit und die Billigkeit präsenswidelt.

Jeem Gesichtspunkte aus müssen die neuernonen der Dampfkesselanlagen beurtheilt werden: ist die Billigkeit nicht nur rücksichtlich des Materialverbrauchs, sondern auch hinsichtlich der gekosten und derjenigen für die Bedienung. Denn es stellt sich heraus, daß in demselben für einen gegebenen Zweck die wirthschaftliche eines Dampfkessels vergrößert wird. Abminderung des Brennmaterialverbrauchs, daß aber die Kosten für eine über gewisse hinausgehende derartige Vergrößerung von der erzielten Brennmaterialersparungen nicht zu werden.

Die allgemeine Einrichtung einer Dampfmaschine vor Augen zu legen, dient Taf. 26, Fig. 1, in Längendurchschnitt darstellt.

Die zur Hälfte mit Wasser gefüllte Kessel A, der N und dem beide verbindenden Stutzen als solcher zu erkennen. Derselbe wird gemauerten Ofen umschlossen, welcher vorn mit dem Raume O enthält und mit den Augen des Kessels und des Sieders einen Kanal, Feuerkanal, Rauchkanal, bildet, in welchen die heißen Verbrennungsproducte zunächst von vorn nach hinten, dann nach vorn und abermals von vorn nach hinten werden, um schließlich in den Schornstein die Esse P zu gelangen. Der mit U beaufschlagte Raum gehört nicht zu diesen Kanälen, sondern ist in diesem besondern Falle, von dem durch die Wölbung R getrennt, lediglich die der Flugschne aus den Kanälen.

Die Leichtung oder Bewegung der Verbrennungsproducte, der Transport derselben durch die Anlage und aus derselben hinaus, sowie der der für den Verbrennungsproceß erforderliche Luft in die Feuerungsanlage wird durch die in der bei den Transportmaschinen benutzten Weise vermittelt, kann aber auch durch eine Transportmaschine, eines Ventiler-Geläufmaschine, einer Luftpumpe (Erhafter) u. s. w. bewerkstelligt

Der Raum des Kessels zerfällt in den Wasserraum. Derjenige Theil des Kessels, welcher mit den heißen Verbrennungsproducten in Berührung gelangt, also einen bestimmten Umfang der Feuerkanal bildet, die Fläche genannt, und zwar directe und Heizfläche, je nachdem er unmittelbar überliegt und die directe oder ausgestrahlte Wärme aufnimmt, oder entfernter vom Rauche

Im Interesse der Sicherheit gegen Explosionsgefahren gesteht dem Vorherrscher, daß die an den den Wasserraum umschließenden Kanälen des Kessels angebracht werden dürfen, in Ausnahmefällen abgewichen.

Ein Vorherrscher zu der Dampfkesselanlage ist in der Reihe von Apparaten und Vorrichtungen, welche unter den Titel der Garnitur fallen.

Die Thür und der Koff O, sowie der behufs Reinigung und der innerlichen Reinigungs-vorrichtungen angebrachte Manoschbedel D, die Garnitur, und ebenso der Sieder oder der Kessel H, welches eine Regulierung des der einbringenden Luftmenge, beziehend-

lich ein völliges Abschließen bewirken läßt. Auch ist das Speiserohr F hinzuzugählen.

Zur Armatur, d. h. zum Hülfsmittel gegen Explosionsgefahr, gehören die Sicherheitsventile B, G und C, von denen das letztere auch als Anstellventil für das an der Stelle C abgeleitete Dampfrohr benutzt wird, und der Schwimmer I mit dem den Wasserstand äußerlich erkennbar machenden Mechanismus F.

Der Sieder oder das Siederrohr N kommt häufig gänzlich in Wegfall, wie z. B. in Fig. 18, wo nur ein einziger Cylinder A vorhanden ist. Derselbe wird nicht selten auch tiefer unter dem Kessel angebracht, wie in Fig. 10, wo die Verbrennungsgase von dem Feuerraum H aus zunächst an den mit dem Halbe N und dem Dome M versehenen Hauptkessel AB ihre Wärme abgeben, und hierauf erst mittels des Kanals K an den mit dem Speiserohre EF versehenen Sieder CD gelangen, welcher in dieser Anordnung jedoch richtiger Vorwärmer genannt wird.

Ferner bringt man das Siederrohr auch wol, wie Fig. 8 zeigt, im Innern des Kessels an, wo es alsdann gemäß seiner veränderten Wirkungsweise Feuer- oder Rauchrohr heißt. Uebrigens zeigt diese Abbildung die Art und Weise der mittels Rieten vorgenommenen Zusammenfügung der einzelnen Blechplatten, wobei noch bemerkt werden kann, daß heutzutage zu den größten Kesseln nur Eisenblech, oder hin und wieder Stahleisen und nie Kupferblech oder Gußeisen verwendet wird.

Fig. 12 zeigt die Anbringung zweier Rauch- oder Feuerrohre in ein und demselben Kessel, und gibt außerdem ein Bild von einer aus mehreren Kesseln zusammengesetzten Kesselanlage, durch Weglassung eines Theils des obern Gewölbes einen Einblick in das Innere der obern Kanäle gewährend. Die Kasse sind in diesem Falle unter den großen Kesseln angebracht; sehr häufig legt man sie jedoch auch in die Feuerrohre, in welchem Falle die Kessel Fairbairn-Kessel oder uneigentlich auch Cornwall-Kessel genannt werden; erstere Benennung nach dem Erfinder, letztere nach dem Landstriche in England, in welchem eine ähnliche Constructionsform häufig und vorzugsweise verwendet wurde.

Die Anbringung einer größeren Anzahl von Rauchrohren führt zu der Construction des Vielrohr- oder Multitubularkessels, von welchem in Fig. 2 und 6 aufrechtstehende und in Fig. 7 ein liegendes Exemplar abgebildet sind. Die innere Einrichtung der ersten ist aus der Durchschnittszeichnung der Fig. 2 zu erkennen, welche noch die Besonderheit eines in den Feuerraum hineinragenden kegelförmigen Bestandtheils aufweist. Die innere Einrichtung von Fig. 7 kann jedoch nur aus dem auf Taf. 32 in Fig. 13 längsdurchschnittlich dargestellten Locomotivkessel oder aus Betrachtung desjenigen Kessels erkannt werden, welcher, auf Taf. 31 in Fig. 7 abgebildet, einer Locomobile angehört, und bei welchem, wie behufs des innerlichen Reinigens von Kesselstein, das den Feuerraum enthaltende Feuerrohr mit dem Rauchrohrbündel herausgezogen erscheint.

Die Rauchrohre erfüllen, weil sie vom Dampfdrucke äußerlich gepreßt werden und somit deformirt werden können, das eingangs erwähnte Erforderniß der Gefährlichkeit nicht in gleichem Maße günstig, als die Siederrohre, Vorwärmer oder cylindrischen Hauptkessel, welche vermöge des innerlich in ihnen wirkenden Dampfdrucks die der Haltbarkeit günstige Gestalt des Cylinders mehr und mehr annehmen.

Die Gefahr der Explosion wird aber um so geringer, je kleiner der Durchmesser der Rauchrohre ge-



raucht pulsirend einwirkende Rauchverhüttungs- oder Schmelzungsfrage noch immer erweckt, läßt eine auch nur kurze Besprechung der Rauchverhüttungs-Apparate hier erforderlich erscheinen.

Im Rauch zu verhüten hat man zunächst beabsichtigt die durch denselben entstandenen Belästigungen angeht, ist alsdann aber an die Lösung des Problems um so eifriger in der irrigen Auffassung gegangen, daß die gelungene Rauchverhüttung eine Erzeugung von Brennmaterial in sich schließt.

Seitdem die Erkenntniß mehr und mehr Raum gewonnen hat, daß die meisten der zur Rauchvermeidung anwendbaren Mittel und geeigneten Principien nur keine Kohlenersparnisse erzielen lassen, sondern sogar einen Mehraufwand von Brennmaterial erfordern, ist der Eifer im Erfundenwollen von Apparaten, durch welche diese Principien verwirklicht werden könnten, erloschen.

Die tiefere Eingebung in die Erkenntniß des chemischen Processes der Verbrennung hinsichtlich von dem atmosphärischen Sauerstoffe dabei gespielten Rolle und in Betreff der Bildung von Kohlenoxyd, Kohlenwasserstoffen, welche letztere Gasdurch Abscheidung von Kohlenstoff in Form von Asche die Grundursache für die Entstehung des Rauchs erzeugt dem Beobachter einer Feuerungsanlage nicht wahrnehmbar, daß dem Schornsteine vorzugsweise unmittelbar nach dem Aufwerfen frischer Kohle dicke Wolken entströmen und daß nach einiger Zeit die Asche desselben so frei erscheint, als ob die Asche gar nicht in Thätigkeit sei.

Der Zustand des letzten Stadiums der Verbrennung der aufgeworfenen Kohlenmasse stellt sich daher als ein für die Lösung der Frage sehr beachtenswerther Zustand. Wenn dieser Zustand fortwährend erhalten werden könnte, so würde die Beseitigung des Rauchens glückt sein. Eine völlige Erfüllung dieser Bedingung ist selbstverständlich nicht möglich, oder man müßte die im Feuerraum eintragen, welche die ersten Stadien der Verbrennung bereits durchgemacht haben, und müßte also mit Coaks oder Holzstößen feuern, was zu theuer sein würde.

Annähernd kann aber jene Bedingung erfüllt werden, wenn auf die bereits glühende Kohlenmasse die Kohlenmenge nicht auf einmal, sondern während der ganzen Dauer der Verbrennung ununterbrochen in kleinen Portionen geworfen wird.

Dieses wird auch von den Heizern, welche eine rauchfreie Verbrennung zu bewirken streben, beherzigt. Man sieht die Kräfte eines einzigen Heizers, namentlich die derselbe gleichzeitig zwei Koste zu bedienen und die weitestgehenden Obliegenheiten zu erfüllen hat, reichen gewöhnlich nicht aus, und die Anstellung mehrerer Heizer würde das Rauchverhüten wiederum zu theuer machen.

Man hat daher die Bedienung des Kostes auf mechanischem Wege, gewissermaßen durch einen automatischen Heizer, zu bewirken versucht. Von den vielen verschiedenen Constructionen, zu denen auch die der letzten Wiener Weltausstellung durch Heimey & Pieper in Dresden ausgestellte Apparat von Dillmann & Smith gehört, ist hier Taf. 26, Fig. 18, der letzte in der Folge abgebildet, welcher namentlich in England häufig angewendet wurde.

Wie sein Name besagt, sind die einzelnen Stäbe des Kostes in Ketten ohne Ende G, G aneinander gefügt, durch Tragrollen L unterstützt, über zwei Trommeln oder Walzen gelegt, von denen die bei O an der Spitze einer Transmission bewegt wird und derselben wieder den Koste bewegt, so daß die einzel-

nen Stäbe desselben allmählich von D nach G gelangen. Die in den Fülltrichter B geschüttete Kohlenmasse wird demzufolge nach Maßgabe der Stellung des Regulirungsschiebers D in größeren oder geringeren Quantitäten fortwährend dem unter dem Kessel A befindlichen Feuerraume zugeführt, und übrigens ist der Kettenrost auf einem Gestelle P angebracht, welches beabsichtigt die leichter ausführbaren Reinigungsarbeiten auf den Schienen H aus- und eingefahren werden kann.

Dieser Apparat erfüllt noch die fernere Bedingung, daß die von den frisch in den Feuerraum gelangenden Kohlen entweichenden Verbrennungsgase über die in voller Glut befindliche Kohlenfläche hinwegstreichen und mit den aus dem letzten Stadium der Verbrennung hervorgehenden Producten sich mischen müssen, eine Bedingung, welche mit einigen Arten der rauchverzehrenden Apparate, welche im wesentlichen aus einem Doppelroste bestehen, dessen Hälften abwechselnd bedient werden, für sich allein zu erfüllen versucht wird.

Die Ursache für die Entstehung des Rauchs hat man auch darin zu finden geglaubt, daß die in den glühenden Verbrennungsraum geworfenen frischen, kalten Kohlenmassen plötzlich einer raschen Destillation unterworfen würden und durch Abkühlung den Verbrennungsprocess stören.

Durch den beschriebenen Kettenrost wird dieser Entstehungsursache ebenfalls etwas entgegengetreten, völliger jedoch noch durch den in Fig. 19 abgebildeten Apparat von George, welcher die Kohle mittels einer Schraube und eines Bewegungsmechanismus von unten dem Koste zuführen läßt, und demnach Schraubekosten genannt wird. Die meisten der mit mechanischen Einrichtungen ausgestatteten Apparate sind wegen einer raschen Zerstörung und baldigen Reparaturbedürftigkeit der mit dem Feuer in nähere Berührung kommenden beweglichen Bestandtheile mehr oder weniger in Mißcredit gerathen und von Constructionen verdrängt worden, welche die gleiche Wirkungsweise mit lauter festen Einzeltheilen erreichen lassen.

Zu den letztern gehören die Post- und Treppenroste und der in Fig. 20 abgebildete Etagenrost. Auf dem eigentlich einfach aus einem mit Schütttrichter versehenen, sehr schräg gelegten Koste bestehenden Postroste wird die Kohle, wie in Fig. 18, von vorn nach hinten einfach durch Hinabrutschen und Hinabrollen transportirt. Das Gleiche findet bei den Treppenrosten statt, welche übrigens noch den Vortheil bieten, die gute Kohle durch die Fugen nicht entweichen zu lassen, dagegen aber auch den Nachtheil an sich tragen, die den Luftzutritt verhindernden Schladen und Aschen festzuhalten. Der Etagenrost in Fig. 20, ein aus höheren Etagen oder Treppen bestehender Treppenrost, läßt aber das Brennmaterial durch Eintragung in jede einzelne Etage unter die glühende Kohlenmasse bringen und demnach die in Fig. 19 durch mechanische Mittel erzielte Bedienungsart ohne irgendwelchen Bewegungsmechanismus erreichen.

Eine nothwendige Bedingung für eine rauchfreie Verbrennung ist selbstverständlich die Zuleitung einer genügenden Quantität frischer Luft. Falls diese Bedingung von Hand aus nicht erfüllt ist, so kann durch nachträgliche Anbringung von Luftkanälen, durch partielles Öffnen der Feuerthür oder durch partielles Auflegen des Kostes dem sichtbar gewordenen Uebelstande des Rauchens abgeholfen werden und geschieht in der That auch oft. Allein je mehr Luft in den Feuerraum gelangt, desto schlechter ist in den meisten Fällen, wenn auch nicht die Verbrennung, so doch die Wärmeausnutzung, und desto mehr Brennmaterial wird



verbraucht. Man hat deshalb dahin gestrebt, mit der Luftzuleitung möglichst zu ökonomisiren und dieselbe zu Zeiten, wenn sie nicht erforderlich ist, gänzlich oder fast gänzlich zu unterdrücken. Diese Zeiten sind die Perioden der früher genannten letzten Stadien der Verbrennung. Ein Apparat, welcher diesen Zweck erreichen läßt und denselben an manchen Feuerungsanlagen, namentlich an denen der Dampfschiffe mit günstigem Erfolge thatsächlich hat erreichen lassen, ist die in Fig. 16 und 17 abgebildete mechanische Feuerthüre von Pridéaur. An derselben ist die vordere Wand einer gewöhnlichen Feuerthüre durch Zalusonen ersetzt (Fig. 16), welche mittels eines Hebelwerks geschlossen und geöffnet werden können. Statt des hintern, oder innern Theils einer gewöhnlichen Feuerthür hat der Erfinder eine größere Anzahl von gitterförmig angeordneten Metallplatten (Fig. 17) angebracht, welche, von der Strahlung der glühenden Kohle erwärmt, diese Wärme der eindringenden Luft mittheilen und hierdurch eine sonst stattfindende schädliche Abkühlung des Feuerraums verhindern. Damit aber die unmittelbar nach dem Aufwerfen frischen Brennmaterials be nöthig Eindringenslassens einer größeren Luftmenge vom Heizer völlig geöffneten Zalusonen allmählich bis zu völliger Abkühlung geschlossen werden, ist ein mit Wasser gefüllter Cylindrer und ein mit dem Hebelwerke verbundener Kolben angebracht, welcher ursprünglich auf jenem Wasser schwimmt, vermöge seines Gewichtes aber unter Uebersinken eines regulirbaren hydraulischen Widerstandes allmählich untertaucht und vermittlest seines Niedersinkens die erwähnten Zalusonen schließt.

Die Größe des gewöhnlichen Planrostes wird nach Maßgabe der Erfahrung derartig bemessen, daß auf jebein Quadratmeter stündlich 50—100 Kilogr. Steinkohlen verbrannt werden können. Uebrigens jedoch kann ohne Beeinträchtigung einer guten und zweckmäßigen Verbrennung mit jener Menge bis auf 20 Kilogr. hinab- und bis zu 150 Kilogr. hinaufgegangen werden. In solchen Ausnahmefällen muß aber der Querschnitt der Feuerzüge, welche man bei obigen Annahmen  $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{3}$ , so groß als die Hoffläche annimmt, einer besondern, genauern Berechnung unterzogen werden.

### Armatur und Garnitur.

An daß in Betreff dieses Gegenstandes bereits auf Seite 65 Gesagte wird hier noch die Beschreibung einiger auf Taf. 28 und 29 befindlicher Abbildungen angereibt.

Um den im Kessel herrschenden Dampfdruck zu erfahren, bringt man mit dem Kessel ein nach dem Principe des Barometers confitruirtes Quecksilbermanometer in Verbindung. In Fig. 15 auf Taf. 28 sind hiervon zwei Constructionsarten dargestellt, welche als Verbesserungen der gewöhnlich im Gebrauche befindlichen, mit einem Schwimmer versehenen Instrumente dieser Art betrachtet werden.

Fig. 10 auf Taf. 28 zeigt dagegen in Aufsicht und im Querschnitt ein Metallmanometer von Bourdon, welches aus Grund der von Schinz beobachteten Erscheinung konstruiert ist, daß eine gebogene Nöhre aus Metall von elliptischem Querschnitt durch Vermehrung oder Verminderung der Spannung der in derselben enthaltenen Flüssigkeit oder Luftart ihre Gestalt ändert. Die gebogene und mit dem Dampfstessel in Verbindung zu bringende Nöhre ist einerseits an einem dieselbe umschließenden Gehäuse und andererseits an einem beweglichen Zeiger befestigt, welcher, den Formveränderungen der Nöhre folgend, die jeweilige in

derselben und demnach auch im Rest die Spannung auf einer adjustirten Skala an

Um den Wasserstand im See zu vermeiden man am häufigsten Wasser-Probiröhre und Schwimmer. Der- jenige jedoch den Uebelstand an sich, zugebungswiderstandes, welchen die durch nach außen geführte Stange derselben ganz zuverlässig zu sein. Um diesen zu vermeiden, hat Herbevin die in Fig. 11 in Ansicht und im Durchschnitt dargestellt. Er besteht aus einem Glasrohr, welches erdacht. Diefelbe ist ein, übrigens mit Probiröhren und mit einer gläsernen Schließförmiges Gefäß, welches mit dem oben in Communication gebracht wird, welches einen Schwimmer enthält, welcher nicht an einer nach außen fortgeführten Stange, sondern an einem nur mittels einer dünnen Stange zusammenwirkenden Heizer erlenk-

Um den immerhin auch hier noch ein-  
 bungsüberstarkt zu befähigen, hat Lehm-  
 in Fig. 9 auf Taf. 29 in Ansicht und  
 abgebildeten magnetischen Schwimmer.  
 Bei diesem Apparate besteht das obere  
 mit dem Kessel befestigtes röhrenartiges  
 Schwimmerflange aus einem Magn-  
 mit auf einen Metallstab, welcher aus  
 Gefäßes auf einer Scala beweglich  
 sind mit der Schwimmerflange noch  
 in Verbindung gebracht, welche bei  
 niedrigem Wasserstande auf eine Signa-  
 lation, während das Gefäße oben in  
 seitswärts ein Sicherheitsventil trägt.

Der in Fig. 14 auf Taf. 29 abgebildete Speiseapparat dient zum Heizen des Kessels. Derselbe besteht aus einem sichtbaren Rohr mit einem Reservoir am hinteren Ende, welches mit dem Kessel in Verbindung steht. Sein mittlerer, kolbenartiger Theil besteht aus dem festen cylindrischen Theile, welcher herabgesenkt, und wodurch das Wasser im Kessel bald in Verbindung gesetzt, bald davon getrennt werden kann. So lange nun genug Wasser im Kessel ist, wird auch der Apparat der beiden erwähnten Theile aus dem Wasser herausgehoben, und das Wasser aus dem Reservoir in den Kessel fließen kann. Sobald aber der Kessel leer wird, sinkt der Apparat in das Wasser, und das Wasser aus dem Reservoir fließt in den Kessel. Sobald sich der Kessel mit Wasser gefüllt hat, steigt der Apparat wieder aus dem Wasser heraus, und das Wasser aus dem Reservoir fließt in den Kessel.

### Dampfmaschinen.

### 1. Balancier-Dampfmaschine

(Tafel 27.)

- a. Der Apparat Heron's von 1826  
und die Maschine Blasco de

Die Erfindung der Dampfstra-  
Arme die Mehrzahl unserer Fahr-  
segen, welche unsere schwerbeladenen  
dabinbraufen macht, welche uns zum  
haften Windkraft mit unablässiger  
stürmenden und windtöndten Oeeane  
Impuls zur Umpannung unsere  
des Handel, die Industrie, das  
geistigen Verkehr mit nie geahnten  
den Netz von Eisenbahnen gab,  
Impuls unterlieferte durch ihr

des Eisens und der Steinkohle, welche übermächtigsten Umschwingung in die Entwicklung ist, des socialen und des politischen Lebens — diese Erfindung wird wol als eine That betrachtet, wird als eine Schöpfung angesehen gleich einer zweiten Pallas mit der rüstet aus dem aufgekärten Haupte unserer menschlichen Zeitperiode für und fertig heraus, jedoch nicht ganz mit Recht. Die Dampfkraft ist sehr wol bekannt gewesen, und selbst die Menschen selbst als motorische Substanz für treibende war ihnen kein völliges Geheimniß. Ebenso Andeutungen darüber vorfinden, daß schon hunderte vor Christi Geburt Dampfmaschinen waren, ebenso ist nachgewiesen, daß schon 1200 von von Alexandrien die Construction eines veredlichten, welcher, im wesentlichen aus zerschnittenen Kessel mit einer Drehachse und gebogenen Ausfuhröhren bestehend, mittels Kraft, nämlich vermöge des aus jenen Röhren entweichenden Dampfes, in Umdrehung versetzt wurde.

Nachdem der Sinn für technische Erfindungen in frühen Zeitperiode an durch viele Jahrhunderte bleibender geschlummert hatte, einem spanischen Documente zufolge im Jahre 1530 dem Spanier Blasco de Garay zum Verleihen eine Dampfmaschine in Vorschlag kam, welche mit jenem Heron'schen Apparate sich die größte constructive Ähnlichkeit hatte, wir daher nach unserer heutigen Bezeichnung eine „Dampfmaschine“ nach Segner'schem nennen würden.

Darüber ist die historische Forschung klar geworden, daß die Entwicklung derjenige Form der Dampfmaschine, welche sich für praktische Verwendbarkeit bewährt erfunden in der Hand geht mit der Entwicklung der Wissenschaften, mit der wachsenden Erkenntniß der Physik des Dampfes.

Die Alten, mit der Dampfkraft auf empirische wol bekannt geworden, doch den Dampf selbst, welche mit dem Wasser gemischt sei das Feuer von demselben getrennt werde, erst seit der Galilei'schen Forschungsperiode zunächst die Eigenschaften der Luft und des Dampfes ergründet, und an diese Ergebnisse reibt sich auch die Erfindung ober, ist, die schrittweise Entstehung der praktischen Dampfmaschine.

Apparate von Guericke und von Papin  
atmosphärische Dampfmaschine von  
Newcomen.

Es liegt keinem Zweifel mehr, daß der Entzug mit der Torricelli'schen Entdeckung der des Luftdrucks und des Gewichtes der Luft (1630) anhebt. Hieran reiht sich die Otto'sche Erfindung der Luftpumpe und die von den deutschen Physikern, Ingenieur und Bürgermeistern gemachte Erfindung eines heit des Reichthums zu Regensburg (1654) tigen Aufsehen neben den bekannten und en Luftdruckballfugeln ausgestellten Apparate aus einem Cylinder und aus einem kalten Kolben bestand, und in welchem der des Luftdrucks bewegt wurde. Dieser in der That die Grundform für unsere, tigen Entwicklungsstufen stehenden Dampfmaschine bildet. Die Leere, welche unter dem

Kolben jenes Cylinders behufs der Entfaltung der Wirksamkeit des Luftdrucks entwidelt werden mußte, nicht, wie Guericke, mit dessen traisterfordernder Luftpumpe, sondern mit einfachern Mitteln zu erzeugen, bildete das Problem, dessen Lösung auf die Wege zur Erfindung der Dampfmaschine führte, und Papin, der in Blois geborene Arzt, Physiker und Mathematiker, war es, welcher während seiner Stellung als Professor in Marburg, nachdem er erfolglos das Schießpulver versucht hatte, im Jahre 1690 den Wasserdampf als solches Mittel verwendete.

Die Ausbildung seines Apparates zu einer Dampfmaschine, obgleich er sehr wohl allerhand Uebertragungsmechanismen für die Bewegung des Kolbens, namentlich behufs des Betriebes eines Schiffs erdachte, ist demselben jedoch nicht geglückt. Den weiteren erfolgreichen Schritt zu thun, war vielmehr den Engländern Newcomen und Cowley vorbehalten, welche 1705 den Guericke-Papin'schen Apparat mit einem Dampfzylinder in Verbindung zu bringen verstanden, daß, wenn auch immer noch keine Dampfmaschine, so doch eine mittels Dampf in Wirksamkeit gesetzte Luftpumpe, oder eine sogenannte atmosphärische Dampfmaschine entstand, welche zum Betriebe der Bergwerke und später zum Betriebe von rotirenden Wellen sich als vollkommen zweckmäßig erwies.

Auf Taf. 27, Fig. 4 ist eine solche Newcomen'sche Maschine in einer ihrer höheren Entwicklungsstufen angehörigen Constructionen typisch abgebildet. Auf dem zur Hälfte in einem gemauerten Ofen stehenden kuppelförmigen Dampfzylinder erscheint unmittelbar der Papin-Guericke'sche Cylinder mit darin beweglichem Kolben angebracht. An dem Kolben ist eine Pleuellstange befestigt und über ein Segmentstüd gelegt, welches an einem hölzernen doppelarmigen Hebel, dem sogenannten Balancier, sitzt. Dieser in seiner Mitte um Zapfen schwingbar gemachte Balancier erscheint andererseits mit einer Pleuellstange, einer Kurbel und einer mit Schwungrad ausgerüsteten rotirenden Welle in Verbindung, während an demselben außerdem noch zwei mittels Ketten ebenfalls an zwei Segmentstüden befestigte Stangen gehängt sind. Der oben völlig offene Cylinder läßt den Luftdruck auf den Kolben wirken und diesen sammt dem beschriebenen Mechanismus bewegen, sobald in seinem untern Raume eine Leere entwidelt ist, und diese Leere wird durch Verdichtung des vorher in diesen untern Raum gelassenen Dampfes erzeugt. Es ist also bemerkenswerth, daß als eigentlich treibende Kraft nicht der Dampf, sondern der durch die Verdichtung des Dampfes befreite Luftdruck auftritt. Die Anwendung der bezeichneten Pleuellstange läßt eine Geltendmachung der directen Dampfkraft an dieser Maschine nicht einmal auskommen.

Die Verdichtung oder Condensation des Dampfes, welches bei den ersten Maschinen einfach durch äußeres Begießen des Cylinders mit kaltem Wasser bewerkstelligt, wird bei dieser vervollkommenen Construction mittels innerlicher Einspritzung von Wasser bewirkt, welches dem oben erwähnten, durch die Maschine selbst fortwährend vollgepumpten Reservoir entnommen wird. Das abwechselnde Einlassen und Abgeschlossen des Dampfes, das sogenannte Steuern der Maschine, welches ursprünglich einfach mittels Öffnens und Schließens eines Hahnes durch die Hand eines Arbeiters geschah, wird hier mittels eines mit der vorn sichtbaren verticalen Stange in Verbindung gebrachten Mechanismus bewirkt, eine bahnbrechende Verbesserung, welche durch den zufällig rege gewordenen kindlichen Erfindungsgeist eines die Maschine beaufsichtigenden Knaben Potter 1716 entstanden sein soll.





innus hat man die zwischen Spannung und m Volumen des abgefloßenen, sich expandirenden Dampfes bestehende gesetzmäßige Beziehung, eine Aufgabe der wissenschaftlichen Forschung, seit Watt's Zeiten mit allem Aufwande schon gearbeitet wurde. Man hat aber auch einen Zweck die abfließenden Einwirkungen der Cylinderverwandlungen und diejenigen der durch den entstehenden Dampfverluste zu wissen.

Zusammengesetzte Thätigkeit aller dieser und weiterer Componenten auf empirischem Wege bestehende Maschine zu erfahren, hat schon Instrument erdacht und angewendet, welches neuer, moderner Richardscher Constructions- (Fig. 8 auf Taf. 27 dargestellt ist, und der 12 genannt wird.

Instrument, wenn durch Aufschrauben mit einem Raum des Dampfzylinders in Verbindung reibt die verschiedenen, während der Dauer des auseinanderfließenden Dampfbrüde in losen Curve auf einen Papierstreifen ver- des Kolbens, welcher einerseits mit einem hantismus und einer ihn festhaltenden Feder ung steht und andererseits vom Cylinderrade so wie der große Dampfkolben ge-

n diesem Instrumente aufgezeichnete Indigramm läßt die im Cylinderrad während der stattgehabte Dampfswirkung berechnen, ein abgebildeter Zählapparat gibt, mit einem Hebele der Maschine in Verbindung gebracht, ebener Zeit gemachte Anzahl von Hüben an, (Fig. 6 abgebildeter Wassermesser ver- e Messung des Dampfquantums, welches ner Zeit in den Cylinderrad geleitet wurde, sen Beobachtungselementen werden Schlüsse wirkungs- oder Gütegrad der Dampfmaschine es wird mit denselben die indicirte Pferde- der Dampfverbrauch pro Indicator- berechnet.

eres bereits früher beschriebenes Instrument, er auf Taf. 24 in Fig. 21 abgebildete Zaum läßt, auf der Schwungradwelle an die von der Maschine geleistete Leistung in n oder effectiven Pferdestärken messen rgleich mit der Indicator-Pferdestärke den g feststellen, welcher von den Widerständen nismus der Maschine aufgezehrt wird.

auf diese Weise ermittelt worden, daß die Watt'schem System sorgfältig konstruirten mit einem gegebenen Steintohlenquantum viel leisten, als die Newcomen'schen.

erausbildung der Taf. 27, Fig. 3 dargestellten unenen Gestalt der Maschine ist indessen allein thätig gewesen. Wie schon der bei schriebene Umschleicher die Erfindung ist, so stammt auch die Anbringung des nismus und des Schwungrades an die n andern Erfindern oder Verbesserern her.

diese Erfinder lauter Engländer, und dieser wie der fernere, daß zu Watt's Zeiten der geist in England überhaupt ungewöhnlich nd seine Ideen an der Hand eines nicht tig pulsirenden Unternehmungsinnes auf die politischen Verhältnisse und durch vers- entgegengesetzte consolidirten Boden der praktischen und Ausprobirung zuführen konnte,

änder zu der Annahme gebracht, die ganze Erfindung der Dampfmaschine, ja auch der Dampfkraft für sich in Anspruch zu nehmen.

Verleßt durch diese Annahme und erfüllt von einer sonderbaren Geschmacksrichtung für französisches Wesen ist in Deutschland mit ungewöhnlicher Leichtgläubigkeit die später von Arago ausgesprochene Behauptung ange- Wört und nachgefaßt worden, daß ein gewisser Sa- lomon de Caus der wahre Erfinder von Dampfkraft und Dampfmaschine sei. Allein dieser, mit der Dulde- mienne des verananten und versorgten Genies und mit den Attributen des intriguenhaft geistig und körperlich gemordeten Weltverbessers, dem empfindsamen Publi- lum vorgeschrieben, einfache Hydrauliker und Gartenbau- meister hat weiter nichts Diesbezügliches vollbracht, als in einer müßigen Stunde 1615 ohne Präension der Neuheit eine recht mangelhafte Abbildung und Be- schreibung von einem Wasser ausströmenden, kleinen Dampfsehel à la Heron von Alexandrien bei Gelegen- heit der Veröffentlichung eines Buchs über Garten- wasserläufe zu geben, und der schlaueste Beweis von der völligen Unzugehörigkeit dieses in Heidel- berg wohnhaft gewesenen Franzosen zu den Mit- arbeitern an der Entstehung der Dampfmaschine ist die Thatfache, daß selbst französische Schriftsteller neuerdings jene Arago'schen Verherrlichungen als völlig unechte „Schönfärberei“ wahrheitsgemäß be- zeichnen.

Das gleiche Verdict läßt sich aber auch über den Marquis of Worcester sprechen, welchen die Engländer mit kritischer Hartköpfigkeit und Ausdauer noch immer als den Entdecker der doch nachgewiesenermaßen schon vor Christi Geburt bekannt gewesenen Dampfkraft und als den vom Beobachter des siedenden Ibe- lessels herangereisten Erfinder der ersten Dampfmaschine glaubhaft zu machen versuchen (1663).

Und endlich kann auch der Engländer Savery nicht unbedingt in die Reihe der an dem Erfindungswerte der Dampfmaschine thätig gewesenen Männer mit auf- gezählt, geschweige denn der eigentliche Erfinder ge- nannt werden, weil seine Erfindung nur ebenso un- eigentlich eine Maschine genannt zu werden verdient, wie man eine Koch- oder eine Kaffeemaschine eine Maschine heißt, indem sie weder einen Kolben, noch einen Balancier, noch eine Kurbel und Ventflange, noch sonst einen sinnreichen Bewegungsmechanismus hatte, sondern nur behufs des Wasserhebens mit Anwendung einiger Pumpenventile von der Con- densationswirkung des Dampfes und der Druckwirkung der Atmosphäre Gebrauch machte. Allein insofern als Savery diesem seinem mit Dampf in Thätigkeit ge- setzten Wasserhebungsapparat eine vor seiner Zeit (1701) noch nie gekannte praktische Brauchbarkeit zu ertheilen verstand, und insofern er einen Dampfsehel konstruirte, ohne welchen Newcomen und Cowsay ihre vertheilbarster wirkende Maschine nicht in Gang setzen konnten und ihn daher an ihrem Patentrechte parti- cipiren ließen, mag sein Name auf den Blättern der Erfindungsgeschichte der Maschine einen Platz einge- räumt erhalten.

Nur muß betont werden, daß bereits angeführter- maßen fast ein halbes Jahrhundert vor Savery und Newcomen, wo wir Deutschen nach einer beliebigen Darstellungsweise unserer Nachbarnationen in den Mond gesehen und uns lediglich mit unfruchtba- ren hypertranscendenten Philosophien beschäftigt haben sollen, der Keim zu der Erfindung der Dampfmaschine aus dem Lusttrudapparate des Otto von Guericke her- auswuchs und auf deutschem Boden unter dem An- reiz deutschen Unternehmungsinnes die Frucht des Papin'schen Dampfzylinders trieb, welcher als der Ur- typus der heutigen Dampfmaschine betrachtet werden muß, und ohne welchen Newcomen und Cowsay un-



ringenden Balancier's unnöthig erscheinen die von diesem doppelarmigen Hebel hin- und herbewegende Stange der Luftpumpe in Weg-  
 Auch hat man den Balancier, obgleich er  
 utage vielfach einen Bestandteil von neu-  
 Maschinen bildet, selbst bei Anwendung von  
 ren als eine antiquirte historische Ueber-  
 angesehen. Man hat diesfalls die Kolben-  
 der Lenkstange in directe Verbindung ge-  
 bebufs der Bewegung der Luftpumpe, der  
 und Speisepumpe, entweder kleinere Hebel  
 in, oder Excentric's angeordnet.

Taf. 28 und 29 sind derartige Constructions-  
 rgestellt. Die erste dieser Tafeln zeigt zu-  
 be Anordnungen, bei welchen die verticale  
 es Cylinders beibehalten wurde. In den  
 , 6 und 8 sind die Cylinder auf einer  
 e und die Schwungradwellen oben auf dem  
 m ober aus Säulen und Trägern gebildeten  
 geordnet. In Fig. 5, 7 und 9 befinden  
 ylinde oben auf dem Gerüste und die  
 wellen unten und zwar derartig, daß die  
 se aus den Wänden der Cylinder nach  
 hrt ist. In Fig. 2 dringt die Kolben-  
 gleich der Cylinder ebenfalls über der  
 welle angebracht ist, oben aus dem Dedel  
 r's, und zwar gebührt dieser Anordnung,  
 lay 1807 eingeführt, der historische Vor-  
 n übrigen.

stellt übrigens eine Maschine von Rowan  
 das Woolf'sche zweicylindrige System in  
 Masfabe verwirklicht. Es arbeitet nämlich  
 der Dampf in drei Cylindern, und zwar  
 inem mittlern kleinen und dann in zwei  
 ern. Auch Legavrian hat eine solche drei-  
 Cylindern, jedoch sonst, in völlig anderer  
 truit.

gende Abbildung, welche die Anwendung  
 e auf die Bewegung einer Schiffschraube  
 igt obenein eine Zwillingmaschine, d. h.  
 ei Einzelmaschinen zusammengesetzte Ma-  
 schine sechs Dampfzylinder daran angebracht  
 denen je drei gesonderte Dampfzuleitung  
 h alle auf ein und dieselbe Betriebswelle  
 Das vorn sichtbare große cylindrische Gefäß  
 r'st ein Condensator, d. h. ein Condens-  
 er nicht gleich dem Watt'schen, mittels  
 Jassereinspritzung, sondern mittels äußerer  
 eine dampfverdichtende Wirkung äußert,  
 haftet an der Maschine noch die Eigen-  
 daß dieselbe mit überhitztem Dampfe  
 d, eine Eigenthümlichkeit, welche man vor-  
 nnten beufus noch weiterer besserer Aus-  
 Dampfwärme vielen Maschinen ertheilte,  
 ründen praktischer Unzuträglichkeit später  
 gte.

It eine von jenen kleinen, für die Haus-  
 endbaren Maschinen dar, bei welchen die  
 aschine unmittelbar mit dem Dampfkeffel  
 sodaf der letztere das Gestell für die:

, 14 und 15 sind bereits bei den Dampf-  
 i besprochen, die Fig. 11, 12 und 13 werden  
 Steuerungsmechanismen beschrieben werden.

Die Abbildung einer Diagonalmaschine,  
 n der im Verhältniß zu der horizontalen  
 Richtung diagonal angeordneten Lage  
 schen. Jeder der beiden mittels recht-  
 lsten Kurbeln auf die oben angebrachte  
 alle wirkenden Cylinder erhält separate

Dampfzuleitung. Es ist also keine Woolf'sche, zwei-  
 cylindrige, sondern eine Zwilling's- oder doppelcylindrige  
 Maschine.

Hinsichtlich der Stellung der Cylinder bildet dieselbe  
 den Uebergang zu den:

### 3. Maschinen von horizontaler Aufstellung.

(Tafel 29.)

Fig. 2 stellt eine Maschine für größere, Fig. 4 eine  
 solche für kleinere Leistungen dar. Der Cylinder, die  
 Geradzführung und das eine der beiden Schwungradlager  
 sind auf einer eisernen Fundamentplatte befestigt,  
 und die letztere ist mit einem steinernen Fundamente  
 verschraubt. In Fig. 3, einer Maschine für sehr  
 kleine Leistungen, ist das Schwungradlager mit dem  
 die Rolle des steinernen Fundamentes mitübernehmenden  
 gußeisernen Fundamente beufus Erstrebung einer solidern  
 und für manche Gegenden (Amerila) auch billigern  
 Construction zusammengegoßen.

Fig. 1 zeigt eine doppelcylindrige oder Zwilling's-  
 maschine.

Fig. 7 ist dagegen eine zweicylindrige oder  
 Woolf'sche Maschine mit der besondern Eigenthümlich-  
 keit, daß die Kurbeln um einen rechten Winkel gegen-  
 einander verstellt sind, und daß demnach die Kolben  
 nicht wie bei dem eigentlich Woolf'schen System parallel  
 miteinander sich bewegen, sondern zu verschiedenen Zeit-  
 punkten ihre todtten Punkte passiren. Beufus der Er-  
 möglichung dieser Wirkungsweise ist noch ein dritter  
 Cylinder, oder besser gesagt ein cylindrisches Gefäß  
 unterhalb angebracht (hier punktiert dargestellt), in  
 welches sich der aus dem kleinen Cylinder abströmende  
 Dampf zunächst ergießt, um alsdann erst in den großen  
 Cylinder zu gelangen. Dieses Gefäß hat den Zweck,  
 die Dampfkräfte auszugleichen und könnte daher Com-  
 pensator (nicht Condensator) genannt werden, und  
 der Zweck dieser Constructionsform der von Walter  
 May in Birmingham auf der londoner Ausstellung  
 1862 ausgestellten Maschine ist die Bewirkung eines  
 gleichförmigern Ganges. Uebrigens hat der Condens-  
 ator mit Luft- und Speisepumpe, mittels einer Schüttel-  
 welle bewegt, vorn an der Seite der Maschine seine  
 Stellung erhalten.

Die Fig. 5 und 6 zeigen eine Corli'sche Maschine,  
 die erstere von der Vorderseite in perspectivischer, die  
 letztere von der Rückseite in geometrischer Ansicht.  
 Letztere Figur stellt namentlich den hervorragenden  
 Bestandteil dieses Maschinensystems dar, nämlich die  
 Steuerung.

Hinsichtlich derselben erscheint hier vor genauerer  
 Beschreibung dieser Maschine ein historischer Rückbild  
 am Plage.

#### Die Steuerungen.

Der erste Steuerungsmechanismus, wie er an den  
 Newcomen'schen Maschinen angebracht wurde, war ein  
 einfacher Hahn. Dieser Hahn wurde ursprünglich von  
 Menschenhand und später mittels eines Mechanismus  
 bewegt, welchen man die äußere Steuerung zu nennen  
 pflegt. Jener Hahn wurde bei Einführung des Con-  
 densators und der Doppelwirkung der Maschine durch  
 Ventile und später durch den Nuschel-, D- und W-  
 Schieber ersetzt, welche Organe man im Gegenfah zu  
 denen der äußern Steuerung die innere Steuerung  
 zu nennen pflegt. Der Nuschelschieber ist eine geraume  
 Zeit in Anwendung geblieben und durch Anbringung  
 von äußerer und innerer Ueberdeckung (Ueberlappung)  
 auch als Expansionschieber, d. h. beufus der  
 Bewirkung der Expansion benutzt. Die Unzulänglich-



leit desselben für letztern Zweck hat alsdann eine größere Anzahl aus zwei Schiebern combinirter Constructionen entstehen lassen, bei welchen dem einen lediglich oder doch vorzugsweise die Rolle des ursprünglichen Muschelschiebers als Dampfvertheiler übertragen wurde, während der andere die Expansion zu vollziehen hatte. Einige solcher Constructionen sind in Fig. 13 auf Taf. 28 und in Fig. 8 und 12 auf Taf. 29, sowie in Fig. 10 auf Taf. 27 dargestellt.

In der ersten dieser Figuren ist der Stenormechanismus von Gouzenbach abgebildet. Der Muschelschieber A wird hier mittels einer Excentricstange auf dem sogenannten Schieber Spiegel des Dampfstaßens B hin- und herbewegt und öffnet bald den einen, bald den andern der beiden nach dem Cylinder führenden Dampfkanäle, während er den mittlern, den Abblasenkanal, bald mit dem andern und bald mit dem einen dieser Kanäle in Verbindung setzt. Solange der in einer zweiten Dampfammer C befindliche zweite Schieber E, welcher ebenfalls mittels einer Excentricstange bewegt wird, die Durchbrechung D offen hält, kann frischer, durch die Leitung F herzugeführter Dampf in den Cylinder gelangen. Sobald aber ein Abfluß von D erfolgt, tritt Expansion ein.

In Fig. 8 auf Taf. 29 ist der zweite, ebenfalls von einer Excentricstange bewegte Schieber direct auf dem Rücken des Muschelschiebers angebracht, und letzterer hat zu dem diesbezüglichen Zwecke eine Erweiterung behufs Anbringung zweier Kanäle erhalten, welche von dem Expansionschieber abwechselnd nach Maßgabe des Expansionsgrades geschlossen werden. Um den Expansionsgrad verändern zu lassen, besteht dieser Meyer'sche Schieber aus zwei Theilen, welche mittels zweier, an der drehbaren Schieberstange angebrachten Schraubenmechanismen mehr oder weniger voneinander entfernt werden können.

Bei der Steuerung von George in Fig. 12 auf Tafel 29 ist zwischen dem mit Kanälen versehenen Muschelschieber und dem mittels besonderer Excentricstange bewegten Expansionschieber eine aus zwei übereinanderliegenden Theilen bestehende Platte angebracht, und hierdurch der Dampfstaßens, ähnlich wie in Fig. 13 auf Taf. 28, in zwei mittels verschiebbarer Oeffnungen communicirende Hälften getheilt. Dadurch, daß die beiden mittlern Bestandtheile des obern Theils jener Platte mittels Zahnstange und Zahnrad verschoben werden können, indem letzteres mittels einer durch den Dedel des Dampfstaßens gesteckten Stange oder Spindel drehbar ist, läßt sich der Expansionsgrad beliebig verändern.

Auch bei der bereits auf Seite 72 besprochenen Steuerung von Farcot wird eine Veränderung des Expansionsgrades durch eine Spindel möglich gemacht, welche durch eine im Dedel des Dampfstaßens angebrachte Stopfbüchse mit einer drehbaren excentrischen Anstoßscheibe in Verbindung steht.

Nachdem mehr und mehr die Erkenntniß Raum gewann, daß die Veränderung des Expansionsgrades den Vortheil einer bessern Dampfbenutzung noch nicht völlig erreichen läßt, wenn dieselbe bloß von der Hand des Maschinenführers bewirkt wird, sondern daß sie vollgewichtiger in Wirksamkeit tritt, wenn sie von der Maschine selbst je nach deren zu durchlaufenden wechselvollen Kraftentwidelungsphasen geregelt wird, so hat man den Verstellungsmechanismus des Expansionschiebers mit dem Regulator der Maschine in Verbindung gebracht und hierdurch unter Fortlassung der die Geschwindigkeit regelnden Drossellappe bewirkt, daß die Maschine ihren gleichförmigen Gang nicht wie früher infolge Drosselung, d. h. Druckverminderung,

des Dampfes, sondern durch Verändern des Expansionsgrades erhält, oder auch so, daß für jede bei constant bleibender Umdrehung von der Maschine abzuleitende Dampfmenge ungedrosselt, d. h. mit seiner größtmöglichen anfänglichen Wirkung gelangt.

Ein diesbezüglicher Verstellungsmechanismus der für die in Fig. 10 auf Taf. 27 zur Steuerung angewendete, ist auf Taf. 28 dargestellt.

Mit der verlängerten Hülse des sich drehenden horizontalen Wellenbalkens sind zwei Frictionscheiben verbunden, die letztern ist in dieselben eingewirrt angebracht, welcher konische Räder an der plötzlicher Zunahme oder Abnahme der Umdrehung der Maschine kommt die untere der Frictionscheiben in Eingriff und die obere Räder nach links oder nach rechts herum drehen, diese konischen Räder in Eingriff mit dem Rade der obern horizontalen Welle, welche letztere ebenfalls bald nach links oder rechts umgedreht und bewegt daher die mit ihr in Verbindung gebrachte Spindel des Ventils bald nach der einen, bald nach der andern Seite, bis die normale Stellung des Ventils erreicht und hierdurch jede der Frictionscheiben in Eingriff gebracht ist.

Eine recht einfache diesbezügliche Vorrichtung schon einer früheren Periode der Entwicklung angehört, aber freilich eine nicht sehr wirksame hat, ist auf Taf. 29 dargestellt.

Unterhand dieser Figur erscheint ein Stück des Cylinders mit den Dampfkanälen, Dampfstaßens und dem darin angebrachten beweglichen Muschelschieber und dem Schieberdedel des Dampfstaßens. Dieses Ventil wird geöffnet und geschlossen durch einen Regulator, der mittels eines in dem rechterhand dargestellten Stückes des Regulators sammt Gestell eines Ventils, welches von dem Regulator getrieben, beziehentlich gedreht wird, das Expansionsventil früher oder später bringt.

An Stelle der Muschelschieber des Excentricmechanismus (Kutner) hin- und hergehende Bewegung eines oszillirenden Schieber (Fig. 11) anwendet, und dieselben wurden herbeigeführt, daß sie durch eine feste Bewegung die Dampfvertheilung bewirken.

In gleicher Weise wurde der oszillirende Schieber zu einem Zahnradregulator in Fig. 12 auf Taf. 28 nach dem Umdrehung dargestellt ist. Oszillirend oder rotirend bewegte sich der Dampf dem Cylinder, wie bei dem Muschelschieber, mittels zweier Ventile und aus denselben mittels derselben.

Endlich sind auch die Ventile, ohne rotirende Bestandtheile wirkende Maschinen nie außer Anwendung gekommen, auch für die kleinern mit rotirenden Ventilen benutzten Maschinen benutzte worden, was verbesserte, das durch den Dampf derselben bedeutend erleichterte Zustand, d. h. seitdem aus ihnen wurden (Fig. 11 auf Taf. 29).

eines einzigen, mit Expansionsvorrichtung Mufchelschiebers wurden dann vier solcher gebracht, zwei für den Dampf einlaß, zwei dampfauslaß, und je eins dieser zwei für eins für die andere Seite des Kolbens. Inordnung, vereinigt mit einem der früher selbstthätigen Verstellungsmechanismus für den, bildet nun den Hauptbestandtheil der Maschine und der größeren Anzahl der auf der Weltausstellung bemerkbar gewesen, deren Maschinen.

#### 4. Maschine von Corliss und von Allen.

(Tafel 29.)

die Erfindungsthätigkeit schon im Beginn hundert ihre Answanderer über den Ocean; und nachdem auch die Vereinigten Staaten Erfindung der Hochdruckmaschine von Evans des ersten praktischen Dampfschiffs von 07) in den Kreis der Mitarbeiterschaft an der Erfindung der Dampfmaschine und deren Verwendung getreten waren, haben die seit einigen Decennien nach dieser Richtung mühsich sich hervorgethan. Im Einklange mit dem Tempo ihrer Geschäftsthätigkeit sind es gewesen, auch der Thätigkeit der Maschinen raschem Pulsschlag einzuspringen. Während Kolben der Dampfmaschinen früher eine Zeit von 0,5 Meter gab und dieselbe allmählich auf 0,8, 1 und 1,5 Meter steigerte, trat der Allen auf der pariser Ausstellung 1867 mit einer neuen Construction hervor, bei welcher der Kolben 4 Meter Geschwindigkeit bewegt wurde. Verbesserung, welche namentlich den Vortheil der geringeren Dimensionen und geringeren Kosten für eine Maschine von erforderlicher Leistung erreichen läßt, scheint jedoch praktische Nutzen mit sich zu führen. Denn obwohl dieselben auf gleichartige Bestrebungen abzielen, so ist der letzten Wiener Weltausstellung nachzusehen, indem die dortigen Maschinen von 2 Meter Kolbengeschwindigkeit arbeiteten, eine Allen'sche Schnelllaufmaschine getroffen.

Es ist schon auf der londoner Ausstellung eine erregende Maschine des Amerikaners, derenartig gewaltigen Einfluß ausgeübt, tonangebend für die Construction fast aller in Wien ausgesetzter Dampfmaschinen zu sein.

Ob vollberechtigt oder ob zum großen Theil der Mode, der Reclame und des Uebergewichts des amerikanischen Systems noch nicht erwiesen.

3. 5 und 6 auf Taf. 29 im Vergleich mit den Abbildungen dieser Tafel zeigen die Maschine auch die Neugier, daß der oben auf dem eisenen Fundamente, an demselben angebracht ist. Jedoch Ursache der Steuerungsmechanismus, 6) aus vier Hahnschiebern besteht, eines einzigen Eccentrics und eines Mechanismus bewegt werden. Die beiden Dampfauflaß bestimmten Hahnschieber einen gewöhnlichen Hebel, mittels fortwährende hin- und hergehende Bewegung. Die beiden oben, für den Dampf, haben dagegen je einen Winkelarm einen Arm eine verticale belastete, dessen anderen Arm der Eccentric greift. Letzterer ist auslösbar und die

Auslösung erfolgt durch einen Mechanismus, welcher mit dem Regulator in Verbindung gebracht ist. Beschleunigt die Maschine ihren Gang und heben sich infolge dessen die Kugeln des Regulators, so werden die von dem Eccentricmechanismus geöffneten Schieberbahnen eher als sonst aus letztem ausgelöst und durch die niederfallenden belasteten Stangen eher als sonst rasch geschlossen, so daß infolge dessen die Expansion eher als sonst eintritt. Durch die Auslösung wird vermieden, daß die belasteten Stangen ein rascherer Abschuß als bei andern Steuerungen bewirkt; dadurch, daß der auslösende Mechanismus mit dem Regulator in Verbindung gebracht ist, wird eine selbstthätige Veränderung des Expansionsgrades, also eine Constanthaltung der Geschwindigkeit der Maschine nicht durch Drosselung, sondern durch Expansion erzielt, und dadurch, daß vier getrennte Schieber angeordnet sind, werden die durch sonst erforderlich werdende längere Dampfstände entstehenden Dampfverluste vermieden.

Bei den neuern, nach Corliss'schem System construirten Maschinen sind die behufs der Vermeidung von Erschütterungen in (unten sichtbare) Luftkissen eingeschlossenen Gewichte der belasteten Stangen durch Federn ersetzt und die übrigen Mechanismen vereinfacht; außer den Hahnschiebern werden auch Doppelschventile oder schleichende Schieber angewendet. Die Construction ist jedoch bei weitem complicirter, als eine Steuerung mit Mufchelschiebern, ein Beweis dafür, daß man heutzutage zu Gunsten der besseren Dampfausnutzung nicht so sehr vor verwickelten und schwierigen Constructionen zurückschreckt, als zu einer Zeit, wo die Erfindung des Mufchelschiebers wegen der Einfachheit desselben die bis dahin gepflogene Anwendung der jetzt wieder hervorgeholten Bahnen und Ventile verdrängte.

Fig. 10 ist bei der Beschreibung von Taf. 21, und Fig. 9 und 14 sind bei derjenigen von Taf. 26 besprochen.

#### 5. Oscillirende und rollende Maschine

(Tafel 30.)

Das Construiren der auf Taf. 28 und 29 abgebildeten Maschinen ohne Balancier läßt einsehen, daß diese Formen sehr hoch oder sehr lang gestreckt deshalb ausfallen, weil die lange Ventilstange, wenn an die völlig aus dem Cylinder herausgezogene Kolbenstange angeschlossen, in dieser Lage bis zu der anzubringenden Kurbelwelle genügenden Platz haben muß. Könnte das Zwischenglied zwischen Kolben und Ventilstange, nämlich die Kolbenstange, in Wegfall kommen, so würde die Maschine bedeutend kürzer werden und daher weniger Raum einnehmen.

Diese Erkenntniß führt, ebenso wie eine sinnreiche kinematische Betrachtung, auf die Anwendung schwingender Cylinder, d. h. auf die Construction der oscillirenden Maschinen.

Der bewegte Uebelstand läßt sich auch auf andere Weise vermeiden, z. B. durch Anordnung zweier Ventilstangen, welche den Cylinder umfassen und mit einer unter oder vor der Bodenfläche des Cylinders angebrachten Kurbel verbunden werden (Fig. 2 auf Taf. 28); ferner durch Anwendung eines parallel zur Kolbenfläche beweglichen Cylinderschleides. Allein den Vorzug verdienen die oscillirenden Maschinen.

Namentlich bei Dampfschiffen, bei denen Raumersparniß von besonderer Wichtigkeit ist, haben dieselben häufig Anwendung gefunden.

Dieselben auch aus Gründen der bessern Dampfausnutzung oder des geringern Reibungswiderstandes zu bevorzugen, ist ungerechtfertigt.





die auch in Fig. 4 erkennbare excentrische Kolbenwelle wird die Drehung des Kolbens

stellt eine der vorigen sehr ähnlich construirte Maschine dar. Auch hier ist die Kolbenwelle concentrisch darauf befestigten Hohlzylinder im Dampfzylinder angeordnet. Es sind aber plattenförmige Kolben, beziehentlich vier bloßen angebracht. Auch erfolgt, was hauptsächlich, die Berührung zwischen dem Kolben und dem Dampfzylinder oben anstatt unten, noch links und rechts je ein Dampfkanal, welcher jedoch nur zum Ablassen des Dampfes in der Dampfammer, befindliche Schieber wird nur und Abstellen der Maschine, beziehentlich zur des Dampfes benutzt, während der unter in der Dampfammer, befindliche Schieber bei der Umsteuerung erfüllen lassen soll, also Ruhe bleibt, als die Kolbenwelle in der Richtung gezeichneten Pfeile umläuft. Der Dampf nur durch einen der beiden innern, oben ausmündenden Kanäle zu, jedoch aus je innern und je einem der äußern, unten im ausmündenden Kanäle ab. Dadurch, daß einem der vier radial beweglichen Kolbenströme Dampf von dem bei der Drehung den Kolbenheile abgesperrt wird, und dabei Vorrückung eines solchen Kolbenheils: Stellung der den Dampf enthaltende Raum vergrößert wird, entsteht Expansion. Behufs dieses Zwecks sind die vier radialen Kolben nur zweier angebracht.

tenden oder rotativen Maschinen von ähnlichen soeben beschriebenen Constructionen haben in Fig. 6 und 8 abgebildeten Formen. rigen Cylinder sind entweder auf einer Zunge oder an der Wand befestigt; auf der ist behufs der Kraftübertragung unmittelbaren Hebe oder ein Zahnrad angebracht, ein Schwungrad entweder gar nicht (Fig. 8) oder sehr geringen Dimensionen vorhanden (Fig. 6).

stellt sich, wie Fig. 10 zeigt, der Cylinder wie derjenige einer Maschine mit altertümlichen Kolben dar. Diese Figur läßt im Fig. 6 ferner die Vereinfachung erkennen der Kugelregulator unmittelbar auf der angebracht ist.

hat man, wie den Rotationspumpen, so Rotationsdampfmaschinen auf die mannichfache die Constructionenform der Kapselräder z. B. hatte die auf der pariser Ausstellung einiges Aufsehen erregende Behrens'sche: innere Einrichtung der auf Taf. 20 in gezeichneten Pumpe desselben Erfinders, und auch eine solche Pumpe.

gleiche der Taf. 30, Fig. 6, 8 und 10 darstellenden Maschinen mit den auf Taf. 28, endlich auf Taf. 27 abgebildeten Formen, constructive Einfachheit drastisch genug eine rotirende Welle zu bewegen, erscheint einfacher, als die Anbringung eines mit verbundenen und von einem Gehäuse Kolbens. Die von jeder rege gewiesenen wieder auf neue sich betheiligenden nach Erfindung einer rotativen Maschine, jenen Vorzügen der constructiven Einfachheit der vortheilhaften Dampfmaschinen möge, sind daher erklärlich. Die sich aber auch, ja vorzugsweise, aus noch

einem anderweiten Grunde herleiten, nämlich aus der Ansicht, daß durch den Kurbelmechanismus, welcher bei den übrigen, üblichen Constructionen durchweg angewendet wird, eine nicht unbedeutende, ja sogar sehr beträchtliche Größe an Kraft, oder besser gesagt, an Effect verloren gehe. Diese, den Erfindern so oft als Irrthum vorzubeweiende Ansicht ist jedoch völlig verfehlt. Abgesehen von sehr unbedeutenden Reibungswiderständen überträgt die Kurbel genau so viel Effect, als dem alternirend bewegten Kolben vom Dampfe überliefert wird. Wenn auch der auf dem Kurbelsapfen übertragene mittlere Druck keineswegs so groß als der vom Kolben ausgeübte ist, so stellt sich doch der von erstem in gegebener Zeit zurückgelegte Weg um soviel größer, als der vom Kolben durchlaufene heraus, daß das Product von Kraft und Weg für beide dieser Organe ganz gleich bleibt, und dieses Product, die sogenannte mechanische Arbeit, und nicht jener eine Factor desselben ist entscheidend für den ausgenutzten Effect.

Die schon mit Watt (1782) und mit Murdoch (1799) anhebenden Bestrebungen nach Erfindung einer vortheilhaft wirkenden rotativen Dampfmaschine scheiterten zu meist an dem Unvermögen einer Vermeidung sehr beträchtlicher Dampfverluste. Den scheibenförmigen Kolben einer alternirend wirkenden, gewöhnlichen Dampfmaschine gegen Unbilden zu schützen, ist ungleich einfacher, leichter und sicherer, als den plattenförmigen oder doch im Querschnitt viereckig sich darstellenden Kolben einer rotativen Maschine mit den geeigneten Dichtungsorganen zu versehen, und obenein fallen die Reibungswiderstände des letztern beträchtlicher als diejenigen des erstern aus, zumal wenn derselbe, wie in Fig. 11, als ein mehrfacher Kolben construiert ist.

Der Dampf wirkt in allen unsern Dampfmaschinen infolge von Raumerweiterung. Die Maschine muß demselben einen Raum darbieten, welchen er nach Maßgabe seiner, aus dem Wasser entstehenden Masse und nach Maßgabe seiner Expansion unter Ueberwindung eines Widerstandes, welcher seiner, seinem jeweiligen Zustande entsprechenden, größten Spannung entspricht, erweitern kann. Ob diese Erweiterung durch Fortschiebung eines in einem Cylinder beweglichen scheibenförmigen Kolbens, oder durch Fortschiebung mehrerer derartiger in mehreren Cylindern beweglicher Kolben, oder durch Drehung eines oder mehrerer in Umhüllungen angebrachter, plattenförmiger Kolben bewerkstelligt wird, ist an und für sich gleichgültig. Eine dehnbare Blase, in welche man den Dampf strömen ließe, und bei welcher nicht nur durch einen Bestandtheil der Wandung (einen Kolben), sondern durch die ganze Wandung unter Ueberwindung eines vorhin charakterisirten Widerstandes die Raumerweiterung bewirkt würde, könnte ebenfalls angewendet werden. In der That sind auch solche blasenartige Constructionen, d. h. es sind Maschinen versucht worden, welche statt des Dampfzylinders mit Kolben ein Gefäß hatten, welches aus einer festen und aus einer damit verschraubten elastischen Stahlplatte bestand, und in welches der Dampf behufs Biegung dieser Stahlplatte ein- und ausgelaufen wurde, während mit der elastischen und durch ihre Elasticität den abgepannten Dampf austreibenden Platte die Ventilstange verbunden war.

Es kommt aber darauf an, von allen diesen Constructionen diejenige auszuwählen, welche allerhand bei jener Raumerweiterung auftretende Druck-, Substanz-, Wärme- und Reibungsverluste möglichst vermeiden läßt. Eine solche vorzügliche Construction ist eine von den erfundenen Rotationsmaschinen nicht. Die Constructionen mit alternirend beweglichen Kolben nehmen vielmehr immer noch den ersten Rang ein, weshalb denn

auch eingangs der historischen Darlegungen mit Recht behauptet wurde, daß der Guericke-Bavin'sche Apparat für unsere praktisch brauchbaren Dampfmaschinen den Urtypus bilde. Die Einfachheit der Construction, dieser Vorzug der Rotationsmaschinen, entscheidet aber gegenüber jenen Verlusten nichts, wie die Thatsache beweist, daß die complicirter konstruirten Woolf'schen Maschinen den einschlägigen vorgezogen wurden, und wofür die fernere Thatsache spricht, daß der einfache Muschelschieber dem bedeutend complicirtern Mechanismus der Corliß-Steuerung neuerdings den Platz räumen mußte.

Fig. 17 ist bereits bei den „Steuerungen“ (Taf. 29) besprochen.

## 6. Transportable Dampfmaschinen, Locomobilen und Halblocomobilen.

(Tafel 31.)

Behufs der Unterscheidung und Classification der Dampfmaschinen sind etliche Bezeichnungen üblich geworden, von denen viele im Laufe der bisherigen Darlegung bereits angeführt wurden. Hinsichtlich der Beschaffenheit des verwendeten Dampfes und der Art seiner Wirkungsweise spricht man von den allerdings historisch gewordenen atmosphärischen Dampfmaschinen, von den Dampfmaschinen schlechweg und von Maschinen mit überhitztem Dampf, von einfachen und doppeltwirkenden Maschinen; ferner unterscheidet man Dampfmaschinen mit und ohne Condensation, mit und ohne Expansion, mit constanter und mit variabler Expansion, mit von Hand und selbstthätig verstellbarer Expansion. Man theilt diese Motoren ein in Niederdruck-, Mitteldruck-, und Hochdruckmaschinen, je nachdem der Dampf mit nur  $1\frac{1}{2}$ , mit 2—3, oder mit 3—10 Atmosphären Spannung darin wirkt. Ein-, zwei- und mehrcylindrige Maschinen werden unterschieden, einfache und Zwillingmaschinen. Nach Maßgabe ihrer Constructionsart sind dieselben hier als Maschinen mit und ohne Balancier, als verticale und horizontale, als solche mit festem und mit oscillirendem Cylinder, als solche mit alternirender und rotirender Kolbenbewegung aufgeführt. In der antithetischen Bezeichnungsweise wird auch von Land- und Seedampfmaschinen (Schiffsmaschinen), von stationären und transportablen, beziehentlich locomobilen Dampfmaschinen gesprochen.

Eine transportable Dampfmaschine ist eine durch Vereinigung mit ihrem Kessel und durch Entbehrlichmachung eines Fundamentes transportfähig gemachte Dampfmaschine.

Von den bisher beschriebenen Constructionsformen erscheint der Kessel völlig losgelöst, gesondert, und in der That ist auch die Wirkungsweise des Kessels so sehr verschieden von der der Maschine, daß ein englischer Praktiker rücksichtlich der geschäftsmännischen Behandlungsart mit Recht den Anspruch that, Dampfesselhaus und Maschinenstube sollten wie zwei verschiedene Geschäfte aufgeführt werden, mit separater Buchung betreffs der Dampfentwidelung und der Dampfverwerthung.

Die transportable Dampfmaschine stellt sich dagegen als volle, ganze Maschine dar, als eine in sich abgeschlossene Individualität.

Indem die eigentliche Maschine mit dem Kessel vereinigt wird, dient letzterer als Fundament.

Bei größern Exemplaren wird, wie Taf. 31, Fig. 9 zeigt, der Kessel mit seiner Längsaxe in der Regel horizontal aufgestellt und demgemäß auch die Maschine

horizontal angeordnet, von welcher die auf dem Rücken der den Kessel enthaltenden Feuerkiste, und die Kurbelwellenmenscheiben auf dem Rücken der hinter dem Schornstein angebracht ist.

Kleinere Exemplare erhalten dagegen, wie auf Taf. 28 zeigt, meistens einen Kessel mit verticaler Maschine, von welcher die Kurbelwellen und die gekrümmte Kurbelwelle mit Riemenstücken verwendbaren Schwungradtheile angebracht erscheint.

Sollen die transportablen Maschinen Ortsveränderung unterzogen werden, wie Fig. 31, Fig. 8 zeigt, in einer Form, welcher gleichzeitig dem Maschinenkessel dient. Häufiger jedoch bleibt die Maschine in einer schützenden Hülle des Wagenlagers, die Maschine wird einfach auf ein paar verriegelte Räderachsen gestellt. In Taf. 7 und 6 veranschaulichten Form mit der Locomobile genannt, während in Fig. 9 und durch Fig. 9 auf Taf. 31 Gestalt Halblocomobile heißt.

Der Dampfentwiler der transportablen Maschinen ist meistens ein sogenannter Verticalcylinder, eine Einrichtung aus Betrachtung der Feuerkiste erkannt werden kann. Auf den Räderachsen ein einfacher Hohlcylinder aus Blech, auf dem Rücken die Maschine und den Kessel umgelegten Schornstein trägt. In Taf. 31 ist ein Beispiel von vielen engen Kessel, welches mit dem an der Seiten, durch etliche (hier 7) Anker oberhalb des Hohlcylinders Feuertraum verbunden ist, hier dargestellt, behufs des Reinigens aus dem Hohlcylinder herausgegeben, sonst jedoch mit der als Deckel dienende Platte an den Hohlcylinder angeschlossen wird.

Die Oberfläche des zu verdampfenden Wassers, welches die von den heißen Seiten durchströmten Röhren zu liegen kommen, nur bis etwas über das Röhrenbündel, oben Raum des Hohlcylinders frei ist. (Siehe die Kessel der Locomotiven auf Taf. 28.)

Die Maschine ist entweder zunächst auf einer Fundamentplatte und diese am Kessel befestigt (Taf. 28), oder direct auf letztem angeordnet (Fig. 1, 7 und 9). Da letzternfalls die Kurbelwellen und Kurbelwellenlager je nach der Wärme stattfindenden Ausdehnung der Entfernungen voneinander ändern müßten, so ist ein genaues Constantbleiben dieser Entfernungen ein Interesse eines möglichst reibungslosen Laufes, ein wichtiges Erforderniß ist, so für die Constructionsarten erachtet, welche neuerdings die englischen Maschinen auszeichnen.

Selbstverständlich können die transportablen Maschinen jede beliebige Größe, sondern die Dimensionen erhalten. Locomobilen von ein Drittel Mt. Durchmesser des Kessels, Leistung von 10—15 Pferdestärken, die größten Exemplare. Auch ist es möglich, die kleinsten Dampfmaschinen zu der Gattung gehören werden. Eine kleine Dampfmaschine von Mignon und Reuter, kleinste auf der letzten Wiener Ausstellung ein Cylinder von 0,03 Mt. Durchmesser und äußerte bei 300 minütlicher Umdrehung eine Leistung von ein Aentel Pferdestärke.

raft nur eines einzigen Arbeiters ersetzte. Ihr bender Kessel von etwas über  $\frac{1}{2}$  Mt. Höhe l. Durchmeßer wurde mittels eines mehrbunzen'schen Brenners durch Gas geheizt. jedoch noch kleinere Maschinen, welche zu rufen, mehr zur Spielerei als zu nützlichen oerwendeten und deshalb Spielzeug n genannten Motoren den Uebergang bilden.

## e Maschinen, Gasmotoren und andere modynamische Kraftmaschinen.

(Tafel 31.)

a vor Erfindung der Dampfmaschine seitens : Benützung der Gase des Schießpulvers che Substanz versucht wurde, so ist man rfindung derselben erklärlicherweise auf den er Verwendung anderer Dämpfe als der se und anderer Gase als der genannten ulvers gekommen und hat diesen Gedanken ueueste Zeit festgehalten, beziehentlich dessen ng mit periodischen Anläufen immer wieder ungestrebt.

nd die ersten Ideen nicht über das allge- etiren hinausgekommen, sodaß von einer r Entwicklung der dießbezüglichen Con- rst seit einem beinahe hundert Jahre nach ag der ersten Newcomen'schen Dampfma- enen Zeitpunkte die Rede sein kann.

### 1. Gaskraftmaschinen.

igerweise hebt diese Geschichte, wenn man wählten Schießpulverversuche Papin's ab- der Dampfmaschine, mit einer Heron'schen Reactionskugel an. Denn im Jahre 1791 Barber ein Patent auf eine derartige id auf einen Retortenofen, mittels welches able, Del oder sonst einer lohlenwasser- Substanz Gas entwickelt, in Verbindung rischer Luft jener Kugel zugeführt und in ch Entzünden zur Verbrennung, Ausdehnung a die Kugel in Umdrehung versetzen- gebracht werden sollte.

! später, also über hundert Jahre nach Pa- en mit dem Guericke'schen Cylinder und Newcomen'sche Maschine bereits an die in Thätigkeit gewesen war, ließ sich Street e patentiren, welche im wesentlichen aus le Papin'schen Cylinder bestand, in wel- es Dampfes ein explosibles Gemisch von itoffgas und Luft zur Verwendung kommen

bine, deren Construction mit derjenigen rirkenden Dampfmaschine übereinstimmt, er das mittels des elektrischen Funken- as- und Luftgemisch nicht nur durch Er- ern auch durch Expansion zur Wirkung der Leben 1799 und sucht die Einführung e wesentlich dadurch zu unterstützen, daß auf „ein neues Mittel behufs Verwen- mmaterialien zur Erzeugung von Wärme . h. ein Patent auf Leuchtgasfabrikation,

1823 läßt sich Brown die Anwendung Zusammenziehung des detonirten Gases n Raums anstatt der directen Wirkung, des Abkühlwassers patentiren. Bright wendet 1833 zur Entzündung des Gemisches statt des elektrischen Funken's

eine Gasflamme an. Die Maschine desselben ist direct und doppelwirkend, Luft und Gas werden mittels zweier Pumpen eingepreßt und das Mischungsverhält- niß wird durch den Gang der Maschine selbst mit Anwendung eines Kugelregulators geregelt.

Auch läßt sich James Johnstone 1841 eine Knall- gasmaschine unter ausdrücklichem Vorbehalt der Be- nützung einer Condensationswirkung dieses Gas- gemisches patentiren.

Zu das praktische Leben eingeführt wird diese Art von Maschinen aber erst durch die Leuchtgas-Motoren von Degraud und Hugon 1858 und von Lenoir 1860.

Es ist nämlich, wie hier sofort erwähnt werden mag, keineswegs gelungen, der Dampfmaschine mit diesen neuern Motoren im großen Ganzen erfolgreiche Con- currenz zu machen. Die Erfahrung hat vielmehr ge- lehrt, daß der Dampf eine bedeutend billigere moto- rische Substanz als das Gas ist. Daber mußten erst gewisse Bedingungen erfüllt werden, welche der Anwendung des Leuchtgases in gewissen Fällen ein relatives Uebergewicht über diejenige des Wasserdampfes ertheilen. Dieser Bedingungen gibt es im wesentlichen drei, nämlich erstens: die allgemeine Verbreitung der Benützung des Gases als Leuchtmaterial, zweitens: das Bedürfnis der Kleinindustrie, namentlich in grö- ßern Städten, nach Motoren, welche billiger als Meis- schenkräfte und explosionsfähiger als Dampfmaschinen sind, und drittens: die Nachfrage nach einem Motor, welcher nicht fortwährend, sondern nach willkürlichen längern Zeitpausen kurze Zeitperioden hindurch ver- wendet werden kann, ohne deshalb einer fortwährenden Erhaltung der Züganglichkeitsfähigkeit und eines beträchtlichen Kosten- und Müheaufwandes behufs er- neuer Zubeitriebsnahme zu bedürfen, wie dies bei einer Dampfmaschine wegen des anzudeizenden und im Feuer zu erhaltenden Kessels nöthig ist.

Eine in irgendeinem Locale irgendeines Stadtwerts eines städtischen Hauses ohne Furcht vor Explosions- gefahr aufstellbare Leuchtgasmaschine bedarf zur Zü- gangsetzung nichts Köstlicheres als ein Streichholz, mit welchem die Entzündungsflamme angezündet wird und kann durch einfaches Zudrehen des Gas- habns außer Betrieb bis zur abermaligen Zubeitrie- bnahme gesetzt werden, ohne während dieser Zeitdauer irgendwelche Betriebsunkosten zu verursachen.

Wenigstens paßt dieser Anspruch auf die später zu beschreibende Otto-Langen'sche Maschine und auf die- jenige von Hugon, welche eine mit einer doppelwir- kenden Hochraddampfmaschine ziemlich identische Con- struction hat, mittels eines Masebals das Gas in den Mischkasten pumpt und zwei Gasbrenner speist, welche die Entzündung des im Cylinder enthaltenen Gas- und Luftgemisches bewirken.

Die auf Taf. 31, Fig. 2 dargestellte Maschine Lenoir's, welche übrigens ebenfalls im wesentlichen die Con- struction einer doppelwirkenden Hochraddampfmaschine und zwar einer solchen von horizontaler Aufstellung hat, ist mit einer elektrischen Batterie, einem Abum- torf'schen Apparate, versehen, von welchem die Drähte links und rechts isolirt durch Dedel und Boden des Cylinders geführt und im Innern mit ihren Spitzen gegen die eisernen Wandungen geklümmt sind. Ein in die Cylindervandungen überpringender Funken, welcher mittels eines an der Kurbelwelle angebrachten und über eine (in unserer Abbildung sichtbare) Con- tactscheibe rotirenden zylinderartigen Stiftes jedesmal bald nach Ueberwindung des toten Punktes erregt wird, entzündet das dem Cylinder zugeführte Gas- und Luftgemisch, welches alsdann durch Expansion den Kolben bewegt. Nebenbei wie bei der Corliss-Dampf-



maschine sind vier Gaswege und zwei Schieber von eigentümlicher Form, separat für Ein- und Auslaß, angeordnet, und ein Mantel dient zur Aufnahme und Durchleitung von Kühlwasser behufs Parahydrung einer ohne diese Kühlung plötzlichen Ueberhitzung der Cylinderwandungen.

Der Gasmotor von Otto und Langen in Köln am Rhein (1864) besteht dagegen, wie Fig. 11 zeigt, aus einem verticalen Cylinder, welcher außer zu seiner Hauptfunction gleichzeitig als Träger für den oben auf demselben angebrachten Näder- und Wellenmechanismus dient und unten, etwa bis zur Hälfte seiner Höhe, von einem Mantel umgeben ist, in welchem das in dem nebenstehenden und mit ihm mittels zweier Nöhren in Verbindung gebrachten Gefäße enthaltene Kühlwasser circulirt. Die innere Einrichtung hat eine auffallende Aehnlichkeit mit einem verbesserten Papin'schen Apparate, welcher hier mehrfach als die Embryonalform der Dampfmaschine bezeichnet wurde.

Auch ist die Wirkungsweise mit derjenigen des Papin'schen Apparates insofern identisch, als das entzündete Gas- und Luftgemisch den unbelasteten, d. h. außer Eingriff gesetzten Kolben in dem oben offenen Cylinder in die Höhe treibt und durch seine nachherige Condensation dem atmosphärischen Drucke die Rolle der eigentlich bewegenden Kraft übermitteln, weshalb denn auch dieser Motor eine atmosphärische Gastraftmaschine heißt. Denn in der That erfolgt die Umdrehung der oben auf dem Cylinder gelagerten Pleiße- und Pleiße-Wellen nur vermöge des vom atmosphärischen Drucke niedergedrückten Kolbens, welcher mittels einer verzahnten Pleiße-Wellenstange auf einen eigentümlich construirten und mit jener Welle vereinigten Pleiße-Sperrenmechanismus einwirkt, wogegen während des arbeitslosen Ausganges des Kolbens die Umdrehung vermöge des relativ schweren Schwungrads fortgesetzt wird.

Wenn wegen dieser scheinbar primitiven Construction, für welche das Vorbild aus den Ursprüngen der Dampfmaschinenformen geholt zu sein schien, und wegen dieser ebenfalls scheinbar primitiven Wirkungsweise dem Langen'schen Motor selbst und sogar vorzugsweise von Sachverständigen anfänglich der Näder gelehrt wurde, so hat nach gewonnener besserer Einsicht der innere, tiefer liegende Gehalt dieser Erfindung um so mehr überrascht. Und in der That ist diese Maschine keineswegs ein Plagiat an der Papin'schen Primitivform, sondern eine Constructionsecht, durch welche die Ausnutzung einer ganz besondern Eigenschaft der hier in Frage kommenden motorischen Substanz, nämlich die der Explosionsfähigkeit, ermöglicht wird.

Bei der Hugon'schen und Lenoir'schen Gasmaschine findet die von Detonation begleitete Explosion des knallgasähnlichen Luft- und Leuchtgasgemisches durch seine nützliche Verwendung; die Wirkung derselben wird vielmehr in Erschütterungen der toten Massen aufgezehrt. Bei der Otto-Langen'schen Maschine dagegen ist deren Ausnutzung so beträchtlich, daß dieser Motor beinahe nur halb so viel Gas verbraucht als jene, nämlich pro Pferdestärke und Stunde, einschließlich des Consums des Entzündungslämpchens, nur 1,1 Kubikmeter im Vergleich zu 2 Kubikmeter.

Die Otto-Langen'sche atmosphärische Gastraftmaschine, welche übrigens, wie der Hugon'sche und Wellman Wright'sche Gasmotor, nicht den elektrischen Funken, sondern die Gasflamme zur Entzündung benutzt, würde aus diesem letzten Grunde ihre Concurrenten ohne Zweifel völlig verdrängen haben, wenn sie nicht den großen Uebelstand an sich trüge, nur mit lautem, klapperndem oder doch stöhnendem, hustenartigem Ge-

räusche zu arbeiten, während der Hugon'sche und Lenoir'sche Motor mit lautloser Bewegung functioniren.

## 2. Heißluftmaschinen.

Während noch viele andere, als die von Erfinder dem Bestreben nach Vermehrung des Gases, Knallgases und verwandter Gasgemische, konstruirte John Stirling 1817 zuerst für erhitze atmosphärische Luft, als die erste oder calorische Maschine. Der Stirling'sche Motor folgte 1833 auf dieser Bahn nach, wurde aber erst 1848 eine kleinere Maschine von fünf bis sechs Pferdestärken in Anwendung gebrachten Functioniren zu bringen. Inzwischen, welches diese und noch mehr andere Maschinen, welche Ericsson 1853 für die Schiffe und welche angeblich 600 Pferdestärken bei den Probefahrten jedoch nur 200 erreichte, wurde bald wieder gedämpft durch die thatsächlich ungünstigere Wirkungsweise, gegen Medenbacher auf Grund theoretischer Vorhersagen hatte.

Trotzdem entstand in jener Zeitperiode eine Reihe von diesbezüglichen Erfindungen, die beispielsweise eine in Fig. 10, Taf. 31, dargestellt ist.

Die genaue Beschreibung der inneren und Wirkungsweise derselben würde den hiesigen Raum zu sehr in Anspruch nehmen. Es wird daher nur im allgemeinen gesagt, daß die Maschine von Wilcox aus zwei bis drei Fuß Höhe in einen Ofen hinabhängenden Kasten von denen der vordere der Arbeit der Pleiße-Wellenstange ist. Die Pleiße-Wellen tragen in der Form von Pleiße-Wellen die Pleiße-Wellenstange, werden von der Pleiße-Wellenstange, welche in dem an der Pleiße-Wellenstange befindlichen Pleiße-Wellenraum erhitzt, und erhitzt ihrerseits wieder die Pleiße-Wellenstange. Die Pleiße-Wellenstange nach der Form dieser Pleiße-Wellenstange und oben ebenflächig. Derjenige der Pleiße-Wellenstange wirkt, jedoch nur bei der Pleiße-Wellenstange auf die Pleiße-Wellenstange ein, deren (hinten) Pleiße-Wellenstange ihn wieder nach abwärts treibt. Der Pleiße-Wellenstange des hinten sichtbaren Pleiße-Wellenstange wird dagegen mittels einer auf der Pleiße-Wellenstange, gefröpsen und um 75 Grad verstellten Pleiße-Wellenstange bewegt und sang an, als er erwärmte Luft in den Pleiße-Wellenstange drückt, dieses letztere jedoch nicht, sondern einen zwischen beiden Cylindern angeordneten Pleiße-Wellenstange. Dieser sehr einfache Namen tragende Regenerator, in welchem schon von Stirling und Ericsson im allgemeinen aus mehrfach über die Pleiße-Wellenstange abgezeichneten Pleiße-Wellenstange bestehend, hat den Zweck, der aus dem Pleiße-Wellenstange entzogenen Luft einen Theil von der Pleiße-Wellenstange hindurchgeleitete Luft wieder zu überhitzen eine völlige Ausnutzung der Pleiße-Wellenstange.

Diese Wilcox'sche calorische Maschine wie diejenigen von Stirling, Ericsson, Schwanke, Schwarzlopf, Young und u. s. w., relativ zum ausgeübten Pleiße-Wellenstange zu groß, zu complicirt, zu theuer, die Pleiße-Wellenstange der Concurrenten der

Wärmewirkungsgrad liefernden Dampf-  
verbindete.

hinder von calorischen Maschinen und die-  
welche eine übertriebene Leistung von denselben  
1, haben ohne Zweifel einen Umstand unbe-  
lassen, welcher von hervorragender Wich-

Derselbe besteht darin, daß die motorische  
des Dampfes in der Gestalt des siebzehn-  
il so wenig Raum als der abgehende Dampf  
den Wassers mittels einer unscheinbar kleinen  
die Maschine, in den Kessel, gepreßt werden  
dagegen die Luft in einem unverändert blei-  
gregatzustande und demnach ohne erhebliche  
sierung mittels einer sehr großen Pumpe in  
ne, in den Erhitzungsapparat, gepreßt wer-

Die verwertbare Leistung ist offenbar nur  
nz von derjenigen, welche vom Arbeitskolben  
und derjenigen, welche vom Pumpenkolben  
wird. Die letztere ist bei der Dampfmaschine  
ndend klein, daß man an dieselbe gar nicht  
und daß man die Pumpe als einen neben-  
Appendix zu betrachten und rücksichtlich der  
nutzung gar nicht zu beachten pflegt. Die-  
wegen bei der Luftmaschine so groß, daß sie  
kräftigen Bruchtheil der vom Arbeitscylinder

Leistung gleicht, und daß der Pum-  
wie Taf. 31, Fig. 10 vor Augen legt, sich  
macht, wie der Arbeitscylinder. Hierzu kommt  
folgender Umstand. Nur diejenigen calo-  
rischen, welche die Luft in bedeutend com-  
pacten zur Verwendung bringen lassen,  
beiläufig. Wird aber die Luft mittels der  
dichtet, so wird, wie beim pneumatischen  
ihre Temperatur sehr beträchtlich erhöht und  
nsfähig gemacht, noch viel Wärme bebüß-

1. Ausnutzung in sich aufzunehmen. Wegen  
den Erfahrung, daß die Luft nicht höher  
300 Grad erhöht werden darf, widrigen-  
falls eine Zerstörung der Maschine namentlich  
kargest, weil noch kein dieser hohen Tem-  
erstehendes Schmiermittel erfunden wurde,

2. Grenze der praktischen Ausnutzungsfähig-  
reicht, und die Maschine muß trotzdem ein-  
agskosten relativ zum geleisteten Effect sehr  
sehr machendes Volumen erhalten.

3. diese Herstellungskosten möglichst abzu-

Ericsson 1860 eine neue, compendiosere  
ist und damit damals in der technischen  
iederholtes, jedoch bereits abermals ver-  
sehen erregt. Diese Form ist Taf. 31, Fig. 5

Die Maschine besteht aus einem einzigen  
Cylinder, welcher (rechterhand) in einen  
agt, dessen Feuerthür und dessen den Cy-  
lantig umgebenden Kanäle in unserer Ab-  
rkenntnis sind. Dieser Cylinder dient, wie  
b derjenige der ältern Ericsson'schen Ma-  
eig als Arbeits- und als Pumpencylin-

t aus diesem Grunde zwei Kolben in sich  
mittels eines sehr sinnreichen, dieser Com-  
diesem Grunde einen wohlverdienten Ruf  
benden Kurbel- und Hebelmechanismus  
12- und voneinander bewegt werden, daß  
1 von frischer Luft, das Verdichten, Er-  
und Expandiren derselben in der die Ent-  
mechanischen Arbeit bedingenden Reihen-  
h geht. Ein Regelregulator ist bebüß  
Ganges, ein schweres Schwungrad aber  
sichtlich der Erzielung einer gleichförmigen  
nden wesentlich auch deshalb vorhanden,  
nur einseitig arbeitenden Kolben dieser

einfach wirkenden Maschine vermöge seiner lebendigen  
Kraft zurücktreiben muß.

Ericsson selbst hatte das Bestreben, dem Dampfe im  
allgemeinen mit der heißen Luft Concurrenz zu machen,  
offenbar aufgegeben und diese neue Form nur in der  
Absicht construiert, den Bedarf an geringen motorischen  
Kräften an solchen Orten zu befriedigen, wo die Dampf-  
maschine das Feld anlässlich ihrer Gefährlichkeit räu-  
men muß, und wo vorzugsweise nur die Menschkraft  
in Concurrenz tritt. Trotzdem erwies sich diese Con-  
struction auch auf diesem engeren Gebiete der Anwen-  
dung als nicht lebensfähig. Die Ausnutzung der  
Wärme war doch nicht günstig, der Kohlenverbrauch  
doch nicht gering genug, und namentlich zeigte sich eine  
unvorhergesehene, bald zur Reparaturbedürftigkeit füh-  
rende und die empfindlichen Nachtheile der Betriebs-  
unterbrechung mit sich bringende Zerstörbarkeit der Ma-  
schine. Der in das Innere des Cylinders hineinragende  
topfartige, metallene Jeneraum verbrannte nach kurzem  
Gebrauche und übte vermöge der von ihm ausgehenden  
strahlenden Wärme auch auf den Cylinder und den  
Kolben eine äußerst zerstörende Wirkung aus.

Durch Beseitigung dieser letztern Uebelstände hat es  
Lehmann in der neuesten Zeit verstanden, die Maschine  
praktischer zu machen. Die diesbezügliche Construction  
ist in Fig. 12 abgebildet. Sie besteht im wesentlichen  
aus den Mechanismen des soeben beschriebenen Eric-  
sson'schen Motors. Jedoch ist ein breiterer, den Arbeits-  
theil des Cylinders wirksamer vor Erhitzung schützender  
Kolben und demnach auch ein längerer Cylinder und  
namentlich ein voluminöserer und außerdem weniger  
zerstörbarer gemauerteter Ofen angewendet worden.  
Ericsson war in seinem Bestreben, die Maschine com-  
pender zu machen, offenbar zu weit gegangen. Er  
hatte durch Anordnung eines zu kleinen Ofens den  
Ausnutzungsgrad der Verbrennungswärme über das  
richtige Maß verringert und durch Anordnung eines  
zu kurzen Cylinders den Einflüssen der Zerstörung  
nicht genügend entgegengewirkt.

Ähnlich wie die Erfindungsthätigkeit rücksichtlich der  
Dampfmaschine durch den wissenschaftlichen Umschwung  
angefacht wurde, welcher, wie hier umfänglicher erör-  
tert ward, anlässlich der Entdeckung der Ursachen des  
Luftdrucks und der hieran sich anreihenden Erkenntnisse  
entstand, so belebten sich auch die Erfindungsbefrebun-  
gen hinsichtlich der calorischen und anderer thermo-  
dynamischer Motoren an der Errungenschaft der mecha-  
nischen Wärmelehre. Namentlich der Nachweis dieser  
neuen Lehre, daß die Dampfmaschine im Verhältnis  
zu der in der Kohle verborgenen und vermöge des  
Verbrennungsprocesses erregbaren Wärmequantität nur  
zwei bis fünf Procent und im günstigsten Falle höchstens  
deren acht ausnützen lasse, war auch wol geeignet, auf  
das Gebiet des Erfindens einer dem Dampf verdrängenden  
motorischen Substanz eine ermutigende Aussicht zu  
eröffnen. Jedoch wurde hierbei übersehen, daß die bei  
der Dampfmaschine auftretenden bedeutenden Verluste  
gerade so wie bei andern zu erfindenden thermodyna-  
mischen Motoren, in Umständen begründet sind, welche  
in eminentem Grade von den Preisverhältnissen der  
Herstellung und des Brennmaterials, von der Gefähr-  
lichkeit, von der Zerstörbarkeit und vielen andern wirth-  
schaftlichen und sicherheitspolizeilichen, im allgemeinen  
jogenannten praktischen Bedingungen abhängen. Die  
Dampftrast bedeutet vollkommener als bisher auszu-  
nützen, würde, theoretisch genommen, durch Steigerung  
des Dampfdrucks möglich sein, wegen Gefährlichkeit  
und Zerstörbarkeit ist dieses Mittel aber unanwendbar,  
ebenso wie bei den nur 300 Grad Lufterhitzung ver-  
tragen könnenden calorischen Motoren.

Der Reibungswiderstand zeichnet ebenfalls bestimmte Grenzen vor und läßt die Expansion nicht völlig ausnützen bei der Dampfmaschine, wie bei andern Motoren. Indem man aber vielfach das einfache, alle diese Umstände und Verhältnisse ignorirende, berechnete, theoretische Resultat der calorischen Maschine dem unter Einfluß derselben beobachteten praktischen Ergebnisse der Dampfmaschine gegenüberstellte, gelangte man zu einer irrigen, unberechtigte Erfolgsverheißungen betreffs der calorischen Maschine in sich schließenden Beurtheilung, während genauere Untersuchungen und richtigere Vergleiche lehrten, daß wir in unsern Dampfmaschinen die Wärme principiell so günstig verwertbar, wie es den Umständen nach nur möglich ist, und daß es sich nicht etwa um eine völlige Umgestaltung der Wirkungsweise derselben, sondern nur um eine Steigerung des Wirkungsgrades durch Vervollkommenung der einzelnen Bestandtheile handeln kann. Und ebenso wurde mehr und mehr erkannt, daß der Dampf die unschätzbare Eigenschaft besitzt, vermöge seiner Feuchtigkeith eine Schmierwirkung der reibenden Flächen und sogar ein Abdichten gegen Substanzverluste bei weitem vollkommener als die trockene Luft zu bewirken, weshalb z. B. auch die mit getrocknetem und überhitztem Dampfe betriebenen Maschinen die Erfolge vermissen ließen, welche auf Grund des motorischen Vorrangs dieser Dampfart über den gestätigten Dampf mit Recht erwartet werden konnten.

### 3. Feuerluftmaschinen.

Einer empirischen Auffassung der Sache lag es nahe, statt der durch Verbrennungsproducte äußerlich erwärmten Luft, die Verbrennungsproducte selbst, die Feuerluft, als motorische Substanz zu verwenden. Von den im Laufe der letzten Decennien entstandenen Maschinen dieser Art sind die Windbaufen'sche, die Belou'sche, die Wenham'sche und die Moyer'sche am bekanntesten geworden. Von letzterer, welche ihrerzeit (1863) in Amerika viel Aufsehen erregte, ist Taf. 31, Fig. 6 eine Abbildung gegeben. Auf dem cylindrischen, den Feuerraum enthaltenden Kessel ist der Arbeitscylinder und auf diesem wieder (in einigen Ausführungsformen auch neben demselben) der Pumpen- oder Compressionscylinder angebracht. Die Luft wird in den, übrigens nach erfolgter Entzündung hermetisch abgeschlossenen, Feuerraum durch das hinten sichtbare, nach abwärts gebogene Rohr gepreßt, und, gemischt mit den Verbrennungsproducten, in den Arbeitscylinder getrieben, wo sie den Kolben durch Expansion auswärts drückt.

Die Erwägungen, daß über 300 Grad heiße Luft oder heißes Gas die Cylinder und Kolben zerstört, daß in den Feuerstätten bei guter Verbrennung eine Temperatur von 1000 bis 1500 Grad entwickelt wird und daß daher, um diese letztere Temperatur auf die erstgenannte mittels Mischung herabzusinken, ein sehr bedeutender, die Verbrennung beeinträchtigender Ueberschuß an Luft um so mehr eingepumpt werden muß, als letztere durch Compression schon bedeutend erhitzt wird, hätte von dem Erfindungsbestreben zurückzuführen sollen. Nichtsdestoweniger hat man durch Anbringung von Abkühlungsmitteln, wodurch auszunehmende Wärme entzogen wurde, und von Schmiermitteln und Mitteln gegen Reibung, wodurch die Construction complicirt und theuer wurde, einen zufriedenstellenden Wirkungsgrad zu erreichen versucht, jedoch vergeblich. Und obenein hat man nicht genügend gewürdigt, daß die entstehenden Schladen und die mitgerissenen Aschentheile die Ursache zu ungewöhnlichen Mängeln werden würden. Man hat zur möglichsten Vermeidung dieser Uebelstände die Steinkohle von der Verwendung

ausgeschlossen und den reinern, wenn auch theueren Coal benutzt; allein man hätte noch weiter gehen und die Kohle nicht nur im vercoalteten, sondern im verschlachten und aschenreinem, gasförmigen Zustand anwenden müssen, und alsdann wäre man so gerathet bei der Gaskraftmaschine angelangt, mit dem allerdings Unterschiede, daß in letzterer gereinigtes, nämlich gasförmige Verbrennungsproducte liefernes Leuchtgas, an jenen aber ungereinigtes Heizgas wirksam war.

Die Mangelstellung der Leuchtgasmaschine, in welche in der That das Leuchtgas, zugleich als Brennmaterial und als Bestandtheil der motorischen Substanz, in welcher die Feuerluft des Leuchtgases als motorische Substanz wirkt, ist bereits gekennzeichnet worden. Eine ähnliche Stellung würde die Heizgasmaschine einnehmen, vielleicht sogar eine wirtschaftlich günstigere, insofern nämlich, als die Kosten für die Reinigung des Leuchtgases in Wegfall blieben. Die eigentlichen Bestandtheile der Leuchtgasmaschine würden aber bei dem Heizgasmotor erst dann zum Vorschein kommen, wenn das Vorhandensein einer städtischen Rohrleitung, angelegt etwa zum Zwecke der Beheizung, die motorische Substanz des Heizgases zu jeder beliebigen Zeit ohne weitere Vorbereitung fertig bezogen läßt. Und die Concurrenz im großen Ganzen mit der Dampfmaschine würde auch diesfalls nicht befürchten können.

Auch Napoleon III., sei hier nebenbei bemerkt, sich mit Feuerluftmaschinen befaßt: in Saint-Etienne den kurz vor der Zerstörung des Schloßes in gedruckten Sieger auf seinem Arbeitstische und unter behufs der Eroberung und Unterjochung Deutschlands ausgearbeiteten strategischen Plänen die Proben von S. du Fay über dessen durch ein Gemisch von Feuerluft und Dampf zu betreibender Maschine aufzuheben vor.

### 4. Aetherdampfmaschinen.

Bei dem Suchen nach andern motorischen Substanzen, als der des Wasserdampfes, hat man die Substanz, die kurz vor der Zerstörung des Schloßes in gedruckten Sieger auf seinem Arbeitstische und unter behufs der Eroberung und Unterjochung Deutschlands ausgearbeiteten strategischen Plänen die Proben von S. du Fay über dessen durch ein Gemisch von Feuerluft und Dampf zu betreibender Maschine aufzuheben vor.

Zu dieser Beziehung sind Schwefelkohlenstoff, Aether und Ammoniakgas Motoren erfunden worden. Der Aether z. B. hat die Eigenschaft, schon bei 35 Grad zu verdampfen und bei 100° eine Spannung von 7 Atmosphären anzunehmen, während der gesättigte Wasserdampf bei dieser Temperatur nur 1 Atmosphäre hat. Man kann daher mittels des Aetherdampfmaschine abgiehenden verbrauchten Aetherdampfes Aetherdämpfe von ziemlich hoher Spannung wieder in dieselben in einer neben der Dampfmaschine aufgestellten und dieser ähnlich construirten Maschine



verwenden, also diese Nebenmaschine ohne besondern Aufwand von Wärme oder Brennmaterial betreiben. Nach diesem Principe haben du Tremblay, Delaporte, Tellier, A. von Waeyenbergh und Andere Maschinen construirt. Die Anwendung eines Oberflächencondensators, d. h. eines aus vielen Röhren bestehenden Apparates, in welchem mittels an der Außenseite der Röhren circulirenden Wassers der aus der Innenseite derselben vorüberströmende, verbrauchte Aetherdampf condensirt wird, hat die abermalige und wiederholte Benützung ein und derselben Substanzverlusträume ermöglicht; allein wegen der enormen Verflüchtigungsfähigkeit des Aethers sind bis jetzt Unlichkeiten unvermeidlich gewesen, die hierdurch entstandenen Substanzverluste haben die Anwendung zu kostspielig und wegen der leichten Entzündlichkeit dieses Stoffs auch zu gefährlich gemacht. Ähnliches dem über den Aether Gesagten gilt auch betreffs der sonst noch verwendeten Dämpfe. Nur die Schwefelkohlenstoff-Dampfmaschine von Ellis verspricht neuerdings eine günstige Ausnahme hiervon zu machen, indem sie mit ganz besonders sorgfältig und eigentümlich construirten Stopfbüchsen und sonstigen, auf das Dichthalten Einfluß nehmenden Vorrichtungen versehen ist. Solche Maschinen werden in Amerika zum Betriebe von Fabriken verwendet, welche selbst keinen Dampfkessel haben, sondern zum Verdampfen des Schwefelkohlenstoffs aus benachbarten Fabriken borgeeignete Abdampe beziehen.

#### Regulatoren.

Bei den motorischen Maschinen wird die durch veränderte Belastung (Ruhwiderstand) veränderte Geschwindigkeit auf ein Normalmaß meistens mittels Veränderung im Zulassen der motorischen Substanz zurückgeführt. Entweder wird zu diesem Behufe eine im Zulußrohr oder Zulußkanale angebrachte Drossellappe beziehentlich ein Ventil, ein Schützen u. f. w. geschlossen oder geöffnet, oder es wird der Expansionsmechanismus verstellt. Dieses Verstellen oder jenes Öffnen und Schließen muß die Hand des Maschinenführers für den Fall bewirken, daß die Geschwindigkeit nach Maßgabe eines intelligenten Willens verändert werden soll, oder daß den auf die Veränderung derselben Einfluß nehmenden Umständen schon vor deren unregelmäßigem Eintreten entgegengegriffen werden muß (Locomotive, Fördermaschine, Dampfwinde, Walzwerkmachine). Für den Fall jedoch, daß die Geschwindigkeit der Maschine unter allen Umständen nach Maßgabe einer bestimmten Gesetzmäßigkeit sich verändern oder fortwährend und ohne Rücksicht auf den jeweilig zu überwindenden Widerstand unverändert bleiben soll, werden Apparate angewendet, mittels deren die Einstellung der genannten Drossellappe oder sonstiger Vorrichtungen von der Maschine selbst bewirkt wird. Dieselben heißen Gouvernateure oder Regulatoren.

Die einfachsten dieser Apparate sind die konischen Ventile, Centrifugal- oder Schwingkugeln-Regulatoren.

Wie schon bei früherer Gelegenheit erwähnt, war Watt, welcher diesen Apparat in der Construction der Dampfmaschine einführte. Aus der besondern, von ihm gewählten und nach ihm benannten, unter anderem auf Taf. 29 in Fig. 1 dargestellt Form, ist ein ganzes Heer von andern Formen entstanden, von denen ein allerdings nur relativ geringer Theil an der auf den Tafeln 29 bis 31 dargestellten Maschinen abgebildet erscheint.

Indem die Angeln des Watt'schen Regulators, welche auf einer mit der Maschine in Verbindung ge-

brachten rotirenden Welle befestigt wird, durch Vergrößerung der Geschwindigkeit vermöge der Centrifugalkraft ihrer Masse auseinandergetrieben werden, bringen sie die erwähnte Drossellappe oder eine ähnliche Vorrichtung zum partiellen Abschluß mittels eines zwischen ihnen oder ihren Armen und jener Klappe angebrachten Hebels, Räder- oder Stangenmechanismus.

Es ist bemerkenswerth, daß die Größe des Gewichts der angewendeten Schwingkugeln nur auf die Schnelligkeit, mit welcher bei stattfindender Geschwindigkeitsänderung die Drossellappe verstellt wird, Einfluß nimmt, und somit die sogenannte Empfindlichkeit des Apparats bedingt, nicht aber, wie wol vermeint zu werden pflegt, die Stellung, die Lage oder den Ausschlagwinkel beeinflusst. Dieser letztere hängt vielmehr lediglich von der Geschwindigkeit ab, mit welcher die Welle des Regulators umgedreht wird.

Eine Gruppe der erfindenen Constructionsformen hat, wie die Watt'sche, die Eigenschaft, für jede Geschwindigkeit eine bestimmte Lage, einen bestimmten Ausschlag anzunehmen, also für eine gewisse Geschwindigkeit auch immer wieder eine gewisse Lage aufzusuchen und in dieser Lage zu verharren. Man nennt daher diese Gruppe die statischen Regulatoren. Eine andere Gruppe ist dagegen derartig construiert, daß die Kugeln auch bei Wiedereintritt der normalen Geschwindigkeit diejenige Position innehalten, welche sie durch Veränderung der Geschwindigkeit erlangt haben, und daß sie daher bei einer und derselben Geschwindigkeit beliebig verschiedene Lagen einnehmen können. Dieselben heißen aus letztem Grunde astatische Regulatoren.

Die astatischen werden den statischen Apparaten vorgezogen, weil sie zufolge der soeben gegebenen Darstellung die Möglichkeit bieten, daß die Drossellappe oder eine dieser ähnliche Vorrichtung in der Lage verbleibt, welche sie bei veränderter Belastung des Motors einnehmen muß.

Jedoch kann dieses Erforderniß auch mittels der statischen Regulatoren erreicht werden, sobald dieselben mit dem die Drossellappe bewegenden Zwischenmechanismus in selbstthätig ausdrückbare Verbindung gebracht werden.

Specifisch gleich und nur graduell verschieden, wie das Gewicht der Schwingkugeln, wirkt das Gewicht der Hülse des Regulators auf den Empfindlichkeitsgrad desselben ein und außerdem nimmt dieses letztere Gewicht auch Einfluß auf den Ausschlag.

Eine Beschreibung oder selbst nur Nennung der Bezeichnung der verschiedenen in Anwendung gekommenen und befindlichen Constructionsarten von Centrifugalregulatoren würde die Grenzen des hier gebotenen Raums überschreiten.

Auch die sonst noch angewendeten Regulatoren anderer Art können hier nicht besprochen werden. Nur einer dieser letztern ist beispielsweise Taf. 31, Fig. 3 und 4 dargestellt. Dieser vom Amerikaner Allen in der jüngsten Zeit erfundene und 1872 in Europa eingeführte Regulator besteht aus einer etwa zu drei Vierteln ihres Inhalts mit Oel gefüllten Trommel von wellenförmiger Umfangsfläche und innerlich (Fig. 4) mit einspringenden Rippen versehen. Dieselbe ist lose auf einer Welle angebracht, welche mittels Riemenscheibe von der Maschine gedreht wird und hierdurch mit etwa 400 minutlichen Umdrehungen ein auf ihr befestigtes Schaufelrad (Fig. 4) bewegt. Vermöge dieser Drehung wird auch, vermittels des Oels, die Trommel nach derselben Richtung in Bewegung gesetzt, andererseits hieran aber durch ein Gewicht (Fig. 3) verhindert, welches durch Kette und spiralförmig gebogenen Hebel mit der

Trommel in Verbindung steht. Ein ebenfalls am Zapfen der Trommel befestigtes Rahmrad greift in ein Zahnradsegment ein und schiebt letzteres und somit auch den mit dessen Arm verbundenen Stellmechanismus nach rechts oder nach links, je nachdem die Geschwindigkeit des Motors dem Schaufeltrabe eine raschere oder langsamere Umdrehung erteilt. Hierdurch wird die Verstellung eines Drosselventils und somit die Regelung des Ganges bewirkt.

## Locomotiven.

(Tafel 32 und 33.)

Die Locomotive kann als ein Fuhrwerk bezeichnet werden, auf und an welchem eine motorische Maschine und ein Mechanismus angebracht ist, welcher mit Hilfe jener Maschine die Fortbewegung der soeben bezeichneten Gesamtheit und gleichzeitig den Transport von angehängten andern Fuhrwerken oder sonstigen Lasten bewirken läßt.

Die Locomotive unterscheidet sich von den bereits besprochenen Locomobilen im wesentlichen durch den an ihr angebrachten Fortbewegungsmechanismus. Der Hauptbestandtheil dieses Bewegungsmechanismus besteht bei den modernen Constructionsformen fast nur aus Rädern, den Treibrädern, welche entweder einen glatten Umfang haben und diesfalls vermöge ihrer Reibung beziehentlich ihrer, die Ursache der letztern bildenden Abkäsion an der berührten Bodenfläche wirken, oder einen rauhen, beziehentlich verzahnten Umfang besitzen und diesfalls vermöge Eingreifens in den relativ weichen Untergrund oder in eine an letztern befestigte Zahnstange den zur Fortbewegung erforderlichen Widerstand finden.

Das angewendete Fuhrwerk ist meistens ein Wagen, mitunter auch ein Schlitten (Taf. 33, Fig. 6) und die motorische Maschine ist bei den derzeitigen Locomotiven durchweg eine Dampfmaschine.

Je nach der Beschaffenheit des Untergrundes, der Straße oder Bahn werden die Locomotiven verschiedenartig konstruirt und als Eisenbahn-, Straßen-, Feld- und Eis locomotiven unterschieden.

Die Straßen- und Feld locomotiven werden auch wol Zugmaschinen genannt, und falls die Vorrichtung des Ziehens und Transportirens angehängter Lasten in Wegfall kommt und nur ein Transport aufgelegter Lasten, beziehentlich aufgesetzener Personen stattfindet, so wird die früher wol allgemein für die Locomotive angewendete Bezeichnung: Dampfswagen, Dampfomnibus, Dampf Schlitten u. s. w. gebraucht.

### 1. Eisenbahn locomotiven.

#### a. Geschichtliches.

Die schon lange in den Köpfen von Erfindern lebendig gewesene Idee der Construction einer Locomotive hat wol in frühern Zeiten in dem Spul einer Gespenstergeschichte in Gestalt eines ohne Antstich und Werde sich bewegenden Wagens ohne Tummelplatz, aber bis auf die jüngsten Tage keine praktische Verwirklichung gefunden, ja man darf sogar behaupten, daß selbst heute eine Lebensfähigkeit, die Zugkraft der Pferde oder allgemeiner der physiologischen Motoren durchweg ersiehende Locomotive noch nicht erfunden wurde.

Nur auf dem engeren Gebiete der Eisenstraßen oder Eisenbahnen sehen wir die diesbezüglich rege gewordene Erfindungsthätigkeit von Erfolg, hier aber auch von überraschendem und staunenswerthem Erfolge gekrönt.

Die eigentliche Geschichte der Erfindung der Locomotiven hebt daher erst von dem Zeitpunkt an, wo Eisenbahnen angewendet wurden. Dieselben gingen

aus den zuerst, nämlich im 16. Jahrhundert, in Deutschland beim Bergbau benutzten Holzbahnen hervor, indem die diese Bahnen bildenden hölzernen Schienen aus Langhölzer zunächst mit schmiedeeisernen Klätschienen benagelt, später, nämlich etwa 1700, in England durch gußeiserne Schienen ersetzt und diese wieder (1829) durch schmiedeeiserne, stählerne oder verstellte schmiedeeiserne Hochschienen verdrängt wurden.

In gleicher Weise, wie an die Entdeckung der Eisenbahnen knüpft sich die Erfindung der Locomotive und an die Erfindung der Hochdruck-Dampfmaschine, d. h. derjenigen Dampfmaschine, welche, mit höher gespannten Dämpfen arbeitend, des Condensators entbehren und relativ geringe Dimensionen erhalten konnten, aus beiden Gründen zur Erbringung der ersten Wagen ohne erhebliche Beeinträchtigung der Raumbedeutung geeignet ist. Es erscheint aus diesem Grunde erklärlich, daß der Erfinder der Hochdruckmaschine, nämlich der schon bei der Geschichte der Dampfmaschine Erfindung genannte Amerikaner Oliver Evans, auch zum Erfinder der Locomotive wurde. Dessen Locomotive, mit dem Namen „Drucker Amphibole“ wurde 1801 angestrichen und fuhr 1803 durch die Straßen von Philadelphia.

Für die Entwicklung und Vervollkommenheit der Erfindung, welche außerdem zu der Gattung der Eisen locomotiven im engeren Sinne des Wortes zu zählen ist, bot aber Amerika keinen Boden. Erst vollzog sich vielmehr in England, wo, unabhängig von Evans, im Jahre 1802 Trevithick und Vivian erst die Anwendung der Hochdruckmaschine für Wagen erprobten und 1804 eine Eisenbahn locomotive in Gang setzten. An diese erste englische, noch primitiv konstruirte Art schlossen sich in rascher Folge eine andere, nicht minder unvollkommene Bauart, welche zum größten Theil als Bewegungsmechanismus in eine verzahnte Mittelschiene eingegriffen, die Zahnrad oder statt des Rades einen gegen die Schiene sich anstemmenden, stalenartigen Apparat hatten, mit complicirten, verticalen Balancier-Dampfmaschinen versehen waren. Im Jahre 1815 — 30 hat jetzt Georg Stephenson mit einer Construction hervorgehoben, welche sein Sohn, Robert Stephenson, übrigens unter Benutzung von Verbesserungen anderer Erfinder, von 1828 an zum Muster für die noch heute gebauten Locomotiven ausbildete und durch unter den Mitarbeitern an dieser Erfindung die Rangstellung sich erwarb, welche Welt unter den Erfindern der Dampfmaschine einnimmt.

Die Erkenntniß, daß die Reibung oder Abkäsion eines glatten Rades auf der glatten Schiene zur Bewegung völlig genüge, sofern die Bahn nicht horizontal gebaut werde, und daß nur bei Ermittelung dieser Bedingungen ein zufriedenstellender Erfolg zu erreichen sei, ferner die horizontale Anordnung der Dampfmaschine und die Anwendung der, eine Leuchtdeutere und viel Dampf produciren lassende Hochdruckmaschine, beschränkten Raume in sich fassen lassen die Vervollkommenheit der Locomotive geworden, ebenso wie die Einführung der ersten Umlenkung und mannichfaltige Veränderungen des Expansionsgrades bewirken lassenden Stephenson'schen Coullisse, von welcher Taf. 32, Fig. 1 eine verbesserte, nämlich die Allen'sche, Form vorliegt. Auch die Ansaugung des Feuers mittels des Erbauers oder Blasebogens (s. Strahlpfeife)

anstatt mittels des ursprünglich verwendeten Blasebalgs oder diesem ähnlicher Vorrichtungen ist von hervorragender Bedeutung gewesen.

### b. Allgemeine Einrichtung.

Nach Robert Stephenson und dessen Mitarbeitern ist die Bauart der Locomotiven wesentlich zu der auf Taf. 32, Fig. 13 im Längsschnitt und in Fig. 6 in Aufsicht (jedoch verkleinert) dargestellten geworden.

Der Wagen besteht aus zwei parallel zur Bahnrichtung angeordneten, vorn durch den Bufferballen p und an mehreren andern Stellen mittels Quer- und Diagonalstücken verbundenen und versteiften Rahmen. Dieselben umschließen (Fig. 3, 8) und stützen sich auf Achsbüchsen, in welchen die Zapfen der Treib- und Laufräder l gelagert sind, die, abweichend von den gewöhnlichen Wagenrädern, mit ihren Achsen fest verbunden sind und daher letztere an ihrer Drehung theilnehmen lassen. Auch bilden die Umfänge der Räder nicht, wie bei den gewöhnlichen Wagen, schwach gewölbte Cylinder, sondern sind nach außen konisch verjüngt und haben innen einen Rand, einen Flantsch (Fig. 3, 9).

Der Rahmenbau ruht jedoch nicht unmittelbar auf den Achsbüchsen, sondern hängt an den Enden von Federn, welche ihrerseits mittels einer in ihrer Mitte angebrachten Stange auf die Achsbüchsen sich stützen. Die Achsbüchsen sind in verticaler Richtung beweglich, behalten aber in horizontaler Richtung ihre Lage bei, verschieben sich daher bei der Stellung der Locomotive auf horizontaler Bahn in genau verticalen Leitern, so daß wol behufs Abwehrgung der von den Unebenheiten der Bahn verursachten Stöße ein Auf- und Niederschwanzen des Baues, aber nicht eine horizontale Verschiebung desselben auf den Achsen möglich ist. An den Rahmen ist die Dampfmaschine befestigt. Dieselbe ist eine Zwillingmaschine, d. h. besteht aus zwei Maschinen, welche auf die mit rechtwinklig verstellten Kurbeln derselben Treibachse einwirken. Eine solche Zwillingmaschine erweist sich als nöthig wegen des Erfordernisses, daß die Locomotive bei jeder Stellung der Kolben, also auch bei derjenigen des todtten Punktes eines derselben in Bewegung gesetzt werden muß. Die beiden Cylinder dieser Zwillingmaschine sind entweder äußerlich oder innerlich an den Rahmen befestigt und lassen ihre Kolben mittels Kolbenstangen und Lentstangen (Lenter, Kurbel-, Treib-, Schub-, Pleuel-, Pleuel-, Pleuelstangen) auf die entweder äußerlich an den Treibrädern, oder innerlich an den Treibachsen vermöge deren Abkröpfung angebrachten Kurbeln k einwirken (Fig. 13). Die Cylinder sind genau oder nahezu horizontal angeordnet, weil andernfalls die Trinde der Kolben- und Lentstangen anstatt lebighen eine Drehung der Kurbeln auch in unerwünscht erhöhtem Grade eine Zusammenpressung und Ausdehnung der Tragfedern m bewirken würden.

Auf der Treibachse sind für jede der beiden Maschinen zwei excentrische Scheiben (Fig. 17) befestigt, die eine für den Vorwärts-, die andere für den Rückwärtsgang der Locomotive. Mittels der Excentricringe und Excentricstangen wirken dieselben, wie ein Kurbelmechanismus, auf die Coullisse ein, deren mittels Hebelwert n vorzunehmende Auf- und Niederschiebung den Gang des Steuertriebers gemäß eines größeren oder geringeren Expansionsgrades oder des erwähnten Vor- und Rückgangs regeln läßt. Die Grundrissfigur 16 zeigt im Durchschnitt zwei innerlich angebrachte Cylinder f mit Kolben j, Dampfammer G, Dampfkanälen, Auslasschiebern, Schieberstangen a und Führungsebenen oder Geradführungen l.

Auf dem Wagen, also zwischen den Rahmen ist der Dampfessel angebracht (Fig. 13). Er ist derartig daran befestigt, daß eine infolge seines Heißwerdens entstehende Ausdehnung, also eine Verschiebung auf dem Rahmenbau möglich wird. Derselbe besteht aus der Feuerkiste n, den Rauchröhren h, welche (oft über 200 an der Zahl) zwischen der letztern und der Rauchkiste c angebracht sind, dem die Feuerkiste umschließenden Wasserfaß q und dem die Rauchröhren umschließenden Cylinderteffel f; ferner aus dem Dome o und der Esse d. Das Wasser befindet sich in dem Zwischenraume, welcher von den mittels sehr vieler Stehboizen und Auler aneinander befestigten und versteiften Feuer- und Wasserfaß gebildet wird, und zwischen den Rauchröhren. Der Raum über dem die obersten Rauchröhren um einige Centimeter überflutenden Wasser und der Dom sind zur Aufnahme des entwickelten Dampfes bestimmt. Das Dampfrohr g, welches mittels des Regulators (eines Schiebers) und der Regulatorstange f vom Führerstand aus geöffnet und geschlossen werden kann, führt den Dampf in die Dampfammern und Cylinder, das Rohr h läßt den verbrauchten Dampf aus den Cylindern ab- und durch den Exhaustor in die Esse strömen (s. Strahlpumpen). Vermöge dieses Vorgangs wird vermittelt, daß der äußere Atmosphärendruck in den Aefenfall und durch den Kofst u die frische Luft, sowie durch die Rauchröhren b die Verbrennungsgase pressen kann. Zu erwähnen ist noch das mit einer Spiralfeder i belastete Sicherheitsventil und das Speiserohr w, welches von dem hinten an die Locomotive gehängten (Fig. 9) als Proviant- oder Munitionswagen dienenden, nämlich ein Wasserreservoir und einen Raum für Kohle oder Coal enthaltenden Tender das Speisewasser herzu- und welches an der bezeichneten Stelle w mittels einer Vorrichtung zusammengefaßt ist, welche die zwischen Locomotive und Tender stattzuhabende Gelentigkeit nicht hindert.

Auch kann noch der dicht über den Schienen angebrachten und häufig mit Drahtseilen versehenen Räume r als übrigens sehr nebenher gedacht werden. Der dicht vor der Einheizthüre angeordnete Führerstand wird neuerdings meistens mit einem schützenden Häuschen umgeben oder doch überdeckt.

### c. Das Gewicht und die Adhäsionskraft. Kuppelung.

Da die Adhäsion der Umfänge der Treibräder an den Schienen die Ursache für die Fortbewegung bildet, so ist es behufs Ausübung großer Zugkräfte erforderlich, diese Adhäsion möglichst groß zu machen. Dies wird durch entsprechende Belastung der Treibräder bewirkt, und diese Belastung ist ein Theil des Eigengewichts der Locomotive. Mittels geeigneter Anspannung der den Bau tragenden und auf die Achsbüchsen der Räder sich stützenden Federn kann man es dahin bringen, daß fast jeder beliebige Bruchtheil des Gesamtgewichts als Belastung auf die Treibachse übertragen wird, und daß die Laufachsen, d. h. die nicht mittels des Motors bewegten, sondern nur den Wagen unterstützenden Achsen, nur einen geringen Theil des Gewichts auf sich zu nehmen haben.

Würde die an den großen Rädern kenntliche Treibachse in Fig. 3 und 9 mit dem ganzen Gewichte belastet und würden demnach die vorn und hinten angebrachten Laufachsen gar keine Belastung erhalten, so würde das ganze Gewicht der Locomotive zum Betriebe derselben ausgenutzt, und der durch Belastung der Laufachsen entstehende schädliche Reibungswiderstand möglichst beseitigt werden.



Allein diesfalls würde die Locomotive im labilen Gleichgewichte auf der Treibachse schweben, sich horizontal auf den Schienen drehen und somit leicht entgleisen können. Aus diesem Grunde und aus den fernern, daß eine zu intensive Belastung den Unterbau der Eisenbahn gefährdet, sowie Radreifen und Schienen zerstört, sieht man von der bezeichneten günstigen Verteilung des Gewichts ab und wendet die Bauart der genannten Fig. 3 und 9, welche übrigens bezüglich der Radstellung ziemlich identisch mit den ersten Constructionen von Robert Stephenson ist, für weniger Zugkraft ausübende Schnellzug-Locomotiven an.

Man umgeht aber die bezeichneten Uebelstände durch das Auskunftsmittel der Anbringung mehrerer Treibachsen, sobald die Lasträder völlig oder zum Theil entbehrlich, beziehentlich in Treibräder umgewandelt werden. Zu diesem Zwecke wird aber meistens nicht eine die accessorischen Treibachsen bewegende besondere Dampfmaschine angebracht, sondern einfach eine mittels Kuppelstangen bewirkte Verbindung derselben mit der Haupttreibachse vorgenommen, sobald die eine Zwillingss-Dampfmaschine sämtliche Treibachsen in Umdrehung versetzt. In Fig. 1, 2, 5, 10, 11 und 14 sind auf diese Weise zwei Treibachsen, in Fig. 4, 6, 8 und 15 deren drei und in Fig. 12 deren vier aneinandergekuppelt.

Die Frage entsteht, weshalb nicht stets nur gekuppelte Treibachsen und gar keine „tote Last“ bewegende Laufachsen angewendet werden?

Hauptsächlich stehen einer derartigen Anordnung die Krümmungen, die Curven der Bahn entgegen. Eine in eine scharfe Krümmung gestellte Locomotive, von oben betrachtet, wird erkennen lassen, daß die starre Vereinigung mehrerer Treibachsen den voneinander entfernten Rädern zwischen den Schienen keinen Platz läßt, weshalb bei gewaltsamer Durchführung dieser Construction ein Auseinanderdrängen der Schienen und ein Entgleisen die verhängnisvolle Folge sein würde.

Um die Treibachsen aus diesem Grunde möglichst dicht aneinanderdrücken zu können, muß man kleine Räder anwenden, was für Schnellzug-Locomotiven nicht geeignet ist. Daher die Beibehaltung der Radstellung in Fig. 3 und 9 für Locomotiven dieses Zwecks, mit ungewöhnlich großen Treibrädern, welche zuerst Cramp-ton angewendet. Daher aber auch die Anwendung der gekuppelten Treibachsen für langsamere laufende oder kräftiger ziehende Güterzug-Locomotiven.

Die Gebirgsbahnen nöthigen zur Anwendung besonders kräftiger Locomotiven und weisen doch auch naturgemäß besonders scharfe Krümmungen auf; ferner lassen sie die Benützung des ganzen Gewichts zur Verkehrskraft in hervorragendem Grade als wünschenswerth deshalb erscheinen, weil die tote Last über die Höhe des Gebirgs transportirt werden muß. Man ist daher ganz besonders für diese Bahnen Locomotiven mit gekuppelten Rädern anzuwenden und die hiergegen durch die Krümmungen verursachten Schwierigkeiten zu besiegen bemüht gewesen. Auch bezog hierzu noch der fernere Grund, daß bei der Thalfahrt die Locomotive den durch sein Gewicht in zu heftige Geschwindigkeit gerathenden Zug aufhalten muß, und daß die zu diesem Zwecke angewendete Gegenampfwirkung um so kräftiger ausfällt, je mehr gekuppelte Achsen vorhanden sind.

#### d. Drehgestelle, Tendermaschinen, Engerth's, Meyer's und Fairlie's System.

Zunächst sucht man den Einfluß der Krümmungen durch Anbringung von Drehgestellen zu paralysiren. Solche Drehgestelle oder Wendeschemel sind kleine zwei-

oder vierräderige Wagen, auf welchen der Vordertheil oder auch der Hintertheil des Kessels ruht, jedoch soartig, daß eine Beweglichkeit möglich ist, insofern eine Drehung des Gestells oder Wagens und eine Einstellung desselben in die Curven stattfinden kann. Zu diesem Zwecke steht das Gestell nur mittels eines Zapfens oder Bolzens mit der Locomotive in fester Verbindung und dieser Bolzen ist, wie in Fig. 1 (Nowotny's System), 2 und 4 (Morris' System), in der Mitte des Gestells oder auch außerhalb desselben mehr nach hinten, angebracht. Letzternfalls dient der Bolzen nicht gleichzeitig als Stütz- und Drehpunkt, sondern nur als Drehpunkt, und die Stützung erfolgt durch eine auf dem Wagen oder Schemel angebrachte Kreischiene. Ist das Gestell letzternfalls einachsiger, heißt es Wispelgestell, ist es zweiachsiger, so wird es nach seinem Erfinder das Baefsen'sche genannt.

Um die tote Last völliger auszunutzen und auch diejenige des Tenders, welcher (Taf. 32, Fig. 3, 9) ebenso unnütz, wie ein unbezahlter schwerer Bodensack mittransportirt, mitgeschleppt werden muß und welche Schleppender heißt, so hat man nicht nur ähnliche Achsen der Locomotive, sondern auch die des Tenders aneinandergekuppelt, also sämtliche Laufachsen zu Treibachsen gemacht. Ein Beispiel der Art ist die Semmering-Locomotive von Engerth, in der äußern Form nach der Fig. 12 abbildet.

Dieselbe hat drei gekuppelte Locomotiv- und eine gekuppelte Tenderachse. Die eine der beiden letzteren ist aber vermöge einer eigenthümlichen Bauart der Tender, auf welchen der Hintertheil des Kessels ruht und mit welchem derselbe verbolzt ist, so nahe an die hinterste Locomotive gerückt, daß mittels eines auf ihr befestigten Zahnrades, eines unten auf einer Zwischenwelle sitzenden und eines oben auf jener Locomotive befestigten Zahnrades der Maschinenkraft in sich aufnimmt und durch Kuppelstangen auch den übrigen Tenderachsen mittheilt.

Auch hat man statt dieses Zahnradmechanismus eine Zwischenwelle mit Kurbelmechanismus angewendet. Beduht die Umgebung dieser schwierigen und der Nutzung und Zerstörung unterworfenen Verbindung man ferner den Tender völlig mit der Locomotive einigt, d. h. das den Tender ausmachende Kohlenreservoir und den Kohlenraum auf der Locomotive selbst angebracht und somit die sogenannten Tender-Locomotiven construirt. Taf. 32, Fig. 4 zeigt ein Beispiel dieser Art und läßt erkennen, daß die Wasserkästen über den Rahmen sich befinden. Dasselbe werden aber auch in den Rahmen selbst angebracht oder fahrfertig auf dem Kessel angeordnet.

Sehr schwere Züge werden durch Verbinde zweier Locomotiven bewegt. Werden hierzu Locomotiven mit lauter gekuppelten Achsen verwendet, ist die auszubende Zugkraft außerordentlich groß und auch kostspielig, namentlich deshalb, weil für die Maschinen doppeltes Personal Dienst thun muß. Es ist Uebelstand zu vermeiden, daß Fairlie gewöhnlich zwei Tenderlocomotiven fest miteinander verbindet, jedoch sie namentlich hinsichtlich der Bedienungsschicht nur als eine einzige behandelt werden. Die Fairlie'sche Construction macht äußerlich den Eindruck eines stamieschen Bruderpaars, welches aus zwei Rädern zusammengekauften ist. Zu den besten gehören die beiden Kessel dieser Duplexlocomotiven aus einem einzigen Stück, die Feuerkisten ebenfalls derselben sind in der Mitte, die Cylindern beider äußersten Enden angebracht. Auch die beiden Maschinen mit ihren vier Cylindern sind dazwischen gebracht, daß die Cylindern an den äußersten Enden

erscheinen. Allein jede dieser Maschinen, also der Motor, ist an einem mit drei getuppten Achsen versehenen Drehgestell befestigt, welches Motorgestell genannt wird, im Gegensatz zu dem nur Laufachsen enthaltenden Laufdrehgestell oder Laufgestell der Fig. 1 und 4. Die beiden Motorgestelle stellen sich unabhängig voneinander in die Curven ein, der lange feste Doppelstiel stützt sich auf dieselben, ohne deren Ausweichung zu hindern, und so ist eine gefahrlose Durchfahung sehr starker Krümmungen möglich.

Eher als Fairlie hat Meyer eine Duplexlocomotive mit zwei Motorgestellen construirt, jedoch die vier Cylinder in der Mitte angeordnet und nicht den Kessel selbst, sondern besondere Gelenkstrangen zur Verbindung der Motorgestelle angewendet. Ja eigentlich traten beide letztgenannten Tendermaschinen schon bei den Concurrentlocomotiven der Semmeringbahn 1851 auf, indem dort das jetzt sogenannte Fairlie'sche System durch die Locomotive „Seraing“ von Lausmann und das Meyer'sche System durch die Locomotive „Wiener Leutnant“ von Günther vertreten war.

Dem Meyer'schen und Fairlie'schen Systeme wird von vielen Seiten eine vielversprechende Zukunft prophezeit. Theoretisch genommen, rüchlich der Ausnützung des vollen Gewichts als Treibmittel, wäre diese Prophezeit auch berechtigt sein. Aber auf der Semmering- und Brennerbahn z. B. werden Tendermaschinen überhaupt nicht für zweckmäßig gehalten, weil deren Adhäsionsgewicht in dem Maße, als der Wasser- und Kohlenvorrath verbraucht wird, sich verringert und daher viel weit auseinanderliegenden Wasser- und Kohlenstationen einer bedenklich großen Differenz unterworfen. Man hat daher auf der Semmeringbahn auch die Ansepfung des Tenders aufgegeben und verwendet neuerdings Locomotiven ohne Drehgestell mit vier getuppten Maschinenachsen und einem Schleppender (Fig. 12).

Ueberhaupt erscheint es nicht rathsam, die Zugkraft in der aus dem Gewichte resultirenden Adhäsion allein abhängig zu machen. Unter allen Umständen leiden Abrieb und Schiene von der hieraus hervorgehenden ungentüglialkraft in bedenklichem Grade, und die Nothwendigkeit zur Anwendung bedeutend höherer und starkerer Schienen und eines erheblich festern und kostspieligern Unterbaues überhaupt, jedoch der wohl aufstellte Vergleich eines Kampfes zwischen Locomotivgewicht und Bahnbau mit demjenigen zwischen Projectil und Panzerplatten als völlig zutreffend erscheint. Ist schwerer als die Achse des schwersten Radwagens, so ist die Achse der Locomotive belastet sein; nur dieses brauchte die Bahn mit sämtlichen Objecten nicht übertrieben solid gebaut zu werden, als es jetzt häufig wegen der schweren Locomotiven nöthig ist.

**Ersatz des Adhäsionsgewichts. Fell's System.**

Man hat daher wiederholt statt der Adhäsion den Magnetismus anzuwenden getrachtet; jedoch erfolglos. Die Anwendung eines Sandstreuers, wie derselbe Taf. 32, Fig. 14 als Cylinder dicht über dem Rahmen der dem Laufachsen erkennbar ist, und welcher mit Westrensen der Schiene mit Sand den Reibungscoefficienten, also die Adhäsionskraft, verstärken soll, ersieht sich nicht viel über die Palliativmittel und dient nicht allzu häufig zur gelegentlichen Abstumpfung schäbiger, den Reibungswiderstand vermindender Einwirkungen.

Ein anderes von den vielen diesbezüglich versuchten Kunstmitteln ist die Anwendung einer Mittelschiene zur Benutzung einer nach Fell'schem Systeme con-

struirten Locomotive. Auf Taf. 33 zeigen Fig. 7 und 8 eine solche Locomotive mit Bahnstrecke.

Gegen die überhöhte Mittelschiene wirken von rechts und von links vier horizontale Räder, welche durch einen in der halb durchschnitten dargestellten Grundrissfigur 8 erkennbaren Federmechanismus angepreßt und von einer unten liegenden Zwillingsmaschine bewegt werden, so daß die beiderseitige Druckkraft die Mittelschiene nicht niederbrückt oder verschiebt, sondern nur deren Substanz oder moleculare Structur zusammenzupressen trachtet. Außerdem sind noch zwei getuppte Treibachsen gewöhnlicher Art vorhanden, und die Maschine ist eine Tenderlocomotive mit seitlich vom Kessel über den Rahmen angebrachten Wasserläufen.

Dieses System, welches für eine über den Mont-Cenis vor vollendeter Durchtunnelung desselben gelegte Interimsbahn construirt war, hat jedoch viele praktische Mängel.

Bei der zur Erseickung des Rigi und auch neuerdings des Kahlenbergs bei Wien angelegten Bahn ist man auf den historischen Ausgangspunkt wieder zurückgetreten und hat eine verzahnte Mittelschiene und mit entsprechenden Zahnradern versehene Locomotiven angewendet; wegen der abnormen Steigungsverhältnisse wohlberechtigt.

**f. Die Dampfmaschinen der Locomotiven-Störende Bewegungen und Ausbalancirung.**

Die als Motoren der Locomotiven benutzten Dampfmaschinen haben sich im allgemeinen in ihren Constructionsformen und sogar in ihren Dimensionen seit Robert Stephenson nicht wesentlich verändert. Zwei völlig oder nahezu horizontale Cylinder werden entweder äußerlich, wie Taf. 32, Fig. 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12 und 14, oder innerlich, wie in den Fig. 3, 6, 8, 13 und 15 angebracht. Der in jedem derselben hin- und herbewegte Kolben treibt mittels Kolben- und Ventstange meistens direct die Kurbel- und Haupttreibachse, auf welcher in den meisten Fällen die auf eine (gewöhnlich Stephenson'sche) Coullisse einwirkenden Excenter angebracht sind. (In Fig. 1, 12 und 14 erscheinen letztere äußerlich angebracht).

Diese übliche Constructionsart der Dampfmaschinen ist, von einem gewissen Standpunkte aus betrachtet, keineswegs eine zweckmäßige.

Infolge der fortwährend hin- und hergeschleuderten Gewichte der Kolben, Kolbenstangen, Ventstangen, Kuppelstangen u. s. w. verändert der Schwerpunkt der Locomotive fortwährend seine Lage und bewegt sich nicht, wie es für den ruhigen Gang erwünscht wäre, nur in der Richtung der Fahrbewegung fort.

Infolge der aus der Wirkungsweise des Kurbelmechanismus resultirenden veränderlichen Drücke gegen den Rahmenbau werden die den ganzen Bau tragenden Federn fortwährend verschoben stark gespannt, bald diejenigen der einen Seite mehr als diejenigen der andern, bald die vordern mehr als die hintern.

Aus diesen mechanischen Ursachen gehen eigenthümliche Bindungen, Schwingungen und Schaukelungen hervor, welche man die störenden Bewegungen zu nennen pflegt.

Die hin- und hergehenden schweren Bestandtheile erzeugen für sich allein Bewegungen, als würde die Locomotive in der Bahn hin- und hergezogen (das Zuden) und als führe sie schwänzelnd in horizontalen Schlangenlinien (das Schlingern oder Schlängeln). Die veränderlichen Drücke auf die Federn ertheilen der Locomotive Bewegungen als wogte sie auf und nieder (das Wogen), als wäre sie ein Schaukelstuhl (das Riden oder auch Galopiren) und als wäre sie eine Kinderwiege (das Wanken oder Wiegen).

Die ersten beiden dieser Bewegungsarten können zwar durch Balancirungsgewichte, welche, ebenso wie die Gegengewichte für die schweren Kurbeln, an den Treibrädern angebracht werden, ausgeglichen und die übrigen durch eine entsprechende Bauart theilweise paralisirt werden. Allein anderweite Umstände lassen diese Ausgleichen unzuverlässig erscheinen. Daher würde es vorthellhaft sein, eine Dampfmaschinenconstruction anzuwenden, welche möglichst wenig hin- und hergehende Massen enthält, oder noch besser, welche deren gar keine hat und auch ohne Kurbelmechanismus wirkt.

Diesbezüglich würde z. B. eine in Fig. 7 dargestellte Maschine mit oscillirenden Cylindern, in welchen sich zwei Kolben gegen- und voneinander bewegen, eine Lösung der Frage bilden. Noch zweckentsprechender aber würde eine Maschine mit rotirenden Kolben, also eine sogenannte rotative Maschine sein, deren Kolben unmittelbar auf der Treibachse zu befestigen wäre und die auch mit einem einzigen Cylinder auskommen ließe, wenigstens behufs der Ueberwindung des todtten Punktes deren zwei nicht nöthig machen würde.

Allein die ungleich schwierigere solide Anbringung der oscillirenden und der hinsichtlich des Dampferverbrauchs äußerst ungünstige Wirkungsgrad der rotativen Maschinen haben noch immer bei der Verwendung der gewöhnlichen horizontalen Maschinen verbleiben lassen. Der Ausgleich der bezeichneten störenden Bewegungen wird durch wenigstens theilweise Anbringung der erforderlichen Gegengewichte und durch Balancier, d. h. doppelhebelartige Bestandtheile, zu bewirken versucht, welche die Drücke der Federn gleichmäßig vertheilen.

Diesbezüglich ist z. B. in Fig. 5 ein Balancier zwischen den gekuppelten Treibrädern behufs Aufnahme der einseitigen Federdrücke dieser Räder in einem über der Stuppselstange befindlichen Ausschnitte des Rahmens angebracht, während Fig. 3 und 11 die in den Treibrädern befestigten Gegengewichte zeigen.

Die hinsichtlich der Bauart der Locomotive aus der rein objectiven wissenschaftlichen Untersuchung hergeleiteten Normen sind mit den aus der allgemeinen Praxis und allerdings auch weniger von den thatsächlich äußerst wichtigen Einwirkungen des Zustandes des Bahnbaues abstrahirenden, vielmehr diesen letztern und die Betriebsverhältnisse concreter berücksichtigenden subjectiven Ansichten der Maschineningenieure so sehr verquickt, daß völlig feste Regeln beim Bau der Locomotiven noch keineswegs befolgt werden.

Der eine hat mehr Meinung für diese, der andere für jene Constructionsart, je nachdem sein Urtheil auf mehr theoretische oder auf lebendig praktische Auffassungen gegründet ist. Selbst das massenhafte angehäufte statistische Material läßt keine feste Urtheilsbasis gewinnen.

Jedoch im allgemeinen und für das Laienauge sind sämtliche Locomotiven der Jetztzeit, wenn auch verschieden hinsichtlich ihrer Bestimmung für Schnellzüge oder Güterzüge, für ebene oder Gebirgsbahnen, für gerade oder stark gekrümmte Geleise, ziemlich von gleicher Einrichtung.

### g. Aeußerlichkeiten. Gewicht und Zugkraft.

Die Abbildungen auf Taf. 32 zeigen daher, daß in allen Ländern und unter allen Zonen, in Deutschland, England und Frankreich, in Rußland und in Ostindien die äußere Form fast dieselbe ist.

Nur die amerikanische, in Fig. 2 abgebildete Locomotive weist eine äußerliche jedoch bedeutungslose Verschiedenheit insofern auf, als vor derselben behufs Verstärkung der in den dortigen unweglichen Gegenden

häufiger auf der weniger sorgfältig überwachten abgelagerten Objecte oder verordneten Dienen gitterförmige Klämer angebracht sind, als nicht eigenthümlicherweise statt der beiden über der Lokomotive befindlichen Laternen nur deren eine vor der Lokomotive besetzt und, ähnlich den Dampfschiffen, statt der schrillenden Signalpfeife auf ihrem Rücken eine Glocke trägt.

Die jetzt gebauten Locomotiven werden mit 2 Pehholbt bis zu 100000 Kilogr. schwer, und nachdem sie Personen- oder Güterzugmaschinen mit einem Adhäsionsgewichte (Druck gegen die Räder) von beziehentlich 25000 bis 30000 und 30000 bis 80000 Kilogr. gebaut, sie üben an den Rädern ihrer Treibräder eine Zugkraft von beziehentlich 10000 und 6000 Kilogr. aus und haben eine Leistungsfähigkeit von beziehentlich 600 und 400 Pferdestärken. Als Personenzug-Locomotiven eine größere Leistung, denn als Güterzugmaschinen, welcher vielmehr der Umstand von der größeren Geschwindigkeit der Lokomotive herrührt. Früher rechnete man als mittlere Leistung der Locomotiven 200 Pferdestärken.

### h. Schleppender.

Auf Taf. 33, Fig. 9 und 10 sind zwei Schleppender abgebildet, der erste von gewöhnlicher amerikanischer Bauart und Einrichtung, der letztere jedoch von Besonderheit, daß eine Füllung des Wassertrogs mitten auf der Stredde erfolgen kann, ohne den Tender und der Zug angehalten werden.

Zu diesem Zwecke ist auf einer längeren Strecke der Bahn ein langer Wassertrog zwischen den Schienen angebracht. Der Tender aber, von dem unten erfunden, hat im Innern seines Bodens ein dicht auf dessen Boden über einer Oefenöffnung festgesetztes Rohr, sowie eine zweite an dicht anzubridende, aber auch mittels Treibung an der unteren, nach unten gebogene Abdrücke, welche in den erwähnten Wassertrog gebracht werden und alsdann vermöge des aus der Tragfläche hervorgehenden Stoches ein Schöpfen des Wassers aus den Füllen des Tenders bewirkt.

### 2. Straßenlocomotiven.

Wenn von den bereits in dem kurzen geschichtlichen Abriss betreffs der Eisenbahnlocomotiven noch vor Entstehung der Schienenwege unterzogenen verfehlten Versuchen hinsichtlich der Construction von Straßenlocomotiven oder Straßendampfwagen zu sehen und der diesbezüglichen Bestrebungen zu Robinson und Watt (1759), sowie von Cugnot nur obenhin gedacht und auch die schon bei den Locomotiven bezeichnete, bereits bei den Straßenlocomotiven genannte Construction Grand's nicht berücksichtigt wird, so kann eigentlich erst seit 1830 an mit historischen Verzeichnungen der Locomotiven Gegenstandes begonnen werden.

Daß die Erfindung einer für eine Straßenlocomotive geeigneten Construction im allgemeinen keine Schwierigkeiten bot, nachdem bereits im 19. Decennium O. Stephenson seine Eisenbahnlocomotive in das Leben gerufen hatte, scheint einleuchtend. Allein die unebene Straße, selbst die glatte, und natürlich noch mehr der Felsweg, vertheilt diesbezüglich doch so wesentlich anders, als die ebene mit nur geringen Stetigungen und ganz besonders für den Zweck der Locomotive hergestellte Eisenbahn, daß höchst eigenartig und keineswegs erwartete Schwierigkeiten überwinden mußten. Nur derjenige, welcher das Ziel



reinen Trude vor Augen hat, der von den einträderu einer Eisenbahnlocomotive bebufs Erregung die Fortbewegung bebingenden Abhäsionskraft ge- die feften eifernen und verftählten Schienen aus- ibt werden muß, wird an die Löfung des Problems Fortbewegung eines Wagens und gar einer Zug- schine mittels Drucks der Räder gegen die Oberfläche er immerhin relativ weichen und nachgiebigen Straße r gerechter Befandeneit hinantreten.

für die glatte, ebene Gifläche scheint die Möglich- des Gelingens schon näher zu liegen. In der at ist daher auch der Veruch nicht ganz misglückt, her auf der Nema mit der auf Taf. 33, Fig. 6 construir- Locomotive angeftellt wurde; dieselbe ist sehr ähn- einer Eisenbahn-Lenbermaschine mit fättelförmig auf t Kesself angebrachten Waffertäften construiert, hat ch statt der Laufräder einen Schlitten und statt der ten Treibräder solche von mit Stacheln versehenen inen.

Allein die Sprödigkeit des Eises bleibt immerhin inderniß in der Durchfahung ein und derselben r und mehr beschädigt werdenden Trace, und der is der Anwendbarkeit ist ein beschränkter. Auch sich seit 1862, dem Zeitpunkte der Erfindung dieser Locomotive, von einer weitem Verwendung nichts nehmen lassen.

Schon viel früher, nämlich 1846—54, war eben bestrebt gewesen, der Schmierigkeit des zu iden Untergrundes durch Anbringung einer fteppbahn zu begegnen. Wie aus Taf. 33, Fig. 4 zu hen, wird hier von den beiden mittels Zahnrädern regten Treibrädern das Gleis mitgeschleppt, indem selbe aus sechs flachen ineinander passenden und t dem Treibrade foder verbolzten Stüden besteht, ke nach Maßgabe der Fortbewegung nacheinander t der Maschine selbst vor die Treibräder gelegt den. Diese flachen Stüde dringen namentlich auf wegen und auf den Feldern selbst nicht so tief die Treibräder in den Boden ein, finden auf let- n einen größeren Reibungswiderstand als die Treib- er und bieten wiederum diesen eine beträchtlichere ästion dar, als dieselben auf dem Boden haben den. Ein Wenzelschemel mit Steuerarrad und jugen- glichen Mechanismus, vorn vor dem Rauchkasten des fess angebracht, läßt ein Lenken bewirken. Allein r der vielfach günstigen Erfolge ist doch diese Loco- tive auf einem nur engen Gebiete von Anwendungs- en brauchbar und vermag wegen ihres langamen gses, ihrer hohen Anschaffungs- und Betriebskosten, ie wegen der häufigen Reparaturbedürftigkeit des m auch sinnreichen, so doch complicirten Mechanismus r den gewöhnlichen Umständen mit den üblichen substernen keineswegs erfolgreich zu concurriren. s wurde daher 1862 wiederum ein System pro-, welches einfach vermöge der Reibung der Rad- änge auf der Oberfläche der Straße fortzulommen te, und zwar wurden hierbei sowohl rauf gemachte r mit Vorprügeln und Querriegen versehene als r einfache glatte Radumfänge, jedoch von solcher te angewendet, daß die Räder fast das Aussehen Chausseewalzen haben.

ach der Constructionsart von Garrett und Sohn geführt zeigt Fig. 5 die dicht hinter dem Kesself ordnete Treibachse, welche von der (nach Locomo- els) hinauf angebrachten einspindigen Maschine ns Zahnradvorgelege und Gelenksette benegt wird, rend vorn beufus des Lenens ein Wisfelartiges hegeßell angebracht ist.

sehr ähnlich ist auch Fig. 2 construiert, jedoch mit Unterschieden, daß zwei Gelenksetten angeordnet

sind und dieseinige für die Treibachse eine mittlere ho- rizontale Lage hat, was bezüglich der entstehenden Bodenpressungen bedeutungsvoll ist.

Ueber diese Zugmaschinen erläufte sich jedoch auf der hamburger Ausstellung (1862) die Locomotive von Schwarzlopf in Berlin den Sieg.

Dieselbe untercheidet sich, in Fig. 1 mit angehäng- tem Wagen abgebildet, von den früheren durch das Vorhandensein von sowohl auf der Treib- als auf der Laufachse angebrachten Federn und einer mittels Cou- lissensteuerung steuerbaren Zwillingssmaschine. Beide Steuerungen, allerdings von der Eisenbahnlocomotive entnommen, jedoch von den früheren Erfindern der Zugmaschine nicht genügend gewürdigt, haben zur Er- reichung des günstigen Erfolgs wesentlich beigetragen. Uebrigens aber erfolgt die Bewegung, nicht wie bei den Eisenbahnlocomotiven direct, sondern vermittels eines zwischen der Maschine und der Treibachse angeordneten (linkerhand unter dem Kesself erkennbaren) Zahnradvorgeleges, und das Lenken wird vermittels eines (rechterhand unter dem Vorderwagen sichtbaren) Kettenrades durch Wendung der mit kleinen Rädern versehenen Laufachse bewirkt.

Die Transportkosten mit einer solchen Schwarzlopf- schen Locomotive und 5 bis 6 angehängten Lastwagen haben sich einschließlich der Amortisation und Verzin- sung des auf 7000 — 8000 Thaler für den ganzen Train sich belaufenden Anschaffungskosten und ein- schließlich des Lohnes für die Bedienungsmannschaft und des Chausseegeldes zu 3 Pfennige per Centner und Meile ergeben, wobei die Fahrgefehwindigkeit eine Meile per Stunde ausfiel.

Das Gewicht der Maschine beträgt 9000 — 10000 Kilogr. und die Pferdestärke höchstens 20 — 25.

Aus Taf. 33, Fig. 12 ist zu ersehen, daß die innere Ein- richtung einer Straßenlocomotive hinsichtlich des Kessels mit derjenigen einer Locomobile übereinstimmt, indem in einem linkerhand sichtbaren verticalen Waffertasten die Feuerkiste mit Rost (hier in der Zeichnung wegge- lassen) angebracht erscheint und von hier aus in einem horizontalen Cylinderkesself bis zum rechterhand zu er- kennenden und die Eise auf sich tragenden Rauchkasten ein Bündel von engen Rauch- oder Feuerrohren an- geordnet ist. Da die Straßenlocomotiven Tenderma- schinen sind, so findet sich auch hier ein Waffertasten vor, nämlich unter dem Führerstande (linkerhand) hinter dem Kesself, zwischen welchen beiden die Treibachse an- gebracht erscheint. Die Maschine mit ihrer Coullissen- steuerung ist bei dieser Construction unter dem Kesself angeordnet, und der beufus des Lenens der kleinen Borderräder vorhandene Mechanismus ist durch den Rauchkasten geführt, um mittels horizontaler Welle und Schraubenrädern vom Führerstande aus regiert werden zu können.

Die äußere Form eines Dampfwagens oder einer Dampftralefche, d. h. eines zum Transporte von Personen geeigneten und durch Dampfkraft betriebenen Fuhrwerks ist, nach der Constructionsart Nidert's, in Fig. 3 abgebildet, und die innere Einrichtung eines Dampfomnibuss laun aus Fig. 11 ersehen werden. Linkerhand ist ein Sitz für den Heizer vor dem Kesself angebracht, welcher ebenso, nur beträchtlich kürzer, wie ein Locomobilekesself eingerichtet erscheint. rechterhand ist über der Laufachse ein Sitz für den, einen zuver- derst angebrachten Lenkhebel ergreifen fönnenden Con- ducteur angeordnet. In der Mitte auf den Tender- kästen befinden sich die gepolsterten Sitzpläze für acht Personen; auch laun, wie die punktirten Linien an- deuten, eine Ueberdachung angebracht werden. Die Maschine befindet sich unter dem Boden der Sitzpläze

und wirkt mittels Vorgelegewelle und Zahnradern auf die (linkerhand) unter dem horizontalen Theile des Keßels angeordnete Treibachse.

Der besonten Erwähnung bedarf es nicht, daß weder eine Dampfmaschine, noch ein Dampfomnibus und ebenso wenig eine Straßenlocomotive, Zugmaschine oder traction-engine erfunden wurde, welche zu der Ausnahme berechtigt, daß den jetzt üblichen Arten des Fortkommens im allgemeinen wirksame Concurrenz gemacht werden könnte. Auch die neuerdings mit Ammoniakmaschinen betriebenen Strahlen-Eisenbahnwagen, welche ursprünglich so viel Aufsehen in Amerika erregten, scheinen trotz der zufriedensstellenden Versuche des Generals Beauregard schon wieder beiseite geschoben zu sein.

### Die Luftschiffahrt.

(Tafel 34.)

Wenn auf den übrigen Tafeln der Maschinentechnik bis auf einige wenige Ausnahmen nur Maschinen und Apparate dargestellt wurden, welche dem Prüfstein praktischer Bewährtheit widerstanden haben, so kann diese letzte Tafel nur Abbildungen von Constructionen bieten, welche rücksichtlich ihrer Wirkungsweise als motorische Fahrzeuge noch keineswegs von Erfolg gekrönt wurden.

Luftballons, welche sich in höhere Regionen der Atmosphäre erheben und von der Strömung der Winde und demnach in der Richtung derselben fortbewegt werden, bilden nicht die Lösung des Problems, welches die Luftschiffahrt sich zum Gegenstande genommen hat. Sie bilden es ebenso wenig, wie der Nachen ohne Steuer und ohne Ruder, welcher ins Meer hinausgeschoben, von den Wogen desselben hin- und hergeschaukelt wird und den Strömungen desselben willenslos folgen muß, die Lösung der Aufgabe der Wasser- schiffahrt enthalten würde. Und daß letztere, gegen Wind oder nach anderer als der herrschenden Luftströmung zu bewegendes Luftschiffe noch nicht erfunden wurden, ist schon aus dem einen Umstande bekannt, daß unsere Widersacher im glorreichen Kriege von 1870—71 trotz der äußersten Anstrengungen und trotz fieberhaft erregter und angespannter Erfindungskraft nicht im Stande waren, ihre Luftposten anders als nach den Launen des Wetterwechsels zu befördern.

Frei, wie der Vogel in der Luft, sich bewegen, je nach Willkür diese oder jene Richtung einschlagen, oder doch, wie mit der Locomotive auf der Eisenbahn oder mit dem Schiffe auf Fluß und Meer, bestimmte Routen innehalten zu können: dieses Problem ist bis jetzt unlösbar geblieben. Wir sprechen daher nur von dem Versuch seiner Lösung, welcher im wesentlichen zwei Richtungen eingeschlagen hat. Erstens hat man den Flug der Vögel, Insekten oder Fledermäuse als Vorbild genommen und Flugmaschinen zu construiren versucht, zweitens hat man das Schwimmen des Fisches im Wasser nachahmen und den Luftballon steuerbar machen wollen.

#### 1. Ballons, Aerostaten.

Ein Ballon der herkömmlichen oder ursprünglichen Art, von mehr oder weniger kugel-, ei- oder birnenförmiger Gestalt, bewegt sich bei Windstille vertical in die Höhe und bei Luftströmungen in einer schräg ansteigenden oder genau genommen in einer krummen Bahn, die mit wachsender Höhe immer mehr der horizontalen Richtung sich nähert. Ist er in einer gewissen Höhe angekommen, so bleibt er schweben oder bewegt sich in der Richtung des in dieser Höhe herrschenden Windes horizontal fort.

Daß die Ursache dieser Erscheinung von der Form der specifischen Gewichte des Ballons (nämlich seines Füllungsstoffs) und einer seinem äußeren Volumen gleichkommenden Luftmenge berührt, und daß dieselbe völlig identisch mit derjenigen ist, welche die Bewegung eines vom Boden des Meeres aufsteigenden Stückes Holz oder eines sonstigen leichteren als Wasser wiegenden Körpers zu Grunde liegt, ist nicht erst jetzt, sondern wurde schon vor Erfindung der Luftballons erkannt.

Denn wenn von dem vom Jahre 1694 datirenden Berichte des Missionars Vassou, nach welchem im Jahre 1306 ein Ballon in Peking aufsteigen sein soll, abgesehen, und wenn daher den Bewohnern des kaiserlichen Reichs das Prioritätsrecht in gleicher Weise, wie a. Guntstern Verthold Schwarz' bezüglich der Erfindung des Schießpulvers, vorenthalten wird, so bleibt die Erfindung des Ballons erst auf das Jahr 1783 zu verlegen sein, sofern die Erzählung von dem Aufsteigen des Portugiesen Don Guzman in einem mit Feuerluft gefüllten Papierballon glaubhaft erweist, und sie ist auf das Jahr 1783 zu verlegen, sofern die Construction der Gebrüder Montgolfier als die erste weisbar zuerst existirende und den Ausgangspunkt der heutigen Formen bildende betrachtet wird; falls aber hat man vor dieser Zeit jene rein theoretische Anschauung gehabt.

Dieselbe wurde, ohne daß man die Erfindung selbst kannte, offenbar an die Entdeckung des Luftdrucks und der Ursache desselben geknüpft, was nach unsern Darlegungen diese Entdeckung als Ausgangspunkt für die Erfindung der Dampfmaschine bildet. Denn nachdem 1630 die Entdeckung der Schwere der Luft von Torricelli und 1648 die Entdeckung der Luftpumpe von Otto von Guericke gemacht war, treffen wir schon 1670 auf einen diesbezüglichen Vorschlag Lana's, welcher mit Segeln ausgetragenen Ballons von dünnem Kupferblech berieten und dieselben luftleer pumpen wollte. Auch verfaßte Simon in Altdorf bei Nürnberg 1678 diese Idee, und mit der Entdeckung des Wasserstoffgases von Cavendish 1766 sprach Professor Wlad in Göttingen 1783 von dem geringen specifischen Gewicht dieses Gases in Theorie vom Aufsteigen eines mit demselben gefüllten leichteren Behälters klar aus und fand 1782 in Laplace, Lichtenberg und Cavallo Experimentatoren, welche an mit Wasserstoff-gefüllten Seifenblasen die Idee bestätigten.

Es ist daher höchst wunderbar, daß, trotzdem die wissenschaftlicherseits so nahe vor der Realisirung der Erfindung stand, dieselbe doch um diese Zeit auf dem empirischen Wege gemacht wurde.

Die Idee Lana's und Sturm's ist allerdings praktisch werthlos. Ein Behälter, welcher durch Luftleerwerden leichter als die Luft gemacht werden soll, muß durch Widerstande leisten gegen den äußeren Luftdruck in den Wandungen erbalten, daß sein Gewicht dasjenige Maß weit überschreiten würde. Aber seitdem der Luft gleiche Pressung vierzehnfach weniger als die des wiegenden Wasserstoffgases entdeckt war, hätte man auf die Idee der Verwendung eines papierenen leichteren Stoffs, statt der zu diesem Zwecke benutzten Seifenblase kommen können.

#### a. Montgolfieren, Charlières.

Nichtdeftoweniger dachten die Papierfabrikanten Montgolfier, obgleich nicht etwa unwissende Praktiker, sondern schon durch ihre Erfindung des papierenen Widerstands rühmlichst als denkende Köpfe bekannt, keineswegs an specifisches Gewicht, Auftriebskraft,

ung von specifisch leichten Gasarten u. dgl., sonderblich die glückliche Inspiration zu ihrer Erfindung notorisch lebendig aus der Betrachtung der umliegenden und dahinziehenden Wolken. Könnte eine solche Wolke in eine leichte Hülle einschließen, ließe sie diese Hülle durch die Lüfte tragen; diese Hülle wäre das Resultat einer offenbar richtigen ersten Anschauung. Und da der Rauch, so folgerten sie, ohne Zweifel weiter, ebenfalls wie die Luft aufsteigt und sich bewegt, so braucht man nur einen leichten, aus Papier oder Leinwand hergestellten Ballon ein Feuer zu entzünden und den Rauch selbst einströmen zu lassen, um ihn zum Aufsteigen zu bringen.

Das Papier, dessen Anwendung den beiden Papierentwerfern nahe lag, erwies sich als zu zerbrechlich, Leinwand als zu wenig dicht. Sie stellten daher einen Ballon von Leinwand her und füllten denselben mit Wasserstoffgas aus. Mit Rauch gefüllt stieg dieser Ballon, wie in Fig. 1 abgebildet ist, bis zu taumelndem Höhe in die Luft. Der Tag dieses ersten gelungenen Aufstiegs war der 4. Juni 1783.

Am 28. August desselben Jahres, also nicht drei Monate später, erfolgte die Aufsteigung des ersten Ballons, den Professor Charles gefertigten und mit Wasserstoffgas gefüllten Ballons.

Wissenschaft hatte sich des Problems angenommen, oder, besser gesagt, sie war durch die Montgolfiers auf den schon längst gesuchten, aber noch gefundenen richtigen Weg geführt. Man konnte man wissenschaftlicher Zweifel in der Möglichkeit der Herstellung einer genügend festen, genügend dichten und genügend dichten Hülle gesetzt, wenn man die Anwendung des Wasserstoffgases dachte, so an nun eine diesbezügliche Construction vor sich, suchte man noch die Entzündlichkeit des in Wasserstoffgas zu entwickelnden Wasserstoffgases, so man durch die sicherste erzeugte Theilnahme an dem Drängen des gesammelten Publicums erzielte, den Versuch zu wagen, und durch die hierzu nöthigen Geldmittel in die Lage gebracht, ihn zur Ausführung zu bringen. Das Wagniß erscheint möglicherweise zwar gering, wenn wir Hunderte von jenen, rothen, ebenfalls mit Wasserstoffgas gefüllten Ballons als Kinderspielzeug heute umhertragen und in die Luft fliegen sehen. Wir erfahren auch die Durchlässigkeit des Gummis, aus welchem sie hergestellt sind und welcher sie in wenigen Tagen zerfallen macht und können daher einen Schluss auf die Schwierigkeit der Herstellung eines dichthaltenden Ballons ziehen.

Die Rücksicht auf die Stellung der Empirie und der Wissenschaft zum Erfinden höchst beachtenswerth, die Montgolfiers nach ihrem ersten glücklichen, rein empirisch gefassten Gedanken, die thörichtesten bezüglich der Vervollkommenheit ihrer Erfindung. Daß nicht der eigentlich specifisch schwerere, sondern die durch die Hitze des Rauchs ausgetriebene und hierdurch sammt dem Rauch leichter gewordene Luft es war, welche das Aufsteigen des Ballons ermöglichte, erkannten sie keineswegs, trotzdem sie von Wissenschaftlern wiederholt darauf aufmerksam gemacht und bezüglich belehrt wurden. Indem sie vielmehr erfolglos, den entwickelten Wasserdampf, endlich um die Wolke nachzuahmen, versuchten, sie die im Rauche vermeinte Electricität für beleuchtend und forschten daher nach unendlich überdehnbaren Zusammensetzungen von ungeraden Stoffen, um mittels deren Verbrennung hervorzuheben elektrischen Rauch zu entwickeln.

Mittlerweile schritt die Wissenschaft auf ihrem correcten Wege weiter fort.

Während die Montgolfiers neben ihren Bestrebungen nach Verbesserungen eine ganze Reihe von ihnen mit Rauch oder warmer Luft gefüllten und Montgolfiers genannten Ballons im Laufe der ersten Jahre nach der Erfindung unter der enthusiastischen Theilnahme der Franzosen und der ganzen Welt vor den Augen des Königs und des Königs bei Kanonendonner und Festgepränge aufsteigen ließen, waren Charles und die Mechaniker Gebrüder Robert bemüht, durch Anwendung von mit Gummilösung getränktem Taffet eine dichtere und doch genügend leichte Hülle, sowie durch Ueberspannung des Ballons mit einem Netzwerk aus Schnüren eine festere Construction zum Aufhängen einer Gondel zu Stande zu bringen, und stellten ebenfalls im Laufe der ersten Jahre eine ganze Reihe von solchen Ballons her, die, mit Wasserstoffgas gefüllt und Charles genannt, zum mächtigsten bewegten Interesse des Publicums ihre Aufstiege machten.

Dieses Interesse entsprang gleichmäßig aus den phantastischen Träumereien und sanguinischen Hoffnungen, welche sich an die nahe bevorstehende Zukunft der Luftschiffahrt knüpften, als auch aus den ersten Erwägungen und ruhigeren Erwartungen, welche durch die Aussicht auf das Ausbenten des Luftballons zu wissenschaftlichen Zwecken und zu strategischen und sonstigen praktischen Verwendungen rege gemacht wurden.

Ob, wie wol behauptet wird, eine französische Charaktereigenthümlichkeit dazu gehörte, für die Inspiration zur Erfindung des Ballons empfänglich zu sein, möchte wol zweifelhaft erscheinen. Vielmehr aber würde das Wagniß, dem zerbrechbaren und thatsächlich oft zerfallenden, lustigen Seidenstoffgebläse bis in schwärzliche Höhen hinauf sich anzuvertrauen, zu jener Zeit in einem andern Lande als in Frankreich nicht sobald bestanden worden sein. Die Spanier und die Portugiesen haben es auf ihren Entdeckungsfahrten an Kühnheit, Verwegenheit und Abenteuerlichkeit nicht fehlen lassen, die Holländer und Engländer sind bei der Eroberung ihrer Colonien nicht weniger entschlossen, muthig und tollkühn gewesen; aber damals, nur wenige Jahre vor dem Ausbruch der großen Revolution, garte es gerade ganz besonders in den Franzosen, und Eitelkeit, Ehrgeiz, Sucht zum Carrière machen, zum Aufsteigen, zur Abenteuerei, spannten jede Faser an und drängten alle Bedenken und Beschränkungen zurück.

Nachdem daher schon drei Monate nach Aufsteigung der ersten Montgolfiere der Versuch mit Anhängen eines eine Ente, einen Hahn und ein Schaf enthaltenden Weidenkörbes gemacht war, entschlossen sich trotz des Einspruchs des Königs, welcher zunächst nur einem Paar verurtheilten Verbrechern die Erlaubniß erteilen wollte, Pilâtre de Rozière und der Marquis d'Arlande eine mit Gondel versehene Montgolfiere zu bestiegen (Fig. 2) und unternahmen nach mehreren, mit Hülfe von verankerten Lauen in geringen Höhen gemachten Vorversuchen am 21. October 1783 die erste Luftfahrt.

Wie sehr Pilâtre de Rozière dem Anreize der Eitelkeit oder des Ehrgeizes und wie wenig er dem wahren, in der Ueberzeugung und in der Erkenntniß wurzelnden Muthes folgte, beweist seine kurz hierauf zur Ausführung gelangende, unverständige und unglückliche Idee, behufs Steigerung des Effects eine Montgolfiere mit einer Chaudière zu combiniren und die Feuerpflanze, welche nach den ersten Versuchen unter den Montgolfiers, aufstiege dieselben nur einmal mit heißem Rauche zu fällen, angebracht wurde, nicht von deren Einwirkung auch auf die mit so leicht entzünd-



lichem und leicht ausdehnbarem Stoff gefüllte Charlière abzuhalten.

Trotz der ernstlichsten und wohlgemeintesten Warnungen seitens der Theoretiker, trat er mit seiner gefährlichen Constructionsart die Reise von Calais nach Dover an, ohne jedoch weit von der Küste fortzukommen, und fand dann, von einer Windströmung wieder landeinwärts zurückgetrieben, als erstes Opfer der Luftschiffahrt am 13. Juni 1785 seinen Tod durch das Plagen der durch die Erhörung offenbar zu stark angespannten Charlière.

Indessen war an dem Orte dieses Unglücksfalls schon am 7. Januar 1785 die erste Lustreise glücklich beendet worden. Der vielgenannte Aeronaut Blanchard, der sich schon vor Montgolfier mit diesbezüglichen Bestrebungen, jedoch erfolglos, befaßt hatte, war sofort nach der vollendeten Thatfache der Erfindung bemüht gewesen, den Ballon reisefähig herzustellen und, da er zu diesem nützlichen Zwecke in Frankreich die genügende Unterstützung nicht fand, nach England gegangen, wo er es dahin brachte, im Vereine mit dem Amerikaner Dr. Jefferys am bezeichneten Datum von den Kreidezellen Dovers nach Calais überzufliegen. Ob der zu dieser ersten Lustreise verwendete Ballon genau die in Fig. 3 abgebildete, von Blanchard zu seiner am 2. März 1784 in Paris unternommenen Luftfahrt oder Ascension benutzte Construction oder eine andere Varietät hatte, vermag ich mit Sicherheit nicht festzustellen. Es sind an demselben sowohl ein Fallschirm als Steuerruder zu erkennen, welche Blanchard für sehr wichtig hielt. Das die Gondel tragende Netzwerk wurde jedoch schon von Professor Charles bei dessen ersten Ballon angewendet.

Ogleich die Luftfahrten oder Ascensionen in unzählbarer Menge Schlag auf Schlag nacheinander folgten, jedoch mehr den Charakter von Athleten- oder Kunststreiterstücken an sich trugen, auch wirkliche Luftreisen, d. h. Luftfahrten nach bestimmten entfernteren Orten, nämlich von Dover nach Calais und umgekehrt, unternommen wurden, so blieb doch eine höhere nützliche Anwendung des Aérostaten noch immer im Stadium des Projectis, bis 1794 im Kriege der französischen Republik gegen Belgien die erste Benützung des Ballons zu Kriegszwecken erfolgte. Von den beiden besonders zu diesem Zwecke organisierten Compagnien, den „aéroliers“, wurde in der durch Fig. 4 veranschaulichten Weise der Reconnoissierungsdienst in der Schlacht von Fleurus, jedoch ohne wichtigen Erfolg, gethan.

Eine Anwendung zu ernsten wissenschaftlichen Zwecken wurde dagegen erst 1803 auf deutschem Boden zur Ausführung gebracht, wo Robertson und Lavoisier am 18. Juli in Hamburg aufstiegen und nach einem 6 1/2-stündigen Aufenthalt in den höhern Regionen wieder bei Hannover auf den Erdboden zurückkehrten, bereichert mit etlichen Beobachtungen betreffs der Reibungselektricität, des Galvanismus, des Schalls, des Siedepunktes, der Sonnenwärme und einiger optischer und physiologischer Erscheinungen.

Bei dieser ersten Fahrt wurde der in Fig. 4 abgebildete und in der Schlacht von Fleurus thätig gewesene Ballon verwendet, welchen Robertson künlich in seinen Besitz gebracht hatte.

Es wurde darauf hingewiesen, wie den Gebrüdern Montgolfier das Verdienst gebühre, die Erfinder der Hülle zu sein, welche durch Aufgefüllwerden mit heißem Rauche, erhitzter Luft oder specifisch leichtem Gase geeignet ist, den Luftballon, den Aérostaten, zu bilden. Schon dieses Verdienst allein ist keineswegs zu unterschätzen. Denn es handelt sich dabei nicht etwa nur um geringfügige Spielerei, sondern die Erfindung

würde nicht zu Stande gekommen sein, wenn die Erkenntniß dabei Raum gewonnen hätte, daß ein solcher Ballon einen beträchtlichen Durchbruch haben müsse, und wenn nicht die praktischen Schwierigkeiten, welche sich der Herstellung einer genügend dichten Hülle von so enormen Dimensionen entgegenstellten, erfolgreich besiegt worden wären. In der That hatte die erste Montgolfière einen Durchmesser über 12 Mt., also von etwa sieben Menschen und ein Gewicht von 215 Kilogr.

Es ist auch die Idee oder Inspiration, zur Lösung des aeronautischen Problems den Zug der Luft oder das Ausströmen des Rauchs zu verwenden, wohl genial zu nennen.

Aber freilich mußten bei den verbesserten Constructionen die Montgolfières gänzlich wieder aufgegeben werden, und fanden später, sowie übrigens auch heutzutage höchstens Verwendung zu Spitzdien- und Belustigungen, während die Charlières zu einer Form für die zu Luftreifen und ersten Zehn- und zwanzigsten vollkommeneren Constructionen bildeten. Er hatte Charles in Verbindung mit dem Präfekten des Ballon mit den Accessorien ausgestattet und zu einer sicheren Luftfahrt und Lustreise erforderlich sind. Er hatte das die Gondel tragende Netzwerk angebracht, ein behufs Abminderung explosionsgefährlichen innern Gasdrucks durch Niederlassen des Ballons zum Auslassen eine geeignete Sicherheitsklappe angeordnet, welche am Ende, im Scheitel, angebracht, durch Ziehen am Seils nach Bedürfnis geöffnet wird; er hatte das Taftestoff durch Leberziehen mit Gummiung verdichtet, einen Unter, ein Höhenmesser angebracht und den Ballast zum Zwecke der Verwerthen des Höhenmessens durch partielles Auslassen desselben verwendet. Auf dieses letztere Ausrüstungsstück, nebenbei bemerkt, durch die praktische Erfahrung geführt worden, welche ihm bei seiner ersten Reise die Erscheinung brachte, daß der Ballon, wenn er aussteigen seines Mitreisenden Robert platzte, 65 Kilogr. erleichtert, mit ihm blies und in 3000 Mt. wieder in die Höhe schnellte.

Das Wasserstoffgas, durch dessen Anwesenheit genügend massige Vereitung Charles sich angewöhnte, wurde jedoch von dem weit billigeren, auch nicht in gleich günstigem Grade geeigneten Gase mehr und mehr in dem Maße verdrängt, als städtischen Gaswerke sich verbreiteten.

Das 7—8 mal so große specifische Gewicht des Leuchtgases wurde paralysirt durch Herstellung größerer, voluminöserer Ballons. Die Anwendung desselben geschah zuerst von den Engländern, auf der Wilschläde des historischen Gemäldes der Aeronautik vorzugsweise mit den Namen Cerruti, Green und dessen Sohn George Green verbunden. Der Ballon, dessen sich Green, der Vater, am 7. November 1836 ausgeführten Reise nach Weiburg im Kassauischen, unter Zuhilfenahme einer Strede von 90 deutschen Meilen in 12 Stunden bediente, wird durch Fig. 5 dargestellt.

An demselben ist linksseitig ein Fallschirm angebracht, und von letzterem, bekannten und dem Professor Lenormand 1783 erfundenen und verbesserten Rettungsapparate in Fig. 9 und 10 eine Abbildung gegeben, nämlich in Fig. 9 im geöffneten, in Fig. 10 im geschlossenen, nach unten wirkenden Zustande.

Die sehr großen Ärostaten von Green und Coxwell, denen der zu einer 1851 in Leipzig stattgefundenen Ausstellung des letztern verwendete Ballon eine Höhe von 1000 Meter und einen Rauminhalt von 1000 Kubikmetern, wurden jedoch von dem im October 1863 in Paris von Nadar aufgelassenen Ballon noch weit überboten. Derselbe, „Le Géant“ getauft, hatte einen Rauminhalt von 1000 Kubikmetern, und trug eine aus spanischem Rohr bestehende, aus zwei Etagen bestehende, und, außer eisernen Instrumenten, photographischen Apparaten, Nahrungsmitteln, auch Betten, Toiletentische u. dgl. bestehende Gondel. Die unglückliche Katastrophe der in Fig. 6 abgebildeten und in der Gegend von Alençon am 1. September 1863 stattgehabten Landung dieses Ballons ging damals durch Zeitungen.

Die Luftfahrer, zu denen außer Nadar und dessen auch der als Äronaut bekannte Godard als Mann oder Kapitän gehörte, vermochten dem nicht genügende Ausströmung zu verschaffen; der Ballon sank daher nur so weit, daß die schwere Gondel der Erde schleifte, und wurde von einem heftigen Wind über Stod und Stein getrieben, bis zur Beschädigung von Gebäuden und unter Zerstörung der Eisenbahndämme, sowie Zerreißung der Seile, in einem Walde bei Nethem hängen blieb. Der „Géant“ hat dann 1867 noch drei Ausfahrten.

Die in Fig. 7 eine noch weit schlimmere Katastrophe, als die den „Niesen“ betreffende, dargestellt, nämlich das Zerplatzen des durch das Anfertigen und bei geschlossenem Ventile vom Sturm heftig ergriffenen „Nepion“, so zeigt Fig. 15 die Verhältnisse eines zur Abfahrt vorbereiteten Ballons auf der Gasanstalt selbst. Inmitten der Gasometer dieser Gasanstalt zu Paris erscheint bereits völlig gefüllte Ballon, noch festgehalten an mehreren mittels eiserner auf der Erde liegenden Seile. Die Seile werden nach einiger Zeit durch den Sturm befreit und mit der Gondel vereinigt, während der Ballon durch drei oder vier Seile angespannt und von Arbeitern ergriffen wird, um Windströmungen feilich abzuwenden.

#### b. Gefesselte Ballons.

Bei anzutretenden Luftreisen des Curfes sicher, welchen der Ballon nehmen sollte, schiedte man Ballons voraus, und wartete ab, bis dieselben die richtige Richtung einschlugen. Welches ist jedoch der Äronauten der Versuch gewagt worden, eine anzuwenden, in welcher eine erwünschte Richtung die erforderliche horizontale Triebkraft zu schaffen, indem die Ansicht gehegt wurde, daß eine Höhenrichtung, gemäß einer im allgemeinen angeordneten zutreffenden Beobachtung, nach verschiedenen Richtungen in Bewegung sein. Solcher Art Versuche ist nicht sehr günstig.

Die sich bei bloßen Höhenmessungen nicht mit dem Ort der Niederfahrt, der Landungs- oder der Höhe bestimmen, und noch weniger vermochte bewirken, daß der Ballon an einem bestimmten der Atmosphäre in der Schwere verharrete, Anstellung von wissenschaftlichen Beobachtungen erwünscht gewesen sein würde. Endlich zur Niederfahrt das kostspielige Gas zum Gebrauche gebracht werden, während eine Aufstellung desselben vorteilhaft sein würde. Alles

dieses hat man jedoch neuerdings durch „Fesselung“ des Ärostaten zu erreichen vermocht.

Ein gefesselter, d. h. ein festgehaltener Ballon ist eigentlich schon der zu militärischen Zwecken angewendete und in Fig. 4 dargestellte. Allein es handelt sich hier um solche Ballons, welche mittels eines durch Maschinenkraft zu bewegendes Seiles festgehalten und niedergezogen werden.

Ein solcher Ballon muß außer sich selbst und den Anfassern seiner Gondel auch noch das Gewicht des langen, bis auf die Erde herabhängenden Seiles tragen. Seine Tragkraft muß daher unter sonst gleichen Umständen beträchtlicher als die eines freien Ärostaten sein. Er wird mithin voluminöser hergestellt oder mit leichtem Gase, d. h. mit Wasserstoff, anstatt mit Leuchtgas gefüllt werden müssen.

Der in London 1869 ausgeführte und in Fig. 11 abgebildete „Gefangene“ wurde durch Combination beider der letztgenannten Mittel zu einem Niesen gemacht, der eine omnibusartige Gondel trug. Sein Durchmesser hatte das ansehnliche Maß von 37 Mt. oder über 20 Menschengrößen, und sein Rauminhalt betrug nicht weniger als 12000 Kubikmetern, d. h. noch einmal soviel als derjenige des „Géant“, und 2,4 mal soviel als der auf der pariser Ausstellung 1867 ausgeführte.

Da die Füllung mit Leuchtgas, noch mehr aber die mit Wasserstoffgas äußerst theuer ist, so stellte sich der Verfertiger Giffard die Aufgabe, eine besonders dichte Hülle herzustellen und wendete mit günstigem Erfolge zwei Lagen Leinwand, eine Lage Musselin, dazwischen Lagen von Kautschuk und darüber sieben Schichten von Gummi und Desfirnis an. Hierdurch wuchs allerdings das Gewicht der Hülle allein auf 2800 Kilogramm. Jedoch die Dichtigkeit war so vollständig, daß wochenlang kein Gas nachgefüllt zu werden brauchte.

Der Ballon war in einer gezimmerten und mit Leinwand überspannten Arena von 175 Mt. Durchmesser angebracht und an einem 650 Mt. langen Kabel befestigt, welches über eine unterirdisch angebrachte Leitrolle bis auf die Trommel einer Dampfwinde geführt war. Dieses Kabel wickelte der Ballon bei der Ausfahrt selbst ab und wurde von demselben wieder niedergezogen, ohne daß eine sonst zum Niedergange erforderliche partielle Entleerung von dem kostspieligen Gase stattfinden hatte.

Das Unternehmen ist ein finanziell verfehltes gewesen, namentlich da schon nach einigen Wochen der Inbetriebnahme ein heftiger Sturm und die Unvorsichtigkeit des Maschinenführers das Zerreißen des Kabels, das Davonsiegen des „Gefangenen“ und das Einfangen und Wiederinstandsetzen desselben verursachte.

Noch unglücklicher verlief ein ähnliches Unternehmen auf der letzten Wiener Weltausstellung.

Ein „gefesselter“ Ballon verhält sich übrigens gegenüber den Windströmungen völlig verschieden von einem freien. Während letzterer den Stößen und Pressungen des Sturms nachgibt und dieselben für den Luftfahrer gar nicht und keineswegs wie für einen auf der Erde Gehenden bemerkbar macht, so läßt der gefesselte Ärostat jeden Windstoß unangenehmst empfinden, und kommt sogar, wenn er nicht schleunigst mittels des Kabels niedergeholt wird, in die durch Fig. 7 dargestellte und bereits beschriebene kritische Situation.

#### c. Lenk- oder steuerbare Ballons.

Das Problem der Lenkung oder Steuerung der Ärostaten ist vom ersten Tage ihrer Erfindung an, oder doch bald darauf, mit sehr viel Vertrauen auf den Erfolg in Angriff genommen worden. Segel und Ruder wurden zuerst versucht. Auch der Ballon von

Blauchard (Fig. 3) hat solche aufzuweisen. Allein beide erwiesen sich als nutzlos und zwar sehr natürlich, da dieselben nur um so mehr Angriffspunkte dem Winde darbieten, welcher den Ballon mit sich fortnimmt, anstatt daß er damit zu bekämpfen wäre. Mit einem Fluß- oder Seeschiffe läßt sich mittels der Segel gegen die Richtung des Windes ankommen, indem vermöge des Steuers und des Widerstandes im Wasser das Laviren bewirkt werden kann.

In ähnlicher Weise könnte bei der Luftschiffahrt durch Hinzunahme eines außerhalb der Luft gelegenen Widerstandes eine Art von Steuerung erlangt werden. Ein diesbezügliches Project von dem Anonymus Aëronaut, ist beispielsweise in Fig. 8 veranschaulicht. Der mit Segeln ausgerüstete Ballon erscheint hier an einem im Meere schwimmenden Steuer befestigt. Er erhält so viel Auftrieb, daß er bei Windstille die Zugtaue vertical anspannt, ohne ein namhaftes Heben des Steuers zu bewirken. Der entsetzliche Wind wird ihn unter Beihülfe des Segels fortreiben. Wird das Steuer mittels der Zugtaue parallel zur Windrichtung gestellt, so wird er unter Ueberwindung eines geringen hydraulischen Widerstandes genau in der Richtung des Windes fortgetrieben werden. Wird dasselbe normal (quer) zur Windrichtung eingestellt, so wird der Ballon ebenfalls in der Windrichtung, jedoch unter Ueberwindung eines bedeutendern hydraulischen Widerstandes und demnach langsamer fortbewegt werden. Stellt man aber das Steuer schräg zur Windrichtung ein, so schlägt der Ballon einen von der Windrichtung abweichenden Weg ein, er wird also bis zu gewissem Grade gesteuert. Wegen des hydraulischen Widerstandes erhält jedoch der Ballon einen Winddruck, welcher leicht die schon beim gefesselten Aërostaten erwähnte und in Fig. 7 dargestellte Katastrophe herbeiführen kann.

Uebrigens ist eine Art von Lenkung, d. h. die Herbeiführung einer andern als der nach der Windrichtung verlaufenen Bewegung auch ohne äußerlichen Widerstand durch den Luftwiderstand selbst bewirkbar, nämlich vermittelt einer besondern Formgebung des Ballons. Eine solche Form ist die in Fig. 12 und 13 ersichtliche, die „Gifschform“ oder „Cigarrenform“ genannt.

Wird mit dieser Form ein Trapez vereinigt, derartig, daß von den Enden des Ballons verticale Taue herabhängen und parallel zur Längsaxe durch eine Stange verbunden sind, wird ferner an diese Stange die schwere Gondel gehängt und auf derselben hin- und herverschiebbar gemacht, so läßt sich beim Aufsteigen in windstiller Luft eine andere als die verticale Richtung vermöge Verschiebung der Gondel und vermöge hierdurch bewirkten Schrägstellens der Ballonaxe einschlagen, indem Auftriebskraft und Luftwiderstand zu einer anders als vertical gerichteten Resultante sich zusammensetzen; ähnlich bei Windströmungen.

Wird diese Bewegung mit einem abwechselnden Aufsteigen und Niedersinken combinirt, so ist ein horizontales Fortkommen auch bei Windstille und gegen den Wind möglich; dasselbe wird in einer in verticaler Ebene gelegenen zickzackförmigen Bahn erfolgen.

Das abwechselnde Aufsteigen und Niedersinken wird auf zweierlei Weise bewirkt. Einmal durch Auswerfen von Ballast und Auslassen von Gas; ferner aber auch durch Anwendung einer „Schwimmblase“, d. h. eines im Ballon enthaltenen zweiten Ballons, welcher mit Luft zu füllen oder davon zu entleeren ist.

Der Vorschlag und Versuch zur Anwendung einer Schwimmblase wurde schon kurz nach Erfindung der Ballons von Meunier gemacht. Die Wirkungsweise

besteht darin, daß die im Innern des mit Gas gefüllten Ballons enthaltene Schwimmblase mit solcher Luft gefüllt ist, welche in den Regionen ein größeres specifisches Gewicht als dort befindliche Luft hat, und demnach mittelst des Auslassens dem Aërostaten ein relativ geringes Gewicht, mithin eine beträchtliche Erleichterung theilen läßt.

Weit wirksamer, als eine Schwimmblase, ist die von Zoulie vorgeschlagene Gasfelle, welche der Gondel befestigt, mittels einer Pumpe an einen Schlauch mit dem Ballon communicirt und durch Füllungsstoß des Ballons theilweise im unteren Zustande in sich birgt oder ihn dem Boden liefert. Eriertensfalls wird die Steighaftigkeit der Ballons bedeutend sein; das abwechselnde Ein- und Dilatiren wird ein Sinken und Steigen bewirken, ohne daß Gas zum Entweichen gebracht, daß Ballast angewendet wird.

Das Steuer ist nur für den Fall des Bedarfs eines von motorischer Kraft bewegten Apparates zur Wirksamkeit zu bringen, und der Apparat wirkt am vorteilhaftesten, je weniger die Standfläche, er dem der Bewegung entgegensteht, Winde preisgibt. Seine zweckmäßige Form fällt daher mit derjenigen einer Schiffs- eines Propellers, zusammen und hat trotz ihrer geringen Oberfläche die erforderliche Triebkraft entsprechend große Drehgeschwindigkeit anzuwenden.

Von dieser Erkenntniß ausgehend, haben ferner der Neuzeit bei den lenkbaren Luftschiffen Schraubenräder angewendet, wie dieselben in 13 zwischen Ballon und Gondel anzuordnen scheinen. Es ist aber auch die Cigarrenform bei diesen lenkbaren Ballons bevorzugt, weil der Auftrieb oder die Steighaftigkeit unter gleichen Umständen nicht von der Form, sondern von dem Volumen abhängt, der zu überwindende Widerstand jedoch um so kleiner ausfällt, je mehr derselben in der Bewegungsrichtung des Querschnitts des Ballons ist.

Nachdem Giffard schon 1852 Versuche an derartigen Bauart angestellt, sich aber wegen Verlegung der Herstellung von geschickten Werkzeugen verlegt hatte, trat Rufus Porter in New York nächst mit einem zur Zufriedenheit wirkenden und hierauf mit einem durch Fig. 12 dargestellten Riesenschiff hervor, dessen Ballon eine Länge von nahe 50 Mt. und einen größten Durchmesser circa 5 Mt. hatte, und dessen Gondel aus 18 Mt. Länge und 2 1/2 Mt. Durchmesser bildete, sowie mit einer zweicylindrischen Maschine von 4 Pferdestärken ausgerüstet war. Die stellenden Probefahrt ergab sich jedoch, daß die Herstellung der Ballonhülle verwendete Leinwand zur Dichtung benutzten Firnis zerstreuen und das eingefüllte Wasserstoffgas entweichen ließ.

Später hat auch Mariott in Californien ein solches Luftschiff hergestellt und vor der Welt, der „Dampf-Luftschiffahrt-Gesellschaft“ in New York stehende Versuche am 2. Juli 1869 ohne jedoch die alsdann in Aussicht genommene Bauung eines größern Schiffs bis jetzt zu Ende gebracht zu haben.

Ein weiterer Versuch wurde auf Grund der jüngsten pariser Belagerung reger militärischen Bestrebungen von Dupuy de Lôme entworfen, welcher das in Fig. 13 abgebildete Schiff von 3500 Kubikmt. Balloninhalt



demselben am 2. Februar 1872 eine gelungene Befahrt nach dem Fort Vincennes unternommen. Der Ballon war mit Wasserstoffgas gefüllt, die Gondel trug 14 Personen.

Nach in Brunn soll 1873 mit einer ähnlichen Constructionsform, welche sich Hänlein 1865 hatte patentiren lassen, eine als zufriedenstellend bezeichnete Befahrt unternommen sein. Dieses Hänlein'sche iß hatte ebenfalls eine Schwimmblase oder Luftkammer, welche jedoch vormalig den Zweck erfüllte, Ballon auch bei Entnahme von Gas straff zu erhalten. Eine solche Entnahme von Gas fand aber ursprünglich ununterbrochen statt, weil die Betriebschne der Schraube, der hauptsächlichste Gegenstand Patents, eine Gasstraßmaschine nach der in Fig. 2 Taf. 31 dargestellten Ventirischen Construction, je in völlig anderer Bauart war, nämlich aus vier in einander beifand und beifand Erzielung möglicher höchst vielfach hohle Maschinenorgane hatte. Die den zum Maschinenbetriebe verwendeten Gasdruck des Ballons entfehende Verminderung an Steigert sollte im wefentlichen durch die Verbundung des Kühlers der Maschinenzylinder benutzten Wassers im übrigen durch Auswerfen von Ballast ausgedrückt werden.

Neue Experimente sollen vorbereitet werden, ebenso andererseits an der Herstellung eines derartigen, sch mit calorischer Maschine ausgerüsteten Luftschiffs a Vernehmen nach in Wien gearbeitet wird.

Alle die nach dieser Richtung hin angestellten Versuche haben die Ueberzeugung beigebracht, daß die Verwendung von motorischen Vorrichtungen benutzten wiederum bei Windstille eine völlig genügende Ventung Luftschiffs bewirken lassen, jedoch eine Bewegung jeder gewünschten Richtung erzielt zu werden verg. Auch will man in ruhiger Luft und bei mäßigem ste befriedigend rasch fortgehen sein. Allein nützliche Luftströmungen erwiesen sich noch als unermülich und ebenso ließ die Tragkraft sehr viel wünschlich übrig. Diefelbe wurde zum größten Theil durch das Gewicht des Motors. Die Lösung Problems der Construction eines Motors, welcher erforderliche Betriebskraft äußert und doch bedeutend leichter ist, als die jetzt existirenden es sind, ist daher die Frage der praktisch verwendbaren Leichtigkeit der Luftschiffe ihrer Lösung bedeutend näher. Besonders leichtes Material ist Aluminium, jedoch zu geringer Festigkeit erfolglos versucht worden. Der erwähnte Hänlein hält die Gasstraßmaschine den in dieser Beziehung am meisten qualificirten Motor, und die Anwendung von durchweg hohlen Vertheilen zum Bau dieser Maschine, wodurch nicht nur das Skelet der Bgdel mit dessen hohlen Enden nachgeahmt, sondern ein sehr wahrer Ausdruck der Festigkeitslehre befolgt wird, zur weiteren Kampfen Herabminderung des Gewichts in hervorzuheben dem geeignet. Auch beträgt der Gasverbrauch für die Pferdekräfte stündlich nur 2 Kubifut., daß der Füllungsgehalt von etwa 4000 Kubifut., ist sobald wesentlich vermindert werden würde. In Abt möchte sich eine calorische Maschine von der Leistungsfähigkeit nicht so gewichtslos, als eine Maschine, herstellen lassen und bei einer Dampfmaschine muß ein schwerer, gefüllter Kessel mitgeschleppt werden. Jedoch ist, später berichtetermaßen, nach dieser Richtung schon Erfauliches geleistet worden.

## 2. Flug- oder Fliegermaschinen.

Schon vor Erfindung der Luftballons und noch später nach derselben ist das Problem des Auf-

steigens in die Luft und der Fortbewegung in diesem Elemente mittels einer Flugmaschine versucht worden. Jedoch erst neuerdings wurden statt der überlieferten Projecte dieser Art erstere und auf wissenschaftlichen Grundsätzen beruhende Unternehmungen ins Leben gerufen, ja es ist sogar dahin gekommen, daß einige aeronautische Vereine die Anwendung des Ballons gänzlich fallen gelassen haben und das Heil für die Luftschiffahrt nur in den Fliegermaschinen finden zu können verneinen.

Nachdem die sanguinischen Hoffnungen, welche bei Erfindung der Aerostaten an deren bahnbrechende Einwirkung auf die Entwicklung der Aeronautik geknüpft wurden, durch das Fehlschlagen der Tausende von unternommenen Versuchen tiefergehend erschüttert sind, hat man sich bei ruhiger Ueberlegung gesagt, daß die Analogie des Fisches, der im Wasser schwimmt, und des Menschen, der mittels des Ballons in der Luft sich bewegt, nur sehr schlecht paßt und eher entmutigend, als ermunternd ist.

Die mit Blütheschnelle selbst gegen die Strömung dahinschießende Forelle, der auf der Lauer auf Beute regungslos in der Schwere sich erhaltende Fledermaus und ebenso alle übrigen Fische bewegen sich und leben in einem Medium, mit welchem ihr Körper in fast genauem specifischen Gleichgewicht steht, ohne demselben bei der Bewegung eine nennenswerthe Fläche und demnach eine namhafte Widerstandsoberfläche darzubieten. Ein mit Menschen beladener Ballon muß dagegen ein so sehr beträchtliches Volumen erhalten, daß der Widerstand desselben in der dem specifischen Gewichte nach 830 mal vom Menschen übertrifften Luft relativ äußerst enorm wird, weshalb der Ballon voll zum Aufsteigen und Schweben eine Unterstüßung darbietet, aber für das Fortbewegen gegen Luftströmungen zu einem äußerst erschwerenden Hemmnis wird, selbst wenn anstatt der Kugel- oder Birnenform die zweckmäßigere Cigarren- oder Fischeform in Betracht kommt.

Dagegen fällt die Analogie des fliegenden, d. h. in der ruhigen oder auch strömenden Luft sich bewegenden Menschen mit dem Vogel, dem Insekt, der Fledermaus, ungleich hoffnungserweckender aus.

Die genannten Flieger haben zu dem Medium der Luft ein ziemlich gleich ungünstiges Gewichtsverhältniß, wie der Mensch. Die Natur weist daher auf die Nachahmung jener Thiere hin. Der Bau von deren Körpern, von deren Flügeln, deren Muskeln, wurde daher genauer untersucht; es wurde das Verhältniß zwischen Körpergewicht, Flügelgröße, Flügelschlag, Flugeschwindigkeit festgestellt.

Nach dieser Richtung hin sind sogar von vielen wissenschaftlichen Corporationen und einzelnen Gelehrten, wie Fresenius, Bredt, Strauß, Kargl u. s. w., mittels höchst sinnreich und geistvoll erdachter Meßapparate bereits sehr interessante Beobachtungen angestellt worden. Beispielsweise fand Bredt, daß die in jeder Secunde gemachte Anzahl von Flügelschlägen bei:

|                                                                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| dem Sperling . . . . .                                                                                | 6—9,                  |
| der Taube . . . . .                                                                                   | 4—5,                  |
| der Saatkrähe . . . . .                                                                               | 2½—4,                 |
| dem Steinadler {schwebend                                                                             | 1,46,                 |
| fliegend                                                                                              | 2—3,                  |
| betrage, während die auf 1 wiener Loth (= 17½ Gr.) des Körpergewichts reducirte Flügeloberfläche bei: |                       |
| dem Sperling . . . . .                                                                                | 8 wiener Quadratzoll, |
| dem Turmfalken . . . . .                                                                              | 4,78    "    "        |
| der Taube . . . . .                                                                                   | 3,65    "    "        |
| dem Steinadler . . . . .                                                                              | 3,4    "    "         |
| dem Seeadler . . . . .                                                                                | 3,15    "    "        |
| dem grauen Geier . . . . .                                                                            | 2,1    "    "         |

ausmache. In gleicher Weise theilt Marcy mit, daß die in jeder Secunde ausgeführte Anzahl der Flügelschläge bei der:

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Wasserjungfer . . . . . | 28  |
| Bespe . . . . .         | 110 |
| Biene . . . . .         | 190 |
| Hummel . . . . .        | 240 |
| Fliege . . . . .        | 330 |

betrage, während Kargl aus dem mittels des Klaviers bestimmten Ton, welchen das summende Geräusch des Flügelschlags einer Stubenfliege erregte, jene Anzahl zu 156 berechnete, und das Gewicht der beobachteten Fliege zu 44 Milligr., sowie die Länge und Fläche von deren Flügel zu 8 Mmt. und 20 QMmt. feststellte.

Durch Abwägung hat man ferner gefunden, daß ein sechspfündiger Steinadler beim gewöhnlichen Fluge nicht mehr als  $\frac{1}{100}$  und bei außerordentlichen Leistungen  $\frac{1}{50}$  Pferdestärken Betriebskraft ausübe, und hat hieraus gefolgert, daß der Mensch, welcher bei fortgesetzter Arbeit am Hebel  $\frac{1}{15}$  Pferdestärke, an der Kurbel und am Gdipel  $\frac{1}{10}$  und am Trettad deren  $\frac{1}{10}$  zu äußern vermag, jedoch sitzend unter alleiniger Aufbietung seiner Muskelkraft ungleich weniger leisten würde, zur Bewegung eines ihn tragenden Fliegapparates 2 Pferdestärken leisten müsse.

Hiernach kann daher eine Flugmaschine keineswegs von dem mit derselben in Verbindung gebrachten Menschen selbst bewegt, sondern nur durch Zuhilfenahme eines Motors betrieben werden.

Dieser Motor darf jedoch im Verhältniß zu seiner Leistung kein beträchtliches Gewicht haben, und ebenso muß der angewendete Flügel- oder sonstige Bewegungsmechanismus möglichst leicht sein.

In gebührender Würdigung dieser unter allen Umständen zu erfüllenden Vorbedingungen, sowie auch in Erkenntniß der Thatsache, daß die Construction der Locomotive mit ihren Treibrädern als Fortbewegungsorganen nicht eine schablonenmäßige Nachahmung des mit Weinen fortkommenden Zugthiers ist, und daß daher auch nicht der Flügel des Vogels nachgeahmt zu werden brauche, sondern statt desselben ein Schraubenpropeller angewendet werden könne, hat die Aeronautical Society of Great Britain zur Förderung der Sache Preisconcurrenzen ausgeschrieben für die leichteste Kraftmaschine und für den leichtesten, jedoch ohne Ballon wirkungsfähigen Flügelapparat oder Propeller.

In der That wurden in Anlaß hiervon an die 80 diesbezügliche Gegenstände theils in Zeichnung, theils in Modell, theils in Ausführungsform eingeleistet und im Jahre 1868 zur öffentlichen Ausstellung gebracht. Eine Dampfmaschine, welche bei 2 Zoll Cylinderdurchmesser und 3 Zoll Hub, mit 7 Atmosphären Spannung bei 300 minütlichen Umdrehungen eine Leistung von 1 Pferdestärke entwickelte und nur 13 Pfund, einschließlich des wasserleeren Kessels, sowie 16 Pfund mit Propeller wog, konnte mit dem Preise gekrönt werden. Dieselbe lieferte zufolge dieser Angaben das günstige Verhältniß von  $\frac{1}{100}$  Pferdestärken für jedes Kilogramm ihres Gewichts sammt Propeller, während nach Maßgabe der weiter oben angeführten Verhältnisse der Steinadler nur  $\frac{1}{100}$  —  $\frac{1}{240}$  und der Mensch nur  $\frac{1}{500}$  Pferdestärken für jedes Kilogramm seines Körpergewichts zu äußern vermag.

Auf jener Ausstellung war ferner das von seinem Erfinder Kaufmann eingeleistete Modell der auf Fig. 14 abgebildeten Flugmaschine vertreten, nach nachfolgend angegebene Dimensionen erhalten ist.

Der fesselartige Hauptkörper, welcher eine Dampfmaschine von 40 nominalen Pferdestärken in sich faßte, sollte, war in einer Länge von 3,6 M., einer größt. Höhe von 1,35 M., einer größten Breite von 1,3 M. projectirt, während die Flügel, denjenigen der Schwäne nachgeahmt, jeder eine Länge von 10,5 M. zu einer Oberfläche von 22 QM. erhalten und zu dem Gewicht der gesammten Maschine 3180 Kilogr. betragen sollte.

Mittels der von der Dampfmaschine durch Kurbel eines in der Abbildung ersichtlichen Hebelmechanismus zu bewegenden Flügel sollte diese Flugmaschine zu einer Geschwindigkeit von stündlich 40 engl. Meilen bei ruhiger Luft in Betrieb genommen werden können, und als Zugmaschine (wie eine Locomotive) zur Bewegung eines, aus einem Tender und drei Lokomotiven bestehenden Trains dienen.

Die einzelnen, den Schwanz bildenden Theile sollten behufs einer wirksamern Steuerbarkeit nach verschiedenen Richtungen zu bewegen sein.

Das zusammenschiebbare, in der Abbildung zu seiner ganzen Länge herabhängende Pendel zu Zweck eines Horizontalhaltens der Maschine. Die vier Räder sollten zum Fortfahren der Maschine auf der Erde nach stattgehabter Landung dienen.

Das ausgestellte Modell von nicht ganz 100 Kilogr. Gewicht wurde in Thätigkeit durch einen Strom von 10 Atmosphären gesetzt, jedoch zu keiner ungestörten Beobachtung bei einer seine Functionen verhinbernden Belastung derartig, daß nur 10 Personen in Activität gelangten. Dieselben sind nach den Reichen von Schlägen zerbrochen und haben gezeigt, daß ihre Construction verbessert werden muß. Von dem Erfolg der in diesem Sinne durchgeführten Versuche und überhaupt auf das ganze Fortschreitende Bestrebungen ist noch nichts bekannt.

Dagegen wurde von Professor Kargl nach dem das bisherigen zur Ermittlung der Verhältnisse der Fliegbiere angestellten Rechnungen und die Möglichkeit der Lösung des Problems in erheblich zu günstigem Lichte erscheinen lassen zum Beispiel der obenangeführte Steinadler mit Wiener Pfunden (3,37 Kilogr.) seinen Flügeln  $\frac{1}{100}$  —  $\frac{1}{500}$  Pferdestärken bewirken könne, was allein zum Schweben mindestens  $\frac{1}{100}$  Pferdestärken über müsse.

Ebenso wurde von demselben rechnungsmäßig festgestellt, daß eine Flugmaschine, welche den erwähnten Steinadler zulommende Flügelverhältnisse und Gewichtsverhältniß erhalte, für jede abzuwickelnde Pferdestärke nur 9 Kilogr. Gewicht haben dürfe. Allein das Wasser, welches stündlich zu konstruirten Maschine pro Pferdestärke verbraucht 8 Kilogr. beträgt und für Maschinen, welche einer möglichststen Gewichtsverminderung gewidmet sind, auf mindestens 16—20 Kilogr. gebracht werden, so sind hiernach die Hoffnungen auf das Gelingen des Problems wiederum auf nebelgrauer Höhe zu liegen.

# Chemische Technik.

Bearbeitet

von

**Dr. Friedrich Schoedler**

Director der großherzoglich hessischen Realschule in Mainz



# I n h a l t.

|                                                        | Seite |                                                                               |  |
|--------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| Einleitung . . . . .                                   | 3     | 6. Arsen . . . . .                                                            |  |
| Eintheilung der Chemie . . . . .                       | 5     | 7. Kohlenstoff . . . . .                                                      |  |
| Das chemische Laboratorium (Tafel 1). . . . .          | 5     | 8. Chlor . . . . .                                                            |  |
| Der chemische Apparat (Tafel 2 und 3) . . . . .        | 8     | Chemische Technologie der Metalle (Tafel 4 und 7) . . . . .                   |  |
| 1. Heizapparate . . . . .                              | 9     | Chemische Technologie der organischen Verbindungen (Tafel 8 bis 10) . . . . . |  |
| 2. Trodenapparate . . . . .                            | 10    | 1. Bierbrauerei . . . . .                                                     |  |
| 3. Hilfsapparate . . . . .                             | 10    | 2. Branntweinbrennerei und Spiritusfabrikation . . . . .                      |  |
| 4. Destillirapparate . . . . .                         | 11    | 3. Essigfabrikation . . . . .                                                 |  |
| 5. Analytische Apparate . . . . .                      | 11    | 4. Zuckersfabrikation . . . . .                                               |  |
| Die Elemente und ihre Verbindungen . . . . .           | 14    | A. Rohrzucker . . . . .                                                       |  |
| Aus der unorganischen Chemie (Tafel 3 bis 7) . . . . . | 15    | B. Rübenzucker . . . . .                                                      |  |
| 1. Sauerstoff . . . . .                                | 15    | 5. Brotbereitung . . . . .                                                    |  |
| 2. Wasserstoff . . . . .                               | 15    | 6. Brotsfabrikation . . . . .                                                 |  |
| 3. Stickstoff . . . . .                                | 19    |                                                                               |  |
| 4. Schwefel . . . . .                                  | 20    |                                                                               |  |
| 5. Phosphor . . . . .                                  | 23    |                                                                               |  |

## Einleitung.

Die uns umgebende Körperwelt ist fortwährend vielfacher Veränderung unterworfen. Die Gesteine zertrümmern sich aus dem Gebirg und zertrümmern das, indem sie es abwärts wälzen, zu Geröll und Sand; das Wasser selbst, indem es beim eintretenden Frost mehr und mehr erkalteet, erstarrt endlich zu Eis. Die Wärme des Frühlings gibt ihm jedoch wieder seine Flüssigkeit, ja sie ist im Stande, das Wasser zu verdampfen, es in Dampf zu verwandeln. Doch derartige Veränderungen an der Körperwelt sind nur äußerliche, esentliche, auf Form und Zusammenhang sich erziehende; das Sandtorn bleibt als ein Bruchtheil des Gesteins, Wasser bleibt Wasser, sei es fest, flüssig oder dampfförmig.

Wenn wir dagegen unsere Felsen mit Holz oder Kohle verbrennen, so wird das Brennmaterial vollständig verzehrt; die Asche verschwindet aus dem Bereich der Körperwelt. Der Most schmeckt süß, weil er Zucker enthält; durch Gärung wird er sauer, bildet sich Wein und der Zucker verschwindet. Wir nennen die veränderte Flüssigkeit Wein. Aber in gelinder Wärme dem Luftzutritt ausgesetzt, geht der Wein über zu Essig; an die Stelle des Weingeistes tritt Essigsäure.

Es sind tief eingehende oder wesentliche Veränderungen, welche in den letztgenannten Beispielen die Stoffe erfahren, und es ließen sich unzählige ähnliche Erscheinungen anführen, deren Gesamtbetrachtung den Gegenstand eines besondern Zweigs der Naturwissenschaft, der Chemie, ausmacht. Indem die Chemie dem Beispiel der im Bereich der Materie vorgehenden Veränderungen nachforscht, gelangt sie zur Kenntniss der Natur der Körper selbst und zu den Gesetzen, nach welchen jene Erscheinungen sich vollziehen. Ein wichtiges Merkmal des 18. Jahrhunderts wird der Aufschwung betrachtet, den Naturwissenschaften in seinem Verlaufe genommen haben und ganz vorzugsweise gilt dies von der Chemie. Sie wird als die jüngste aller Naturwissenschaften angesehen, als ein Kind der leztvergangenen Jahrhunderte, dessen Ausbildung sich fortsetzt in der Gegenwart. Wenn wir nach den Anfängen chemischer Wissenschaft im Alterthume, so richtet sich der Blick zunächst auf die hochgebildeten Völker der Griechen. Allein da wir bei denselben bereits einer staunenswerthen Entwidlung der Begriffe in den Gebieten der Philosophie, der Politik, des Rechts, der Kunst und der Wissenschaften begegnen und in der Mathematik sowie in den Theorien der Mechanik und beobachtenden Astronomie nennwerthe Leistungen vorfinden, haben wir keine Bedenken, dass chemische Vorgänge Gegenstand der Aufmerksamkeit der hervorragenden Geister dieses Alterthums gewesen sind.

Wir daher bei einem geschichtlichen Ueberblick auf die Chemie auch bis in das Alterthum zurückgehen, nicht dies mehr, um Thatfachen als Ideen aus dem Alterthum aufzusuchen. Letztere verknüpfen sich erst mit den im Verlauf der Zeit gemachten

chemischen Beobachtungen und Entdeckungen und erhoben sich erst ganz spät zum Rang theoretischer Auffassung. Es lassen sich hiernach fünf verschiedene Epochen oder Zeitalter der Chemie bilden, nämlich:

- 1) Zeitalter der chemischen Kenntnisse der Alten, bis 300 nach Christus;
- 2) Zeitalter der Alchemie oder Goldmacherkunst, von 300—1325;
- 3) Zeitalter der medicinischen Chemie oder Zatrochemie, von 1525—1650;
- 4) Zeitalter der phlogistischen Chemie, von 1650—1775;
- 5) Zeitalter der analytischen Chemie von 1775 bis zur Chemie der Gegenwart.

Was den Namen unserer Wissenschaft betrifft, so reicht derselbe zurück um 1400 Jahre. Bei Julius Firmicus Maternus, einem römischen Schriftsteller aus dem Anfange des 4. Jahrhunderts, kommen zuerst die Worte „scientia chimiae“, also einer Wissenschaft der Chemie vor, die sich auf Operationen beziehen, die auch heute derselben noch angehören. Spätere, insbesondere griechische Schriftsteller schreiben aus: Chemia, Chemeia, Alchemie und Archemie. Da das erste chemische Wort aus dem 9. Jahrhundert von Geber, einem Araber herrührt, so leitete man gewöhnlich den Namen Alchemie aus dem Arabischen ab, worauf insbesondere die dem arabischen Artilek entsprechende Vorsilbe al hinzuweisen scheint. Allein man begegnet in alten Schriften auch der Schreibart archemie und archymie, die man aus ars chimiae entstanden vermuthet; durch die auch sonst in den Sprachen häufige Vertauschung von r und l sei dann aus Archymie endlich Alchemie entstanden.

Mehrfacher Zweifel herrscht ferner über die Bedeutung des Namens Chemie. Einige beziehen denselben auf das griechische Chymos, das Saft bedeutet; nach andern weist er auf Aegypten hin, das auch Chemia, nach seinem schwarzen Erdbreich, genannt wird. Hier war auch in der That schon früh eine gewisse chemische Industrie verbreitet, und es mag damit zusammenhängen, dass die Chemie später auch als die ägyptische oder schwarze Kunst, Schwarzkunst bezeichnet wird.

Die Chemie des Alterthums beschränkt sich lediglich auf die Ausübung einiger Gewerbe, die auf chemischen Vorgängen beruhen, worin, wie erwähnt, die Aegyptier entschieden hervorragten. Wie insbesondere aus Abbildungen ägyptischer Denkmäler hervorgeht, verstanden dieselben außer der Darstellung und Verarbeitung mehrerer Metalle und Metallgemische auch die von Salmiak, Soda, Kochsalz, Alaun und Glas; sie brannten Ziegel und gemalte Töpferwaaren, kannten Bleiweiß und Grünspan, und bereiteten Essig, Bier, Seife sowie verschiedene Arzneimittel, und besaßen die Kunst, Leichname einzubalsamiren, um sie vor Fäulnis zu bewahren.

Was wir bei den Phöniziern, Juden, Griechen und Römern Aehnliches vorfinden, lässt sich auf ägyptischen Ursprung zurückführen. Wenn China nach Alter und Umfang seiner chemischen Kenntnisse Aegypten über-

trifft, so blieb es doch abgeschlossen und ohne Einfluß auf deren Ueberlieferung und Weiterentwicklung.

Zwar scheint es, als ob die griechischen Philosophen sich bereits mit einer Frage beschäftigt hätten, die noch bis in die neueste Zeit ein Hauptgegenstand chemischer Forschung und Speculation geblieben ist, nämlich die Frage nach den Elementen oder Urstoffen aller Dinge. Allein dieselben gebrauchten das Wort Element in andern Sinne, als gegenwärtig geschieht. Einige verstanden darunter die allgemeine Bedingung, aus welcher die ganze Körperwelt hervorgegangen sei, wie Thales das Wasser, Anaximenes die Luft und Heraklit das Feuer als das Ursprüngliche bezeichnen, während andererseits Aristoteles unter seinen Elementen verschiedene Urzustände oder Grundeigenschaften begreift, aus deren Vorhandensein und Mischung die verschiedenen Eigenschaften und Zustände der Körperwelt hervorgehen. Hiernach sind Feuer, Wasser, Luft und Erde Vertreter von Hitze, Trockenheit, Feuchtigkeit und Kälte, von deren Vorhandensein und Mischung die Eigenschaften der Dinge, wie heiß, kalt, trocken, feucht, schwer, fest, flüssig u. s. w. abhängen. Außerdem findet sich noch die Andeutung eines fünften ätherischen Elements, der *essentia quinta*, das vielleicht das Geistige vorstellen soll und später Gegenstand eifriger chemischer Nachforschung wurde, wie denn noch jetzt der Ausdruck Quintessenz gebräuchlich ist, um damit den subtilsten Gehalt von etwas zu bezeichnen.

Das Zeitalter der Alchemie datiren wir von dem Auftreten chemischer Schriften, die zuerst in griechischer Sprache abgefaßt, vornehmlich durch die in Europa eingebrungenen Araber uns übermitteln worden sind. Hervorragend und bis ins 16. Jahrhundert in Geltung bleibend sind die Schriften von Geber oder Dschafar, dem vom 13. Jahrhundert an in den andern Ländern Europas als bedeutendsten Alchemisten nachfolgen Albertus Magnus, Roger Bacon, Arnoldus Villanovus, Raymundus Lullus und Basilus Valentinus. Die Kunst Gold zu machen, insbesondere durch Umwandlung aus unedeln Metallen, ist hier Aufgabe der Chemie. Die Werke sind in einer mystischen, bildlichen, oft ganz unverständlichen Sprache geschrieben, und wenn auch die unermüdlichen und wunderlichen Arbeiten in der genannten Richtung ihr Ziel nicht erreichten, so wurden durch dieselben doch eine ganze Reihe schätzbarer Hatzsachen zu Tage gefördert. Von chemischen Producten aus dieser Periode sind zu nennen: Schwefelmilch, Schwefeleber, Soda, Pottasche und Aetkali, Schwefelsäure, Salpetersäure, Königswasser und Essigsäure, Präparate des Antimons, Quecksilbers, Silbers und Goldes, der Weingeist, Weinstein, Arsenit und das Ammoniak. Die Destillation und Sublimation waren bereits geläufige und vielfach angewendete chemische Operationen.

Im Zeitalter der medicinischen Chemie, das die Periode von 1525—1650 umfaßt, nehmen die alchemischen Versuche der Goldmacherei ihren Fortgang, ja sie setzen sich fort bis in unsere Zeit, wenn auch mehr in den Hintergrund gedrängt und nur noch in den Händen von Betrügnern. Dagegen betheiligen sich nunmehr Aerzte und gelehrte Mönche in hervorragender Weise an chemischen Arbeiten, deren Ziel vornehmlich auf Herstellung eines Universalheilmittels gerichtet war. Als solches wird der Stein der Weisen aufgeführt, der nebenbei noch die Tugenden besitzen soll, geringe Metalle in Gold zu verwandeln, und das aurum potable, die Goldtinctur. Im Gegensatz zu den Ärzten der Alten, die als Heilmittel nur einfache Mittel, wie Pflanzenäfte anwendeten, führt Paracelsus als solche die chemischen Präparate ein;

ihm folgen Glauber, der Entdecker des wunden Glaubersalzes, und am Ende der Periode der ausgezeichnete Arzt van Helmont, der die Gase von den Dämpfen unterscheiden lehrte. In den Schriften von Geannanten ist ein erheblicher Fortschritt zu erkennen im Gegensatz zu der vorhergehenden literarischen Schreibweise. Insbesondere zeichnen sich aus durch Klarheit und Genauigkeit die Schriften des Agricola über die Hüttenprocesse.

Das Zeitalter der phlogistischen Chemie, das falls ungefähr hundert Jahre umfassend, fällt zusammen mit einer Periode wissenschaftlicher Bewegung, die an geregt durch die vorhergegangenen Entdeckungen von Welttheile und gefördert durch die Erfindung der Buchdruckerkunst, eine großartige Umgestaltung der Naturwissenschaften vorbereiten und bewirken mußte. Bezeichnet werden sind die Namen von Kepler, Galilei, Torricelli und des Philosophen Bacon von Verulam, die in den Naturwissenschaften den Versuch und die Beobachtung als die allein richtige Methode bezeichnen. In werden ferner in diesem Zeiträume die Alchemie der Wissenschaften gegründet, wichtig für Ausbreitung und Verbreitung wissenschaftlicher Arbeiten durch ihre Zeitschriften. An chemischen Arbeiten theilten sich nunmehr zahlreiche Männer an den geübten Ständen, und insbesondere nahm der Apotheker daran einen ehrenvollen Antheil. In der Vermehrung, welche die Kenntniss chemischer Sachen erfuhr, ist besonders hervorzuheben die Entdeckung der wichtigsten Gase, wie des Sauerstoffs, Wasserstoffs, Stickstoffs, Chlors, Stickstoffoxyds, Wasserstoffs, der Kohlensäure, schwefeligen Gas und des Phosphors, auch verschiedener organischer Stoffe und die Ausfindung des Jodens in elementarischer Form. Lavoisier, Cavendish, Priestley, Berzelius, Wollaston und Scheele betheiligten sich an dieser Arbeit. Ihren Hauptcharakter erhält jedoch diese Epoche von dem Auftreten der ersten chemischen Theorien, die sogenannten phlogistischen Theorie, welche von zwei ausgezeichneten Ärzten, Becher und Stahl aufgestellt wurde. Dieselbe dreht sich um die Frage, warum Metalle beim Erhitzen an der Luft verbrennen (d. i. sich oxydiren), und warum die entstehenden Metallasche (Dreyde) beim Schmelzen mit Kalk zu Metallen zurückgeführt werden?

Zur Erklärung dieser Vorgänge wird die Existenz eines Stoffs angenommen, Phlogiston genannt, in sehr geringer Menge in den Metallen enthalten, die beim Erhitzen derselben entweichen er, wodurch sie die metallische Eigenschaft verlieren. Gewisse Körper sind sehr reich an Phlogiston, z. B. Schwefel, Kohle, und insbesondere Kohle. Wird daher letztere mit Metallasche gegläht, so nehmen diese etwas Phlogiston auf und werden wieder zu Metallen. Diese Theorie, die damaligen Standpunkt scharfsinnige Theorie war, wurde unhaltbar erweisen, sobald man anfang, die chemischen Processe mit der Wage zu verfolgen, wodurch sich ergab, daß die Metalle beim Verfallen an Gewicht zunehmen, und daß die Metallasche bei der Zurückführung in Metalle an Gewicht verlieren, was unmöglich war, wenn im ersten Falle Phlogiston entweicht und im letzten aufgenommen wird.

Mit der Einführung der Wage in die chemische Forschung geschieht gegen Ende des 18. Jahrhunderts der Uebergang in die Periode der analytischen Chemie, die vielleicht besser als die der phlogistischen überhaupt bezeichnet werden würde. In nunmehr wird die Chemie nicht lediglich mehr als ein res eingebildeten oder wirklichen Nutzens wegen gepriesen, sondern viele widmen sich derselben als einem



stande rein wissenschaftlicher Forschung. Allerdings ist es die analytische Methode, welche von da an und Fortschritt vorschreibt, d. h. die genaue Untersuchung, aus welcherlei Stoffen die Körper zusammengesetzt sind, die qualitative Analyse, und welchen Gewichtsverhältnissen, die quantitative Analyse.

Das rationelle Betreiben der Chemie führte einerseits zum Begriff der chemischen Elemente, sowie zur Vermehrung ihrer Anzahl durch fortwährende Entdeckungen bis auf 63, worunter die der leichteren Elemente von hervorragender Bedeutung war — andererseits leiteten die Ergebnisse der quantitativen Untersuchungen zur Erkenntnis von Gesetzen, an welchen eine Reihe von Hypothesen, Theorien und Speculationen angeschlossen.

Der Eingang dieser Periode zeichnet sich Lavoisier durch seine Widerlegung der phlogistischen Theorien, die richtigen Erklärung des Oxydations- und Verbrennungsprocesses. Von seinen Zeitgenossen sind wir Fourcroy, Guyton Morveau, Berzelius, Richter und Waparroth.

Die große und stets sich mehrende Reihe der nachfolgenden Chemiker, deren viele zu den Lebenden gehören, bilden, je nach der Richtung ihrer Thätigkeit, verschiedene Gruppen. Vorzugsweise Analytiker, insbesondere im Gebiet der unorganischen oder Mineralchemie, sind: Berzelius, Wöhler, Rose, Smellie, Liebig, Bunsen und Fresenius. Mehr synthetische Chemiker sind ausgezeichnet: Gay-Lussac, Berzelius, Regnault, Faraday, Davy, Dalton, Graham und Kopp. An der Spitze der Chemiker, welche hauptsächlich die organische Chemie bearbeiten, sind wir Liebig, den Begründer der organischen Chemie, und zählen hierher noch Dumas, Gerhardt, Reimer, Hofmann, Kolbe und Kekulé.

Die unendlichen Entdeckungen von Stoffen, von denen nur organischen Basen, wie des Chinins, gedacht, und die ins Unermessliche sich mehrende Darstellung chemischer Verbindungen, stellen der Medicin, Künsten und Gewerben neue und ungeachtete Hülfsmittel zur Verfügung; sie bilden ferner die Grundlage theoretischen Chemie, die mit der Lehre von den chemischen Proportionen oder Äquivalenten, der Atomtheorie, der Lehre vom Isomerismus und der elektrochemischen Theorie, von der Typentheorie der Moleculartheorie und der Valenz oder Werthigkeit der Atome ihren nicht vollendeten Entwicklungsstadium entgegentritt. Die Spectralanalyse eröffnet den Blick in die chemische Natur unerreichbarer Himmelskörper und gestattet die chemische Speculation auch im Bereich des Weltraums.

Die Chemie ist nunmehr eine durchaus selbstständige Wissenschaft auch in ihren Vertretern geworden. Bis auf der Hochschule einem Professor der Medicin theilhaft, besitzen jetzt alle Universitäten und polytechnischen Schulen besondere Lehrstühle der Chemie und ihr gewidmete Laboratorien. Ueberdies ist die Chemie herausgetreten aus der Beschränkung als Fachwissenschaft, sie ist als eine der allgemein bildenden Wissenschaften aufgenommen worden in den Lehrstoff der Gymnasien und Realschulen.

## Einteilung der Chemie.

In der Art und Weise, wie unsere Wissenschaft sich ausbreitet und verwertet wird, läßt sich dieselbe in reine Chemie und in angewandte Chemie theilen. Den Eingang in letztere bildet die Experimentalchemie, d. i. ein Vortrag über die chemischen Erscheinungen, begleitet von den zum Verständnis unentbehrlichen Versuchen oder Experimenten.

Als pneumatische Chemie bezeichnete man früher den von den Gasen handelnden Theil derselben. Die Experimentalchemie wird eingetheilt in die unorganische oder Mineralchemie, welche von den Stoffen handelt, die der unorganischen Körperwelt entnommen werden, und in die organische Chemie, früher auch als Phytologie und Zoöchemie bezeichnet, welche die chemischen Verbindungen betrachtet, deren Ursprung aus dem Bereiche der Pflanzen und Thiere sich ableitet. Der Experimentalchemie geht zur Seite die analytische Chemie, welche als das A-B-C des praktischen Chemikers anzusehen ist, denn sie lehrt die Handgriffe und Methoden, welche erforderlich sind, die Stoffe in ihre Bestandtheile zu zerlegen und die Mengen der letztern zu bestimmen. Die theoretische Chemie hat als Gegenstand die kritische Forschung und Darstellung der Gesetze, welche aus der Fülle chemischer Thatfachen sich ergeben, sowie den Versuch, dieselben auf Grundursachen zurückzuführen; sie wird hierbei stets mehr oder weniger zur speculativen Chemie. Ein Theil derselben, der von den Gewichtsverhältnissen handelt, in welchen die Stoffe sich verbinden, hat man als Stöchiometrie bezeichnet.

Die angewandte Chemie setzt selbstverständlich die reine Chemie voraus, denn sie ist deren Beziehung und Hülfsleistung im Gebiete anderer Zweige der Wissenschaft oder der Künste und Gewerbe. In diesem Sinne spricht man von einer medicinischen, physiologischen und pharmaceutischen Chemie, von einer technischen Chemie im allgemeinen und von besonderen Zweigen derselben, der Metallurgie oder bergmännischen Chemie, von der Gärungs- oder Mycochemie, der Farbenchemie und endlich von landwirthschaftlicher oder Agrikulturchemie u. a. m.

## Das chemische Laboratorium.

(Tafel I.)

Man hatte sich gewöhnt, seine Vorstellung über das Aussehen und die Einrichtung eines chemischen Laboratoriums nach den Gemälden der niederländischen Schule zu bilden, die uns in wiederholten Darstellungen von photographischer Genauigkeit die Scenerie der Werkstätte eines Alchemisten damaliger Zeit überliefert haben. Durch diese Bilder ist dieser geradezu eine typische, romantische Figur geworden. Im schwarzen Talar und Barett, mit langem weißen Bart sitzt er im geschmückten Sessel, vertieft in den alten folianten tabbalistischen Monogramme. Das Laboratorium selbst ist ein geheimnißvoller, düsterer Winkel, ausgestattet mit wunderlichem Kram, fremdartige Thiergestalten in Gläsern und aufgehängt an der Decke, rings umher mannichfaches Geräthe, Flaschen, Kolben, Phiole von seltsamer Form. Aus der dunkelsten Ecke leuchtet unter dem mächtigen Destillirapparat die feurige Glut, und man ist des Augenblicks gewärtig, aus der Höhe den Homunculus, den rothen Drachen oder Salamander hervorspringen zu sehen.

Von diesem traditionellen Bilde der alchemistischen Herzensstücke, wo Zauberkranke gebrannt und Wundermittel destillirt wurden, ist das heutige chemische Laboratorium um so mehr verschieden, als man erst in der neuesten Zeit seinen Zweck klar erkannt, hierdurch seine Einrichtung getroffen und seinen Ausbau vollendet hat. Die Laboratorien dienen heutzutage vorzugsweise dem wissenschaftlichen Unterricht in der Chemie, der ohne die praktische Übung nur in der

Anhäufung eines unfruchtbaren Gedächtniswerths bestehen würde.

Während im Beginn des Zeitalters der wissenschaftlichen Chemie die Meister in der chemischen Experimentierkunst nur wenigen bevorzugten Schülern ihre Werkstätten öffneten, wie Bergelius in Stockholm, Gay-Lussac in Paris, Rose in Berlin, richtete vor etwa vierzig Jahren Liebig in Gießen zuerst ein öffentliches Universitätslaboratorium ein, das, mit beschiedenen Mitteln begonnen, zur Pflanz- und Musterchule der Methodik in praktischer Ausführung wissenschaftlicher Arbeiten geworden ist. Seitdem sind ähnliche Anstalten an allen Universitäten und technischen Hochschulen entstanden, und es gewinnt den Anschein, als ob bei einigen derselben die verspätete Herstellung hätte gut gemacht werden sollen durch wahrhaft palastartige Bauwerke mit verschwenderischer innerer Ausstattung.

Das erst im Jahre 1869 vollendete neue Universitätslaboratorium zu Leipzig sollte alle bei den vorhergegangenen Einrichtungen derselben Art gemachten Erfahrungen benutzen und die bewährten Vorzüge in sich vereinigen, und dadurch als eine Musteranstalt sich erweisen. Es ist daher ganz vorzüglich geeignet, in Bild und Wort Zweck und Ausführung eines modernen chemischen Laboratoriums zur Anschauung und zum Verständniß zu bringen. Dasselbe ist mit einem Aufwand von 80000 Thalern nach der Idee und den Entwürfen des zeitigen Dirigenten, des Professors der Chemie H. Kolbe, vom Architekten Zöcher erbaut worden.

Die Einrichtung des Laboratoriums ist dahin bemessen, daß darin 130 Praktikanten an hierfür eingerichteten Tischen ebenso viele Arbeitsplätze finden. Es sind ferner für gewisse chemische Arbeiten und Versuche Locale mit besonderen Vorrichtungen vorhanden. Ueberdies sind die erforderlichen Säle für die Vorträge, sowie die Wohnräume für den Professor und die Assistenten mit einbegriffen.

An der Hand von Taf. 1, Fig. 1, die das Erdgeschoss, und Fig. 2, welche das obere Stockwerk im Grundriß darstellt, läßt sich nachweisen, in welcher Vollständigkeit diesem Zwecke genügt ist. Betrachten wir zunächst eine Reihe von Einrichtungen, welche in beiden Stockwerken die gleiche ist, so begegnen wir den Arbeitszimmern A, A' mit je vier, resp. je sechs Arbeitszischen, von welchen die des Erdgeschosses für Anfänger bestimmt sind, während im oberen Stock die bereits geübten Chemiker arbeiten. Außerdem ist noch eine Anzahl von Arbeitsplätzen an den Fensterpeilern, Fensterbänken und passenden Stellen der Seitenwände angebracht. B B sind geräumige Experimentierzimmer, mit langen Tischen, für solche Arbeiten, die eine Aufstellung von größern Apparaten erfordern. C C sind offene Hallen, die nach Bedarf einen Fensterverschluß erhalten können, während D D gänzlich offene Hallen sind. In diese Locale werden Arbeiten verlegt, bei denen in großer Menge übel riechende oder schädliche Gase und Dämpfe sich entwickeln. E und E sind Zimmer für die Arbeiten mit Schwefelsäureoxyd. Dieses abwechselnd riechende und in größerer Menge giftig wirkende Gas ist eins der wichtigsten Reagentien, unentbehrlich in der qualitativen und quantitativen Analyse, sodaß es fortwährend in Gebrauch kommt und den Laboratorien älterer Einrichtungen hauptsächlich ihren specifischen Geruch verleiht. Es ist daher mit Recht in ein abgesondertes Gemach verwiesen worden, wohnin eine Leitung das Schwefelwasserstoffgas aus einem in dem Kellertraume befindlichen Gasometer führt, das von Zeit zu Zeit damit gefüllt wird, und aus welchem durch eine einfache Vorrichtung aller überschüssige Schwefel-

wasserstoff von der großen, stets warmen Luft vollständig aufgelesen wird, daß man gar nicht seinen häßlichen Geruch verspürt. Eine Anzahl Tische stellt es den Laboranten zur Verfügung, wo es gewährt diese Einrichtung den doppelten Zweck von Bequemlichkeit und Ersparniß. In F und G sehen wir kleine Laboratorien für die Assistenten. G und G sind Kammern, wo Reagentien vorrätig gehalten werden. In H begegnen wir dem Zimmer k, welches mechanische Werkstätte dient, sodann dem Zimmer I, wo seine Wagen aufgestellt sind. In J zweideckiges und zugleich als Bibliothekszimmer dienend Raum K des Oberstocks. Diese Bibliothek ist mit solchen Werken ausgestattet, in denen der Chemiker bei seinen Arbeiten sich Rath zu erholen hat.

Auch die pyrotechnischen Arbeiten, die metallurgische Schmelzungen, lang andauernde Glühungen in sehr hohen Temperaturen, machen bedienend die leichten und Einrichtungen erforderlich, mit hohem Luftzug und feuerfestem Mauerwerk. Solche sind in einem hellen gewölbten Raume des Erdgeschosses.

Das Local H (Fig. 2) enthält Vorrichtungen eigentümlicher Art, die in neuerer Zeit eine wichtige Rolle, vorzugsweise in der organischen Chemie spielen. Die chemische Verwandtschaft zwischen Elementen und Verbindungen derselben äußert sich in vielen Fällen ganz verschieden, je nachdem dieselbe gewöhnlichen Temperatur- und Luftdruck-Verhältnisse oder bei lang andauernder hoher Temperatur und hohem Druck aufeinander einwirken. In der Art werden die betreffenden Stoffe in Glasröhren gebracht, letztere zugegenossen, Del- oder Metallballe auf 200 — 300° C. erhitzt. Hierbei entleert, wenn flüchtige Körper vorhanden sind, im Innern der Glasröhre ein außerordentlich hoher Druck, der nicht selten dieselbe in gefährlicher Weise für den Experimentirenden sprengt. In der Gefahr wird die Glasröhre nochmals in eine Hülse eingeschlossen. Als Beispiel von chemischer Einwirkungen der Art sind die farbigen anzu führen, von denen viele nach eben beschriebenen Bedingungen gebildet werden.

Der Raum H des Erdgeschosses und die Stages sind Garderobezimmer, worin der Chemiker nicht bloß Hut, Ueberrod, Schirm u. dgl. in der Regel auch einen Costümwechsel vorfindet, die chemischen Arbeiten stets mit Gefahr für die Integrität des Anzugs verknüpft sind. Ein zweites Zimmer, welches der Schwefelsäure genügt, um einen unvermeidlichen Tropfen Schwefelsäure, um ein Loch zu erzeugen, genug für die Beförderung eines emittirten dungsstüdes zum Laborirerde. Das arbeitend sonal bietet nach dieser Metamorphose allern interessanten Mannichfaltigkeit antiquirter Apparate.

Imponirend und ansprechend ist der Eindruck, den in den großen Hörsaal M Eintreten. Derselbe ist von zwei Seiten durch zwei Fenster erleuchtet und hat auf neun aufsteigenden Bänken und Stühlen 180 Sitzplätze gewährt uns den Einblick in dieses eben als geschmackvoll eingerichtete Local. Wenn man hinweg sehen wir vor uns den großen Chemisch des vortragenden Professors, bedeckt mit den verschiedensten Art. In der Mitte der Vorwand befindet sich eine schwarze Tafel, auf der dieselbe die chemischen Formeln und die Bilder der sich vollziehenden Zersetzungen und Verbindungen entwirft. Diese Tafel ist nach der Art schiebbar, wie unser Bild darstellt, wodurch

Nische geöffnet ist, in der die Versuche an-  
werden mit überelischen Stoffen, ohne Be-  
zu der Zuhörenden. Zugleich sieht man in das  
Präparatzimmer (N, Fig. 1), aus welchem  
sistent nach Bedarf die hergerichteten Apparate  
räparate darreicht. An beiden Seiten der Ta-  
b die zu den Versuchen erforderlichen Re-  
n aufgestellt. Der obere Theil der Rück-  
ist in Felder getheilt, auf welchen deutlich  
die Namen der chemischen Elemente, mit  
ung ihrer Zeichen und Atomgewichte, angeschrie-  
id, sodas sie, stets vor dem Auge des Zuhörers  
ch, leicht dem Gedächtnis sich einprägen. In  
Littelfeld ist die Wüste des erhabenen Sönners  
ist und Wissenschaft, des greisen Königs Jo-  
von Sachen aufgestellt; derselben gegenüber  
Ministers von Falkenstein, der sich hohe  
nte um die Förderung der Universität Leipzigs  
chemischen Instituts insbesondere erworben hat.  
beiden Seitenwänden befinden sich die Wägen der  
hen der Chemie, von Liebig und Wöhler,  
von Berzelius und Mitscherlich. Ein reicher  
ndter für Gaslicht und drei an Stelle der drei  
in der Dede des Saals über dem Experi-  
tisch eingesezte Gasfönnen erhellen bei abends  
Vorlesungen den Hörsaal.

n Vorbereitungszimmern N und N' benach-  
der große Saal O, welcher die Sammlungen  
her Präparate und Apparate enthält. Er birgt  
eigentlichen Schätze der gesammten Anlage, aus-  
in Glaschränken. Hier finden wir in unzäh-  
r Vollständigkeit beizuminnen die 63 Elemente, aus  
t die greifbare Welt zusammengefezt ist, und die  
ien Combinationen, in welchen dies sich verwirk-  
hat. Doch nur das specifisch chemisch gebildete  
weiss den Werth des oft unscheinbaren Inhalts  
Bläser zu schätzen, die denselben sich darbieten.  
a rascher Sprung vom äussersten Süd des Ge-  
s nach dem äussersten Norden führt uns in den  
ten Hörsaal P. Daneben befinden sich die Wohn-  
ner für Assistenten Q Q', R R', S S'. Den  
ch bildet das kleine Zimmer T; es steht durch  
fenster in Verbindung mit der Aussenwelt und  
deshalb zu solchen Versuchen, welche absoluten  
chluss des Tageslichts erheischen.

n ähnliches, größeres Zimmer mit schwarzen  
den, Fußboden und Dede, mit nur einem Fenster,  
es leicht lichtdicht verschlossen werden kann, ist  
im obern Stockwerk gelegene Raum Q. Dasselbe  
zu photometrischen Messungen und andern op-  
n, speciell zu Spectralversuchen. Anknüpfend  
einige bereits bekannte Thatfachen haben die  
rsuchungen von Bunsen und Kirchhof über den  
luss der in einer Flamme befindlichen Dämpfe auf  
Spectrum, d. i. auf das farbige Bild, in welches  
Prisma den hindurchgehenden Lichtstrahl zertheilt,  
unschätzbare Methode ergeben, um die Gegen-  
t unendlich geringer Mengen eines Elements zu  
anen, eine Methode, die nicht nur zur Entdeckung  
rerer bis dahin unbekannter Elemente führte, welche  
ter Erde angehören, sondern die auch gestattet,  
r die chemischen Elemente, aus welchen andere Welt-  
er zusammengefezt sind, sichere Anhaltspunkte zu  
en. Grund genug, um dieser Methode der Spec-  
analyse ein in aller Vollkommenheit ausgestattetes  
t anzuweisen.

Die übrigen, mit W W ... bezeichneten Räume des  
geschoßes machen einen Theil der Wohnung des  
professors aus, deren übrige Gemächer in Fig. 2  
ch die gleichen Buchstaben kenntlich gemacht sind.

Wir sind hiermit wiederum im obern Stock angelangt,  
wo noch einige Zimmer zu besuchen sind. L ist das Local  
zur Ausführung der organischen Analyse, nach der  
Methode, die mit Liebig's Namen unzertrennbar ver-  
knüpft ist. Sie beruht im wesentlichen darin, das  
die meisten organischen Körper, nur aus Kohlenstoff,  
Wasserstoff und Sauerstoff bestehend, verbrennlich sind.  
Die Verbrennung derselben ausföhrlich zu be-  
wirken, die entstehenden Producte aufzusammeln und  
zu wiegen und somit die quantitative Zusammensetzung  
der organischen Körper zu ermitteln, ist das Verdienst  
dieser S. 12 eingehend besprochenen Methode. Zu ihrer  
Ausführung findet sich hier alles vereinigt und ausfö  
zweckmäßigste eingerichtet.

Neben dem Privatlaboratorium N des Pro-  
fessors befindet sich dessen Sprech- und Ge-  
schäftszimmer O. Der Raum P dient dem Pro-  
fessor theils zur Ausführung organischer Elementar-  
analysen, theils zum Ueberhören hermetisch verschlo-  
sener Röhren, und enthält außerdem eine dem Chemiker  
so nothwendige Badevorrichtung mit Wasser- und  
Dampfleitung. R ist ein zur Aufstellung der Theil-  
maschine und anderer feinerer Instrumente bestimmtes  
Local. Endlich erreichen wir das Zimmer S für Gas-  
analysen. Letztere erfordern eine höchst genaue Ab-  
messung der in Untersuchung befindlichen Gase, und da  
deren Volumen mit jedem Temperaturwechsel sich ändert,  
so wurde hauptsächlich darauf Rücksicht genommen, das  
dieses Zimmer nach Norden liegend und durch seine  
Geräumigkeit möglichst unempfindlich ist für Schwän-  
kungen in der Temperatur.

Somit hätten wir den Gang durch sämmtliche Räu-  
mlichkeiten dieser Stätte des chemischen Studiums be-  
endet. Wir nehmen nunmehr unsern Standpunkt an  
der Eingangstüre des Arbeitsaales (Fig. 4) und ge-  
winnen hiermit den Ueberblick über einen Schau-  
platz reger praktischer chemischer Thätigkeit. In dem  
geräumigen, hellen Local stehen sechs große Arbeitstische,  
jeder eingerichtet für vier Arbeiter. Ein breiter Gang  
trennt die beiden Reihen der Tische, um welche über-  
dies ringsum ein hinreichender Abstand zur bequemen  
Bewegung zwischen denselben bemessen worden ist.  
Die gegenüber geöffnete Thüre gewährt eine perspectiv-  
ische Aussicht durch die ganze Länge des Gebäudes  
und eine Vorstellung von der beträchtlichen Ausdehnung  
desselben.

Die Abbildung eines einzelnen Arbeitstisches  
(Fig. 5) ist von photographischer Genauigkeit, sodas  
wir fast im Stande sind, die angebezeichneten Namen der  
Laboranten lesen zu können, die aus allen Län-  
dern sich zusammenfinden an dieser zur Zeit ersten  
Universität Deutschlands. Der Arbeiter findet da auf  
seinem Werkplatz alles vereinigt, was für die Mehr-  
zahl seiner Versuche erforderlich ist. Gummischläuche  
liefern ihm bewegliche Gasflammen, und Röhren der  
Wasserleitung, nach Bedarf, kaltes Wasser; durch  
ein Becken nehmen alle abfälligen Flüssigkeiten  
ihren Abfluss. Eine Garnitur von Reagentien steht  
jedem zur Verfügung und ein einfacher Winkelbadeu  
dient gleichzeitig zur Sperrung der Schuttladen und  
Schränke, worin der Laborant seine weitem Requisi-  
ten aufbewahrt. Auf dem mit einer Eichenholzplatte  
bedeckten Tische sehen wir Apparate der verschiedensten  
Art aufgestellt, zum Filtriren, Destilliren, Titriren  
u. s. w. In der Mitte zwischen je zwei Repositorien  
ist zum Gebrauch für je zwei Praktikanten eine  
Bunsen'sche Wasserluftpumpe besetzt, an dieser  
Stelle hauptsächlich zum raschen Filtriren und Aus-  
waschen bestimmt.

Die Methode der quantitativen Analyse unorganischer



Verbindungen, insbesondere der Minerale, besteht im wesentlichen darin, diese Körper erst in gelösten Zustand zu versetzen und alsdann aus den Lösungen nacheinander die einzelnen Bestandtheile in Gestalt unlöslicher, pulverförmiger Niederschläge auszufällen. Ein jeder derartiger Niederschlag muß auf einem Filter gesammelt, von anhängenden Stoffen ausgewaschen, getrocknet und gewogen werden, alles mühsame, viele Sorgfalt und Geduld erfordernde Operationen, die, stets wiederkehrend, sich äußerst zeitraubend erweisen. Außerordentlich vereinfacht und abgekürzt werden dieselben, wenn das auf den Niederschlag gegossene Wasser, mit einem verstärkten Druck auf denselben wirkend, die von ihm zurückgehaltene Lösung gewaltsam verdrängt. Hierbei wird von dem atmosphärischen Drucke in solcher Weise Anwendung gemacht. Das Filter von Fieberpapier, welches bestimmt ist, den Niederschlag aufzunehmen, wird mit seiner Spitze in einen unten im Trichter eingestekten Hohlkegel von Platinblech eingepaßt, und wird überall an die Wandung des Trichters fest angelegt. Hierdurch wird das Zerreißen des Filterpapiers verhindert, wenn das Wasser unter starkem Druck dasselbe durchdringt. Der Platinkegel paßt auf das genaueste in den Glasrichter T, Fig. 6, der vermittels eines durchbohrten Kortex luftdicht in den Hals eines Kolbens K von starkem Glas gesteckt ist. Ein zweites durch den Kort gehendes Glasrohr steht durch ein Kautschukrohr R in Verbindung mit einer Vorrichtung, welche die Luft in dem Kolben verdünnt. Sobald dies geschieht, drückt die Luft die mit dem Niederschlag auf das Filter gebrachte Flüssigkeit in einem Strahle aus der Spitze des Trichters, und in gleicher Weise das wiederholt aufgegebene Waschwasser, so daß in einigen Minuten das Gefäß der Auswaschung vollendet ist, worauf der Niederschlag mit dem Filter herausgenommen, gesüßt und gewogen werden kann.

Da der Luftdruck zuweilen den Kolben zerprengt, so wird derselbe in eine Art Becher B von Blech eingestellt und dessen Oefnung mit Tuch bedeckt, was das Umherfliegen von Glasplittern verhindert.

Die Luftverdünnung im Kolben durch eine gewöhnliche Luftpumpe zu bewirken, erweist sich nicht zweckmäßig, da der in den Waschwässern häufige Gehalt von Säuren, Schwefelwasserstoff u. a. m. die Metalltheile der Maschine angreifen würde. Man bedient sich dazu besser jener Punsen'schen Wasserluftpumpe. Es genügt zu diesem Zwecke, das vom Kolben abgehende Kautschukrohr luftdicht mit dem Behälter in Verbindung zu setzen, aus welchem Wasser in einem Rohr mit einer Fallhöhe von 10 — 12 Meter ausfließt und hierdurch die Luft aus dem Kolben saugt.

Zum Schluß noch einige Worte über Heizung und Ventilation sämtlicher Arbeitsräume. Erstere geschieht mittels heißer Wasserdämpfe, die von einem im Souterrain liegenden Dampfkessel durch ein System eiserner Röhren nach etwa 30 einzelnen Localitäten sich verbreiten und dieselbe in angenehmer und leicht zu regulirender Weise erwärmen. Aus derselben Quelle wird auch der für die Wasserbäder und Trockenschränke erforderliche Dampf gezogen und zugleich das destillierte Wasser geliefert. Im Sommer werden letztere aus einem zweiten kleineren Dampfkessel gespeist.

Die Ventilation wird bewirkt durch weite Züge, welche frische, im Winter gewärmte Luft von außen herbeiführen, und ebenso weite Schornsteine, welche durch Mündungen in der Nähe des Fußbodens und der Decke des Zimmers die verdorbene Luft beständig aufsaugen und hinwegführen. Infolge dessen herrscht in den Laboratoriumsräumen immer eine reine gesunde Atmosphäre.

## Der chemische Apparat.

(Tafel 2 und 3.)

Anspruchlos und unscheinbar, ja! gerade das, was der chemische Apparat sich aus, wenn wir ihn im Vergleich mit dem physikalischen. Welches Element macht auf den Laien der Besuch eines physikalischen Cabinets! Hinter spiegelnden Glascheiben schauen und glänzen ihm ganze Reiben der wunderbarsten Apparate entgegen; er erkennt in der feinen Ausführung der Maschinen in Messing und Stahl, in Holzwerk und Glas Meisterwerke der feinen Kunst, und in der That berechnet sich der Werth eines physikalischen Inventars auf viele Tausende, das reich ausgestatteten Anstalten reihen sich vor, und mehr Säle aneinander, mit immer neuen Instrumenten.

Von all diesem Glanz hat der Chemiker nicht zu zweifeln; wenn wir ihn überraschen könnten in den vollsten experimentellen Thätigkeit, dann finden wir seinen Arbeitstisch bedeckt mit allerlei Geräth, welches durch Pracht noch durch Kostbarkeit seine Bewunderung erregt. Und wenn er uns in der Mitte seines Reichthums vor die Spiegelscheiben seiner Präparatensammlung führt und mit Stolz auf sie weist, so erblicken wir dahinter nichts als farbige Gläsern aller Größe, gefüllt mit Stoffen aller Art. Der Blick in die Aufstellung einer Apotheke eines Materialkrams ist davon nur wenig verschieden, dennoch verschließen die Behälter der chemischen Sammlung die merkwürdigsten Stoffe und Reagentien, mitunter von größter Seltenheit und Kostbarkeit. Ist hier in Wirklichkeit eine Musterkarte der Chemiewelt aufgestellt, aus der alles sich aufbaut und aus dem alles wieder zerfällt im Kreislauf des chemischen Processes. Aber es erfordert einen Sachverständigen, einen Kenner, um diese Schätze zu würdigen.

Die Unterhaltungskosten eines großen Laboratoriums und die eines physikalischen Cabinets bemessen sich nach ganz verschiedenen Gesichtspunkten. Die Einrichtung für eigentlich chemische Arbeiten ist verhältnißmäßig billig, und man reicht hier mit Hunderten von Thalern weiter, als beim physikalischen Apparat, so viel Tausenden. Allein während der letztere, wenn angeschafft, jahrelang seine Dienste leistet — man bedient an die Luftpumpe, die Fallmaschine, die Hebelwerke, optischen Instrumente —, findet im chemischen Laboratorium ein täglicher Consum statt. Das Experiment, das seinem Wesen nach in der Constante Vertheilung verschiedener Stoffe besteht, die dabei verbraucht werden, verbraucht und verzehrt fortwährend Reagentien. Es ist wie ein Organismus; es erzeugt neue Combinationen und scheidet Abfälle aus.

Sehen wir uns nun den chemischen Apparat an, so steht das Glasgeräth obenan; es ist die Universalgleichwicht des Chemikers, sei es in Gestalt von Kolben oder Kochflaschen, Retorten, Bechern, Röhren, Gloden, Cylindern, Trichtern, Probirgläsern und dergleichen der verschiedensten Art, darunter die sogenannten Wulfschen, zwei- und dreihalsigen Flaschen, worin Taf. 3, Fig. 16 ein Beispiel ist. Eine ganz besonders wichtige Rolle spielen die Glasröhren; sie bilden die Kanäle, durch welche der Chemiker den Geleiten der Dämpfe ihre Wege anweist, bald um sie zu condensiren, bald um sie zu sammeln. Nicht nur verleiht er der Glasröhre nach Belieben zu schneiden und zu biegen, sondern auch vor der Lampe des Glasblästers, die dieselbe zu erweichen und aufzubläsen zu allerlei wunderlich erdachten Formen, deren Fig. 4, 7, 8 und 9 zeigen.

Aber der zerbrechlichen Natur des Glases bedient

iche Opfer, besonders durch die Hände der Arbeiter. Es herrscht da ein beständiger Consum und Ersatz. Ist Glas ist Porzellan am häufigsten verwendet; meist in der einfachen Form wenig verzierter unter Abdampfschalen. Aber es ist vom feinsten Porzellan; es klingt wie Metall und ist so sorgfältig, daß es vom Chemiker unbedenklich auf freies Feuer gesetzt wird. Dann finden sich noch kleine von Porzellan, sowie Röhren für beständige Glühungen.

Das bescheidenste Material ist aber der Kork, und das wichtig. Man hat Chemiker ersten Ranges in gelinden Entzündungen ausbrechen gesehen beim Einsetzen eines ganz untadeligen, zarten, dichten, porenreichen Korkstopfens. Denn der Kork ist zugleich ein Verbindungsmittel der chemischen Apparate, und man wolle nur seine Verwendung in Tafel 3, Fig. 23 und 18 betrachten, um eine Vorstellung seiner Bedeutung zu gewinnen. Zu seiner Anwendung hat der Chemiker die Korkpresse, um ihn weich und elastisch zu machen, das überaus scharfe Messer zum Zurechtschneiden, den Korkmesser und die Korkseile, auch Rattenschwanz zum Durchbohren desselben.

Ein gefährlicher Concurrent ist dem Kork entgegen in der Kautschuk, seitdem es gelungen ist, denselben durch einen Zusatz von Schwefel zu vulkanisieren, wodurch er beliebige Grade der Härte und Weichheit und zwar bei jeder Temperatur anzunehmen vermag. In der That spielt die Kautschukröhre eine große Rolle in der Geschichte der Experimentalchemie, verbindet auf das leichteste und zuverlässigste mit Röhren (Taf. 2, Fig. 21) und Flaschen mit Röhren (Taf. 3, Fig. 10, 11).

Vor dem Kork hat die aufschraubende Verbindung den großen Vorzug, daß sie vollständig gestattet und somit die Gefahr des Zerplatzens möglichst aufgestellt Apparate beträchtlich vermindert. Außerdem wird Kautschuk noch verwendet in den Stopfen, Ballons für Saug- und Spritzungen und zu sehr praktischen Klemmen oder Sperrungen, Fig. 2, die von ihrem Erfinder den großen Namen Quetschhahn erhalten haben.

Porzellan, Kork und Kautschuk — das sind die Grundelemente der chemischen Experimentierung, neun Zehntel aller chemischen Operationen, ersten Ranges, die zu den hervorragendsten Entdeckungen geführt haben, sind mit Apparaten aus diesen Hilfsmitteln ausgeführt worden, denen in späterer Zusammenstellung das Prädikat der Einfachheit vorzuziehen werden kann.

Beiläufig wird ein kostbares Material in Anspruch genommen, wie in erster Linie das Platin, das in den gewöhnlichen höchsten Hitzeoperationen unzerstört ist und nur von wenig Substanzen angegriffen wird. Daher verwendet man Ziegel von Platin, besonders bei analytischen Arbeiten zu Glühungen; ferner dienen zum Verdampfen Bleche und Platten von Platin, und zu verschiedenen Zwecken Arabit und Platinischwamm.

Silber wird in Gestalt von Schalen oder in Kesseln gebraucht bei Arbeiten, die mit ätzenden Flüssigkeiten befaßt sind, durch welche Platin, Glas und Porzellan angegriffen werden. In manchen Fällen jedoch blanke eiserne Geräte gleich guten Dienst. Jedoch braucht der Chemiker, wenn er seinen hantirt, die in Wasser löslich sind — was häufig gesagt bei allen mehr oder weniger der Fall ist. Tafel 2, Fig. 21 sind die ganze Ausrüstung und die Tafel B mit Quecksilber gefüllt.

Endlich, herabsteigend zu den unedelsten Metallen, hat

noch auch das Blei gewisse, dem Chemiker werthvolle Eigenschaften; es widersteht insbesondere dem Angriff der Verbindungen des Fluors, und Bleigeräthe dienen daher zu Darstellung und Aufbewahrung der Fluorwasserstoffsäure (Flußsäure), und Bleiröhren sind die unersetzlichen Leitungsröhren für das Leuchtgas.

Da hier und da noch allerlei mechanische Arbeiten vorkommen, die der Chemiker theils an den Stoffen, theils an seinen Apparaten vorzunehmen hat, so fehlt es in seiner Werkstätte nicht an Mörteln und Reibschalen von Eisen, Porzellan, Stahl und Alcat, an Hammer, Amboss und Zange, an Säge und Feile, ja auch eine Drehbank mag sich vorfinden zu Schleifen- und Bohrarbeiten, und Blasbälge in verschiedenen Dimensionen zur Belebung der Glut bei Kohlenfeuerung u. s. w.

Nach dieser Vorbetrachtung gehen wir nunmehr an der Hand unsern Atlas über zur Schilderung einiger Apparate, und beginnen mit solchen, die zu chemischen Operationen im Allgemeinen dienen, z. B. Heizapparate, während die in ganz besonderen Fällen verwendeten erst dann besprochen werden, wenn von den Stoffen die Rede ist, die ihre Zugabe erfordern.

### 1. Heizapparate.

Die Wärme ist ein chemisches Hauptagens, in allen Abstufungen, vom gelinden Wasserbad bis zur höchsten Weißglühhitze. Die Alten hatten ganze arsenale von Öfen; die allgemeine Verbreitung des Leuchtgases hat hierin eine große Vereinfachung herbeigeführt.

In Taf. 2, Fig. 1 erblinden wir den sogenannten Universalofen für Kohlenheizung. Derselbe ist von starkem Eisenblech, innen mit einem Beschlag von Thon ausgefüttert, etwa 0,5 Meter hoch. Oben ist bei b die Thür zur Feuerung, unten die Thür a zur Regulirung des Luftzutritts. Die Dämme d dienen zum Aufsetzen der Kochgeschirre.

Soll dieser Ofen zur Destillation benutzt werden, so wird der Ring Fig. 2 aufgesetzt und in diesen die Kapelle Fig. 3 gehängt. Letztere ist ein kleiner Kessel mit halbrundem Ausschnitt am Rande, zur Aufnahme des Retortenhalses, wie aus Fig. 12 ersichtlich, die einen ganz ähnlichen, aber feststehenden Ofen aus Mauerwerk darstellt. In die Kapelle wird etwa ein Finger hoch Sand gebracht, die Retorte eingesetzt und der verbleibende Hohlraum mit Sand ausgefüllt. Man nennt eine solche Vorrichtung ein Sandbad.

Zu Glüh- und Schmelzarbeiten in größerem Maßstabe dient der Schmelzofen, Fig. 11, im Durchschnitt abgebildet. Auf die Kofstabe, die hier im Querschnitt erscheinen, wird der Ziegel mit der Schmelzmasse gestellt, ringsum Holzloble geschüttet und die Feuerthüre geschlossen. Die Stärke des Zugs und der entstehende Hitzegrad hängt von der Höhe des seitwärts mit dem Glühraum verbundenen Kamins ab. Zur Erzeugung der stärksten Weißglühhitze benutzt man eine unter dem Namen des Sessförmigen Ofens bekannte Vorrichtung, Fig. 13. Derselbe besteht aus einem Cylinder von starkem Eisenblech, welcher unten eine Düse, d. i. Mundstück zum Einblasen von Luft durch einen Blasbalg hat. In den oberen Rand des Cylinders wird ein großer Graphitiegel eingehängt, in welchen zwei Zoll über seinem Boden, 8 kleine Löcher eingebohrt worden sind. Diesen gegenüber, auf einen Unterzug, wird der von glühenden Kohlen umgebene Ziegel gestellt, der die zu schmelzende Masse enthält. Man wählt hierzu einen der sogenannten heftigen Ziegel, die in Groß-Almerode aus unschmelzbarem Thon gefertigt werden.

Es gelingt, in demselben die schwerst schmelzbaren Metalle, wie Mangan, Chrom, Kobalt und Nickel zu schmelzen. Der Sessström'sche Ofen wird jedoch übertrassen und ersetzt durch die Wirkung der Flamme, welche entsteht, wenn in gewöhnliches Leuchtgas ein Strom von Sauerstoff eingeblasen wird. Dieselbe schmilzt Platin mit Leichtigkeit und bringt Silber zum Kochen, sodass es in Gestalt blauer Dämpfe überdestillirt. Die hierbei verwendeten Schmelztiegel werden aus gebranntem Kalk geschnitten.

Zu Erhitzungen geringen Grades und Umsangs dient die Spirituslampe, Fig. 4. Sie ist meist von Glas, das stets elegant bleibt und leicht den Stand des Brennmaterials erkennen lässt. Ein Baumwollbüschel fängt den Weingeist auf, dessen Verdunstung nach gemachtem Gebrauch durch ein aufgesetztes Hütchen verhindert wird. Eine Spirituslampe von starker Heizkraft, die insbesondere zu den Gährungsversuchen bei Analysen vorzügliche Dienste leistet, ist die Berzelius'sche Lampe mit doppeltem Luftzug, Taf. 2, Fig. 5 und Taf. 3, Fig. 13, 15, 16. Sie besteht nach dem ursprünglichen Princip aus einem Rundbrenner und wird aus einem Weingeistbehälter gespeist, der auf Niveau mit der Lampe communicirt oder, was gewöhnlicher ist, sie in Gestalt eines Ringes umgibt. Dieselbe ist jedoch seit der allgemeinen Verbreitung des Gases mehr und mehr außer Gebrauch gekommen, insbesondere seit Bunsen den nach ihm benannten Gasbrenner, Taf. 2, Fig. 9, construirt hat, durch welchen der Gasflamme der Name benommen und eine außerordentliche Heizkraft verliehen worden ist. Dies beruht darauf, daß dem Leuchtgas Luft beigegeben wird, bevor es zum Verbrennen gelangt. In diesem Zweck tritt durch seitliche Oeffnungen in den Fuß des Brenners, Fig. 6, Luft ein, mischt sich in dem aufgeschraubten Brandrohr, Fig. 7, mit dem Gas, und wird dann angezündet. Die Verbrennung geschieht hierdurch so vollständig, daß eine fast farblose Flamme entsteht, die daher auch zur Spectralanalyse verwendet wird. Sie ist zugleich so heiß, daß ohne Gefahr Glasgefäße derselben nicht ausgesetzt werden können. Es genügt jedoch, dem Glas ein Drahtnetz als Unterlage zu geben, um die Hitze geeignet zu mäßigen. Schiebt man in das Brandrohr der Bunsen'schen Lampe den Einsatz, Fig. 8, so werden die Luftlöcher geschlossen und man erhält an der spaltförmigen Oeffnung eine schmale, leuchtende und rauschende Flamme, welche zu Reductionsversuchen am Löthrohr geeignet ist.

## 2. Trockenapparate.

Heizapparate besonderer Art sind die Trockenapparate. Sie dienen hauptsächlich, um Stoffe, die der quantitativen Analyse unterworfen werden sollen, bei einer bestimmten Temperatur von allem hygroskopischen Wasser zu befreien, mitunter auch, um selbst chemisch gebundenes Kristallwasser zu entfernen. Eine sehr einfache Vorrichtung der Art zeigt Fig. 14 auf Taf. 2, ein Kasten von Kupferblech mit doppelter Wandung, der durch b mit Oel gefüllt und auf einen Herd oder Ofen, oder über ein Feuer gestellt wird. Ein bei a eingesezierter Thermometer zeigt die Temperatur an. In den innern Hohlraum c bringt man die zu trocknende Substanz und schließt das mit den Abzugslöchern g und h versehene Thürchen. Ganz ähnlicher Art ist die Trockenbüchse, Fig. 16, in welche man das Schälchen mit der Substanz einstellt und den Dedel mit dem Thermometer aufsetzt. Man kann dann die Büchse einer beliebigen Wärmequelle aussetzen. Durch die Oeffnung b entweicht die Feuchtigkeit.

Das ganz einfache Wasserbad besteht aus einer

Porzellanschale mit innern Rand, Fig. 17, die man zur Hälfte mit Wasser gefüllt und in den Kasten c Schale gesetzt, welche den einzutrocknenden Gegenstand enthält, der in diesen nicht über 100 Grad erhitzt wird. Begreift man die Anwendung höherer Temperatur, so bedient man sich ganz ähnlicher Metallgefäße, die Oel enthalten (c. bad). Manche Stoffe zerfallen sich bei der geringen Erwärmung, und man kann ihnen nur dadurch Schutz entziehen, sie austrocknen, daß, sie in einem Schmelzgefäß, Fig. 15, auf ein Gefäß mit Schwefelsäure c gesetzt werden, worauf man das Ganze mit einer Glasglocke b bedeckt. Die Schwefelsäure saugt alle dem Körper das verdunstete Wasser auf.

Von mehr zusammengesetzter Art ist der Apparat, Fig. 18, dessen man sich zum Austrocknen der Substanz bedient, die der organischen Analyse unterworfen werden sollen. Der eigentliche, aus Glas bestehende Trockenbehälter c steht nach links mit einem Kessel der Schwefelsäure enthält, nach rechts mit einem Wassergefäß d von ziemlichem Umfang in Verbindung. Er wird erhitzt, indem man ihn in das untere aus gebildete Kesselfchen einsetzt, das Wasser enthält, worin man sich über einer Lampe stehend zu trocknen. Sein Dedel hat beiderseits passende Auslässe e, die nach oben gehenden Schenkel der Trockenbüchse. Sobald man durch den Hahn e Wasser ausfließen lässt, entsteht eine Luftbewegung durch den Apparat, indem durch das Rohr b Luft einströmt, durch die Schwefelsäure gehend ihre Feuchtigkeit abgibt und über die in c befindliche Substanz hinströmt, welche selbst austrocknet. Von Zeit zu Zeit läßt man den Apparat e bei g und f aus und wiegt ihn. Die Substanz selbst keine weitere Abnahme an Gewicht, dann ist die darin enthaltene Substanz vollkommen trocken.

## 3. Filtrationsapparate.

Noch begegnen wir im Laboratorium Filtrationsapparaten verschiedener Art. Ein solcher ist Taf. 2, Fig. 19 abgebildet und kann mit seinen verschiedenen Theilen ein Universaltrichter genannt werden. In dem dieses theils aus Holz, theils aus Eisen bestehende Gefäß ist gewöhnlich mit einer Pergamenthaut bedeckt, die stets reinlich gehalten werden muß. Ein Ring des untersten Armes b dient zum Aufhängen der Abtampfschalen über eine Spirituslampe, ein Trichters beim Filtriren; zwischen die Gelenke c und d wird ein Tiegelfuß bei Glühbirnen gehängt; zum Aufsetzen kleiner Schalen. Die Hähne dienen den Rührstäben von verschiedener Größe bei d eingeklemmt werden. Die obere Schraube e ist ein sogenannter Retortenschlüssel, seine mit Kork gefüllten Arme n, n, welche durch die Schrauben i und l geschlossen und geöffnet werden können, wird je nach Bedarf der Hals der Retorte oder einer Glasröhre u. s. w. eingeklemmt. Die Schraube f kann der Halter sowohl in der horizontalen als in der vertikalen Richtung nach Bedarf gestellt werden; derselbe ist ferner mit einem Ringe zu der die Schraube g gehört, dreht, um die dreifache Beweglichkeit macht es möglich, den Trichter in jeder beliebigen Lage festzustellen zu verwenden. In der Praxis findet man diese vier verschiedenen Vorrichtungen auf demselben Apparat vertheilt.

Fig. 22 zeigt ein hölzernes Filtrationsgefäß. Die Filtration ist eine der häufigsten Operationen und bezweckt die Trennung einer Flüssigkeit von den in ihr suspendierten Körpertheilen. Es geschieht dies, indem man



ein sogenanntes Filter gießt, ein tonisch gefaltetes Filterpapier, das in einen Glasrichter paßt und dessen Spitze die durchgefeilte, oder wie man sagt rirte Flüssigkeit vollkommen klar abtropft. Auf Filter verbleiben die festen Theile, entweder als bloßer Rückstand, oder dieselben bilden die Hauptmasse, wie z. B. in chemischen Analysen, wenn Stoffe Niederschläge ausgeschieden worden sind und als solche gesammelt und genau gewogen werden sollen. diesem Falle muß der auf dem Filter befindliche Stand vor dem Trocknen sorgfältig ausgewaschen werden. Dies geschieht durch öfteres Aufgießen von dem Wasser, und hierzu findet meist die Sprigische Verwendung. Dieselbe hat entweder wie Fig. die Einrichtung des aus der Physik bekannten outalls und besteht aus einer kleinen, mit Wasser gefüllten Flasche, in welche eine Glasröhre einpaßt, die durch die in angegebener Haltung stark Luft geblasen wird. Sobald dies aufhört, treibt die erhaltene verdichtete Luft einen kräftigen Wasserstrahl in dem Sprigrohr. Bequemer ist jedoch die in Fig. abgebildete Sprigflasche, deren Sprigröhre unter Wasser bis fast zum Boden reicht, während die Luft durch ein zweites kurzes Mundstück, eingehaucht wird, den Wasserstrahl heraufstreibt. Damit man erforderlichensfalls auch siedendes Wasser verwenden kann, eine aus Draht gefertigte Handhabe angebracht.

#### 4. Destillirapparate.

Von den Destillirapparaten, diesem Haupt- und Wunderwerk der alten Laboratorien, ist den modernen nur wenig zu sehen. Alle Arbeiten, die massenhaft Destillationen erfordern, werden betreffenden Industrie überlassen, wie dies später gezeigt wird. Die einfachste Destillirvorrichtung besteht aus der Retorte, die in der bereits beschriebenen Sandpelle, Taf. 2, Fig. 12, sitzt und ihren Hals in den des liegenden Kolbens einführt, der bestimmt ist, das rochne der Destillation, Destillat genannt, aufzunehmen. Ein solcher Apparat ist jedoch nur verwendbar bei Flüssigkeiten, die, wie z. B. Salpetersäure oder Schwefelsäure, eine geringe Flüchtigkeit besitzen, daß es zur Verdichtung ihrer Dämpfe genügt, den Hals in eine Schüssel mit öfter erneuertem Wasser oder Schnee zu legen.

Handelt es sich aber darum, sehr flüchtige Flüssigkeiten, wozu wir Weingeist und Aether rechnen, der Destillation zu unterwerfen, so bedient man sich des Liebig'schen Destillirapparats, Fig. 23. Die Retorte sitzt auf einem Ofen, mit aufwärts gerichtetem Halse, welchem daher nur Dampf durch ein Verbindungsstück in eine ziemlich lange und weite Glasröhre aa ausweichen kann. Dieselbe dient als Condensator, d. h. zur Verdichtung des Dampfes zu Flüssigkeit, so ist zu diesem Zweck vermittels zweier Rörre in ein weiteres Blechrohr eingefügt, in welches aus einem Behälter durch ein Zuleitungsrohr e beständig kaltes Wasser einfließt, während das warm gewordene durch f abfließt. Das Destillat gelangt durch den Schnabel h' in ein zur Aufnahme dienende kleine Kolben. Dieser ausgezeichnete Apparat gestattet bei jeder Temperatur die Destillation selbst der flüchtigsten Stoffe ohne jeden Verlust.

#### 5. Analytische Apparate.

Wir verlassen nunmehr das Gebiet der allgemein anwendbaren chemischen Apparate, um unsere Betrachtungen einigen andern zuzuwenden, die in ganz bestimmten Fällen der chemischen Analyse Anwendung finden und die gewählt worden sind, um einen Einblick in die mancherlei Combinationen zu gestatten,

welche durch die verschiedenen Eigenschaften der Körper hervorgerufen werden, deren Menge einer genauen Ermittlung unterworfen werden soll.

Da sehen wir zuerst auf Taf. 2, Fig. 19 einen Apparat zur Bestimmung von Kohlenensäure, ein Meisterstück der Glasbläserkunst. Beispielsweise soll aufs genaueste ermittelt werden, wie viel Kohlenensäure in einer abgemessenen Menge von doppeltkohlensaurem Natron enthalten ist. Man bringt dieses in den kleinen Kolben A und fügt etwas Wasser hinzu, worin es sich auflöst. Der mit verdünnter Salpetersäure gefüllte Einsatz C paßt luftdicht in die Oeffnung a des Kolbens; nachdem er in dieselbe eingefügt worden ist, füllt man den Schenkel B zur Hälfte mit Schwefelsäure und verschließt die Röhre h oben mit etwas Wachs. Die ganze Vorrichtung wird nunmehr gewogen, worauf man die Röhre h durch den Kork i ein wenig in die Höhe dreht, so daß die Spitze des Einsatzes bei c geöffnet wird und Salpetersäure in den Kolben fließt. Hierdurch wird das kohlen-saure Natron zersetzt; die Kohlen-säure wird frei und nimmt, der geträumten Röhre h folgend, den Weg durch die in B befindliche Schwefelsäure, die ihr alle Feuchtigkeit entzieht, und entweicht endlich aus d. Durch Kochen des Kolbeninhalts sowie durch Saugen bei d, nachdem man das Wachs von der Mündung der Röhre h hinweggenommen hat, wird alle Kohlen-säure aus dem Apparat entfernt, der nunmehr wieder gewogen wird. Die Abnahme seines Gewichts entspricht dem Gewicht der entwichenen Kohlen-säure.

Eine der schwierigsten Aufgaben ist unter Umständen die genaue quantitative Bestimmung der Salpetersäure. Wir versuchen ein für diesen Zweck zwar vermittelte Methode zu beschreiben, die sich aber unter andern bei der Untersuchung des Salpetergehalts im Labad bewährt hat. Dieselbe beruht auf dem Princip, daß Salpetersäure beim Erhitzen mit Eisenchlorid in Stidordgas verwandelt und das letztere, mit Sauerstoff zusammengebracht, wieder in Salpetersäure zurückgeführt wird. Zur Ausführung der Operation bringt man das gelöste salpetersaure Salz in den Ballon A, Fig. 21, der durch ein Kautschukrohr mit einer Glasröhre b b, hier punktiert, verbunden ist, an deren Ende wieder eine Kautschukröhre c c befestigt ist. Nachdem durch Kochen des Inhalts von A alle Luft ausgetrieben ist, taucht man c in eine Lösung von Eisenchlorid in Salzsäure, worauf diese in den Ballon steigt. Man verschließt das Kautschukrohr c mit einer Klemme von Eisendraht und führt es in der mit Quecksilber gefüllten Wanne unter die kleine, ebenfalls mit Quecksilber gefüllte Glasglobe B. Man setzt jetzt die Lampe wieder unter A und bewirkt hierdurch die Zersetzung der Salpetersäure in Stidordgas, nach deren Vollendung die Klemme am Ende der Kautschukröhre c geöffnet und das Stidordgas in die Globe B geleitet wird. Ein wenig Kaltmilch, die man in dieselbe steigen läßt, dient, um etwa beigemengte saure Dämpfe zu entfernen. Es handelt sich nunmehr darum, das Gas in den Ballon C überzuführen; derselbe enthält etwas Wasser, welches man längere Zeit kochen läßt, damit alle Luft ausgetrieben wird, worauf man das Ende der Kautschukröhre f über die dünne Spitze der Globe B zieht und nachher die Spitze abbricht. Sofort steigt das Stidordgas in den luftleeren Ballon C. Die große Globe D enthält Sauerstoff, der nach C hinübertritt, sobald die Kautschukröhre f an h gefügt und der Hahn r geöffnet wird. In Verührung mit Sauerstoff wird das Stidordgas in Salpetersäure verwandelt, die in Wasser gelöst im Ballon C sich befindet und deren

Menge man aus dem Verbrauch einer ganz verdünnten Natronlauge von bekanntem Gehalt findet, die zur Sättigung erforderlich ist.

Eine analytische Methode ganz besonderer Art ist die Maßanalyse oder Titrimethode. Sie bezweckt hauptsächlich, auf eine leichte und rasche Weise den Gehalt einer Flüssigkeit an der in ihr gelösten Substanz zu ermitteln, insbesondere in der chemischen Technik, wo Fälle derart häufig vorkommen. Als Beispiel führen wir eine Seifensiederei an, wo täglich die Frage nach dem Natron- oder Kaligehalt einer Lauge sich einstellt, oder eine Münze, wo es sich ebenso oft darum handelt, den Silbergehalt des ein- und ausgehenden Silbers genau zu bestimmen. Wählen wir den letztern Fall als Beispiel zur Beschreibung der Methode. Alles im Verkehr befindliche Silber ist eine Legirung von Kupfer und Silber; der Gehalt an letzterm bestimmt seinen Werth. Eine genau abgemessene Probe des zu untersuchenden Silbers wird in reiner Salpetersäure aufgelöst; die entstandene Lösung enthält salpetersaures Silberoxyd und salpetersaures Kupferoxyd, welch letzteres ihr eine blaue Färbung ertheilt. Wird zu dieser Flüssigkeit eine Auflösung von Chlornatrium (Kochsalz) gebracht, so entsteht eine unlösliche Verbindung von Chlor mit Silber, Chlorsilber genannt, welche sich außerordentlich rasch in Gestalt von weißen Flocken abscheidet, wenn die Flüssigkeit stark geschüttelt wird. Führt man mit dem Zusatz von Chlornatrium fort, so gelingt es bald, alles Silber auszufällen, während sämtliches Kupfer gelöst bleibt. Man sieht ein, daß hierzu um so mehr Chlornatriumlösung verbraucht wird, je mehr Silber vorhanden war. Aus dem Gesetz der chemischen Verbindungsverhältnisse hat man berechnet, daß eine Lösung von 0,5416 Gramm Chlornatrium in 100 Kubikcentimeter Wasser genau 1 Gramm Silber niederschlägt. Man nennt diesen Gehalt der Salzlösung ihren Titer. Verbraucht man beispielsweise von dieser titrirten Flüssigkeit zum Ausfällen des Silbers aus obiger Probe 85 Kubikcentimeter, so enthielt dieselbe 0,85 Gramm Silber, was dem Silbergehalt eines süddeutschen Sechfers entspricht.

Da es leicht ist, eine solche titrirte Kochsalzlösung in Menge vorrätig zu halten, so bedarf es, um nach dieser Methode eine Silbergehaltsbestimmung vorzunehmen, nur der einzigen Abwägung der genommenen Probe. Wollte man dagegen das ausgeschiedene Chlorsilber wägen und daraus den Silbergehalt erfahren, so müßte dasselbe vorher auf einem Filter gesammelt, auf das sorgfältigste ausgewaschen und getrocknet werden, Operationen, die nicht nur sehr zeitraubend sind, sondern auch die Möglichkeit dabei vorkommender Fehler vermehren.

Auf Taf. 3 begegnen wir nun den einfachen Apparat, die bei der Maßanalyse verwendet werden und welche bezwecken, die titrirte Flüssigkeit höchst genau, in beliebig kleinen Portionen, selbst Tropfen für Tropfen, der Probe zugeben zu können. Fig. 1 ist eine Pipette von 10 Kubikcentimeter Inhalt; sie wird durch Eintauchen in die titrirte Flüssigkeit gefüllt, hierauf ihre obere Oeffnung mit dem Zeigefinger verschlossen, durch dessen Lüften und Andrücken man nachher das Ausfließen des Inhalts regulirt. Am bequemsten sind die Fig. 2 abgebildeten, mit Sperrhahn versehenen Titrirröhren nach Mohr. Am untern Ende befindet sich ein durch eine Klemme von elastischem Messingdraht geschlossenes Kautschukrohr. Drückt man die beiden Endspitze desselben gegeneinander, so öffnet sich die Sperrung, und die Flüssigkeit fließt ab; beim Nachlaß des Drucks schließt sie sich

wieder. Durch diese Vorrichtung ist die Burette von Gay-Lussac, Fig. 3, fast gänzlich verdrängt worden; sie heißt auch Tropfglas, weil kein Tropfen derselben die darin enthaltene Flüssigkeit nur tropfenweise ausfließt. Wie die Abbildungen andeuten, sind diese Röhren auf das sorgfältigste graduirt und getheilt in Kubikcentimeter und Zehntel derselben, so daß selbst sehr kleine Mengen der verbrauchten Flüssigkeit abgelesen und z. B. bei Silberproben ein Gramm genau bestimmt und  $\frac{1}{2}$  Milligramm noch abgeschätzt werden kann.

Epochenmachend für die Entwicklung der analytischen Chemie war die Ausbildung der organischen Analyse durch Liebig in den zwanziger Jahren des Jahrhunderts. Die Verbindungen der organischen Chemie bestehen in der Regel aus zwei bis drei, seltener aus vier bis sechs Elementen. Während sich an denselben sämtliche 63 Elemente sich betheiligen und hierdurch ihre verschiedenen Eigenschaften erklärlich erscheinen, sind die zahlreichen organischen Stoffe meist nur aus dreierlei Elementen zusammengesetzt, nämlich aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff. Eine geringe Zahl derselben enthält auch vierten Bestandteil Stickstoff. In der That sind die drei erstgenannten Elemente den Zuder, der Alkohol, die Citronensäure, das Stearin — Elemente den widerwärtigsten Eigenschaften. Diese Unähnlichkeit kann daher nicht in der Qualität, sondern in der relativen Quantität ihrer Elemente liegen. Die Bestimmung dieser Gewichtsmengen ist eine große Schwierigkeit. Man kann nicht z. B. eine gewogene Menge von Zuder in Wasser auflösen und nunmehr den Kohlenstoff oder ein anderes Element als unlöslichen Niederschlag ausfällen, wie dies oben mit dem Silber geschehen ist. Man nimmt das Stickstoff lässt sich aus den organischen Verbindungen keins ihrer Elemente direct abtrennen. Die Analyse mußte daher einen andern Weg einschlagen, und dieser war dadurch vorgezeichnet, daß diese Stoffe sämtlich und vollständig verdunstet sind und in diesem Falle Kohlenäure und Wasser liefern. Die Aufgabe war, diese Bestandtheile aufzusammeln, und dieselbe ist durch die Vorrichtung, welche wir mit Hülfe der Abbildungen auf Taf. 4 beschreiben wollen, vollständig gelöst.

Als Beispiel nehmen wir an, daß ermittelt werden soll: aus wie viel Gewichtstheilen Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff eine abgemessene Menge eines Zuders besteht. Hierzu sind 0,5 Gramm Zuder genügend. Es ist unmöglich, diesen Zuder in der Luft oder in Sauerstoff vollständig zu verbrennen, die entstandenen Producte aufzusammeln. Man zerlegt aber den Zuder fein zerreibt und mit reicher Kohlenoxyd vermischt in einer langen Glasröhre, die der Glühhitze ausgesetzt, so gibt das Kupferrohr Sauerstoff ab, der Zuder verbrennt vollständig, Wasser und Kohlenäure, welche aus dem einen Ende der sogenannten Verbrennungsröhre entweichen. An diesem ist die gewogene Chlorcalciumröhre (Fig. 7) luftdicht angefügt; sie wird mit kleinen Schüden von Chlorcalcium, einem der jede Spur des hindurchstreichenden Zuders aufsaugt und festhält, dagegen die Kohlenäure durchsickern läßt. Diese tritt in den gewogenen Apparat, Fig. 4, der aus einem System von Glasstücken besteht und zum Theil durch einen Kallilauge, von der die Kohlenäure vollständig absorbiert wird. Sobald die Verbrennung beendet ist, bricht man die am hintern Ende der Verbrennungsröhre befindliche Spitze ab, jedoch Luft

sämmtliche im Apparat noch vorhandene Kohlensäure sowie den Wasserdampf verdrängen kann. Die Apparate werden nunmehr abgenommen und gewogen; aus ihrer Gewichtszunahme erfahren wir die Mengen des aus dem Zuder entfallenen Wassers und der Kohlensäure, und da die Zusammensetzung dieser Verbindungen bekannt ist (100 Wasser = 12 Wasserstoff + 88 Sauerstoff; 100 Kohlensäure = 27 Kohlenstoff + 73 Sauerstoff), so läßt sich leicht berechnen, wie viel Kohlenstoff und Wasserstoff der Zuder enthält. Zieht man die Summe der Gewichte dieser beiden Elemente von dem Gewicht des zur Analyse verwendeten Zuders (0,5 Gramm), so ergibt sich das Gewicht des in demselben enthaltenen dritten Elements, des Sauerstoffs. Auf diese Weise ist ermittelt worden, daß der Zuder besteht aus

|      |                      |
|------|----------------------|
| 42   | Procente Kohlenstoff |
| 6,5  | „ Wasserstoff        |
| 51,5 | „ Sauerstoff         |

100,0 Gewichtstheile Zuder.

Wir sehen in Fig. 5 die Aufstellung des Apparats zur organische Analyse, dessen man sich bedient, wenn die Verbrennungsrohre a durch Holzkohlen ersetzt wird; dieselbe liegt alsdann in einem rostartigen und wird mit glühenden Kohlen umgeben. In kurzer Zeit geschieht die Verbrennung meist vermittelt der Gasflamme, Fig. 6. Eine Reihe von Brennern befindet sich unter der Verbrennungsrohre, sobald die Ansündung der vordern begonnen und allmählich der Spitze zu fortgeschritten werden kann.

Wenn eine organische Verbindung außer den genannten drei Elementen noch Sticksstoff enthält, z. B. bei den bekannten wichtigen Arzneistoffen, dem Chinin und Morphin, der Fall ist, so geschieht die Verbrennung derselben der Hauptsache nach, oben beschrieben worden ist; nur wird ein längere Verbrennungsrohr genommen und in dessen vordern Theil eine Spirale von blankem Kupferdraht eingelegt. In diesem Falle entweicht der Sticksstoff, wä-  
 100 Wasser und Kohlensäure aufgenommen und ge-  
 100 werden.

Zur Bestimmung des Sticksstoffs wird eine andere Art desselben Stoffs verwendet und dabei Gewicht gemacht von der Erfahrung, daß aller Sticksstoff einer organischen Verbindung in gasförmiges Ammoniak (= 3 Wasserstoff + 14 Sticksstoff), übergeführt wird, wenn man dieselbe mit ätzendem Kalk, Kali oder Natron der Glühbirne aussetzt. Man wiegt daher eine kleine Menge des stickstoffhaltigen Körpers ab, vermischt ihn mit einem Gemenge von Kalk und Natron und füllt damit eine Verbrennungsrohre d, welche in dem Neuen Fig. 8 er-  
 100 Das entweichende Ammoniak tritt in einen  
 100 Apparat a, der wässrige Chlorwasserstoffsäure  
 100 enthält, und verbindet sich mit dieser zu Chlorammonium  
 100 (sogenanntem Salmiak). Nach Vollendung der  
 100 Operation wird der Kugelapparat abgenommen, sein  
 100 Inhalt in eine gewogene Porzellan-  
 100 schale entleert und  
 100 getrocknet, so lange eine Auslösung von Chlorplatin  
 100 gefügt, als noch ein hellgelber Niederschlag ent-  
 100 steht. Letzterer heißt Platinchlorid und ist eine  
 100 Verbindung von Chlorammonium mit Chlorplatin  
 100 (4 Sticksstoff + 4 Wasserstoff + 106 Chlor +  
 100 Platin). Man setzt nun die Porzellan-  
 100 schale auf  
 100 Feuer; zuerst verdampft das vorhandene Wasser,  
 100 der Niederschlag wird trocken und zerfällt sich endlich  
 100 in der Glühbirne vollständig, sodas nur metallisches  
 100 Platin in der Porzellan-  
 100 schale zurückbleibt, dessen  
 100 Gewicht man durch abermalige Wägung derselben er-  
 100 mittelt. Da man aus der oben angegebenen Zusam-

menetzung des Platinsalmiaks weiß, daß auf je 99 Gewichtstheile Platin 14 Gewichtstheile Sticksstoff kommen, so läßt sich aus dem gefundenen Gewicht des Platins leicht berechnen, wie viel Sticksstoff ursprünglich in der analysirten organischen Verbindung gewesen ist. Man berechnet nunmehr aus den beiden ausgeführten Analysen den Gehalt an Kohlenstoff, Wasserstoff und Sticksstoff auf Procente, und das, was an 100 fehlt, ist gleich dem Gewicht des Sauerstoffgehalts der Verbindung. Als Ergebnis dieser analytischen Arbeiten wissen wir, daß das Chinin folgende Zusammen-  
 100 74,4 Procente Kohlenstoff  
 100 7,3 „ Wasserstoff  
 100 8,6 „ Sauerstoff  
 100 9,7 „ Sticksstoff

100,0 Gewichtstheile Chinin.

Den Schluß unserer Beschreibung analytischer Apparate und Methoden bildet die Betrachtung der wichtigsten aller: der Wage und der Wägung. Indem wir hierbei auf Taf. 2, Fig. 20, hinweisen, besinnen wir uns einem ebenso eleganten als brillanten Instrument gegenüber. Von seiner Wage spricht der Chemiker nur mit einer gewissen salbungsvollen Verehrung; er weiß ihr ein besonderes, lediglich ihr gewiehtes Waggzimmer an, und es ist der Ausdruck der höchsten Günst, die der chemische Professor gewähren kann, wenn er einem seiner Adepten gestattet, der Wage zu nahen, der er sich selbst bedient.

Verschiedene Ursachen machen es nothwendig, bei der quantitativen Analyse nur mit geringen Mengen der zu untersuchenden Verbindungen zu operiren. Häufig ist deren mäßige Gewinnung, ihre Seltenheit und Kostbarkeit Grund genug, um damit sparsam zu verfahren. Allein auch bei Stoffen gewöhnlicher Art lassen sich die chemischen Operationen, wie Auswaschen, Trocknen, Glühen, Schmelzen, Verbrennen u. s. w., bei geringer Menge leichter und vollkommener bewerkstelligen, als wenn dieselbe nur unerheblich mehr beträgt. Das genaue Abwägen kleiner Gewichtsmengen erfordert aber Wagen von höchster Empfindlichkeit und Zuverlässigkeit, und die Anforderungen der Mechaniker sind darauf gerichtet, diesen wichtigen Instrumenten den höchsten Grad der Vollkommenheit zu verleihen. Man verlangt in der That, daß ein solches bei einer Belastung von 500 Gramm (= 0,5 Kilo) noch einen deutlichen Ausschlag gibt bei Auslegung von ein viertel Milligramm, d. i.  $\frac{1}{400000}$  Kilo!

Die Mechanik belehrt uns, daß eine Wage um so empfindlicher ist, je länger die Arme des Wagbalkens sind, je leichter derselbe ist und je näher sein Schwerpunkt unter dem Aufhängepunkt liegt. In der Praxis sind hierin jedoch gewisse Grenzen geboten; werden z. B. die Arme sehr verlängert, so müssen sie entsprechend verstärkt werden, damit sie sich nicht biegen.

Unsere Abbildung zeigt eine aus dem Atelier des Mechanikers Vornardt in Braunschweig hervorgegangene prämiirte Wage von erwähnter Leistungsfähigkeit, zum Preise von 100 Thlrn. In einem Mahagonikasten mit Glaswänden befindet sich eine Marmorplatte. Auf derselben erhebt sich ein hoher Messingcylinder, in welchem die Tragsäule des Wagbalkens auf- und abgehoben werden kann, durch Umbrehung des außerhalb des Kastens befindlichen Schraubentops. Der Wagbalken ist durchbrochen und hat in der Mitte ein Stahlschneide, welche sich auf eine Carneolplatte aufsetzt; ebenso befinden sich Stahlschneiden an seinen beiden Enden, auf welche die Schalengehänge mit Carneolplatten sich aufsetzen. Zur Schonung der Schneiden werden dieselben bei Ver-





einander zu Chlornasserstoff oder Salzsäure: 16. Dieser Vorgang findet in folgender Weise statt: Molekül Wasserstoff =  $\text{H H}$  } =  $\text{H Cl}$  } = 2 Moleküle Molekül Chlor =  $\text{Cl Cl}$  } =  $\text{Cl H}$  } = 2 Moleküle Molekül Chlornasserstoff.

Das Molekülargewicht einer chemischen Verbindung ist die Summe der Atomgewichte ihrer Bestandtheile.

1 Atom Wasserstoff  $\text{H} = 1$  und

1 Atom Chlor  $\text{Cl} = 35$  verbinden sich

1 Molekül Chlornasserstoff  $\text{ClH} = 36$ . Außer dem eigenthümlichen Gewicht besitzen die Elemente noch eine weitere Qualität, welche man die Erthigkeit oder Valenz derselben nennt. Sie besteht darin, daß von gewissen Elementen 1 Atom es derselben stets nur 1 Atom eines andern zu den vermag, wie dies bei dem bereits angeführten Chlornasserstoff  $\text{ClH}$  der Fall ist. Solche Elemente werden als einwerthige bezeichnet. Ein einwerthiges Atom bindet dagegen zwei einwerthige; als Beispiel dient der Sauerstoff, von dem 1 Atom mit 2 Atomen Wasserstoff sich zu Wasser,  $\text{O}$  oder  $\text{H}_2\text{O}$ , verbindet. Entsprechend verhält es sich mit den drei-, vier- und mehrwerthigen Atomen.

Durch die Zusammenstellung der chemischen Zeichen und der chemischen Formeln gebildet, die auszuweisen und wie viel Atomen verschiedener Elemente das Molekül einer chemischen Verbindung besteht. Sind von einem Element mehrere Atome vorhanden, so bezeichnet man ihre Anzahl durch dem Zeichen angehängte Ziffer. In den frühern Jahren der Chemie des Chlornasserstoffes  $\text{HCl}$  und des Wassers  $\text{H}_2\text{O}$  fügte man noch  $\text{NH}_3$  Ammoniak;  $\text{CH}_4$  = Sumpfgas;  $\text{H}_2\text{SO}_4$  = Schwefelsäure;  $\text{KNO}_3$  = Salpeter;  $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$  = Alkohol.

Wir erkennen aus der Formel  $\text{H}_2\text{SO}_4$ , daß in 1 Molekül Schwefelsäure 7 Atome vereinigt sind, nämlich 2 Atome Wasserstoff, 1 Atom Schwefel und 4 Atome Sauerstoff. Eine Gruppe von 2 Atomen Kohlenstoff, 1 Atom Wasserstoff und 1 Atom Sauerstoff bilden, sich verbunden, 1 Molekül Weingeist.

Jeber die Art und Weise, wie die verschiedenen Elemente eines Moleküls angeordnet oder gruppiert sind, haben verschiedene Ansichten, die sich in den Formeln der Chemie ausdrücken lassen. Die Betrachtung solcher Betrachtungen gehört der theoretischen und speculativen Chemie an. Schließlich sei bemerkt, daß die Moleküle, selbst wenn sie aus Atomen bestehen, immer noch höchst kleine, ungenommene weder dem bloßen, noch dem besten Auge sichtbare Körpertheile sind. Wenn Moleküle stark zusammenhängen, so ist der Körper, den sie bilden, ein fester; bei den flüssigen Körpern ist die Zusammenhängen geringer, und die luftförmigen, die Gase und Dämpfe, sind solche, deren Moleküle gänzlich getrennt in gleichen Abständen von einander sich befinden, so daß gleiche Raumtheile derselben eine gleiche Anzahl von Molekülen enthalten.

## Aus der anorganischen Chemie.

(Tafel 3 bis 7.)

Dem Nachfolgenden geben wir eine kurze Charakteristik einiger der wichtigsten Elemente und ihrer Verbindungen. Hierbei ist Gelegenheit geboten zur Beschreibung einer Reihe von interessanten Apparaten und Methoden, insbesondere aber zu einer ausführlicheren Beschreibung derjenigen chemischen Producte, die Gegenstand der chemischen Technik in größerem Maßstabe sind.

### 1. Sauerstoff.

Sauerstoff (Oxygenium,  $\text{O} = 16$ ) ist ein Bestandtheil der atmosphärischen Luft, die ein Ge-

menge von 1 Volumen Sauerstoff mit 4 Volumen Stickstoff ist; er ist ferner, chemisch gebunden, der Hauptbestandtheil des Wassers, der meisten Minerale, aller Pflanzen- und Thierstoffe, und man schätzt seine Gesamtmenge auf die Hälfte der Erdmasse. In reinem Zustande gewinnt man den Sauerstoff durch Erhitzen gewisser Verbindungen desselben, wie z. B. des Braunsteins oder Mangan-Überoxyds, ( $\text{MnO}_2$ ). Am leichtesten geschieht dies, wenn chlorsaures Kali,  $\text{KClO}_3$ , mit Zusatz von etwas Braunstein in einer Retorte erhitzt wird. Das rasch und in Menge sich entwickelnde Gas wird durch ein gekrümmtes Rohr unter einen mit Wasser gefüllten Cylinder geleitet und in diesem aufgefangen, wie Taf. 4, Fig. 1 zeigt. Es ist farb- und geruchlos, etwas schwerer als Luft. Vorzüglich ausgezeichnet ist der Sauerstoff dadurch, daß brennbare Körper in demselben mit außerordentlicher Lebhaftigkeit verbrennen, insbesondere Kohle, Eisen und Phosphor unter der glänzendsten Lichtentwicklung.

Der Sauerstoff ist als chemisches Agens von höchster Bedeutung, denn die wichtigsten Prozesse, wie das Atmen, die Verbrennung, die Gärung und viele andere werden lediglich bedingt durch ihn. Die aus seiner Vereinigung mit andern Elementen entstehenden Verbindungen werden Oxide genannt. Ein Theil derselben zeichnet sich aus durch einen sauren Geschmack; es sind dies die Säuren, welche noch weiter charakterisirt sind durch ihr Vermögen, blaue Pflanzenfarben in Roth zu verwandeln. Mit den Metallen bildet der Sauerstoff die sogenannten Oxyde, deren Eigenschaften denen der Säuren entgegengesetzt sind, indem sie einen laugengeschmack besitzen und die rothe Pflanzenfarbe in Blau verwandeln.

### 2. Wasserstoff.

Der Wasserstoff (Hydrogenium,  $\text{H} = 1$ ), kommt in freiem Zustande in der Natur nicht vor; er ist Bestandtheil des Wassers, der Pflanzen- und Thierstoffe und mancher Minerale. Zur Gewinnung desselben wird stets das Wasser ( $\text{H}_2\text{O}$ ) verwendet, dem man durch die Einwirkung eines Metalls den Sauerstoff entzieht. Hierzu läßt sich das Eisen verwenden, indem in einen Hintonlauf ein gewundener Eisendraht gebracht und derselbe (Taf. 4, Fig. 2) zum Glühen erhitzt wird. Das Eisendraht steht einerseits mit einem kleinen Kolben in Verbindung, in welchem Wasser siedet, dessen Dampf beim Hintertreiben über glühendes Eisen zerlegt wird; der Sauerstoff verbindet sich mit dem Eisen zu Eisenoxyd und der freigewordene Wasserstoff wird in einem Cylinder aufgefangen. Es ist jedoch bequemer, den Wasserstoff ohne Anwendung eines starken Kohlenfeuers darzustellen, und es geschieht dies sehr leicht, wenn man Zink mit verdünnter Schwefelsäure in dem Entwicklungsapparat (Taf. 3, Fig. 9) übergießt. Es entsteht schwefelwasserstoffgas, während Wasserstoffgas entweicht. Dasselbe ist jedoch feucht, und wünscht man es trocken zu erhalten, so muß es, wie die Figur zeigt, durch eine mit Stücken von Chlorcalcium gefüllte Röhre geleitet werden, wodurch ihm der beigemengte Wasserdampf vollständig entzogen wird.

Der Wasserstoff ist ein farb- und geruchloses Gas, und vornehmlich ausgezeichnet durch sein geringes specifisches Gewicht, das vierzehnfach geringer ist als das der Luft. Der Wasserstoff ist daher der leichteste aller Körper. Um dies durch den Versuch zu veranschaulichen, läßt man aus einem mit Wasserstoffgas gefüllten Behälter B (Taf. 4, Fig. 7), dem sogenannten Gasometer, dieses Gas durch ein Chlorcalciumrohr streichen, um es von Wasserdampf zu befreien, der

sein Gewicht sehr vermehren würde; es gelangt alsdann in einen kleinen, auf die Öffnung der gebogenen Röhre aufgesetzten Kautschukballon, der sich anfüllt und in die Luft erhebt, sobald man ihn losläßt. Man benutzte daher in früherer Zeit das Wasserstoffgas zum Füllen großer für Luftfahrten bestimmter Ballons. Gegenwärtig verwendet man hierzu das Leuchtgas, welches zwar beträchtlich schwerer ist als Wasserstoff, dessen Darstellung jedoch wohlfeiler und leichter ausführbar ist.

Der hier abgebildete Gasometer, dessen man sich häufig bei Experimenten mit Gasen bedient, besteht aus einem 50 Centimeter hohen Blechcylinder B, der durch zwei mit Hähnen versehene Röhren mit einem obern, offenen Behälter in Verbindung steht. B wird ganz mit Wasser gefüllt, alle Hähne geschlossen und nunmehr die unten links sichtbare Schraube aufgedreht und in die Öffnung das Rohr eingeführt, aus welchem das Gas sich entwickelt. Indem es in B aufsteigt, fließt unten eine entsprechende Menge von Wasser aus. Sobald B nahezu gefüllt ist, was man an dem nebenbefindlichen Wasserstandrohr von Glas ersieht, wird die Schraube geschlossen und der obere Behälter mit Wasser gefüllt. Öffnet man nun den Hahn rechts, dessen Rohr bis auf den Boden von B reicht, so übt das Wasser einen Druck auf das Gas aus und dieses entweicht, sobald oben der seitliche Hahn geöffnet wird.

Die zweite charakteristische Eigenschaft des Wasserstoffs ist seine Brennbarkeit. Nähert man dem aus einer Öffnung ausströmenden Gas eine Flamme, so entzündet es sich und brennt mit einer schwach leuchtenden, aber sehr heißen Flamme. Es findet hierbei die Verbindung des Wasserstoffs mit Sauerstoff statt, deren Product das Wasser ist. Hält man in der That über eine Wasserstoffgasflamme eine Glasglocke, so verdichtet sich an deren Wand der entstehende Wasserdampf und man kann das herabrinne Wasser auffammeln.

Zwei Volumen Wasserstoffgas erfordern zu ihrer vollkommenen Verbrennung ein Volumen Sauerstoffgas. Bringt man die genannten Gase in diesem Verhältnis zusammen und entzündet das Gemenge, so erfolgt eine heftige Explosion, weil der gebildete Wasserdampf durch die gleichzeitig entstehende große Hitze eine außerordentliche Ausdehnung erfährt. Dieses Gasgemenge, das den bezeichnenden Namen Knallgas erhalten hat, ist daher höchst gefährlich und alle Experimente mit Wasserstoff erfordern die größte Vorsicht, da schon ein wenig beigemengte Luft dasselbe explosibel macht.

Nichtsdestoweniger kann man dieses Gasgemenge ohne Gefahr anzünden, wenn man sich des Knallgasbrenners (Fig. 6) bedient. Die Gase befinden sich getrennt in besondern Behältern unter gleichem Druck und stehen durch Kautschukschläuche mit dem Brenner in Verbindung; bei S tritt der Sauerstoff ein durch ein enges Rohr, welches umgeben ist von dem weitem Knerohr W, das den Wasserstoff zuführt. Beide Gase vermischen sich erst in dem Augenblick, wo sie die Öffnung des Brenners verlassen, und erzeugen angezündet die Knallgasflamme von ungeheurer Hitze. Man verwendet dieselbe zum Löthen und Schmelzen von Platin; ein Stückchen Kalk wird in dieser Flamme weißglühend und strahlt ein der Sonne ähnliches Licht aus, das unter dem Namen Drummond's Kalklicht in der Optik verwendet worden ist und jetzt meist durch das elektrische Licht ersetzt wird.

Einen andern Wasserstoff-Abthapparat zeigt uns Fig. 5 im Durchschnitt. Seine Einrichtung hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Gasometer. Der Apparat ist von Blei oder Kupfer gefertigt; sein unterer Theil enthält auf dem durchlöcher-

Boden KL Stüde von Zink. Im obern Theil befindet sich verdünnte Schwefelsäure, die das Öffnen des Hahns f zum Zink tritt und die Bildung von Wasserstoffgas bewirkt, das durch das Rohr h in das kleine Abstrichgefäß g gelangt zu seinem Ausweg bei C zum Lötrohr nimmt, wo es seitlich durch einen Glasbalg L Luft zugesaugt werden kann. Neuerdings hat man jedoch bei derartigen Vorrichtungen den Wasserstoff ersetzt durch gewöhnliches Erdgas.

Auf einer Combination der Eigenschaften des Platins und des Wasserstoffs beruht die Einrichtung des elegantesten aller Feuerzeuge, das von Lavoisier erfundene Platin-Feuerzeug (Fig. 4), das so gut Wasserstoff-Feuerzeug genannt werden kann. In der kleinen Messingtasche f ist ein aus zertheiltem Platin bestehendes sogenanntes Platin-Schwämmchen aufgestellt; dasselbe hat die wichtige Eigenschaft, aus der Luft Sauerstoff anzuziehen, wie ein Schwamm Wasser aufsaugt und festhält. Beim Niederdrücken der Feder c öffnet sich ein aus welchem Wasserstoff ausströmt; sobald derselbe den Platinschwamm trifft, beginnt eine Reaction desselben mit Sauerstoff, wobei eine solche Menge von Wärme stattfindet, daß der Platinschwamm sich selbst entzündet und das Wasserstoffgas wird und das weiter ausströmende Gas wird. Dasselbe kommt aus einer kleinen Glasglocke, in der ein Stück Zink b aufgehängt ist. Der Apparat enthält verdünnte Schwefelsäure, welche durch den Hahn n in die Glocke eindringt und die Entwicklung von Wasserstoff bewirkt. Nach dem das Hahn verdrängt das Gas wieder die Schwefelsäure aus der Glocke. Leider kann man dieses Feuerzeug nicht in die Tasche stecken, weil es fast ganz außer Gebrauch gekommen.

Den Beschluß der wissenschaftlichen, auf Wasserstoff sich beziehenden Darstellungen macht ein Apparat zur Bildung von Wasser. Dieser soll in der Weise vor sich gehen, daß der genauesten Beweis liefert über Zusammenhänge von Wasser in Procenten von Sauerstoff und Wasserstoff. Zu diesem Zwecke wird aus Zink und verdünnter Schwefelsäure in der Flasche A Wasserstoffgas entwickelt und zunächst durch eine Flasche B mit concentrirter Schwefelsäure geleitet, um das Gas von Wasserdampf zu befreien. Um jedoch jede Spur von Wasser aus dem Wasserstoffgas zu entfernen, wird dieses noch ein System von U-förmigen Röhren C, D, E, die Stückchen von Pflanzengas, welche mit Schwefelsäure befeuchtet sind, durch das Gas absolut trocken in den kleinen Kolben F der Kupferoxyd enthält und sorgfältig gemischt werden ist. Wenn man nun vermittels einer Zange Kupferoxyd erhitzt, so verbindet sich der in der Röhre enthaltene Sauerstoff mit dem durch Wasserstoff und bildet damit Wasser, welches in flüssiger Form in dem Ballon G an der Öffnung in Dampfform von der Absorptionsröhre H aufgenommen wird. Da auch G und H vor dem Experimenten worden waren, so ergibt sich aus der Gewichtsabnahme der Menge des gebildeten Wassers die Gewichtsabnahme des Kolbens F findet sich in diesem Wasser enthaltenen Sauerstoff. Von erstem abgezogen ergibt den zur Bildung von Wasser verwendeten Wasserstoff. Man hat man gefunden, daß das Wasser aus

|                        |
|------------------------|
| 88,8 Proc. Sauerstoff  |
| 11,2 Proc. Wasserstoff |
| 100,0 Wasser.          |



Von der wissenschaftlichen Betrachtung des Wassers abgesehen, bedarf seines Nachweises für die Wichtigkeit dieses allgemeinen Lebensbedürfnisses. Dem Chemiker insbesondere ist es als Lösungsmittel für die meisten körperlich schädlichen Stoffe, überall, wo Menschen ihren ohnützigen aufzuklagen gedanken, bildet das Vorhandensein von Wasser die erste Frage, und da, wo die Natur nicht freiwillig diesen Lebensquell hervorbringt, läßt sich weder Mühe noch Kosten scheuen, sei es, um ihn herbeizuleiten aus weiter Ferne oder es zu erschaffen aus unzugänglicher Tiefe.

Ein solches ist der Fall bei dem Artesischen Brunnen, zu dessen Erbohrung die Fig. 8—12 verzeichnete Geräte verwendet werden. Man nimmt an, daß dieser Name herrührt von der Grafschaft Artois, wo die ersten Brunnen der Art hergestellt worden seien. Allein es ist sicher, daß bereits den Ägyptern sowie den Chinesen das Verfahren, die Bohrung zu fördern, bekannt war. Meist ist die Ansicht verbreitet, daß sich überall artesische Brunnen erheben ließen, wenn es nur gelänge, hinunter tief in die Erdrinde einzudringen. Die vorhandenen Erfahrungen weisen jedoch darauf hin, daß die Mehrzahl der vorhandenen Brunnen dieser Art in denjenigen Erdschichten sich befindet, welche geologisch als Übergangsgebirge oder secundäre Formationen zu betrachten sind; nicht diesen hat man auch in den tertiären Bildungen Quellen erbohrt, und es geradezu als Zufall gilt, wenn in zerstücktem Massengestein, wie Granit, Wasser erreicht

zur Vohrarbeit verwendete Erdborher ist einer Meißel mit gerader Schneide (Fig. 10), mit Störmiger (Fig. 9), seltener rund und gezahnt (Fig. 11). Vermittelt einer Schraube ist er an dem Ende befestigt, das aus 6—7 Meter langen und 2 Centimeter dicken eisernen Stangen besteht, mit zunehmender Tiefe immer neue aneinandergefügt werden. Es wird an der zum Bohrvorrichtung gehörenden Stelle zuerst ein Schacht gegraben, in dessen Boden oder Gestein erreicht, worauf ein Keil von Holz (Fig. 8) eingelassen und in das Gestein eingeführt wird. Es hängt an einem Seile, das durch den Hebel vorgehoben kann.

Die Vorrichtung dient, um das Gestein mit dem einig Fuß hoch zu erheben und dann wieder zu lassen, wodurch die Zertrümmerung des Gesteins bewirkt wird. Die Hebearbeit geschieht entweder durch Menschenkraft oder durch mechanische Vorrichtung, welche den Schläger, der den abwechselnd hebt und fallen läßt, durch Uebersetzung der Bewegungen erhalten. Ein Arbeiter gibt der Handhabe der Meißel von Zeit zu Zeit Umdrehung, damit das erbohrte Loch rund bleibt und nicht von Natur schon etwas erweitert wird, welches von oben eingegossen. Wenn der Meißel eine gewisse Menge von Bohrspäne gebildet hat, so muß derselbe herausgehoben, was vermittelt des sogenannten Lüpfers (Fig. 12), geschieht. Das Seil n wird mit dem Ende des gehenden Seils verbunden, das um einen geschlungen ist, durch deren Umdrehung der Meißel herausgehoben und der Meißel durch den Hebel hinablassen und Fallenlassen des Meißels sich, so oft dies geschieht, das Ventil des Schlamms tritt in den Hohlraum, erfüllt und wird heraufgezogen. Sobald das Bohrloch erreicht ist, beginnt wieder die Arbeit des Meißels.

Diese Art der Arbeit, die insbesondere bei großen Tiefen sehr zeitraubend ist, hat mehrfache Vervollkommenung in der Construction der Bohrerzeuge erfahren, allein immerhin hängt die Geschwindigkeit im Bohren derselben wesentlich ab von der Natur des Gesteins, das durchstochen werden muß.

Abgesehen von zahllosen artesischen Brunnen, die bereits in geringer Tiefe Wasser ergeben haben, sind einige derselben berühmt geworden durch die außerordentliche Tiefe, bis zu welcher der Meißel hinuntergetrieben worden ist. Hierbei hat sich das auch anderwärts beobachtete Gesetz bestätigt, daß die Wärme der Erde zunimmt, je tiefer man in ihre Rinde eindringt. Das Bohrloch von Grenelle in Paris hat 547 Meter Tiefe, und liefert Wasser von 27,7° Wärme; das von Mondorf, bei 730 Meter Tiefe, solches von 34°.

Eine andere bei der fortwährend zunehmenden Verdichtung der Bevölkerung mehr und mehr sich aufdrängende Frage ist die nach der Beschaffenheit des als unentbehrliches Nahrungsmittel verwendeten Wassers, gleichgültig ob dasselbe als Trinkwasser oder zur Zubereitung von Speisen, ja selbst als Verbrauchswasser in der Haushaltung dient. Unter allen Umständen müssen wir die ausgiebige Verfügung über reines Wasser als eine der notwendigsten Bedingungen für das Wohlbefinden des Menschen ansehen. Es steht fest, daß die Entstehung und Verbreitung von Epidemien ihre wesentliche Förderung durch Brunnen erhält, zu welchen organische Verwesungsstoffe durch die Erde ihren Weg finden.

Die Verbeisserung unreinen Wassers ist daher vielfach Gegenstand der chemischen Technik geworden und der einschlägigen Frage hängt ab von der Natur der vorhandenen Verunreinigungen. Bestehen dieselben lediglich in dem Vorhandensein trübender Theile, so genügt eine Filtration des Wassers, um dieselben zu entfernen und demselben die Klarheit des Wassers zu verleihen, welche mehr unser Auge als unser Geschmack verlangt. In Städten von der ungeheuren, auf zwei bis drei Millionen angeschwollenen Bevölkerung, wie dieses mit Paris und London der Fall ist, ist man gezwungen, analog dem Sprichwort: „Wir nehmen Geld, wo wir es finden“ — das Wasser herzunehmen, wo man es findet; es kommen da nicht nur natürliche und erbohrte Quellen und Brunnen, sondern auch das Regen- und Flußwasser zur Verwendung, und es ist insbesondere das letztere, für welches großartige Filtrirwerke in Gang gesetzt worden sind. Aber auch Berlin ist bereits auf den Verbrauch filtrirten Spreewassers angewiesen.

Dieselben bestehen im wesentlichen darin, daß man das Wasser durch wechselnde Schichten von gröblichem und feinerem Sand und Holzkohlenpulver hindurchläßt, was bis zu einem gewissen Grade beschleunigt werden kann durch Anwendung von höherem Druck. Als oberste Filtrirschicht dient immer ein grobes Material, das die Hauptmasse der trübenden Stoffe aufzunehmen vermag, ohne alsbald sich zu verstopfen. Mit der Zeit ist jedoch eine Erläuterung jeder Filtrirvorrichtung durch die Zunahme der Verstopfung unvermeidlich und die Erneuerung oder Reinigung derselben nothwendig. Letztere geschieht in der Regel in der Weise, daß man reines Wasser in umgekehrtem Weg durch das Filter gehen läßt, das den abgesetzten Schlamm hinwegnimmt. Als Beispiel erlaube ich mir auf Taf. 4, Fig. 15 ein Filtrirwerk mit sogenannter Selbstreinigung. Der Boden q ist festgestampft und mit Platten in Cement geglättet; auf denselben sind im Abstand von 0,3 Meter die Ziegel o in Reihen hochkantig aufgestellt, aber so, daß sie bei 1,5 Centimeter Abstand offene

Fugen lassen. Die Kanäle, die so durch die Ziegelreihen gebildet werden und durch die Fugen miteinander in Verbindung stehen, sind von oben mit durchlöchernten Platten bedeckt, auf welchen die Schichten des Filtrirmaterials aufgetragen werden, nämlich: zuerst 30 Centimeter gewaschener Kies, dann fünf weitere Schichten in immer abnehmendem Korn, dann 45 Centimeter gewaschener feiner Sand, endlich so oberst 45 Centimeter desselben Sandes mit  $\frac{1}{10}$  gestopferter Holzlohe vermischt.

Das zu filtrierende Wasser kommt durch den Kanal H an und fließt bei offener Schütze K und offenem Hahn S durch das Rohr auf den Sand, durchsinkt das Filter, sammelt sich in den Zwischenräumen o und zieht von da aus dem Filter ab. Wenn das Filter der Erschöpfung nahe ist, so gibt man dem Hahn S eine Drehung, welche die obere Oeffnung des Rohres O schließt und den senkrecht unter die Filtrirschichten in die Zwischenräume o . . . gehenden Schenkel bei P öffnet. Der Druck zwingt das Wasser aufwärts durch das Filter zu steigen, wo es die darin abgelagerten Unreinigkeiten lospült und durch die Oeffnungen L nach dem Abzugskanal führt. Die Oberfläche des Filters muß zum Schlusse jedesmal etwas aufgeraut und von Zeit zu Zeit erneuert werden. Ein solches Filter liefert in 24 Stunden 35500 Kubikmeter Wasser.

Von Vorrichtungen in kleinerem Maßstabe, die in Haushaltungen verwandt sind, zeigt Fig. 13 ein solches, das zum Gebrauch auf der See bestimmt ist. Ein in die obere Mündung des Bootschs eingegießer Cimer l mit durchbrochenem Boden a dient zum Eingießen und verhindert das Ueberlaufen während der Schwanungen des Schiffs. Das Wasser fällt aus dem Raume b durch das Rohr d in den Raum c und steigt, wenn es diesen angefüllt hat, mit einem dem Falle entsprechenden Druck aufwärts durch die Filtrirschichten in g nach dem Raume k mit dem Hahn n zum Ablassen des filtrirten Wassers. Ein hier nicht abgebildetes Rohr gestattet der Luft den Austritt aus k.

Ein Filter von noch kleinern Verhältnissen ist in Fig. 14 abgebildet. Dasselbe besteht aus einem sackförmig ausgebaunten, feintönigen, Wasser durchlassenden Sandstein aa. Der Dedel mit dem daranhängenden Filtrirteine wird mit dem Blechmantel ff und dem gußeisernen Bodenstück dd durch die an letztem feststehenden Wügel g mittels der Druckschraube n wasserdicht zusammengehalten. Das zu filtrierende Wasser kommt mit dem erforderlichen Druck von 3 Metern durch das Rohr m in den Raum zwischen Mantel und Filtrirstein, dringt durch die ganze Oberfläche in das Innere, und fällt dieses an, bis es durch das Rohr c abläuft. Zum Reinigen öffnet man i, um Luft ein-, und den Bropfen h, um das Wasser abzulassen, und löst die Schraube, worauf man den Filtrirstein herausnehmen und scheuern kann. Ähnliche und noch einfachere Apparate werden in Berlin aus einer künstlich erzeugten gepreßten Filtrirlohe angefertigt.

Wenn wir an ein „gutes Trinkwasser“ die folgenden Anforderungen stellen: völlige Klarheit, Freisein von mikroskopischen Thieren und Pflanzenformen, möglichstes Freisein von organischen Stoffen, besonders faulenden, möglichste Weichheit und erforderlichen Gehalt an Kohlensäure und Luft, sowie endlich richtige Temperatur — so kann ein filtrirtes Wasser denselben nur in annäherndem Grade entsprechen. Insbesondere wirkt das Filtriren Vermindernd auf den Gehalt an Gasen, und das Wasser großer Städte ist daher meist

schal, unerquicklich, wie abgestanden. Von den genannten organischen Stoffen ist dasselbe um so reiner, je mehr die Holzlohe bei der Filtration in Anwendung kommen konnte.

Als ein chemisches Mittel, um trübes Wasser zu klären, empfiehlt sich in manchen Fällen der Zusatz von etwas Alaun. Die in diesem Salz enthaltenen Thonerde ist ausgezeichnet durch ihre Neigung, mit organischen Stoffen, insbesondere mit Pflanzentheilen, sich zu verbinden, die bei Gegenwart von Ammoniak noch begünstigt wird. Es kann daher leicht ein trübes und übelriechendes Wasser die Bedingungen zur Zersetzung des Alauns erfüllen, wobei die Thonerde in Gestalt einer gallertartigen Masse sich auscheidet, welche die trübenden Theile enthält und rasch niederschlägt.

Einer der gewöhnlichsten Bestandtheile des Wassers ist der kohlensaure Kalk. Derselbe beeinträchtigt keineswegs seine Verwendung als Trinkwasser. Dagegen erweist sich ein kalkhaltiges oder sogenanntes hartes Wasser ungeeignet für manche ökonomische Zwecke, als z. B. zum Kochen der Gallenfrüchte und zum Waschen. In der Regel findet sich dafür ein Ersatz durch die Verwendung von Regen- oder Flußwasser. Ueberdies erweist sich der Kalkgehalt des Wassers in der großen Industrie mehrfach von äußerst nachtheiligem Einfluß, und es gilt dies insbesondere von dem Dampfer der Dampfmaschinen. Bei dem ungeheuren Dampferverbrauch durch den Dampfkegel setzt sich, selbst bei geringem Kalkgehalt, alsbald eine Kalkkruste auf dem Boden ab, der sogenannte Kesselstein, der durch die Störung des Betriebes, zu vermehrtem Dampferverbrauch und zu Explosionen gibt. Die Mittel zur Verhütung und zur Entfernung der Bildung des Kesselsteins sind zahllos, ohne daß sie jedoch das Licht radical beseitigen.

Zum Verständniß seiner Bildung sei bemerkt, daß der kohlensaure Kalk an sich im Wasser unlöslich ist, dagegen von demselben aufgelöst wird, wenn es Kohlensäure enthält; wird nun ein Wasser, das in dieser Weise Kalk enthält, erhitzt, so entweicht die Kohlensäure und der kohlensaure Kalk fällt als feiner Schlamm zu Boden und erhärtet zu einer Kruste, wie dies an unsern Kochgeschirren beobachtet werden kann. Hier auf beruht die Taf. 4, Fig. 18 im Durchschnitte abgebildete Vorrichtung zur Verhütung des Kesselsteins. Das durch o eintretende Speisewasser fließt dem Rohre d auf, vertheilt sich, bei e austretend, in tellerartige Quertwände m zu beiden Seiten, und gelangt von Teller zu Teller herabfließend durch die Rohre a in den ringförmigen Behälter bb, den es anfüllt, bis f durch c in den Kessel abläuft. Auf diesem Wege erhitzt der durch die weite Oeffnung p aus dem Kessel tretende Dampf das Wasser und schlägt einen großen Theil des Kalks nieder, der sich am Boden ringförmigen Gefäßes bei bb sammeln und durch d nach außen entfernt werden kann. Nachdem eine mit dieser Vorrichtung versehene Locomotive 5074 Meile Wegs zurückgelegt hatte, betrug der in bb angesammelte Kalk 448 Kilogramm, oder 72 Pfdent des im Wasser enthaltenen Kalks.

Es war unstreitig die oben erwähnte Einbuße der erquickenden Geschmacks, die das Wasser durch die Filtration erleidet, welche Anregung gab, in großen Städten ein angenehmeres Getränk dadurch herzustellen, daß man dem Wasser künstlich Kohlensäure zusetzte. Quellen, die von Natur ein Wasser liefern, das reich ist an Kohlensäure, und die daher Sauerwasser genannt werden, finden sich zwar, wie bei uns und da so häufig, daß hiernach eine Gegend zwischen Rhein und Nahe das Sauerland heißt. Bei uns

breit wird das dorthin flammende Selterferwasser versendet. Allein theils weil bei weitem Transport dieses Wasser ein Luxusartikel wird, theils um sich von auswärtigem Bezug unabhängig zu machen, entstand die Industrie der künstlichen Sauerlinge.

Wir erblicken in Fig. 17 einen zur Darstellung solcher Wasser dienenden Apparat. In den Gas-generator B wird kohlensaure Magnesia (Magnetit) gebracht und aus dem Behälter C Schmelzfäule hinzugegeben. Das hierdurch entwickelte kohlensaure Gas entweicht durch das Rohr d' und wird, indem es ein System von Waschlflaschen DD, dd passiert, gereinigt und tritt durch das Rohr D'' in den 1,6 Meter hohen Gasbehälter GG, dessen unterer Theil in einem Wasserbehälter steht, von dem in der Abbildung ein Stück der vordern Wand hinweggelassen ist, um dessen innere Einrichtung sehen zu lassen. Dasselbe befindet sich eine Druckpumpe, vermittels welcher GG mit Wasser angefüllt worden war. Die bei e eintretende Kohlensäure jüht allmählich den ganzen Gasbehälter, indem sie das Wasser aus demselben durch tt' wieder in den Waschlflaschen drängt. Sobald dies geschehen ist, werden die Hähne x und r geschlossen und die Druckpumpe in Thätigkeit gesetzt, so lange, bis das in den Cylinder GG gepresste Wasser die darin befindliche Kohlensäure auf ein Fünftel zusammengebrückt hat. Es wird nunmehr der Hahn p geöffnet und das comprimirte Gas durch D'' in den horizontalen, mit Wasser gefüllten Cylinder M geleitet. Indem man den Hahn T in Umdrehung versetzt, vermischt sich die Kohlensäure mit dem Wasser und wird von demselben absorbiert. Vermittels eines Hahns von besonderer Einrichtung wird das nunmehr mit Kohlensäure gesättigte Wasser aus M in Flaschen abgezogen. Soll dasselbe siederdes die Bestandtheile einer Mineralquelle enthalten, so werden die betreffenden Salze durch R dem Wasser zugefügt. Die Hähne g und g werden nur dann geöffnet, wenn man den Generator durch das Rohr H entleeren will.

Den Schluß unserer Betrachtungen über das Wasser bildet die Verwendung desselben als Eis, die eine von Jahr zu Jahr steigende Wichtigkeit erreicht hat. Während längere Zeit dasselbe lediglich als ein Mittel diente, um in der heißen Jahreszeit kühle Getränke herzustellen, und bei uns nur als ein Luxusartikel angesehen wurde, spielt es jetzt seine Hauptrolle als vorzüglichstes Erhaltungsmittel unserer Nahrungsmittel. Die Auffindung eines urweltlichen Elefanten, eines Mammoth, mit wohlerhaltenem Fleisch, eingefroren in sibirischem Eis, hat uns belehrt, daß niedere Temperatur die Verwesung auf Zehntausende verhindern kann. Es liegt daher nahe, aus dieser merkwürdigen Erfahrung den umfassendsten Nutzen für die menschliche Oekonomie im großen und kleinen zu ziehen. Nicht nur begegnen wir in vielen Haushaltungen dem Eis schraube, der dazu dient, um Butter, Milch, Fleisch länger frisch und die Getränke kühl zu erhalten, sondern Millionen Centner Eis werden von Fleischern, Fischhändlern, Bierbrauern und Conditoren geborgen, in ähnlicher Absicht. Nicht minder hat die wohlthätige Verwendung des Eises in der Heilkunde mit der Leichtigkeit seiner Beschaffung zugenommen.

Und dennoch kann der Fall eintreten, daß man, insbesondere für leihgenannten Zweck, Eis entbehren muß, sei es, daß die Vorräthe erschöpft sind oder daß örtliche Verhältnisse deren Aufbewahrung unmöglich machen. Hierdurch wurde man hingeführt zur künstlichen Erzeugung von Eis, die seit lange schon als interessantes physikalisches oder chemisches Experiment in den Vorlesungen ausgeführt worden ist. Dasselbe hat in der Hand der Technik eine solche Ausbildung

erfahren, daß, unter gewissen Verhältnissen wenigstens, der Preis des künstlich erzeugten Eises dem von der Natur producirt den Wage zu halten vermag.

Es ist eine bekannte Thatsache, daß Abkühlung eintritt, wenn Wasser verdunstet, und wir begreifen zu diesem Zweck im Sommer Straß- und Hausflur. Flüssigkeiten, die rascher verdunsten als Wasser, erzeugen aber verhältnismäßig eine weit stärkere Erkaltung; es handelte sich für die Industrie darum, eine Flüssigkeit der Art zu verwenden, daß dieselbe durch die Verdunstung nicht verloren wird, sondern wieder verdichtet und wiederholt zur Eisbildung benutzt werden kann. Auf diesem Princip beruht der Taf. 4, Fig. 16 abgebildete Eisapparat von Carré. In einer Retorte von Schmiedeeisen A befindet sich eine höchst concentrirte Lösung von Ammonial in Wasser; dieselbe wird durch einen untergelegten Ofen auf 130° erwärmt. Das Ammonial entweicht durch das Rohr b und tritt in die mit Wasser umgebene Vorlage B. Alle Vorrichtungen sind luftdicht miteinander verbunden. Das Ammonial kann daher nicht entweichen, es verdichtet sich vielmehr in B zu einer Flüssigkeit von höchster Flüchtigkeit. Sobald dieses geschehen ist, wird unter A der Ofen hinweggenommen und ersetzt durch ein Gefäß mit kaltem Wasser; zugleich entfernt man den Wasserbehälter CC, der B umgeben hatte. Sofort beginnt das flüssige Ammonial sich in Dampf zu verwandeln, der wieder von dem in A befindlichen Wasser absorbiert wird. Die Verdunstung ist so energisch, daß in B eine Erkaltung von —40° eintritt und Wasser rasch gefriert, welches sich in einem in B eingeschobenen Cylinder befindet. Die Ammoniallösung kann nun aufs neue und in derselben Weise zur Eiszerzeugung verwendet werden.

### 3. Stickstoff.

Der Stickstoff, Nitrogenium, N = 14, ist ebenfalls ein gasförmiges Element, etwas leichter als Luft, farb- und geruchlos. Dem Raume nach bestehen vier Fünftel der Atmosphäre aus Stickstoff, dem ein Fünftel Sauerstoff beigemengt ist. Im übrigen findet sich derselbe weder häufig, noch mannigfaltig; doch enthalten thierische Stoffe, mit Ausnahme des Zettes, durchschnittlich 16 Procent Stickstoff; im Pflanzen- und Mineralreich ist er selten. Von verschiedenen Methoden, um reinen Stickstoff zu erhalten, beschreiben wir die nachfolgende: In einer kleinen Retorte (Taf. 3, Fig. 16) erhitzt man salpetrigsaures Ammonial  $\text{NH}_4\text{NO}_3$ , das sich zerlegt in Stickstoff und Wasser ( $\text{N}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ ); letzteres verdichtet sich in der dreifachen Flasche, während das Gas in bekannter Weise aufgefangen wird. Abgesehen davon, daß eine brennende Kerze in Stickstoffgas erlischt, hat dasselbe keine ausgezeichneten Eigenschaften, allein dasselbe bildet verschiedene wichtige Verbindungen, von denen die Salpetersäure  $\text{HNO}_3$ , und Scheidewasser genannt, in der Technik vielfach Verwendung findet. Beim Zersetzen thierischer Stoffe entsteht die vorhin genannte gasförmige Verbindung des Stickstoffs mit Wasserstoff, das Ammonial  $\text{NH}_3$ , das durch seinen stechenden Geruch sich leicht bemerklich macht. Seine Lösung in Wasser heißt Salmiakgeist und ist ein bekanntes Arzneimittel. Zu dessen Darstellung im kleinen wird in einem Kolben (Fig. 20) ein Gemenge von gebranntem Kalk und Salmiak erhitzt; das entweichende Ammonialgas wird gewaschen, indem es eine dreihalsige Flasche passiert, die etwas Wasser enthält; es tritt sodann in eine Flasche mit reinem Wasser und wird von diesem absorbiert.

Ammonial und Salze desselben bilden sich fer-



ner, wenn thierische Stoffe erhitzt werden. In der That war der beim Verbrennen des Kamelmistes entstehende Ruß die älteste Quelle zur Gewinnung von Chlorammonium oder Salmial  $\text{NH}_4\text{Cl}$ . Aber auch die Steinkohle, die durchschnittlich 0,8 Procent Stickstoff, entsprechend 1 Procent Ammoniak enthält, liefert dasselbe, wenn sie erhitzt wird. Dies ist der Fall bei der Gasfabrikation, wo in dem nebenbei auftretenden Theerwasser Ammoniak enthalten ist. Da jährlich Millionen Centner Steinkohlen zur Gaszerzeugung der Destillation unterworfen werden, so könnte hierdurch der ganze Bedarf an Ammoniak gedeckt werden. Seine Gewinnung aus den Theerwassern ist jedoch mit Schwierigkeit verbunden, weil dieselben nur sehr verdünnte Ammoniaklösungen und außerdem verunreinigt sind durch übelriechende Theerstoffe. Sie geschieht, indem Theerwasser in einem Kessel A (Taf. 7, Fig. 9) erhitzt wird; es entwickelt sich Ammoniakgas, das, begleitet von Wasserdampf, durch das Rohr d in die erweiterten Einsätze e und f tritt, welche von den mit Gaswasser gefüllten Kählern B und C umgeben sind. Der Wasserdampf wird hierdurch zu Wasser verdichtet, das wieder nach A zurückfließt, während das Ammoniak durch g weiter geht, bei geschlossenem Hahn h in die Vorlage E und von hier durch die mit Kohlenpulver gefüllten Filter G und H in die Vorlage F gelangt, welche reines Wasser enthält, von dem es absorbiert wird. Die Kohlenfilter reinigen das Gas von den Theerstoffen. Sie müssen von Zeit zu Zeit erneuert werden, während dessen man den Hahn i schließt und h öffnet; das Ammoniak wird alsdann von der in der Vorlage D befindlichen Salzsäure unter Bildung von Salmial aufgenommen. Nach Vollenbung der Operation wird der Kessel durch a entleert, das vorgewärmte Theerwasser aus B und C durch Öffnen der Hähne l und m nachgefüllt und die Arbeit fortgesetzt.

Die Verbindung des Stickstoffs mit Kohlenstoff wird Cyan genannt, d. i. „Blaustoff“, weil sie, mit Eisen vereinigt, die unter dem Namen Berlinerblau bekannte prachtvolle blaue Farbe bildet. Seine chemische Formel ist  $\text{NC}$ , wofür jedoch in der Regel das Zeichen Cy gesetzt wird. Die Bildung des Cyans findet nur unter gewissen Umständen statt und wird fabrikmäßig bewirkt, indem thierische Abfälle verschiedener Art, insbesondere Wolle, Leder und Fleischen, mit einem Zusatz von Pottasche und Eisendrehspäne erhitzt werden. Die genannten Rohstoffe werden in kleine verschleißbare eiserne Kessel (Fig. 10) gebracht, durch deren Dedel ein Nährwert geht, worauf man sie bis zum Glühen und Schmelzen des Kesselinhalts erhitzt. Hierbei tritt eine Zersetzung der Thierstoffe unter Entwicklung von Gasen ein, und es hinterbleibt eine schwarze Schmelze, die, mit Wasser behandelt, eine Lösung gibt, aus der nach vollzogener Klärung schöne große Krystalle von gelber oder orangefarbener Farbe sich abscheiden.

Dieses Salz ist eine Verbindung von Cyan mit Kalium und Eisen,  $\text{Cy}_2\text{KFe}$ , und heißt Cyaneisenkalium. Da anfänglich zu seiner Darstellung eingetrocknetes Blut verwendet wurde, so ist für dasselbe allgemein der Name Blutlaugensalz gebräuchlich. Seine Hauptverwendung findet es zur Darstellung von Berlinerblau, das als Niederschlag sich bildet, wenn eine Lösung desselben mit einer eisenhaltigen Lösung zusammengebracht wird.

Unterwirft man das Blutlaugensalz mit Schwefelsäure der Destillation, so entsteht Cyanwasserstoff  $\text{CyH}$ , ein farbloses, eigenthümlich nach bitterm Mandeln riechendes, höchst giftiges Gas, das, in Wasser

geleitet, sich darin auflöst und wässrige Cyanwasserstoffsäure, sogenannte Blausäure, bildet. Quecksilberoxyd gesetzt sich dieselbe in Wasser und Cyanquecksilber  $\text{HgCy}_2$ , das in farblosen Krystallen erhalten wird. Zudem man endlich die letztgenannte Verbindung erhitzt, erhält man das Cyan in Gestalt eines farblosen Gases, das mit phosphorhaltiger Flamme brennt.

#### 4. Schwefel.

Der Schwefel, S = 32, ist ein Element von hervorragender Bedeutung; er findet sich vertheilt in wenigen Orten gediegen, von welchen die Umgebungen von Argenti auf Sicilien die ergiebigste Quelle ist, indem sie wol drei Viertel alles Schwefels liefern, der in der Welt verbraucht wird. Außerdem kommt der Schwefel vor in Verbindung mit Eisen, den sogenannten Schwefelkies oder Pyrit,  $\text{FeS}$ , der 50 Procent Schwefel enthält und zu dessen Gewinnung benutzt wird; auch andere Metalle, wie Kupfer, Quecksilber, Zink, Kobalt, Nickel, Arsen und Arsen finden sich vorherrschend in Verbindung mit Schwefel. Seine Verbindung mit Sauerstoff, Schwefelsäure, ist ein Bestandteil fast aller zersetzender Minerale, wie des Gipses, Schwefelkies, Strontianpulvers. Endlich begegnen wir auch Schwefel in der organischen Natur, indem er 2 Procent in den eiweißartigen Stoffen der Pflanzen und Thiere enthalten ist.

Auf Sicilien erscheint der Schwefel in drei eingeprengt in Gesteinen, die aus Kalk, Gips und Mergel bestehen. Dieselben werden gebrochen, führen einen sehr ungleichen Gehalt an Schwefel, dem einige 6, andere 15 und die reichsten 20 Procent liefern. Man gewinnt denselben hauptsächlich durch Ausfäuerung, d. i. Ausfäsmelzung, indem man Gesteine zu einem Meiler mit geeigneten Zuschlägen aufeinandersezt, von außen mit Erde deckt und den Schwefel in die Luftkanäle zieht, die man durch Meiler anzuzünden. Indem ein Theil des Schwefels verbrennt, schmilzt der übrige und fließt in schiefe Fläche, auf der der Meiler errichtet ist, nach einem Sammelloch. Obgleich dieses Verfahren mit sehr erheblichem Verlust an Schwefel verbunden ist, so läßt der Mangel an Brennmaterial in der Gegend ein anderes kaum zu, und die zur Darstellung abgebildete Einrichtung kommt deshalb selten zur Ausführung. Aus einer gemauerten Kammer c, mittels des abgehenden Feuers von außen erwärmt, fällt man durch den Schieber b vorgewärmte Schwefel führende Gesteine in einen verschleißbaren Kessel von Gußeisen a, der von dem Feuer umspielt wird. Die Schwefeldämpfe streichen durch das Rohr d, dichten sich in der Vorlage e; von da geht das flüssige Schwefel durch f in einen Kasten g.

Die Gesamtzerzeugung von Schwefel wird gegen 6 Millionen Centner im Werthe von Millionen Franken angeschlagen, und es nimmt die Industrie Englands allein 37 Procent in Anspruch. Der aus den Meilern ausgefäsmelte Schwefel ist mit 0,5 bis 3 Procent von dem Gestein, den Stoffen verunreinigt und muß daher vor seiner nachherigen Verwendung gereinigt sein. Dies geschieht in dem dargestellten Apparat. In einen Behälter der Rohschwefel gebracht und durch die Spitze der Feuerung geschmolzen; er fließt durch das Rohr h in den Cylinderschmelzbehälter; letzterer ist der directen Wirkung

ausgesetzt, welche den Schwefel in Dampf verwandelt, er durch das weite Abzugrohr *b* in eine benachbarte erdumige Kammer tritt und dort zu flüssigem Schwefel sich verdichtet, der auf der geeigneten Bodenfläche *e* *p* in den Keßel *q* abgelassen und in kleine Cylindern, zu Stangen Schwefel, geformt wird.

Wenn man diesen Destillationsproceß in der Weise vornimmt, daß die Kammer sich nicht erwärmt, so schlägt sich der Schwefel in Gestalt eines feinen Staues, der sogenannten Schwefelblumen, nieder und wird in dieser Gestalt für verschiedene Zwecke in den Handel gebracht.

Zu den bekanntern Eigenschaften des Schwefels fügen wir ergänzend hinzu, daß derselbe bei 115° schmilzt, bei 300° siedet und sich in Dampf verwandelt. Etwas über diesen Punkt bei Zutritt der Luft erhitzt, entzündet er sich und verbrennt mit blauer Flamme; das hierbei entstehende Product, gewöhnlich unrichtigerweise Schwefel dampf genannt, ist schweflige Säure  $\text{SO}_2$ , ein rötlich riechendes Gas, das häufig Verwendung findet zum Bleichen von Wolle, Stroh und Federn, sowie zur Conservirung von Speisen und Getränken. Seine Anwesenheit verhindert die Entwicklung der kleinen kleiner Organismen und dadurch den Eintritt der Gärung und Fäulnis.

Die schweflige Säure ist ferner die Vorstufe zur Bildung der Schwefelsäure,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ , dieser in der Technik so vielfach verwendeten Verbindung, daß man die Größe ihres Verbrauchs in einem Lande als Gradmesser für dessen industrielle Entwicklung bezeichnet hat.

Die Schwefelsäure läßt sich betrachten als die Verbindung von 1 Atom Schwefel mit 3 Atomen Sauerstoff  $\text{SO}_3$ , wozu noch die Bestandtheile von Wasser  $\text{H}_2\text{O}$  hinzukommen. Es gelingt jedoch nicht, dem Schwefel 3 Atome Sauerstoff ohne weiteres zuzuführen; beim Verbrennen nimmt er aus der Luft deren nur zwei auf und bildet schweflige Säure  $\text{SO}_2$ . Die weitere Oxydation geschieht durch die Einwirkung von Salpetersäure auf die schweflige Säure, indem erstere einen Theil ihres Sauerstoffs an diese abgibt und sie in Schwefelsäure verwandelt. Die Salpetersäure wird durch diese Abgabe von Sauerstoff zurückgeführt in ein Gas, das Stidoryd  $\text{NO}$  heißt und das die merkwürdige Eigenschaft besitzt, sobald es mit Luft zusammenkommt, aus dieser unverzüglich Sauerstoff aufzunehmen und sich in salpetrige Säure  $\text{N}_2\text{O}_3$  zu verwandeln. Auch diese Verbindung gibt aber, wenn sie mit schweflicher Säure in Berührung kommt, an diese 1 Atom Sauerstoff ab und verwandelt sich zurück in Stidoryd. Letzteres wiederholt nun die Aufnahme von Sauerstoff aus der Luft und dessen Abgabe zur Bildung von Schwefelsäure so oft und so lange, als dazu Gelegenheit gegeben ist; es spielt gleichsam die Rolle eines Sauerstoff borgen und herleihenden Dieners. Während die Mechanik vergeblich nach einem Perpetuum-mobile sucht, hat also die Chemie in dem Stidoryd ein Perpetuum-agile aufgefunden.

Auf diesen chemischen Zerlegungen und Bildungen beruht der Proceß der Schwefelsäurefabrikation, der darin besteht, durch Verbrennung von Schwefel zuerst schweflige Säure darzustellen, hernach unter Gegenwart von Wasserdampf Salpetersäure einwirken zu lassen, die in Stidorydgas verwandelt wird, das alsdann seinen Dienst fortsetzt.

In der Vorlesung über Experimentalchemie bedient man sich des Apparats Taf. 3, Fig. 18, um den geschilderten Vorgang zu veranschaulichen. Zu diesem Zweck wird die erforderliche schweflige Säure nicht durch Verbrennung von Schwefel, sondern dadurch erzeugt, daß man in einer kleinen Retorte *a* Kupfer-

späne mit Schwefelsäure erhitzt; das Gas tritt durch eine kleine, Wasser enthaltende Flasche und gelangt mit Wasserdampf beladen in den Ballon *A*, der Luft enthält. In der Retorte *b* entwickelt sich durch die Einwirkung von Salpetersäure auf Kupferspäne Stidorydgas, das ebenfalls in den Ballon sich begibt, wo nunmehr alle Bedingungen zur Schwefelsäurebildung erfüllt sind. Die weitem, mit *A* in Verbindung stehenden Kolben *B* und *C* begünstigen die Vollenbung des Processes; durch das Rohr *c* kann erforderlichenfalls frische sauerstoffhaltige Luft zugeführt werden, während in *B* und *C* eingelegte Röhre einen Ausweg für den Stidstoff der Luft gestatten, der an dem ganzen Proceß keinen Antheil nimmt. Die entstehende Schwefelsäure sammelt sich auf dem Boden der Ballons *A* und *C*.

Die Schwefelsäurefabrikation ist eine der nur im größten Maßstabe ausgeführten Industrien. Zur Erzeugung der schwefligen Säure verwendet man entweder Kobaltkiesel, oder man erhitzt schwefelhaltiges Eisenerz, eigentl.  $\text{FeS}_2$ , sodaß dessen Schwefelgehalt verbrennt. Im übrigen ist der Verlauf derselbe. Taf. 6, Fig. 6 zeigt einen der besten sogenannten Kieselbrenner im Querschnitt, in vorderer Ansicht und im seitlichen Durchschnitt. Derselbe hat die Gestalt eines Schachtofens, dem bei *a* Luft eingeblasen wird. Durch die Oeffnungen *d* *d* wird feingepochter Schwefelkiesel eingeblasen, der sich über ein System von durchbrochenen Sohlen aus Thon verbreitet. Die Feuerung befindet sich über dem Kof *r*, und die bei der Verbrennung des Schwefels entstehende schweflige Säure wird durch den eingeblasenen Wind aufwärts nach *e* und in der Richtung *e* *g* des seitlichen Durchschnitts nach der Flugstaubkammer *E* geführt, wo die unverbrennlichen Theile des Kiefes sich absetzen, während die schweflige Säure ihren Weg in die Schwefelsäurekammer fortsetzt.

An Stelle der in dem Vorlesungsversuch benutzten Ballons treten in der großen Fabrikation die Bleikammern, Räume von 100—2000 Kubikmeter Inhalt, deren Wände bekleidet sind mit Bleiplatten, welche von den hier auftretenden Säuren nicht angegriffen werden. Fig. 6 gewährt uns den Einblick in die Einrichtung einer Fabrik, die täglich 150—200 Ctr. Schwefelsäure erzeugt. *A* ist der Schwefelbrenner, aus welchem das aus der Verbrennung von Kobaltkiesel hervorgehende Schwefligesäuregas durch die Röhre *B* und *D* in die Vorkammern *C* und *E* tritt; in letzterer befindet sich ein System von terrassirten Pyramiden aus Steingut, über welches, von außen kommend, Salpetersäure langsam herabfließend sich ausbreitet und in Stidoryd zerfällt und somit der Proceß der Schwefelsäurebildung eingeleitet wird. Derselbe setzt sich fort in der Hauptkammer *G* sowie in den hintern Kammern *I* und *M*, welche durch die Röhre *F*, *H* und *K* in Verbindung stehen. Ein Dampfessel *R* dient, um in die Kammern oben durch die Oeffnungen *SS* von Zeit zu Zeit Wasserdampf einzublasen. Dem unbetheiligten Stidstoff ist der Ausweg durch den Schlot *P* *O* gestattet. Der Theorie gemäß sollte das einmal gebildete Stidorydgas hinreichen, um ins Unendliche schweflige Säure überzuführen in Schwefelsäure. Unvermeidliche Verluste machen jedoch eine Erneuerung der Zufuhr von Salpetersäure nöthig, von der man 4—6 Pfd. braucht, um 100 Pfd. Schwefel in Schwefelsäure zu verwandeln.

Wie ersichtlich, liegt die Hauptkammer *G* am tiefsten, und in ihr fließt aus allen Kammern die in denselben gebildete Schwefelsäure zusammen; aus *C* und *E* durch die Leitung *gg*. Das hier sich ansammelnde

Product, Kammerfäure genannt, ist eine mit Wasser verdünnte Säure, welche concentrirt werden muß. Zu diesem Zwecke wird sie anfänglich in Bleisäunen erhitzt, wodurch ein Theil des Wassers verdunstet; sobald jedoch ihr Siedepunkt  $200^\circ$  erreicht, greift die Säure das Blei an. Sie wird nunmehr in eine Destillirblase von Platin B (Fig. 7) gebracht und darin weiter erhitzt. Der entstehende Wasserdampf entweicht durch das Helmrohr C; sobald ein in die Blase eingelassenes Thermometer die Temperatur von  $338^\circ$  anzeigt, hat die Säure die erforderliche Concentration erreicht, und es wird der Hahn r des Hebers H geöffnet, der aus einem stets mit Schwefelsäure gefüllten Platinrohr besteht und durch welchen die Säure abfließt. Das Heberrohr ist mit Wasser umgeben, um die Säure abzukühlen. Durch ein hinreichend bewegliches Heberwerk v läßt man von S her aus der Bleisäure frische Säure durch den Sperrtrichter U nachfließen. Die zu dieser Operation verwendeten Platintessel sind sehr theuer, und man bedient sich daher jetzt wieder häufiger der gläsernen Retorten oder Flaschen zum Concentriren der Schwefelsäure, wie Fig. 8 uns eine solche von 136 Liter Inhalt zeigt, die in einem Sandbad sitzt. Dieselbe steht durch ein gebogenes Glasrohr mit einer bleiernen Vorlage C in Verbindung, zur Aufnahme des Destillats. Eine Anzahl solcher Vorrichtungen wird durch ein gemeinschaftliches Feuer geheizt.

Die Schwefelsäure  $H_2SO_4$ , auch Schwefelsäurehydrat oder englische Schwefelsäure genannt, hat das spezifische Gewicht 1,85 und ist eine farb- und geruchlose Flüssigkeit von höchst saurer ätzender Beschaffenheit und daher äußerst gefährlich. Ihre Anwendung ist eine sehr ausgedehnte, indem sie insbesondere zur Darstellung fast aller andern Säuren dient.

Vornehmlich in Sachen wird durch Destillation aus dem Eisenvitriol die braune rauchende Schwefelsäure, auch Vitriolöl genannt, gewonnen. Dieselbe ist ein Gemenge von wasserfreier Schwefelsäure (Schwefelsäure-Anhydrit,  $SO_3$ ) mit Schwefelsäurehydrat ( $2H_2SO_4$ ) und dient hauptsächlich zur Auflösung des Indigos, der von letzterer nicht verändert wird.

Indem wir noch einiger Verbindungen des Schwefels zu gedenken haben, kommen wir zurück auf einige Abbildungen der Tafel 3 uners Atlas.

Zunächst verdient der Schwefelwasserstoff  $H_2S$  unsere Aufmerksamkeit. Dieses durch seinen abentheuerlichen, an faule Eier erinnernden Geruch übel charakterisirte Gas bildet sich bei der Zersetzung schwefelhaltiger organischer Stoffe; es ist brennbar und sehr giftig. In der analytischen Chemie erweist es jedoch unschätzbare Dienste durch sein Verhalten gegen die schweren Metalle, welche es aus ihren Lösungen in Gestalt von eigenthümlich gefärbten, meist schwarzen Niederschlägen auscheidet. Es dient daher nicht nur als ein qualitatives Erkennungsmittel zur Entdeckung der Gegenwart eines solchen Metalls, sondern erforderlichenfalls zur gänzlichen Entfernung desselben.

Zu diesem Zweck bereitet der Chemiker den Schwefelwasserstoff, indem er Schwefeleisen  $FeS$  übergießt mit verdünnter Schwefelsäure oder Salzsäure. In den großen Unterrichtslaboratorien hält man dieses Gas vorrätig in Gasometern, von welchen Zuleitungsrohren mit verschließbaren Hähnen dasselbe an Ort und Stelle führen. Beim Verbrauch in kleinem Maßstabe empfehlen sich Apparate, die jederzeit zur Entwicklung von Schwefelwasserstoff parat sind und die ihre Thätigkeit von selbst einstellen, sobald dieselbe nicht mehr erfordert wird. Ein solcher ist Taf. 3, Fig. 10 abgebildet. Zur Instandsetzung desselben wird

zuerst in den mittlern Ballon durch die Leitung geschmolzenes Schwefeleisen in baselnschaffigen Zellen eingebracht und sodann ein Glasrohr mit gestricheln eingeleitet. Der obere Trichterballon wird dicht in die Mündung c. Durch seine Schmelze die Säure eingegossen, bis sie den mittlern Ballon etwa halb anfüllt, und nunmehr der Hahn g der Es beginnt die Entwicklung von Schwefelwasserstoffgas, welches allmählich den mittlern Ballon ausfüllt und endlich die Säure durch die untere Oeffnung des Trichterballons in diesen hinausrückt, wie das Fig. 11 zeigt. Mit der Verdrängung der Säure aus dem Mittelballon hat aber die Weiterentwicklung aufgehört, und der Apparat ist zum Gebrauch fertig. Es genügt die Oeffnung des Hahns g zu schließen, und das Gas durch die an das Kautschukrohr angelegte Trichteröhre in die zur Untersuchung bestimmte Vorrichtung treten zu lassen. In dem Maße, als Gas aus dem Mittelballon austritt, steigt die Säure zu dem auf und erzeugt aufs neue dessen Entwicklung.

Derselben Dienst leistet der viel einfachere Apparat Fig. 11. In die Flasche A wird zuerst eine untere Oeffnung übersteigende Schicht von Holzkohlepulver gebracht und hierauf ein Schwefeleisen aufgesetzt. Alsdann wird der gebogene Glasballon K aufgesetzt und A mit der leeren Flasche B durch ein Kautschukrohr in Verbindung gesetzt und letztere mit der Säure gefüllt. Beim Schließen des Hahns K dringt die Säure durch das Kautschukrohr und steigt in A bis zur halben Höhe, worauf Gasentwicklung beginnt. Nun wird der Hahn K geschlossen; das Gas treibt die Säure wieder aus nach B, worauf dessen Entwicklung anhält. Der Apparat zum Gebrauch fertig ist. Bei jeder neuen Gasentwicklung wird Eintritt und Gang der Gasentwicklung regulirt einerseits durch den Luftdruck, andererseits durch die Spannung des Schwefelwasserstoffgases.

Als elegantes Experiment mag noch die Entwicklung des Schwefelwasserstoffgases angeführt werden, den kürzern Schenkel einer Glasröhre (Fig. 12) wird etwas Kalium gebracht, dieselbe mit Kohle gefüllt und sodann ein abgemessenes Volumen Schwefelwasserstoff in derselben aufsteigen gelassen. Der Schwefel des Kaliums vermittelst der Lampe erhitzt sich der Schwefel mit dem Kalium, und es entsteht ein Wasserstoffgas übrig, das gemessen wird.

Eine interessante Verbindung bildet der Schwefel mit dem Kohlenstoff; sie wird Schwefelkohlenstoff,  $CS_2$ , genannt und entsteht, wenn Schwefel über glühende Kohlen geleitet wird. Es wird dieses fabrikmäßig unter Anwendung des Apparats Fig. 19. Ein aufrecht stehender Cylinder A mit einem eisenen Rohr durch die weitere Oeffnung E mit einem von gutgetrodener Holzstöße angefüllt und der Derselbe befindet sich inmitten eines Sandbades in Brand gesetzt wird. Sobald der Cylinder A schließt man in die engere Oeffnung vor dem Hahn in das Rohr c, der sofort schmilzt und in Dampf verwandelt, durch eine Schicht glühender Kohle streicht und mit Kohlen verbindet. Selbstverständlich sind die Dampfröhren durch Pfropfen verschlossen worden und der stehende äußerst flüchtige Product gelangt in den vorgelegten Ballon I, wo ein Theil des Gases verdichtet und durch den Hahn K in die Flasche L und O übergeführt wird. Ein Theil des Gases wird, indem er dampfförmig weiter durch den Hahn PP und den Kahlapparat Q geht, verdichtet und aufgesammelt.

Als Product wird aus den verdichteten



ie beide feste, unlösliche Körper sind, der Schwefelkohlenstoff in Gestalt einer wasserhellen Flüssigkeit genommen, le das Licht so stark bricht, daß ein damit gefülltes Prisma die prachtvollsten Farben zeigt; derselbe ist reinbar, etwas schwerer als Wasser, riecht höchst abentheulich und siedet schon bei  $15^{\circ}$ . Diese außerordentliche Flüchtigkeit macht ihn sehr geeignet, in Vorlesungen die bei rascher Verbunstung eintretende Kälte anzuweisen. Auf ein Brechfen gießt man einige Tropfen Wasser, setzt in dieses eine kleine Platinnale, die etwas Schwefelkohlenstoff enthält; durch lassen mit dem Balg beschleunigt man dessen Vermischung, und in wenig Augenblicken ist die Schale gefroren.

Der Schwefelkohlenstoff löst Schwefel, Phosphor, arze, Kaustik, Sette und Oele, und wird zur Reinigung und Reinigung derartiger Stoffe, insbesondere zur Vulkanisirung des Kautschuks verwendet.

### 5. Phosphor.

Der Phosphor,  $P=31$ , wurde gegen das Ende des 17. Jahrhunderts von goldmachewollenen Labanten entdeckt, die keine Ahnung haben konnten, daß dieser Stoff, der damals mit unsäglichem Mühe dargestellt und Goldes werth bezahlt wurde, heutigentags der ärmsten Hütte in Gestalt der Bänthölzer als Abfall des täglichen Verbrauchs eingeführt ist. Die Natur bietet dieses Element nur als Phosphorsäure  $P_2O_5$ , welche in Verbindung mit Kalk die Minerale bildet, deren bekannteste der Apatit oder der Phosphorit sind. Ihre Verbreitung ist gering, doch hat bei stets zunehmender Wichtigkeit derselben die eifrige Nachforschung zur Entdeckung großer Phosphoritlager, u. a. des von Limburg an der Rh., geführt. Die Verwitterung solcher Minerale heilt den phosphorsauren Kalk in der Erdoberfläche, wo er, von den Pflanzen aufgenommen, insbesondere in den Samen der Gräser, Getreide und Getreidefrucht sich vorfindet. Dem Thiere als Nahrungsmittel, führen sie den phosphorsauren Kalk über in den Körper, wo er das Knochengewebe bildet. Ueberhaupt halten die Gehirn- und Nervensubstanz, sowie Muskel und der Urin etwas Phosphor. Einen Umweg legt also der Phosphor zurück, bis der Thierkörper in den Knochen das alleinige Rohmaterial, aus dem er ihn darstellt.

Die Fabrication des Phosphors beginnt mit dem Brennen der Knochen, wodurch die in denselben enthaltene Leimschubstanz zerstört wird; es geschieht dies in Schachtdöfen, die Aehnlichkeit mit den Kalköfen haben. Dabei hinterbleibt die weißgebrannte, poröse Knochenasche, die sich leicht zu Pulver mahlen läßt, in einem hölzernen Bottich mit 70 Procent etwas kochender Schwefelsäure angerührt wird. Die Schwefelsäure entzieht der Knochenasche zwei Drittel ihres Gehalts und scheidet denselben in Gestalt von ungelbem Gips ab; die verbleibende Auflösung enthält ein Drittel Kalk, verbunden mit Phosphorsäure; diese anfänglich in Weispfannen für sich allein eintröpfelt, später vermisch mit grobem Pulver von Kalk in eisernen Kesseln, und zuletzt bei schwacher Hitze völlig eingetrodnet. Zwölf bis fünfzehn Pfund eingetrodneten Masse werden in eine flachenförmige Retorte von feuerfestem Thon gefüllt, deren in sogenannten doppelten Galerienöfen (Taf. 7, Fig. 1) zwei Reihen von je 18 Stück mit zugewendeten Enden liegen und von einem nach der Längendurchziehenden Feuer bis zum Hellrothglühen erhitzt werden. In dieser hohen Temperatur wirkt die zerfallende auf die Phosphorsäure, der sie den

Sauerstoff entzieht; der freierwerdende Phosphor entweicht als Dampf, gemengt mit brennbaren Gasen. Nach einigen Stunden erscheint bei der Vorlage eine weißblaue Flamme, deren Uebergang in blendendes Weiß den Beginn der Destillation anzeigt. Die Vorlage besteht aus zwei durch Hälse verbundenen Glöden von Steingut, die in mit Wasser gefüllten Untersätzen stehen. In letztern verdichtet sich der Phosphor und kann mit Leichtigkeit herausgenommen werden.

Um Coal und Steinkohle als Heizmaterial verwenden zu können, hat man auch den Defen zur Destillation von Phosphor die in Fig. 12 im seitlichen Durchschnitt dargestellte Einrichtung gegeben. Aehnlich wie bei der Erzeugung des Leuchtgases liegen hier fünf Thoncyllinder zu zwei und drei übereinander, in welche das Gemisch von Kohle und phosphorsaurem Kalk eingebracht wird. Von jedem mündet ein Rohr in eine oben gewölbte, unten offene Stütze b von einem Meter Länge, welche durch Röhren mit einem ähnlichen davorstehenden Gefäß b in Verbindung steht, das einige Oeffnungen zum Entweichen der Gase hat. Beide stehen in einer Rinne c, durch welche kaltes Wasser fließt, das durch eine schmale Oeffnung ganz unten an der vordern Seite eintritt und durch eine etwas höher angebrachte Oeffnung  $\beta$  an dem hintern Ende austritt (s. Fig. a und  $\beta$  neben Fig. 11). Der in dieser als Vorlage dienenden Vorrichtung verdichtete Phosphor kann so von dem durchfließenden Wasser nicht hinweggeführt werden.

Der rohe Phosphor ist unrein, roth, braun und schwarz gefärbt; er wird gereinigt, indem man ihn unter Wasser geschmolzen durch sämliche Leber preßt oder mit Sand vermisch einer nochmaligen Destillation unterwirft; 136 Pfd. Retortenfüllung liefern 21 Pfd. rohen und 17 Pfd. gereinigten Phosphor, der wachsgleich, bläuglich und durchsichtig ist. In den Handel kommt er meist in Gestalt von kleinfingerdicken Stangen. Diese Form erhält er durch Schmelzen in einem Trichter c, Fig. 13, der in einem Wasserbade a sich befindet. Beim Oeffnen des Hahns bei b fließt der Phosphor in eine angelegte Glasröhre, die in einer Kufe mit kaltem Wasser sich befindet, wodurch der Phosphor erstarrt und ein wenig aus der Glasröhre hervortritt. Zieht man die Phosphorstange heraus, so fließt geschmolzener Phosphor nach und erstarrt, sobald er in das kalte Wasser kommt, sodas man sämmtlichen Phosphor wie einen Draht aus c ziehen kann.

Der Phosphor dient fast ausschließlich zur Anfertigung der Bänthölzer, und bei dem ungeheuren Verbrauch derselben hat seine Fabrication große Verhältnisse angenommen und ist sein Preis bis unter 1 Thlr. für das Pfund gesunken. Das in Frankreich angestrebte Verfahren, denselben direct aus dem vollen Mineralreich gelieferten Phosphorit durch Zersetzung desselben mittels Kieseisäure (Sand) und Kohle in Schachtdöfen vorzunehmen, verspricht denselben noch billiger zu liefern. Es läßt sich alsdann erwarten, daß der gewöhnliche, giftige und leicht entzündliche Phosphor in den Bänthölzern gänzlich verdrängt wird durch Ueberführung desselben in rothen oder amorphen Phosphor, der weder giftig noch leicht entzündlich ist und beim Reibzeug der schwedischen Reibgünder bereits verwendet wird.

Wenn auch technisch von keiner Bedeutung, so ist doch das Phosphorwasserstoffgas interessant dadurch, daß es im Moment seines Zusammenstossens mit Luft sich entzündet, mit leuchtender gelber Flamme unter Bildung weißer Nebelringe verbrennt, wie Taf. 3, Fig. 16 solche zeigt, wo aus dem Gasentwidelungsrohr kleine Pfafen von diesem Gase aus dem Wasser aufsteigen.



anzünden lassen. Als Rückstand enthält das rothe Coals in Gestalt einer porösen, schladigen Fe.

Die Hauptproducte der Destillation sind also: brenn- Gas und Dämpfe, Theerwasser und Theer; es dieselben, denen wir auch bei der Fabrication im jen begegnen. Nicht jede Steinkohle ist in gleicher e geeignet zur Gaszerzeugung; denn wenn auch allen der Kohlenstoff der vorwaltende, über 80 Pro- betragende Bestandtheil ist, so findet doch ein ichtlicher Unterschied in ihrem Gehalt an Sauer- und Wasserstoff statt, wozu letzterer zur Gas- ng das wesentliche Element ist. Im allgemeinen die beim Brennen zusammenbadenden Kohlen zur gewinnung die geeigneten. Es liefern 50 Kilo nachbenannten Kohlen an Gas in englischen Ru- ken: Widdau 400, Ruhrkohle 500, Cannelekohle Voghelekohle 700, in runder Zahl, und hinter- a 30—35 Kilo Coals.

Die Steinkohlen enthalten durchschnittlich 0,8 Pro- Sticksstoff und wechselnde Mengen von Eisenkies Zweifach-Schwefeleisen  $\text{FeS}_2$ , die ebenfalls an der ung sich betheiligen. Das rothe Leuchtgas ist r ein Gemisch sehr verschiedener Gase, welche ihrem Werth für die Beleuchtung vier Gruppen n: 1) schweres und leichtes Kohlenwasser- gas, gutleuchtende Bestandtheile; 2) Kohlen- ; und Wasserstoffgas, schwach leuchtende, aber gebende; 3) Sticksstoff- und Kohlenäure- verdünnende, die Leuchtkraft vermindern; und Ammoniak- und Schwefelwasserstoffgas, liche Bestandtheile, welche die Brauchbarkeit des ngases in dem Grade beeinträchtigen, daß sie aus entfernt werden müssen. Auch die Kohlen- läßt sich aus dem rohen Gas entfernen, wöh- wir kein Mittel besitzen, das Verhältnis seiner Bestandtheile zu ändern. Endlich sind dem- noch Dämpfe von Theer und flüchtigen Kohlen- stoffen, wie Benzol u. a., beigemengt. Die Fa- tion geschieht demnach in die Erzeugung, in die rigung und Vertheilung des Leuchtgases.

Die Erzeugung des Leuchtgases dient der Gas- , Fig. 2 von vorn abgebildet. In demselben fünf  $\Delta$  förmige Retorten AA' von ge- item Thon zu drei und zwei übereinander. Sie n mit Steinkohle in groben Stücken gefüllt und nschäftlich geheizt. Aus dem vordern hervor- den Theile jeder Retorte führt ein Abfuhrungs- HH aufwärts, das oben durch ein Kniestück e 3) mit dem abwärtsgehenden Schenkel nn ver- en ist. Letzterer mündet in einen zur Aufnahme heers und Theerwassers bestimmten horizontalen, Vorlage dienenden Kanal GG (Fig. 2). Den n Verlauf der Operationen verfolgen wir in 15, wo der Gasofen im seitlichen Durch- t sich darstellt, mit den Retorten CC', dem Ab- gsrohr T und der Vorlage B. Man ersieht die Art des Verschlusses der Retorten an ihrem rstehenden Kopftheil vermittels aufgeschraubter , sowie die Art der Füllung bei der untern te C'. Die Heizung der Gasretorten geschieht Steinkohle und mit den bei der Fabrication abfallenden Coals. Ihre Führung ist von tlichem Einfluß auf die Menge und Beschaffen- es erzeugten Gases; es empfiehlt sich, die ein- te Kohle möglichst rasch zu erhitzen. In vier Stun- den ist die Destillation vollendet. Von größ- ichtigkeit ist es, daß die in der Retorte befind- Gase nur eine geringe Spannung besitzen, weil ein Theil derselben durch die poröse Thonmasse

entweicht und ein anderer Theil sich unter Abscheidung von Graphit zerlegt. Ja es hat sich für die Schnel- ligkeit und Ausgiebigkeit der Gaszerzeugung sehr vor- theilhaft erwiesen, den Druck innerhalb der Retorten künstlich zu vermindern. Es geschieht dies durch die sogenannten Exsuptoren, Vorrichtungen, welche in der Art von Luftpumpen wirkend, das Gas rasch aus der Retorte und weiter befördern. Als Beispiel diene der Exsuptor von Beal (Fig. 4), der Haupt- sache nach aus einem fest aufgestellten Cylinder A be- stehend, in welchem ein zweiter Cylinder B concentrisch um seine Achse sich dreht und durch das Spiel der verschiebbaren Scheidewände bb die Gase in der von den Pfeilen angedeuteten Richtung aus der Retorte der Leitung zuführt. Zu genauem Verständnis würde eine Reihe ins einzelne gehender Zeichnungen erforder- lich sein.

Die nachfolgenden Vorrichtungen Fig. 15 dienen zur Reinigung des Gases. Zu B wird nicht aller Theer abgejezt, vielmehr ein Theil in Dampfform, ein an- derer mechanisch vom Gas weiter geführt. In dem dieses jedoch ein System verbundener Röhren D, die unten durch Wasser abgeperrt sind, passieren muß, gibt es seinen Gehalt an Theer und Ammoniak größ- tentheils ab. Ein Heberrohr H dient zum Ablassen der damit gesättigten Flüssigkeit aus E. Von energischer Wirksamkeit zur Fortsetzung des Reinigungsgeheißes erweisen sich die sogenannten Schruber OO, Cylinder, die mit Coals oder Scherben gefüllt sind, über welche durch eine besondere Vorrichtung beständig kaltes Wasser rieselt. Vortheilhaft erweist es sich, denselben etwas Schwefelsäure zuzusetzen, wodurch das Ammo- nial dem Gas vollständig entzogen wird. Letzteres enthält jetzt als schädliche Beimischung noch Kohlen- säure und Schwefelwasserstoff, und wird zu deren Ent- fernung in einen Behälter M geleitet, wo es wieder- holt über die Reinigungsmaße, welche etagenweise auf Jordan ausgebreitet ist, hinzustreichen gezwungen ist. Dieselbe besteht aus einem Gemenge von gelöschtem Kalk (Kalkhydrat) mit Eisenvitriol, dem zur Anflode- rung etwas Sägemehl hinzugefügt wird; diese Stoffe zersetzen sich in Gips und Eisenoxydhydrat mit über- schüssigem Kalkhydrat, welches die Kohlenäure aus dem Leuchtgas hinwegnimmt. Dessen Schwefelwasser- stoff wird von dem Eisenoxydhydrat gebunden unter Bildung von Schwefeleisen. Wenn die Reinigungs- maße ihre Wirksamkeit verloren hat, so wird sie her- ausgehoben und einige Zeit an der Luft liegen ge- lassen, wodurch sie wieder wirksam wird, indem das Schwefeleisen durch rasch eintretende Oxydation sich in Eisenvitriol zurückverwandelt. Hierbei entgeht jedoch ein Drittel des vorhandenen Schwefels der Oxydation und wird ausgeschieden. Daher nimmt bei fortgesetz- tem Gebrauch der Reinigungsmaße ihr Schwefelgehalt zu und erreicht bis 60 Procent, sobald dieselbe in der Schwefelsäurefabrication Verwendung findet, indem man den Schwefel zu schwefliger Säure verbrennt (vgl. S. 21). In neuerer Zeit wird als Reinigungs- maße mit Vortheil ein Gemenge von Kalkhydrat mit natürlichem Eisenoxydhydrat, sogenanntem Masenerz, verwendet.

Leuchtgas darf, in Kaltwasser geleitet, dasselbe nicht weißlich trüben, sonst enthielte es Kohlenäure, Blei- lösung nicht schwärzen, sonst wäre es schwefelwasser- stoffhaltig, und rothes Ladinuspapier nicht blau fär- ben, was einen Gehalt an Ammoniak anzeigen würde. Hat es diesen Grad von Reinigung erreicht, so wird es nach dem Gasometer G geleitet, einem großen, aus Eisenblech kniftdicht vermittelten Behälter, der bei ge- öffnetem Zugangsrohr S sich erhebt und mit Gas füllt,



und bei geöffnetem Abzugrohr S' sich senkt und das Gas in die Leitung dem Consum zuführt.

Die nunmehr eintretende Vertheilung des Gases macht in der Leitung einen möglichst gleichbleibenden Druck desselben erforderlich. Ausgeübt wird derselbe im allgemeinen durch den Gasbehälter, allein er ist vielfachen Störungen ausgesetzt durch Wechselfälle, denen das Gas in seinem Laufe und beim Ausströmen unterliegt. Diesem Uebelstande wird begegnet durch Einschaltung des Druckregulators von Clegg (Fig. 5). Das Gas tritt, von dem Gasbehälter herkommend, durch das Rohr D ein und durch das Rohr C aus in die Leitung; diese beiden Rohre befinden sich in einem kleinen, mit Wasser beschickten Gasbehälter A, dessen Trommel B mit dem Druck steigt und fällt. An dieser Trommel ist ein Regelventil F aufgehängt, welches in dem Querschnitt E der Mündung des Austrittsrohres C spielt. Das Gas kann nur durch den ringförmigen Zwischenraum zwischen E und F abströmen. Mit wachsendem Druck in der Leitung hebt sich nun die Trommel B, folglich auch F, und verringert diesen Zwischenraum, mit abnehmendem Druck sinkt F, und der Zwischenraum erweitert sich, es wird daher stets gleich viel Gas durch C abfließen und die Druckveränderung sich selbst ausgleichen.

Das Leuchtgas wird im Verkehr nach dem Volumen, und zwar nach englischen Kubitfuß berechnet und bezahlt; man bedarf daher einer Vorrichtung, womit das Gas ohne besondere Mäßhaltung zuverlässig gemessen werden kann. Eine solche ist die bereits seit 1816 im Gebrauch befindliche Gasuhr, deren Einrichtung wir mit Hülfe der Fig. 6, 7, 8 zu erläutern versuchen. Dieselbe besteht aus einem Gehäuse, innerhalb dessen eine walzenförmige, leicht um ihre Achse drehbare Trommel B (Fig. 7) sich befindet und das mit einer Vorlammer E in Verbindung steht. Gehäuse, Trommel und Vorlammer sind bis zu einer bestimmten Höhe W mit Wasser gefüllt. Die Trommel wird durch das in dieselbe ein- und austretende Gas in Bewegung gesetzt, und jede Umdrehung entspricht einer gewissen Menge von durchpastirtem Gas. Die Einrichtung der Vorlammer ist durch Fig. 6 ersichtlich. Das von oben durch das Rohr E eintretende Gas gelangt zuerst in die kleine Abtheilung F, in dessen Oeffnung ein von dem Schwimmer S getragenes Ventil i spielt. Sinkt durch Verdunstung das Wasser unter den erforderlichen Stand W, so sinkt mit demselben auch der Schwimmer S und schließt das Ventil, und die Uhr steht still. Aus der kleinen Abtheilung F tritt das Gas in die größere G und geht abwärts in den hier sichtbaren Theil H eines zweifelhakenigen Rohres, dessen anderer Schenkel, durch die Wand der Trommel gehend, das Gas in diese einführt. Die Trommel selbst ist in vier Abtheilungen oder Kammern getheilt, durch Scheidewände eigentümlicher Art, welche in Fig. 8 dargestellt sind, nach Hinnwegnahme des sie umgebenden Wärmantels. Jede Scheidewand besteht aus einem Querschnitt v w und zwei Seitenbän. Die Bän der verschiedenen Scheidewände schließen nicht durchgehend dicht aneinander, sie bilden etwas voneinander absteigende Schlitze, wie zwischen d und b und zwischen w und a ersichtlich. Durch diese Schlitze tritt das Gas ein und aus; geschieht dies z. B. zwischen d und b, so nimmt dasselbe seinen Weg entlang dem Querschnitt v w nach dem an der Rückseite bei c befindlichen Schlitze. In dem Augenblick, wo die obere Oeffnung, der Umdrehung folgend, unter Wasser geht und geschlossen wird, tritt der untere Schlitze aus demselben hervor und entläßt das Gas in den über Wasser

befindlichen Theil des Gehäuses, von wo es durch (Fig. 6) seinen Weg in die Leitung nimmt.

Die Achse der Trommel hat bei a (Fig. 7) eine Schraube ohne Ende, durch deren Umdrehung die Zahnräder P (Fig. 6) in Bewegung versetzt werden. Die Achse durch eine Hülse sich bis in die Zählerrichtung U erhebt und daselbst eine Anzahl Räder i wegt, mit Ueberlegungen durch Triebe, welche die Zeiger tragen. Die Geschwindigkeit dieser ist so geregelt, daß der Zeiger des einen zu dem der des folgenden die Zehner, des dritten zu dem der des vierten die Tausender anzeigt. Bei a daher die Ziffern zu der Zahl, welche die durchgetretenen Kubitfüße anzeigt, an den vertheilten Zifferblättern abzulesen.

In den Gasfabriken hat man Gasuhren der gewöhnlichen, sogenannte Stationsuhren, welche nur die Menge des erzeugten Gases zu registriren, zugleich den Gang der Gasentwidelung selbst zu kontrolliren. Die vordere Fläche einer solchen (Fig. 9) zeigt sechs Zifferblätter, so daß hier zu lesen ist die Menge des passirenden Gases bis zu Hunderten abzulesen sind.

Auf der Achse der Trommel der Gasuhr ist eine Scheibe von Messing g ausgezogen, auf welcher gleich große Papierscheibe befestigt wird. Diese dreht sich mit der Trommel der Uhr, ihre Umdrehung ist also ein Maß für die Menge des durch das Gas. Ueber der Scheibe ist eine gewöhnliche, angebracht, als Messer der Zeit. Uhr und Scheibe sind durch den Pfeilspitzer h verbunden, so daß mit dem obern Ende an den Minutenzeiger angebracht ist und an dem untern Ende ein Stift trägt, dessen Spitze durch eine Feder an der Papierscheibe angebracht wird. Würde der Pfeil der Uhr allein bewegt, so würde er mit der Scheibe von halber zu halber Stunde auf- und niedergehen, eine Null beschreiben; stände er still und die Scheibe drehte sich allein, so würde der Pfeil dieser einen Kreis verzeichnen. Da sich aber die Scheibe und die Papierscheibe, so wie der Pfeil am Umdreien der Scheibe verschleifen, so fallen die Bogen geschlossen aus, wenn das Gas erzeugt wird, offener. Verläßt die Scheibe gleichmäßig, so fallen die verzeichneten Bogen symmetrisch aus.

Es erübrigen noch einige Worte über die Vorrichtungen zur Beleuchtung durch Gas, die Gasbrenner. Dieselben unterscheiden sich in zwei Hauptarten. Bei erstern bildet die Flamme weder einen Schlitze, wie bei dem Rundbrenner Fig. 12, wodurch das ausströmende Gas durch den Namen des Brenners sehr gut als Flamme bildet — oder das Gas tritt durch gegenüberstehenden Oeffnungen aus, wie bei dem schwanzbrenner Fig. 10 der Fall ist, oder durch eine flache, der Bezeichnung entsprechende Oeffnung (Fig. 11) entsteht. Bei den Rundbrennern (Fig. 13) tritt das Gas durch einen Kreis von Löchern (Fig. 14), die einander gegenüberstehen, in die Flamme ein, so daß die benachbarten Flammen in einem Schlitze stehen; sie bedürfen stets eines Zuges.

Die Lichtstärke des Gases hängt in einem hohen Grade von dessen Zusammensetzung, insbesondere von dem Gehalt an schwerem Kohlenwasserstoff; bei einem 10–12 Procent übersteigenden Gehalt an diesem das Gas in gewöhnlichen Brennern nur in Argandbrennern zu verwenden, da dem wird die Lichtstärke der Gasflamme

Druck, unter welchem es ausströmt; ist dieser zu hoch, so mischt sich am Ort der Ausströmung zu viel bei, und der untere blaue Theil der Flamme verändert sich in nachtheiliger Weise. Durch zweckmäßige Leitung des Gases läßt sich die Ausströmung reguliren. Man rechnet für einen gewöhnlichen Brenner auf Stunde einen Gasverbrauch von 4—5 Kubikfuß verlangt, daß seine Lichtstärke der von 12—18 Kerzen gleichkommen soll, was durch die Photometrie genau ermittelt wird.

Gleich das dem Kohlenstoff in gewissen chemischen Asphalten nahestehende Element Silicium ein Antheil der allverbreiteten Kieselerde ist und in einen hervorragenden Antheil an der Zusammensetzung der Erdrinde hat, so ist doch keine seiner Verwendungen für sich Gegenstand einer bemerkenswerthen industriellen, und dasselbe gilt für das Vor, ohnehin eins der seltener vorkommenden Elemente ist.

### 8. Chlor.

Unter den nichtmetallischen Elementen gehört endlich auch dem Chlor, Brom, Jod und Jlor gete Gruppe von gemeinschaftlichem Charakter, von denen jedoch nur das erstgenannte massenhaft auf und in der chemischen Technik eine Rolle spielt. Das Chlor,  $\text{Cl} = 35$ , bereits gegen Ende des 18ten Jahrhunderts entdeckt, ist doch erst zu Anfang gegenwärtigen als ein Element erkannt worden. Es ist ein gelblich-grün gefärbtes Gas,  $2\frac{1}{2}$ -mal schwerer Luft, von ganz eigenenthümlichem Geruch, die Athmungsorgane heftig angreifend und daher sehr giftig. Ein starken Druck läßt es sich in eine braungelbe Flüssigkeit verwandeln und in Wasser ist es ziemlich löslich. Das Chlor ist mit einer energischen Verdichtungskraft begabt. Nur wenige Körper widerstehen seiner zerstörenden Einwirkung, die sich besonders gegen organische Stoffe so eingreifend erweist, dieselben bei längerer Einwirkung durch Chlorig zerstört werden. Hieraus beruht jedoch die wichtige Anwendung des Chlors als Desinfectans, insbesondere aber zum Bleichen. Von seinen Verbindungen sind am wichtigsten das Chlornatrium  $\text{NaCl}$ , bekannt als unser gewöhnliches Salz; Kochsalz, und die aus demselben dargestellte Formwasserstoffsäure  $\text{HCl}$  oder Salzsäure.

Im Körper von so kräftiger Verwandtschaft, wie Chlor sie besitzt, kann im unveränderten Zustande im Bereich der Natur sich nicht vorfinden. Zu That ist fast alles Chlor, das existirt, mit Natrium zu Kochsalz vereinigt, das theils in Gestalt von Salzlagern, theils in den Salzquellen im Meerwasser gelöst ist. Sein Gehalt an Natrium beträgt 60 Procent.

Wenn Kochsalz mit Schwefelsäure gemischt und erst wird, so entwickelt sich Chlorwasserstoffgas,  $\text{HCl}$ , und es hinterbleibt schwefelsaures Natrium,  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ , in der Technik Sulfat genannt. Dieser Schritt ist im größten Maßstab als erster Act bei Sodafabrikation vollzogen und liefert das Chlorwasserstoffgas als Nebenprodukt, welches, in Wasser gelöst, bis zu möglicher Sättigung, die wässrige Formwasserstoffsäure, gemeinhin Salzsäure genannt, ist. Die Menge dieser nebenher gewinnbaren Säure reicht sich so außerordentlich, daß sie den Bedarf übersteigt, weshalb die Sodafabrikanten es vortheilhaft finden, das salzsaure Gas in die Luft entweichen zu lassen, statt es in Wasser zu verdichten. In weit und breit wurde durch diese sauren Gase die Vegetation geschädigt, so daß in England ständige Vorschriften den Fabrikanten zwingen, nur

höchstens 5 Procent derselben in die Atmosphäre abzugeben zu lassen. Um das Gas durch Wasser zu absorbiren, bedient man sich entweder der zweifelhafte Wässrigen Flaschen von Steingut oder sogenannter Verdichtungsstürme.

Wir erblicken in Taf. 7, Fig. 4 eine Kette oder einen Strang solcher Flaschen, deren nicht unter 20—70 miteinander verbunden werden. a ist ein Trichter, durch welchen Wasser in die erste Flasche eingegossen wird, das durch die Seitenöffnungen c c von links nach rechts fließt, entgegen dem Strom des salzsauren Gases, das vom Sulfatofen (S. 29) kommend durch die gebogenen Schenkel e e sich bewegt. Das Wasser, stets aus neuem dem Gas beegend, absorbirt dasselbe, es erreicht endlich die letzte Flasche und fließt in möglichen gesättigten Zustande als rauchende Salzsäure aus derselben aus. Ungeachtet dieser zweckmäßigen Einrichtung entweichen bei diesem System noch 15 bis 20 Procent Gas. Die Verdichtung desselben geschieht am vollständigsten durch die erwähnten Thürme, hohle Cyliner von 12—38 Meter Höhe, die mit Stäben von Coaks gefüllt sind, über welche von oben herab Wasser rieselt, während das Gas von unten aufsteigt. Die Hauptschwierigkeit zur Errichtung derselben liegt in der Beschaffung eines Steins und Bindemittels, das hinreichend lange dem Angriff der entstehenden Salzsäure Widerstand leistet. Man wählt hierzu Sandsteine, die, erforderlichenfalls mit heißem Theer getränkt, durch Fugen verbunden und mit einem Mörtel aus Thon und Theer verklebt werden. Fig. 3 zeigt den Unterbau eines solchen Verdichtungssturms im Durchschnitt. A Fundament des Thurms; B mittleres Stück desselben; c c Koste, auf welchen die Coaks ruben; C Raum unterhalb derselben, in welchem sich die gebildete Salzsäure sammelt; i Abzugrohr für dieselbe nach dem Behälter D; b Rohr zur Ueberführung der Säure von dessen Boden nach E, von wo sie abgelassen wird. Die gasförmige Säure gelangt vom Sulfatofen zuerst nach E und geht durch a und a' unter den Koste des Thurms.

Die also gewonnene Salzsäure wird in vielen chemisch-technischen Operationen verwendet, deren einige ihre Entstehung erst der Zeit verdanken, in der sie eins der wohlfeilsten Produkte geworden ist. Ausschließlich dient sie jedoch zur Erzeugung des Chlors selbst sowie des Chlorkalks.

Wenn Salzsäure mit gepulvertem Braunkstein, d. i. Mangan-Weerzhyd  $\text{MnO}_2$ , erwärmt wird, so tritt eine Zersetzung ein, als deren Producte Manganchlorid  $\text{MnCl}_2$ , Wasser und freies Chlor austreten, entsprechend der folgenden Gleichung:  $\text{MnO}_2 + 4 \text{HCl} = \text{MnCl}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} + \text{Cl}_2$ . Die Hauptverwendung findet für diesen Zweck das Chlor zum Bleichen, allein es erweist sich die eben genannte Bereitung desselben nicht vortheilhaft; man zieht hierzu die Anwendung des Chlorkalks oder Bleichkalks vor, der daher Gegenstand der Fabrication ist.

Der Chlorkalk wird gebildet, wenn Chlorgas über Kalkhydrat, d. i. gelochten Kalk, geleitet wird. Man bedarf deshalb einer größeren Vorrichtung zur massenhaften Entwicklung des Chlors. Eine solche sehen wir Fig. 5 mit Hinzueinsetzung der Vorrichtung abgebildet. Der eigentliche Chlorentwickler ist ein aus massivem Sandstein gebauener Trög A, dessen Wände aa in eine Ummauerung ww mit einer 2 Centimeter dicken Schicht von Pech eingefittet sind; er ist oben durch eine Sandsteinplatte p geschlossen, durch welche der Braunkstein (bis 10 Ctr.) eingebracht und auf einem Kof von Sandsteinprismen vertheilt wird; q ist eine Oeffnung zum Eingießen der Salzsäure.

säure, v Dönnung und u Rohr zum Einführen des heizenden Dampfes; sr Kanal zum Abbleiten des Chlors in die Kalkkammer; zwischen h h breite Dönnung zum Entleeren der Röhren, verschließbar durch einen angeschraubten Dedel d. Alle genannten Theile sind aus Sandstein gefertigt und in Theer bis zur Sättigung gelocht worden. In Fig. 6 sehen wir den Gasentwinder in Thätigkeit aufgestellt; s leitet heißen Dampf in denselben; das Chlor tritt aus z durch eine Leitung von Thon a in die Flasche b, um hier Wasser abzugeben und sich abzukühlen, und geht dann weiter durch d in die Kalkkammer. Dieselbe ist entweder, ähnlich den Schwefelsäurekammern, aus Bleiplatten oder aus in Theer gelochten Brettern angefertigt und enthält auf Hüden ausgebreitet zu trocknendem Staube gelochten Kalk, über welchen das Chlor hinstreicht unter Bildung von Chlorkalk.

Der Chlorkalk ist durchsichtlich ein Gemenge in gleichen Theilen von unterchlorigsaurem Kalk  $\text{Ca Cl}_2\text{O}$ , Chlorkalccium  $\text{Ca Cl}_2$ , Kalk  $\text{CaO}$  und Wasser  $\text{H}_2\text{O}$ ; er ist ein weißes, leicht zusammenballendes Pulver von eigentümlichem, chlorähnlichem Geruch. In Wasser zum Theil löslich, bildet er die Weichflüssigkeit, auch Weichwasser genannt, in welche die zu bleichenden Stoffe eingelegt werden. Beim Zusatz einer Säure entwickelt der Chlorkalk rasch eine reichliche Menge von Chlorgas.

## Chemische Technologie der Metalle.

(Tafel 6 und 7.)

In der früher gegebenen Uebersicht der Elemente begegnen wir zuerst der Gruppe der leichten Metalle, also genannt, weil sie theils leichter, theils nur wenig schwerer sind als Wasser. Die bekanntesten oder besser gesagt, die häufiger vorkommenden derselben sind das Kalium, Natrium, Calcium, Barium, Strontium, Aluminium und Magnesium. Als weitere charakteristische Eigenschaft derselben gilt ihre große Verwandtschaft zum Sauerstoff, jedoch man niemals eins derselben in metallischem oder gebiegenem Zustand antreibt und die meisten, um sie vor Oxidation zu schützen, in Steinöl aufbewahrt werden müssen, das keinen Sauerstoff enthält. Ihre Darstellung ist erst in diesem Jahrhundert gelungen.

Die leichten Metalle spielen eine große Rolle in der Mineralogie, denn ihre Oxyde bilden unter dem Namen von Kali, Natron, Kalk, Baryt, Bittererde (oder Magnesia) und Thonerde, in Verbindung mit Kieselerde die Gesteine und Felsen, aus denen die Erdrinde zusammengesetzt ist. Weniger interessant erscheint dagegen die chemische Industrie derselben, nicht etwa, weil sie unbedeutend ist, sondern weil die darin angewendeten Operationen fast durchgehend sehr einfacher Art sind, wenig Aufwand von künstlichem Apparat bedürfen und der Beschreibung fast nur die Aufzählung von Glühen, Schmelzen, Mahlen, Lösen, Filtriren, Niederschlagen, Krystallisiren u. s. w. bedürfen, wie solche beispielsweise bei dem Kalk- und Cementbrennen, bei der Ultramarin-, Soda-, Salpeter- und Alaunfabrikation vorkommen. In andern Zweigen, wie in der Töpferei und Glasfabrikation, tritt dagegen der chemische Proceß in Betracht der Handarbeit und des Aufheißes, welchen die Kunst nimmt, fast gänzlich in den Hintergrund.

Die Gewinnung der schweren Metalle aus ihren Erzen bietet dagegen der Beschreibung mehrfach ein höchst anziehendes Feld, und es genügt der Waid in ein Hütnenwerk, um dies zu bestätigen. Allein auch hier ist der chemische Proceß in wenigen Grundzügen vorzeichnet; die Hauptarbeit ist eine vllstänische, in

der Föhrung von Schmelzöfen, Hoch-, Hammer- und Walzwerken bestehende. Sie bildet mit der Föhrung der Erze die Aufgabe des Berg- und Hüttenwesens, dem ein besonderer Theil des Atlas gewidmet ist.

Wir beschränken uns daher auf die Skizze der Gewinnung der populärsten Chemikalien aus dem Reich der metallischen Elemente, nämlich der Pottasche, des Kochsalzes und der Soda.

Wenn Soljache mit heißem Wasser übergossen wird, so besitzt die bräunlich gefärbte ablaufende Flüssigkeit Lauge genannt, außer einem eigentümlichen, alkalisch bezeichneten Geschmack, die Eigenschaften, Sette anzulösen, weshalb zur Zeit, wo Solj noch allgemeine Brennstoff war, in jeder Haushaltung die Asche sorgfältig gesammelt und die aus ihr bereitete Lauge zum Waschen verwendet wurde. Es kam dies darauf, daß die Asche der Pflanzen solj saures Kali  $\text{K}_2\text{CO}_3$  enthält, das beim Eindampfen der Lauge als ein braun gefärbter Rückstand bleibt, der jedoch durch starkes Glühen oder Calciniren ergrünlich-weiße, körnig-pulverige Masse bildet, welche Pottasche genannt wird.

In früherer Zeit, wo bei einer geringen Bevölkerung noch manche Theile von Deutschland mit ungedebnten Wäldern bedeckt waren und das Holz an Mangel an Bedarf und Transportmitteln fast keinen Werth hatte, da wurde inmitten derselben die Aschenföhrerei betrieben. Gefälltes Holz mit Stumpenwerk wurde in Gruben verbrannt, die Asche in eine Reihe von Tonnen mit doppeltem Boden gekocht und ausgelaugt, indem man die von der ersten abgelaugte Lauge auf die folgende goß und so fort, um sie möglichst concentrirte Lauge zu erhalten. Ein einfacher eiserner Kessel genügte zum Eindampfen derselben.

Heutzutage hat die Pottaschenföhrerei sich zurückgezogen nach dem südöstlichen Europa, Asien, Amerika, und unterseidet sich fast nur durch verschiedene Vorrichtungen zum Eindampfen von der alten. Taf. 6, Fig. 9 eine solche zeigt, wo eine flache Kammer durch in Röhren darunter hergehendes Feuer erhitzt wird, das zugleich den als Vorwärmer dienenden Kessel c umspült. Wenn die Lauge zu einem bläulichen Brei eingekochten ist, läßt man sie auf die Seite eines Flammofens ablaufen, wo sie, von oben eingegeben zu einer harten Masse gebaden und nachher der Calcination unterworfen wird.

Die Pottasche ist ein chemisches Rohprodukt, welches durchschnittlich 60 Procent kohlensaures Kalium, außerdem schwefelsaures Kali, Chlorkalium, Kieselerde und einige metallische Beimengungen enthält, die es mitunter ein bläuliches oder röthliches Ansehen geben. Sie ist um so vorzüglicher, je größer ihr Gehalt an ersterem ist, und findet in der Fabrication von Salzen, Glas und Seife eine unerlässliche Verwendung. In der Luft aufgesetzt, zieht sie aus derselben Wasser an und zerfällt, da sie in denselben höchst löslich ist. Die Pottasche läßt sich daher von den sie begleitenden Salzen reinigen, wenn man dieselbe mit wenig Wasser übergießt, die entstandene Lösung von den unauflöselichen Salzen abgießt und verdampft, wodurch man ein schneeweißes kohlensaures Kali erhält.

Da die Gewinnung der Pottasche aus Salzen, welche mit der sich ausbreitenden Cultur mehr und mehr in Frage gestellt wird, so war man bereits sie auf andere Weise zu beschaffen, was nahe liegt, an dieselbe Bezugsquelle zu denken, aus der die Pflanze das Kali bezieht, an die salzhaltigen Minerale des Erdbodens. Die vielertheilten



thgesteine enthalten Kali, aber an Kieselsäure ge-  
n, in unlöslichem Zustande. Es ist jedoch der  
nischen Technik noch nicht in befriedigender Weise  
angen, aus dem Feldspath kohlensaures Kali dar-  
stellen, und dasselbe gilt für des leptom Gewinnung  
Chlorkalium, Aufgaben, deren Lösung mit der  
t zu erwarten ist.

Wenn Pottasche mit Kohlenpulver vermischt in einem  
parat von Schmiedeeisen der Weißglühhitze aus-  
get wird, so tritt eine Zerlegung ein. Das Kali  
t seinen Sauerstoff ab an Kohle, und freigeswor-  
tes Kalium,  $K = 39$  destillirt über in eine mit  
eind gefüllte Vorlage; dasselbe bildet weiß metall-  
nische kleine Kugeln, die auf Wasser geworfen  
gebräunlich sich entzünden und mit röthlich-violetter  
anne verbrennen. Dieses merkwürdige Metall wurde  
t im Jahre 1807 entdeckt.

Von den übrigen Salzen des Kaliums haben tech-  
che Bedeutung das Chlorkalium  $KCl$ , das  
chwefelsaure Kali  $K_2SO_4$ , und der Salpeter oder  
perkaliumsaures Kali  $KNO_3$ . Die beiden erstgenannten  
den gegenwärtig in großer Menge aus dem so ge-  
annten Abraumfals einiger Salzlager gewonnen,  
n welchen das bei Staßfurt das bedeutendste ist. Die-  
s Salzlager ist der Küstland eines eingetrockneten  
leeres und enthält dessen Salze in einer ihrer Löslichkeit  
stprechenden Reihenfolge, sodaß zu unterst der schwer-  
liche Gips liegt, worauf ein mächtiges Lager von  
Steinsalz (Chloratrium  $NaCl$ ) folgt, über welchem  
ie etwa 50 Meter starke Schicht von Abraumfals  
egt, also genannt, weil es früher als wertlos be-  
achtet und abgeräumt wurde. Fig. 1 dient zur Ver-  
anschaulichung der beim staßfurter Salzlager sich vor-  
findenden Verhältnisse: e Steinsalz, d d Abraumfals,  
Mergelschicht.

Die Schicht des Abraumfalzes besteht wieder aus  
mer unteren Region, 90 Procent Steinsalz mit Poly-  
alit (aus Gips, schwefelsaurer Magnesia und Kali  
stehend) enthaltend; einer mittlern, 60 Procent  
Steinsalz mit Kieserit (schwefelsaure Magnesia) ent-  
altend, und einer obern Region, 25 Procent Stein-  
alz und Carnallit (aus Chloratrium und Chlor-  
magnesium bestehend) enthaltend. Die Abraumfalze  
den eine wichtige Verwendung als Düngsalz und  
werden ausgebeutet zur Gewinnung von Chloratrium  
nd schwefelsaurem Kali, welches ersteres zur Salpeter-  
nd letzteres zur Alaunfabrikation benutzt wird.

Das bereits mehrfach angeführte Kochsalz, seiner  
hemischen Zusammensetzung entsprechend Chlorna-  
rium  $NaCl$  genannt, hat in erster Linie seine alt-  
ererbte Bedeutung als unentbehrliches Nahrungsmittel.  
Wie gering auch die Menge desselben er-  
scheinen mag, die wir tagtäglich den Speisen zusehen,  
o ist dieselbe doch von wesentlichem Einfluß auf unser  
Wohlbefinden, und die Salzsteuer, wohl berechnet, in-  
sofern niemand sich ihr entziehen kann, ist keineswegs  
uehrliebig, da Salz ein Bedürfnis auch des Ar-  
sten ist. Nicht überall hat die Natur dem Menschen,  
er im Durchschnitt jährlich 16 Kilo desselben bedarf,  
s Kochsalz genügend geboten. Man erzählt von  
Zivilisationen an der Goldküste von Afrika, wo für  
eine Steinsalzplatte, so groß, daß ein Keger mit bei-  
den Füßen auf derselben zu stehen vermag, der ganze  
Keger feil ist, und daß die höchste dem Gast erwiesene  
Gunft darin besteht, daß ihm erlaubt wird, zu lachen  
an einem Eßel solchen Salzes, das der Gastfreund  
wie ein Amulet an Hals trägt.

Im übrigen spendet uns die Natur das salzige  
Salz in dreierlei Weise, in Gestalt eines festen Mi-  
nerals als sogenanntes Steinsalz, gelöst in Quell-

wasser als Salzsole, und endlich im Meerwasser,  
durch dessen Verdunstung an der Luft das Seesalz  
gewonnen wird.

Der Salzgehalt der Solen sinkt von 32 Procent,  
welchen die Lüneburger, die stärkste aller bekannten  
Solen, besitzt, bei andern herab bis unter 5 Procent,  
die alsdann die Arbeit zur Salzgewinnung nicht mehr  
lohnern. Dieselbe wird hauptsächlich vertbeuert durch  
den Aufwand des zur Verdampfung des Wassers er-  
forderlichen Brennstoffs. Man ist daher bemüht,  
schwächere Solen durch freiwillige Verdunstung, die  
sogenannte Gradirung, möglichst zu concentriren,  
bevor sie auf die Siedepfannen gebracht werden.  
Hierzu dienen die Gradirhäuser oder Gradir-  
bane, wovon Fig. 2 eine Abbildung gibt. Ein  
aus Holz gezimmertes Gerüst von mehreren Stock-  
werken CC ist ausgefüllt mit aufgeschichtetem Reisig  
von Schwarzdorn. Durch ein Pumpwerk wird die  
Sole in den zu oberst befindlichen flachen Behälter D  
gebracht, von wo sie aus den Hähnen ee ausfließend  
über die Dornen sich ausbreitet und in einen untern  
Behälter A herabtröpfelt. Die lange Seite des Gradir-  
baues ist senkrecht auf die Richtung des herrschenden  
Windes gerichtet, und die durch denselben gehende  
Luftströmung nimmt einen Theil des Wassers aus  
der über das Dornreißig ausgebreiteten Sole hinweg,  
sodaß sie unten stärker anflutet, als sie oben ausge-  
gossen wurde. Durch erneutes Hinaufpumpen und  
Verabfließenlassen wird dieselbe auf den niedrigsten  
Grad gebracht.

In flachen Siedepfannen wird unnehmlich die Sole  
durch ein darunter hinstreichendes Feuer erhitzt und  
weiter eingedampft, bis das Kochsalz in Gestalt kleiner  
Würfelchen, die sich zu Treppentpyramiden aneinander  
gruppieren, herauskrystallisirt.

Die Solen sind niemals reine Kochsalzlösungen,  
sie enthalten mehr oder weniger andere Salze,  
die gelöst bleiben, nachdem ersteres herauskrystallisirt und  
auf diese Weise die sogenannte Mutterlauge bit-  
den, die Chloromagnesium, Chlorcalcium, schwefelsaures  
Natron u. s. w., darunter bei manchen Solen auch  
Verbindungen von Brom und Jod enthält und vor-  
nehmlich für Heilzwecke zu Bädern verwendet wird.

Das Kochsalz dient aber ferner als Grundlage der  
größten chemischen Industrie, als Rohmaterial zur Fa-  
brication der Soda, d. i. des kohlensauren Na-  
trons  $NaCO_3$ . Gleich der Pottasche wurde die Soda  
bis zu Anfang dieses Jahrhunderts aus Asche ge-  
wonnen, jedoch durch Verbrennung gewisser an und  
im Meere wachsender Pflanzen, der sogenannten Salz-  
kräuter und Lauge. Außerdem wurde eine unreine  
Soda unter dem Namen von Trona aus den Salz-  
seen Aegyptens und Armeniens in den Handel ge-  
bracht.

Beide Bezugsquellen sind heutiges Tags ganz in den  
Hintergrund getreten durch die Uebersührung des Koch-  
salzes in Soda. Die Auffindung des hierzu einzu-  
schlagenden Wegs war seinerzeit für die Chemie keine  
leichte Aufgabe, und es bedurfte politischer Verwidelun-  
gen und ermunternder Preisgebote, um ihre Lösung  
herbeizuführen, welche 1790 von dem Franzosen Le  
Blanc gelöst wurde, jedoch mehr theoretisch als prak-  
tisch, da der eigentliche Aufschluß der Sodafabrikation  
seit Anfang der zwanziger Jahre in England  
durch James Muspratt begründet wurde.

Dieselbe beginnt mit der Verwandlung des Koch-  
salzes in schwefelsaures Natron  $Na_2SO_4$ , in der  
Industrie Sulfat genannt, indem ersteres mit Schwefel-  
säure der Destillation unterworfen wird, was in  
den Sulfatöfen geschieht, wovon wir in Taf. 7,

Fig. 1 und 2 den Längs- und Querschnitt erbliden. Der Zerlegungsproceß geschieht in einer flachen Schale A aus Gusseisen, die mit feuerfesten Steinen überwölbt ist und in welche durch die Thür Z 6—14 Ctr. Kochsalz und etwa gleich viel Schwefelsäure durch ein Bleitrohr eingetragen und durch Umrühren möglichst gut vermischt werden. Das hierbei unter beständigem Aufschäumen massenhaft sich entwickelnde Chlorwasserstoffgas  $\text{ClH}$  entweicht durch das Thonrohr C und wird, wie früher (S. 27) ausführlich beschrieben worden ist, zu wässriger Salzsäure verdichtet. Zur völligen Zerlegung des Gemenges muß dasselbe jedoch härter erhitzt werden und wird deshalb durch die Oefnung n in die sogenannte Muffel B hinübergezogen. Letztere ist ein von feuerfesten Steinen begrenzter, breiter und flacher Kasten; die auf dem Treppentrost a angelegte Feuerung zieht über dessen Dede in den Kanal ff und geht durch die Züge gg' unter dem Boden der Muffel zweimal hin und her und tritt endlich zwischen ii bei p unter die Schale A. Auf diese Weise empfängt die Muffel die stärkste Hitze, und indem durch drei seitliche Thüren die Masse öfter mit Krüden umgearbeitet wird, findet die vollständige Zerlegung statt; die hier noch ausgetriebene Salzsäure wird durch D nach den Verdichtungsrichtungen geführt.

Das erzeugte Sulfat ist ein weißes Pulver. Ein großer Theil desselben wird an die Glasfabrikation abgegeben, ein kleiner Theil durch Auflösung zur Krystallisation gebracht und als Glaubersalz in der Medicin verwendet, der größte Theil dagegen zu Soda weiter verarbeitet. Zu diesem Zweck wird ein Gemenge von durchschnittlich gleichen Theilen Sulfat und grobgepulvertem Kalk mit Holz- oder Steinkohle, deren Menge in verschiedenen Fabriken zwischen 40 und 170 Gewichtstheilen schwankt, in einen Flammofen, Fig. 7, eingebracht, und zwar zuerst auf die höhere Etage desselben D zum Vorwärmen und nachher auf den Schmelz- und Glühraum C zum Fertigmachen. Von dem über dem Roß A entzündeten Feuer kommend, wird die Flamme von der gewölbten Dede des Ofens auf die Masse geworfen und diese ins Glühen gebracht. Durch seitliche Thüren wird dieselbe vermittels eiserner Stangen und Krüden tüchtig umgerührt. Es ist hierzu durchschnittlich eine Stunde Zeit erforderlich, und bei Tag und Nacht ununterhaltender Arbeit werden in 24 Stunden 16, 24 bis 36 Beschickungen fertig gemacht.

Die aus dem Ofen gegogene Nohsoda ist eine graue Masse und enthält als Hauptbestandtheil 30—40 Procent kohlensaures Natron, außerdem Schwefelcalcium, Kalk und kohlensauren Kalk, von welcher letztern Bestandtheilen die Soda durch Auslaugen getrennt wird. Hierbei ist es von Wichtigkeit, mit dem geringsten Wasseraufwand möglichst concentrirte Laugen zu erhalten, was durch folgendes Verfahren geschieht. Ein System von eisernen Kästen CC (Fig. 8) ist treppenartig aufgestellt und durch Heber tt in Verbindung gebracht; in dieselben werden vom Boden abfließende Kasten mit Seitenlöchern a eingehängt, mit Sodaschmelze angefüllt und in den obersten Kasten frisches Wasser ausgegossen. Dasselbe kommt treppabwärts stets mit frischer Soda in Berührung und fließt gesättigt aus dem letzten Kasten durch den Hahn e in den Sammelbehälter R. Der oberste Kasten ist natürlich der zuerst ausgegogene und wird durch den zweiten ersetzt, welchem treppauf die andern nachrücken, was vermittels der Querstangen und einer Hebevorrichtung an der Dede des Locals geschieht.

Läßt man eine heiß gesättigte Sodafällung langsam erkalten, so bilden sich schöne Krystalle dieses Salzes,

welche 62 Procent Wasser enthalten. Diese krystallisirte Soda ist sehr rein von Beimengungen anderer Salze, sie wird jedoch wenig fabricirt, da bei der Verendung der Transport des Wassergehalts in Rücksicht kommt. An der Luft verwittert die krystallisirte Soda, d. h. sie verliert ihr Wasser und zerfällt in einem weißen Mehl.

Bei weitem der größte Theil der Sodalauge wird jedoch in eisernen Pfannen eingedampft und die erhaltene Salzmasse zur Austreibung alles Wassers einem Flammofen calcinirt. Man erhält auf der Weise die calcinirte Soda, welche an Ansehen der krystallisirten sehr nachsteht, denn sie enthält durchschnittlich in Procenten: 70—84 kohlensaures Natron 1—12 Natrium, 8—10 schwefelsaures Natron 3—4 Kochsalz, kleinere Mengen anderer Bestandtheile nicht gerechnet.

Der Verbrauch der Soda ist ein außerordentlich großer. Abgesehen von ihrer allgemeinen Verwendung in den Haushaltungen zum Waschen, wird dieselbe hauptsächlich in Anspruch genommen von der Glas- und Glasfabrikation und unzähligen weiteren chemischen Operationen. Die Sodafabrikation hat in der Entwicklungsgeschichte der Industrie eine hervorragende Bedeutung gewonnen, weil mit der Ausübung andere wichtige chemische Fabricationen notwendig zusammenhängen und dadurch Entfaltung und Aufschwung erhielten, wie die der Schwefelsäure, Salzsäure, des Chloralkalis, die wiederum auf ganz andere anderer Industriezweige begünstigend einwirkten.

## Chemische Technologie der organischen Verbindungen.

(Tafel 8 bis 10.)

Der Unterschied zwischen organischen und unorganischen Verbindungen ist bereits früher (S. 1) besprochen worden. Es wurde ferner über die große Anzahl und Mannichfaltigkeit gedacht und bemerkt, daß die meisten aus den drei Elementen Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff bestehen, wozu bei einer geringen Zahl als viertes Element noch der Stickstoff hinzutritt. Der Unterschied in den Eigenschaften der organischen Verbindungen besteht also nicht darin, daß sie verschiedene Elemente enthalten, sondern darin, daß in einem Molekül (S. 14) derselben eine ungleiche Anzahl von Atomen der genannten Elemente vorhanden ist und daß diese Atome verschiedenartig gruppirte sind. Es beruht hierauf die Eigenthümlichkeit, daß eine organische Verbindung in eine ganze Reihe von Verbindungen umgewandelt werden kann, ohne Zuzugabe eines neuen Elementes. So starke  $\text{C}_2\text{H}_2\text{O}_2$  verandelt sich in Summi  $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ , dieser in  $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ , dieser in  $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$ , dieser in  $\text{C}_2\text{H}_2\text{O}$ , welcher endlich in Essigsäure  $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$  übergeht. Wenn es dagegen sich darum handelt, das Kochsalz in Soda überzuführen, so haben wir in der hergehenden Erfahrung, daß hierzu noch andere Elemente, nämlich Schwefelsäure, Kohle und Kalk zu Hülfe genommen werden müssen.

Charakteristisch für die organischen Verbindungen ist ferner die nahe Beziehung, in welcher die meisten von unserm eigenen Körper stehen, sei es daß sie denselben als Nahrungsmittel oder Arzneimittel dienen. Dabei kommt es, daß einige der großartigen Industriezweige diesem Gebiet, wie die Brauerei, Brennerei, Zucker- und Zuckersiederei herabgegangen sind und auf die menschlichen Haushaltung. Sie sind deshalb gewissermaßen unser besonderes Interesse zu erregen, zumal als sie denselben sich nachweisen läßt, welchen großen Einfluß

ie Anwendung wissenschaftlicher Grundsätze aus der Chemie und Physik auf ihren Betrieb geäußert hat.

### 1. Bierbrauerei.

Die Bierbrauerei verwendet als Rohmaterial Gerste, Hopfen und Wasser. Ihre Aufgabe besteht darin, die in der Gerste enthaltene Stärke theilweise in Gummi, theilweise in Zucker überzuführen, ebern in Gärung zu versetzen und dem also erzeugten Getränk durch Beigabe eines bitteren und aromatischen Stoffs Wohlgeschmack und größere Haltbarkeit zu verleihen.

Das Gerstentorn besteht aus einer hölzigen Hülle von unlöslichem Zellstoff und einem Mehlkörper, der etwa 60 Procent Stärke, 10 Procent sogenannter Eiweißstoffe und bis 15 Procent Feuchtigkeit enthält; beim Verbrennen hinterläßt es 2 Procent Asche, deren Hauptbestandtheil phosphorjaurer Kalk ist.

Die Bierbrauerei zerfällt in drei Hauptoperationen, in das Malzen, in das Würzeln und in die Gärung.

Zur Bereitung des Malzes wird die Gerste in der sogenannten Weiche, einer großen ausgemauerten Cisterne, mit Wasser übergossen und tüchtig umgerührt. Hierbei schwimmen die tauben Körner oben auf und werden als nutzlos hinweggeschöpft. Nach 4—6 Stunden wird das Weichwasser abgezogen; es ist gelblich gefärbt, indem es aus der Gerste sogenannte extractive Stoffe aufgelöst hat, und nimmt leicht einen säuerlichen Geschmack und übeln Geruch an. Das Wasser muß daher rechtzeitig und öfter erneuert werden, und je nach Jahreszeit und Beschaffenheit der Gerste ist das Einweichen vollendet. Man erkennt es daran, daß die beträchtlich aufgequollenen Körner weich sind und daß beim Druck die Hülle leicht vom Körper sich löst.

Es folgt nunmehr das Wachsen oder Keimen des Malzes. Zu diesem Zwecke wird die geweichte Gerste auf die Malztenne gebracht, einen sorgfältig geplatteten Boden, der sich am besten in einem Erdgeschloß befindet, daher Malzkeller genannt, sodas darin eine möglichst gleich bleibende 10—12° K. betragende Temperatur herrscht. Die Gerste wird entweder in Beete ausgebreitet oder auf kleine Haufen von 12—15 Centimeter gebracht, und es beginnt alsbald unter Entwidlung von Kohlensäure eine Erwärmung derselben einzutreten, welche in der Mitte eine Höhe von 17—20° K. erreicht und ohne Nachtheil 22° nicht übersteigen darf. Sowol deshalb, als auch um einen gleichförmigen Gang der Malzbildung zu erzielen, werden die Beete oder Haufen öfter gemendet oder umgestochen, sodas der mittlere, wärmere Theil oben zu liegen kommt, ein wichtiges Geschäft, das viel Aufmerksamkeit und Geschicklichkeit erfordert und nach Umständen wiederholt wird. Hierbei findet die Entwidlung der Keime der Gerste statt, welche alsbald zum Vorschein kommen und die erforderliche Ausbildung gewonnen haben, wenn die Wurzelfeime anderthalb mal so lang sind als das Korn und der Blatt- oder Graßkeim etwa halb so lang. Die Gerste ist jetzt in Malz verwandelt und greift sich mollig oder süßig an, und wenn man einige Körner davon aufnimmt, so hängt an denselben ihre vier- bis achtfache Menge.

Die wichtigste hierbei vorgegangene Veränderung ist jedoch eine innerliche. Aus den Eiweißstoffen der Gerste hat sich ein eigenthümlicher Körper, Diastase genannt, gebildet, der die Eigenschaft besitzt, die Stärke überzuführen in Stärkezucker, und zwar erstreckt sich dieses Vermögen auf eine viel größere Menge von Stärke als in jedem Gerstentorn selbst vorhanden ist. Man kann sich von dieser Zuderbildung leicht überzeugen,

indem man einen Stärkelleister mit etwas geschrotetem Malz vermischt, in mäßiger Wärme stehen läßt. Nach einiger Zeit beginnt der steife Kleister mehr und mehr flüssig zu werden und sein sader mehligler Geschmack verwandelt sich in einen süßen, herrührend von dem entstandenen Zucker. Man bedient sich daher auch des Malzes in der Branntweimbrennerei mit größtem Vortheil, um den Stärkegehalt großer Massen von Kartoffeln durch Zusatz von etwas Malz in Zucker zu verandern.

Da während der Malzbildung ein kleiner Theil des Stärkegehalts der Gerste in Zucker übergeht, so besitzt das Malz selbst einen süßlichen Geschmack; dasselbe würde, in dem seuchten Zustande befindlich, alsbald weiter auswachsen und grüne Blattseime bilden und der Zerlegung und Verderbniß anheimfallen, dem durch rasches Trocknen oder Darren des Malzes Einhalt geschehen muß.

Geschieht dieß lediglich durch Ausbreiten des Malzes an der Luft, so wird das Product Luftmalz genannt; in der Regel wird jedoch durch Anwendung künstlicher Wärme das Darrmalz erzeugt. Nicht nur wird durch letztere ein vollkommenes Trocknen der Körner erreicht, sondern es erhält das Malz hierbei ein eigenthümliches Nöstungsaroma, das dem Bier den geschätzten angenehmen Darrmalzgeschmack verleiht. Zu diesem Zwecke wird das seuchte, etwas abgewellte Malz auf den Darrboden b (Taf. 8, Fig. 1) gebracht, der aus durchlöcheren Eisenplatten oder Drahtgittern besteht und der von unten aufsteigenden heißen Luft den Durchgang gestattet; dd sind Stützen des Darrbodens; cc abschließende Wände. Die Feuerung befindet sich bei f und die erhitzte Luft nimmt den durch die Pfeile bezeichneten Weg aufwärts; ein kleines Dach e verhindert das Herabfallen der getrockneten Malzseime in die Feuerung; gg sind Züge, durch welche nach Bedarf kalte Luft zugelassen werden kann. Da hier die bei der Feuerung entstehenden Verbrennungsproducte der heißen Luft beigemischt sind, so wird eine solche Einrichtung Rauchdarre genannt und zu ihrer Feuerung kann nur trockenes hartes Holz oder Coals verwendet werden, da der überfließende Rauch anderer Brennstoffe, wie von Torf, Braum- oder Steinkohle, das Malz verderben würde. Der geringere Preis der letztgenannten macht jedoch ihre Verwendung wünschenswerth, was ohne Nachtheil geschieht, wenn die Feuerluft in Doppelreihen von Kanälen cc (Fig. 2) unter der Darplatte i hin- und hergeführt wird und durch ein Kamin entweicht. Die leicht abfallenden Malzseime werden durch eine Kornsege getrennt und dienen als Viehfutter.

Gutes Darrmalz muß eine lichtgelbe Farbe, den eigenthümlichen, angenehmen Malzgeruch besitzen und süß schmecken; es muß vollbauchig sein, auf Wasser schwimmen, beim Zerbeißen trachen und innen schön weiß aussehn. Hinsichtlich seiner Bestandtheile unterscheidet es sich von der Gerste darin, daß es etwas weniger Eiweißstoffe und etwas mehr Stärkergummi enthält; sein Gehalt an Stärkemehl ist ungefähr 4 Procent geringer, um welche dagegen sein Gehalt an Extractivstoffen zugenommen hat.

Zur Erzeugung dunkelfarbiger Biere wird auch sogenanntes Farbmalz angefertigt, indem man Gerste in Blechtrommeln stark röstet, bis zum Schwarzwerden, und solches dem Darrmalz zusetzt.

Zur Darstellung der Würze wird geschrotenes, d. i. durch Quetschmalen in grobes Pulver vermandeltes Malz dem Einzeigen oder Maischen unterworfen, worunter man dessen Behandlung mit Wasser in einer Temperatur versteht, bei der das Stärkemehl



durch die Einwirkung von Diastase in Zucker und Gummi sich verwandelt. Das hierbei eingehaltene Verfahren ist sehr verschieden, und es hängt davon ganz besonders der Charakter des erzeugten Biers ab, sodaß die verschiedenen Braumethoden in der Hauptsache auf verschiedenen Maischmethoden beruhen. Im wesentlichen lassen sich jedoch dieselben zurückführen auf zwei Hauptarten des Verfahrens. 1) Das Aufguss- oder Infusionsverfahren und 2) das Koch- oder Decoctionsverfahren. Erstere ist in Norddeutschland, Belgien und England üblich, letzteres in Baiern und bei den andernwärts nach bairischer Art gebrauten Bieren.

Bei dem Infusionsverfahren wird das Malzschrot in den mit einem Siebbeden versehenen Maischbottich mit kaltem Wasser eingeteigt und bildet damit gehörig umgerührt eine dicke, breiartige Masse. Mittlerweile ist in dem benachbarten Braueßel Wasser zum Sieden erhitzt worden, von welchem man durch ein auf den Boden des Maischbottichs gehendes Rohr so viel in diesen überfließen läßt, bis die Temperatur der Maische im Sommer auf 40—50° N., im Winter auf 50—60° gebracht worden ist, bei welcher die Umwandlung der Stärke in Zucker und Gummi vor sich geht. Nach Verlauf von etwa einer Stunde wird die Maische dünnflüssig und nimmt eine bräunliche Farbe und entschiedenen süßen Geschmack an, alles Anzeichen der eingetretenen Veränderung. Sobald eine herausgenommene Probe durch Jodlösung nicht mehr blau gefärbt wird, sondern klar bleibt, ist diese Umwandlung der Stärke eine vollständige.

Man läßt nunmehr den flüssigen Theil der Maische, von jetzt an Würze genannt, durch den Siebboden in den Grand, d. i. ein tiefer stehendes Behälter abfließen, von wo sie später nach der Siebpfanne gebracht wird.

Die rückständige Maische erhält in ähnlicher Weise einen zweiten Aufguss, der eine schwächere, zu leichtem Bier verwendete Würze liefert, während der dritte Aufguss einen so geringen Gehalt besitzt, daß er nur zur Verarbeitung auf Branntwein oder Esig, oder zur Eintheilung neuer Maische verwendbar ist.

Beim Decoctionsverfahren wird nachdem das Malzschrot eingeteigt ist, entweder ein Theil der Maische selbst in den Kessel gebracht, gelocht und wieder zurückgegeben in den Maischbottich, was man das Vidmaischofen nennt, oder man unterwirft die vom Maischbottich abgelassene Flüssigkeit dem Kochen und bringt sie wieder in denselben zurück (Lautermaischofen). Die Maische erhält hierdurch die zur Zuckerbildung erforderliche Temperatur. Es herrschen jedoch mannichfache Abänderungen in der Ausführung dieser Methoden.

Zum Durcharbeiten der Maische in den Maischbottichen dienen entweder Maischbölzer, Rührreite, die mit der Hand geführt werden, oder in größeren Brauereien mechanische Rührwerke, wie Fig. 4 ein solches zeigt, das in der Seckelmaier'schen Brauerei in München eingeführt ist. Durch einen hinreichenden Mechanismus drehen sich die beiden Flügelachsen g und h in entgegengesetzter Richtung, während zugleich durch eine langsame Umbrehung der Hauptachse c das ganze System in dem Maischbottich in Bewegung ist.

Die Infusionswürzen unterscheiden sich von den Decoctionswürzen durch einen größeren Gehalt an Milchsäure und werden leicht sauer; sie geben ferner leichter und rascher in Gärung über als letztere, bei welchen durch das Kochen die Einweissstoffe theilweise ausgeflockt worden sind und die sich vorzugsweise zu Lagerbieren eignen.

Wenn man die Würzen einfacht, so hinterläßt das sogenannte Malzextract, von brauner Farbe und süßlichem Geschmack, wie es gegenwärtig als Würzmittel häufig im Gebrauch ist. Seine Hauptbestandtheile sind Gummi und Zucker, welche beide leicht in Gärung in Alkohol sich überführen lassen. Je mehr Extract eine Würze liefert, desto gehaltreicher von demselben. Das Saccharometer (Zuckermess) setzt die Würze um so weniger tief ein, je größer der Gehalt ist, und seine Angaben dienen, um den Grad zu unterrichten über den Procentgehalt der Würze an Malzextract. Man rechnet für je 1 Liter Alkoholgehalt des Biers 2 Procent Extract an Würze, während ein anderer Theil des Extracts unverändert wiederfindet im Bier. Selbstverständlich erfordern starke Biere zu ihrer Erzeugung größere Würzen. Solche, bei welchen der Extractgehalt beträgt, der von 4—15 Procent in verschiedenen Bieren schwankt, werden substantiöse oder reichliche Biere genannt. Der Alkoholgehalt der letzteren beträgt 2—8 Procent, und man nennt solche Biere starke Biere. Soll daher z. B. ein Bier 10 Procent Extract und 4 Procent Alkohol enthalten, so muß die Würze vor der Gärung 16 Procent Extract an Saccharometer anzeigen.

Die vom dem Maischbottich klar abgegebene Würze wird nunmehr in die Braupfanne oder in den Braueßel gebracht, um gelocht und geklärt zu werden. Die Kochgefäße sind von Kupfer, und es sind die ersten vieredig und flach, die letzten gewölbt und tiefer. Von den vielerlei Formen Fig. 3 die eines Kessels, mit etwas einwärts gebogenem Boden, der widerstandsfähiger ist gegen den Druck der Flüssigkeit, und mit einer Gasabfuhr durch die Hähne b. Durch den Hahn c leitet die Lautermühle dem Maischbottich; e ist eine um den Kessel herum angeordnete Galerie.

Das Kochen der Würze bezweckt, dieselbe zu trüben, stärker zu machen, wobei sie zugleich eine tiefere Färbung annimmt. Im Verlauf desselben erfolgt eine weitere gebende Umbildung von Stärke in Zucker, was sich an der zunehmenden Süßigkeit der Würze erkennen läßt. Zugleich tritt die Separation derselben ein, worunter man das Gerinnen der Würze versteht, die sich in zwei Theile theilweise aufschließen, die sich abheben und wodurch das erzeugte Bier klarer wird. Endlich wird mit dem Kochen das Hopfen verbunden, indem auf 100 Pfund Biers 1 1/2—2 Pfund Hopfen zugegeben werden, der dem Biere Bitterkeit, Aroma und Farbe verleiht. Letzteres bewirkt der Hopfen seinen Gehalt an flüchtigem Öl und an Gerbstoffen, welche die Fersehung hemmen, und an Gerbstoffen mit Einweissstoffen der Würze verbunden sich zu fällen. Das Kochen mit Hopfen dauert etwa zwei Stunden, worauf letzterer durch Siebvorrichtungen entfernt wird. Die Würze nunmehr als gekochte Würze bezeichnet. Die Menge des Hopfenzusatzes und die Zeit des Kochens mit demselben richtet sich nach dem Geschmack der Biertrinker, nach der Stärke und der Brauzeit des Biers.

Schwache und für den Sommer bestimmte Biere müssen stärker gekocht werden, wemittels Jandbitteren Geschmacks verbunden ist. Stark gekochte Biere mit etwas weniger Hopfen kürzere Zeit gekocht, ein vollmundiges, süßes und aromatisches Bier.

Die im Vorhergehenden beschriebenen Verfahren des Eintheilens, Maischens, Kochens und Klärens der Würze, bei welcher die vorzunehmende Gärung

nen Brautessig über freiem Feuer geschieht, lassen auch durch Dampf bewirken, der vom Brautessig geleitet wird. Es ist hierzu ein continuirlicher Antrieb erforderlich, und Zahl, Stellung und Größe der Vorrichtungen sind so bemessen, daß sie einander die Hände arbeiten, wie wir dies mit Hülfe Fig. 5, die einen Dampfbrauerei vorstellt, äußern wollen. Wenn dieselbe im Gange ist, so befindet sich in dem Dampfessel A, der zugleich der Kessel ist, gehopfte Würze im Kochen; je nach Bedarf wird durch die sich verzweigenden Leitungsröhren der Dampf entweder in den Wasserbottich F, er in einen der drei nebeneinanderstehenden Maischtische, von denen nur der vorderste E sichtbar ist, er endlich in das Hopfenextraktionsgefäß B geleitet. Das erhitze Wasser macht seinen Weg von F nach den Maischbottichen; die in letztern nach und nach hinzugegebenen Würzen gehen der Reihe nach in das Gefäß B, um gehopft zu werden, gelangen in derselben Ordnung in den Kessel A und von diesem, sobald sie hinlänglich gekocht sind, auf die Kühlschiffe. Die Richtung des Dampfes wird durch die vorhandenen Ventile regulirt.

Wir schreiten nunmehr zur dritten Hauptoperation der Bierverzuckerung, zur Gärung, welche bezweckt, einen Theil des Zuckergehalts der Würze in Alkohol und Kohlensäure zu verwandeln. Erst hierdurch lösen sich im Bier alle seine charakteristischen Eigenschaften vereinigt; der Alkohol macht es lebend und erquickend, die Kohlensäure erfrischend, schäumend, es unversehrt Malzextract, aus Gummi und Zucker bestehend, macht das Bier substantiös oder sättigend, und der aromatische Bitterstoff des Hopfens gibt ihm den beliebten Hopfengeschmack.

Es ist zur Beurtheilung der Eigenschaften des Bieres und insbesondere seiner Behandlung und Aufbewahrung wohl zu beachten, daß dasselbe nicht wie der Wein ein fertig vergorenes Getränk ist, sondern daß derselbe nach der Hauptgärung stets noch nachgärungsfähige Bestandtheile übrigbleiben, welche die Nachgärung bewirken.

Die Gärung ist unstreitig einer der merkwürdigsten chemischen Zersetzungsprozesse; sie besteht der Hauptsache nach darin, daß Zucker,  $C_6H_{12}O_6$ , zerfällt wird in Alkohol ( $C_2H_5O$ ) und in Kohlensäure,  $2CO_2$ . Dieselbe vollzieht sich jedoch unter so eigenthümlichen Bedingungen und Nebenerscheinungen, wie dies bei keinem andern chemischen Vorgange der Fall ist, so daß sie lange Zeit als ein ungelöstes Räthsel aller Organe des Beobachters und allen Scharfsinns des Forschers herausforderte. Es beruht dies darauf, daß die Gärung neben der chemischen Zersetzung die Entwicklung pflanzlicher Organismen einherläuft und so, daß beide Vorgänge nothwendig sich bedingen. Die klare Erkenntniß dessen konnte daher nur durch das vereinte Studium des Chemikers und des Pflanzenphysiologen herbeigeführt werden, daß folgende Thatensachen festgestellt hat:

Eine Lösung von reinem Zucker in Wasser zerfällt weder von selbst, noch unter der Einwirkung der reichlichsten chemischen Agentien in Alkohol und Kohlensäure. Eine solche Zersetzung tritt jedoch alsbald von selbst ein, wenn Zucker gelöst ist in Flüssigkeiten, welche Gährungsstoffe enthalten, wie dies bei den natürlichen süßen Pflanzensaften, z. B. beim Trauben- und Apfel- sowie bei der künstlich erzeugten Bierwürze der Fall ist — ein bekannter Vorgang, den wir Gärung nennen.

Die Zersetzung solcher gärungsfähiger Flüssigkeiten ist jedoch nicht ein bei Temperaturen, die dem Gewässer-Atlas. 2. Aufl. — Chemische Technik.

frier- und Siedepunkt des Wassers sich nähern auch nicht in sehr zucker- oder alkoholfreien Flüssigkeiten und in solchen, die Stoffe enthalten, welche lebenden Körpern sich giftig erweisen. Die Gärung unterbleibt ferner, wenn eine gärungsfähige Flüssigkeit gekocht und noch heiß abgeseiht wird von der Luft; ja sie gärt auch selbst dann nicht, wenn man Luft zu ihr treten läßt, die durch ein Baumwolle enthaltendes oder durch ein glühendes Rohr gestrichen ist. Die also behandelte Flüssigkeit geräth jedoch in Gärung, sobald sie erkalte einige Zeit mit gewöhnlicher Luft in Berührung ist.

Aus gärenden Flüssigkeiten, die Gährungsstoffe enthalten, scheidet sich im Verlauf der Gärung sogenannte Hefe aus; dieser Schlämmerzweig, unter dem Mikroscop betrachtet, als aus kleinen, zu den einfachsten Pilzformen gehörenden Pflanzengebilden bestehend, welche den Namen Hefenpilze oder Gärungspilze, *Saccharomices cerevisiae*, führen. Zu deren Lebensverrichtungen gehört die Aufnahme von Zucker und die Ausscheidung von Alkohol und Kohlensäure.

Die Zellwand der Gärungspilze ist hinsichtlich ihrer chemischen Zusammensetzung der Stärke und dem Zucker sehr ähnlich; ihr Zellinhalt ist dagegen, wie der aller Pflanzen, stickstoffhaltig. Die Hefenpilze können daher, in eine Zuckertlösung gebracht, zwar leben und deren Gärung hervorruhen, allein sie können sich darin nicht vermehren. In einer Flüssigkeit wie die Bierwürze, in der außer Zucker noch stickstoffhaltige Gährungsstoffe sich befinden, wirken die Pilze nicht nur als Erreger oder Ferment der Gärung, sondern sie vermehren sich auch und erzeugen Hefe.

Die niederen Pflanzen, zu welchen die Hefenpilze gehören, pflanzen sich fort durch sogenannte Keimsporen, welche unsichtbar klein sind. Die Luft enthält stets solche Keime, die überall hingelangen und sich da entwickeln, wo sie günstigen Bedingungen begegnen. Hieraus erklärt sich, daß eine gärungsfähige Flüssigkeit, nachdem sie gekocht und von der Luft abgeschlossen worden ist, nicht in Gärung geräth; die in ihr vorhanden gewesenen Keime oder Pilze sind durch die Hitze getödtet worden, neue Keime können nicht hinzutreten. Was das Pflanzenleben hindert — Kälte, Hitze, Gifte — verhindert auch die Gärung. Läßt man die zutretende Luft durch Baumwolle streichen, so hält diese die Keime zurück; streicht sie durch ein glühendes Rohr, so verbrennen die Keime und die Gärung unterbleibt in beiden Fällen.

Solange noch in einer Flüssigkeit Zucker und Gährungsstoffe nebeneinander vorhanden sind, tritt unter günstigen Umständen Gärung in derselben ein.

Nur auf Grund vorstehender Thatfachen läßt sich Einsicht gewinnen in die Gärungsercheinungen, welche bei der Erzeugung aller geistigen Flüssigkeiten, des Weins, des Biers, des Brantweins und des Alkohols auftreten.

Damit die heiße gehopfte Würze in Gärung übergeführt werden kann, muß dieselbe vor allen Dingen in ihrer Temperatur erniedrigt oder die Kühlung der Würze vorgenommen werden. Es ist nothwendig, daß diese Operation rasch vor sich geht, da die Würze sehr geneigt ist, sauer zu werden, d. h. aus der geistigen in die Essiggärung überzugehen. Zu diesem Zweck läßt man dieselbe auf flache hölzerne Stufen, Kühlschiffe genannt, von großem Flächeninhalt laufen, sobald sie darin nur 4—6 Centimeter hoch steht und je nach Art des zu brauenden Biers auf 9—4° R. sich abkühlt. Dabei verdunstet noch ein beträchtlicher Theil des Wassergehalts der Würze, und es setzt sich aus ihr als Kältegelager noch etwas in Flocken geronnenes Eiweiß ab.

Da eine rasche Kühlung der Würze sich nur in den Herbst- und Frühjahrsmonaten bewirken läßt, so werden erstere zu Darstellung des sofort in Verbrauch genommenen Winterbiers, letztere für die Sommer- oder Lagerbiere verwendet. Ueberdies sucht man durch Aufstellung der Kühlschiffe an hohen, zugigen Stellen, durch künstlich erzeugten Zug vermittels Flügeln, durch Anwendung eiserner Kühlschiffe, die Kühlung zu beschleunigen. Endlich hat man sich durch die Einführung künstlicher Kühlung vermittels kalten Wassers und vornehmlich des Eises fast ganz von der Jahreszeit emancipirt, so daß in größeren Brauereien der Betrieb ununterbrochen neun Monate dauert.

Wir sehen in Fig. 6 eine künstliche Kühlvorrichtung im Grundriß; sie besteht aus einem flachen kupfernen Kasten aa, in welchem ein Schlangenrohrsystem bb liegt; in dieses tritt bei b kaltes Wasser ein, das bei c erwärmt ausfließt, weil es die Wärme der Würze aufnimmt, die, bei A in das Kühlgefäß eintretend, durch die Scheidewände cc genöthigt wird, das ganze Rohrsystem zu passieren, so daß sie bei b gekühlt den Apparat verläßt.

Die gekühlte Würze wird in den Gärteller geleitet, ein reinlich gehaltenes Erdgeschloß, dessen Temperatur nicht unter 5 und nicht über 12° K. betragen darf. Auf einem Lager stehen die offenen Gärtöttchen, deren Größe und Anzahl sich nach der des Betriebs richtet. Sie dienen zur Aufnahme der Würze, welche zur raschern Einleitung der Gärung durch einen Zusatz von 5—6 Maß dicker Hefe auf 1000 Maß Würze, wie man sagt, angestellt und über der im Bottich ein Steigraum belassen wird, da sie während der Gärung sich hebt. Letztere beginnt nach 8—12 Stunden einzutreten, indem ein zarter weißer Schaum oder Rahm ihre Oberfläche überzieht; nach 24 Stunden zeigt sich das Kränzen, indem die Schaumdecke durchbrochen wird und die Oberfläche der Würze ein geträufeltes, zackiges Ansehen erhält, das sich nach zwei bis vier Tagen verliert und nur eine bräunliche dünne Decke zurückläßt.

Diese Hauptgärung dauert 7—10 Tage; mit ihrer Lebhaftigkeit steigt die Temperatur der Würze um einige Grade und sinkt wieder; ihr süßer Geschmack und ihr specifisches Gewicht vermindern sich in gleichem Grade. Erleidet letzteres keine weitere Abnahme, so ist die Hauptgärung vollendet, das Bier ist säßig, d. h. reif, um aus Fässer gegossen und der Nachgärung überlassen zu werden. Dasselbe wird durch einen oberhalb des Bodens befindlichen Spinn abgezogen von der Hefe, die im Verlauf der Gärung sich unten abscheidet und daher Unterhefe genannt wird. Nur die mittlere, gelbe und sehr dicke Schicht derselben wird als brauchbar hinweggenommen und aufbewahrt. Von dieser Ausschleibungssart der Hefe hat der beschriebene Verlauf der Gärung den Namen der Untergärung erhalten. Die hierbei erzeugten Hefenpilze bestehen aus vereinzelten Zellförmigen von  $\frac{1}{10}$  Mikrometer Durchmesser. Die Untergärung findet auf alle nach bairischer Art gebrauten Schanz- und Lagerbiere Anwendung.

Die Obergärung hat daher ihren Namen, daß bei dem raschern und fräftigeren Verlauf derselben die entweichende Kohlensäure größere Bläschen bildet, welche die Hefe mit sich in die Höhe nehmen, so daß sie nicht am Boden sich ansammelt. Sie kommt in Anwendung bei den leichten Weißbieren in Norddeutschland, ferner bei den belgischen und englischen Bieren, und zeichnet sich aus durch ihren raschern, in zwei Tagen vollendeten Verlauf, der durch höhere Temperatur des Gärtraums und durch Anstellen mit Oberhefe bewirkt

wird. Letztere erhebt sich mit einem gewöhnlichen Schaum, der eine hohe Schaumdecke oder einen Schaumberg bildet, daher denn bei der Obergärung in bedeutender Steigraum beim Füllen der Gefäße zu lassen werden muß. Nach Vollendung der Gärung sinkt der Schaum zusammen und hinterläßt die Hefe in Gestalt einer gelblichen, krümeligen Schicht, besteht, unter dem Mikroskop betrachtet, aus langen zu Schnüren gereihten Hefenpilzen.

Sowol das obergärige als auch das untergärige Bier enthält noch eine gewisse Menge von Zucker und Gärstoff, wodurch die in den Lagerfässern eintretende und ebenso verlaufende Nachgärung tritt. Die hierbei entwickelte Kohlensäure vergrößert den Theil im Bier und verleiht ihm seine wichtigsten Eigenschaften — den erfrischenden Geschmack und die Fähigkeit des Schäumens. Es ist von der Wichtigkeit, die Biere auf dem Höhepunkt der Gärung in Gebrauch zu geben, da mit der Dauer und dem gänzlichen Verlust der Kohlensäure der gehaltvollste Bier fade und geschmacklos wird. Durch die Einrichtung der Lagerräume für das Bier ist auch die Haltbarkeit des Biers, das eine große Neigung hat zur Essigsäuregärung, hiermit sauer und unbrauchbar zu werden, widerstanden, welche die aus maltrirten und gehopften Würzen erzeugten untergärigen Biere wesentlichste Bedingung für ihre längere Aufbewahrung ist jedoch eine möglichst niedrige, 4—5° K. haltende Temperatur, die man durch Kellerteller, insbesondere mit Zugabe von Eis, zu erreichen sucht. In England, wo die Sommertemperatur nicht die Höhe der Continente erreicht, begegnet man dem nachtheiligen Einfluß der Wärme und des Luftzutritts durch eine größere Größe der aufrechten stehenden richtiger als Lagerthürme zu bezeichnen. In in oberirdischen Hallen oder Magazinen, bei Temperatur 12° K. beträgt, deren Einfluß ein großes Quantum Bier sich vertheilt und merklich wird.

Die Güte des Biers wird nicht leicht seinen Gehalt an den verschiedenen Bestandtheilen, sondern es kommen hierbei Geschmack, Liebhaberei mit in Betracht. Während es ein leichtes, gar nicht oder nur schwach gebitterte Biere vorgezogen werden, während andere anderwärts stark, substantiös und dem Hopfengeschmack; die unter dem Namen und Lambda bekannten belgischen Biere, allen Trieb, schmecken hart, säuerlich, und daran gewöhnt sein, um sie genießbar zu machen, von den berühmten englischen Bieren ist nicht jedermanns Sache, während die Anerkennung findet. Letztere haben auch bairischen und österreichischen, insbesondere Biere sich erworben, die im In- und Auslande fortwährend gesteigerten Verbrauchs sich erfreuen. Je mehr Extract das Bier enthält, und voller erscheint es auf der Zunge, und desselben schwankt zwischen 4—15 Procent unterscheidet man extractreiche, vollköstliche von den extractarmen, dünnen und wässrigen, die, wenn sie einen größeren Alkoholgehalt besitzen, weinartig sind. Letztere betragen 2—8 Procent.

Von dem Gehalt an Kohlensäure schwankt die Stärke des Schäumens ab. Aus dem



ere heißen Weißbiere; dunklere, aus Dattmalz  
haltene werden Braundbiere genannt; die gehop-  
ften heißen Bitterbiere, die ungehopften Süßbiere,  
mit Bockgeschmack behafteten Bockbiere.  
Zur Vergleichung des Gehalts verschiedener Biere  
den wichtigsten Bestandtheilen dient folgende Tafel:

| Namen der Biere           | Procente an |         |
|---------------------------|-------------|---------|
|                           | Extract     | Alkohol |
| London-Ale, gewöhnliches  | 5—4         | 4—5     |
| London-Ale, zum Export    | 7—5         | 6—8     |
| London-Porter, zum Export | 7—6         | 5—6     |
| Brüsseler Lambid          | 5—3         | 4—6     |
| Wairisches Bier           | 6—4         | 3—4,5   |
| Berliner Weißbier         | 6,2—5,7     | 1,8—2.  |

## 2. Branntweinbrennerei und Spiritusfabrikation.

Branntwein und Spiritus oder Weingeist werden durch Destillation aus gegorenen Flüssigkeiten gewonnen und sind Gemische von Alkohol und Wasser, wie geringen Mengen anderer bei der Gärung sich lösender flüchtiger Stoffe. Man nennt ein solches Product Branntwein, wenn es 40—50 Massprocente Alkohol enthält und unmittelbar als Getränk dient. Der Spiritus enthält über 90 Procent Alkohol und hat eine ausgedehnte technische Verwendung als Brennmaterial, als Firnisse, zur Essigsäurefabrikation, zur Darstellung chemischer und pharmaceutischer Präparate, zur Conser- vierung u. s. w.

Spiritus, der von den begleitenden riechenden Stoffen möglichst befreit worden ist, heißt gereinigter Spiritus oder Sprit und wird als Zusatz zu Wein, Bier, Liqueuren und zu Parfümerien verwendet.

Würde zur Gewinnung dieser beiden alkoholhaltigen Flüssigkeiten lediglich reiner Zucker verwendet, so könnten sie nur Alkohol und Wasser enthalten. Allein es werden Branntweine erzeugt aus den verschiedensten oder: oder stärkehaltigen Naturproducten, die bei der Gärung neben Alkohol noch riechende Stoffe bilden, welche dem Destillat sich beimischen und ihm einen eigenthümlichen Geruch und Geschmack verleihen, den man Aroma nennen, wenn er angenehm, und Fäul, wenn er widerlich ist. Die Branntweine erhalten daher, je nach ihrer Abkunft, besondere Namen, wie Weizen-, Heidelbeer-, Himbeer- und Kirschbranntwein oder Kirschwasser, Frucht- oder Kornbranntwein der Whisky, Kartoffelbranntwein oder Schnaps; Cnabrantwein, Arac oder Reisbranntwein, Rum, der aus Zuckermelasse, und Cognac, der durch Destillation aus dem Wein gewonnen wird, u. a. m.

Die Branntweinbrennerei, früher durch die von der örtlichkeit hervorgebrachten Naturproducte bedingt und als Nebengeschäft der Landwirtschaft betrieben, hat nun Rang einer großen Fabrikation angenommen, seitdem man in der Kartoffel eine Culturpflanze kennen lernte, die jede andere übertrifft in der massenhaften Erzeugung von Stärke. Wie Stärke in Zucker und weiter in Alkohol verwandelt wird, wurde bei der Fabrikation des Biers (S. 31 u. 33) bereits eingehend besprochen, weshalb wir uns hier auf die Beschreibung niger Apparate beschränken können.

Noch sei bemerkt, daß auch die Branntweinbrennerei aus Kartoffeln mehr und mehr aus dem landwirthschaftlichen Betrieb verschwindet und der Spiritusfabrikation erliegt, wo nicht örtliche Verhältnisse sie begünstigen. Es beruht dies vornehmlich darin, daß er nur 10 Procent Wasser enthaltende Spiritus eine am Transport geeignete Handelswaare ist als Branntwein, der 50—60 Procent Wasser enthält, für

welches bei Versendungen die Fracht zu bezahlen ist. Es empfiehlt sich daher meistens, Spiritus zu beziehen und denselben erforderlichenfalls durch Zusatz von Wasser auf Branntwein zu verdünnen.

Aus der chemischen Zusammensetzung des Zuckers läßt sich berechnen, daß bei der Färbung desselben in Alkohol und Kohlensäure aus 100 Gewichtstheilen Zucker 53,8 Gewichtstheile Alkohol entstehen müßten. Allein in Wirklichkeit wird diese Menge nicht ganz gewonnen; man kann annehmen, daß der Zucker die Hälfte seines Gewichts Alkohol gibt, sobald also für 2 Kilo in Gärung gebrachten Zuckers 1 Kilo Alkohol in die Flüssigkeit kommt. Es beruht dies darauf, daß Alkohol und Kohlensäure allerdings die Hauptproducte der Gärung sind, daß jedoch 4—5 Procent Zucker derselben entgehen und andere Producte bilden, nämlich Bernsteinsäure, Glycerin und die sogenannten Weindele und Fäulstoffe.

Die Branntweinbrennerei aus Kartoffeln zerfällt in drei Operationen, in das Maischen, in die Gärung und in die Destillation. Das Maischen bezweckt, vermittels eines Zusatzes von Malz zu Kartoffelmehl dessen Stärke durch die Einwirkung von Diastase in Stärkezucker überzuführen. Zu diesem Zweck müssen die Kartoffeln gewaschen, in Dampf gelocht und zerrieben werden, wozu mancherlei mechanische Vorrichtungen in Anwendung kommen. Taf. 8, Fig. 7 zeigt eine solche. Der trichterförmige Behälter A steht in einem Fasse, in welches Dampf eingeleitet wird, der die Kartoffeln weich löst; durch Umbrehung der sechsantigen Walze c in dem Ansaß C gelangen die Kartoffeln nach und nach in das formliche Reibwerk B, in welchem die mit Flügeln b b und Reibstößen h h... ausgestattete Achse a a unter Zutritt von Wasser sich umdreht, die Kartoffeln in Brei verwandelt und diesen durch die Löcher drückt, während die Schalen zurückbleiben.

Die zerriebene Kartoffelmasse kommt mit einem Zusatz von etwa 5 Procent Malzschrot auf die Maischbottiche und wird zur Zunderbildung auf die Temperatur von 50° R. gebracht. Hierbei verflüssigt sich der größere Theil der breiigen Masse alsbald, während die dicker Klumpen verbleiben und der Zunderbildung widerstehen. Zur Beseitigung dieses Mißstandes gibt man die Masse in den Apparat ABCD (Fig. 8) im Euerzchnitt. Der dünne Theil läuft ab, während durch Umbrehung der Kurbel G die Regelwalze I in Bewegung gesetzt wird, die alle vorhandenen Klumpen zerquetscht und durch den Siebboden drückt.

Nach vollendeter Zunderbildung wird die Maische durch einen Zusatz von Hefe in Gärbottiche bei etwa 14° R. zur Gärung angesetzt, die in 48 Stunden vollendet ist, worauf man zur Destillation schreitet.

Eine jede Destillation beruht darauf, daß in dem Destillirgefäß eine Flüssigkeit durch Wärme in Dampf verwandelt wird, der aufsteigt und durch nachfolgende Dämpfe weitergeschoben wird, bis er an einen kühleren Theil des Apparats, die Kühlvorrichtung, gelangend, sich wieder zu Flüssigkeit verdichtet, die nach einem zur Aufnahme dienenden Behälter, Vorlage genannt, abfließt. Man vermag also vermittels der Destillation Stoffe, die flüchtig sind, d. h. die sich bei einer bestimmten Temperatur in Dampf verwandeln, zu trennen von solchen, die nicht flüchtig sind, oder von solchen, die weniger flüchtig sind. Letzteres ist der Fall bei der Destillation des Branntweins aus Maische, die Alkohol enthält, der bei 63° R. siedet und daher beträchtlich flüchtiger ist als das gleichzeitig vorhandene Wasser, das erst bei 80° R. siedet.

Wenn daher Maische erhitzt wird, so entwickelt sich

vorerst und am reichlichsten Dämpfe von Alkohol. Allein dies hindert nicht, daß zugleich Wasserdampf sich bildet und mit abzieht. Der Erfolg ist, daß die überdestillierte Flüssigkeit, Destillat genannt, ein Gemisch von Alkohol und Wasser ist, daß ersterer im Anfange der Destillation vorwaltet, im Verlauf derselben mehr und mehr abnimmt, bis zuletzt der Dampf gar keinen Alkohol mehr enthält, sondern nur noch Wasser liefert. In diesem Zeitpunkt ist die Destillation vollendet, und er gilt als erreicht, wenn von dem Quantum der zur Destillation eingegebenen Maische ein Drittel überdestilliert ist. Außerdem läßt sich dieser Vorgang verfolgen mittels eines dafür eingerichteten Aräometers, das Alkoholometer, Spiritus- oder Branntweinwaage genannt wird, eine Glasröhre, die um so tiefer einsinkt, je reicher das Gemische an Alkohol ist.

Der einfachste, im kleinen Betrieb hier und da noch gebräuchliche Branntwein- oder Brennapparat besteht aus einer Destillirblase von Kupfer, auf deren weite Oeffnung nach Einbringung der Maische der Helm oder Hut aufgesetzt wurde, dessen Schnabelrohr in das gewundene Schlangenrohr mündet. Dieses steht in einem mit kaltem Wasser gefüllten Kühltisch (Kühltonne) und leitet die verdichtete Flüssigkeit in ein als Vorlage dienendes Gefäß. Die früher übliche Heizung mit freiem Feuer ist fast gänzlich durch Dampfheizung verdrängt, die insbesondere den Vortheil gewährt, daß sie das Anbrennen der Maische verhindert. Von den zahllosen Abänderungen, welche in Größe und Einrichtung des Brennapparats vorkommen, zeigt uns Fig. 9 eine Destillirblase, deren Seitenwand von Holz ist, während Helm und Bodentisch aus dünnem Kupferblech bestehen, mit eingeführtem Dampfrohr. Sie empfiehlt sich durch ihre Wohlfeilheit.

Das von der Maische abdestillierte Drittel enthält durchschnittlich 21 Procent Alkohol und wird Lutter genannt. Aus demselben wird der Branntwein dargestellt, indem man den Lutter der Rectification, d. h. einer nochmaligen Destillation unterwirft und das zwischen 40—50 Procent Alkohol enthaltende Destillat gesondert auffängt. Der alkoholarme Rückstand heißt Phlegma.

Die in der Blase verbleibenden Maischrückstände dienen unter dem Namen von Schlempe oder Spülschlamm als Viehfutter.

Das in der Maische entstehende Kartoffelfuselöl (oder Amylalkohol  $C_2H_5O$ ) siedet erst bei  $132^\circ R$ ; es ist im ersten Theil des Destillats nur wenig davon vorhanden, sondern tritt hauptsächlich gegen das Ende der Destillation auf, daher das zuletzt gesammelte den widerlichen Fuselgeruch und Geschmack in hohem Grade besitzt.

Die Spiritusfabrikation auf der heutigen Entwicklungsstufe bezweckt, sofort direct aus der Maische eine Flüssigkeit zu erzielen, die 85—90 Maßprocente Alkohol enthält, und zwar mit dem geringsten Aufwand an Zeit und Brennstoff. Die hierzu befolgten zwei Hauptmethoden, die Rectification und Dephlegmation beruhen auf folgenden Grundsätzen: Wenn eine alkoholhaltige Flüssigkeit — z. B. Maische — erhitzt wird, so verwandelt sich vor allem der flüchtigere Alkohol in Dampf, dem sich nachträglich mehr und mehr Wasserdämpfe beinengen; die bei jeder Destillation zuerst auftretenden Dämpfe sind daher stets alkoholreicher als die nachfolgenden. Läßt man nun die aus der Destillirblase abziehenden Dämpfe nicht direct in die Kühlvorrichtung geben, sondern durch eine alkoholhaltige Flüssigkeit, so nehmen sie aus letz-

terer Alkohol auf und werden alkoholreicher. Enthält sich dieser Vorgang mehrmals, so nimmt der Dampf an Alkoholgehalt fortwährend zu, man nennt denselben die Rectification und die dazu dienenden Vorrichtungen Rectificatoren.

Auch bei der Dephlegmation werden die aus der Blase aufsteigenden alkoholhaltigen Dämpfe sofort vollständig verdichtet, sondern genöthigt, längeren Weg durch den Dephlegmator zu legen, in welchem ein Theil derselben sich zu flüssiger Flüssigkeit verdichtet, die wieder in die Blase zurückfließt, während alkoholreicherer Dampf weiter geht. Der Regel werden bei der Spiritusfabrikation verschiedene Vorrichtungen verbunden, wie dies bei dem Apparat von Bistorius (Fig. 10) der Fall ist.

Wenn derselbe in Betrieb gesetzt ist, sind die Blasen A und B sowie der Vorwärmer C mit einer alkoholhaltigen Flüssigkeit gefüllt. In A entwickelte Dampf erhebt sich in dem Vorwärmer C, tritt in die in B befindliche Maische ein und gelangt bereichert an Alkohol in das Helmrohr I seitwärts abgehende Knieleit. Der obere Theil s des letztern geht durch den Vorwärmer C, der den Vorwärmer C umgibt. Aus s tritt der Dampf in eine Vorlage von C besetzte ringförmige Kanne II und tritt nach unten abwärts zu steigen, wobei ein Theil der Flüssigkeit sich verdichtet. Die alkoholhaltigen Dämpfe verbreiten sich in dem engen Raum zwischen C und C' und gehen durch die Kanne v, v, die sich bei v vereinigen, in den Dephlegmator D, wo sie durch die Schale e nach unten abwärts zu fließen, sich auszubreiten. Die Dämpfe C' sowohl, als auch die von D, unten durch s oben durch aufgegossenes Wasser abgeköhlte, dephegmirend auf den durchstreichenden Kühlrohr e erforderlichenfalls noch ein zweites mal in solches Becken paßirt und zuletzt mit einem Alkoholgehalt von 85—90 Procent durch das Rectificator abzieht.

Indem also der von A ausgehende Dampf in B, so bald als die in C verdichtete alkoholhaltige Flüssigkeit sich durchstreichend, zweimalige Rectification statt, während in D und den etwa nachfolgenden Becken eine Dephlegmation sich vollzieht. Aus C tritt die erwärmte Maische durch γ und den Hahn a abgelaßen und von da durch Aufziehen des Hahns i nach der Blase A. Letztere wird durch die Zeichnung nicht sichtbares Bodenschlamm entleert. Wenn, wie dies hier der Fall ist, mit directem Feuer beheizt wird, so dienen die Werke f und h zur Verhinderung des Anbrennens der Maische.

Reinigt man den Probegahn d, so geht der Dampf aus der Blase A direct in den kleinen Vorwärmer aus dem Gehalt der verdichteten Flüssigkeit man Fortschritt und Ende der Destillation.

In dem mit Dampf betriebenen Stillstand von Bistorius (Zaf. 10, Fig. 1) bezeugt der der im Vorhergehenden beschriebenen Apparat nur in veränderter Aufstellung, jedoch in der Einrichtung zur Erklärung genügt, da obendrein die Pfeile die Bewegung und Richtung der Dämpfe veranschaulicht wird.

A erste, B zweite Blase; C erster Vorwärmer für die Maische, die durch a a eingelassen wird; E, F, G drei Dephlegmatoren, aus deren letztem der Alkohol Dampf durch Kühlfaß geht; durch ee tritt aus dem Destillat

eise Wasserdampf in die Blase A; die Ansätze n und des Warnwassertröhrs dienen zum theilweisen oder anzen Ablassen des erwärmten Wassers über den Vephelegmatoren; die Zuleitung des kalten Wassers ist ege lassen; die Nitrore o leiten den in den Beden c ansammelnden Lutter durch das Rohr pp zurück den ersten Vephelegmator; w sind sogenannte Mann- cher zum Reinigen der Blasen; durch d wird die echempe entleert; s ist ein Probehahn.

Wie mannichfach auch die Abänderungen in den elen zur Spiritusfabrikation dienenden Apparaten in mögen, so beruhen doch alle im wesentlichen auf m vorstehend erläuterten Grundrissen und Einrich- ungen, wie insbesondere die in Frankreich und Belgien blichen Rectificationscolonnen.

### 3. Essigfabrikation.

Die Essigfabrikation bildet eine Fortsetzung der reugung von Branntwein und Spiritus, und findet ch daher öfter in Verbindung mit dieser Industrie. as wir Essig nennen, ist der Hauptsache nach ein emenge von mindestens 2 und von höchstens 10 Pro- nt Essigsäure ( $= C_2H_4O_2$ ) mit Wasser. Es gibt weierlei Bildungsweisen der Essigsäure, erstlich die urch trodene Destillation des Holzes, welche den so- enannten Holzessig liefert, und die zweite, bei wel- er Alkohol durch Aufnahme von Sauerstoff in Essig- ture übergeht. Der Holzessig ist wegen seines Ge- als an empyreumatischen oder brennlichen Stoffen u Speisen nicht geeignet und wird in der Technik verwendet. Aber in unsern Haushaltungen verbrauchte Essig ist auf letztere Art gewonnen worden. Der Vorgang hierbei ist folgender. Sauerstoff, der auf Alkohol ( $C_2H_5O$ ) einwirkt, entzieht demselben 2 Atome Wasserstoff und bildet mit demselben Wasser ( $H_2O$ ) nd eine flüchtige Verbindung, sogenannten Aldehyd ( $C_2H_4O$ ), was sich durch folgende Formeln veran- schaulichen läßt:  $C_2H_5O + O = H_2O + C_2H_4O$ . Der letztgenannte Körper geht durch weitere Einwir- ung von Sauerstoff, von dem er 1 Atom aufnimmt, ber in Essigsäure:  $C_2H_4O + O = C_2H_4O_2$ . Bei diesem Vorgang entstehen aus 100 Pfd. Alkohol, un- er Aufnahme von 69 Pfd. Sauerstoff, 130 Pfd. Essigsäure.

Die Umwandlung von Alkohol in Essigsäure geht doch nur unter besondern Bedingungen vor sich. Es t bekannt, daß weder Spiritus noch Branntwein von lbt sich in Essig verwandeln und sauer werden. er Sauerstoff bedarf, um dies zu bewirken, eines ermittlers. Ein solcher ist höchst fein vertheiltes latin, sogenannter Platinmoir. Gießt man in n Trinktglas etwas Spiritus und stellt 1 Centimeter och über denselben ein Schälchen mit Platinmoir, orauf man die Vorrichtung bedeckt, so erkennt man on nach einigen Minuten durch den Geruch, daß ledehyd und Essigsäure sich gebildet haben, deren enge zunimmt, bis der Alkohol völlig in letztere erwandelt ist. Man nimmt an, daß der Platinmoir n Sauerstoff der Luft verdichtet, der alsdann kräf- ger auf den Alkoholdampf einwirkt. Diese Methode rd jedoch zur Fabrication von Essig nicht angewen- t und hierzu vielmehr ein Weg eingeschlagen, der siggärung genannt wird, wegen der Aehnlichkeit, ie er mit der Entstehung des Alkohols aus Zuder urch die Gärung hat.

Wir wissen aus Erfahrung, nicht selten zu unserm ickruß und Schaden, daß Wein, Bier und zuder- altige Säfte sauer werden. Beobachtet man z. B. en Weinrest, der in einer Flasche stehen geblieben t, so beginnt derselbe nach einiger Zeit sich zu trü-

ben, er wird, wie man am Rhein sagt, kahnig, d. h. auf seiner Oberfläche erscheint ein weißlicher Schimmel, und alsbald macht sich durch Geruch und Geschmack bemerklich, daß der Wein in Essig verwan- delt ist; ganz ähnlich ist der Vorgang beim Bier. Jener Schimmel ist aber nichts anderes als ein mi- kroskopischer Pilz, der sogenannten Essigpilz, Myco- derma aceti, zu dessen Lebensfunction es gehört, die Uebertragung des Sauerstoffs der Luft an Alkohol zu vermitteln und diesen in Essigsäure zu verwandeln. Alle Ursachen, welche die Entwidlung und das Leben dieses Essigpilzes verhindern, dienen daher auch zur Verhinderung der Essiggärung, ganz ähnlich, wie dies bezüglich der Hefenpilze bei der Alkoholgärung erläu- tert worden ist. Je reicher eine Flüssigkeit ist an Alkohol, desto stärker Essig liefert sie, doch ist zu be- merken, daß die Essigbildung nicht vor sich geht, wenn dieser Gehalt mehr als 12 Procent beträgt; es ist zum Eintritt derselben ferner eine Temperatur von 18—30° R. erforderlich. Je mehr dieselbe den letzt- genannten Grad erreicht und je mehr Luft zur essig- bildenden Flüssigkeit hinzutritt, um so rascher vollzieht sich deren Umwandlung in Essig.

Nach diesen Vorbemerkungen gehen wir über zur Essigfabrikation, für die es zwei Hauptmethoden gibt, die ältere oder langsame Methode und die neuere oder Schnelleßigfabrikation.

Das einfachste Beispiel der Gewinnung von Essig auf erstgenanntem Wege ist zugleich die ursprüngliche Methode, indem man Wein in Säuerung übergehen läßt. Das Product heißt Weinessig, und da es die aromatischen Bestandtheile des Weins enthält, so gilt es als die vorzüglichste aller Essigsorten. Hierzu ist jedoch zu bemerken, daß schwache und saure Weine, die arm sind an Alkohol und Zuder, unmöglich einen kräftigen Essig liefern können und daß feinere und starke Weine heutigentags zu theuer sind, um zur Essigbildung mißbraucht zu werden. Dagegen wird mitunter in Süddeutschland noch der Hauseßig be- reitet. Man findet da auf dem großen Rachelefen ein Fäßchen liegend, mit offenem Spunt und etwas über halb gefüllt mit Essiggut. Als letzteres dienen Reste von Wein, Obstwein und Bier, trüber Wein, Branntweinelutter, die gelegentlich aufgefaßt werden und in Essig übergehen, der sich klärt und durch einen in halber Höhe des Bodens befindlichen Hahn abge- lassen wird.

Die in großem Maßstabe ausgeführte langsame Essigfabrikation führt wol auch den Namen der Essig- siederei oder Essigbrauerei, da die Verarbeitung ganz in denselben Operationen besteht, die zur Verei- tung einer Würze erforderlich sind, nämlich im Malzen von Getreide, Einmischen desselben mit Zusatz von Kartoffelmehl, Erhitzen der Maische zur Zunderbildung und Abziehung einer möglichst starken, zuderhaltigen Würze, welche zur Gärung angestellt, eine weinartige Flüssigkeit, Malzwein, auch Essiggut genannt, lie- fert, die durchschnittlich 4,4 Procent Alkohol enthält.

Die Ueberführung derselben in Essig geschieht in der Essigtube, einer heizbaren Localität, in der je nach Größe des Betriebs 30—100 und mehr Essig- bildner lagern, nämlich Fässer, die zu drei Viertel angefüllt werden. Der Zutritt der Luft ist durch den offenen Spunt gestattet, und bei einer durchschnittlichen Temperatur von 20—24° R. ist die Essigbildung in sechs bis zehn Wochen vollendet. Sie läßt sich noch beschleunigen, wenn beim Beginn dem Essiggut etwas fertiger Essig zugeetzt und die Temperatur bis gegen 30° R. gesteigert wird.

Seitdem die Spiritusfabrikation aus Kartoffeln eine



neuerte, wenn auch weniger hohe Prämie durch den auf die Einfuhr des Zuckers gelegten Zoll. Dieselbe besteht noch heute als wesentliche Bedingung für die einheimische Zuckererzeugung, denn während in Deutschland sowohl der eingeführte Rohrzucker als auch der Rübenzucker durchschnittlich pro Pfund 6 Groschen kostet, beträgt der Preis desselben in England 3 bis 4 Groschen, da dort der Colonialzucker zollfrei eingeht.

Die Rübenzuckerfabrikation entwickelte sich vorzüglich wieder im nordwestlichen Frankreich, wo Arras und Lille ihre Mittelpunkte bilden. In Deutschland gewann sie Ausdehnung besonders in der preussischen Provinz Sachsen, in Braunschweig und Anhalt, während in Süddeutschland nur eine einzige Fabrik von hervorragender Bedeutung sich behauptet hat. Es fehlte nämlich auch in späterer Zeit keineswegs an Krisen für diese Industrie. Mit der steigenden Production des inländischen Rübenzuckers mußte eine entsprechende Verminderung des Eingangszolls für Colonialzucker eintreten, und der Staat suchte diesen Ausfall seiner Einnahmen zu decken durch Besteuerung der Zuckerrfabrikation. In der That wurde dieselbe von anfänglich  $\frac{1}{2}$  Groschen für den Centner verarbeiteter Rüben seit 1840 allmählich auf  $7\frac{1}{2}$  Groschen gesteigert und dürfte hiermit ihre Grenze noch nicht erreicht haben. Im Jahre 1867, wo 43,5 Mill. Ctr. Rüben verarbeitet wurden, war der Ertrag der Rübensteuer 12 Mill. Thlr. Die Gesamtproduction von Rübenzucker in Europa betrug 14 Mill. Centner, wovon auf Deutschland nahezu 4 Mill. Centner kommen.

Diese Belastung der Fabrikation konnte nur ertragen werden durch eine vervollkommnete Methode in der Zuckergewinnung, und hier ist es, wo die Fortschritte in der Chemie sowie die Zuziehung physikalischer und mechanischer Hilfsmittel das Einhalten der Wage ermöglichen. Andererseits hatten entsprechende Verbesserungen im Anbau der Rübe mitgewirkt zur Erreichung und Einhaltung dieses Ziels.

Hiermit sind wir bei der Betrachtung der Zuckerrübe selbst angekommen, von der verschiedene Spielarten angebaut werden, unter welchen die Sclerator- oder Imperialrübe den reichsten, auf 12—14 Proc. steigenden Zuckergehalt besitz. Durchschnittlich kann jedoch der Zuckergehalt der Rüben nicht höher als 10—11 Proc. angenommen werden. Als mittlere chemische Zusammenfassung der Zuckerrübe ergeben sich folgende Procente:

|                                                                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Wasser . . . . .                                                                                                  | 82,7  |
| Zucker . . . . .                                                                                                  | 11,3  |
| Eiweißstoffe . . . . .                                                                                            | 1,5   |
| Zellstoff . . . . .                                                                                               | 0,8   |
| Organische Stoffe, insbesondere Säuren<br>und ihre Salze, Farbstoff u. a. m.,<br>und unorganische Salze . . . . . | 3,7   |
|                                                                                                                   | 100,0 |

Als verkäufliche Waare in Gestalt von Melis werden aus dem Centner Rüben 7—8,5 Pfd. Zucker gewonnen.

Der große Gehalt des Rübensaftes an Eiweißstoffen, insbesondere aber an Säuren und Salzen sind die Ursachen, welche die Gewinnung des Zuckers aus demselben ungemein erschweren und die Ausbeute beeinträchtigen.

Die Fabrikation des Rübenzuckers umfaßt eine Reihenfolge von Operationen, welche wir in Nachfolgendem aufzählen:

1) Das Waschen und Putzen der Rüben. 2) Das Zerkleinern derselben. 3) Gewinnung des Rübensaftes.

4) Scheidung des Saftes mit Kalk und Entfärbung desselben. 5) Entfärbung vermittels Filtration durch Knochenkohle. 6) Verlocken des Saftes zur Kristallisation. 7) Darstellung von Melis und Candis.

1) Das Waschen und Putzen der Rüben geschieht in einer aus Latten gefügten Trommel, 12 Centimeter tief in Wasser eintaucht und durch Dampfmaschine in Umdrehung versetzt wird; die so kommen gereinigten Rüben werden mit dem Kopf von den Köpfen und sonstigen unbrauchbaren Theilen befreit.

2) Die Zerkleinerung der Rüben. Dies besteht vorherrschend in dem Zerreiben oder, richtiger gesagt, in einem Zerreißen der Rüben. Da es in den Zellen der Rübe eingeschlossen ist, so war selbst die Anwendung des stärksten Drucks nicht vermögen, denselben auszupressen. Dies kann geschehen, wenn das Zellgewebe zerrieben ist, so man sich der Reibe von Thierro (Zaf. 9, 2) bedient, die im Durchschnitt abgebildet ist. Diese besteht aus einer Reibetrommel, die aus zwei Eichen von Gußeisen gebildet wird, von welchen jede eine 11 sichtbar ist. Zwischen denselben vermittels Schrauben hölzerne Dauben gegeneinander und auf diese abwechselnd schmale Holzleihen (Z) aufgenagelt und entsprechende Sägeblätter (A) zwischen denselben eingelassen, von welchen je eines eingeseht werden. Durch einen jederseits über Stirne dieser Theile getriebenen schmiebschrauben bekommt das Ganze Halt, der noch vermehrt durch Ueberziehen des Holzwerkes der Trommel warmem Wasser, wodurch es aufquillt. Fortwährend die Herstellung dieser Vorrichtung, indem wie Fig. 4 zeigt, zwei gußeiserne Schieber (B) durch die Achse b und die darauffolgende Kette zu einem Ganzen fest verbunden sind. Jeder dieser Schieber werden dann Sägeblätter in einen festklemmt, der durch einen am Umfang befindlichen gebildet wird.

Die Trommel ist auf der Achse a (Fig. 1) montiert und macht mit derselben 1000 bis 1200 Umdrehungen in der Minute, wodurch in 24 Stunden 600 bis 800 Ctr. Rüben in einen feinen Brei vermandelt werden. Es geschieht dies durch die über die Leisten hervorragenden Zähne der Sägeblätter. Damit der Brei nicht weggeschleudert wird, deckt eine Kappe (C) den Blech D die Oberseite der Maschine. Die Kappe wird in dem sogenannten Rumpf C verriegelt entweder durch Handarbeiter oder durch einen mechanischen Schiebeknecht (Pouffoir). Die zerriebene Rübe fällt in den Raum E.

Nach dem Verfahren von Schüpenbach, bei der großen Fabrik von Waghausel in Bode wird, werden die Rüben durch eine mechanische Vorrichtung in fingerlange Schnitzel geschnitten, getrocknet und später extrahiert.

3) Gewinnung des Rübensaftes. Das Pressen des Rübenbreis hat die hydraulische Presse alle früheren Pressvorrichtungen verdrängt, weil sie leichter Handhabung und großer Wirkung in kleinem Raum einnimmt. Die Einrichtung der hydraulischen Presse beruht auf dem hydrostatischen Gesetz, daß der Druck, welcher auf eine Stelle einer Flüssigkeit ausgeübt wird, die in einem verschlossenen Gefäß sich befindet, nach allen Richtungen mit gleicher Kraft fortpflanzt. Ein unwillkommener Nebenwirkung der erzielbaren Wirkung wird mitunter die Verstopfen von Weinsäcken. Ist eine solche angefüllt, so daß der Kork unmittelbar auf der Flüssigkeit aufliegt, so reicht ein ganz geringer Druck

lag hin, die Flasche zu zer Sprengen. Jeder Theil innern Oberfläche der Flasche, der so groß ist als vom Kork berührte Flüssigkeitsfläche erleidet in dem Falle einen gleich großen Druck wie jene, was Gesamtwirkung von innen nach außen ergibt, selbst die härteste Flasche nicht zu widerstehen mag.

Um zu erläutern, wie dieses Princip Anwendung et bei der hydraulischen Presse, bedienen wir uns Fig. 5. Dieselbe stellt ein zweifachenförmiges Gefäß vor, in welchem zwei Kolben luftdicht eingepaßt verschiebbar sind. Das Gefäß ist angefüllt mit Wasser. Wirkt nun ein Druck auf den kleineren, so pflanzt sich derselbe fort und schiebt den in dem weiteren Schenkel mit einer Kraft in die Höhe, die so viel mal größer ist als die angewendete, der Querschnitt des großen Kolbens den des kleinen Flächeninhalt übertrifft. Es habe beispielsweise Querschnitt des kleinen Kolbens 1 Quadratzentimeter, der des großen 100 Quadratzentimeter, und sei der auf ersten wirkende Druck gleich 10 Pfd., wird der große Kolben mit einer Kraft von  $\times 100 = 1000$  Pfd. aufwärts geschoben. Wird über diesem Kolben ein Widerlager angebracht, so zwischen diesem und dem Kolben ein Körper einsteckt, so wird letzterer mit der entsprechenden Kraft ammengepreßt. Je größer der Querschnitt des ersten Kolbens im Verhältnis zu dem des Druckkolbens, desto größer der auf letztern ausgeübte Druck, desto höher die Wirkung der Presse, die in der That zu einer außerordentlichen Leistung gesteigert werden kann. Zur weitern Veranschaulichung dient Fig. 6, wo die Begleitung der Druckpumpe, welche durch m das Wasser unter den Preßkolben g führt, die eigentliche Vorrichtung abgebildet ist. Dieser Kolben trägt seinem obern Theil eine Platte h, Preßstück genannt, die ringsum eine rinnenförmige Vertiefung Aufnahme des ausfließenden Saftes hat, der durch 3 Rohre z' abläuft. Auf den Preßstück wird der in der eingeschlagene oder in Säcke gefüllte Rübenbrei eingeschalteten Eisenblechen aufgeschichtet und durch 1 Auftrieb des Kolbens gegen das Widerlager o gedrückt.

Die Dide der zu pressenden Rübenbreischichten darf eine geringe sein, sodas nach vollzogener Pressung Preßrückstände, die sogenannten Preßlinge, nicht zu sehr als Pappe, und dabei dicht und möglichst den erscheinen. 100 Pfd. Rüben liefern 76,8 Saft und 23,2 Pfd. Preßlinge, welche noch 15 Wasser und 72 Pfd. Zucker enthalten. Man benutzt dieselben als Futter, zur Bereitung von Branntwein und als Material zur Papierfabrikation.

Außer dem geschilderten Preßverfahren kommt zur Gewinnung auch das Schleuberfahren vermittels Centrifuge in Anwendung. Der populärsten Anwendung der Centrifugalkraft begegnen wir, wenn Köchin den gewaschenen Salat, in eine Seide oder einen Korb gethan, träftig in Umschwingung versetzt. Anhängende Wasser fliegt durch die Oeffnungen anhängen davon. Maschinen, nach gleichem Princip konstruirt, um Flüssiges von Festem zu trennen, heißen Centrifugen. Fig. 10 zeigt uns im Längsschnitt eine Saftcentrifuge; a ist eine oben offene Trommel mit siebartig durchlöcherter Wand, in welche Rübenbrei eingeschüttet wird, der von dem Regels abgleitet und nach der Trommelwand geleitet wird. Der Mantel e e umgibt die Trommel und dient zum Ablassen des ausgeschleuderten Saftes, der durch f fließt. Durch die Achse b, welche mit der Betriebsmaschine in Verbindung steht, wird die Trommel in

Bewegung gesetzt, von 1000 — 1200 Umdrehungen in der Minute. Dieselbe vermag 150 — 200 Pfd. Rübenmasse aufzunehmen. Die Centrifuge liefert aus dem eingetragenen Brei nur ungefähr 65 Proc. Saft. Zur Gewinnung des zuckerhaltigen Saftes, der im Rückstand noch enthalten ist, wird dieser gedreht, d. h. durch eingepreßtes Wasser etwas verdünnt und abermals ausgeschleudert. Eine Wiederholung dieser Operation würde zwar eine fast gänzliche Erschöpfung des Breis möglich machen, aber so verdünnte Säfte liefern, daß er die Kosten der Eindampfung nicht lohnt.

Endlich macht man bei der Gewinnung des Zuckers aus der Rübe auch Gebrauch von der Maceration, welche darin besteht, daß die getrocknete Rübe gemahlen und wiederholt in Wasser eingeweicht wird, das den Zucker auszieht. Dieses Verfahren gewährt den Vortheil, daß das Verarbeiten der getrockneten Rübe einen Geschäftsbetrieb zuläßt, der auf das ganze Jahr sich ausdehnt, während das Aufarbeiten frischer Rüben in eine kurze Periode, in die sogenannte Campagne sich zusammenhängt, mit nachfolgendem Stillstehen der Arbeiter. Als Nachtheil der Arbeit mit getrockneter Rübe ergibt sich jedoch der wiederholte Aufwand von Brennstoff, einmal um den natürlichen Wassergehalt der Rübe, und das andere mal um das bei der Maceration wieder zugelegte Wasser zu verdampfen. Man hat daher letztere nicht ohne Vortheil auf frische Rübenschnitzel anzuwenden versucht.

4) Die Scheidung des Rübensaftes. Der ausgepreßte Saft scheidet sich an der Luft rasch tintenartig; er enthält außer Zucker einige stickstoffhaltige Substanzen, die leicht Fermente bilden und den Zucker in Milchsäure und andere Gährungsproducte überführen; er enthält ferner freie Säuren, die geneigt sind, den Zucker in unkrystallisirbaren Zucker zu verwandeln. Es gilt daher, diesen nachtheiligen Einflüssen möglichst rasch zu begegnen, was geschieht, indem der Saft in der Scheidepfanne, unter Zusatz von 1 — 2 Pfd. Kalk auf 100 Liter erhitzt wird. Sobald der Inhalt der Pfanne den Siedpunkt erreicht hat, scheidet er sich in eine zusammenhängende, starke, graue Schaumdecke und in klaren Saft, welcher letzterer schon nach einigen Minuten abgeseigt werden kann. Der im Kessel verbleibende Schaum bildet eine schlammige Masse, den sogenannten Scheideschlamm, und hält eine bedeutende Menge Zuckers zurück. Zu dessen Gewinnung wurde früher der Schlamm durch Handarbeit in Säcke gefüllt und ausgepreßt, allein von dem darin vorhandenen ägenden Kalk wurden nicht nur die Preßbeutel, sondern auch die Kleider und Hände der Arbeiter zerfressen, sodas letztere diese Arbeit verweigerten. Die Einführung einer bessern Methode wurde daher als eine allseitige Wohlthat begrüßt.

Die Entlastung des Scheideschlammes geschieht jetzt allgemein durch die Filterpresse (Fig. 11). Derselben ist die Einrichtung von Pressen zu Grunde gelegt, die in England schon lange in der Porzellanfabrikation zum Auspressen des Wassers aus der feingeschlammten Porzellanerdemasse in Anwendung kommen. Auf einer horizontalen Barre T sind vermittels der Handhaben g g eine Anzahl von eisernen Preßplatten s, d, s, d, eingehängt; der bewegliche Holm h läßt sich durch Anziehen der Schraubenmutter n m, was mit dem Hebel F geschieht, auf der Barre T gegen den festen Holm h schieben, wodurch die Preßplatten aneinandergebrückt werden. Jede Preßplatte hat eine etwa 2 Centimeter starke Vertiefung und ist der Länge nach cannelirt. Es entstehen auf diese Weise zwischen den Platten schmale, auf der hohen Kante stehende

Preßkammern, welche ringsum mit sehr feinnäsigem Messingdrahtsieb und darübergeschlagenem Tuch bekleidet sind. Auf unserer Abbildung sind einige Preßplatten herausgenommen, sodaß die mit Drahtsieb verkleidete vertiefte Wand *f* der Platte *d* sichtbar ist. *h* ist ein hohler, vierkantiger Kanal, und eben in die Höhe gehoben, um zu zeigen, daß er unten die Oeffnungen 1, 2, 3, 4 . . . hat, welche ebenso viel Oeffnungen entsprechen, die zu den Preßkammern führen, v v . . . sind Ventile, durch welche diese Oeffnungen geschlossen werden können. Denken wir uns den Kanal *h* herabgelassen, durch die Schraube *b* fest angedrückt und bei geöffneten Ventilen v . . . in Verbindung gesetzt mit einem höher gelegenen Behälter, der mit Scheideschlamm gefüllt ist, so wird letzterer in die Preßkammern treten. Werden nunmehr die Ventile v v geschlossen und der Hebel *F* in Thätigkeit gesetzt, so rücken die Preßplatten zusammen, der Scheideschlamm wird ausgedrückt und entläßt seinen Saft in die Sammelrinne *S*. Es ist sehr die Einrichtung getroffen, daß durch ein Zuleitungsrohr *x* Dampf in alle Preßkammern einströmen kann, welcher den in dem Schlammklüften und in dem Preßzeuge noch vorhandenen Zuderast austreibt und der Sammelrinne zuführt. Es wird auf diese Weise ein sehr vollständiges Ausfüßen des Schlammes erzielt.

Der Einfluß, welchen die Scheidung auf den Saft ausgeübt hat, ist ein sehr wesentlicher. Erstlich wird durch die Siedebüge ein großer Theil einseitiger Stoffe als Schaum abgeschieden, während durch den Kalzzusatz andere stoffhaltige Bestandtheile unter Entwicklung von Ammoniak zerlegt werden. Die vorhandenen freien Säuren werden abgumpft und die Salze zerlegt, sodaß freies Kali und Natron im Saft enthalten sind. Gleichzeitig entsteht jedoch eine Verbindung von Kalk mit Zuder, sogenannter Zuderkalk, die in Wasser löslich ist. Dieser Zuder würde der Gewinnung entgegen, ohne die Vornahme der Entkalkung des Saftes, welche durch Einleitung von Kohlensäure in denselben bemerkt und Saturation genau wird; der Kalk fällt als ein Schlamm nieder, der mit dem Scheideschlamm der Filterpresse unterworfen wird.

Während der Rübenast vor der Lärnung trübe, röthlich oder schwärzlich und schwach sauer war, erscheint er nach derselben vollkommen klar (blank), hellgelb, alkalisch und von stark ammoniakalischem Geruch.

5) Die Filtration des Saftes durch Knochenkohle und das Verdampfen des Saftes.

Der natürliche Wassergehalt des Rübensaftes wird noch vermehrt durch den Wasserzusatz, den derselbe bei verschiedenen Operationen, wie beim Ausfüßen des Rübenbreis, des Scheideschlammes u. a. m. erfährt. Zur Gewinnung des Zuders aus dem Saft müssen  $\frac{10}{11}$  seines Gewichts Wasser oder 16000 Liter auf 1000 Liter verdampft werden. Man unterscheidet hierbei zwei Perioden, nämlich das Verdampfen des sogenannten Dünnsaftes bis zur Concentration von 25° B., von welchem Punkt an der Saft Dickast heißt und durch das nunmehr eintretende Verkochen zur Krystallisation gebracht wird.

Ungeachtet der Reinigung, welche der Saft durch die Scheidung und Saturation erfahren hat, enthält derselbe immer noch fremde Stoffe, die insbesondere bei zunehmender Concentration desselben zerlegend auf den Zuder einwirken. Außer färbendem Stoff ist es die Gegenwart von Kali, Natron, sowie von Kalk, welche sich nachtheilig erweisen und auf chemischem Wege nicht entfernt werden können.

Glücklicherweise hat man in der Knochenkohle ein Mittel entdeckt, eine weitere Reinigung des Saftes zu

bewirken, indem dieselbe die wunderbare Eigenschaft besitzt, sowohl Farbstoffe als auch Salze anzuheben und festzuhalten. Zu diesem Zweck wird der Saft zweimal durch Kohle filtrirt, das erste mal unmittelbar nach der Saturation oder nachdem derselbe etwas verdampft ist; es ist dies die Filtration des Dünnsaftes. Die zweite oder die Filtration des Dickastes unmittelbar vor dem Verkochen statt, wenn der Saft eine Concentration von 22 — 25° B. erreicht hat.

Allgemein in Verwendung ist das Dumas'sche Kohlenfilter (Fig. 7), im Durchschnitt, es ist ein rechtstehender Cylinder von Eisenblech, der 50 Centimeter Durchmesser und 3 bis 4 Meter Höhe hat. In demselben befinden sich Mannlöcher *m* und *m'* dienen zum Ein- und Ausbringen frischer und abgenutzter Kohle; der Zylinder wird mit einem Seithut belegt und dann mit der gepulverten Kohle aufgetragen. In das Innere des Filters strömen nicht weniger als vier Gähne, um nach dem Dampf durch *C*, oder Wasser durch *d*, Dünnsaft durch *e* oder Dickast durch *f*, aus oberhalb bemerken zu halten einlassen zu können. Der vom Filter austretende Saft steigt in dem Rohre *u* anheben und fließt bei geöffnetem Hahn *h* in den Trichter *t*, auf die Leitrohre *O* oder *O'* gesteuert wird, je nachdem Dünnsaft oder Dickast resultirt.

Der aus dem Filter hervorgehende, möglichst gereinigte Dickast heißt nunmehr Klarcel, und wird zur Krystallisation verköcht.

Die ausgezeichnete Wirkung, welche die Knochenkohle die Reinigung des Saftes ausübt, nimmt jedoch in dem Maße, als auf ihrer Oberfläche die der Reinigung entgegenstehenden Stoffe sich absetzen, welche einestheils aus stoffhaltigen organischen Stoffen, insbesondere Zucker, andernteils aus Kalk bestehen. Letzterer wirkt auf die Kohle so kräftig anziehend, daß manche Fabriken die Entkalkung durch Kohlensäure ganz unterlassen. Es tritt endlich ein Zeitpunkt ein, in welchem die Kohle ihre Wirksamkeit völlig eingebüßt hat und wo sie vom Filter entfernt werden muß. Bei dem starken Verbrauch an Kohle, der sich in der Fabrik Waghausl jährlich auf circa 20000 Ctr. beläuft, ist es daher von größter Wichtigkeit, daß man Mittel und Wege gefunden hat, zur Wiederbelebung der Kohle, d. h. zu ihrer Verfrischung, wodurch sie ihre nützlichen Eigenschaften nahezu vollständig wiedererlangt. Zu diesem Zweck wird die gebrauchte Kohle zuerst mit Zätsäure behandelt, wodurch ihr der ausgenommene Kalk entzogen wird; hierauf überläßt man die Kohle der sogenannten Gärung, d. h. der Gärung, wodurch die organischen Stoffe in Zersetzung übergeben. Der letztere Proceß kann mit Zeitgewinn ersetzt werden durch die Behandlung der Kohle mit Natronlauge. Es folgt dann ein sorgfältiges Waschen der Kohle, worauf sie getrocknet und geblüht wird.

Letzteres geschieht in dem Köhren-Bläth (Taf. 8, Fig. 11), den wir im Durchschnitt veranschaulichen; 30 bis 40 gusseiserne Köhren sind in zwei Reihen *c, c'* hintereinander in einem Cylinderschiffe einander gegenüber angeordnet. Das schiffe Wand *v* ist der Raum, in dem der untere Theil der Cylinder sich befindet, in die Abtheilungen *p* und *q* getheilt. Durch *o* tritt kalte Luft ein, fällt auf die Endfläche der Cylinder und strömt dann nach oben in den Feuerraum *C* unter den Rost. Die abziehende Luft dient zum Trocknen der auf der horizontalen Platte über den Bogen ausgebreiteten gebrauchten Kohle. Die Cylinder werden mit Kohle beladung, nachdem sie hinlänglich geblüht ist, durch das unten angebrachte Schieber entleert wird, worauf sie von oben nachrückt und Platz zu neuer Füllung erhält.



6) Das Verloren des Klärsels zur Kry-  
stallisation. In dem Vorhergehenden haben wir  
sehen, daß der Saft nach der Scheidung durch Ein-  
sen eine fortwährende Concentration erfährt. Es  
wird hierbei unbeachtet gelassen, auf welche Weise das  
Kochen geschieht, obgleich dies von höchster Bedeutung  
ist. Die Ausbeute an Zucker ist. Bemerkten wir zu-  
erst, daß letzterer beim Erhitzen an der Luft fort-  
während eine Veränderung erleidet, was sich durch die  
zunehmend dunkler werdende Färbung zu erkennen gibt.  
Es beruht dies darauf, daß ein Theil des Zuckers sich  
braungefärbten Schleimzucker verwandelt, der un-  
stallbar ist und daher für den Zweck der Dar-  
stellung verkäuflicher Waare verloren geht. Eine Ver-  
änderung dieses Verlustes läßt sich nur herbeiführen  
durch, daß alle Kocharbeit möglichst abgetrückt, sowie  
daß sie bei Abschluß der atmosphärischen Luft und bei  
möglichst niedriger Temperatur ausgeführt wird.

Diese Anforderungen entspricht in vorzüglichster  
eise die Vacuumpanne (Zaf. 9, Fig. 8), bei  
der alle Hülfsmittel der vorangeschrittenen Physik  
d. Mechanik in Anwendung kommen. Vacuum  
umt der Physiker einen luftleeren Raum, und wir  
ben uns daher die Vacuumpanne v als einen  
gäum abgeschlossenen, nahezu luftleeren Kessel vor-  
stellen, wie unsere durchschnittliche Abbildung den-  
ken in vollster Thätigkeit zeigt. Das Verständniß  
selbst setzt voraus, daß man sich eine ganze Reihe  
itworfender Vorrichtungen, wie Dampfmaschine, Pum-  
pen, Behälter verschiedener Art u. a. m., hinzu-  
fügen hat.

Die Erhitzung des in der Pfanne befindlichen Zucker-  
saftes geschieht einerseits durch das in demselben be-  
findliche vielfach gewundene Schlangrohr s, dem  
nach d Dampf zugeleitet wird, andererseits durch den  
den Doppelboden b befindlichen Dampf, den das  
rohr d 2 liefert; s' und b' führen das in der Schlang-  
e dem Doppelboden condensirte Wasser hinweg. Der  
is dem erhitzten Zuckersaft sich erhebende Dampf tritt  
den cylindrischen Aufsatz D, Dom genannt, der das  
obersteigen des Saftes vermeiden soll, und gelangt  
nach das Rohr R in den Uebersteiger H und in den  
ondensator C, wo er verdichtet wird. Auf diese  
eise wird mit dem Dampf auch die anfänglich in  
e Vacuumpanne befindliche Luft aus derselben ent-  
mt, sodaß ein inwendig angebrachtes Barometer m  
r 5 — 10 Centimeter Druck anzeigt, gegen 76  
ntimeter Luftdruck außerhalb. Der Siedepunkt des  
klärsels, der durch das eingetauchte Thermometer t  
obachtet wird, liegt dann nur zwischen 50 bis 60° R.,  
ährend es unter dem atmosphärischen Druck erst bei  
° R. siedet. Der Probeflecker p dient, um Proben  
s kochenden Inbalt herausnehmen zu können, ohne  
daß Luft eindringen vermöge; durch das Fenster u  
st sich der Gang des Kochens im Vacuum beobachten,  
is durch ein Licht an dem zweiten Fenster U' er-  
uchtet wird. Durch den Zethahn g kann Luft  
engelassen werden, sowie auch Fett, um das Ueber-  
rigen der kochenden Masse zu verhindern. Sobald  
tere hinlänglich eingedampft ist, wird sie durch  
ederdrücken des Regels c vermittels des Hebels h  
utert und fließt dann durch den Trichter T  
i dafür bestimmte Behälter. Zum Nachfällen des  
uums genügt es, den Saughahn z' zu öffnen, um  
ach den äußern Ueberdruck in den Saugrohren z',  
, z', z', je nach Bedarf Dinnsaft, Dicksaft oder  
asser aufsteigen und durch das Rohr z eintreten zu  
ssen.

Wenn bei stürmischem Kochen die Masse in dem  
rohr n aufsteigt, so wird sie von der Fanglappe f

im Dom zurückgehalten und fließt durch die Öffnungen  
k k wieder in das Vacuum zurück. Nichtsdestoweniger  
ist der Fall vorgehen, daß Flüssigkeit selbst in den  
Uebersteiger H treten kann, wo sie dann durch den  
Hahn q abgelassen wird; die Standprobe i i zeigen  
beiderseits an, wie es im Innern dieser Vorrichtungen  
beschaffen ist. Die abziehenden Dämpfe treten in der  
durch die Pfeile angezeigten Richtung in den Con-  
densator C, vertheilen und verdichten sich daselbst in  
einem System von Röhren r r, die mit kaltem Wasser,  
von w herkommend, umgeben sind. Das hierdurch  
warm gewordene Wasser kann durch den Hahn o ab-  
gelassen werden.

Das Einlochen des Klärsels im Vacuum wird fort-  
gesetzt, bis dasselbe so concentrirt ist, daß nach dem  
Entleeren beim Erkalten aus der vollkommen klaren  
oder blauen Masse das Auskristallisiren des Zuckers  
eintritt. Man nennt dies das Blanklochen und  
erkennt die Erreichung dieses Zeitpunktes an der  
Fadenprobe, die darin besteht, daß eine heraus-  
geholte Probe, zwischen Zeigefinger und Daumen aus-  
einandergezogen, fleiste, abbrechende Fäden bildet.  
Das Kochen kann jedoch noch weiter fortgesetzt werden  
und es findet alsdann die Auscheidung von Zuck-  
kristallen bereits in dem Apparate selbst schon statt,  
was man das Kochen auf Korn nennt.

7) Die Arbeit auf Rohzucker und Brotzucker.  
So wie dem Producenten des indischen Zuckers locale  
Verhältnisse und Zustände es vortheilhafter erscheinen  
lassen, sich auf die Darstellung von Rohzucker zu be-  
schränken und das Reinigen desselben den Raffinerien  
zu überlassen, so ist dies auch bei manchen Rüben-  
zuckerfabrikanten der Fall. Ihre Aufgabe ist es daher,  
einen kräftig geklärten Rohzucker, mehr oder weniger  
bräunlich gefärbten Rohzucker zu erzeugen. Zu diesem  
Zweck wird der blank oder auf Korn verlochte Zuck-  
saft, die sogenannte Züllmasse, in die Krystallisa-  
tionskästen von Eisenblech (Fig. 9) ausgegossen,  
die ladirt sind und etwa 240 Pfd. Züllmasse auf-  
zunehmen vermögen. Die Abflusssröbren oder Zillen  
dieser Kästen sind verklopft, und letztere werden in der  
Züllstube bei 25 — 30° R. aufgestellt, worauf die  
Krystallisation beginnt. Nach 6 — 12 Stunden  
wird der Stöpsel gezogen, wobei die nicht krystallisi-  
erte Masse als sogenannter Syrup abfließt; um dessen  
völliges Abfließen zu bewirken, wird von Zeit zu  
Zeit mit einem zugespitzten eisernen Dorn in die Zille  
eingestochen. Nach acht Tagen ist diese Operation  
vollendet und der fertige Rohzucker wird ausgegossen  
und ausgekühlt, wobei man den an der Zille befind-  
lichen syruphaltigen Theil absondert. Er heißt: erstes  
Product, zum Unterschied von dem zweiten, dritten  
und vierten Product, welche weniger rein sind und  
bei längerem Stehen aus dem abgelassenen Syrup  
noch auskristallisiren. Zur Gewinnung des vierten  
Productes wird der Syrup in Behältern von Eisen-  
tafeln, die 300 Ctr. aufnehmen, bis zur Dauer  
eines Jahres der Krystallisation überlassen. Diese  
Nachproducte werden meist zur Anreicherung der Zül-  
massen in das Vacuum zurückgebracht, was man das  
Einwerfen nennt. Manche Fabriken arbeiten nur  
auf erstes und zweites Product, und ziehen es vor,  
die ablaufenden Syrupe auf die Erzeugung von Spi-  
ritus zu verwenden.

Anstatt, wie angeführt, die Trennung des Syru-  
ps von den Krystallen durch langames Ablausenlassen zu  
bemerkselligen, geschieht dies jetzt auch häufig ver-  
mittels der Centrifuge, durch Ausschleudern. Die  
Maschine ist der früher beschriebenen ganz ähnlich, nur  
kleiner. Die eingegebene Züllmasse wird mit einem

kleinen Zusatz von Wasser in einem sogenannten Maisch-  
trog zu einem gleichförmigen Brei verarbeitet und hier-  
durch die Abcheidung des Syrups so vollständig er-  
möglichst, daß der aus der Centrifuge kommende Zucker,  
nachdem er etwas abgetrocknet hat, sofort verkäufliche  
Maare ist.

Die Vorarbeit, treffender als Melisarbeit bezeichnet, denn ihre Aufgabe ist die Erzeugung von Zuder in Gestalt der im Gebrauch gewöhnlichen Zuderbüte von weißem Melis, besteht darin, daß die Züllmasse in ladirte Zuderbusformen von Eisenblech gebracht wird, deren in der Spitze befindliche Oeffnung verstopft ist. Durch öfters Umrühren, Stören, bewirkt man eine möglichst gleichförmige Krystallisation, und nachdem diese eingetreten, läßt man den Syrup ablaufen. Ein Theil desselben bleibt jedoch den Krystallen anhängen und wird durch das sogenannte Dediren entfernt, indem man auf den breiten Theil des Zuderhuts eine concentrirte Lösung von reinem Zuder, Dedisyrup oder Desfel, aufgießt, der den braungefärbten Syrup verdrängt. Auch wird letzterer durch Auslaugen auf den sogenannten Rutschapparaten entfernt, indem die Spitzen der Formen luftdicht in die Oeffnungen eines Rohrensystems eingesetzt werden, das mit einer Luftpumpe in Verbindung steht. Sobald durch letztere die Luft innerhalb verdünnt wird, brüdt die Atmosphäre mit Gewalt den Syrup durch die Form und aus der Oeffnung der Spitze heraus.

Die aus den Formen genommenen Brote werden in einer auf 40° R. geheizten Stube getrocknet und hierauf ihre immerhin noch gelblich gefärbten Spitzen auf einer Drehbant zu einer neuen Spitze abgedreht, worauf dieselben als Handelswaare zum Verpacken kommen.

Raffinade heißt ein vorzüglicher reiner Melis, der aus den besten Rohzudern dargestellt wird, indem man dieselben in heißem Wasser auflöst, durch Zusatz von Knochenohle und von Blut oder Eiweiß entfärbt und klärt. Die vollkommen klare und farblose Flüssigkeit wird alsdann in der oben beschriebenen Masse verköcht und gefüllt.

Der Candiszucker besteht bekanntlich aus großen Krystallen, die zur ihrer Bildung längere Zeit erfordern als die kleinen Kryställchen des Rohzuckers und Melis. Zu seiner Darstellung wird ein möglichst blankes Klärfel bis zur schwachen Fadenprobe verfocht und als Füllmasse in die Candisbüchsen gebracht, runde, nach unten etwas sich verengende Gefäße von Kupfer- oder Eisenblech, in welchen inwendig quer Fäden gespannt sind. Sie werden in der sogenannten Stove, einem auf 40—50° R. geheizten Raume 8—10 Tage ruhig stehen gelassen, worauf man den nicht krystallisirten Syrup von dem gebildeten Candis ablaufen läßt.

Die Melasse bildet den dunklen Hintergrund der Rübensuderfabrikation und den Gegenstand der ungeduldeten Sorge des Fabrikanten. Während der von den indischen Rohzudern abfallende Syrup einen reinen Geschmack hat und als Versüßungsmittel verwendbar ist, bietet die Rübenmelasse eine dickflüssige, schwarzgrüne Masse von wirrigem Geruch und elbhaft salzigem Geschmack dar und erweist sich als völlig ungenießbar. Da 100 Pfd. Rüben etwa 2,5 Pfd. Melasse liefern, und diese noch ungefähr 50 Proc. trocknisfähigen Zuder enthält, so läßt sich leicht der Verlust ermessen, der aus diesem Abgang entsteht. Die Verlegenheit war für den Fabrikanten um so größer, als sich kaum eine Verwendung fand für dieses missällige Nebenproduct. Sein schon am Geschmack erkennbarer Gehalt an Kali- und Natronsalzen macht dasselbe nur bei Verfeinerung als Zusatz zum Viehfutter verwend-

deren Ueberschreitung Diarrhöen veranlaßt. Die  
 Masse wird daher hauptsächlich auf die Darmschleim-  
 haut mit Spiritus verarbeitet, der jedoch einen schlechten Ge-  
 schmack hat und nur für technische Zwecke  
 nützlich ist.

Es fehlt jedoch keineswegs an Versuchen, zu  
Mellasse noch einen Theil ihres Zuckers zu gewin-  
nen und man hat in neuerer Zeit hierzu die Dia-  
talse-Hülse genommen. Dieselbe beruht darauf, daß Wasser  
von verschiedenen Stoffen und ungleicher Löslich-  
keit durch ein Membran voneinander getrennt werden  
Bestreben haben, die Scheidewand gegenseitig zu  
dringen und dies so lange fortzusetzen, bis beider-  
ein Zustand des Gleichgewichts hergestellt ist. Man  
kann zu dialytischen Versuchen sowohl tierische als  
pflanzliche Häute verwenden, wie z. B. Rind-  
Pergamentpapier. Die Erfahrung lehrte hierzu, die  
kryallisirbaren Stoffe, sogenannte Amygdalin, zu  
die Salze und der Zucker gehören, wird für die  
die Membran hindurchgehen als die untreiblichen  
oder Colloide, von welchen die Eiweißstoffe,  
Gummi und die schleimigen Stoffe zu trennen.  
Fig. 12 zeigt einen kleinen Apparat zu diesen  
Versuchen, einen Dialysator. Er besteht aus  
einem kleinen Reifen von Guttapercha, welcher  
der einen Seite mit Pergamentpapier ausgekleidet  
ist. Man stellt den Dialysator auf Wasser, so-  
daß in einem weiten Gefäß befindet, und bringt  
selben die zu dialysirende Flüssigkeit, z. B. Zucker-  
Da zeigt es sich, daß vor allem die Salze durch  
welche durch die Scheidewand in das Wasser über-  
sodas im Dialysator eine Mellasse verbleibt, die  
ärmer und Zuckerreicher ist als vorher. Man hat  
auf ein Verfahren zum Entzählen der Zucker-  
gründet, das jedoch bis jetzt ebenso wenig befrucht-  
Nesultate ergeben hat, als die Bräunung des  
Zucker der Mellasse an Kalk gebunden durch  
niederzuschlagen und durch Kohlensäure wieder  
scheiden.

Es war uns nicht gestattet, in dem Buch mehr als eine flüchtige Skizze der Juden zu geben, die nur die wichtigsten Momente berühren konnte. Dieselbe genügt jedoch, zu zeigen, welchen hervorragenden Antheil sie an allen Vorgängen dieser bedeutenden Zeit und wie sehr ihre Besprechung hier am rechten

## 5. Die Brotherhood

Der allgemeine Sprachgebr  
 zahlreiche sprichwörtliche A  
 Brot als das Nahrungsm  
 haupt, daß so hervorragt  
 es genügt, es statt alle  
 der That verdient daß  
 vereinigt in seiner I  
 hastigkeit und Ha  
 machen, ausf  
 unterhalten,  
 thun im  
 den Best  
 zur W-  
 aus  
 A

... und v  
auf will  
thmung  
benmaße  
leistet  
rt, bi

der Teig sofort gebacken, so liefert er keineswegs Brot, sondern eine harte, dichte Masse, geschmacklos, die die Ofterluden (Mazzen) der Juden und der hessischen Juden. Der Teig muß zu diesem Zweck in Form flacher Kuchen gebracht werden, wie deren Schottland, im nördlichen Indien, von den Arabern Afrika u. a. m. angefertigt und meist auf heißen Steinen gebacken werden. Diesen Kuchen ist die Nahrungsfähigkeit nicht abzuspüren, auch besitzen sie den Vorzug großer Haltbarkeit. Klein sie sind schwer verdauen, und ihr Mangel an Wohlgeschmack läßt den Juden den Eintritt des Passahfestes, das ihn soebenlang zum Genuß der Mazzen verurtheilt, nicht als ein Freudenfest, sondern als ein Gedächtniß der Lage schwerer Bedrängniß und Entbehrung begeben. Das gute Brot, dessen als täglicher Nahrung auch der verarmteste Mann nicht überdrüssig wird, zeichnet sich aus durch seine lockere Beschaffenheit. Der innere Theil, die Krume, besteht aus einer feinsten, zelligen, blasigen Masse, die um so besser erhalten ist, je gleichförmiger sie erscheint, ohne größere Zwischenräume und ohne dichte, feste Partien, sogenannten Wasserrand, und ohne eingestreute Kleimpfropfen. Der äußere Theil des Brotes, die Kruste, ist hart, glänzend, gelb bis dunkelbraun gefärbt und von dem eigenthümlichen angenehmen Nussgeschmack. Im übrigen gibt es Brotsorten von erheblichem Unterschied, wie insbesondere das Weißbrot, das aus Weizenmehl, und das Schwarzbrot, das aus Roggenmehl bereitet wird, zwischen welchen das aus beiden Getreidearten gemischte Brot steht. Es unterscheidet sich von dem Hefenbrot durch weniger ausgeprochenen Geschmack von dem säuerlich schmeckenden, mit Sauerteig erzeugten Brot.

Ueberall wo wir in geschichtlichen Ueberlieferungen vom Brote bezeugen, weist dieses auf das Vorhandensein eines Culturvolks hin, sei es, daß in Ruinen und Schutt begraben Vadorrichtungen sich erhalten haben, oder daß, wie in der heiligen Schrift, zahlreiche Aufzählungen des Brotes seine Bedeutung hervorheben. Solange ein Volk nicht zum Brotbaden zu bringen ist, solange verbleibt es der Cultur unzugänglich. Denn nicht nur setzt der Gebrauch des Brotes den Ackerbau voraus, sondern es kann auch der langsame Gang seiner Vereitlung und die Errichtung des in Mauerwerk auszuführenden Backofens nicht ohne ein festes Volk gedacht werden.

Unterwerfen wir die Hauptvorzüge des Brotes, seine Verdaulichkeit und Loderheit, der nähern Betrachtung, so ergibt sich, daß bei seiner Vereitlung die Bestandtheile des verwendeten Mehles keine wesentliche chemische Veränderung erleiden. Wird Stärke, welche den Hauptbestandtheil des Mehles ausmacht, mit Wasser geknetet, so quillt sie auf und bildet den sogenannten Kleister. Während sie vorher unlöslich war, ist sie nunmehr theilweise löslich. Daher kommt es, daß eine Mehlsuppe, zu der Mehl mit Wasser gekocht worden ist, als Speise den Vorzug verdient vor bloß mit Wasser angerührtem Mehl. Bei ersterer ist durch die Einwirkung der Hitze die Stärke in den leicht löslichen Zustand übergeführt worden. Ähnlich verhält es sich beim Brotbaden. Im Innern des Brotes steigt die Hitze nicht über den Siedepunkt des Wassers und bewirkt eine entsprechende Umwandlung der Stärke. Weiter gehend ist die Veränderung an der Außenseite des Brotes, bei der Kruste, wo durch die stärkere Hitze die Stärke theilweise in Gummi übergeführt wird, theilweise jene eigenthümlichen Nussproducte gebildet werden, die sich auszeichnen durch ihre bräunliche Färbung und den anprechenden Geruch und Geschmack.

Befanntlich treten auch beim Braten des Fleisches ähnliche Erscheinungen auf, die den Wohlgeschmack desselben wesentlich erhöhen, allein in beiden Fällen ist uns die chemische Natur der dabei gebildeten Stoffe wenig bekannt.

Die Loderheit des Brotes, welche mit beiträgt zur Leichtverdaulichkeit desselben, wird herbeigeführt durch eine in der Masse des Teiges bewerkstelligte Entzündung von Kohlenensäure. Indem die Fähigkeit des Teiges die Entzündung der Gasblasen hindert und die Wärme dieselben ausdehnt, findet ein allgemeines Aufblähen des Teiges statt, was eine Erhebung desselben, das sogenannte Gehen, zur Folge hat. Nachzuweisen ist nun, wie eine solche Kohlenensäure-Entzündung zu Stande kommt. Hierbei hat man sich zu erinnern der nahen chemischen Beziehungen, in welchen Stärke, Zucker, Weingeist, Kohlenensäure, Essigsäure und Milchsäure zu einander stehen, wie dies bei der Gärung (S. 30) bereits nachgewiesen wurde. Man hat sich ferner zu erinnern, wie sehr die in den Getreidekörnern enthaltenen Eiweißstoffe geneigt sind, die Rolle eines Gärungsregers oder Ferments zu übernehmen.

In Hinblick auf seine chemischen Bestandtheile weicht das Mehl von dem Getreide, aus dem es dargestellt worden ist, insofern ab, als durch das Mahlen die äußere Hülle des Fruchtkorns, die aus Zellstoff besteht, entfernt und dadurch das Mehl an diesem ärmer wird und dafür reicher an Stärke. Ein Theil der letzteren ist übergegangen in Zucker und Gummi, so daß die wichtigsten Mehlsorten in Procenten die folgende Zusammensetzung darbieten:

|                  | Weizenmehl | Roggenmehl | Gerstenmehl |
|------------------|------------|------------|-------------|
| Wasser . . .     | 15,5       | 14,6       | 14,0        |
| Zellstoff . . .  | 5,2        | 7,3        | 8,0         |
| Eiweißstoffe und |            |            |             |
| Pflanzenseim     | 5,4        | 4,4        | 4,9         |
| Stärke . . .     | 63,6       | 64,2       | 53,1        |
| Gummi . . .      | 6,2        | 4,1        | 6,3         |
| Zucker . . .     | 2,3        | 3,4        | 3,0         |

wozu noch kleine Mengen eines Fettkörpers, phosphorsaurer Kalk und Sand als Abgang vom Nussheime kommen.

Ueberläßt man einen aus Wasser und Mehl angerührten Teig an einem warmen Orte sich selbst, so nimmt er einen eigenthümlichen, geistigen und sauren Geruch an und bildet den sogenannten Sauerteig. Unter dem Einfluß der als Ferment wirkenden Eiweißstoffe tritt hierbei eine Gärung des im Mehle vorhandenen Zuckers ein, wodurch Kohlenensäure und Weingeist entstehen. Indem letzterer in Essigsäure und Milchsäure übergeht, wird der Teig sauer. Nimmt die also begonnene Fermentation des Teiges ungestört ihren Fortgang, so stellt sich Säure ein. Wird jedoch der Sauerteig rechtzeitig verwendet, indem er durch Kneten sorgfältig mit frischem Teige vermischt wird, so wirkt er in letztem als Gärungsmittel und ruft in der ganzen Masse desselben eine rasche Fermentation von Zucker in Kohlenensäure und Weingeist hervor, was das oben angeführte Gehen des Teiges zur Folge hat. Ganz in derselben Weise wirkt Hefe, wenn sie frischem Teig eingebacken wird, und es hängt von Gewohnheit und Liebhaberei ab, ob man sich der einen oder andern der genannten Fermente beim Brotbaden bedient.

Wir haben demnach dreierlei Material zur Brotbereitung, nämlich Mehl, Wasser und Gärungsmittel. Als Zusatz dienen Salz und an manchen Orten Gewürz, wie insbesondere Kümmel oder Fenchel.

Das Mehl vermag ungefähr zwei Drittel seines Gewichtes Wasser zu binden, um einen Teig von ge-



eigneter Dide zu bilden; man rechnet ferner auf 100 Theile Mehl 4 Theile Sauerteig, oder bei Weißbrot 2 Theile Preshefe. Das Anmachen des Teiges geschieht mit lauwarmem Wasser von 21 — 37° R.

In der Regel wird jedoch nicht jedesmal Sauerteig dem zu einem Backgang dienenden Mehle frisch zugegeben, da es sich viel vortheilhafter erweist, einen Theil des richtig in Gärung versetzten, gegangenen Teiges zurückzubehalten und diesem frischen Teig zuzusetzen, was in Bädereien mit raschem Betrieb bis zur Hälfte der Teigmasse geschieht. Da die Güte des Brotes hauptsächlich von einer möglichst gleichförmig in seiner ganzen Masse sich vollziehenden Gärung abhängt, so wird diese leichter bewirkt, wenn dem frischen Teig eine größere Masse bereits in Gärung begriffenen Teiges zugefügt wird, als wenn derselbe mit nur wenig Sauerteig vermischt wird, dessen gleichmäßige Vertheilung eine sehr sorgfältige und mühsame Knetarbeit erfordert.

Hat der Teig die erforderliche Beschaffenheit erreicht, so wird er ausgewirkt, d. h. in die Form von Broten oder Laiben gebracht. Unmittelbar vor dem Einschieben in den Backofen werden dieselben mit lauem Wasser bestrichen, welches aus dem Teig etwas Gummi auflöst, wodurch die Kruste beim Baden einen schönen Glanz erhält. Da die Brote während des Badens durch Wasserverdunstung beträchtlich an ihrem Gewicht verlieren, das Gewicht des verläuschten Brotes aber behördlich vorgeschrieben ist, so muß bei dessen Auswirkung entsprechend mehr Teig genommen werden, und zwar um so mehr, je kleiner das Brot ist.

Die durchschnittliche Temperatur des Backofens ist 200° R.; dieselbe reicht hin, um die Stärke in den leicht löslichen Zustand überzuführen und die Kruste des Brotes zu bilden; sie dehnt ferner die im Innern der Teigmasse gebildete Kohlenäure aus. Die zähe Beschaffenheit derselben, herrührend von dem Gehalt des Mehls an Pflanzenleim, hindert jedoch das Entweichen der Gasbläschen, die daher den Teig ausblähen. Die zahlreichen Poren des Brotes stellen die von der Kohlenäure aufgetriebenen Zellräume dar. Der gleichzeitig gebildete Weingeist wird durch die Hitze verflüchtigt und geht verloren. Bei der ungeheuren Menge des täglich erzeugten Brotes ist dieser Verlust an Weingeist sehr bedeutend, bei den einzelnen Backöfen jedoch zu gering, als daß dessen Gewinnung der Mühe lohnte.

In Jahren des Mangels und der Theuerung ist die Frage nach Ersatzmitteln des Mehls zur Brotbereitung entstanden. Stoffe ohne Nahrungswert, wie Sägemehl, die zur Vermehrung der Masse zugefügt werden, sind als Ersatzmittel nicht zu betrachten. Dagegen verträgt das Brot eine Futhat von Erbsenmehl und Kartoffelmehl in gewisser Grenze, ohne Vinderung seines Wertes. Die Vortheilhaftigkeit dieses Verfahrens wird jedoch bedingt durch den Preis dieser Zusätze, der in der Regel in gleichem Verhältniß steigt wie die Fruchtpreise, und es sich dann mehr empfiehlt, diese Nahrungsmittel für sich zu genießen.

Da während der Brotgärung stets ein Theil der Mehlbestandtheile in Kohlenäure und Weingeist übergeführt und somit für die Ernährung verloren werden, so suchte man nach Mitteln, diesen Verlust zu vermindern. Ein solches besteht darin, daß man dem Teige doppeltkohlen-saures Natron und verdünnte Salzsäure beizumengt; es bildet sich hierbei Kochsalz, das dem Brote verbleibt, während die frei werdende Kohlenäure den Teig lodert. Auch sucht man denselben Zweck zu erreichen, indem man dem Teige sogenanntes Backpulver zusetzt, das einerseits aus doppeltkohlen-saurem Natron

und andererseits aus saurem phosphorsaurem Kalk als Weinsäure besteht. Der Zusatz des phosphorsauren Kalks soll Eratz bieten für den Abgang des Bestandtheils des Getreidekorns, der hauptsächlich in der Hülse desselben enthalten ist und beim Backen der Kleie entfernt wird.

Die letztgenannten Methoden bieten den Vortheil, daß sie die Vornahme der Backarbeit jederzeit möglich machen, indem nicht erst der länger dauernde Gärungsproceß abgewartet werden muß; es kann insbesondere bei der Anwendung die lästige Nacharbeit in der Backstube Wegfall kommen. Andererseits sollen die Kosten der Anschaffung des erforderlichen Materials nicht zu hoch werden durch einen entsprechenden Mehrertrag des Brotgewichts. Da ferner bei diesem Verfahren die Entwickelung der Kohlenäure eine plötzliche ist, so ist sie nicht wohl so gleichförmig durch die ganze Teigmasse vertheilt auftreten, wie dies bei Anwendung der Hefe mittel der Fall ist, und daher fällt das Brot etwas weniger locker aus. Am meisten wird bei der Anwendung von Backpulver empfohlen für Gebäcke.

Gehen wir nun über zur Ausführung der Backarbeit selbst, so überzeugt uns die Betrachtung des Backofens, daß in der Bäckerei, ähnlich wie in der Hefe-, jahrhundertlang nicht der mindeste Fortschritt gefunden hat, ja es zeigt der in dem hiesigen Haus von Pompeji ausgegrabene Backofen die kleinste dieselbe Construction, die man noch in Backöfen auf dem Lande findet. Ein primitiver Backofen besteht aus einem runden, ovalen Herde, überspannt von einem niedrigen Bogen, das im Stande ist, die Hitze gut zu reflectiren. Die Ofenwand selbst ist aus Backstein und Lehm aufgemauert. Nach hinten etwas ansteigende Sohle des Ofens mit Ziegelsteinen belegt oder aus Lehm gegossen. An seiner vordern Seite befindet sich das kleine Mundloch, welches sowohl zum Anlegen des Feuermaterials als auch später zum Einschießen des Brotes dient. Beim Heizen bleibt das Mundloch offen, es tritt alldann durch seinen untern Theil die erforderliche Luft ein, während aus dem oberen Theile brennungsproducte sammt dem Rauch ausströmen, durch einen oberhalb angebrachten Rauchblech abgeführt werden.

Zum Heizen des Backofens wendet man meistens trockenes Holz an, wozu Kiefernholz besonders sich eignet, und daß der Ofen die nöthige Temperatur erreicht hat, erkennt der Bäcker daran, wenn beim Reiben der Sohle des Herdes mit einem eisernen Holz Junken sich zeigen. Dieselbe beträgt etwa 200 — 225° R. Das Holz ist zu Kohlen verbrannt, welche rasch aus dem Ofen gezogen werden, um vor demselben befindlichen Vertiefung durch die Sohle gelöst werden. Man beizt sich, die Sohle des Ofens vermittelst eines nassen Wischers zu reinigen, und beginnt sogleich mit dem Einschieben des badenden Brotes, worauf das Mundloch durch eine eiserne Thüre verschlossen wird. Zwischen den Seiten derselben befindliche kleine Oeffnungen stellen durch Einschiebung brennender Späne die Beleuchtung des Ofens während dieser Arbeit.

Bei der beschriebenen Einrichtung entweicht der Rauch durch das Mundloch und werden die Kosten für das Holz ein erheblicher Fortschritt, der Mundloch (Taf. 10, Fig. 6) des Backofens zum Heizen und Einschieben dient, während die brennende Kohlen durch einen Kanal in der Sohle in das Kamium abgeführt werden. Der Schieber u kann die Oeffnung des Abzugsregulators somit der Zug regulirt werden. Die angedeutete

abgelassen werden zur Ablösung in den Raum *m* unter dem Backofen gebracht. Die Vertiefung *x* vor demselben erleichtert den Stand des Arbeiters. Der über dem Backofen befindliche Raum *z* dient als Backstube und empfängt von diesem die abgehende Wärme, welche die Ausbildung des Teiges begünstigt.

Beim Herausnehmen des Gebäcks kühlen Backöfen er beschriebenen Art sich ab und müssen für weiteren Gebrauch wieder geheizt und gereinigt werden. Diese während Unterbrechungen fallen hinweg bei dem kontinuierlichen Backofen (Fig. 7 und 8) wo Sohle und Gewölbe von außen durch eine Circulation der Feuerung geheizt werden. Das über den beiden Feuerungen *n n* angezündete Feuer verbreitet die heiße Luft unter dem Backraum *a a*, dessen Sohle auf den Seiten von Backsteinen ruht. (Fig. 8), worauf sie, durch *b b* über das Gewölbe hinreichend, nach dem Kamin entweicht. Auch hier wird die abgehende Wärme benutzt, um die über dem Backofen befindliche Backstube *z* zu erwärmen. Die getrennte Feuerung dieses Backofens gestattet die Anwendung von Steinkohlen, welche auf der bloßen Sohle eines gewöhnlichen Ofens nicht gut brennen.

### 6. Brotsfabrikation.

Das charakteristische Merkmal einer Fabrikation sind massenhafte Production, Theilung der Arbeit, Anwendung der Maschine an Stelle der Handarbeit. Hieraus erklärt sich, daß eine fabrikmäßige Erzeugung von Brot nur erst in neuerer Zeit und unter besonderen Umständen sich vortheilhaft erweisen konnte, wie an Orten mit dicht gedrängter, starker Bevölkerung und unter den günstigsten Transportverhältnissen, da der Reis und die Haltbarkeit des Brotes eine längere Reise nicht vertragen. Bei der Einfachheit des ganzen Verfahrens ist eine Theilung der Arbeit nicht zu erwarten, wohl aber ist es gelungen, die außerordentlich anstrengende Arbeit des Meisters der Maschine zu übertragen, und es beruht hierin ein wesentlicher Fortschritt.

Von der großen Anzahl verschiedener Mäsetmaschinen, die konstruirt worden sind, beschreiben wir deren zwei, die sich in vorzüglicher Weise bewährt haben. Die erste, welche den Teig zu dem unmisshobrot einer Mälstärkerei im größten Maßstabe verarbeitet, ist auf Taf. 10, Fig. 4 abgebildet. Eine kreisförmige, niedrige Trommel *T* aus starkem Eisenblech und von 2 Meter Durchmesser dreht sich in der Richtung des Pfeiles um die verticale Achse *A*, vermittelst am Rande, innerhalb ihres Bodens befindlicher Zähne, in welche ein Gekrad eingreift, beides in der Vertiefung *v v* angedrückt und daher auf der Zeichnung nicht sichtbar. Denselben ruht auch die Achse von *A* in einem Zapfenlager. An ihrem untern Ende befindet sich ein Cylinder *c*, wodurch zwischen diesem und der Trommel ringförmiger Anstrichraum gebildet wird, in welchem der Bedarf des Mehls von den im obern Stockwerk befindlichen Magazinen durch einen schrägen Hohlraum herabgelassen wird; durch zwei mit Nähn versehenen Zulieferungsröhren kann das erforderliche kalte und warme Wasser zugelassen werden. Außerdem noch der Sauerteig zugegeben.

Die Mäsetarbeit wird bewirkt durch ein gabelsförmiges Schwert *k* von höchst einfacher Construction. Eine durch die Trommel in Umdrehung versetzte Achse ist mit einem eisernen Verbund, an dessen beiden Enden sich je ein Dicht über den Boden der Trommel herabreichender Ring *a a* befindet. Die Umdrehung geschieht in einem gegen den entgegen gesetzten Sinne, und indem diese fortwährend Kreise beschreiben, mischen und

verarbeiten sie die durchpassirende Teigmasse auf das vollkommenste. Die Trommel dreht sich in einer Minute siebenmal um ihre Achse, während die Mäsetgabel in derselben Zeit 25 Umdrehungen macht, wodurch eine Teigmasse für 200 Brote zu 2 Kilo innerhalb 15 Minuten hergestellt wird. Derselbe bedarf keiner weiteren Behandlung, als daß davon die für je ein Brot bestimmten Portionen abgemessen und mit einigen Handgriffen in die geeignete Form gebracht werden.

So gute Dienste diese Vorrichtung leistet für den erwähnten Zweck, so bedürfen doch die feineren Brotsorten einer sorgfältigeren Verarbeitung des Teiges, wie derselbe in der Mäsetmaschine Fig. 5 vor sich geht, welche kleinere Dimensionen hat, jedoch in derselben der Teig für 100 Brote zu 2 Kilo fertig gemacht werden kann. Derselbe besteht aus einem feststehenden halbrunden Trog *T* von Eisenblech, durch dessen Wand die horizontale Flügelachse *A* geht, an welcher die eigenthümlich geformten, 3 Centimeter breiten Leisten *L L* befestigt sind und mit denselben das Nährwerk bilden. Dieses wird durch die Uebertragung verschiedener Zahnräder in zwölf Umdrehungen in der Minute versetzt. Die von den Nährleisten dargestellten Curven sind lediglich durch die Erfahrung gefunden. Bei dem Wege, den sie beschreiben, kann kein Theil der Teigmasse denselben entgehen. Nach 15 Minuten ist derselbe fertig und wird entleert. Zu diesem Zwecke wird durch *h h* und Abziehen von Stellschrauben der Trog drehbar um die nummervorgestellte Flügelachse *A* gemacht; vermittelst der Kurbel *k* wird ein Rad in Umdrehung versetzt, das in eine Verzahnung am Rande des Trogs eingreift und diesem die erforderliche Neigung gibt, jedoch der Teig rasch in einen untergestellten Eimer entleert werden kann.

Mit einer so raschen und massenhaften Anfertigung von Teig muß eine entsprechend fördernde Bäckereirichtung Hand in Hand geben, und als eine solche bewährt sich der Hochdruck-Wasserheizungs-Backofen von Wieghorst, den uns Fig. 9 im Längsschnitt und Fig. 10 im Querschnitt zeigt. Der Backraum *a a* wird geheizt durch ein oberes System eiserner Röhren *r r* und ein unteres *r' r'*, deren je nach Größe des Backofens 10 — 30 nebeneinander liegen. Derselben besitzen eine Länge von 3,5 Meter, bei einem Durchmesser von 6 Centimeter und etwa 0,5 Centimeter Wandstärke. Diese Röhren bestehen aus gezogenem Schmiedeeisen, sind zur Hälfte mit Wasser gefüllt und an beiden Enden fest zugeweiht. Sie sind vorher einer hydraulischen Probe von etwa 400 Atmosphären Druck unterworfen worden. Bei der zum Brotdaten erforderlichen Temperatur von 200 — 220° R. erhebt sich jedoch der in den Röhren entstehende Druck nicht über 800 — 100 Kilo für den Quadratcentimeter. Zu dessen Vertheilung ist eine der Heizröhren verlängert und in Verbindung gesetzt mit einem an der Vorderwand des Backofens befindlichen Manometer. Sobald dieser einen höhern Druck anzeigt, kann durch Öffnen der Regulatoren *T* und Schließen der Zughähnen *T* die Temperatur des Backofens auf die gewünschte Höhe gebracht werden. Die letztere wird überdies noch durch ein außen sichtbares Pyrometer angegeben, und man ist auf diese Weise Herr der Hitze, wie dies bei keiner andern Einrichtung möglich ist.

Daß in den Heizröhren befindliche Wasser wird nicht verzehrt, da ihm ein Ausweg nicht gestattet ist; es kommt jedoch mitunter vor, daß in einzelnen Röhren höchst feine Oeffnungen sich befinden, sogenannte Sandporen, die bei dem kalten hydraulischen Druck nicht

bemerklich werden, die jedoch bei der Kenderung, welche die Structur des Eisens in der Hitze erleidet, Wasserdampf entweichen lassen. Die Anwesenheit eines solchen fehlerhaften Rohres wird alsbald daran erkannt, daß sein dem Feuer ausgesetztes Ende glühend wird, wenn sein Wassergehalt verdunstet ist. Es genügt alsdann, dieses Rohr herauszunehmen und dasselbe durch Einschiebung eines andern zu ersetzen, zu welchem Zwecke stets einige Röhren vorrätzig gehalten werden. Der Betrieb leidet durch diesen, übrigens sehr selten nöthig werdenden Wechsel nicht die mindeste Störung.

Die Heizung der Röhren geschieht mit einem äußerst geringen Aufwand von Kohle, wie aus der Abbildung ersichtlich, indem nur ein Ende derselben von etwa 40 Centimeter der Wirkung des Feuers ausgesetzt wird.

Als Sohle des Badofens dient eine Platte von Eisenblech *b b*, welche auf sechs kleinen Rädern ruht, die auf zwei Schienen *s s* laufen, die sich außerhalb in gleicher Länge fortsetzen und von Stützen *st* getragen werden, sodaß die Badplatte leicht herausgezogen und eingeschoben werden kann. Sobald ersteres geschehen ist, wird der in Brote geformte Teig aufgelegt und

mit einem Ruck eingeschoben. Das Öffnen und Schließen der schweren Ofenthüre, die einen dichten Verschuß gewähren muß, wird erleichtert durch die Verbindung mit dem über einer Rolle beweglichen Gegengewicht *G*. Der Badofen wird mit 120 bis 160 Broten zu 2 Kilo besetzt, deren Baden 2–3 Stunden erfordert.

Die Fabrication des Brotes bei vereinter Anwendung der vorstehend beschriebenen Knetmaschine und Badofeneinrichtung gewährt, bei großer Reinlichkeit, den außerordentlichen Vortheil, daß zur Ausführung aller Verrichtungen gewöhnliche Arbeiter verwendbar sind unter Leitung eines tüchtigen Backmeisters. Es ist nicht nur die Handknetarbeit hinweg, sondern auch das Einschließen der Brote, beides mühsame Verrichtungen, von welchen insbesondere die letztere eine große Uebung und Körperkraft erfordert. In der Militärbäckerei zu Mainz, wo zehn Wieghorst'sche Badöfen aufgestellt sind, hat sich dieser fabrikmäßige Betrieb in den Jahren 1870 und 1871, wo zeitweise der Brothbedarf nicht nur für die Garnison, sondern auch für 25000 Kriegsgefangene zu bestreiten war, vorzüglich bewährt.









